

РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ

РЛС – ДОКТОР



1997

1998

Новое качество и экономичность терапии гипертоний



Индапамид

единственный
выбор для
длительной
монотерапии
гипертонии
стр. 343

Эналаприл

успешная терапия
эссенциальной
гипертонии любой
степени тяжести
стр. 813

Кортиазем ретард (дилтиазем)

гипотензивный,
антиангинальный и
противоаритмический
эффект
стр. 412

Аценозин

стойкое и
контролируемое
снижение
артериального
давления при
низких дозах
препарата
стр. 161

РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ РОССИИ

РЛС – ДОКТОР

Главный редактор Ю.Ф. Крылов

Редакционная коллегия:

В.Л. Багирова, Г.Л. Вышковский, Е.Г. Лобанова,
В.П. Падалкин, А.С. Румянцев, Г.С. Чернов

Москва

РЕМАСО  РЕМАКО

1997 / 1998

В подготовке РЛС-Доктор 97/98 принимали участие:

Руководитель работ, разработчик технологии создания РЛС-Доктор 97/98 - Г.Л.Вышковский.

Разработка и сопровождение информационного обеспечения: М.К.Евстигнеева (руководитель), М.Т.Гасанов, Г.Ф.Демьянова, Г.И.Ефремова, Е.В.Зорян, Т.В.Иванова, Е.И.Карамышева, И.М.Шугурова, Т.В.Юлова, а также сотрудники отечественных предприятий, зарубежных фармацевтических фирм и их представительств, принявшие участие в подготовке и выверке данных.

Корректировка и ввод информации: Л.А.Енгальчева (администратор базы данных), Л.Л.Лак, Л.Н.Серегина.

Разработка и сопровождение лингвистического обеспечения (терминологических словарей и классификаторов): М.К.Евстигнеева, Т.В.Иванова, Е.Г. Лобанова, А.С.Румянцев, Г.С.Чернов.

Разработка и сопровождение программного обеспечения: М.В.Румянцев.

Организационно - техническое обеспечение: Е.Г.Вышковский, Л.Ю.Елизарова.

Подготовка оригинал-макета: А.Ю.Кукин, М.В.Румянцев, Я.И.Терешин, Ж.А.Якушева.

Научно-техническое редактирование: Г.Ф.Демьянова, Г.С.Чернов.

Литературное редактирование: Л.В.Журавлева, В.С.Осипова.

Взаимодействие с предприятиями и фирмами по сбору и выверке данных: О.С.Вышковская (руководитель), И.Л.Гагарина, К.В.Гореликова, Л.Л.Лак.

Маркетинг и логистика: Обухов В.Ю. (руководитель), В.В.Бровар, О.В.Сапрыкин, Л.А.Федина, Ю.В.Шафранский.

Планово-финансовое обеспечение: Т.А.Шмелева (руководитель), С.В.Кузьмина, Т.В.Юношкина.

Оглавление

Предисловие	4
Как пользоваться РЛС-ДОКТОР 97/98	6
Список сокращений и условных обозначений	8
Глава 1. Нозологический указатель лекарственных средств	9
1.1. Алфавитный перечень показаний к применению	9
1.2. Указатель лекарственных средств (по показаниям к применению) . .	19
Глава 2. Описания лекарственных средств	105
Глава 3. Адреса предприятий и фирм и их представительств в России	843



ПРЕДИСЛОВИЕ

Пять лет творческий коллектив «Регистра лекарственных средств России» готовился к выпуску этого справочника. Все эти годы сотрудники РЛС трудились над тем, чтобы российский врач получил удобный отечественный карманный справочник о новейших лекарственных средствах, который, будучи компактным, тем не менее, содержал бы полную, достоверную и актуальную информацию. РЛС-ДОКТОР 97/98 предназначен сотням тысяч врачей всех областей медицины, учащимся медицинских учебных заведений, включая систему постдипломного образования, и просто людям, заботящимся о своем здоровье. Сотни специалистов приняли участие в подготовке описаний препаратов, в консультациях, выверке и согласовании данных, обеспечивая своим трудом высокую достоверность и актуальность материалов справочника.

Настоящее издание РЛС-ДОКТОР 97/98 - одно из трех* в серии справочников РЛС - содержит необходимую для врача информацию о 2000 лекарственных средств 226 отечественных и зарубежных производителей. Все препараты разрешены к медицинскому применению в России и реально присутствуют в ее аптечной сети. Как правило, это - лекарства ведущих зарубежных фармацевтических компаний, хотя 20% массива описаний составляют отечественные препараты, а также лекарственные средства производителей из стран СНГ и Балтии.

РЛС-ДОКТОР 97/98 - первый карманный справочник, применяющий в качестве поискового указателя динамическую нозологическую классификацию (по показаниям к применению), построенную на существующем в книге массиве описаний препаратов.

В РЛС-ДОКТОР 97/98 производители получили возможность выбрать целесообразный объем описаний для своих препаратов. Краткое описание, как правило, имеет известный специалистам препарат, который не является оригинальным. Более полная информация приводится в описаниях препаратов, являющихся для производителей основными с точки зрения их распространения в России.

РЛС-ДОКТОР 97/98 есть составная часть системы справочников РЛС. Ему свойственно строгое следование национальным правилам ведения и использования терминологических словарей (реестров) и классификаторов. В качестве лингвистической основы в РЛС применяются терминологические словари и классификаторы, использующие только

***) Информацию о двух других справочниках системы РЛС - «РЛС- 97/98» и «РЛС-ПК», читатель может найти на цветной вклейке настоящего издания.**

официальные источники информации: «Государственный реестр лекарственных средств» (далее по тексту Госреестр), «Государственная фармакопея», приказы Министерства здравоохранения РФ. Для соблюдения требований единого информационного пространства в настоящем издании списки торговых названий лекарств и перечни международных непатентованных названий приведены в соответствие с Госреестром.

Словарь МНН* ведется, как и в Госреестре на русском языке. В качестве основы используется русскоязычный словарь, подготовленный специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Актуализация словаря осуществляется в рамках базы данных «Регистра лекарственных средств России», причем возникающие терминологические разногласия удовлетворяются, как правило, в пользу принятого в отечественной практике варианта.


Опыт показывает, что врачи нашей страны часто не знают производителей лекарств, которыми они лечат пациентов, хотя им известно, что препараты, выпускаемые различными фирмами, вследствие неодинаковой технологии производства и других причин, могут различаться по биологической доступности. Поэтому в книгу включен раздел, содержащий сведения о производителях лекарственных средств, вошедших в РЛС-ДОКТОР 97/98.

Хотя коллектив РЛС старался выпустить книгу, отвечающую самым строгим требованиям читателей, мы далеки от мысли о ее совершенстве и будем рады любому обоснованному критическому замечанию, высказанному в адрес справочника.

Мы выражаем глубокую благодарность всем сотрудникам предприятий и фирм, принявшим участие в подготовке и выверке данных РЛС-ДОКТОР 97/98, а также приносим извинения всем тем, чьи замечания не были учтены как несоответствующие общим принципам РЛС.



Ю.Ф.Крылов,
Профессор, доктор
медицинских наук,
главный редактор
"Регистра лекарственных
средств России"



Г.Л.Вышковский,
Кандидат
технических наук,
директор
издательства
«Ремако»



Как пользоваться «РЛС-ДОКТОР» 97 / 98

Если врачу известно заболевание, то с помощью нозологического указателя (глава 1) он сразу узнает о препаратах, показанных при лечении или профилактике данного заболевания. В основу нозологического указателя положен системный уровень классификации заболеваний. Поскольку содержание поля показаний современной номенклатуры лекарственных средств невозможно ограничить только рамками нозологий, редколлегия сочла необходимым расширить классификатор некоторыми синдромально-симптоматическими и диагностическими средствами. Таким образом, все лекарственные средства сгруппированы по заболеваниям или показаниям к применению.

В каждой группе лекарственных средств легко обнаружить вновь зарегистрированный препарат с незнакомым торговым названием. Для удобства работы с указателем он дополнен перечнем основных разделов нозологической классификации (3-я обложка) со ссылками на страницы указателя, с которых они начинаются. Для облегчения поиска нужной нозологии приведен алфавитный перечень нозологической классификации со ссылками на соответствующие группы указателя.

Полные названия предприятий и фирм и соответствующие им краткие наименования даны в главе 3 «Адреса предприятий и фирм и их представительств в России». Раздел поможет читателю найти нужного производителя или его представителя в России и узнать их реквизиты.

Если читателю известно принятое в России торговое название лекарственного средства, он может найти его описание непосредственно в главе 2, поскольку описания препаратов расположены там в алфавитном порядке по торговым названиям. Из описаний лекарственных средств читатель может получить медицинскую информацию по препарату, необходимую для принятия решения о возможности его применения.

Ниже приведен алфавитный перечень используемых в книге сокращенных названий информационных полей с их расшифровкой:

- Сост. и ф.в.** - состав и форма выпуска,
- Фарм. действ.** - фармакологическое действие,
- Фармакодин.** - фармакодинамика,
- Фармакокин.** - фармакокинетика,
- Клин. фармак.** - клиническая фармакология,

Показ. - показания,

Противопоказ. - противопоказания,

Берем. и корм. гр. - применение при беременности и кормлении грудью,

Поб.действ. - побочные действия,

Передоз. - передозировка,

Взаим. - взаимодействие,

Прим. и доз. - способ применения и дозы,

Предост. - меры предосторожности,

Произв. - производители или их представители.

Кроме того, описание препарата содержит следующие информационные поля: торговое название на русском языке, торговое название на латинском языке (как правило для отечественных лекарств) или на английском языке (преимущественно для зарубежных препаратов), международное непатентованное название на русском языке.

В случае, если информация в поле отсутствует, оно не выводится в описании.

Зарегистрированные торговые названия снабжены символом ®.

Препараты одного и того же производителя, имеющие разные торговые названия, формы выпуска и дозы, но одинаковый состав, имеют общее описание с одноименным названием.

Поскольку описания препаратов подготовлены по материалам производителей, препараты - синонимы, в основе которых лежит одно действующее вещество, могут иметь расхождения по форме описания их содержания.

Все сокращения и условные обозначения, встречающиеся в тексте РЛС-ДОКТОР 97/98, даны на странице 8.

Полученные из РЛС-ДОКТОР 97/98 сведения могут быть использованы читателями для принятия решений о возможном применении лекарственных средств, но сами по себе не могут применяться для прописания препарата пациенту. Издательство снимает с себя ответственность за отрицательные последствия, связанные с неправильным использованием информации РЛС-ДОКТОР 97/98.

Список сокращений и условных обозначений

А - ампер
АД - артериальное давление
АДГ - антидиуретический гормон
АКТГ - адренокортикотропный гормон
АЛТ - аланинаминотрансфераза
АМФ - аденозинмонофосфат
АО - акционерное общество
АООТ - акционерное общество открытого типа
АПФ - ангиотензинпревращающий фермент
АСТ - аспартатаминотрансфераза
атм. - атмосфера
АТФ - аденозинтрифосфат
БМКК - блокаторы "медленных кальциевых каналов"
в/а - внутриаьтериально
в/в - внутривенно
в/к - внутрикжно
в/м - внутримышечно
Витамин Вс - фолиевая кислота
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
ВОЗ - всемирная организация здравоохранения
Вт - ватт
г - грамм
ГАБК - гамма-аминобутировая кислота
ГАМК - гамма-аминомасляная кислота
град.С - градус Цельсия
Гц - герц
ГЭБ - гематоэнцефалический барьер
дАД - диастолическое артериальное давление
ДВС - дессиминированное внутрисосудистое свертывание
Дж - джоуль
ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота
др. - другие
ЕД - единица действия
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИБС - ишемическая болезнь сердца
ИВЛ - искусственная вентиляция легких
ИФТС - Иммуноферментная тест-система
кг - килограмм
КЕ - коллагеназные единицы активности
КЕД - кошачья единица действия
КИЕ - калликреиновая ингибирующая единица
КЩР - кислотно-щелочное равновесие
кв.м. - квадратный метр
кв.см - квадратный сантиметр
ккал/л - килокалорий на литр

к.р.с. - крупный рогатый скот
куб.мм - кубический миллиметр
ЛГ - лютеинизирующий гормон
ЛДГ - лактатдегидрогеназа
ЛЕД - лягушачья единица действия
ЛОР - оториноларингология
ЛПВП - липопротеиды высокой плотности
ЛПНП - липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП - липопротеиды очень низкой плотности
ЛППП - липопротеиды очень высокой плотности
л - литр
МАО - моноаминоксидаза
МЕ - международные единицы
мес - месяц
мин - минута
мкг - микрограмм
мл - миллилитр
млн. - миллион
мм рт.ст. - миллиметр ртутного столба
МНН - международное непатентованное название
мОсм - миллиосмолярность
МПК - минимальная подавляющая концентрация
МРТ - магнитно-резонансная томография
мэкв - миллиэквивалент
нг - нанограмм
НД - нормативная документация
нед - неделя
НПВС - нестероидные противовоспалительные средства
НПЦ - научно-производственный центр
ОАО - открытое акционерное общество
об.% - объемный процент
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция
ОРЗ - острое респираторное заболевание
ОЦК - объем циркулирующей крови
ПАВ - поверхностно-активные вещества
ПАСК - парааминосалициловая кислота
ПВП - поливинилпирролидон
ПВХ - поливинилхлорид
пг - пикограмм
ПДК - предельно допустимая концентрация
ПЕ - протеолитические единицы активности
п/к - подкожно
ППР - процесс перерегистрации
ПР - процесс регистрации
РАН - Российская академия наук

РЛС - регистр лекарственных средств
РНК - рибонуклеиновая кислота
с - секунда
сАД - систолическое артериальное давление
см - сантиметр
см. - смотри
СОЭ - "скорость" оседания эритроцитов
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита
СТГ - соматотропный гормон
ст. - статья
тел. (tel.) - телефон
т.н. - так называемый
ТОС - тонкие органические соединения
ТДТС - трансдермальная терапевтическая система
ТУ - технические условия
УВЧ - ультравысокие частоты
УЕ - условные единицы активности
УЗИ - ультразвуковое исследование
УФ - ультрафиолетовое
Фармгруппа - фармакотерапевтическая группа
ФЕ - фибринолитическая единица
ФС - фармакопейная статья
ФСГ - фолликулостимулирующий гормон
ХГ - хорионический гонадотропин
ХЕ - хлебные единицы
ЦНС - центральная нервная система
ч - час
ч. - часть
ЧДА - чистый для анализа
ЧСС - частота сердечных сокращений
шт. - штук
ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота
ЭКГ - электрокардиография
ЭЭГ - электроэнцефалография
AUC - площадь под кривой "концентрация - время"
AV - атриовентрикулярная (блокада, проводимость)
Cl - клиренс
Cmax - максимальная концентрация препарата в плазме крови
Cmin - минимальная концентрация препарата в плазме крови
CoA - коэнзим А
per os - введение лекарственного препарата через рот
pH - водородный показатель
q.s. - в достаточном количестве
T_{1/2} - период полувыведения препарата
WPW-синдром - синдром Вольфа - Паркинсона - Уайта



ГЛАВА 1

Нозологический указатель лекарственных средств

1.1. Алфавитный перечень показаний к применению

А			
Абстиненция	91	Ангионевротический отек	64
Абсцесс	22	Ангиопатия	68
Абсцесс внутрибрюшинный	51	Ангиопатия диабетическая	68
Абсцесс кожи и мягких тканей	29	Андрогензависимые заболевания	84
Абсцесс легких	62	Андрогенная недостаточность	84
Абсцесс мозга	36	Анемия	56
Агранулоцитоз	57	Анемия В ₁₂ дефицитная	56
Агрессивность	93	Анемия апластическая	56
Аденоидит	22	Анемия гемолитическая	56
Аденома предстательной железы	81	Анемия железodefицитная	56
Адипозогенитальный синдром	85	Анемия медикаментозная	57
Аднексит	77	Анемия постгеморрагическая	57
Адреногенитальный синдром	85	Анемия фолатдефицитная	57
Акромегалия	85	Анкилостомоз	23
Актиномикоз кожи	30	Анорексия	47
Актиномикоз легких	25	Апатия	93
Алкоголизм	92	Аритмии желудочковые	73
Аллергические заболевания ЖКТ	47	Аритмии на фоне дигиталисной интоксикации	73
Аллергические заболевания глаз	19	Аритмии наджелудочковые	74
Аллергические заболевания дыхательных путей	58	Аритмии при WPW-синдроме	74
Алоpecia	26	Аритмия мерцательная	74
Альцгеймера болезнь	36	Аритмия мерцательная пароксизмальная	74
Амебиаз	22	Аритмия мерцательная тахисистическая	74
Аменорея	78	Артралгия	97
Аменорея вторичная	78	Артрит	41
Аменорея пролактинзависимая	78	Артрит инфекционный	41
Амиотрофический боковой склероз	36	Артрит подагрический	41
Анасарка	75	Артрит ревматоидный	41
Ангина	22	Артроз	43
Ангина агранулоцитарная	22		
Ангина фолликулярная	22		
Ангиография	70		
Ангиокардиография	70		
		Артроз деформирующий	43
		Аскаридоз	23
		Аспергиллез	25
		Астения	87
		Астенопические жалобы	19
		Астма бронхиальная	58
		Астма бронхиальная атопическая	59
		Астма бронхиальная инфекционно-аллергическая	59
		Астма бронхиальная физических напряжений	59
		Астматический статус	59
		Астроцитомы	39
		Асфиксия	102
		Асфиксия новорожденных	102
		Асфиксия плода внутриутробная	102
		Асцит	47
		Атеромы нагноившиеся	29
		Атеросклероз	68
		Атеросклероз периферических сосудов	68
		Атеросклероз сосудов мозга	68
		Атеросклероз сосудов сердца	68
		Атония ЖКТ	47
		Атония желудка	47
		Атония кишечника	47
		Атония матки	102
		Атония мочевого пузыря	77
		Атрофия зрительного нерва	39
		Атрофия мышц	43
		Аутоиммунные заболевания крови	57
		Ахилия	53
		Ацидоз	89
		Б	
		Бактериемия	22
		Бактериурия	77

Баланопостит	77
Белковая недоста- точность	87
Беременность и лактация	90
Беременность не- доношенная	102
Бесплодие	77
Бесплодие жен- ское	77
Бесплодие муж- ское	77
Бесплодие на фоне гиперпролак- тинемии	77
Беспокойство	94
Бессонница	92
Бешенство	23
Блефарит	20
Блефароконъюнк- тивит	20
Болевой синдром в родах и послеро- довой период	98
Болевой синдром выраженный	97
Болевой синдром при инфаркте лег- кого	98
Болевой синдром при инфаркте ми- окарда	98
Болевой синдром при остром пан- креатите	98
Болевой синдром при прорезыва- нии зубов	98
Болевой синдром слабый	98
Болевой синдром умеренный	98
Болезнь лучевая	19
Боли в глазах	99
Боли при ноше- нии зубных протез- ов	99
Боли фантомные	99
Боль головная	99
Боль зубная	99
Бородавки	29
Брадикардия	74
Бредовые состоя- ния	92
Бронхит	59
Бронхит астмати- ческий	60
Бронхит с гипер- секрецией слизи	60
Бронхит хрони- ческий	60
Бронхоспазм	60
Бронхоэктатичес- кая болезнь	60

Бруцеллез	22
Бурсит	44
В	
Вагинит	77
Варикозное рас- ширение вен	68
Варикозное рас- ширение вен пи- щевода	49
Венерические за- болевания	22
Вентрикулография	36
Вертебро-базилляр- ная недостаточность	36
Ветряная оспа	24
Возбуждение	93
Возбуждение пси- хомоторное	93
Вульвит	77
Вульвовагинит	78
Выкидыш	102
Выкидыш в пер- вом триместре бе- ременности	102
Выкидыш несосто- явшийся	102
Выкидыш угро- жающий	102
Г	
Гайморит	65
Галакторея	35
Галлюцинации	92
Гастралгия	99
Гастрит	47
Гастрит анацид- ный	47
Гастрит атрофи- ческий	47
Гастрит гипер- ацидный	47
Гастрит острый	47
Гастрит хроничес- кий	47
Гастрит эрозивный	47
Гастроэнтерит	48
Гастроэнтероколит	55
Гельминтозы	23
Гематома	26
Гемералопия	20
Геморрагический синдром	96
Геморрой	48
Гемосидероз	87
Гепатит	48
Гепатит аутоим- мунный	48
Гепатит вирусный	48
Гепатит паренхи- матозный	48
Гепатит токсичес- кий	48

Гепатит хроничес- кий	48
Гепатоз жировой	48
Гепатопоражения лекарственные	101
Гепатохолецистит	48
Герпес	23
Герпес гениталь- ный	80
Герпес глаз	20
Герпес зостер	24
Герпес простой	24
Гидраденит	29
Гименолепидоз	23
Гингивит	67
Гинекомастия	35
Гиперагрегация	96
Гиперазотемия	83
Гиперальдостеро- низм	85
Гиперацидность желудочного сока	48
Гипербилирубине- мия	49
Гипервитаминоз D	87
Гиперкальциемия	89
Гиперкератоз кожи	26
Гиперкинез	36
Гиперкоагуляция	96
Гиперлипидемия	69
Гиперпаратиреоз	85
Гиперпролактине- мия	84
Гиперпролактине- мия медикаментоз- ная	84
Гиперрубцевание	27
Гиперсаливация	67
Гипертензия	69
Гипертензия арте- риальная	69
Гипертензия внут- ричерепная	36
Гипертензия ги- перкинетическая	70
Гипертензия мало- го круга кровооб- ращения	70
Гипертензия пор- тальная	49
Гипертиреоз	85
Гипертонический криз	70
Гипертонус мы- шечный	38
Гипертриглицери- демия	69
Гиперурикемия	87
Гиперфибринолиз	96
Гиперхолестерине- мия	69
Гипоальбуминемия	87

Гиповитаминоз	88	Дезориентация	93	Диагностические	
Гиповитаминоз А	88	Деменция	93	средства	21
Гиповитаминоз В	88	Депрессия	94	Диарея	49
Гиповитаминоз В ₁	88	Депрессия ажити-		Диарея аллерги-	
Гиповитаминоз В ₂	88	рованная	94	ческая	49
Гиповитаминоз В ₆	88	Дерматит	27	Диарея бактери-	
Гиповитаминоз В _с	88	Дерматит аллерги-		альная	51
Гиповитаминоз С	88	ческий	27	Диарея лучевая	49
Гиповитаминоз D	89	Дерматит герпети-		Диарея medica-	
Гиповитаминоз РР	89	формный Дюрин-		ментозная	49
Гиповолемия	70	га	27	Диатез экссуда-	
Гипогликемия	91	Дерматит зудящий	27	тивный	89
Гипогонадизм	84	Дерматит инфици-		Дивертикулит ки-	
Гипокалиемия	89	рованный	27	шечника	49
Гипокальциемия	89	Дерматит пеленоч-		Дизентерия	23
Гипокоагуляция	96	ный	27	Дизентерия амеб-	
Гипоксия мозга		Дерматит пузыр-		ная	22
медикаментозная	36	чатый	27	Дизурия	78
Гиполактация	35	Дерматит эксфо-		Дисальгоменорея	99
Гипонатриемия	89	лиативный	27	Дисбактериоз	23
Гипопаратиреоз	85	Дерматомиозит	44	Дисгенезия гонад	
Гипоплазия	78	Дерматофития	30	(синдром Терне-	
Гипотензия арте-		Детский тик	40	ра)	78
риальная	70	Дефицит в орга-		Дисгидроз кожи	28
Гипотензия арте-		низме железа	90	Дискинезия ЖКТ	49
риальная ортоста-		Дефицит фактора		Дискинезия желч-	
тическая	70	свертывания		ных путей	49
Гипотиреоз	85	крови II	96	Дисменорея	78
Гипотонус мышеч-		Дефицит фактора		Диспепсия	49
ный	38	свертывания		Диспепсия бро-	
Гипотрофия	89	крови IX	96	дильная	50
Гипофункция жел-		Дефицит фактора		Диспепсия гни-	
того тела	85	свертывания		лостная	50
Гипофункция под-		крови VII	96	Диспермия	79
желудочной желе-		Дефицит фактора		Дистония вегета-	
зы		свертывания		сосудистая	70
внешнесекретор-		крови VIII	96	Дистресс-синдром	
ная	53	Дефицит фактора		респираторный	60
Гипофункция яич-		свертывания		Дистрофия гепато-	
ников	85	крови X	96	церебральная	50
Гирсутизм	27	Диабет несахар-		Дистрофия рого-	
Гистеросальпинго-		ный	85	вицы	20
графия	78	Диабет сахарный	86	Дистрофия сетчат-	
Гистоплазмоз	25	Диабет сахарный		ки	20
Глаукома	19	инсулинзависимый	86	Дисфагия	50
Глаукома вторич-		Диабет сахарный		Дифиллоботриоз	23
ная	19	инсулиннезависи-		Дифтерия	23
Глаукома закрыто-		мый	86	Диэнцефальный	
угольная	19	Диагностика	36	синдром	36
Глаукома открыто-		Диагностика	70	Дуоденит	50
угольная	19	Диагностика забо-		Дыхательная не-	
Глиобластома	39	леваний	60	достаточность	61
Гломерулонефрит	81	Диагностика забо-			
Глоссалгия	99	леваний ЖКТ	49	Ж	
Гонорея	22	Диагностика забо-		Желчнокаменная	
Грипп	24	леваний почек	78	болезнь	50
		Диагностика забо-			
		леваний почек и		З	
		мочевыводящих		Заболевания арте-	
		путей	78	рий	70
		Диагностика забо-		Заболевания арте-	
		леваний урогени-		рий окклюзион-	
		тальных органов	78	ные	70
				Заболевания вен	71
Д					
ДВС-синдром	96				
Дегенеративные					
заболевания внут-					
реннего уха (ото-					
склероз)	66				

Заболевания гипоталамо-гипофизарные..... 85	Затрудненное мочеиспускание..... 79	Инттоксикация щавелевой и фтористой кислотами..... 102
Заболевания глаз..... 19	Затрудненное отделение мокроты..... 61	Инфантилизм психический..... 93
Заболевания инфекционные..... 22	Затрудненное сосредоточение..... 93	Инфаркт миокарда..... 72
Заболевания кожи..... 26	Зоб токсический диффузный..... 85	Инфаркт миокарда острый..... 72
Заболевания молочных желез..... 35	Зоб эндемический..... 85	Инфекции ЛОР-органов..... 62
Заболевания надпочечников..... 85	Золлингера-Эллисона синдром..... 50	Инфекции абдоминальные..... 51
Заболевания нервной системы..... 36	Зуд..... 28	Инфекции вирусные..... 23
Заболевания ногтей..... 30	Зуд аногенитальный..... 28	Инфекции вирусные дыхательных путей..... 62
Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани..... 41	Зуд старческий..... 28	Инфекции вирусные кожи..... 29
Заболевания органов ЖКТ и гепатобилиарной зоны..... 47	И	Инфекции вирусные полости рта..... 67
Заболевания органов кроветворения..... 56	Изжога..... 50	Инфекции вирусные слизистых оболочек..... 28
Заболевания органов респираторной системы..... 58	Икота..... 50	Инфекции волосистых участков кожи..... 29
Заболевания органов слуха..... 66	Иммунодефицит..... 87	Инфекции глаз вирусные..... 20
Заболевания парашитовидной железы..... 85	Импетиго..... 29	Инфекции желчевыводящих путей..... 51
Заболевания периферической крови..... 57	Импотенция..... 79	Инфекции мочевыводящих путей..... 79
Заболевания полости рта..... 67	Инволюция матки медленная..... 102	Инфекции на фоне иммунодефицита..... 24
Заболевания преломляющих сред глаза..... 20	Инсульт..... 37	Инфекции наружного слухового прохода..... 66
Заболевания сердечно-сосудистой системы..... 68	Инсульт геморрагический..... 37	Инфекции органов грудной клетки..... 62
Заболевания сетчатки..... 20	Инсульт ишемический..... 37	Инфекции органов малого таза..... 80
Заболевания спинного мозга..... 36	Интеллектуально-мнестические расстройства..... 93	Инфекции печени..... 51
Заболевания урогенитальных органов..... 77	Инттоксикация алкалоидами..... 101	Инфекции пищевода..... 51
Заболевания щитовидной железы..... 85	Инттоксикация алкогольная..... 101	Инфекции половых органов вирусные..... 80
Заболевания эндокринные..... 84	Инттоксикация антагонистами фолиевой кислоты..... 101	Инфекции полости рта..... 51
Заикание..... 40	Инттоксикация антихолинэстеразными средствами..... 101	Инфекции после родовые..... 80
Запоры..... 50	Инттоксикация бензольная..... 101	Инфекции почек..... 80
Запоры атонические..... 50	Инттоксикация металлами (редкоземельными, тяжелыми)..... 101	Инфекции тазовой клетчатки..... 80
Запоры спастические..... 50	Инттоксикация мышьяком..... 101	Инфекции урогенитальные..... 79
Запоры у беременных..... 50	Инттоксикация наркотиками..... 101	Инфекции челюстно-лицевой области..... 24
Запоры хронические..... 50	Инттоксикация никотином..... 101	
Заторможенность..... 93	Инттоксикация радионуклидами..... 101	
	Инттоксикация сердечными гликозидами..... 101	
	Инттоксикация снотворными и транквилизаторами..... 102	

Инфекционно-воспалительные заболевания ЖКТ.....	50	Клонорхоз.....	23	Кровотечение желудочно-кишечное.....	96
Инфекционно-воспалительные заболевания глаз.....	20	Коклюш.....	24	Кровотечение капиллярное.....	97
Инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей.....	61	Коксартроз.....	43	Кровотечение легочное.....	97
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей.....	28	Колика.....	52	Кровотечение маточное.....	97
Инфекция раневая.....	29	Колика желчная.....	52	Кровотечение носовое.....	97
Инфильтрат роговицы.....	20	Колика кишечная.....	52	Кровотечение печеночное.....	97
Ипохондрия.....	94	Колика почечная.....	81	Кровотечение у больных с лейкозами.....	97
Иридоциклит.....	20	Колит.....	52	Кровотечение у больных с тромбоцитопенической пурпурой.....	97
Ирит.....	20	Колит псевдомембранозный.....	52	Крона болезнь.....	52
Истерия.....	92	Колит спастический.....	52	Ксерофтальмия.....	21
Иценго-Кушинга болезнь.....	85	Колит хронический.....	52		
Ишемическая болезнь сердца.....	71	Колит язвенный.....	52		
Ишиалгия.....	99	Коллагенозы.....	44		
		Кома диабетическая.....	87		
К		Кома мозговая.....	92		
Кандидозы ЖКТ.....	51	Кома печеночная.....	52		
Кандидозы кожи.....	30	Компьютерная томография.....	78		
Кандидозы системные.....	25	Кондилома остроконечная.....	29	Л	
Кандидозы слизистых оболочек.....	30	Контрактуры мышечные.....	38	Ларингит.....	64
Карбункулы.....	29	Контрацепция.....	81	Ларингопапилломатоз.....	64
Кардиалгия.....	100	Контрацепция местная.....	81	Легионеров болезнь.....	24
Кардиомиопатия.....	73	Контрацепция оральная.....	81	Легочно-сердечная недостаточность.....	75
Кардиомиопатия гипертрофическая обструктивная.....	73	Конъюнктивит.....	21	Лейкоз.....	57
Кардиопоражения антрациклиновые.....	102	Конъюнктивит аллергический.....	19	Лейкоз волосатоклеточный.....	57
Кардиосклероз.....	73	Корь.....	24	Лейкоз гранулоцитарный.....	57
Карнес зубов.....	67	Кохлеовестибулярный синдром.....	36	Лейкоз нелимфобластный.....	57
Каталепсия.....	92	Крапивница.....	31	Лейкопения.....	57
Катаракта.....	20	Красная волчанка.....	44	Лейкопения апластическая.....	57
Кахексия.....	89	Краснуха.....	24	Лейшманиоз висцеральный.....	24
Кашель.....	63	Кривошея спастическая.....	38	Лейшманиоз кожный.....	29
Кашель сухой.....	64	Криптококкоз.....	25	Лептоспироз.....	24
Квинке отек.....	31	Кровоизлияние в сетчатку глаза.....	21	Лимфаденит и лимфангит.....	57
Кератит.....	20	Кровоизлияние в стекловидное тело.....	21	Лимфогранулема паховая.....	23
Кератоз сенильный.....	26	Кровоизлияние внутриглазное.....	21	Лимфогранулематоз.....	57
Кератоиридоциклит.....	20	Кровоизлияние внутричерепное.....	36	Лимфогранулематоз доброкачественный.....	58
Кератоконъюнктивит.....	20	Кровотечение.....	96	Лимфогранулематоз злокачественный.....	58
Кератомалиция.....	20	Кровотечение в полости рта.....	96	Лимфолейкоз.....	57
Климакс.....	80	Кровотечение в послеоперационном периоде.....	96	Лимфома.....	58
Климакс у женщин.....	80	Кровотечение геморроидальное.....	96	Лимфома Беркитта.....	58
Климакс у мужчин.....	81	Кровотечение гиперфибринолитическое.....	96	Лимфома гистиоцитарная.....	58

Лимфома нелим- фобластная.....	58
Лимфома неходж- кинская.....	58
Лимфосаркома.....	58
Липомы нагноив- шиеся.....	29
Листерия.....	24
Лишай красный плоский.....	31
Лишай разноцвет- ный.....	30
Лучевые пораже- ния кожи.....	19
Лучевые пораже- ния слизистых.....	19
Лямблиоз.....	24

М

Магнитно-резо- нансная томогра- фия головного и спинного мозга.....	36
Мальабсорбция.....	52
Малярия.....	25
Масталгия.....	100
Мастит.....	35
Мацерация кожи.....	31
Мезотелиома плевры.....	64
Меланوما.....	33
Менингит.....	36
Менингит крипто- кокковый.....	37
Менингит менин- гококковый.....	37
Менингококконо- сительство.....	37
Менингомиелит.....	37
Меньера болезнь.....	37
Метеоризм.....	53
Миалгия.....	100
Миастения.....	37
Мигрень.....	37
Миелография.....	36
Миелолейкоз.....	57
Миеломная бо- лезнь.....	58
Миелопатия фуни- кулярная.....	36
Миелофиброз.....	58
Микоз грибовид- ный.....	33
Микозы кожи.....	29
Микозы кожи во- лосистой части го- ловы.....	30
Микозы кожи вто- ричноинфициро- ванные.....	30
Микозы наруж- ных половых ор- ганов.....	30

Микозы систем- ные.....	25
Микозы слизис- тых оболочек.....	30
Микоплазмоз.....	25
Микроспория.....	30
Микротравмы.....	31
Минеральная не- достаточность.....	89
Миозит.....	44
Миокардиодистро- фия.....	73
Миопатия.....	44
Миопия.....	19
Муковисцидоз легких.....	64
Мягкий шанкр.....	23

Н

НПВС-гастропа- тия.....	53
Навязчивые рас- стройства.....	93
Надпочечниковая недостаточность.....	85
Нанизм гипофи- зарный.....	85
Напряженность.....	94
Нарколепсия.....	92
Нарушение КЩС.....	89
Нарушение мозго- вого кровообраще- ния.....	37
Нарушение мы- шечного тонуса.....	38
Нарушение це- лостности кожи.....	31
Нарушение эндо- кринной функци поджелудочной железы.....	86
Нарушения внут- риглазного крово- обращения.....	21
Нарушения водно- электролитного обмена.....	89
Нарушения возбу- димости, проводи- мости и автоматизма серд- ца.....	73
Нарушения вос- приятия информа- ции.....	92
Нарушения засы- пания.....	92
Нарушения им- мунной системы.....	87
Нарушения крово- обращения в орга- нах слуха.....	67

Нарушения мыс- лительной дея- тельности.....	92
Нарушения обмен- а веществ.....	87
Нарушения пери- ферического кро- вообращения.....	70
Нарушения психи- ки.....	91
Нарушения разви- тия костной систе- мы и зубов.....	90
Нарушения роста.....	87
Нарушения свер- тывающей систе- мы крови.....	96
Нарушения тро- фики глаза.....	21
Нарушения тро- фики кожи и волос.....	32
Нарушения це- лостности и трав- мы глаза.....	21
Нарушения эмоци- ональной сферы.....	93
Невралгия.....	100
Неврастения.....	95
Неврит.....	38
Неврит зрительно- го нерва.....	38
Неврит лицевого нерва.....	38
Неврит тройнич- ного нерва.....	38
Невроз.....	95
Недостаточное слезоотделение.....	21
Недостаточность артериовенозного кровообращения.....	75
Недостаточность венозного крово- обращения.....	71
Недостаточность внешнесекретор- ной функции орга- нов ЖКТ.....	53
Недостаточность лимфатического кровообращения.....	75
Нейробластома.....	39
Нейрогенный мо- чевой пузырь.....	81
Нейродермит.....	32
Нейропатия.....	39
Нейропатия диабе- тическая.....	39
Некатороз.....	23
Нефрит.....	81
Нефроз.....	81
Нефропатия.....	81



Нефропатия беременных 81
 Нефротический синдром 81
 Нефроуролитиаз 81
 Нефроуролитиаз уратный 81

О

Обменно-дистрофические заболевания внутренних органов 90
 Обменно-дистрофические заболевания нервной системы 39
 Обменно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата 44
 Обморожение 32
 Ожирение 90
 Ожоги 32
 Ожоги глаз 21
 Ожоги глубокие 32
 Ожоги инфицированные 32
 Ожоги кожи и слизистой 33
 Ожоги кожи фосфором 33
 Ожоговая болезнь 33
 Озена 64
 Олигоменорея 78
 Олигоспермия 79
 Олигофрения 93
 Онихомикозы 30
 Описторхоз 23
 Определенность 33
 Опухоли 33
 Опухоли 44
 Опухоли 64
 Опухоли мозга 39
 Опухоли молочной железы доброкачественные 35
 Опухоли на фоне лучевой болезни 19
 Опухоли органов ЖКТ 53
 Опухоли уrogenитальных органов 81
 Орнитоз (пситтакоз) 26
 Орхит 82
 Остаточные явления геморрагического инсульта 37
 Остаточные явления ишемического инсульта 38

Остаточные явления нарушения мозгового кровообращения 38
 Остаточные явления полиомиелита 39
 Остаточные явления субарахноидального кровоизлияния 38
 Остаточные явления черепно-мозговых травм 40
 Остеоартрит 42
 Остеоартроз 43
 Остеолизис 45
 Остеомалация 45
 Остеомиелит 45
 Остеопатия 45
 Остеопороз 45
 Остеопороз постменопаузальный 45
 Остеопороз стероидный 45
 Остеосаркома 44
 Остеохондроз 43
 Остит деформирующий 45
 Острые аллергические реакции на лекарства, пищу, укусы насекомых и др. 104
 Отек 64
 Отек легких 75
 Отек мозга 39
 Отек слизистой носоглотки 64
 Отеки периферические 75
 Отечный синдром 75
 Отит средний 67
 Отит средний аллергический 67
 Отит средний инфекционный 67
 Отрыжка 53
 Отслойка десневого края 67

П

Панариций 33
 Панкреатит 53
 Панкреатит геморрагический 53
 Панкреатит острый 53
 Панкреатит рецидивирующий 53
 Панкреатит хронический 53
 Панкреофиброз (муковисцидоз) 53
 Парагонимоз 23

Паралич 39
 Паралич бульбарный 39
 Паралич лицевого нерва 39
 Паралич спастический 39
 Паралич церебральный детский 39
 Параметрит 82
 Паранойя 94
 Паратиф 25
 Парез 39
 Парентеральное питание 90
 Паркинсона болезнь 39
 Паркинсонизм 39
 Пародонтит 67
 Пародонтоз 67
 Паронихия 33
 Педикулез 33
 Перелом 45
 Перелом костей несрастающийся 45
 Периаартериит узелковый 44
 Периаартрит 42
 Перикардит 75
 Период интенсивного роста, пожилой возраст 90
 Перитонит 51
 Перифлебит поверхностный 71
 Печеночная недостаточность 53
 Пиелит 83
 Пиелонефрит 82
 Пиелостит 83
 Пилороспазм 54
 Пинодермия 31
 Плеврит 62
 Плексит 38
 Пневмония 63
 Пневмония крупозная 63
 Пневмония новорожденных 63
 Пневмония очаговая 63
 Пневмония послеоперационная 63
 Пневмония хроническая 63
 Повреждения зубной эмали 68
 Повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах 90



Повышенная про- ницаемость сосу- дов	75
Подагра	88
Полиартрит	42
Полименорея	78
Полиневрит	38
Полиомиелит	39
Поллиноз	65
Половое созрева- ние преждевре- менное	83
Половые наруше- ния	83
Порфирия	91
Послеинфаркт- ный период	72
Посткастрацион- ный синдром	85
Постфлебитный синдром	71
Постхолецистэкто- мический синдром	54
Почесуха	33
Почесуха солнеч- ная	33
Почечная недоста- точность	83
Почечная недоста- точность острая	83
Почечная недоста- точность хрони- ческая	83
Преварикозный синдром	71
Предменструаль- ный синдром	83
Преходящее нару- шение мозгового кровообращения	38
Проказа	33
Проктит	54
Проктосигмоидит эрозивный	54
Пролежни	33
Простатит	83
Простатит хрони- ческий	83
Псевдомеланхо- лия старческая	94
Психоз	95
Психоз алкоголь- ный	95
Психоз инволюци- онный	95
Психоз мания- кально-депрессив- ный	95
Психопатия	95
Псориаз	33
Пузырчатка	34
Пульпит	68

Р

Рабдомиосаркома	44
Радикулит пояс- нично-крестцовый	38
Раздражитель- ность	94
Рак	39
Рак бронхов	64
Рак гортани	64
Рак желудка	53
Рак кишечника	53
Рак кожи	33
Рак колоректаль- ный	53
Рак легких	64
Рак матки	81
Рак молочной же- лезы	35
Рак молочной же- лезы в постмено- паузе	35
Рак молочной же- лезы гормонозави- симый	36
Рак молочной же- лезы у мужчин после кастрации	36
Рак мочевого пу- зыря	82
Рак остеогенный	44
Рак печени	53
Рак пищевода	53
Рак поджелудоч- ной железы	53
Рак половых орга- нов у девочек	82
Рак почек	82
Рак предстатель- ной железы	82
Рак слизистых оболочек	33
Рак толстого ки- шечника	53
Рак шейки матки	82
Рак щитовидной железы	86
Рак яичек	82
Рак яичника	82
Раннее пробужде- ние	92
Раны	31
Раны вялозажи- вающие	32
Рассеянный скле- роз	36
Расслабление матки	102
Растворение хо- лестериновых желчных камней	50
Растяжение	46
Рахит	46

Рахит витамин D- зависимый	46
Рахит витамин D- резистентный	46
Рахитоподобные заболевания у детей старше 8 лет	46
Рвота	54
Рвота беременных	54
Рвота медикамен- тозная	54
Рвота на фоне лу- чевой терапии	54
Рвота неукроти- мая	54
Реакция "Транс- плантат-против хозяина"	87
Реакция отторже- ния при транс- плантации органов	87
Ревмокардит	75
Реконвалесценция	91
Рентгеноконтраст- ное исследование ЖКТ	49
Рентгеноконтраст- ное исследование желчевыводящих путей	49
Ретикулосаркома кожи	33
Ретикулосаркома костей	44
Ретинит	21
Ретинит пигмент- ный	20
Ретинобластома	21
Ретинопатия	20
Рефлюкс-гастрит	47
Рефлюкс-эзофагит	55
Рефлюкс-эзофа- гит эрозивный	55
Ригидность мышц	38
Риккетсиоз	25
Ринит	64
Ринит вазомотор- ный	65
Ринит гиперпластический	65
Родовой деятель- ности слабость	103
Роды	103
Роды преждевре- менные	103
Рожа	30
Руброфития	30

С

СПИД	25
Сальмонеллез	25
Сальмонеллоноси- тельство	25
Сальпингит	83



Сальпингоофорит 83	Сперматогенеза	Токсический отек
Саркома мягких	стимуляция..... 79	легких 64
тканей 45	Спондилоартрит	Токсоплазмоз 26
Себорея 34	анкилозирующий..... 42	Тошнота.....54
Сепсис.....25	Спондилоартроз 43	Травмы глаз 21
Септикопиемия.....25	Спутанность со-	Травмы опорно-
Сердечная недо-	знания..... 92	двигательного ап-
статочность 75	Стенокардия 72	парата.....46
Сердечная недо-	Стенокардия коро-	Травмы черепно-
статочность лево-	нароспастическая 72	мозговые 40
желудочковая 76	Стенокардия не-	Трахейт 65
Сердечная недо-	стабильная..... 73	Трахеобронхит.....66
статочность острая 76	Стенокардия	Трахома 20
Сердечная недо-	после инфаркта..... 73	Тревога.....94
статочность хрони-	Стенокардия ста-	Тревожно-депрес-
ческая.....76	бильная 73	сивные состояния.....94
Сибирская язва 26	Столбняк..... 26	Тремор мышц 40
Сигмоидит 55	Стоматит 68	Трепетание пред-
Сикоз 31	Стоматит герпети-	сердий 74
Синдром Рейно 70	ческий..... 68	Трещины аналь-
Синдром болевой.....97	Стронгилоидоз 23	ной области.....32
Синдром воспали-	Судороги мышц	Трещины кожи 32
тельный 101	ночные 40	Трещины сосков
Синдром гипокси-	Судороги феб-	у кормящих жен-
ческий 101	рильные у детей..... 40	щин 36
Синдром интокси-	Судорожный син-	Трихинеллез.....23
кационный 101	дром 40	Трихомониаз 26
Синдром лихора-	Суставной и вне-	Трихофития 30
дочный 102	суставной ревма-	Трихоцефалез.....23
Синдром сниже-	тизм 42	Тромбангит обли-
ния работоспособ-		терирующий 71
ности и	Т	Тромбоз артерий.....76
физического пере-	Тахикардия желу-	Тромбоз артерий
напряжения 102	дочковая..... 74	периферических.....76
Синовит.....46	Тахикардия желу-	Тромбоз артерий
Синусит.....65	дочковая парок-	сетчатки 21
Сифилис.....23	сизмальная 74	Тромбоз вен ге-
Скарлатина 26	Тахикардия над-	морроидальных 76
Склерит.....21	желудочковая 74	Тромбоз вен сет-
Склеродермия 44	Тахикардия над-	чатки 21
Снижение остро-	желудочковая па-	Тромбоз венозный.....76
ты слуха 67	роксизмальная 74	Тромбофлебит 71
Сниженная иници-	Тахикардия сину-	Тромбофлебит по-
ативность 94	совая..... 74	верхностных вен 71
Сниженная кон-	Тендинит 46	Тромбоцитопени-
центрация внима-	Тендовагинит 46	ческая пурпура 57
ния.....93	Тендосиновит.....46	Тромбоцитопения.....57
Состояния аку-	Тенезмы мочевого	Тромбоэмболия 76
шерские неотлож-	пузыря.....83	Тромбоэмболия
ные 102	Тениаринхоз 23	центральной арте-
Сотрясение мозга.....40	Тениоз 23	рии сетчатки.....21
Сочетание вирус-	Тик 40	Туберкулез.....26
ной и бактериаль-	Тиреоидит 86	Туберкулез кожи 26
ной инфекций 24	Тиф брюшной 26	Туберкулезные
Спазм артерий	Тиф сыпной.....26	свищи 26
мозга 39	Токсикоз беремен-	Туберкулезный
Спазм артерий	ности 103	лимфаденит.....26
сетчатки.....21	Токсикоз беремен-	Туберкулезный
Спазм перифери-	ности поздний.....103	менингит.....26
ческих артерий 71	Токсикоинфекция.....26	Туберкулезный
Спазмофилия 46	Токсикоинфекция	перитонит 26
Спастичность мы-	пищевая 52	Туберкулезный
шечная 38	Токсикомания 95	плеврит.....26

Туберкулома 26
Туляремия 26

У

Углеводная недостаточность 91
Угри 34
Угри розовые 34
Укорочение секреторной фазы менструального цикла 79
Уретрит 83
Урография 78
Усталость роженицы 103

Ф

Фарингит 66
Фенилкетонурия 91
Феохромоцитома 85
Фиброз поджелудочной железы 54
Фибромиома матки 82
Физические и умственные перегрузки 91
Фикомикоз 25
Флебит 71
Флебография 70
Флегмона 26
Фобия 94
Фолликулит 31
Фотодерматит 27
Фототравмы глаз 21
Фронтит 65
Функциональные расстройства зрительного аппарата 21
Фурункулез 31

Х

Хирургическая практика 103
Хламидиоз 26
Холангиопанкреатография 49
Холангит 54
Холепанкреатит 54
Холера 26
Холестаз 54
Холецистит 54
Холецистит хронический 54
Холецистохолангит 54
Хорея 40
Хорионкарцинома, пузырный занос 82
Хориоретинит 20
Хронические и острые аллерги-

ческие заболевания 104

Ц

Целлюлит 31
Цервицит 84
Цереброваскулярная недостаточность 40
Циклит 21
Цирроз печени 55
Цисталгия 101
Цистернография 36
Цистинурия 91
Цистит 84
Цитомегаловирусные инфекции 24
Цитопения лучевая 19

Ч

Чесотка 34

Ш

Шизофрения 95
Шистосомоз 23
Шок 76
Шок анафилактический 76
Шок кардиогенный 77
Шок ожоговый 77

Э

Эзофагит 55
Эзофагит эрозивный 55
Экзема 34
Экзема микробная 34
Эклампсия 103
Экстрапирамидные расстройства 38
Экстрасистолия 74
Экстрасистолия желудочковая 74
Экстрасистолия наджелудочковая 75
Эмболия жировая 76
Эмоциональная лабильность 95
Эмпиема желчного пузыря 52
Эмпиема плевры 63
Эмфизема легких 66
Эндартериит облитерирующий 71
Эндокардит 77
Эндокардит септический 77
Эндокринные опухоли гастро-энтеропанкреатической системы 87

Эндометриоз 84
Эндометрит 84
Энтезопатия 47
Энтерит 55
Энтеробиоз 23
Энтероколит 55
Энтероколит хронический 55
Энурез 84
Энцефалит 40
Энцефалит клещевой 24
Энцефалопатия 96
Эпидермофития 30
Эпидидимит 84
Эпилепсия 40
Эпилепсия генерализованная 40
Эпилепсия с малыми припадками 40
Эпилептический статус 41
Эписклерит 21
Эритема 34
Эритема многоформная 35
Эритразма 31
Эритремия 58
Эритробластопения 57
Эритродермия 35
Эрозии 32
Эрозии шейки матки 84
Эрозия роговицы 21
Эстрогенная недостаточность 85
Эхокардиография 70

Ю

Ювенильные и другие нарушения поведения 96

Я

Язва роговицы 21
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 55
Язвы ЖКТ 56
Язвы ЖКТ медикаментозные 56
Язвы ЖКТ стрессовые 56
Язвы анастомоза 56
Язвы кишечника пептические 56
Язвы кожи 35
Язвы некротические 35
Язвы трофические 35

1.2. Указатель лекарственных средств по показаниям к применению

1. Болезнь ЛУЧЕВАЯ

Аскорбиновая кислота.....	152
Викасол.....	220
Димедрол.....	301
Поливит гериатрик.....	578
Убихинон компози- тум.....	729
Уолш поливит для взрослых.....	735
Уолш поливит для детей.....	736
Эссенциале.....	829

1.1. Лучевые поражения кожи

Белогент.....	172
Белодерм.....	172
Витаон.....	228
Ируксол.....	359
Метилурацил.....	467
Метилурациловая мазь.....	467
Облепиховое масло.....	530
Пантенол.....	550
Ронидаза.....	627
Солкосерил.....	659
Целестодерм В.....	781
Эндур-ВМ.....	816

1.2. Лучевые поражения слизистых

Витаон.....	228
Метилурациловая мазь.....	467
Мукоза компози- тум.....	492
Солкосерил.....	659

1.3. Опухоли на фоне лучевой болезни

Убихинон компози- тум.....	729
-------------------------------	-----

1.4. Цитопения лучевая

Инозие-Ф.....	346
Лейкоген.....	429
Полидан (Натрия нуклеоспермат).....	578
Рибоксин.....	619

2. Заболевания ГЛАЗ

2.1. Аллергические заболевания глаз

Аллержи.....	119
Аломид.....	120
Африн.....	161
Бронал.....	200
Гидрокортизон.....	252
Гисталонг.....	258
Димебон.....	300
Ломилан.....	442
Оптикром.....	535
Хай-Кром.....	772
Целестон.....	782
Цетрин.....	785

2.1.1. Конъюнктивит аллергический

Аллержи.....	119
Аломид.....	120
Асмовал.....	152
Гаразон.....	238
Гистаглобулин сухой.....	257
Гистимет.....	258
Задитен.....	317
Задитен СРО.....	317
Зиртек.....	322
Кестин.....	384
Кларитин.....	390
Лекролин.....	431
Ломилан.....	442
Нафтизин.....	502
Оптикром.....	535
Офтан Дексаметазон.....	545
Санорин-Аналергин.....	638
Софрадекс.....	663
Супрастин.....	679
Тинсет.....	701
Хай-Кром.....	772
Целестон.....	782

2.2. Астенопические жалобы

Диглофтон.....	292
Поливит гериатрик.....	578
Санорин-Аналергин.....	638
Уолш поливит для взрослых.....	735
Уолш поливит для детей.....	736

2.2.1. Миопия

ФиБС.....	753
Эмоксипин.....	812

2.3. Глаукома

Арутимол.....	151
Бетоптик.....	185
Гипотиазид.....	256
Глаумол.....	259
Индерал.....	343
Левулоза.....	427
Натрия оксипути- рат.....	501
Офтан Пилокарпин.....	546
Пилокарпина гид- рохлорид с метил- целлюлозой.....	565
Прозерин.....	589
Псоринохель.....	598
Тауфон.....	688
Тимопстик.....	699
Тимопстик-депо.....	700
Тимпило.....	700
Трусопт.....	727
Эмоксипин.....	812

2.3.1. Глаукома вторичная

Арутимол.....	151
Винпоцетин.....	223
Кавинтон.....	361
Офтан Тимолол.....	546
Тимопстик.....	699
Тимопстик-депо.....	700
Тимпило.....	700
Трусопт.....	727
Фотил.....	765
Фотил форте.....	765

2.3.2. Глаукома закрытоугольная

Арутимол.....	151
Пилокарпина гид- рохлорид.....	565
Тимопстик.....	699
Тимопстик-депо.....	700
Фотил.....	765
Фотил форте.....	765

2.3.3. Глаукома открытоугольная

Арутимол.....	151
Бетоптик.....	185
Глаумол.....	259
Натрия оксипути- рат.....	501
Офтан Дипивеф- рин.....	545
Офтан Тимолол.....	546
Пикамилон.....	564
Тимопстик.....	699
Тимопстик-депо.....	700
Тимпило.....	700
Трусопт.....	727

Фотил.....	765
Фотил форте.....	765
2.4. Заболевания преломляющих сред глаза	
Витасик.....	229
ФиБС.....	753
2.4.1. Дистрофия роговицы	
Витасик.....	229
Лакрисин.....	422
Тауфон.....	688
2.4.2. Инфильтрат роговицы	
Витасик.....	229
Лакрисин.....	422
2.4.3. Катаракта	
Вита Иодурол три- фосфаденин.....	226
Витафакол.....	229
Изодибут.....	330
Каталин.....	379
Квинакс.....	382
Наклоф.....	498
Офтан Катахром.....	546
Поливит гериатрик.....	578
Тауфон.....	688
2.4.4. Кератомалы- ция	
Гептавит.....	251
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617
2.5. Заболевания сетчатки	
2.5.1. Гемералопия	
Гептавит.....	251
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617
Рибофлавин.....	619
2.5.2. Дистрофия сетчатки	
Пентамон.....	558
Пилокарпина гид- рохлорид.....	565
Предуктал.....	586
Танакан.....	685
Тауфон.....	688
Фосфобнон.....	765
Эмоксипин.....	812
Эндур-Е 200.....	817
2.5.3. Ретинит пиг- ментный	
Гептавит.....	251
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617
2.5.4. Ретинопатия	
Венорутон.....	212
Венорутон форте.....	212
Дицинон.....	307
Доксилек.....	309

Доксиум.....	309
Кавинтон.....	361
Ксантинола нико- тинат.....	416
Пентамон.....	558
Предуктал.....	586
Редергин.....	611
Ретаболил.....	616
Танакан.....	685
Тиклид.....	698
Эмоксипин.....	812
2.5.5. Хориоретинит	
Преднизолон.....	585
Предуктал.....	586
Целестон.....	782
Эмоксипин.....	812
2.6. Инфекционно- воспалительные за- болевания глаз	
Алоэ экстракт жид- кий для инъекций.....	121
Гарамицин.....	238
Гентамицин.....	246
Гидрокортизон.....	252
Зиндолин 250.....	320
Мидрум.....	476
Орунгал.....	541
Пливасепт.....	575
Софрадекс.....	663
Сульфацил натрия.....	676
Тобрекс.....	706
Тотацеф.....	709
Ципробай.....	796
Ципролет.....	796
Ципрофлоксацина гидрохлорид.....	797
Цифлоксинал.....	803
Эндур-Е 200.....	817
Эрмицед.....	826
2.6.1. Блефарит	
Гаразон.....	238
Максидекс.....	452
Макситрол.....	453
Офтальмо-Септо- некс.....	545
Софрадекс.....	663
Тобрекс.....	706
ФиБС.....	753
Ципролет.....	796
Эрмицед.....	826
2.6.2. Блефароко- нъюнктивит	
Гаразон.....	238
Максидекс.....	452
Макситрол.....	453
Наклоф.....	498
Тобрекс.....	706
Ципролет.....	796

2.6.3. Инфекции глаз вирусные

2.6.3.1. Герпес глаз

Бонафтон.....	194
Виролекс.....	224
Витасик.....	229
Ликопид.....	436
Офтан Иду.....	545

2.6.3.2. Трахома

Доксал.....	308
Доксициклин.....	310
Рифадин.....	622
Сульфадиметоксин.....	675

2.6.4. Иридоциклит

Максидекс.....	452
Макситрол.....	453
Мидрум.....	476
Офтан Дексамета- зон.....	545
Преднизолон.....	585
Целестон.....	782

2.6.5. Ирит

Максидекс.....	452
Макситрол.....	453
Мидрум.....	476
Офтан Дексамета- зон.....	545
Реопирин.....	615
Рибофлавин.....	619
Целестон.....	782

2.6.6. Кератит

Витасик.....	229
Гаразон.....	238
Дексазон.....	278
Зовиракс.....	323
Лекролин.....	431
Максидекс.....	452
Макситрол.....	453
Офтальмо-Септо- некс.....	545
Офтан Дексамета- зон.....	545
Рибофлавин.....	619
Солкосерил.....	659
Тобрекс.....	706
ФиБС.....	753
Целестон.....	782
Ципролет.....	796

2.6.7. Кератоиридо- циклит

Макситрол.....	453
Мидрум.....	476

2.6.8. Кератоко- нъюнктивит

Аломид.....	120
Бонафтон.....	194
Витасик.....	229
Гаразон.....	238
Лекролин.....	431
Максидекс.....	452
Макситрол.....	453
Наклоф.....	498

Оптикром	535
Офтан Дексамета- зон	545
Солкосерил	659
Тобрекс	706

2.6.9. Конъюнктивит

Африн	161
Бронал	200
Гаразон	238
Гисталонг	258
Грюнамицин сироп	269
Илозон	335
Максидекс	452
Макситрол	453
Мукоза компози- тум	492
Наклоф	498
Офтальмо-Септо- некс	545
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Рибофлавин	619
Санорин-Аналергин ..	638
Солкосерил	659
Сульфацил натрия	676
Тобрекс	706
ФиБС	753
Фурагин	769
Фурацилин	770
Цетрин	785
Ципролет	796

2.6.10. Ретинит

Реопирин	615
ФиБС	753

2.6.11. Склерит

Дексазон	278
Максидекс	452
Макситрол	453
Тобрекс	706

2.6.12. Циклит

Макситрол	453
Мидрум	476

2.6.13. Эписклерит

Гаразон	238
Максидекс	452
Макситрол	453
Тобрекс	706

2.7. Кровоизлияние внутриглазное

Траумель С	714
Эмоксипин	812

2.7.1. Кровоизлия- ние в сетчатку глаза

Дицинон	307
Траумель С	714
Эмоксипин	812

2.7.2. Кровоизлия- ние в стекловидное тело

Дицинон	307
Эмоксипин	812

2.8. Ксерофтальмия

Гептавит	251
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Слеза натуральная	657

2.9. Нарушения внутриглазного кро- вообращения

Агапурин	106
Вазонит	207
Винпоцетин	223
Галидор	235
Дартелин	275
Диглофтон	292
Мемоплант	462
Пармидин	554
Пентамон	558
Радомин	601
Стрептаза	671
Танакан	685
Эмоксипин	812
Эндотелон	816

2.9.1. Нарушения трофики глаза

Кавинтон	361
Наклоф	498
Трентал	716
Трентал 400	716

2.10. Нарушения це- лостности и травмы глаза

Витасик	229
Гаразон	238
Солкосерил	659
Эмоксипин	812

2.10.1. Ожоги глаз

Витасик	229
Гаразон	238
Лакрисин	422
Солкосерил	659
Эмоксипин	812

2.10.2. Травмы глаз

Витасик	229
Максидекс	452
Наклоф	498
Офтан Дексамета- зон	545
Солкосерил	659
Тауфон	688

2.10.3. Фототравмы глаз

Эмоксипин	812
-----------------	-----

2.10.4. Эрозия рого- вицы

Витасик	229
Лакрисин	422
Солкосерил	659

2.10.5. Язва рогови- цы

Витасик	229
Солкосерил	659
Сульфацил натрия	676
Целестон	782
Ципролет	796

2.11. Недостаточ- ное слезоотделение

Лакрисин	422
Хай-Кром	772

2.12. Ретинобласто- ма

Метотрексат-Эбеве	470
Тиотепа-Тиоплекс	702
Цитоксан	800

2.13. Спазм артерий сетчатки

Агапурин	106
Вазонит	207
Винпоцетин	223

2.14. Тромбоз арте- рий сетчатки

Агапурин	106
Аспирин плюс С	155
Винпоцетин	223
Кавинтон	361
Пилокарпина гид- рохлорид	565
Стрептаза	671

2.14.1. Тромбоэмбо- лия центральной ар- терии сетчатки

Стрептаза	671
-----------------	-----

2.15. Тромбоз вен сетчатки

Агапурин	106
Кавинтон	361
Пилокарпина гид- рохлорид	565
Стрептаза	671
Эмоксипин	812

2.16. Функциональ- ные расстройства зрительного аппара- та

Венорутон	212
Венорутон форте	212
Диглофтон	292
Олигогал-Se	533
Слеза натуральная	657
Хай-Кром	772

2.16.1. Диагности- ческие средства

Мидрум	476
Эфедрина гидрох- лорид	835

3. Заболевания ИНФЕКЦИОН- НЫЕ

3.1. Абсцесс

Абактал.....	105
Азактам.....	110
Климицин.....	395
Нелорен.....	504
Оксациллин натри- евая соль.....	531
Фортум.....	763
Цефотаксим.....	786
Ципринол.....	795
Эхинацея компози- тум С.....	837

3.2. Амебиаз

Делагил.....	279
Доксал.....	308
Доксициклин.....	310
Интетрикс.....	354
Медазол.....	459
Метранизол.....	471
Метронидазол.....	473
Орвагил.....	535
Тиберал.....	696
Флагил.....	754

3.2.1. Дизентерия амебная

Илозон.....	335
Интетрикс.....	354
Макмирор.....	451
Медазол.....	459
Тиберал.....	696

3.3. Ангина

V-Пенициллин	
Словакофарма.....	842
Альдолор.....	124
Альфацет.....	126
Амоксиклав.....	135
Ампициллина три- гидрат.....	138
Ангин-Хель С.....	141
Бактрим.....	167
Бикарминт.....	185
Вокара.....	231
Гексорал.....	243
Гипозоль.....	256
Грюнамицин сироп.....	269
Дикломелан.....	295
Динабак.....	301
Доксилан.....	308
Доксициклин.....	309
Доксициклина гид- рохлорид.....	310
Дрилл боль в горле.....	314
Дурацеф.....	315
Зиннат.....	321
Ибуклин.....	327
Ибуклин юниор.....	327
Ингалипт.....	342
Йокс.....	359

Календулы настой- ка.....	361
Мегациллин орал.....	458
Ноготков цветки.....	524
Палитрекс.....	547
Ретарпен.....	616
Рибомунил.....	619
Ромазулан.....	627
Стопангин.....	669
Сумамед.....	677
Суметролим.....	677
Тантум Верде.....	686
Томицид.....	706
Тонзилгон.....	706
Тонзилотрен.....	707
Трансамча.....	714
Умкалор.....	734
Фалиминт.....	740
Фарингосепт.....	742
Фурацилин.....	770
Цеклор.....	780
Элюдрил.....	812
Эритромицин.....	826
Эрмицед.....	826

3.3.1. Аденоидит

Биодроксил.....	187
Гексадрепс.....	241
Гексализ.....	241
Гексапневмин.....	242
Гексаспрей.....	243
Клиацил.....	392
Лимфомнозот.....	437
Орелокс.....	536
Ровамицин.....	625
Сульфадиметоксин.....	675
Умкалор.....	734
Эуфорбиум компо- зитум Назентроп- фен С.....	835

3.3.2. Ангина агра- нулоцитарная

Лендацин.....	432
Метилурацил.....	467
Пентоксил.....	558

3.3.3. Ангина фолли- кулярная

Антрима.....	144
Гексадрепс.....	241
Гексализ.....	241
Гексапневмин.....	242
Гексаспрей.....	243
Гексорал.....	243
Йокс.....	359
Клиацил.....	392
Нелорен.....	504
Орелокс.....	536
Сульфадиметоксин.....	675
Фелексин.....	746

3.4. Бактериемия

V-Пенициллин	
Словакофарма.....	842
Абактал.....	105
Гарамицин.....	238

Гентамицин.....	246
Гентамицина суль- фат.....	246
Дефламон.....	286
Кейтен.....	382
Клафоран.....	390
Клион.....	397
Ликацин.....	435
Лонгацеф.....	443
Нетромицин.....	506
Оспамокс.....	542
Офрамакс.....	544
Пенициллин G на- триевая соль.....	555
Пипрацил.....	569
Тамицин.....	683
Тобрацин-АДС.....	705
Фортум.....	763
Цефотаксим.....	786
Цифран.....	803
Эхинацея компози- тум С.....	837

3.5. Бруцеллез

Берлоцид.....	180
Берлоцид 480.....	180
Берлоцид 960.....	180
Доксилан.....	308
Доксициклин.....	310
Доксициклина гид- рохлорид.....	310
Левомецетин.....	427
Моноклин.....	486
Римактан.....	620
Рифадин.....	622

3.6. Венерические заболевания

Пливасепт.....	575
Рулид.....	631
Цитеал.....	799

3.6.1. Гонорея

V-Пенициллин	
Словакофарма.....	842
Абактал.....	105
Амоксициллин.....	135
Ампицилин.....	136
Ампициллин.....	137
Ампициллина на- триевая соль крис- таллическая.....	137
Бассадол.....	168
Гарамицин.....	238
Гентамицин.....	246
Глауфос.....	259
Данемокс.....	273
Дардум.....	274
Доксал.....	308
Доксилан.....	308
Доксициклин.....	309
Доксициклина гид- рохлорид.....	310
Заноцин.....	318
Зинацеф.....	320
Зиндолин 250.....	320

Зиннат.....	321
Клафоран	390
Лендацин	432
Лидаприм	433
Лонгацеф.....	443
Максаквин	452
Мефоксин	473
Модивид.....	483
Моноклин	486
Нетромицин	506
Нолицин	525
Норилет.....	527
Офрамакс	544
Палитрекс.....	547
Пенглоб	555
Пенициллин G на- триевая соль.....	555
Перти	562
Пефлацин	563
Пипрацил	569
Рифамор.....	623
Рифампицин	623
Рифогал	624
Ровамицин	625
Роцефин	629
Сульфадиметоксин ..	675
Сумамед	677
Суметролим	677
Таривид.....	687
Уназин	734
Уротрактин	739
Фелексин.....	746
Цеклор	780
Цефалексин	786
Цефобид	786
Цефотаксим	786
Ципробай.....	796
Ципролет	796
Цитерал.....	800
Цифлоксиал	803
Цифран	803
Эноксор.....	818
Эрмицед	826
Юнидокс Солютаб	838
3.6.2. Лимфограну- лема паховая	
Грюнамицин сироп....	269
Доксициклин.....	310
Сулотрим.....	674
Эрмицед	826
3.6.3. Мягкий шанкр	
Лендацин	432
Сулотрим.....	674
3.6.4. Сифилис	
V-Пенициллин	
Словакофарма.....	842
Доксал	308
Доксилан	308
Доксициклин.....	309
Илозон	335
Йода спиртовой раствор.....	359
Моноклин	486

Офрамакс.....	544
Пенициллин G на- триевая соль	555
Ретарпен	616
Ровамицин.....	625
Экстенциллин	809
Эрмицед.....	826
Юнидокс Солютаб.....	838
3.7. Гельминтозы	
Билтрицид.....	186
Левамизол-Эбеве	426
3.7.1. Анкилостомоз	
Вермокс	217
Декарис	278
Телмокс.....	689
3.7.2. Аскаридоз	
Вермокс	217
Декарис	278
Левамизол-Эбеве	426
Пиперазина адипи- нат.....	567
Телмокс.....	689
3.7.3. Гименолели- доз	
Билтрицид.....	186
3.7.4. Дифиллобот- риоз	
Билтрицид.....	186
3.7.5. Клонорхоз	
Билтрицид.....	186
3.7.6. Некатороз	
Телмокс.....	689
3.7.7. Описторхоз	
Билтрицид.....	186
3.7.8. Парагонимоз	
Билтрицид.....	186
3.7.9. Стронгилои- доз	
Вермокс	217
3.7.10. Тениаринхоз	
Билтрицид.....	186
3.7.11. Тениоз	
Билтрицид.....	186
Вермокс	217
3.7.12. Трихинеллез	
Гидрокортизон	252
3.7.13. Трихоцефа- лез	
Вермокс	217
Телмокс.....	689
3.7.14. Шистосомоз	
Билтрицид.....	186
3.7.15. Энтеробиоз	
Вермокс	217
Пиперазина адипи- нат.....	567
Пирвиниум	571
Пиркон	571
Телмокс.....	689

3.8. Дизентерия

Амоксиклав	135
Винилин (Бальзам Шостаковского).....	221
Карбактин.....	374
Нолицин	525
Норилет.....	527
Пенглоб	555
Пенодил.....	556
Полисорб МП	580
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Сульфадиметоксин....	675
Суметролим	677
Уголь активирован- ный	729
Фталазол	767
Фуразолидон.....	769
Фурацилин	769
Цедекс	780

3.9. Дисбактериоз

Бактисубтил	166
Бевиплекс	169
Лактулоза сироп	423
Линекс.....	438
Флонивин БС	757
Хепель.....	774
Хилак форте	774

3.10. Дифтерия

V-Пенициллин	
Словакофарма.....	842
Д.Т.Вакс.....	271
Илозон	335
Имовакс	
Д.Т.Адюльт.....	337
Клиндамицин	396
Макропен.....	451
Пенициллин G на- триевая соль.....	555
Реницин.....	614
Ровамицин	625
Тетракок 05.....	693
Эритромицин.....	826
Эрмицед	826

3.11. Инфекции ви- русные

Грипп-Хель	268
Иммуноглобулин	337
Интраглобин	354
Тонзилгон	706
Траумель С	714
Флу	758
Энгистол.....	815
Эндобулин	816

3.11.1. Бешенство

Имогам Раж	339
------------------	-----

3.11.2. Герпес

Ацикловир	164
Ацикловир-Акри	164
Ацикловир-Акри мазь.....	165
Валтрекс	209
Виролекс	224



Декарис	278
Зовиракс	323
Ликопид	436
Ребиф	607
Тыквеол	728
Цикловакс	789
Циклоферон	790

3.11.2.1. Ветряная оспа

Ацикловир	164
Ацикловир-Акри	164
Виролекс	224
Лизавир	435

3.11.2.2. Герпес зoster

Ацикловир	164
Ацикловир-Акри	164
Ацикловир-Акри мазь	165
Валтрекс	209
Виролекс	224
Гевизош	240
Зовиракс	323
Лизавир	435
Ребиф	607
Цикловакс	789
Циклоферон	790

3.11.2.3. Герпес простой

Ацикловир	164
Ацикловир-Акри	164
Ацикловир-Акри мазь	165
Валтрекс	209
Виролекс	224
Гевизош	240
Зовиракс	323
Лизавир	435
Ребиф	607
Солкосерил	659
Цикловакс	789
Циклоферон	790

3.11.3. Грипп

Алталекс	122
Альдолор	124
Арбидол	147
Афлубин	160
Биокалитол	188
Ваксигрип	207
Грипп-Хель	268
Гриппекс	268
Ибупрофен Ланна-хер	328
Иммунал	337
Инфлубене	357
Инфлюцид	357
Йокс	359
Калпол	364
Калпол 6 плюс	364
Кальцекс	365
Каффетин	380
Пакселадин	547
Пливалгин	575

Ремантадин	612
Сандра	637
Септолете	646
Стопангин	669
Фервекс	750
Флу	758
Форталгин Ц	762

3.11.4. Корь

Иммуноглобулин человека нормальный	337
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Рувакс	629

3.11.5. Краснуха

Рудивакс	630
----------------	-----

3.11.6. Сочетание вирусной и бактериальной инфекций

Афлубин	160
Бетадине	182
Доксициклина гидрохлорид	310

3.11.7. Энцефалит клещевой

Реальдирон	606
Ремантадин	612
ФСМЕ-Булин	766
ФСМЕ-Иммун Ин-жект	767
Циклоферон	790

3.12. Инфекции на фоне иммунодефицита

Абактал	105
Азактам	110
Альфаферон	126
Ацикловир	164
Дифлюкан	306
Зовиракс	323
Иммунал	337
Интраглобин	354
Кейтен	382
Лонгацеф	443
Максипим	453
Меронем	465
Норилет	527
Офрамекс	544
Пентаглобин	556
Пентакаринат	557
Перти	562
Тазоцин	680
Фортум	763
Циклоферон	790
Ципробай	796
Ципролет	796
Цитотект	802
Цифран	803
Эндобулин	816
Эстифан	830
Эхинацея компози-тум С	837

3.12.1. Цитомегаловирусные инфекции

Зовиракс	323
Циклоферон	790
Цимевен	791
Цитотект	802
Энгистол	815

3.13. Инфекции челюстно-лицевой области

Амоксиклав	135
Нелорен	504
Фелексин	746
Эхинацея компози-тум С	837

3.14. Коклюш

Ампициллин	137
Илозон	335
Иммуноглобулин человека нормальный	337
Макропен	451
Пакселадин	547
Пенодил	556
Ровамицин	625
Синекод	652
Спаскупрель	664
Стандациллин	667
Тетракок 05	693

3.15. Легионеров болезнь

Абактал	105
Грюнамицин сироп	269
Доксициклина гидрохлорид	310
Реницин	614
Рифадин	622
Ровамицин	625
Эритромицин	826

3.16. Лейшманиоз висцеральный

Глюкантим	263
Пентакаринат	557

3.17. Лептоспироз

Доксал	308
Доксициклина гидрохлорид	310
Оспамокс	542

3.18. Листерия

Ампициллин	136
Илозон	335
Оспамокс	542

3.19. Лямблиоз

Макмирор	451
Медазол	459
Метронидазол	473
Нитазол	511
Орвагил	535
Тиберал	696
Флагил	754
Фуразолидон	769

3.20. Малярия

Делагил	279
Плаквенил	573
Сульфален	676

3.21. Микозы системные

Дафнеджин	276
Низорал	508
Орунгал	541
Триксилем	721
Фунгизон	768

3.21.1. Актиномикоз легких

V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Доксициклин	310
Пенициллин G натриевая соль	555
Фунгизон	768

3.21.2. Аспергиллез

Фунгизон	768
----------------	-----

3.21.3. Гистоплазмоз

Низорал	508
Фунгизон	768

3.21.4. Кандидозы системные

Дифлюкан	306
Низорал	508
Фунгизон	768

3.21.5. Криптококкоз

Дифлюкан	306
Фунгизон	768

3.21.6. Фикомикоз

Фунгизон	768
----------------	-----

3.22. Микоплазмоз

Доксал	308
Доксициклина гидрохлорид	310
Моноклин	486
Реницин	614
Ровамицин	625
Роксимижан	626
Эритромицин	826

3.23. Паратиф

Абактал	105
Амоксиклав	135
Левомецетин	427
Лендацин	432
Септрин	647
Септрин-форте	647
Суметролим	677
Тримосул	722
Фуразолидон	769

3.24. Риккетсиоз

Доксал	308
Доксициклин	310
Доксициклина гидрохлорид	310

Левомецетин	427
Моноклин	486

3.25. СПИД

Видекс	219
Инвираза	341
Интраглобин	354
Интрон-А	355
Криксиван	415
Реальдирон	606
Ретровир	617
Роферон А	628
Сулотрим	674
Хивид	774
Циклоферон	790
Цитотект	802

3.26. Сальмонеллез

Абактал	105
Антрима	144
Карбактин	374
Левомецетин	427
Нолицин	525
Норилет	527
Пенглоб	555
Пенодил	556
Полисорб МП	580
Порталак	582
Стандациллин	667
Хилак форте	774
Цедекс	780

3.26.1. Сальмонеллоносительство

Абактал	105
Пенодил	556
Пефлацин	563
Порталак	582
Ципринол	795

3.27. Сепсис

V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Абактал	105
Азактам	110
Акт-ХИБ	114
Амикацин	129
Амоксиклав	135
Ампициллин	137
Ампициллина натриевая соль кристаллическая	137
Бактрим	167
Бонцефин	195
Ванкоцин	210
Ванмиксан	210
Галиум-Хель	235
Гарамицин	238
Гентамицин	245
Гентамицина сульфат	246
Дефламон	286
Добутрекс	307
Доксициклина гидрохлорид	310
Зинацеф	320
Кефадим	388

Кефзол	388
Клиндамицин	396
Клион	397
Ликацин	435
Линкомицина гидрохлорид	438
Лонгацеф	443
Мандол	454
Мефоксин	473
Небцин	502
Нетромицин	506
Оксациллин натрия соль	531
Пенициллин G натриевая соль	555
Пенодил	556
Пентаглобин	556
Пентрексил	558
Перти	562
Роцефин	629
Септрин	647
Септрин-форте	647
Тактивин	682
Тиенам	696
Тобрацин-АДС	705
Уназин	734
Фортум	763
Цефазолин	785
Цефобид	786
Цефотаксим	786
Ципринол	795
Ципробай	796
Ципролет	796
Ципрофлоксацина гидрохлорид	797
Цитерал	800
Цифлоксинал	803
Эдицин	806
Энгистол	815
Эхинацея композитум С	837

3.27.1. Септикопиемия

V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Абактал	105
Акт-ХИБ	114
Амоксиклав	135
Бактрим	167
Дардум	274
Кейтен	382
Клафоран	390
Климицин	395
Максипим	453
Медазол	459
Меронем	465
Офрамакс	544
Пенициллин G натриевая соль	555
Пипрацил	569
Тазоцин	680
Тамицин	683
Тобрацин-АДС	705
Тотацеф	709



Цефотаксим	787
Цифран	803
3.28. Сибирская язва	
V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Пенициллин G натриевая соль	555
Рифадин	622
3.29. Скарлатина	
Клиацил	392
Клиндамицин	396
Мегациллин орал	458
Оспен	542
Оспен 750	542
Ретарпен	616
Сумамед	677
Цедекс	780
Эрмицед	826
3.30. Столбняк	
Д.Т.Вакс	271
Имовакс	
Д.Т.Адюльт	337
Тетракок 05	693
Тубокурарин	728
Целестон	782
3.31. Тиф брюшной	
Абактал	105
Амоксиклав	135
Антрима	144
Данемокс	273
Левомецетин	427
Лендацин	432
Норилет	527
Септрин	647
Септрин-форте	647
Суметролим	677
Тримосул	722
3.32. Тиф сыпной	
Доксилаи	308
Рифадин	622
Юнидокс Солютаб	838
3.33. Токсикоинфекция	
Карбактин	374
Полисорб МП	580
Уголь активированный	729
Фуразолидон	769
3.34. Токсоплазмоз	
Ровамицин	625
3.35. Трихомониаз	
Бетадин	181
Бетадине	182
Гине-Лотримин	254
Кандибене	369
Клион-Д	397
Макмирор	451
Макмирор комплекс 500	451
Медазол	459
Метранизол	471

Метронидазол	473
Нитазол	511
Орвагил	535
Повидон-йод	576
Солкотриховак	660
Стеригал	668
Тержинан	692
Тиберал	696
Флагил	754

3.36. Туберкулез

Бромгексин	198
Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Изониазид	333
Канамицин сульфат	369
Ликопид	436
Максаквин	452
Римактан	620
Рифадин	622
Рифамор	623
Рифампицин	623
Рифарен	623
Рифогал	624
Тактивин	682
Тизамид	697
Этамбутол	831
Этионамид	832

3.36.1. Туберкулез кожи

Гептавит	251
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Римактан	620

3.36.2. Туберкулезные свищи

Римактан	620
----------------	-----

3.36.3. Туберкулезный лимфаденит

Римактан	620
----------------	-----

3.36.4. Туберкулезный менингит

Гидрокортизон	252
Римактан	620

3.36.5. Туберкулезный перитонит

Римактан	620
----------------	-----

3.36.6. Туберкулезный плеврит

Римактан	620
----------------	-----

3.36.7. Туберкулома

Римактан	620
----------------	-----

3.37. Туляремия

Доксициклина гидрохлорид	310
Левомецетин	427

3.38. Флегмона

Амоксиклав	135
Диоксидин	301
Оксациллин натри-	

евая соль	531
Тобрацин-АДС	705
Эхинацея компози-	
тум С	837

3.39. Хламидиоз

Доксилаи	308
Доксициклин	310
Заноцин	318
Илозон	335
Клиндамицин	396
Левомецетин	427
Максаквин	452
Моноклин	486
Перти	562
Реницин	614
Ровамицин	625
Роксимизан	626
Циклоферон	790
Ципролет	796

3.39.1. Орнитоз (пситтакоз)

Грюнамицин сироп	269
Доксал	308
Доксициклин	310

3.40. Холера

Бассадо	168
Доксициклина гидрохлорид	310
Максаквин	452
Моноклин	486
Тримосул	722

4. Заболевания КОЖИ

4.1. Алопеция

Деперзолон	282
Диане-35	289
Дипроспан	303
Кеналог	383
Кутерид	419
Флулем	760

4.2. Гематома

Венитан	212
Гепальпан	247
Лиотон 1000	438
Репарил-гель Н	616
Траумель С	714
Хондроксид	776

4.3. Гиперкератоз кожи

Белосалик	173
Радевит	601
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Солкодерм	659

4.3.1. Кератоз сенильный

Витрум Витамин Е	230
------------------------	-----

**4.4. Гиперрубцева-
ние**

Кеналог	383
Псоринохель	598
Ронидаза	627
Стекловидное тело	668

4.5. Гирсутизм

Андрокур	141
Диане-35	289
Флулем	760

4.6. Дерматит

Адвантан	108
альфа-Токоферола ацетат	125
Белодерм	172
Белосалик	173
Бепантен	175
Бетновейт	184
Бромазепам Ланна- хер	197
Венорутон форте	212
Витрум Витамин Е	230
Галстена	237
Гаразон	238
Гепар композитум	248
Диадерм	287
Дипрогент	302
Дипросалик	303
Дипроспан	303
Кеналог	383
Ксантинола нико- тинат	416
Кутерид	419
Кутерид Г	419
Кутивейт	420
Локоид	441
Локоид Крело	441
Пиридоксина гид- рохлорид	571
Постеризан	582
Постеризан форте	582
Псоринохель	598
Радевит	601
Ретиноевая мазь	617
Ромазулан	627
Сандиммун	636
Сандиммун-Неорал ...	636
Сибикорт	649
Солкосерил	659
Сульфодекортэм	676
Триакорт	717
Триамцинолон	718
Тыквеол	728
Ультралан	732
Целестодерм В	781
Цефалексин	786
Циклоферон	790
Циндол суспензия	792

**4.6.1. Дерматит ал-
лергический**

Адвантан	108
Акортин	113
Апулеин	147

Асмовал	152
Ауробин	160
Белогент	172
Белодерм	172
Берликорт	176
Бетновейт	184
Бронал	200
Бутироксан	206
Гидрокортизон аце- тат	253
Гистаглобулин сухой	257
Дексазон	278
Деперзолон	282
Димебон	300
Димедрол	301
Дипрогент	302
Дипросалик	303
Дипроспан	303
Задитен	317
Задитен СРО	317
Карбактин	374
Кеналог	383
Кларитин	390
Кутерид Г	419
Кутивейт	420
Лимфомнозот	437
Ломилан	442
Перитол	560
Пирроксан	572
Радевит	601
Семпрекс	645
Совентол	658
Супрастин	679
Тавегил	680
Тинсет	701
Трексил	715
Триакорт	717
Триамцинолон	718
Фенистил	748
Фенкарол	749
Фторокорт	768
Хилак форте	774
Элоком	811

**4.6.2. Дерматит гер-
петиформный Дю-
ринга**

Фторокорт	768
-----------------	-----

**4.6.3. Дерматит зу-
дящий**

Акортин	113
Аминазин	130
Атаракс	158
Ауробин	160
Дипрогент	302
Ирикар	358
Кларитин	390
Кутерид Г	419
Кутивейт	420
Меновазин	463
Ново-Пассит	522
Олазол	532
Пипольфен	567

Совентол	658
Тавегил	680
Трексил	715
Фенистил	748
Целестодерм В с гарамицином	781
Элоком	811

**4.6.4. Дерматит ин-
фицированный**

Банеоцин	167
Белогент	172
Бетадин	181
Гаразон	238
Грюнамицин сироп	269
Дермозолон	285
Кутерид Г	419
Пимафукорт	566
Ровамицин	625
Стрептонитол	671
Сумамед	677
Тридерм	719
Целестодерм В с гарамицином	781
Цитеал	799

**4.6.5. Дерматит пе-
леночный**

Белодерм	172
Кутерид Г	419

**4.6.6. Дерматит пу-
зырчатый**

Бепантен	175
Дексазон	278
Метилурациловая мазь	467
Пантенол	550
Целестон	782

**4.6.7. Дерматит экс-
фолиативный**

Белогент	172
Белодерм	172
Бепантен	175
Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Дипрогент	302
Кеналог	383
Пантенол	550
Преднизолон	585
Целестодерм В	781
Целестодерм В с гарамицином	781
Целестон	782

4.6.8. Фотодерматит

Белогент	172
Белодерм	172
Делагил	279
Дипрогент	302
Кутерид	419
Плаквенил	573
Совентол	658
Ультралан	732
Фторокорт	768
Целестодерм В	781



Целестодерм В с
гарамицином.....781

4.7. Дисгидроз кожи

Белодерм.....172
Белосалик.....173
Бифоназол.....192
Дипрогент.....302
Дипросалик.....303
Формагель.....762

4.8. Зуд

Акортин.....113
Аллержи.....119
Алталекс.....122
Биолайн Кандида
Ист.....188
Ирикар.....358
Квестран.....381
Ким бальзам жид-
кий.....388
Кутивейт.....420
Пипольфен.....567
Синафлана мазь.....652
Синодерм.....654
Совентол.....658
Тавегил.....680
Трексил.....715
Фенистил.....748
Целестодерм В.....781
Целестодерм В с
гарамицином.....781

4.8.1. Зуд аногени- тальный

Акортин.....113
Ауробин.....160
Дипрогент.....302
Постеризан.....582
Постеризан форте.....582
Проктоседил.....590
Ультралан.....732
Ультрапрокт.....732
Фторокорт.....768
Целестодерм В.....781
Целестодерм В с
гарамицином.....781

4.8.2. Зуд старчес- кий

Целестодерм В.....781
Целестодерм В с
гарамицином.....781

4.9. Инфекции ви- русные слизистых оболочек

Ацикловир.....164
Грипп-Хель.....268
Мукоза компози-
тум.....492
Цикловакс.....789

4.10. Инфекционно- воспалительные за- болевания кожи и мягких тканей

V-Пенициллин
Словакофарма.....842
Абактал.....105
Альфацет.....126
Амоксиклав.....135
Ампицилин.....136
Ампициллин.....137
Ампициллина на-
триевая соль крис-
таллическая.....137
Ампициллина три-
гидрат.....138
Бактрим.....167
Банеоцин.....167
Бепантен.....175
Бетадин.....181
Биодроксил.....187
Бонцефин.....195
Брустан.....204
Ванкоцин.....210
Гарамицин.....238
Гентамицин.....246
Гентамицина суль-
фат.....246
Глауфос.....259
Данемокс.....273
Дардум.....274
Динабак.....301
Диоксицина мазь.....301
Доксилан.....308
Доксициклин.....309
Доксициклина гид-
рохлорид.....310
Дурацеф.....315
Заноцин.....318
Зинацеф.....320
Зиндолин 250.....320
Зиннат.....321
Илозон.....335
Йода спиртовой
раствор.....359
Кейтен.....382
Кефадим.....388
Кефзол.....388
Клафоран.....390
Клиндамицин.....396
Лидаприм.....433
Ликацин.....435
Линкомициновая
мазь.....438
Лонгацеф.....443
Макропен.....451
Максаквин.....452
Максипим.....453
Мандол.....454
Мегациллин орал.....458
Медазол.....459
Мефоксин.....473
Небцин.....502
Нетромицин.....506

Оспамокс.....542
Оспексин.....542
Офрамекс.....544
Палитрекс.....547
Пенглоб.....555
Пенициллин G на-
триевая соль.....555
Пентрексил.....558
Перти.....562
Пефлацин.....563
Пливасепт.....575
Повидон-йод.....576
Простафлин.....593
Псоринохель.....598
Реницин.....614
Рифамор.....623
Ровамицин.....625
Роксимизан.....626
Роцефин.....629
Рулид.....631
Септрин.....647
Септрин-форте.....647
Сибикорт.....649
Солексин
Солексин-КИД
Солексин-Форте.....658
Стеригал.....668
Стрептоцид.....672
Сульфален.....676
Сумамед.....677
Суметролим.....677
Тазоцин.....680
Таривид.....687
Теникам.....690
Тиенам.....696
Тотацеф.....709
Триасепт.....719
Тридерм.....719
Уназин.....734
Фастум.....745
Фелексин.....746
Флемоксин Солю-
таб.....755
Флуклоксациллин.....759
Фортум.....763
Цеклор.....780
Цефазолин.....785
Цефалексин.....786
Цефобид.....786
Цефотаксим.....787
Ципробай.....796
Ципролет.....796
Ципросол.....797
Ципрофлоксацина
гидрохлорид.....797
Цитерал.....800
Цифлоксинал.....803
Цифран.....803
Эритромицин.....826
Эрмицед.....826
Юнидокс Солютаб.....838

4.10.1. Абсцесс**кожи и мягких тканей**

Амоксиклав	135
Гентамицин	245
Гентамицина сульфат	246
Диоксидин	301
Доксициклин	309
Клафоран	390
Клиацил	392
Климицин	395
Клиндамицин	396
Нелорен	504
Оспен	542
Оспен 750	542
Простафлин	593
Рифамор	623
Суметролим	677
Тазоцин	680
Тамицин	683
Тобрацин-АДС	705
Фортум	763
Цефаклен	785

4.10.2. Атеромы нагноившиеся

Амоксиклав	135
Дермозолон	285
Клиацил	392
Реницин	614
Салициловая кислота	634
Цефаклен	785
Цитеал	799

4.10.3. Гидраденит

Амоксиклав	135
Дермозолон	285
Редатив	611
Реницин	614
Салициловая кислота	634
Хлорэтил	775
Цефаклен	785

4.10.4. Импетиго

Амоксиклав	135
Доксициклин	309
Зиннат	321
Оспен	542
Оспен 750	542
Пливасепт	575
Редатив	611
Сумамед	677

4.10.5. Инфекции вирусные кожи

Ацикловир	164
Зовиракс	323
Цикловакс	789

4.10.5.1. Бородавки

Декарис	278
Псоринохель	598
Ребиф	607
Солкодерм	659

4.10.5.2. Кондилома остроконечная

Альфаферон	126
Вэллферон	234
Интрон-А	355
Кондилин	404
Ребиф	607
Роферон А	628
Солкодерм	659
Тиотепа-Тиоплекс	702

4.10.6. Инфекции волосистых участков кожи

Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Дермозолон	285
Цефотаксим	786

4.10.7. Инфекция раневая

Амоксиклав	135
Аятин	166
Банеоцин	167
Бетадине	182
Винизоль	221
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гарамицин	238
Гентамицин	245
Гентамицина сульфат	246
Гентамициновая мазь	247
Дермазин	283
Дефламон	286
Диоксидин	301
Диоксицина мазь	301
Доксициклин	309
Доксициклина гидрохлорид	310
Зинацеф	320
Календулы настойка	361
Клиацил	392
Климицин	395
Клион	397
Левовинизоль	426
Левомеколь мазь	426
Лендацин	432
Ликацин	435
Ликопид	436
Линкомицина гидрохлорид	438
Нелорен	504
Ноготков цветки	524
Оксациллин натрия евая соль	531
Оксициклозоль	532
Олазоль	532
Пантоцид	550
Пленка с линкомицином	574
Пливасепт	575
Повидон-йод	576

Простафлин	593
Реницин	614
Ретарпен	616
Роцефин	629
Стрептонитол	671
Стрептоцид	672
Сульфадиметоксин	675
Суметролим	677
Тазоцин	680
Тамицин	683
Томицид	706
Триасепт	719
Тримосул	722
Фортум	763
Фурагин	769
Фурацилин	770
Цефаклен	785
Ципринол	795
Эдицин	806

4.10.8. Карбункулы

Амоксиклав	135
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гепатромбин	250
Доксициклин	309
Цефаклен	785
Цефотаксим	786
Эдицин	806

4.10.9. Лейшманиоз кожный

Глюкантим	263
Пентакаринат	557
Фунгизон	768

4.10.10. Липомы нагноившиеся

Амоксиклав	135
Салициловая кислота	634

4.10.11. Микозы кожи

Батрафен	168
Бетадине	182
Дактанол	272
Дафнеджин	276
Дермозолон	285
Кандибене	369
Канестен	369
Ламизил	424
Лотридерм	445
Лотримин	445
Микозолон	477
Микоспор	477
Микоспор крем в наборе для лечения ногтей	477
Низорал	508
Нитрофунгин	517
Нихлофен	519
Орунгал	541
Пимафуорт	566
Пимафуцин	566
Травоген	709
Травокорт	710

Тридерм	719
Трозид	726
Цитеал	799
Экалин	807
Экзодерил	808

4.10.11.1. Актиноми- коз кожи

Доксициклин	310
-------------------	-----

4.10.11.2. Дермато- фития

Батрафен	168
Бифоназол	192
Низорал	508
Орунгал	541
Трозид	726

4.10.11.3. Заболева- ния ногтей

Дактанол	272
Микозолон	477
Трозид	726
Экалин	807

4.10.11.3.1. Онихо- микозы

Батрафен	168
Бифоназол	192
Дактанол	272
Кандибене	369
Ламизил	424
Лоцерил	446
Низорал	508
Орунгал	541
Пимафуцин	566
Трозид	726
Экалин	807
Экзодерил	808

4.10.11.4. Кандидо- зы кожи

Батрафен	168
Бифоназол	192
Дактанол	272
Дафнеджин	276
Декаминная мазь	277
Дифлюкан	306
Кандибене	369
Лотридерм	445
Лотримин	445
Микоспор	477
Микоспор крем в наборе для лечения ногтей	477
Низорал	508
Нитрофунгин	517
Нихлофен	519
Орунгал	541
Пимафукурт	566
Пимафуцин	566
Травоген	709
Травокурт	710
Тридерм	719
Трозид	726
Экалин	807
Экзодерил	808

4.10.11.5. Лишай

разноцветный

Микоспор	477
Микоспор крем в наборе для лечения ногтей	477
Низорал	508
Орунгал	541
Экалин	807

4.10.11.6. Микозы

кожи волосистой

части головы

Ламизил	424
Низорал	508
Экалин	807

4.10.11.7. Микозы

кожи вторичноинфи-

цированные

Дактанол	272
Кандибене	369
Микозолон	477
Пимафукурт	566

4.10.11.8. Микозы

наружных половых органов

Бифоназол	192
Гино-дактанол	255
Дафнеджин	276
Кандибене	369
Лотримин	445
Орунгал	541
Пимафуцин	566
Трозид	726
Экалин	807

4.10.11.9. Микро- спория

Бифоназол	192
Низорал	508
Травоген	709
Травокурт	710
Экалин	807

4.10.11.10. Рубро- фития

Бифоназол	192
Низорал	508
Экалин	807

4.10.11.11. Трихофи- тия

Бифоназол	192
Дактанол	272
Низорал	508
Нитрофунгин	517
Нихлофен	519
Травоген	709
Травокурт	710
Экалин	807

4.10.11.12. Эпидер- мофития

Дактанол	272
Декаминная мазь	277

Лотридерм	445
Лотримин	445
Низорал	508
Нитрофунгин	517
Нихлофен	519
Травоген	709
Травокурт	710
Трозид	726

4.10.12. Микозы

слизистых оболочек

Батрафен	168
Биолайн Кандида	
Ист	188
Бифоназол	192
Дафнеджин	276
Дермозолон	285
Кандибене	369
Орунгал	541

4.10.12.1. Кандидо- зы слизистых оболо- чек

Батрафен	168
Биолайн Кандида	
Ист	188
Бифоназол	192
Гексорал	243
Гине-Лотримин	254
Гино-дактанол	255
Дафнеджин	276
Клион-Д	397
Орунгал	541
Пимафуцин	566
Стопангин	669
Тержинан	692

4.10.13. Рожа

V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Амоксиклав	135
Гентамицин	245
Грюнамицин сироп	269
Зинацеф	320
Клафоран	390
Клиацил	392
Климицин	395
Лендацин	432
Мегацillin орал	458
Оспен	542
Оспен 750	542
Пенициллин G на- триевая соль	555
Реницин	614
Ретарпен	616
Ровамицин	625
Стрептонитол	671
Сульфадиметоксин	675
Сумамед	677
Тамицин	683
Фортум	763
Цефаклен	785
Цефотаксим	786
Эдицин	806

4.10.14. Сикоз

Реницин.....	614
Цефаклен.....	785

4.10.15. Фолликулит

Амоксиклав.....	135
Гентамициновая мазь.....	247
Дермозолон.....	285
Лендацин.....	432
Низорал.....	508
Редактив.....	611
Реницин.....	614
Салициловая кис- лота.....	634
Цефаклен.....	785

4.10.16. Фурункулез

Амоксиклав.....	135
Винилин (Бальзам Шостаковского).....	221
Гентамицин.....	245
Гентамицина суль- фат.....	246
Гентамициновая мазь.....	247
Гепатромбин.....	250
Грюнамицин сироп.....	269
Доксициклин.....	309
Зиннат.....	321
Лендацин.....	432
Оспен.....	542
Оспен 750.....	542
Простафлин.....	593
Редактив.....	611
Реницин.....	614
Рифамор.....	623
Сульфадиметоксин ...	675
Суметролим.....	677
Тамицин.....	683
Цефаклен.....	785
Цефотаксим.....	786
Эдицин.....	806

4.10.16.1. Пиодер- мия

Гентамицина суль- фат.....	246
Гентамициновая мазь.....	247
Диоксилина мазь.....	301
Зиннат.....	321
Кандибене.....	369
Клафоран.....	390
Клиацил.....	392
Кутерид Г.....	419
Пимафукорт.....	566
Пливасепт.....	575
Повидон-йод.....	576
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617
Салициловая кис- лота.....	634
Стрептонитол.....	671
Томицид.....	706
Фастин-1.....	745

4.10.17. Целлюлит

Гентамициновая мазь.....	247
Зинацеф.....	320
Простафлин.....	593
Тазоцин.....	680
Ципринол.....	795

4.10.18. Эритразма

Бифоназол.....	192
Илозон.....	335
Кандибене.....	369
Мегациллин орал.....	458
Микоспор.....	477
Микоспор крем в наборе для лече- ния ногтей.....	477
Редактив.....	611
Трозид.....	726
Экалин.....	807

4.11. Квинке отек

Гистаглобулин сухой.....	257
Гордокс.....	266
Димебон.....	300
Зиртек.....	322
Кларитин.....	390
Ломилан.....	442
Перитол.....	560
Супрастин.....	679
Фенкарол.....	749

4.12. Крапивница

Асмовал.....	152
Берликорт.....	176
Гистаглобулин сухой.....	257
Гисталонг.....	258
Димебон.....	300
Задитен.....	317
Задитен СРО.....	317
Зиртек.....	322
Кенакорт.....	382
Кестин.....	384
Кларитин.....	390
Ломилан.....	442
Ново-Пассит.....	522
Перитол.....	560
Синодерм.....	654
Совентол.....	658
Супрастин.....	679
Тавегил.....	680
Тинсет.....	701
Трансамча.....	714
Трексил.....	715
Фенистил.....	748
Фенкарол.....	749
Фторокорт.....	768
Хилак форте.....	774
Целестон.....	782
Цетрин.....	785
Эфедрина гидрох- лорид.....	835

4.13. Лишай крас- ный плоский

Белогент.....	172
Белодерм.....	172
Белосалик.....	173
Бетновейт.....	184
Витамин Е Слова- кофарма.....	227
Деперзолон.....	282
Дермовейт.....	284
Дипрогент.....	302
Дипросалик.....	303
Кутерид.....	419
Кутивейт.....	420
Синодерм.....	654
Ультралан.....	732
Хлорэтил.....	775

4.14. Мацерация кожи

Витаон.....	228
-------------	-----

4.15. Нарушение це- лостности кожи

Бальзамический линимент по А.В.Вишневскому.....	167
Губка гемостатичес- кая коллагеновая.....	270
Левовинизоль.....	426
Ликопид.....	436
Метуракол.....	473
Олазоль.....	532
Пантенол.....	550
Пливасепт.....	575
Солкосерил.....	659
Стеригал.....	668

4.15.1. Микротрав- мы

Алталекс.....	122
Аятин.....	166
Бепантен.....	175
Бетадин.....	181
Витаон.....	228
Пантенол.....	550
Пливасепт.....	575
Триасепт.....	719

4.15.2. Раны

Аятин.....	166
Банеоцин.....	167
Бепантен.....	175
Бетадин.....	181
Винизоль.....	221
Винилин (Бальзам Шостаковского).....	221
Витаон.....	228
Геласпон.....	243
Диоксидин.....	301
Комбутек-2.....	402
Метилурациловая мазь.....	467
Нетромицин.....	506
Олазоль.....	532
Пантенол.....	550

Пантоцид	550
Пленка с линкомицином	574
Пливасепт	575
Повидон-йод	576
Радевит	601
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Салициловая мазь	634
Солкосерил	659
Стеригал	668
Стрептонитол	671
Сульфадиметоксин	675
Сульфаргин	676
Тиссукол Кит	704
Фурацилин	770
Ципринол	795

4.15.3. Раны вялोजаживающие

Альгимаф	123
Альгипор	123
Аскорбиновая кислота	151
Винизоль	221
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Витаон	228
Гептавит	251
Ируксол	359
Кальцевита	365
Компламин	403
Лековит С-Са	430
Ликопид	436
Метилурацил	467
Метилурациловая мазь	467
Метуракол	473
Олазол	532
Пантенол	550
Рибофлавин	619
Солкосерил	659

4.15.4. Трещины кожи

Бепантен	175
Витаон	228
Пантенол	550
Радевит	601
Солкосерил	659

4.15.4.1. Трещины анальной области

Лаксигал	423
Мукофальк	493
Постеризан	582
Постеризан форте	582
Ультрапрокт	732

4.15.5. Эрозии

Анацид	140
Витаон	228
Пантенол	550
Радевит	601

4.16. Нарушения трофики кожи и волос

Бепантен	175
Венорутон форте	212
Дипросалик	303
Ксантинола никотинат	417
Фарма-Мед Ле-ди'с формула для волос, кожи и ногтей	743
Фридерм pH-баланс	766
Циннасан	794
Эндур-Е 200	817

4.17. Нейродермит

Адвантан	108
Апилак	145
Белодерм	172
Белосалик	173
Бепантен	175
Бетновейт	184
Гепар композитум	248
Гумизоль	270
Деперзолон	282
Дерматоп	283
Димебон	300
Дипрогент	302
Дипросалик	303
Задитен	317
Задитен СРО	317
Ирикар	358
Перитол	560
Пиридоксина гидрохлорид	571
Псоринохель	598
Синафлана мазь	652
Синодерм	654
Триакорт	717
Ультралан	732
Ультрапрокт	732
Фторафур	767
Фторокорт	768
Целестодерм В	781
Целестодерм В с гарамицином	781
Циклоферон	790

4.18. Обморожение

Агапурин	106
Вазонит	207
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гептавит	251
Дартелин	275
Ируксол	358
Радомин	601
Раствор Рингера	605
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Совентол	658
Солкосерил	659

4.19. Ожоги

Альгимаф	123
Альгипор	123
Бепантен	175
Бетадин	181
Винизоль	221
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гептавит	251
Дерматоп	283
Ируксол	358
Календулы настойка	361
Кальция пантотенат	368
Кеталар	385
Кеторол	387
Комбутек-2	402
Левовинизоль	426
Метилурацил	467
Метилурациловая мазь	467
Ноготков цветки	524
Оксициклозол	532
Олазол	532
Пантенол	550
Парацетамол	553
Повидон-йод	576
Радевит	601
Раствор Рингера	605
Раствор Хартмана	605
Ретаболил	616
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Рефортан	618
Солкосерил	659
Стабизол	666
Стеригал	668
Стрептонитол	671
Сульфаргин	676
Тыквеол	728
Ультралан	732
Фебрицет	745
Фурацилин	770
Циклоферон	790

4.19.1. Ожоги глубокие

Альгипор	123
Гипозоль	256
Дермазин	283
Комбутек-2	402
Левовинизоль	426
Олазол	532
Стеригал	668
Стрептонитол	671


4.19.2. Ожоги инфицированные

Банеоцин	167
Бетадин	181
Бетадине	182
Винизоль	221
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221



Medical Market™

МЕДИКАЛ МАРКЕТ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

**Вместе с нами
в медицину будущего!**

Medical Market™

Практикующий врач

Международный медицинский журнал "МЕДИКАЛ МАРКЕТ" и журнал последипломного образования "ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ" – это 7 лет актуальной информации, качественной рекламы, это доверие читателей, это прочная репутация в кругу профессионалов.

Главная задача редакционной коллегии – расширить круг профессиональных знаний врачей и фармацевтов:

ознакомить их с последними новинками современного медицинского рынка;

дать практические профессиональные рекомендации видных отечественных и зарубежных специалистов по диагностике и лечению различных заболеваний;

ввести в курс новостей зарубежной и отечественной медицинской науки;

публиковать информацию о международных и отечественных фармацевтических компаниях и производителях медоборудования, которые представляют свою продукцию на российском медицинском рынке.

Тираж: "МЕДИКАЛ МАРКЕТ" – 18000 ежеквартально,
"ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ" – 12000 ежеквартально.

Журналы распространяются на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Подписка осуществляется только редакцией:

Россия, 103051 Москва, Цветной бульвар, 30.
Экспериментальная типография, 3 этаж
Тел.: (095) 200-2382, 200-2457, факс: (095) 200-2359

Гарамидин	238
Гентамицин	245
Гентамициновая мазь	247
Дермазин	283
Диоксилина мазь	301
Доксициклина гид- рохлорид	310
Календулы настой- ка	361
Комбутек-2	402
Лендацин	432
Ликацин	435
Небцин	502
Нелорен	504
Нетромицин	506
Оксациллин натри- евая соль	531
Оксициклозоль	532
Олазоль	532
Пливасепт	575
Повидон-йод	576
Реницин	614
Стрептонитол	671
Тамицин	683
Триасепт	719
Фастин-1	745
Фортум	763
Фурагин	769
Фурацилин	770
Цефаклен	785
Цефотаксим	786
Ципринол	795
Эдицин	806

4.19.3. Ожоги кожи и слизистой

Витаон	228
Дермазин	283
Ируксол	359
Комбутек-2	402
Метилурациловая мазь	467
Метуракол	473
Облепиховое масло	530
Пантенол	550
Пливасепт	575
Салициловая мазь	634
Совентол	658
Солкосерил	659
Стеригал	668
Стрептонитол	671
Ультралан	732
Фастин-1	745
Фенистил	748

4.19.4. Ожоги кожи фосфором

Солкосерил	659
------------------	-----

4.19.5. Ожоговая болезнь

Димебон	300
Карбактин	374
Плазма-Лит	148

Водный Раствор	572
Тыквеол	728

4.20. Опрелость

Белодерм	172
Бепантен	175
Бифоназол	192
Витаон	228
Деперзолон	282
Дермозолон	285
Диадерм	287
Кутерид	419
Кутивейт	420
Пливасепт	575
Редатив	611
Циндол суспензия	792
Цитеал	799

4.21. Опухоли

4.21.1. Меланома

Алкеран	118
Альфаферон	126
Винкристин суль- фат	222
Гидреа	252
Зитазониум	323
Интрон-А	355
Мюстофоран	496
Реальдирон	606
Роферон А	628
Тамоксифен	684
Цисплатин-Эбеве	798
Элдицин	810

4.21.2. Микоз грибо- видный

Альфаферон	126
Велбе	211
Винкристин суль- фат	222
Гидрокортизон	252
Метотрексат на- трия АДС	469
Реальдирон	606
Роферон А	628
Целестон	782
Цитоксан	800

4.21.3. Рак кожи

Блеоцин	193
Метотрексат	468
Метотрексат на- трия АДС	469
Флуорокс	760
Цисплатин	798

4.21.4. Рак слизис- тых оболочек

Флуорокс	760
----------------	-----

4.21.5. Ретикулосар- кома кожи

Блеоцин	193
Вумон	233
Метотрексат	468

4.22. Панариций

Пливасепт	575
Реницин	614
Цефотаксим	786

4.23. Паронихия

Низорал	508
Пливасепт	575
Цефотаксим	786
Экалин	807

4.24. Педикулез

Бензилбензоат	174
Бензилбензоата мазь	174
Нок	524

4.25. Почесуха

Бетновейт	184
Кутерид	419
Кутивейт	420
Пипольфен	567
Триакорт	717

4.25.1. Почесуха солнечная

Кутерид	419
---------------	-----

4.26. Проказа

Рифадин	622
Рифампицин	623

4.27. Пролежни

Альгипор	123
Бальзамический линимент по А.В.Вишневскому	167
Бепантен	175
Бетадин	181
Винизоль	221
Губка гемостатичес- кая коллагеновая	270
Дермазин	283
Диадерм	287
Ируксол	358
Камфорный спирт	368
Комбутек-2	402
Компламин	403
Левовинизоль	426
Повидон-йод	576
Солкосерил	659
Стеригал	668
Стрептонитол	671
Сульфаргин	676
Фурацилин	770

4.28. Псориаз

Акортин	113
альфа-Токоферола ацетат	125
Апуленн	147
Белогент	172
Белодерм	172
Белосалик	173
Бетновейт	184
Випсогал	224
Гептавит	251
Гидрокортизон	252
Гумизоль	270

Дексазон	278	Гидрокортизон	252	Дермовейт	284
Деперзолон	282	Дипрогент	302	Димебон	300
Дерматоп	283	Дипросалик	303	Дипрогент	302
Дермовейт	284	Кутерид	419	Дипросалик	303
Дипрогент	302	Кутивейт	420	Ирикар	358
Дипросалик	303	Низорал	508	Кальция пантоте- нат	368
Дипроспан	303	Ново-Пассит	522	Кларитин	390
Ибусан	328	Радевит	601	Кутерид	419
Кенакорт	382	Ретиноевая мазь	617	Кутерид Г	419
Кеналог	383	Рибасан форте	618	Кутивейт	420
Кетонал	386	Роаккутан	624	Локоид	441
Кнаван	399	Солкодерм	659	Локоид Крело	441
Кутерид	419	Сульфodeкортэм	676	Ломилан	442
Кутивейт	420	Фридерм деготь	766	Нитрофунгин	517
Ликопид	436	Фридерм цинк	766	Ново-Пассит	522
Локоид	441	Целестодерм В	781	Пипольфен	567
Локоид Крело	441	Целестодерм В с гарамицином	781	Псоринохель	598
Метотрексат	469	4.31. Угри		Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Метотрексат на- трия АДС	469	Андрокур	141	Рибофлавин	619
Метотрексат-Эбеве	470	Бассадо	168	Семпрекс	645
Оксорален ультра	532	Диане-35	289	Сибикорт	649
Пиридоксина гид- рохлорид	571	Доксал	308	Синафлана мазь	652
Псориатен	598	Доксициклин	310	Синоподерм	654
Псоринохель	598	Зинерит	321	Супрастин	679
Псоркутан	599	Климицин	395	Трансамча	714
Ретинола ацетат (Витамин А)	617	Микрофоллин форте	478	Трексил	715
Рибасан форте	618	Моноклин	486	Триакорт	717
Сандиммун	636	Пливасепт	575	Тыквеол	728
Сандиммун-Неорал	636	Продерм	589	Ультралан	732
Синафлана мазь	652	Реницин	614	Фенистил	748
Синоподерм	654	Ретиноевая мазь	617	Фторокорт	768
Сульфodeкортэм	676	Роаккутан	624	Хепель	774
Тактивин	682	Скинорен	657	Хилак форте	774
Триакорт	717	Стрептонитол	671	Целестодерм В	781
Триксилом	721	Хепель	774	Целестодерм В с гарамицином	781
Тыквеол	728	Цитеал	799	Целестон	782
Ультралан	732	4.31.1. Угри розо- вые		Циклоферон	790
Фридерм деготь	766	Доксициклин	310	4.33.1. Экзема мик- робная	
Фторокорт	768	Сульфodeкортэм	676	Апилак	145
Целестодерм В	781	Фторокорт	768	Банеоцин	167
Целестодерм В с гарамицином	781	4.32. Чесотка		Белогент	172
Целестон	782	Бензилбензоат	174	Бепантен	175
Цигнодерм	787	Бензилбензоата мазь	174	Дермозолон	285
Элоком	811	Сульфodeкортэм	676	Дипрогент	302
Эссенциале	829	4.33. Экзема		Кутерид Г	419
4.29. Пузырчатка		Адвантан	108	Нихлофен	519
Белодерм	172	Акортин	113	Олазол	532
Гидрокортизон	252	Апилак	145	Сибикорт	649
Дексаметазон	279	Апулеин	147	Софрадекс	663
Имуран	341	Ауробин	160	Ультралан	732
Преднизолон	585	Белодерм	172	4.34. Эритема	
Триамцинолон	718	Белосалик	173	Гидрокортизон	252
Фторокорт	768	Бетновейт	184	Кутерид	419
Целестон	782	Гаразон	238	Мегацillin орал	458
4.30. Себорея		Гептавит	251	Псоринохель	598
Акортин	113	Гистаглобулин сухой	257	Синоподерм	654
Апилак	145	Деперзолон	282	Сумамед	677
Белодерм	172	Дерматоп	283	Трексил	715
Белосалик	173			Фастум	745
Бетновейт	184				

4.34.1. Эритема многоформная

Белодерм	172
Дексазон	278
Фторокорт	768
Целестон	782

4.35. Эритродермия

Белодерм	172
Бетновейт	184
Кутерид	419
Кутивейт	420
Ультралан	732

4.36. Язвы кожи

Анавенол	138
Аскорбиновая кислота	151
Бальзамический линимент по А. В. Вишневскому	167
Ируксол	359
Комбутек-2	402
Ликопид	436
Метилурациловая мазь	467
Метуракол	473
Пливасепт	575
Повидон-йод	576
Простафлин	593
Псоринохель	598
Радевит	601
Рибофлавин	619
Солкосерил	659
Стеригал	668
Фортум	763
Фурацилин	770
Циндол суспензия	792
Циннасан	794
Ципринол	795

4.36.1. Язвы некротические

Ируксол	359
---------------	-----

4.36.2. Язвы трофические

Агапурин	106
Аевит	110
Альгимаф	123
Альгипор	123
Бепантен	175
Бетадин	181
Вазонит	207
Венза	212
Венорутон	212
Венорутон форте	212
Винизоль	221
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гентамициновая мазь	247
Гепатромбин	250
Губка гемостатическая коллагеновая	270
Дартелин	275
Диоксилина мазь	301

Ируксол	358
Кальция пантотенат	368
Компламин	403
Ксантинола никотинат	416
Левовинизоль	426
Лиотон 1000	438
Метуракол	473
Олазол	532
Пантенол	550
Пливасепт	575
Радомин	601
Ромазулан	627
Ронидаза	627
Солкосерил	659
Стрептонитол	671
Сульфаргин	676
Тазоцин	680
Трентал	716
Трентал 400	716
Ультралан	732
Цитеал	799
Эскузан	827

5. Заболевания МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

5.1. Галакторея

Абергин	106
Бромокриптин	
Поли	199
Бромэргон	200
Кломид	397
Клостилбегит	399
Серокриптин	648

5.2. Гинекомастия

Данодиол	273
Данол	273

5.3. Гиполактация

Апилак	145
Гормель С	267

5.4. Мастит

Бифидумбактерин сухой	191
Бромэргон	200
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гепатромбин	250
Фортум	763

5.5. Опухоли молочной железы доброкачественные

Бромокриптин	199
Бромэргон	200
Данодиол	273
Мастодинон	456
Примолют-Нор	587

5.6. Рак молочной железы

5-Фторурацил-Эбеве	840
Алкеран	118
Велбе	211
Винкристин	222
Винкристин сульфат	222
Гемзар	244
Гидреа	252
Декарис	278
Депостат	282
Доксолем	311
Доксорубицин-Эбеве	311
Золадекс	325
Карбоплатин-Эбеве	375
Ледоксина	428
Лейкеран	428
Мамомит	454
Мегейс	458
Метотрексат	468
Метотрексат натрия АДС	469
Метотрексат-Эбеве	470
Новантрон	520
Новофен	524
Оксипрогестерона капронат	531
Примолют-Нор	587
Растоцин	606
Ребиф	607
Синэстрол	655
Таксотер	682
Тамоксифен	684
Тамоксифен Эбеве	685
Тестостерона пропионат	693
Тиотеп-Тиоплекс	702
Трексан	715
Флурокс	760
Фторафур	767
Хормоплекс	777
Циклотал	790
Циклофосфан	791
Цитоксан	800
Цитомид	801
Элдизин	810
Эндотелон	816
Эпилем	823
Этинилэстрадиол	832
Этопозид	833

5.6.1. Рак молочной железы в постменопаузе

Билем	186
Винкристин	221
Зитазониум	323
Мамомит	454
Ориметен	536
Ретаболил	616
Тамоксен	684



Фарестон 742
Флурокс 760

5.6.2. Рак молочной железы гормонозависимый

Винкристин 221
Ретаболил 616
Тамоксифен 684
Флурокс 760

5.6.3. Рак молочной железы у мужчин после кастрации

Винкристин 221
Флурокс 760

5.7. Трещины сосков у кормящих женщин

Бепантен 175

6. Заболевания НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Абсцесс мозга

Ампицилин 136
Дефламон 286
Клион 397
Эдицин 806

6.2. Альцгеймера болезнь

Амиридин 133
Ноотропил 526
Ойкамид 531
Церебролизин 783

6.3. Вертебро-базиллярная недостаточность

Кавинтон 361
Редергин 611
Стугерон 674
Сульпирид 675
Танакан 685
Церутил 785

6.4. Гиперкинез

Ноотропил 526
Тиаприд 695
Тропацин 727
Циклодол 789

6.5. Гипертензия внутричерепная

Инстенон 347
Левулоза 427

6.6. Гипоксия мозга медикаментозная

Бемегрид 173

6.7. Диагностика

Ультравист-240, 300, 370 731

6.7.1. Вентрикулография

Ультравист-240, 300, 370 731
Этиотраст 832

6.7.2. Магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга

Магневист 449

6.7.3. Миелография

Ультравист-240, 300, 370 731
Этиотраст 832

6.7.4. Цистернография

Ультравист-240, 300, 370 731
Этиотраст 832

6.8. Диэнцефальный синдром

Пирроксан 572

6.9. Заболевания спинного мозга

6.9.1. Амиотрофический боковой склероз

альфа-Токоферола ацетат 125
Витамин Е Словакофарма 227
Цианокобаламин 787
Эндур-Е 200 817

6.9.2. Миелопатия фуникулярная

Амиридин 133
Мидокалм 476
Цианокобаламин 787

6.9.3. Рассеянный склероз

Амиридин 133
Бетаферон 184
Галиум-Хель 235
Карбасан 375
Карбасан ретард 375
Копаксон-Тева, Кополимер-1 406
Мидокалм 476
Тактивин 682
Фосфобион 765
Церебрум композитум 784
Цианокобаламин 787
Циклоферон 790

6.10. Кохлеовестибулярный синдром

Аминалон 131
Валидол 208
Валидол с глюко-

зой 209
Вертигохель 218
Винпоцетин 223
Димедрол 301
Кавинтон 361
Ким бальзам жидкий 388
Кинедрил 389
Микрозер 478
Ноотропил 526
Пирроксан 572
Редергин 611
Стугерон 674
Сульпирид 675
Танакан 685
Фенибут 747
Цинедил 792
Циннаризин 793
Циннарон 793
Циннасан 794

6.11. Кровоизлияние внутричерепное

Нимотоп 509
Тиклид 698

6.12. Менингит

V-Пенициллин
Словакофарма 842
Абактал 105
Акт-ХИБ 114
Амикацин 129
Амоксициллин 135
Ампицилин 136
Ампициллин 137
Бактрим 167
Гарамицин 238
Гентамицин 246
Дардум 274
Дексазон 278
Зинацеф 320
Интраглобин 354
Клафоран 390
Левомецетин 427
Ликацин 435
Линкомицина гидрохлорид 438
Лонгацеф 443
Меронем 465
Небцин 502
Оспамокс 542
Офрамекс 544
Пенициллин G натриевая соль 555
Пенодил 556
Пентаглобин 556
Пентрексил 558
Пефлацин 563
Роцефин 629
Рулид 631
Стандациллин 667
Тобрацин-АДС 705
Флуклоксациллин 759
Фортум 763
Целестон 782
Цефобид 786



Цефотаксим	787
Циклоферон	790
6.12.1. Менингит криптококковый	
Лендацин	432
6.12.2. Менингит менингококковый	
Гентамицин	245
Иммуноглобулин человека нормальный	337
Лендацин	432
Роксимижан	626
Рулид	631
Сульфадиметоксин ..	675
Тамицин	683
Цефотаксим	786
6.12.3. Менингококконосительство	
Римактан	620
Рифадин	622
Рифамор	623
Ровамицин	625
Рулид	631
6.12.4. Менингомиелит	
Эдицин	806
6.13. Менъера болезнь	
Аминазин	130
Вертигохель	218
Винпоцетин	223
Димедрол	301
Дифенин	305
Кавинтон	361
Кинедрил	389
Контемнол	405
Ксантинола никотинат	416
Микрозер	478
Предуктал	586
Сульпирид	675
Фенибут	747
Цинедил	792
Циннаризин	793
Циннарон	793
Циннасан	794
6.14. Миастения	
Амиридин	133
Витамин Е Словакофарма	227
Прозерин	589
Спиронаксан	664
6.15. Мигрень	
Алталекс	122
Амазол	127
Амол	136
Анаприлин	139
Аскофен-П	152
Аспирин Кардио	154
Ацетаминофен	162
Бромазепам Ланна-	

хер	197
Бурана	205
Валерианы настойка	208
Вольтарен	232
Вольтарен рапид	232
Давериум	271
Дитамицин	305
Имигран	336
Индерал	343
Калпол	364
Калпол 6 плюс	364
Каффетин	380
Кнавоп	399
Контемнол	405
Корвитол	408
Коргард	409
Ксантинола никотинат	417
Никошпан	509
Новиган	521
Ново-Пассит	522
Обзидан	530
Ормидол	536
Парацетамол	553
Пенталгин-Н	557
Перитол	560
Пикамилон	564
Пливалгин	575
Пронаксен	592
Псоринохель	598
Редергин	611
Ретафил	617
Рибасан форте	618
Сбор успокоительный N 3	641
Синусан	655
Спазмoвералгин	663
Нео	663
Спаскупрель	664
Спигелон	664
Стадол НС	667
Стугерон	674
Тромбо АСС	726
Фебрицет	745
Цель Т	783
Циннаризин	793
Циннасан	794
6.16. Нарушение мозгового кровообращения	
Аминалон	131
Аспирин плюс С	155
Аспирин УПСА	155
Вазонит	207
Вертигохель	218
Винпоцетин	223
Галидор	235
Инстенон	347
Калия глутаминат	363
Компламин	403
Ксантинола никотинат	417
Мемоплант	462

Милдронат	480
Нимотоп	509
Ойкамид	531
Пентамон	558
Пикамилон	564
Пирацетам	570
Радомин	601
Ретафил	617
Семакс	645
Солкосерил	659
Тиклид	698
Тромбо АСС	726
Церебрум компози-тум	784
Церутил	785
Цинедил	792
Циннаризин	793
Циннарон	793
Циннасан	794
Эмоксипин	812
6.16.1. Инсульт	
Аспирин Кардио	154
Инстенон	347
Ноотропил	526
Солкосерил	659
6.16.1.1. Инсульт геморрагический	
Солкосерил	659
Эмоксипин	812
6.16.1.2. Инсульт ишемический	
Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Аспифат	157
Вазонит	207
Винпоцетин	223
Галидор	235
Дартелин	275
Инстенон	347
Кавинтон	361
Курантил N 25	418
Никошпан	509
Нимотоп	509
Пентамон	558
Редергин	611
Солкосерил	659
Стугерон	674
Тиклид	698
Трентал	716
Трентал 400	716
Церебролизин	783
Эмоксипин	812
6.16.2. Остаточные явления геморрагического инсульта	
Аминалон	131
Инстенон	347
Пентамон	558
Пикамилон	564
Редергин	611
Цинедил	792

Эскулюс компози-	
тум	827
6.16.3. Остаточные явления ишемического инсульта	
Агапурин.....	106
Аминалон	131
Винпоцетин	223
Инстенон.....	347
Кавинтон.....	361
Липостабил	440
Никошпан	509
Ноотропил.....	526
Пентамон	558
Пикамилон	564
Стугерон	674
Тиклид.....	698
Трентал.....	716
Трентал 400.....	716
Цинедил.....	792
Эскулюс компози-	
тум	827
6.16.4. Остаточные явления нарушения мозгового кровообращения	
Агапурин.....	106
Аминалон	131
Гаммалон	237
Мемоплант	462
Никошпан	509
Ноотропил.....	526
Ойкамид	531
Пиридитол	571
Стугерон	674
Танакан.....	685
Церебрум компози-	
тум	784
Цинедил.....	792
Циннаризин.....	793
Эндурацин	817
Эскулюс компози-	
тум	827
6.16.5. Остаточные явления субарохной-дального кровоизлияния	
Стугерон	674
6.16.6. Преходящее нарушение мозгового кровообращения	
Аминалон	131
Аспирин Кардио	154
Аспирин УПСА с	
витамином С.....	156
Аспифат	157
Винпоцетин	223
Дротаверина гид-	
рохлорид.....	314
Инстенон.....	347
Кавинтон.....	361
Никошпан	509

Нимотоп	509
Солкосерил	659
Стугерон.....	674
6.17. Нарушение мышечного тонуса	
Сант-Е-гал	638
6.17.1. Гипертонус мышечный	
Клонотрил	398
Мидокалм	476
Седуксен.....	642
Спаскупрель	664
Тропацин	727
Циклодол.....	789
6.17.2. Гипотонус мышечный	
Викасол	220
Фосфобион	765
6.17.3. Контрактуры мышечные	
Мидокалм	476
Миоластан	482
Седуксен.....	642
6.17.4. Кривошея спастическая	
Миоластан	482
Фастум	745
6.17.5. Ригидность мышц	
Креданил	414
Седуксен.....	642
Синемет.....	653
Синемет СР	653
Тропацин	727
Циклодол.....	789
6.17.6. Спастичность мышечная	
Диазепекс	288
Мидокалм	476
Миоластан	482
Седуксен.....	642
Спаскупрель	664
6.17.7. Экстрапирамидные расстройства	
Акинетон	112
Пипольфен	567
Циклодол.....	789
6.18. Неврит	
Амбене	127
Апизартрон	144
Аспизол	153
Ибупрофен	327
Мориамин форте	490
Нейромультивит	503
Пливалгин	575
Прозерин	589
Протрадон	596
Целестон.....	782
Энгистол.....	815

6.18.1. Неврит зрительного нерва	
Целестон	782
6.18.2. Неврит тройничного нерва	
Карбамазепин-	
Акри	374
Карбапин.....	374
Нейромультивит.....	503
Спигелон	664
Сторилат	670
Цианокобаламин	787
6.18.2.1. Неврит лицевого нерва	
Нейромультивит.....	503
Никотиновая кис-	
лота	509
6.18.3. Плексит	
Гумизоль	270
Нейромультивит.....	503
6.18.4. Полиневрит	
Аминалон	131
Бевиплекс.....	169
Витабекс.....	226
Гаммалон.....	237
Дибазол	290
Кальция пантоте-	
нат.....	368
Липамид.....	439
Липоевая кислота.....	440
Пливалгин	575
Реопирин.....	615
Цианокобаламин	787
Эспа-липон	828
6.18.5. Радикулит пояснично-крестцовый	
Амбене	127
Анальгин	139
Випросал В мазь	223
Гумизоль	270
Дексазон	278
Дикломелан.....	295
Диклофенак.....	297
Дипроспан.....	303
Ибупрофен	327
Ибупрофен Ланна-	
хер	328
Ибусан	328
Индовис ЕС.....	344
Индотард.....	346
Каффетин.....	380
Кеторол.....	387
Миоластан.....	482
Нейромультивит.....	503
Перца стручкового	
настойка	563
Пироксикам	572
Ревма-гель	609
Ревмон гель	609
Реопирин.....	615
Репарил-гель Н.....	616

Стекловидное тело	668	Цитоксан	800	Пермакс	561
Сургам	679	Цитомид	801	Селегилин-CTS	643
Теникам	690	6.21.4. Рак		Синемет	653
Тобитил	705	БиКНУ	185	Синемет СР	653
Унгапивен	735	Доксорубицин-		Тропацин	727
Фастум	745	Эбеве	311	Церебрум компози-	
ФиБС	753	Флурокс	760	тум	784
Цель Т	783	Цитомид	801	Циклодол	789
Цианокобаламин	787	6.22. Отек мозга		Элдеприл	809
6.19. Нейропатия		Дексазон	278	Юмекс	838
Нейромультивит	503	Лазикс	420	6.25.1. Паркинсо-	
Эспа-липон	828	Пентамин	558	низм	
6.19.1. Атрофия		Урбазон	737	Акинетон	112
зрительного нерва		Фуросемид	770	Бромокриптин	199
Пилокарпина гид-		Фуросемид Ланна-		Бромокриптин	
рохлорид	565	хер	771	Поли	199
Прозерин	589	Фурсемид	772	Бромэргон	200
6.19.2. Нейропатия		Целестон	782	Димедрол	301
диабетическая		Эуфиллин	834	Изиком	329
Агапурин	106	6.23. Паралич		Креданил	414
Изодибут	330	Прозерин	589	Мадопар	449
Карбапин	374	6.23.1. Паралич		Мадопар быстро-	
Тегретол	689	бульбарный		действующие таб-	
Тегретол ЦР	689	Амиридин	133	летки	
Унитиол	735	6.23.2. Паралич ли-		(диспергируемые)	449
Эспа-липон	828	цевого нерва		Мадопар ГСС	449
6.20. Обменно-дис-		Дибазол	290	Мидантан	476
трофические заболе-		6.23.3. Паралич		Пиридоксина гид-	
вания нервной		спастический		рохлорид	571
системы		Тропацин	727	Селегилин-CTS	643
Берокка Са + Mg	181	Фенобарбитал	749	Синемет	653
Нейротрат форте	503	Циклодол	789	Синемет СР	653
Убихинон компози-		6.23.4. Паралич це-		Тиаприд	695
тум	729	ребральный детский		Тропацин	727
6.21. Опухоли мозга		Аминалон	131	Циклодол	789
БиКНУ	185	Гаммалон	237	Элдеприл	809
Мюстофоран	496	Цианокобаламин	787	Юмекс	838
Нидран	507	6.24. Парез		6.26. Полиомиелит	
СииНУ	650	Амиридин	133	Дибазол	290
Тиотепа-Тиоплекс	702	Витамин Е Слова-		Иммуноглобулин	
Триксилем	721	кофарма	227	человека нормаль-	
Цитомид	801	Эндур-Е 200	817	ный	337
6.21.1. Астроцитома		6.25. Паркинсона		Имовакс Полио	338
БиКНУ	185	болезнь		Кальцитрин	366
6.21.2. Глиобласто-		Акинетон	112	Папазол	551
ма		Бромокриптин		Полио Сэбин Веро	579
БиКНУ	185	Поли	199	Прозерин	589
Блеоцин	193	Галиум-Хель	235	Тетракок 05	693
Нидран	507	Даверниум	271	Фосфобион	765
6.21.3. Нейроблас-		Изиком	329	6.26.1. Остаточные	
тома		Креданил	414	явления полиомие-	
Алкеран	118	Мадопар	449	лита	
Винкристин	221	Мадопар быстро-		Дибазол	290
Винкристин суль-		действующие таб-		6.27. Спазм артерий	
фат	222	летки		мозга	
Вумон	233	(диспергируемые)	449	Винпоцетин	223
Доксолем	311	Мадопар ГСС	449	Дротаверина гид-	
Доксорубицин-		Мидантан	476	рохлорид	314
Эбеве	311	Наком	500	Кофеин-бензоат на-	
Ледоксина	428	Ниар	507	трия	413
Растоцин	606	Парлодел	553	Нимотоп	509
				Папаверина гид-	
				рохлорид	551

6.28. Судорожный синдром

Берлидорм 10	176
Берлидорм 5	176
Клонотрил	398
Магния сульфат	449
Нозепам	524
Сибазон	649
Тиопентал	702

6.28.1. Судороги мышц ночные

Детралекс	285
Эсавен	829

6.28.2. Судороги фебрильные у детей

Вибуркол	219
----------------	-----

6.29. Тик

Галопер	235
Галоперидол	237
Тиаприд	695
Тиодазин	701
Фенибут	747

6.29.1. Детский тик

Галопер	235
Депакин	281
Депакин 300 энте-рик	281
Депакин хроно	281
Депакин хроно 500	281
Седуксен	642
Транксен	713

6.29.2. Заикание

Галоперидол	237
Фенибут	747

6.30. Травмы черепно-мозговые

Аминалон	131
Винпоцетин	223
Глиатилин	260
Натрия оксибутират	501
Ойкамид	531
Пикамилон	564
Пирацетам	570
Солкосерил	659
Сульпирид	675
Траумель С	714
Церебролизин	783

6.30.1. Остаточные явления черепно-мозговых травм

Аминалон	131
Вертигохель	218
Гаммалон	237
Ноотропил	526
Ойкамид	531
Пирацетам	570
Редергин	611
Семакс	645
Сиднокарб	649
Танакан	685

Траумель С	714
Церебрум компози-тум	784
Цинедил	792
Циннасан	794

6.30.2. Сотрясение мозга

Вертигохель	218
Инстенон	347
Траумель С	714
Церебролизин	783
Церебрум компози-тум	784
Циннасан	794

6.31. Тремор мышц

Индерал	343
Креданил	414
Обзидан	530
Ормидол	536
Персен форте	562
Синемет	653
Синемет СР	653
Тримепранол	722

6.32. Хорея

Галоперидол	236
Гумизоль	270
Оспен	542
Оспен 750	542
Пиридоксина гид-рохлорид	571
Тиаприд	695
Тиапридал	695
Фенобарбитал	749

6.33. Цереброваскулярная недостаточность

Антисклерин	143
Глиатилин	260
Дартелин	275
Инстенон	347
Кавинтон	361
Ноотропил	526
Пикамилон	564
Пиридитол	571
Редергин	611
Танакан	685
Церебролизин	783
Церутил	785
Циннасан	794
Эндурацин	817
Эуфиллин	834

6.34. Энцефалит

Кефадим	388
Прозерин	589
Церебрум компози-тум	784
Циклоферон	790
Эдицин	806

6.35. Эпилепсия

Берлидорм 10	176
Берлидорм 5	176
Глютаминовая кис-	

лота	264
Депакин	281
Депакин 300 энте-рик	281
Депакин хроно	281
Депакин хроно 500	281
Диазепам	288
Карбапин	374
Карбасан	375
Карбасан ретард	375
Клонотрил	398
Мазепин	450
Мерлит	465
Напотон	501
Неулептил	506
Нитразепам	511
Нитрам	512
Нозепам	524
Паглюферал 1,2,3	546
Седуксен	642
Сибазон	649
Сторилат	670
Тегретол	689
Тегретол ЦР	689
Тизерцин	697
Эндур-Е 200	817
Эпиал	823

6.35.1. Эпилепсия генерализованная

Гексамидин	241
Депакин	281
Депакин 300 энте-рик	281
Депакин хроно	281
Депакин хроно 500	281
Дифенин	305
Карбамазепин-Акри	374
Карбапин	374
Карбасан	375
Карбасан ретард	375
Клонотрил	398
Ламиктал	424
Сторилат	670
Тегретол	689
Тегретол ЦР	689
Фенобарбитал	749
Хлоракон	775
Эпиал	823
Эуноктин	833

6.35.2. Эпилепсия с малыми припадками

Берлидорм 10	176
Берлидорм 5	176
Депакин	281
Депакин 300 энте-рик	281
Депакин хроно	281
Депакин хроно 500	281
Карбамазепин-Акри	374
Карбапин	374
Карбасан	375
Карбасан ретард	375

Клонотрил	398
Ламиктал	424
Сторилат	670
Эпиал.....	823
Эуноктин	833

6.35.3. Эпилептический статус

Геминеврин	245
Клонотрил	398
Магния сульфат	449
Мерлит.....	465
Тиопентал	702

7. Заболевания ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

7.1. Артрит

Аллитера	119
Артротек.....	150
Афлубин.....	160
Биолайн Артритис	188
Брустан	204
Бурана	205
Випросал В мазь	223
Витрум Витамин Е.....	230
Вольтарен Эмульгель.....	233
Гидрокортизон ацетат	253
Дексазон.....	278
Диклоберл 100	294
Диклоберл 25	294
Диклоберл 50	294
Диклоберл 75	294
Диклоберл ретард.....	294
Диклориум.....	296
Диклофенак ЕС.....	298
Дискус композитум.....	304
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Ибупрофен Ланнахер.....	328
Индовис ЕС.....	344
Индометацин.....	344
Камфорный спирт.....	368
Капсикам	373
Кеналог	383
Кетонал	386
Кнавон	399
Кошачий Коготь	413
Коэнзим компози-тум.....	413
Ортофен	540
Перофен	562
Плаквенил	573
Профенид	597
Профенид гель 2,5%	597

Реметан	613
Саникам	637
Тауредон	688
Триамцинолон.....	718
Унгапивен	735
Фастум	745
ФиБС	753
Хотемин	777
Целестон	782
Циклоферон	790

7.1.1. Артрит инфекционный

Ампицилин	136
Биодроксил	187
Бонцефин.....	195
Гентамицина сульфат	246
Дардум	274
Дурацеф.....	315
Заноцин	318
Зинацеф	320
Зиндолин 250	320
Кефадим	388
Кефзол	388
Клафоран.....	390
Клиндамицин.....	396
Лендацин	432
Ликацин	435
Лонгацеф	443
Мандол	454
Мефоксин	473
Нелорен	504
Офрамекс.....	544
Палитрекс	547
Перти.....	562
Пефлацин.....	563
Пипрацил	569
Ровамицин.....	625
Роцефин.....	629
Тиенам	696
Тотацеф	709
Траумель С.....	714
Триамцинолон.....	718
Уназин	734
Фортум	763
Хотемин	777
Цефазолин	785
Цефобид.....	786
Цефотаксим.....	786
Ципринол	795
Ципробай	796
Ципролет.....	796
Ципросол	797
Ципрофлоксацина гидрохлорид	797
Цитерал	800
Цифлоксинал.....	803
Цифран	803

7.1.2. Артрит подагрический

Алломарон.....	119
Аллопуринол	120
Вольтарен.....	232
Диклоберл 100	294

Диклоберл 25	294
Диклоберл 50	294
Диклоберл 75	294
Диклоберл ретард.....	294
Дикломелан	295
Диклофенак ЕС.....	298
Диклофенак-Ретард.....	298
Доналгин	312
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Ибупрофен Ланнахер.....	328
Ибусан	328
Индовис ЕС.....	344
Индометацин.....	345
Кетонал	386
Кнавон	399
Наклофен	499
Наклофен Дуо.....	499
Нифлугель.....	519
Реопирин	615
Санапрокс.....	635
Тобитил	705
Траумель С.....	714
Хотемин.....	777
Целестон	782

7.1.3. Артрит ревматоидный

Амбене.....	127
Анопирин.....	143
Артамин.....	149
Артротек.....	150
Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Ацетилсалициловая кислота	162
Биолайн Артритис	188
Брустан	204
Бруфен.....	205
Випросал В мазь.....	223
Витамин Е Словакофарма.....	227
Вольтарен	232
Вольтарен рапид.....	232
Декарис	278
Дексаметазон.....	279
Делагил	279
Диклобене.....	293
Диклоберл 100	294
Диклоберл 25	294
Диклоберл 50	294
Диклоберл 75	294
Диклоберл ретард.....	294
Дикломелан	295
Диклонат П.....	296
Диклориум.....	296
Диклофен	297
Диклофенак	297
Диклофенак ЕС.....	298
Диклофенак-Ретард.....	298
Дипроспан	303

Дифен.....	305	Диклофенак-Ретард.....	298	Диклоберл 25	294
Доналгин	312	Дипроспан	303	Диклоберл 50	294
Ибуклин	327	Дифен	305	Диклоберл 75	294
Ибуклин юниор	327	Дона.....	311	Диклоберл ретард	294
Ибупрофен.....	327	Индовис ЕС	344	Дикломелан	295
Ибупрофен Ланна-хер	328	Индометацин.....	344	Диклонат П	296
Ибусан.....	328	Индометацин-Акри	345	Диклориум	296
Имуран.....	341	Индотард	346	Диклофен.....	297
Индовис ЕС	344	Капсикам	373	Диклофенак.....	297
Индометацин.....	345	Кетонал	386	Диклофенак ЕС	298
Индометацин-Акри	345	Наклофен	499	Дифен.....	305
Индотард	346	Наклофен Дуо.....	499	Дона	311
Интраглобин.....	354	Нифлугель.....	519	Доналгин.....	312
Кенакорт.....	382	Реопирин	615	Ибуклин.....	327
Кетонал.....	386	Ровамицин	625	Ибуклин юниор	327
Кнавон.....	399	Санапрокс.....	635	Ибупрофен	327
Консупрен.....	404	Теникам.....	690	Ибупрофен Ланна-хер	328
Ледоксина	428	Траумель С	714	Ибусан	328
Метотрексат-Эбеве	470	7.1.5. Периартрит		Индовис ЕС.....	344
Наклофен.....	499	Брустан	204	Индометацин	344
Наклофен Дуо	499	Бруфен.....	205	Индометацин-Акри	345
Нифлугель	519	Вольтарен Эмуль-гель	233	Индотард.....	346
Нифлурил	519	Гумизоль	270	Кетонал.....	386
Ортофен	540	Дикломелан	295	Кнавон	399
Оспен	542	Диклориум.....	296	Наклофен.....	499
Оспен 750	542	Диклофенак ЕС.....	298	Наклофен Дуо	499
Остеогенон	543	Дона.....	311	Нифлугель	519
Перофен.....	562	Ибупрофен Ланна-хер	328	Ортофен.....	540
Пироксикам.....	572	Индометацин.....	345	Перофен.....	562
Плаквенил.....	573	Кетонал	386	Пироксикам	572
Преднизолон	585	Наклофен	499	Пронаксен	592
Пронаксен	592	Наклофен Дуо.....	499	Профенид.....	597
Профенид.....	597	Фастум	745	Профенид гель 2,5%.....	597
Профенид гель 2,5%.....	597	Цель Т.....	783	Ремоксикам	613
Ревма-гель.....	609	7.1.6. Полиартрит		Санапрокс	635
Ревмон гель.....	609	Апизартрон	144	Саникам	637
Реметан.....	613	Берликорт.....	176	Сургам	679
Ремоксикам	613	Брустан	204	Теникам	690
Реопирин	615	Гумизоль	270	Тобитил.....	705
Санапрокс	635	Диклоберл 100	294	Триамцинолон.....	718
Сандиммун	636	Диклоберл 25	294	Флугалин	758
Сандиммун-Неорал	636	Диклоберл 50	294	Хотемин	777
Санфинак.....	639	Диклоберл 75	294	Целестон	782
Сургам.....	679	Диклоберл ретард	294	Эльдерин.....	811
Тауредон	688	Диклориум.....	296	7.1.8. Суставной и внесуставной ревматизм	
Теникам	690	Индометацин.....	344	Амол.....	136
Тобитил	705	Кетонал	386	Аспизол.....	153
Траумель С	714	Нифлугель.....	519	Аспирин	154
Триамцинолон	718	Нифлурил.....	519	Ацесал	162
Флугалин.....	758	Траумель С	714	Ацетилсалицило-вая кислота.....	162
Целестон	782	Этимизол	832	Берликорт	176
Цель Т.....	783	7.1.7. Спондилоартрит анкилозирующий		Бурана	205
Циклоферон	790	Амбене	127	Вольтарен.....	232
Эльдерин	811	Бруфен.....	205	Вольтарен рапид	232
7.1.4. Остеоартрит		Вольтарен	232	Гидрокортизон	252
Амбене.....	127	Гумизоль	270	Гидрокортизон ацетат	253
Артротек	150	Диклобене.....	293	Гумизоль	270
Брустан.....	204	Диклоберл 100	294	Дексаметазон	279
Бруфен	205				

Диклобене	293	Кетонал.....	386	Нифлурил.....	519
Диклоберл 100	294	Кошачий Коготь.....	413	Ортофен	540
Диклоберл 25	294	Коэнзим компози-		Перофен	562
Диклоберл 50	294	тум	413	Пироксикам	572
Диклоберл 75	294	Наклофен.....	499	Реметан	613
Диклоберл ретард.....	294	Наклофен Дуо	499	Ремоксикам	613
Дикломелан	295	Ортофен.....	540	Румалон.....	632
Диклонат П	296	Перофен.....	562	Сургам	679
Диклофен	297	Профенид.....	597	Цель Т.....	783
Дипроспан	303	Профенид гель		Циклоферон.....	790
Дифен	305	2,5%.....	597	Эльдерин	811
Ибуклин	327	Псоринохель.....	598		
Ибуклин юниор.....	327	Ревмон гель	609	7.2.4. Остеохондроз	
Ибупрофен	327	Ронидаза	627	Брустан	204
Индометацин.....	345	Румалон	632	Бруфен.....	205
Индометацин-Акри ..	345	Саникам	637	Бурана.....	205
Калпол	364	Структум.....	673	Диклонат П.....	296
Калпол 6 плюс	364	Траумель С.....	714	Диклофенак-Ре-	
Камфорный спирт.....	368	Унгапивен	735	тард.....	298
Кенакорт	382	Хондроксид	776	Дискус композитум ..	304
Кетонал	386	Хотемин	777	Дифен	305
Клиацил	392	Цель Т	783	Дона.....	311
Кнавон	399	Циклоферон	790	Ибуклин	327
Наклофен	499	Эндур-Е 200	817	Ибуклин юниор.....	327
Наклофен Дуо	499			Индометацин.....	345
Ортофен	540	7.2.1. Артроз де-		Индометацин-Акри....	345
Оспен	542	формирующий		Капсикам	373
Оспен 750	542	Бруфен	205	Кралонин.....	414
Профенид	597	Диклоберл 100	294	Нифлурил.....	519
Профенид гель		Диклоберл 25	294	Спаскупрель.....	664
2,5%	597	Диклоберл 50	294	Унгапивен.....	735
Ревмон гель	609	Диклоберл 75	294	Хондроксид.....	776
Ремоксикам.....	613	Диклоберл ретард	294	Цель Т.....	783
Ретарпен.....	616	Индовис ЕС.....	344		
Ровамицин	625	Индотард	346	7.2.5. Спондилоа-	
Ронал	627	Нифлурил	519	ртроз	
Саникам	637	Триамцинолон.....	718	Брустан	204
Санфинак	639	Флугалин	758	Гумизоль.....	270
Синусан.....	655	Циклоферон	790	Диклоберл 100	294
Траумель С.....	714			Диклоберл 25	294
Триамцинолон	718	7.2.2. Коксартроз		Диклоберл 50	294
Целестон.....	782	Индовис ЕС.....	344	Диклоберл 75	294
Цель Т.....	783	Индометацин	344	Диклоберл ретард.....	294
Экстенциллин	809	Индотард	346	Дикломелан	295
Эльдерин	811	Нифлурил	519	Диклонат П.....	296
Эндур-Е 200.....	817	Румалон	632	Диклофен	297
		Цель Т	783	Дона.....	311
		Церебрум компози-		Ибуклин	327
		тум	784	Ибуклин юниор.....	327
7.2. Артроз				Нифлурил.....	519
Апизартрон	144	7.2.3. Остеоартроз		Ортофен	540
Брустан	204	Брустан	204	Перофен	562
Витрум Витамин Е....	230	Бурана	205	Ревмон гель.....	609
Гумизоль	270	Вольтарен Эмуль-		Реметан	613
Диклоберл 100	294	гель	233	Румалон.....	632
Диклоберл 25	294	Дикломелан.....	295	Хотемин.....	777
Диклоберл 50	294	Диклофенак ЕС	298	Цель Т.....	783
Диклоберл 75	294	Доналгин.....	312	Церебрум компози-	
Диклоберл ретард.....	294	Ибупрофен	327	тум.....	784
Диклонат П	296	Ибупрофен Ланна-			
Диклориум.....	296	хер	328	7.3. Атрофия мышц	
Диклофен	297	Ибусан	328	альфа-Токоферола	
Диклофенак-Ре-		Индометацин	345	ацетат	125
тард	298	Кетанов.....	385	Витрум Витамин Е....	230
Дискус композитум...	304	Кетонал.....	386	Эндур-Е 200.....	817
Индометацин.....	344	Кнавон	399		
Кеналог	383				

7.4. Бурсит

Бруфен	205
Вольтарен Эмуль-гель	233
Гидрокортизон ацетат	253
Дикломелан	295
Диклофенак ЕС	298
Доналгин	312
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Ибупрофен	327
Ибупрофен Ланна-хер	328
Ибусан	328
Индовис ЕС	344
Индометацин	344
Индотард	346
Кенакорт	382
Кеналог	383
Кетонал	386
Кнавон	399
Наклофен	499
Наклофен Дуо	499
Нифлугель	519
Перофен	562
Ревмон гель	609
Реметан	613
Реопирин	615
Сургам	679
Теникам	690
Тобитил	705
Траумель С	714
Фастум	745
Целестон	782

7.5. Коллагенозы

Берликорт	176
Гидрокортизон	252
Дексаметазон	279
Интраглобин	354
Кенакорт	382
Метипред	468
Метотрексат-Эбеве	470
Псоринохель	598
Триамцинолон	718
Эндобулин	816

7.5.1. Дерматомиозит

альфа-Токоферола ацетат	125
Имуран	341
Преднизолон	585
Целестон	782

7.5.2. Красная волчанка

альфа-Токоферола ацетат	125
Белодерм	172
Бетновейт	184
Гидрокортизон	252
Декарис	278
Дексазон	278
Дексаметазон	279

Делагил	279
Деперзолон	282
Дермовейт	284
Имуран	341
Кенакорт	382
Кеналог	383
Кутивейт	420
Плаквенил	573
Преднизолон	585
Псоринохель	598
Триамцинолон	718
Ультралан	732
Фторокорт	768
Целестон	782

7.5.3. Периаартериит узелковый

Дексаметазон	279
Имуран	341
Преднизолон	585

7.5.4. Склеродермия

Артамин	149
Витамин Е Слова-кофарма	227
Триамцинолон	718
Целестон	782

7.6. Миозит

Анальгин	139
Брустан	204
Дипроспан	303
Индометацин	344
Йода спиртовой раствор	359
Капсикам	373
Кенакорт	382
Миоспрей	483
Муравьиный спирт	495
Наклофен	499
Наклофен Дуо	499
Нифлугель	519
Перца стручкового настойка	563
Ревма-гель	609
Ревмон гель	609
Реопирин	615
Унгавивен	735
Хлорэтил	775

7.7. Миопатия

Витамин Е Слова-кофарма	227
Ретаболил	616
Эндур-Е 200	817

7.8. Обменно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата

Альфа Дз-Тева	125
Амбене	127
Брустан	204
Витамин Е Слова-кофарма	227
Диклоберл 100	294

Диклоберл 25	294
Диклоберл 50	294
Диклоберл 75	294
Диклоберл ретард	294
Диклонат П	296
Диклориум	296
Дискус композитум	304
Индовис ЕС	344
Индотард	346
Калько	364
Кальций-Сандоз форте	365
Кальцитрин	366
Кеналог	383
Коэнзим компози-тум	413
Миоластан	482
Нейромультивит	503
Остеопан	543
Псоринохель	598
Ревма-гель	609
Ревмон гель	609
Румалон	632
Скелид	656
Фарма-Мед Ле-ди'с формула для укрепления кост-ной ткани	743
Хондроксид	776
Хотемин	777
Цель Т	783

7.9. Опухоли

Кошачий Коготь	413
Флурокс	760
Хотемин	777
Цель Т	783

7.9.1. Остеосаркома

Винкрестин	221
Доксорубин-Эбеве	311
Метотрексат	468
Растоцин	606
Трексан	715
Цисплатин-Эбеве	798
Эпилем	823

7.9.2. Рабдомиосаркома

Винкрестин	221
Винкрестин суль-фат	222
Космеген	412
Ледоксина	428
Цитомид	801

7.9.3. Рак остеогенный

Флурокс	760
---------------	-----

7.9.4. Ретикулосаркома костей

Винбластин	221
Вумон	233
Метотрексат-Эбеве	470
Циклофосфан	791

7.9.5. Саркома мягких тканей

Алкеран.....	118
Винкристин.....	221
Доксолем.....	311
Доксорубицин-Эбеве.....	311
Метотрексат.....	468
Метотрексат-Эбеве.....	470
Растоцин.....	606
Тамоксифен Эбеве.....	685
Цисплатин-Эбеве.....	798
Цитомид.....	801
Эпилем.....	823

7.10. Остеолизис

Аредиа.....	148
Бонефос.....	195
Кальцитрин.....	366
Миакальчик.....	474
Оссин.....	543

7.11. Остеомалация

Альфа Дз-Тева.....	125
Витамин D ₃ Б.О.Н.....	227
Кальцевита.....	365
Кальций-Сандоз форте.....	365
Кальцитрин.....	366

7.12. Остеомиелит

V-Пенициллин.....	
Словакофарма.....	842
Абактал.....	105
Амикацин.....	129
Биодроксил.....	187
Бонцефин.....	195
Ванкоцин.....	210
Ванмиксан.....	210
Гарамидин.....	238
Гентамицин.....	245
Гентамицина сульфат.....	246
Дардум.....	274
Дефламон.....	286
Доксилан.....	308
Доксициклина гидрохлорид.....	310
Дурацеф.....	315
Заноцин.....	318
Зинацеф.....	320
Зиндолин 250.....	320
Кефадим.....	388
Кефзол.....	388
Клафоран.....	390
Климицин.....	395
Клиндамицин.....	396
Клион.....	397
Лендацин.....	432
Ликацин.....	435
Линкомицина гидрохлорид.....	438
Лонгацеф.....	443
Мандол.....	454
Мефоксин.....	473

Небцин.....	502
Нелорен.....	504
Нетромицин.....	506
Оксациллин натрия соль.....	531
Офрамекс.....	544
Палитрекс.....	547
Пенициллин G натриевая соль.....	555
Перти.....	562
Пефлацин.....	563
Пипрацил.....	569
Простафлин.....	593
Рифадин.....	622
Ровамицин.....	625
Роцефин.....	629
Солексин.....	
Солексин-КИД.....	
Солексин-Форте.....	658
Тамицин.....	683
Тиенам.....	696
Тобрацин-АДС.....	705
Тотацеф.....	709
Уназин.....	734
Флуклоксациллин.....	759
Фортум.....	763
Цефазолин.....	785
Цефалексин.....	786
Цефобид.....	786
Цефотаксим.....	786
Ципринол.....	795
Ципробай.....	796
Ципролет.....	796
Ципросол.....	797
Ципрофлоксацина гидрохлорид.....	797
Цитерал.....	800
Цифлоксинал.....	803
Цифран.....	803
Эдицин.....	806
Эрмицед.....	826

7.13. Остеопатия

Альфа Дз-Тева.....	125
Артамин.....	149
Рокальтрол.....	625
Цель Т.....	783

7.14. Остеопороз

Альфа Дз-Тева.....	125
Витамин D ₃ Б.О.Н.....	227
Гинодиан-Депо.....	256
Калько.....	364
Кальций-Сандоз форте.....	365
Кальцитрин.....	366
Климонорм.....	395
Миакальчик.....	474
ОртоОстео.....	540
Оссин.....	543
Остеогенон.....	543
Остеохин.....	543
Ретаболил.....	616
Тобитил.....	705
Тонокальцин.....	707

Тридин.....	719
Фарма-Мед Ле-ди'с формула для укрепления костной ткани.....	743
Хормоплекс.....	777
Эндур-Е 200.....	817

7.14.1. Остеопороз постменопаузный

Дерместрил.....	283
Дивитрен.....	291
Калько.....	364
Кальцитрин.....	366
Климен.....	394
Клиогест.....	396
Менорест.....	463
Миакальчик.....	474
Остеогенон.....	543
Остеохин.....	543
Премарин.....	586
Рокальтрол.....	625
Тонокальцин.....	707
Трисеквенс.....	724
Фосамакс.....	764
Эстрогель.....	830

7.14.2. Остеопороз стероидный

Кальцитрин.....	366
Миакальчик.....	474
Оссин.....	543
Остеогенон.....	543
Остеохин.....	543
Тонокальцин.....	707

7.15. Остит деформирующий

Аредиа.....	148
Калько.....	364
Коэнзим компози-тум.....	413
Цель Т.....	783
Церебрум компози-тум.....	784

7.16. Перелом

Аскорбиновая кислота.....	151
Брустан.....	204
Кальцитрин.....	366
Кетанов.....	385
Метилурацил.....	467
Нифлугель.....	519
Повидон-йод.....	576
Траумель С.....	714
Фарма-Мед Ле-ди'с формула для укрепления костной ткани.....	743

7.16.1. Перелом костей несрастающийся

Аскорбиновая кислота.....	151
Кальцитрин.....	366
Лековит С-Са.....	430

Метилурацил.....	467
Остеогенон.....	543
Стекловидное тело	668

7.17. Растяжение

Апизартрон.....	144
Брустан.....	204
Вольтарен Эмуль-гель.....	233
Гепальпан.....	247
Кетанов.....	385
Ким бальзам жидкий.....	388
Миоспрей.....	483
Наклофен.....	499
Наклофен Дуо.....	499
Нифлугель.....	519
Нифлурил.....	519
Перофен.....	562
Профенид.....	597
Профенид гель 2,5%.....	597
Ревма-гель.....	609
Ревмон гель.....	609
Реметан.....	613
Репарил-гель Н.....	616
Траумель С.....	714
Фастум.....	745
Хондроксид.....	776

7.18. Рахит

Альфа Дз-Тева.....	125
Видайлин-М.....	219
Витамин D ₃ Б.О.Н.....	227
Витрум Кальциум.....	230
Кальций-Сандоз форте.....	365
Кальция глицеро-фосфат.....	367
Морнамин форте.....	490

7.18.1. Рахит витамин D-зависимый

Альфа Дз-Тева.....	125
Витамин D ₃ Б.О.Н.....	227
Рокальтрол.....	625

7.18.2. Рахит витамин D-резистентный

Альфа Дз-Тева.....	125
Рокальтрол.....	625

7.18.3. Рахитоподобные заболевания у детей старше 8 лет

Витамин D ₃ Б.О.Н.....	227
-----------------------------------	-----

7.19. Синовит

Дипроспан.....	303
Индовис ЕС.....	344
Индометацин.....	344
Индотард.....	346
Кнавон.....	399
Наклофен.....	499

Наклофен Дуо.....	499
Нифлугель.....	519
Реметан.....	613
Сургам.....	679
Траумель С.....	714
Фортум.....	763
Целестон.....	782

7.20. Спазмофилия

Витамин D ₃ Б.О.Н.....	227
Магне Б6.....	448
Тахистин.....	688

7.21. Тендинит

Вольтарен Эмуль-гель.....	233
Диклофенак ЕС.....	298
Доналгин.....	312
Ибупрофен Ланна-хер.....	328
Ибусан.....	328
Индовис ЕС.....	344
Индометацин.....	344
Индотард.....	346
Кетонал.....	386
Кнавон.....	399
Наклофен.....	499
Наклофен Дуо.....	499
Нифлугель.....	519
Нифлурил.....	519
Перофен.....	562
Профенид.....	597
Профенид гель 2,5%.....	597
Реметан.....	613
Реопирин.....	615
Сургам.....	679
Теникам.....	690
Тобитил.....	705
Фастум.....	745
Цель Т.....	783

7.22. Тендовагинит

Витамин Е Слова-кофарма.....	227
Вольтарен Эмуль-гель.....	233
Гепатромбин.....	250
Дикломелан.....	295
Ибуклин.....	327
Ибуклин юниор.....	327
Индометацин.....	344
Кетонал.....	386
Наклофен.....	499
Наклофен Дуо.....	499
Нифлугель.....	519
Нифлурил.....	519
Перофен.....	562
Пироксикам.....	572
Реметан.....	613
Сургам.....	679
Теникам.....	690
Тобитил.....	705
Траумель С.....	714

7.23. Тендосиновит

Бруфен.....	205
Витамин Е Слова-кофарма.....	227
Диклофенак ЕС.....	298
Дипроспан.....	303
Индовис ЕС.....	344
Индометацин.....	345
Кетонал.....	386
Кнавон.....	399
Нифлугель.....	519
Нифлурил.....	519
Ревмон гель.....	609
Реметан.....	613
Репарил-гель Н.....	616
Тобитил.....	705
Траумель С.....	714
Фастум.....	745
Целестон.....	782

7.24. Травмы опорно-двигательного аппарата

Артрекс.....	150
Брустан.....	204
Бурана.....	205
Венитан.....	212
Вольтарен.....	232
Вольтарен рапид.....	232
Вольтарен Эмуль-гель.....	233
Гепальпан.....	247
Гепатромбин.....	250
Диклобене.....	293
Диклоберл 100.....	294
Диклоберл 25.....	294
Диклоберл 50.....	294
Диклоберл 75.....	294
Диклоберл ретард.....	294
Дикломелан.....	295
Диклонат П.....	296
Диклофенак.....	297
Диклофенак-Ретард.....	298
Дифен.....	305
Доналгин.....	312
Ибуклин.....	327
Ибуклин юниор.....	327
Ибупрофен.....	327
Ибупрофен Ланна-хер.....	328
Ибусан.....	328
Индометацин.....	345
Индометацин-Акри.....	345
Капсикам.....	373
Кетанов.....	385
Кетонал.....	386
Кеторол.....	387
Ким бальзам жидкий.....	388
Кнавон.....	399
Лиотон 1000.....	438
Лупоцет.....	447
Миоспрей.....	483
Морфина гидрох-	

лорид	490
Наклофен	499
Наклофен Дуо	499
Нифлугель	519
Нифлурил	519
Омнопон	534
Парацетамол	553
Перофен	562
Пироксикам	572
Промедол	591
Протрадон	596
Профенид	597
Профенид гель 2,5%	597
Раствор Хартмана	605
Ревмон гель	609
Реметан	613
Ремоксикам	613
Репарил-гель Н	616
Санапрокс	635
Санфинак	639
Стеригал	668
Теникам	690
Торадол	708
Траумель С	714
Тромбофоб	727
Фастум	745
Фебрицет	745
Хондроксид	776
Цель Т	783
Эльдерин	811
Эссавен	829
Эфедрина гидрох- лорид	835
7.25. Энтезопатия	
Доналгин	312
Сирдалуд	656

8. Заболевания ОРГАНОВ ЖКТ И ГЕПАТОБИ- ЛИАРНОЙ ЗОНЫ

8.1. Аллергические заболевания ЖКТ

Налкром	500
Нутрамиген	529
Полисорб МП	580
Прегестимил	584
Тинсет	701
Трексил	715

8.2. Анорексия

Алталекс	122
Амитриптилин	
Словакофарма	134
Апилак	145
Видалин-М	219
Витабекс	226
Капли Береш Плюс ..	370
Мульти-Саностол	493

Мульти-табс LJ	494
Перитол	560

8.3. Асцит

Лазилактон	421
Модуретик	485
Урактон	737
Фурсемид	772

8.4. Атония ЖКТ

Викасол	220
Координакс	406

8.4.1. Атония же- лудка

Координакс	406
Перистил	560
Прозерин	589

8.4.2. Атония кишеч- ника

Кальция пантоте- нат	368
Координакс	406
Нукс вомика-Го- маккорд	529
Пантенол	549
Перистил	560
Прозерин	589
Регулакс	610

8.5. Гастрит

Алсукрал	122
Альфогель	127
Галидор	235
Гастал	239
Гастрikumель	240
Гелусил лак	244
Гелусил-суспензия	244
Де-Нол	276
Метамол	466
Метилурацил	467
Мукоза компози- тум	492
ПееХоо	555
Ромазулан	627
Смекта	658
Спазмомен 40	664
Тальцид	683
Трифермент	725
Фенилсалицилат, висмута нитрат ос- новной, экстракт красавки	748
Фосфалюгель	764

8.5.1. Гастрит ана- цидный

Панкреатин	549
Панцитрат	550
Пепсин	559
Хилак форте	774

8.5.2. Гастрит атро- фический

Панкреатин	549
Пепсин	559

8.5.3. Гастрит гипе- рацидный

Анацид	140
Ацидекс	163
Бекарбон	169
Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
Гастал	239
Гастерин	239
Гастрозем	240
Гестид	251
Гистак	257
Дуоденохель	315
Маалокс	448
Ранитидин	603
Сбор желудочно- кишечный	640
Фамопсин	740
Фосфалюгель	764

8.5.4. Гастрит ост- рый

Анацид	140
Гастал	239
Гастерин	239
Гестид	251
Маалокс	448
Сукрат	674
Тыквеол	728

8.5.5. Гастрит хро- нический

Бисмофальк	191
Гастал	239
Гастерин	239
Гестид	251
Кошачий Коготь	413
Маалокс	448
Метацин	467
Реницин	614
Сукрат	674
Тыквеол	728
Хеликоцин	772

8.5.6. Гастрит эро- зивный

Анестезин	143
Ацидекс	163
Беломет	173
Гастерин	239
Гастрозем	240
Гистодил	258
Нейтронорм	504
Ранитидин	603
Стиламин	669

8.5.7. Рефлюкс-га- стрит

Ацидекс	163
Галстена	237
Гастерин	239
Гистодил	258
Метамол	466
Ранитидин	603
Урсофальк	739
Фамосан	741

8.6. Гастроэнтерит

Гепатофальк план-	
та	250
Фталазол	767
Хилак форте	774

8.7. Геморрой

Агиолакс	107
Ауробин	160
Венза	212
Венорутон	212
Венорутон форте	212
Гинкор прокто	255
Гинкор форт	255
Детралекс	285
Лаксатин	422
Лаксигал	423
Мукофальк	493
Новокаин	523
Парембал	553
Постеризан	582
Постеризан форте	582
Прамоксин	584
Прокто-Гливенол	590
Проктоседил	590
Ромазулан	627
Сенна	645
Стресс формула с железом	672
Суппозитории ректальные с эвкалиптоном	678
Траумель С	714
Тыквеол	728
Ультрапрокт	732
Цикло 3 форт	788
Эскузан	827
Эскулюс композитум	827

8.8. Гепатит

альфа-Токоферола ацетат	125
Викасол	220
Галстена	237
Гепар композитум	248
Гепастерил А	250
Дексазон	278
Инозие-Ф	346
Калия глутаминат	363
Калия оротат	363
Левулоза	427
Липоевая кислота	440
Метилурацил	467
Никотиновая кислота	509
Орницетил	537
Пиридоксина гидрохлорид	571
Порталак	582
Преднизолон	585
Псоринохель	598
Ретинола ацетат (Витамин А)	617
Рибоксин	619
Рибофлавин	619

Сбор желчегонный N 3	640
Силегон	650
Силимар	651
Сирепар	656
Урсофальк	739
Хепель	774
Целаскон Эффервесценс	781
Цианокобаламин	787
Энгистол	815
Эссенциале	829

8.8.1. Гепатит аутоиммунный

Бетаин цитрат УПСА	183
Циклоферон	790

8.8.2. Гепатит вирусный

Альфаферон	126
Бетаин цитрат УПСА	183
Вэллферон	234
Декарис	278
Иммуноглобулин человека нормальный	337
Интрон-А	355
Карбактин	374
Легалон	427
Легалон-35	427
Липамид	439
Реальдирон	606
Ребиф	607
Рибофлавин	619
Роферон А	628
Циклоферон	790

8.8.3. Гепатит паренхиматозный

Бетаин цитрат УПСА	183
Инозие-Ф	346
Кальция глюконат	367
Легалон	427
Легалон-35	427

8.8.4. Гепатит токсический

Бетаин цитрат УПСА	183
Галстена	237
Инозие-Ф	346
Калия оротат	363
Кальция глюконат	367
Легалон	427
Легалон-35	427
Метионин	468
Рикавит	620
Силегон	650
Силибин	651
Сирепар	656
Тыквеол	728
Эссенциале	829

8.8.5. Гепатит хронический

Ангирол	141
Артамин	149
Бетаин цитрат УПСА	183
Витамин Е Словакофарма	227
Витрум Витамин Е	230
Гепатофальк планта	250
Декарис	278
Имуран	341
Инозие-Ф	346
Калия глутаминат	363
Калия оротат	363
Карбактин	374
Легалон	427
Легалон-35	427
Липамид	439
Намацит	501
Реальдирон	606
Ребиф	607
Рикавит	620
Сбор желчегонный N 3	640
Силибин	651
Сирепар	656
Трифермент	725
Тыквеол	728
Урсофальк	739
Фебихол	745
Холензим	776
Эндур-Е 200	817
Эспа-липон	828

8.8.6. Гепатохолецистит

Бетаин цитрат УПСА	183
Тыквеол	728
Фебихол	745

8.9. Гепатоз жировой

альфа-Токоферола ацетат	125
Витрум Атеролитин	229
Галстена	237
Гепар композитум	248
Гепатофальк планта	250
Липоевая кислота	440
Метионин	468
Сирепар	656
Урсофальк	739
Эссенциале	829

8.10. Гиперакцидность желудочного сока

Бекарбон	169
Беломет	173
Бетаин цитрат УПСА	183
Бимарал	187

Гестид	251
Гистак	257
Зантак	318
Зоран	326
Квамател	381
Маалокс	448
Нейтронорм	504
Ортанол	537
ПееХоо	555
Примамет	587
Ранитал	602
Ранитидин	603
Ренни	615
Тисацид	704
Улкодин	730
Ульфамид	733
Фамопсин	740
Фамосан	741

8.11. Гипербилирубинемия

Гепар композитум	248
------------------------	-----

8.12. Гипертензия портальная

Гипотиазид	256
Индерал	343
Порталак	582

8.12.1. Варикозное расширение вен пищевода

Сандостатин	636
Тромбовар	726

8.13. Диагностика заболеваний ЖКТ

Глюкагон	263
Дисфлатил	304
Лимонтар	437

8.13.1. Рентгеноконтрастное исследование желчевыводящих путей

Билигност	186
-----------------	-----

8.13.2. Рентгеноконтрастное исследование ЖКТ

Агнолак	107
Бимарал	187
Бисакодил	190
Лаксатин	422
Лаксигал	423
Ультравист-240, 300, 370	731
Фортранс	762
Эспумизан	828

8.13.3. Холангиопанкреатография

Ультравист-240, 300, 370	731
--------------------------------	-----

8.14. Диарея

Альфогель	127
Бевиплекс	169
Бифидумбактерин сухой	191
Бифиформ	192
Викасол	220
Гастерин	239
Диарол	290
Имодиум	340
Калия-магния-аспарагинат	363
Линекс	438
Лоперамид	444
Мукофальк	493
Нормикс	528
Нутрамиген	529
Поливит гериатрик	578

Раствор Натрия хлорида 0,9%	604
-----------------------------------	-----

Раствор Натрия хлорида с глюкозой 5%	604
--	-----

Раствор Рингера	605
-----------------------	-----

Раствор Хартмана	605
------------------------	-----

Регидрон	610
----------------	-----

Сандостатин	636
-------------------	-----

Смекта	658
--------------	-----

Таинакомп	686
-----------------	-----

Уголь активированный ФАС-Э	729
----------------------------------	-----

Ферро-градумет	751
----------------------	-----

Флонивин БС	757
-------------------	-----

Хеферол	774
---------------	-----

Хилак форте	774
-------------------	-----

Энтерол	818
---------------	-----

Энфамил соя	822
-------------------	-----

Эрсефурил	826
-----------------	-----

8.14.1. Диарея аллергическая

Бактисубтил	166
-------------------	-----

Линекс	438
--------------	-----

Лоперамид	444
-----------------	-----

Прегестимил	584
-------------------	-----

8.14.2. Диарея лучевая

Бактисубтил	166
-------------------	-----

Прегестимил	584
-------------------	-----

8.14.3. Диарея медикаментозная

Бактисубтил	166
-------------------	-----

Лоперамид	444
-----------------	-----

Нормикс	528
---------------	-----

Прегестимил	584
-------------------	-----

Энтерол	818
---------------	-----

8.15. Дивертикулит кишечника

Альфогель	127
-----------------	-----

Мукофальк	493
-----------------	-----

Фортум	763
--------------	-----

8.16. Дискинезия ЖКТ

Бимарал	187
---------------	-----

Реглан	610
--------------	-----

Спазмомен 40	664
--------------------	-----

8.17. Дискинезия желчных путей

Алталекс	122
----------------	-----

Ангирол	141
---------------	-----

Бетаин цитрат УПСА	183
--------------------------	-----

Бимарал	187
---------------	-----

Галстена	237
----------------	-----

Гепабене	247
----------------	-----

Гепатофальк планта	250
--------------------------	-----

Новиган	521
---------------	-----

Сбор желудочно-кишечный	640
-------------------------------	-----

Сбор желчегонный N 3	640
----------------------------	-----

Тыквеол	728
---------------	-----

Урсофальк	739
-----------------	-----

Холагогум	775
-----------------	-----

Холафлукс	776
-----------------	-----

8.18. Диспепсия

Альфогель	127
-----------------	-----

Анацид	140
--------------	-----

Бекарбон	169
----------------	-----

Бимарал	187
---------------	-----

Вибуркол	219
----------------	-----

Галстена	237
----------------	-----

Гастерин	239
----------------	-----

Гастрikumель	240
--------------------	-----

Гелусил лак	244
-------------------	-----

Гелусил-суспензия	244
-------------------------	-----

Гепар композитум	248
------------------------	-----

Гепатофальк планта	250
--------------------------	-----

Гистак	257
--------------	-----

Дисфлатил	304
-----------------	-----

Зантак	318
--------------	-----

Координакс	406
------------------	-----

Мезим форте	460
-------------------	-----

Мезим форте 10000	461
-------------------------	-----

Метамол	466
---------------	-----

Мотилиум	490
----------------	-----

Ново-Пассит	522
-------------------	-----

Панкреатин	549
------------------	-----

Пепсин	559
--------------	-----

Перистил	560
----------------	-----

Портаген	580
----------------	-----

Реглан	610
--------------	-----

Симикол	652
---------------	-----

Тальцид	683
---------------	-----

Уголь активированный	729
----------------------------	-----

Уголь активированный ФАС-Э	729
----------------------------------	-----

Фосфалюгель	764
-------------------	-----

Хепель	774
--------------	-----

Хилак форте	774
-------------------	-----

Холагол	776
---------------	-----

Холензим	776	Лаксигал.....	423	Фамопсин.....	740
Цитрат бетаина		Норгалакс	527	Фамосан.....	741
Бофур.....	802	Нукс вомика-Го-маккорд	529	Фамотидин	741
Эспумизан	828	Порталакс	582	Циметидин Ланна-хер	792
8.18.1. Диспепсия бродильная		Регулакс	610	8.25. Изжога	
Анацид.....	140	Сенна	645	Анацид.....	140
Фебихол	745	Тисасен.....	703	Винилин (Бальзам Шостаковского)	221
8.18.2. Диспепсия гнилостная		Форлакс	761	Гастал	239
Анацид.....	140	Хилак форте	774	Гастерин	239
Лактулоза сироп	423	8.23.1. Запоры атонические		Гестид	251
Фебихол	745	Агиолакс.....	107	Дуоденохель.....	315
8.19. Дистрофия гепатоцеребральная		Координакс.....	406	Маалокс	448
Артамин	149	Лаксатин.....	422	Метамол	466
Унитиол	735	Морская капуста	490	Примамет	587
8.20. Дисфагия		Перистил	560	Ранитал.....	602
Гастрikumель.....	240	Сенна	645	Ренни.....	615
Креданил	414	8.23.2. Запоры спастические		Сукрат	674
Синемет	653	Агиолакс.....	107	Тыквеол	728
Синемет СР.....	653	Гепар композитум	248	8.26. Икота	
8.21. Дуоденит		Спаскупрель	664	Галоперидол	236
Анацид.....	140	8.23.3. Запоры у беременных		8.27. Инфекционно-воспалительные заболевания ЖКТ	
Беломет.....	173	Бекунис легкий	172	Амоксиклав	135
Гастал	239	Мукофальк	493	Ампицилин	136
Гелусил лак	244	Сенна	645	Ампициллин	137
Гелусил-суспензия.....	244	8.23.4. Запоры хронические		Ампициллин	
Гистодил	258	Агиолакс.....	107	АМП-КИД	
Де-Нол	276	Бекунис драже	171	АМП-Форте.....	137
Метамол.....	466	Бекунис легкий	172	Ампициллина натриевая соль кристаллическая	137
Ромазулан	627	Бисакодил.....	190	Ампициллина тригидрат	138
Спазмомен 40	664	Гентамицина сульфат.....	246	Бактрим	167
Сукрат	674	Координакс.....	406	Гарамидин	238
Фамосан.....	741	Лаксатин.....	422	Гентамицин.....	245
8.22. Желчнокаменная болезнь		Мукофальк	493	Гентамицина сульфат	246
Галидор.....	235	8.24. Золлингера-Эллисона синдром		Глауфос	259
Галстена.....	237	Ацидекс	163	Доксилан.....	308
Гепар композитум	248	Беломет	173	Доксициклин	309
Дротаверина гидрохлорид.....	314	Гистак	257	Доксициклина гидрохлорид.....	310
Метамол.....	466	Гистодил.....	258	Зиндолин 250	320
Убихинон композитум	729	Зантак	318	Лидаприм	433
Хенохол	773	Зоран	326	Максаквин.....	452
Хепель	774	Квамател	381	Мезим форте 10000	461
Холагогум	775	Лосек	445	Нетромицин.....	506
Холагол	776	Нейтронорм	504	Норилет	527
8.22.1. Растворение холестерина желчных камней		Омез	533	Нормикс.....	528
Урсофальк	739	Омезол	533	Оспамокс.....	542
Хенофалк	773	Ортанол.....	537	Перти.....	562
Хенохол	773	Примамет.....	587	Пепфлация.....	563
8.23. Запоры		Раниберл	602	Роцефин.....	629
Бекунис драже	171	Ранитал	602	Суметролим	677
Бекунис легкий.....	172	Ранитидин	603	Таривид	687
Бисакодил.....	190	Сандостатин	636	Тримосул.....	722
Депурафлукс	283	Симесан.....	651	Флемоксин Солютаб.....	755
Лаксатин	422	Улкодин	730	Фортум	763
		Улкосан.....	730		
		Ульфамид	733		

Ципробай.....	796	Максипим.....	453	Ципролет.....	796
Ципролет.....	796	Меронем.....	465	Цитерал.....	800
Ципрофлоксацина		Пенициллин G на-		Цифран.....	803
гидрохлорид.....	797	триевая соль.....	555		
Цифлоксинал.....	803	Пипрацил.....	569	8.27.5. Инфекции	
Цифран.....	803	Рифамор.....	623	печени	
Энфамил соя.....	822	Рифогал.....	624	Абактал.....	105
Эрмицед.....	826	Роцефин.....	629	Амоксиклав.....	135
Эхинацея компози-		Сбор желчегонный		Антрима.....	144
тум С.....	837	N 3.....	640	Зиндолин 250.....	320
Юнидокс Солютаб....	838	Стандациллин.....	667	Меронем.....	465
8.27.1. Абсцесс		Сульфадиметоксин....	675	Пефлацин.....	563
внутрибрюшинный		Сульфален.....	676	Тамицин.....	683
Абактал.....	105	Суметролим.....	677		
Азактам.....	110	Тамицин.....	683	8.27.6. Инфекции	
Амоксиклав.....	135	Таривид.....	687	пищевода	
Гентамицина суль-		Тотацеф.....	709	Амоксиклав.....	135
фат.....	246	Фортум.....	763	Антрима.....	144
Клафоран.....	390	Цефазолин.....	785		
Климицин.....	395	Ципробай.....	796	8.27.7. Инфекции	
Клиндамицин.....	396	Цитерал.....	800	полости рта	
Меронем.....	465	Цифлоксинал.....	803	Амоксиклав.....	135
Нетромицин.....	506			Антрима.....	144
Тамицин.....	683	8.27.4. Инфекции		Бетадине.....	182
Фортум.....	763	абдоминальные		Вокара.....	231
Цефотаксим.....	786	Абактал.....	105	Гексадрепс.....	241
Ципринол.....	795	Азактам.....	110	Гексализ.....	241
8.27.2. Диарея бак-		Амоксиклав.....	135	Календулы настой-	
териальная		Антрима.....	144	ка.....	361
Амоксиклав.....	135	Берлоцид.....	180	Клиацил.....	392
Бактисубтил.....	166	Берлоцид 480.....	180	Клиндамицин.....	396
Карбактин.....	374	Берлоцид 960.....	180	Лендацин.....	432
Нолицин.....	525	Бонцефин.....	195	Мундизал гель.....	495
Норилет.....	527	Гарамицин.....	238	Ноготков цветки.....	524
Нормикс.....	528	Глауфос.....	259	Пленка с линкоми-	
Полисорб МП.....	580	Дардум.....	274	цином.....	574
Прегестимил.....	584	Дефламон.....	286	Реницин.....	614
Стандациллин.....	667	Заноцин.....	318	Фелексин.....	746
Сулотрим.....	674	Зиндолин 250.....	320	Эрмицед.....	826
Таривид.....	687	Кефадим.....	388		
Ципросол.....	797	Клафоран.....	390	8.27.8. Кандидозы	
Энтерол.....	818	Климицин.....	395	ЖКТ	
8.27.3. Инфекции		Клион.....	397	Пимафуцин.....	566
желчевыводящих		Лендацин.....	432	Энтерол.....	818
путей		Ликацин.....	435		
Абактал.....	105	Лонгацеф.....	443	8.27.9. Перитонит	
Амоксиклав.....	135	Максипим.....	453	Амикацин.....	129
Ампицилин.....	136	Медазол.....	459	Амоксиклав.....	135
Ампициллин.....	137	Меронем.....	465	Ампициллин.....	137
Ампициллина три-		Мефоксин.....	473	Ампициллина на-	
гидрат.....	138	Небцин.....	502	триевая соль крис-	
Антрима.....	144	Нетромицин.....	506	таллическая.....	137
Глауфос.....	259	Нормикс.....	528	Бонцефин.....	195
Грюнамокс.....	269	Офрамакс.....	544	Гарамицин.....	238
Дардум.....	274	Перти.....	562	Гентамицин.....	246
Доксилан.....	308	Пипрацил.....	569	Гентамицина суль-	
Доксициклин.....	310	Тазоцин.....	680	фат.....	246
Доксициклина гид-		Тамицин.....	683	Дефламон.....	286
рохлорид.....	310	Таривид.....	687	Диоксидин.....	301
Зиндолин 250.....	320	Тиенам.....	696	Зинацеф.....	320
Кефзол.....	388	Уназин.....	734	Кефадим.....	388
Климицин.....	395	Фортум.....	763	Клафоран.....	390
Лидаприм.....	433	Цефобид.....	786	Климицин.....	395
		Цефотаксим.....	786	Клиндамицин.....	396
		Ципробай.....	796	Клион.....	397
				Лендацин.....	432
				Максипим.....	453

Мандол.....	454	Дикломелан.....	295	Спазмомен 40.....	664
Медазол.....	459	Диклонат П.....	296	Тыквеол.....	728
Меронем.....	465	Дротаверина гид-		Фенилсалицилат,	
Мефоксин.....	473	рохлорид.....	314	висмута нитрат ос-	
Небцин.....	502	Кетанов.....	385	новной, экстракт	
Нетромицин.....	506	Метацин.....	467	красавки.....	748
Пипрацил.....	569	Наклофен.....	499	Флонивин БС.....	757
Раствор Хартмана.....	605	Наклофен Дуо.....	499	Фталазол.....	767
Роцефин.....	629	Но-шпа.....	520	Хепель.....	774
Тамицин.....	683	Новиган.....	521	Хилак форте.....	774
Таривид.....	687	Павестезин.....	546	Энтерол.....	818
Тобрацин-АДС.....	705	Папаверина гид-		8.29.1. Колит псев-	
Тотацеф.....	709	рохлорид.....	551	домембранозный	
Фортум.....	763	Папазол.....	551	Ванкоцин.....	210
Цефобид.....	786	Пентамин.....	558	Эдицин.....	806
Ципринол.....	795	Сбор желудочно-		8.29.2. Колит спас-	
Ципробай.....	796	кишечный.....	640	тический	
Цифлоксинал.....	803	Спазмoverалгин		Бекарбон.....	169
8.27.10. Токсикоин-		Нео.....	663	Бимарал.....	187
фекция пищевая		Спаскупрель.....	664	Павестезин.....	546
Гастерин.....	239	Тропацин.....	727	Папаверина гид-	
Нолицин.....	525	8.28.2. Колика ки-		рохлорид.....	551
Плазма-Лит 148		шечная		Ромазулан.....	627
Водный Раствор.....	572	Бекарбон.....	169	Спаскупрель.....	664
Полисорб МП.....	580	Валерианы настой-		8.29.3. Колит хрони-	
Прегестимил.....	584	ка.....	208	ческий	
Уголь активирован-		Валосердин.....	209	5-АСА.....	839
ный ФАС-Э.....	729	Дибазол.....	290	Линекс.....	438
Фуразолидон.....	769	Дикломелан.....	295	Сбор желудочно-	
8.27.11. Эмпиема		Дротаверина гид-		кишечный.....	640
желчного пузыря		рохлорид.....	314	8.29.4. Колит язвен-	
Абактал.....	105	Корвалдин.....	408	ный	
Амоксиклав.....	135	Корвалол.....	408	5-АСА.....	839
Антрима.....	144	Метацин.....	467	Гидрокортизон.....	252
Тамицин.....	683	Но-шпа.....	520	Дексазон.....	278
Таривид.....	687	Новиган.....	521	Дипроспан.....	303
Фортум.....	763	Нукс вомика-Го-		Мезакол.....	460
8.28. Колика		маккорд.....	529	Метипред.....	468
Анальгин.....	139	Папаверина гид-		Налкром.....	500
Аспизол.....	153	рохлорид.....	551	Салофальк.....	634
Вибуркол.....	219	Папазол.....	551	Триамцинолон.....	718
Гастрikumель.....	240	Пентамин.....	558	Целестон.....	782
Дибазол.....	290	Сбор желудочно-		8.30. Кома печеноч-	
Диклориум.....	296	кишечный.....	640	ная	
Дротаверина гид-		Спазмoverалгин		Гепастерил А.....	250
рохлорид.....	314	Нео.....	663	Орницетил.....	537
Кетанов.....	385	Спазмомен 40.....	664	Порталак.....	582
Нобритем.....	520	Спаскупрель.....	664	Преднизолон.....	585
Новиган.....	521	Тропацин.....	727	Эссенциале.....	829
Орницетил.....	537	8.29. Колит		8.31. Крона болезнь	
Павестезин.....	546	Бесалол.....	181	5-АСА.....	839
Протрадон.....	596	Бифидумбактерин		Декарис.....	278
Ренель.....	613	сухой.....	191	Мезакол.....	460
Спазмомен 40.....	664	Винилин (Бальзам		Мукофальк.....	493
Спаскупрель.....	664	Шостаковского).....	221	Салофальк.....	634
Хепель.....	774	Галидор.....	235	Триамцинолон.....	718
8.28.1. Колика		Галиум-Хель.....	235	8.32. Мальабсорб-	
желчная		Метилурацил.....	467	ция	
Бекарбон.....	169	Мукоза компози-		Кенакорт.....	382
Вольтарен.....	232	тум.....	492	Нутрамиген.....	529
Вольтарен рапид.....	232	Никотиновая кис-		Портаген.....	580
Гепар композитум.....	248	лота.....	509		
Дибазол.....	290	Нукс вомика-Го-			
		маккорд.....	529		

Прегестимил	584
Ферро-градумет.....	751
Энфамил соя.....	822

8.33. Метеоризм

Алталекс.....	122
Бимарал.....	187
Галидор.....	235
Гастрikumель.....	240
Гестид.....	251
Дисфлатил.....	304
Линекс.....	438
Мезим форте.....	460
Мезим форте 10000...	461
Метамол.....	466
Нукс вомика-Го-маккорд.....	529
Панкреатин.....	549
Панцитрат.....	550
Плантекс.....	573
Ренни.....	615
Сбор желудочно-кишечный.....	640
Симикол.....	652
Уголь активированный.....	729
Уголь активированный ФАС-Э.....	729
Флонивин БС.....	757
Хилак форте.....	774
Эспумизан.....	828

8.34. НПВС-гастропатия

Альфогель.....	127
Анацид.....	140
Гастал.....	239
Зантак.....	318
Сайтотек.....	633
Сукрат.....	674
Фосфалюгель.....	764

8.35. Недостаточность внешнесекреторной функции органов ЖКТ

Галстена.....	237
Плантекс.....	573
Портаген.....	580
Прегестимил.....	584
Холензим.....	776

8.35.1. Ахилия

Панкреатин.....	549
Пепсин.....	559

8.35.2. Гипофункция поджелудочной железы внешнесекреторная

Дигестал.....	291
Дигестал форте.....	291
Креон.....	414
Ликреаза.....	436
Мезим форте.....	460
Мезим форте 10000...	461
Панкреатин.....	549

Панцитрат.....	550
Портаген.....	580
Прегестимил.....	584
Трифермент.....	725
Холензим.....	776

8.36. Опухоли органов ЖКТ

8.36.1. Рак желудка

5-Фторурацил-Эбеве.....	840
Гидреа.....	252
Доксолев.....	311
Метотрексат.....	468
Мутамицин.....	496
Нидран.....	507
Растоцин.....	606
СиНУ.....	650
Флуорокс.....	760
Фторафур.....	767
Эпилем.....	823
Этопозид-Эбеве.....	833

8.36.2. Рак кишечника

Флуорокс.....	760
Эпилем.....	823

8.36.3. Рак колоректальный

5-Фторурацил-Эбеве.....	840
Нидран.....	507
Рибасан форте.....	618
Флуорокс.....	760
Фторафур.....	767

8.36.4. Рак печени

5-Фторурацил-Эбеве.....	840
Нидран.....	507
Флуорокс.....	760

8.36.5. Рак пищевода

5-Фторурацил-Эбеве.....	840
Блеоцин.....	193
Метотрексат.....	468
Флуорокс.....	760
Цисплатил.....	798

8.36.6. Рак поджелудочной железы

5-Фторурацил-Эбеве.....	840
Гемзар.....	244
Мутамицин.....	496
Флуорокс.....	760

8.36.7. Рак толстого кишечника

Декарис.....	278
Левамизол-Эбеве.....	426
Нидран.....	507
СиНУ.....	650
Флуорокс.....	760
Фторафур.....	767

8.37. Отрыжка

Бимарал.....	187
Дисфлатил.....	304
Координакс.....	406
Метамол.....	466
Перистил.....	560
Эспумизан.....	828

8.38. Панкреатит

Метилурацил.....	467
Мукоза компози-тум.....	492
Панцитрат.....	550

8.38.1. Панкреатит геморрагический

Гордокс.....	266
Портаген.....	580
Прегестимил.....	584

8.38.2. Панкреатит острый

Аксид.....	113
Анацид.....	140
Гордокс.....	266
Мнакальцик.....	474
Портаген.....	580
Прегестимил.....	584

8.38.3. Панкреатит рецидивирующий

Анацид.....	140
Гордокс.....	266

8.38.4. Панкреатит хронический

Аксид.....	113
Анацид.....	140
Галстена.....	237
Гордокс.....	266
Дигестал.....	291
Дигестал форте.....	291
Креон.....	414
Ликреаза.....	436
Мезим форте.....	460
Мезим форте 10000...	461
Панкреатин.....	549
Панцитрат.....	550
Трифермент.....	725
Фебихол.....	745
Холензим.....	776

8.38.5. Панкреофиброз (муковисцидоз)

Креон.....	414
Ликреаза.....	436
Мезим форте.....	460
Мезим форте 10000...	461
Панкреатин.....	549
Портаген.....	580
Прегестимил.....	584
Трифермент.....	725
Фортум.....	763

8.39. Печеночная недостаточность

Бетаин цитрат УПСА.....	183
-------------------------	-----



Гепар композитум 248	Раствор Рингера 605	Урсофальк 739
Квадевит 380	Раствор Хартмана 605	Фортум 763
Порталак 582	Реглан 610	Хепель 774
Хепель 774	Циннарон 793	Холагол 776
8.40. Пилороспазм	8.43.1. Рвота беременных	Холафлукс 776
Гастрikuмель 240	Аминазин 130	Цефобид 786
Дибазол 290	Димедрол 301	Ципринол 795
Дротаверина гидрохлорид 314	8.43.2. Рвота медикаментозная	8.47. Холепанкреатит
Дуоденохель 315	Метамол 466	Галстена 237
Нобритем 520	Метипред 468	Гепар композитум 248
Павестезин 546	Мотилиум 490	Дуоденохель 315
Папаверина гидрохлорид 551	Навобан 497	Панцитрат 550
Спаскупрель 664	Осетрон 541	8.48. Холестаз
8.41. Постхолецистэктомический синдром	8.43.3. Рвота на фоне лучевой терапии	Галстена 237
Галстена 237	Зофран 326	Гепар композитум 248
Гепабене 247	Метамол 466	Гептрал 251
Гепар композитум 248	Мотилиум 490	Урсофальк 739
Дигестал 291	Осетрон 541	8.49. Холецистит
Дигестал форте 291	8.43.4. Рвота неукротимая	Ампициллина натриевая соль кристаллическая 137
Панкреатин 549	Галопер 235	Гепар композитум 248
Сбор желчегонный N 3 640	Галоперидол 236	Мукоза композитум 492
Холензим 776	Метамол 466	Оксациллин натриевая соль 531
8.42. Проктит	Раствор Натрия хлорида 0,9% 604	Папаверина гидрохлорид 551
5-АСА 839	Сенорм 646	Рифамор 623
Альфогель 127	8.44. Тошнота	Сбор желчегонный N 3 640
Гипозоль 256	Бимарал 187	Спаскупрель 664
Диклобене 293	Валидол 208	Суметролим 677
Диклофенак-Ретард 298	Зофран 326	Трифермент 725
Ибупрофен 327	Ким бальзам жидкий 388	Фортум 763
Лаксатин 422	Кинедрил 389	Цефобид 786
Метилурацил 467	Метамол 466	Ципринол 795
Морская капуста 490	Мотилиум 490	8.49.1. Холецистит хронический
Налкром 500	Навобан 497	Ангирол 141
Салофальк 634	Нобритем 520	Галстена 237
Санфинак 639	Новокаин 523	Гепатофальк планта 250
Суппозитории ректальные с эвкалиптоном 678	Осетрон 541	Грюнамокс 269
Ультрапрокт 732	Реглан 610	Календулы настойка 361
8.42.1. Проктосигмоидит эрозивный	Циннарон 793	Панкреатин 549
Салофальк 634	8.45. Фиброз поджелудочной железы	Сульфадиметоксин 675
8.43. Рвота	Дигестал 291	Фебихол 745
Бевиплекс 169	Дигестал форте 291	Холагогум 775
Бимарал 187	Портаген 580	Холагол 776
Валидол 208	Прегестимил 584	Холафлукс 776
Галоперидол 237	8.46. Холангит	Холензим 776
Калия-магния-аспарагинат 363	Гепар композитум 248	8.49.2. Холецистохолангит
Кинедрил 389	Гепатофальк планта 250	Грюнамокс 269
Метамол 466	Грюнамокс 269	Сульфадиметоксин 675
Мотилиум 490	Рифамор 623	Тыквеол 728
Осетрон 541	Сбор желчегонный N 3 640	Холагогум 775
Поливит гериатрик 578	Сульфадиметоксин 675	Холафлукс 776
Раствор Натрия хлорида с глюкозой 5% 604	Суметролим 677	Ципринол 795

8.50. Цирроз печени

Альдактон.....	123
Альфогель.....	127
Анаприлин.....	139
Буфенокс.....	206
Викасол.....	220
Галстена.....	237
Гепар композитум.....	248
Гепатофальк план- та.....	250
Гептрал.....	251
Гипотиазид.....	256
Карбактин.....	374
Лазилактон.....	421
Лактулоза сироп.....	423
Легалон.....	427
Легалон-35.....	427
Липамид.....	439
Метионин.....	468
Модуретик.....	485
Намацит.....	501
Орницетил.....	537
Порталак.....	582
Рибоксин.....	619
Рикавит.....	620
Силегон.....	650
Силибин.....	651
Силимар.....	651
Сирепар.....	656
Спиронаксан.....	664
Спиринол.....	665
Триам-ко.....	718
Тыквеол.....	728
Урактон.....	737
Урсофальк.....	739
Фуросемид.....	770
Фурсемид.....	772
Цианокобаламин.....	787
Эспа-липон.....	828
Эссенциале.....	829

8.51. Эзофагит

Альфогель.....	127
Ортанол.....	537
Симесан.....	651
Спазмомен 40.....	664

8.51.1. Рефлюкс-эзофагит

Аксид.....	113
Алсукрал.....	122
Анацид.....	140
Беломет.....	173
Гастал.....	239
Гистак.....	257
Гистодил.....	258
Зантак.....	318
Зоран.....	326
Квамател.....	381
Координакс.....	406
Лосек.....	445
Маалокс.....	448
Нейтронорм.....	504
Омез.....	533
Омезол.....	533

Перистил.....	560
Примамет.....	587
Раниберл.....	602
Ранитал.....	602
Ранитидин.....	603
Роксан.....	626
Симесан.....	651
Смекта.....	658
Сукрат.....	674
Тальцид.....	683
Улкодин.....	730
Улкосан.....	730
Ульфамид.....	733
Урсофальк.....	739
Фамосан.....	741
Фамотидин.....	741
Фосфалюгель.....	764
Циметидин Ланна- хер.....	792

8.51.2. Рефлюкс-эзофагит эрозивный

Беломет.....	173
Гистодил.....	258
Нейтронорм.....	504
Ранитидин.....	603
Симесан.....	651
Циметидин Ланна- хер.....	792

8.51.3. Эзофагит эрозивный

Анестезин.....	143
Беломет.....	173
Ранитидин.....	603
Роксан.....	626
Симесан.....	651
Фамотидин.....	741
Циметидин Ланна- хер.....	792

8.52. Энтероколит

Альфогель.....	127
Амоксициллин.....	135
Ампицилин.....	136
Бактисубтил.....	166
Бесалол.....	181
Бифидумбактерин сухой.....	191
Ванкоцин.....	210
Винилин (Бальзам Шостаковского).....	221
Линекс.....	438
Метилурацил.....	467
Морская капуста.....	490
Мукоза компози- тум.....	492
Никотиновая кис- лота.....	509
Нормикс.....	528
Нукс вомика-Го- макорд.....	529
Прегестимил.....	584
Простафлин.....	593
Ромазулан.....	627
Сулотрим.....	674

Трифермент.....	725
Тыквеол.....	728
Фенилсалицилат, висмута нитрат ос- новной, экстракт красавки.....	748
Холензим.....	776

8.52.1. Гастроэнте-роколит

Линекс.....	438
Реницин.....	614
Эдицин.....	806

8.52.2. Сигмоидит

Альфогель.....	127
Антрима.....	144
Эдицин.....	806

8.52.3. Энтерит

Бактисубтил.....	166
Бесалол.....	181
Галидор.....	235
Гидрокортизон.....	252
Линекс.....	438
Макропен.....	451
Порталак.....	582
Спазмомен 40.....	664
Суметролим.....	677
Флонивин БС.....	757
Флуклоксациллин.....	759
Эдицин.....	806

8.52.4. Энтероколит хронический

Гепар композитум.....	248
Линекс.....	438
Панкреатин.....	549
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617

8.53. Язвенная бо-лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Аксид.....	113
Алоэ экстракт жид- кий для инъекций.....	121
Алсукрал.....	122
Альфогель.....	127
Анацид.....	140
Анестезин.....	143
Ацидекс.....	163
Беломет.....	173
Бимарал.....	187
Бисмофальк.....	191
Вентер.....	214
Винилин (Бальзам Шостаковского).....	221
Гастал.....	239
Гастерин.....	239
Гастрikumель.....	240
Гастрозем.....	240
Гелусил лак.....	244
Гелусил-суспензия.....	244
Гестид.....	251
Гистак.....	257

Гистодил	258
Де-Нол	276
Дибазол	290
Димедрол	301
Дротаверина гид- рохлорид	314
Дуоденохель	315
Зантак	318
Зоран	326
Квамател	381
Кошачий Коготь	413
Лосек	445
Маалокс	448
Метацин	467
Метилурацил	467
Мукоза компози- тум	492
Нейтронорм	504
Никотиновая кис- лота	509
Новокаин	523
Облепиховое масло ..	530
Омез	533
Омезол	533
Ортанол	537
ПееХоо	555
Пилорид	565
Пиридоксина гид- рохлорид	571
Примамет	587
Раниберл	602
Ранитал	602
Ранитидин	603
Реницин	614
Роксан	626
Ромазулан	627
Сайтотек	633
Сбор желудочно- кишечный	640
Симесан	651
Солкосерил	659
Стиламин	669
Сульпирид	675
Тальцид	683
Тисацид	704
Тропацин	727
Тыквеол	728
Улкодин	730
Улкосан	730
Ульфамид	733
Фамопсин	740
Фамосан	741
Фамотидин	741
Фенилсалицилат, висмута нитрат ос- новной, экстракт красавки	748
Фосфалюгель	764
Хеликоцин	772
Циклоферон	790
Циметидин Ланна- хер	792
Эглонил	805

8.54. Язвы ЖКТ

Анацид	140
Гастал	239
Гистак	257
Метилурацил	467
Нейтронорм	504
Раниберл	602
Симесан	651
Сукрат	674
Фамосан	741
Фамотидин	741

8.54.1. Язвы ЖКТ медикаментозные

Анацид	140
Гастерин	239
Гистодил	258
Маалокс	448
Ранитидин	603
Роксан	626
Сайтотек	633
Сукрат	674
Фамосан	741

8.54.2. Язвы ЖКТ стрессовые

Беломет	173
Гастерин	239
Гистак	257
Гистодил	258
Зантак	318
Зоран	326
Маалокс	448
Нейтронорм	504
Омез	533
Раниберл	602
Ранитидин	603
Роксан	626
Симесан	651
Улкосан	730
Циметидин Ланна- хер	792

8.54.3. Язвы анасто- моза

Гистак	257
Раниберл	602
Ранитидин	603
Фамосан	741

8.54.4. Язвы кишеч- ника пептические

Гистодил	258
Зантак	318
Лосек	445
Маалокс	448

9. Заболевания ОРГАНОВ КРО- ВЕТВОРЕНИЯ

9.1. Анемия

Витамин Е Слова- кофарма	227
Витрум Витамин Е	230
Гидрокортизон	252

Дексазон	278
Калия оротат	363
Ноотропил	526
Поливит гериатрик	578
Рекормон	612
Тиклид	698
Убихинон компози- тум	729
Ферронал	751
Целаскон Эффе- рвесценс	781
Эндур-ВМ	816
Эндур-Е 200	817
Эпомакс	823
Эпрекс	824

9.1.1. Анемия В₁₂ дефицитная

Цианокобаламин	787
----------------------	-----

9.1.2. Анемия аплас- тическая

Гидрокортизон	252
Дексаметазон	279
Провирон-25	588
Рекормон	612
Тимоглобулин	698
Трансамча	714
Цианокобаламин	787

9.1.3. Анемия гемо- литическая

Берликорт	176
Гидрокортизон	252
Дексаметазон	279
Имуран	341
Преднизолон	585
Рекормон	612
Триамцинолон	718
Целестон	782

9.1.4. Анемия желе- зодефицитная

Актиферрин	115
Гино-тардиферон	255
Железа глюконат 300	316
Железа фумарат 200	317
Матерна	456
Пиридоксина гид- рохлорид	571
Рибофлавин	619
Сорбифер Дурулес	661
Тардиферон	687
Фарма-Мед Ле- ди'с формула Же- лезо плюс	744
Ферлатум	750
Ферретаб комп.	751
Ферро-градумет	751
Ферронал	751
Ферронат	752
Ферроплект	752
Феррум Лек	753
Хеферол	774
Цианокобаламин	787

9.1.5. Анемия меди- каментозная

Цианокобаламин	787
Эпрекс	824

9.1.6. Анемия по- стгеморрагическая

Ферронат	752
Феррум Лек	753
Цианокобаламин	787

9.1.7. Анемия фо- латдефицитная

Гино-тардиферон	255
Лейковорин АДС	428
Фоллиат кальция	761

9.2. Аутоиммунные заболевания крови

Дексазон	278
Интраглобин	354

9.3. Заболевания пе- риферической крови

Алкеран	118
Милеран	481

9.3.1. Агранулоци- тоз

Дексаметазон	279
Метилурацил	467
Полидан (Натрия нуклеоспермат)	578
Преднизолон	585
Триамцинолон	718
Энгистол	815

9.3.2. Лейкопения

Граноцит	267
Лейкоген	429
Лейкомакс	429
Метилурацил	467
Нейпоген	503
Пентоксил	558
Полидан (Натрия нуклеоспермат)	578

9.3.3. Лейкопения апластическая

Пентоксил	558
Полидан (Натрия нуклеоспермат)	578

9.3.4. Тромбоцито- пения

Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Дексаметазон	279
Триамцинолон	718
Целестон	782

9.3.4.1. Тромбоцито- пеническая пурпура

Берликорт	176
Винкристин	221
Винкристин суль- фат	222
Гидрокортизон	252
Дексазон	278

Имуран	341
Интраглобин	354
Преднизолон	585
Триамцинолон	718

9.3.5. Эритробласти- пения

Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Целестон	782

9.4. Лейкоз

Винкристин	222
Винкристин суль- фат	222
Вумон	233
Гидрокортизон	252
Декарис	278
Дексаметазон	279
Доксорубин- Эбеве	311
Ланвис	425
Ледоксина	428
Меркаптопурин	465
Метипред	468
Метотрексат	468
Метотрексат на- трия АДС	469
Нидран	507
Пури-нетол	601
Растоцин	606
Трексан	715
Триамцинолон	718
Целестон	782
Церубидин	784
Циклофосфан	791
Цитомид	801
Цитонал	801
Эпилем	823
Этопозид	833

9.4.1. Лейкоз воло- сатоклеточный

Альфаферон	126
Вэллферон	234
Интрон-А	355
Реальдирон	606
Ребиф	607
Роферон А	628

9.4.2. Лейкоз грану- лоцитарный

Цитоксан	800
Элдизин	810

9.4.3. Лейкоз нелим- фобластный

Вепезид	214
Новантрон	520
Цитонал	801

9.4.4. Лимфолейкоз

Амсидил	138
Берликорт	176
Винбластин	221
Винкристин	221
Дексазон	278
Доксодем	311

Интраглобин	354
Кенакорт	382
Ланвис	425
Лейкеран	428
Метотрексат на- трия АДС	469
Метотрексат-Эбеве	470
Новантрон	520
Пури-нетол	601
Растоцин	606
Тактивин	682
Трексан	715
Триксилем	721
Флудара	759
Циклофосфан	791
Цитарабин	799
Цитоксан	800
Цитонал	801
Элдизин	810

9.4.5. Миелолейкоз

Альфаферон	126
Амсидил	138
Весаноид	218
Вэллферон	234
Гидреа	252
Доксодем	311
Интрон-А	355
Ланвис	425
Меркаптопурин	465
Метотрексат на- трия АДС	469
Миелосан	477
Милеран	481
Пури-нетол	601
Растоцин	606
Реальдирон	606
Роферон А	628
Трексан	715
Церубидин	784
Цитарабин	799
Цитоксан	800
Цитонал	801

9.5. Лимфаденит и лимфангит

Гепатромбин	250
Лимфомиозот	437
Фастум	745

9.6. Лимфогрануле- матоз

Берликорт	176
БиКНУ	185
Велбе	211
Вепезид	214
Винкристин	222
Винкристин суль- фат	222
Вумон	233
Декарис	278
Доксорубин- Эбеве	311
Ледоксина	428
Лейкеран	428
Преднизолон	585

СиинУ	650
Тактивин	682
Церубидин	784
Цитоксан	800
Цитомид	801

9.6.1. Лимфогранулематоз доброкачественный

Винбластин	221
Винкристин	221
Гидрокортизон	252

9.6.2. Лимфогранулематоз злокачественный

БиКНУ	185
Блеоцин	193
Винбластин	221
Винкристин	221
Вумон	233
Метотрексат-Эбеве	470
Этопозид-Эбеве	833

9.7. Лимфома

БиКНУ	185
Вепезид	214
Винкристин сульфат	222
Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Доксолем	311
Метипред	468
Метотрексат	468
Нидран	507
Растоцин	606
Роферон А	628
СиинУ	650
Трексан	715
Фторафур	767
Целестон	782
Цитоксан	800
Цитомид	801
Элдизин	810
Эпилем	823

9.7.1. Лимфома Беркитта

Ледоксина	428
Трексан	715
Триксилем	721
Цитоксан	800
Элдизин	810

9.7.2. Лимфома гистиоцитарная

Велбе	211
Вепезид	214
Винкристин сульфат	222
Трексан	715
Цитоксан	800
Цитонал	801
Элдизин	810

9.7.3. Лимфома нелимфобластная

Элдизин	810
---------	-----

9.7.4. Лимфома неходжкинская

Альфаферон	126
Винкристин	221
Доксолем	311
Доксорубицин-Эбеве	311
Интраглобин	354
Ледоксина	428
Лейкеран	428
Метотрексат	469
Метотрексат натрия АДС	469
Новантрон	520
Роферон А	628
Трексан	715
Флудара	759
Цитарабин	799
Цитомид	801
Элдизин	810
Этопозид	833
Этопозид-Эбеве	833

9.7.5. Лимфосаркома

Берликорт	176
Блеоцин	193
Винбластин	221
Доксорубицин-Эбеве	311
Ледоксина	428
Метотрексат	468
Триамцинолон	718
Триксилем	721
Церубидин	784
Циклофосфан	791
Цисплатин-Эбеве	798

9.8. Миеломная болезнь

Алкеран	118
Альфаферон	126
Аредиа	148
БиКНУ	185
Доксорубицин-Эбеве	311
Интрон-А	355
Метипред	468
СиинУ	650
Циклофосфан	791
Цитоксан	800
Эпилем	823

9.9. Миелофиброз

Милеран	481
---------	-----

9.10. Эритремия

Имифос	336
--------	-----

10. Заболевания ОРГАНОВ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

10.1. Аллергические заболевания дыхательных путей

Аллержи	119
Африн	161
Бронал	200
Гексапневмин	242
Делуфен	280
Длянос	307
Задитен	317
Задитен СРО	317
Кромоглин	416
Ломилан	442
Ринитал	621
Тавегил	680
Тартефедрель	687
Трексил	715
Целестон	782

10.2. Астма бронхиальная

Адреналина гидрохлорид	110
Алопрол	121
Алоэ экстракт жидкий для инъекций	121
Альдецин	124
Амбробене	128
Амбrolан	128
Аминофиллин	133
Беклазон	169
Беклазон легкое дыхание	170
Бекломет	170
Бекодиск	171
Бекотид	171
Берликорт	176
Бриканил	196
Бриканил инхалер	196
Бриканил Турбухалер	196
Бромгексин	198
Бронал	200
Бронхалис-Хель	201
Вентакс	213
Вентодиск	214
Вентолин	214
Волмакс	232
Галиум-Хель	235
Гидрокортизон ацетат	253
Дексаметазон	279
Дипроспан	303
Диффумал 24	306
Задитен	317
Задитен СРО	317
Кальция пантотенат	

нат.....	368	100.....	666	Бассадол.....	168
Капли Бронховерн....	370	Спофиллин ретард		Бикарминт.....	185
Карбактин.....	374	250.....	666	Биодроксил.....	187
Кенакорт.....	382	Талеум.....	683	Биокалитол.....	188
Кеналог.....	383	Тинсет.....	701	Бромгексин.....	198
Кошачий Коготь.....	413	Трексил.....	715	Бронкатар.....	201
Кромоген ингаля-		10.2.2. Астма брон-		Бронхикум.....	201
тор.....	415	хиальная инфекци-		Бронхикум баль-	
Кромоген легкое		онно-аллергическая		зам с эвкалипто-	
дыхание.....	415	Аминофиллин.....	132	вым маслом.....	202
Кромолин.....	416	Бромгексин.....	198	Бронхикум ингалят...	202
Либексин.....	433	Бронхосан.....	203	Бронхикум меди-	
Метипред.....	468	Грюнамокс.....	269	цинские ванны с	
Мукодин.....	491	Задитен.....	317	тимьяном.....	202
Мукоза компози-		Задитен СРО.....	317	Бронхикум пастил-	
тум.....	492	Кромоген ингаля-		ки от кашля.....	203
Пентамин.....	558	тор.....	415	Бронхикум сироп	
Пипольфен.....	567	Спиринол.....	665	от кашля.....	203
Плибекот.....	575	Спофиллин ретард		Бронхо-мунал	
Пульмикорт.....	599	100.....	666	Бронхо-мунал II.....	203
Пульмикорт Турбу-		Спофиллин ретард		Гексапневмин.....	241
халер.....	599	250.....	666	Геломиртол форте.....	244
Ретафил.....	617	Трексил.....	715	Гентамицина суль-	
Саламол.....	633	10.2.3. Астма брон-		фат.....	246
Саламол легкое		хиальная физичес-		Глауфос.....	259
дыхание.....	633	ких напряжений		Грюнамицин сироп....	269
Салмо.....	634	Аминофиллин.....	132	Грюнамокс.....	269
Сальбутамол.....	635	Вентодиск.....	214	Густель.....	270
Сальметер.....	635	Вентолин.....	214	Динабак.....	301
Серевент.....	647	Задитен.....	317	Доксал.....	308
Солутан.....	660	Задитен СРО.....	317	Доксилан.....	308
Спаскупрель.....	664	Интал.....	352	Доксициклин.....	309
Спиронаксан.....	664	Интал плюс.....	353	Доксициклина гид-	
Супрастин.....	679	Кромоген ингаля-		рохлорид.....	310
Тайлед.....	681	тор.....	415	Заноцин.....	318
Тартефедрель.....	687	Кромоген легкое		Зинацеф.....	320
Теопэк.....	691	дыхание.....	415	Зиннат.....	321
Теотард.....	691	Спофиллин ретард		Кальция пантоте-	
Тонзан-акут.....	706	100.....	666	нат.....	368
Трексил.....	715	Спофиллин ретард		Карбоцистеин.....	376
Триамцинолон.....	718	250.....	666	Клиндамицин.....	396
Тропацин.....	727	Тайлед.....	681	Лендацин.....	432
Флекаксин.....	754	Трексил.....	715	Либексин.....	433
Фликсотид.....	756	10.2.4. Астматичес-		Ликопид.....	436
Целестон.....	782	кий статус		Максипим.....	453
Эреспал.....	825	Аминофиллин.....	132	Мегациллин орал.....	458
Этимизол.....	832	Гидрокортизон.....	252	Ментоклар.....	464
Эуфиллин.....	834	Преднизолон.....	585	Мукалтин.....	491
Эуфилонг.....	835	Саламол легкое		Мукоза компози-	
Эфедрина гидрох-		дыхание.....	633	тум.....	492
лорид.....	835	Урбазон.....	737	Мукосол.....	492
10.2.1. Астма брон-		10.3. Бронхит		Орелокс.....	536
хиальная атопичес-		Абактал.....	105	Офрамекс.....	544
кая		Алопрол.....	121	Пакселадин.....	547
Аминофиллин.....	132	Амбробене.....	128	Палитрекс.....	547
Задитен.....	317	Амбродан.....	128	Пантенол.....	549
Задитен СРО.....	317	Амол.....	136	Пенглоб.....	555
Интал.....	352	Ампицилин.....	136	Пенодил.....	556
Интал плюс.....	353	Ампициллина три-		Пиносол.....	567
Кромоген ингаля-		гидрат.....	138	Пипрацил.....	569
тор.....	415	Антрима.....	144	Простафлин.....	593
Кромоген легкое		Ацетилцистеин.....	163	Пульмекс.....	599
дыхание.....	415	Бактрим.....	167	Пульмекс беби.....	599
Спофиллин ретард				Ретинола ацетат	
				(Витамин А).....	617

Рибомунил	619
Рифамор	623
Ровамицин	625
Сальбутамол	635
Сбор грудной N 4	640
Солутан	660
Сульфадиметоксин	675
Сумамед	677
Суметролим	677
Тазоцин	680
Тартефедрель	687
Теотард	691
Тонзан-акут	706
Умкалор	734
Фелексин	746
Флекоксин	754
Цедекс	780
Цефазолин	785
Цефаклен	785
Цефотаксим	787
Циклоферон	790
Ципринол	795
Цифран	803
Эвкабал бальзам С	804
Эвкабал-капли от кашля	804
Эвкабал-сироп от кашля	804
Эритромицин	826
Эрмицед	826
Эстифан	830

10.3.1. Бронхит астматический

Алопрол	121
Альдецин	124
Аминофиллин	132
Бриканил	196
Бриканил инхалер	196
Бриканил Турбухалер	196
Бромгексин	198
Вентакс	213
Гистаглобулин сухой	257
Декарис	278
Диффумал 24	306
Задитен	317
Задитен СРО	317
Капли Бронховерн	370
Кеналог	383
Кромоген ингалятор	415
Пипольфен	567
Ретафил	617
Саламол	633
Салмо	634
Сальметер	635
Спаскупрель	664
Спофиллин ретард 100	666
Спофиллин ретард 250	666
Тайлед	681
Талеум	683

Теопэк	691
Теотард	691
Эуфиллин	834
Эуфилонг	835

10.3.2. Бронхит с гиперсекрецией слизи

Бронхосан	203
Карбоцистеин	376
Мукодин	491
Мукосол	492
Эвкабал бальзам С	804

10.3.3. Бронхит хронический

Алопрол	121
Альдецин	124
Амробене	128
Амбrolан	128
Амоксиклав	135
Бассадо	168
Берликорт	176
Биокалиптол	188
Бриканил	196
Бриканил инхалер	196
Бриканил Турбухалер	196
Бронхалис-Хель	201
Бронхосан	203
Вентодиск	214
Вентолин	214
Волмакс	232
Геделикс	240
Геделикс сироп от кашля	240
Зинацеф	320
Зиннат	321
Календулы настойка	361
Капли Бронховерн	370
Карбоцистеин	376
Либексин	433
Модивид	483
Мукодин	491
Мукосол	492
Палитрекс	547
Салмо	634
Серевент	647
Сулотрим	674
Теотард	691
Фелексин	746
Ципринол	795
Эреспал	825
Эуфиллин	834
Эуфилонг	835
Эхинацин ликвидум	837

10.4. Бронхоспазм

Аминофиллин	133
Бриканил	196
Бриканил инхалер	196
Бриканил Турбухалер	196
Бронхосан	203

Вентакс	213
Вентодиск	214
Вентолин	214
Диффумал 24	306
Папаверина гидрохлорид	551
Саламол легкое дыхание	633
Салмо	634
Сальбутамол	635
Сальметер	635
Спаскупрель	664
Тайлед	681
Тартефедрель	687
Теопэк	691
Триамцинолон	718
Эреспал	825
Этимизол	832
Эуфиллин	834
Эуфилонг	835

10.5. Бронхоэктатическая болезнь

Абактал	105
Амробене	128
Амбrolан	128
Амоксиклав	135
Ацетилцистеин	163
Бактрим	167
Бромгексин	198
Бромгексин 8- капли	198
Бронхосан	203
Галиум-Хель	235
Капли Бронховерн	370
Карбоцистеин	376
Мукалтин	491
Мукодин	491
Палитрекс	547
Суметролим	677
Фелексин	746
Флекоксин	754
Фортум	763
Ципринол	795
Эрмицед	826

10.6. Диагностика заболеваний

Карбоцистеин	376
Либексин	433
Мукодин	491
Нафтизин	502
Олинт	533
Отривин	544
Санорин	638

10.7. Дистресс-синдром респираторный

Амробене	128
Куросурф	419
Целестон	782
Экзосурф педиатрический	808



10.8. Дыхательная недостаточность

Вентакс	213
Кофеин-бензоат натрия	412
Нобритем	520
Ретафил	617
Спофиллин ретард 100	666
Спофиллин ретард 250	666
Сульфокамфокаин	677
Этимизол	832

10.9. Затрудненное отделение мокроты

Амбробене	128
Ацетилцистеин	163
Бромгексин	198
Бромгексин 10	198
Берлин-Хеми	198
Бромгексин 4 Берлин-Хеми	198
Бромгексин 8 Берлин-Хеми	198
Бронхикум	201
Бронхикум бальзам с эвкалиптовым маслом	202
Бронхикум ингалят	202
Бронхикум медицинские ванны с тимьяном	202
Бронхикум пастилки от кашля	203
Бронхикум сироп от кашля	203
Бронхосан	203
Геделикс	240
Геделикс сироп от кашля	240
Геломиртол форте	244
Капли Бронховерн	370
Карбоцистеин	376
Метацин	467
Мукалтин	491
Мукосол	492
Синупрет	654
Эвкабал-капли от кашля	804

10.10. Инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей

Аллергин	119
Альдолор	124
Альфацет	126
Амоксициллин	135
Амол	136
Ампициллин	137
Ампициллин АМП-КИД	137
АМП-Форте	137
Ампициллина на-	

триевая соль кристаллическая	137
Ангин-Хель С	141
Бактрим	167
Берлоцид	180
Берлоцид 480	180
Берлоцид 960	180
Биодроксил	187
Биопарокс	190
Бонцефин	195
Бромгексин	198
Бромгексин 10	198
Берлин-Хеми	198
Бромгексин 4 Берлин-Хеми	198
Бромгексин 8 Берлин-Хеми	198
Бромгексин 8-капли	198
Бронхалис-Хель	201
Бронхосан	203
Ванкоцин	210
Ванмиксан	210
Вольтарен	232
Вольтарен рапид	232
Гарамицин	238
Геделикс	240
Геделикс сироп от кашля	240
Гексапневмин	241
Гентамицин	245
Гентамицина сульфат	246
Глауфос	259
Грипп-Хель	268
Грюнамокс	269
Густель	270
Данемокс	273
Дардум	274
Динабак	301
Доксициклин	309
Доксициклина гидрохлорид	310
Дурацеф	315
Заноцин	318
Зинацеф	320
Зиндолин 250	320
Зиннат	321
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Ибупрофен Ланна-хер	328
Илозон	335
Иммунал	337
Инфлюцид	357
Каффетин	380
Кефадим	388
Кефзол	388
Клафоран	390
Клиацил	392
Клиндамицин	396
Коэнзим компози-тум	413
Лидаприм	433
Ликацин	435

Ликопид	436
Лонгацеф	443
Макропен	451
Максаквин	452
Максипим	453
Мандол	454
Мегациллин орал	458
Меронем	465
Мефоксин	473
Мукоза компози-тум	492
Мукосол	492
Мульти-табс с Витамином С	494
Небцин	502
Нетромицин	506
Орелокс	536
Оспамокс	542
Оспексин	542
Оспен	542
Оспен 750	542
Офрамекс	544
Палитрекс	547
Пантенол	549
Пентрексил	558
Перти	562
Пефлацин	563
Пипрацил	569
Пливалгин	575
Простафлин	593
Пульмекс	599
Пульмекс беби	599
Реницин	614
Рифамор	623
Роксимижан	626
Роцефин	629
Рулид	631
Сбор грудной N 4	640
Септрин	647
Септрин-форте	647
Синупрет	654
Солексин	
Солексин-КИД	
Солексин-Форте	658
Стандациллин	667
Стоптуссин	670
Стрептоцид	672
Стресс формула 600	672
Сульфален	676
Сумамед	677
Тазоцин	680
Таривид	687
Тартефедрель	687
Тиенам	696
Тонзилгон	706
Тотацеф	709
Траумель С	714
Тримосул	722
Умкалор	734
Фелексин	746
Фервекс	750
Флекоксин	754
Флемоксин Солю-таб	755

Флуклоксациллин.....	759	Бронхикум меди-		Фортум.....	763
Фортум.....	763	цинские ванны с		Цедекс.....	780
Цеклор.....	780	тимьяном.....	202	Цефаклен.....	785
Цефазолин.....	785	Бронхикум пастил-		Цефотаксим.....	786
Цефалексин.....	786	ки от кашля.....	203	Ципринол.....	795
Цефобид.....	786	Бронхикум сироп		Ципробай.....	796
Цефотаксим.....	787	от кашля.....	203	Ципролет.....	796
Ципробай.....	796	Бронхо-мунал		Цитерал.....	800
Ципролет.....	796	Бронхо-мунал II.....	203	Цифлоксинал.....	803
Ципросол.....	797	Вольтарен.....	232	Цифран.....	803
Ципрофлоксацина		Вольтарен рапид.....	232	Эстифан.....	830
гидрохлорид.....	797	Глауфос.....	259	10.10.3. Инфекции	
Цитерал.....	800	Грипп-Хель.....	268	вирусные дыхатель-	
Цифлоксинал.....	803	Грюнамицин сироп.....	269	ных путей	
Цифран.....	803	Грюнамокс.....	269	Альдолор.....	124
Эритромицин.....	826	Декарис.....	278	Афлубин.....	160
Эрмицед.....	826	Делуфен.....	280	Бронхикум.....	201
Эхинацея компози-		Диклобене.....	293	Бронхикум баль-	
тум С.....	837	Диклофенак.....	297	зам с эвкалипто-	
Эхинацин ликви-		Доксилан.....	308	вым маслом.....	202
дум.....	837	Доксициклин.....	309	Бронхикум ингалят...	202
Юнидокс Солютаб.....	838	Заноцин.....	318	Бронхикум меди-	
10.10.1. Абсцесс		Зинацеф.....	320	цинские ванны с	
легких		Зиндолин 250.....	320	тимьяном.....	202
Абактал.....	105	Зиннат.....	321	Бронхикум пастил-	
Амикацин.....	129	Ингалипт.....	342	ки от кашля.....	203
Амоксиклав.....	135	Инфлубене.....	357	Бронхикум сироп	
Антрима.....	144	Йокс.....	359	от кашля.....	203
Бактрим.....	167	Календулы настой-		Гексапневмин.....	241
Гентамицина суль-		ка.....	361	Грипп-Хель.....	268
фат.....	246	Кальцекс.....	365	Делуфен.....	280
Диоксидин.....	301	Клафоран.....	390	Инфлубене.....	357
Зинацеф.....	320	Клиацил.....	392	Инфлюцид.....	357
Канамицин суль-		Климицин.....	395	Лековит С-Са.....	430
фат.....	369	Клиндамицин.....	396	Либексин.....	433
Кейтен.....	382	Лендацин.....	432	Сандра.....	637
Клафоран.....	390	Лидаприм.....	433	Сульфадиметоксин....	675
Климицин.....	395	Мегациллин орал.....	458	Траумель С.....	714
Клиндамицин.....	396	Мундизал гель.....	495	Трексил.....	715
Лендацин.....	432	Нелорен.....	504	10.10.4. Инфекции	
Линкомицина гид-		Оспексин.....	542	органов грудной	
рохлорид.....	438	Оспен.....	542	клетки	
Нелорен.....	504	Оспен 750.....	542	Абактал.....	105
Рифамор.....	623	Офрамакс.....	544	Амоксиклав.....	135
Тамицин.....	683	Пенициллин G на-		Гентамицина суль-	
Таривид.....	687	триевая соль.....	555	фат.....	246
Фортум.....	763	Пентрексил.....	558	Клафоран.....	390
Цефаклен.....	785	Перти.....	562	Климицин.....	395
Цефотаксим.....	786	Повидон-йод.....	576	Медазол.....	459
10.10.2. Инфекции		Простафлин.....	593	Нелорен.....	504
ЛОР-органов		Реницин.....	614	Тамицин.....	683
Абактал.....	105	Рибомунил.....	619	Таривид.....	687
Амоксиклав.....	135	Ровамицин.....	625	Цефаклен.....	785
Антрима.....	144	Ромазулан.....	627	10.10.4.1. Плеврит	
Берлоцид.....	180	Роцефин.....	629	Бассадос.....	168
Берлоцид 480.....	180	Рулид.....	631	Гентамицина суль-	
Берлоцид 960.....	180	Санапрокс.....	635	фат.....	246
Биодроксил.....	187	Септолете.....	646	Диоксидин.....	301
Биопарокс.....	190	Стрептоцид.....	672	Доксал.....	308
Бронхикум.....	201	Сульфадиметоксин....	675	Доксициклина гид-	
Бронхикум баль-		Сумамед.....	677	рохлорид.....	310
зам с эвкалипто-		Суметролим.....	677	Лендацин.....	432
вым маслом.....	202	Таривид.....	687	Пентакаринат.....	557
Бронхикум ингалят...	202	Тотацеф.....	709		
		Фелексин.....	746		

Рифамор.....	623
Тамицин.....	683
Фортум.....	763
Цефотаксим.....	786

10.10.4.2. Пневмония

V-Пенициллин.....	
Словакофарма.....	842
Акт-ХИБ.....	114
Альфацет.....	126
Амбробене.....	128
Амикацин.....	129
Ампицилин.....	136
Ампициллина тригидрат.....	138
Ацетилцистеин.....	163
Бактрим.....	167
Бассадол.....	168
Биодроксил.....	187
Бронхикум.....	201
Бронхикум бальзам с эвкалиптовым маслом.....	202
Бронхикум ингалят.....	202
Бронхикум медицинские ванны с тимьяном.....	202
Бронхикум сироп от кашля.....	203
Глауфос.....	259
Грюнамицин сироп.....	269
Грюнамокс.....	269
Дефламол.....	286
Динабак.....	301
Доксал.....	308
Доксилан.....	308
Доксициклин.....	309
Доксициклина гидрохлорид.....	310
Заноцин.....	318
Зинацеф.....	320
Зиннат.....	321
Илозон.....	335
Канамицин сульфат.....	369
Карбоцистеин.....	376
Кейтен.....	382
Клафоран.....	390
Клиндамицин.....	396
Клион.....	397
Лендацин.....	432
Либексин.....	433
Ликопид.....	436
Линкомицина гидрохлорид.....	438
Лонгацеф.....	443
Максипим.....	453
Мандол.....	454
Метилурацил.....	467
Модивид.....	483
Моноклин.....	486
Мукалтин.....	491
Мукосол.....	492
Оксациллин натрия.....	

евая соль.....	531
Орелокс.....	536
Офрамакс.....	544
Пакселадин.....	547
Пенглогл.....	555
Пенициллин G натриевая соль.....	555
Пенодил.....	556
Пипрацил.....	569
Простафлин.....	593
Реницин.....	614
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617
Рифадин.....	622
Рифамор.....	623
Ровамицин.....	625
Роцефин.....	629
Сулотрим.....	674
Сульфадиметоксин.....	675
Сумамед.....	677
Суметролим.....	677
Тазоцин.....	680
Таривид.....	687
Тобрацин-АДС.....	705
Тонзан-акут.....	706
Уназин.....	734
Фортум.....	763
Цедекс.....	780
Цеклор.....	780
Цефазолин.....	785
Цефотаксим.....	787
Циклоферон.....	790
Цифран.....	803
Эдицин.....	806
Эритромицин.....	826
Эрмицед.....	826
Эстифан.....	830

10.10.4.2.1. Пневмония крупозная

Антрима.....	144
Лендацин.....	432
Тамицин.....	683
Цефотаксим.....	786

10.10.4.2.2. Пневмония новорожденных

Тамицин.....	683
Цефотаксим.....	786

10.10.4.2.3. Пневмония очаговая

Антрима.....	144
Лендацин.....	432
Цефотаксим.....	786

10.10.4.2.4. Пневмония послеоперационная

Антрима.....	144
Гентамицина сульфат.....	246
Зинацеф.....	320
Лендацин.....	432
Тамицин.....	683
Цефотаксим.....	786

10.10.4.2.5. Пневмония хроническая

Бронхо-мунал.....	
Бронхо-мунал П.....	203
Гентамицина сульфат.....	246
Мукосол.....	492
Орелокс.....	536
Рибомунил.....	619
Цефотаксим.....	786

10.10.4.3. Эмпиема плевры

V-Пенициллин.....	
Словакофарма.....	842
Амикацин.....	129
Бактрим.....	167
Гентамицина сульфат.....	246
Диоксидин.....	301
Доксилан.....	308
Кейтен.....	382
Лендацин.....	432
Линкомицина гидрохлорид.....	438
Оксациллин натрияевая соль.....	531
Пенициллин G натриевая соль.....	555
Рифамор.....	623
Тамицин.....	683
Фортум.....	763
Цефотаксим.....	786

10.11. Кашель

Алталекс.....	122
Амол.....	136
Биолайн Колд.....	189
Бронхалис-Хель.....	201
Бронхикум.....	201
Бронхикум бальзам с эвкалиптовым маслом.....	202
Бронхикум ингалят.....	202
Бронхикум медицинские ванны с тимьяном.....	202
Бронхикум пастилки от кашля.....	203
Бронхикум сироп от кашля.....	203
Геломиртол форте.....	244
Густель.....	270
Инфлюцид.....	357
Коделак.....	401
Ментоклар.....	464
Морфина гидрохлорид.....	490
Мукодин.....	491
Омнопон.....	534
Протиазин Экспекторант.....	596
Пульмекс.....	599
Пульмекс беби.....	599
Сбор грудной N 4.....	640

Синекод	652
Стоптуссин	670
Тартефедрель	687
Терпинкод	693
Фалиминт	740
Эвкабал-капли от кашля	804
Эвкабал-сироп от кашля	804

10.11.1. Кашель сухой

Биокалиптол	188
Бронхикум	202
Гексапневмин	241
Морфина гидрох- лорид	490
Мукалтин	491
Омнипон	534
Пакселадин	547
Стоптуссин	670

10.12. Ларингит

Амол	136
Ангин-Хель С	141
Асинис	151
Бикарминт	185
Биокалиптол	188
Биопарокс	190
Бронхалис-Хель	201
Бронхо-мунал	203
Бронхо-мунал II	203
Гексадрепс	241
Гексализ	241
Гексапневмин	242
Гексаспрей	243
Грюнамицин сироп	269
Грюнамокс	269
Гумизоль	270
Доналгин	312
Ингалипт	342
Йокс	359
Календулы настой- ка	361
Капли Бронховерн	370
Ликопид	436
Мегациллин орал	458
Ментоклар	464
Нелорен	504
Пакселадин	547
Пантенол	549
Пиносол	567
Реницин	614
Рибомунил	619
Санорин	638
Септолете	646
Спаскупрель	664
Сульфадиметоксин	675
Тонзан-акут	706
Трансамча	714
Уназин	734
Фалиминт	740
Фарингосепт	742
Цефаклен	785
Эвкабал бальзам С	804
Эрмицед	826

Эхинацин ликви- дум	837
10.13. Муковисци- доз легких	
Ацетилцистеин	163
Бромгексин	198
Бронхосан	203
Мукозол	492
Пульмозим	600
Фортум	763

10.14. Озена

Амоксиклав	135
Делуфен	280
Эуфорбиум компо- зитум Назентроп- фен С	835

10.15. Опухоли

10.15.1. Ларингопа- пилломатоз

Интрон-А	355
----------------	-----

10.15.2. Мезотелио- ма плевры

Тиотепа-Тиоплекс	702
-----------------------	-----

10.15.3. Рак брон- хов

Декарис	278
Доксолем	311
Метотрексат	468
Флуорокс	760

10.15.4. Рак гортани

Блеоцин	193
Гидреа	252
Метотрексат	468
СииНУ	650
Флуорокс	760

10.15.5. Рак легких

Бластокарб	192
Бластолем	192
Блеоцин	193
Вепезид	214
Винкристин	221
Винкристин суль- фат	222
Гемзар	244
Доксорубицин- Эбеве	311
Карбоплатин-Эбеве ...	375
Ледоксина	428
Метипред	468
Метотрексат	468
Метотрексат на- трия АДС	469
Метотрексат-Эбеве	470
Навельбин	497
Нидран	507
Параплатин	551
Платимит	573
Растоцин	606
Рибасан форте	618
СииНУ	650
Таксотер	682

Трексан	715
Триксилем	721
Флуорокс	760
Циклофосфан	791
Цитомид	801
Элдизин	810
Эпилем	823
Этопозид	833
Этопозид-Эбеве	833

10.16. Отек

10.16.1. Ангионевро- тический отек

Бронал	200
Данодиол	273
Димебон	300
Кенакорт	382
Цетрин	785

10.16.2. Отек слизи- стой носоглотки

Адреналина гид- рохлорид	110
Аллержи	119
Африн	161
Гексапневмин	242
Длянос	307
Эуфорбиум компо- зитум Назентроп- фен С	835

10.16.3. Токсичес- кий отек легких

Лазикс	420
Фуросемид Ланна- хер	771

10.17. Ринит

Аллергин	119
Алталекс	122
Амол	136
Ангин-Хель С	141
Асинис	151
Беконазе	170
Бикарминт	185
Биокалиптол	188
Биолайн Колд	189
Биопарокс	190
Бронал	200
Бронкатар	201
Бронхо-мунал	203
Бронхо-мунал II	203
Гексапневмин	242
Гисталонг	258
Гистимет	258
Гриппекс	268
Гумизоль	270
Делуфен	280
Дипроспан	303
Длянос	307
Задитен	317
Задитен СРО	317
Зиртек	322
Капли Бронховерн	370
Ким бальзам жид- кий	388
Кромоглин	416

Леконил	430	Умкалор	734	Палитрекс	547
Леконил П	430	Фазин	740	Рибомунил	619
Ментоклар	464	Фенистил	748	Ровамицин	625
Мундизал гель	495	Фенкарол	749	Санорин	638
Нафтизин	502	Фервекс	750	Септрин	647
Олинт	533	Хай-Кром	772	Септрин-форте	647
Отривин	544	Цетрин	785	Синупрет	654
Пантенол	549	Эреспал	825	Синусан	655
Противазин Экспек-		Эуфорбиум компо-		Сумамед	677
торант	596	зитум Назентроп-		Суметролим	677
Рибомунил	619	фен С	835	Тонзилгон	706
Ринитал	621	Эфедрина гидрох-		Умкалор	734
Санорин	638	лорид	835	Уназин	734
Санорин-Аналергин ..	638	10.17.2. Ринит вазо-		Фазин	740
Семпрекс	645	моторный		Фелексин	746
Синусан	655	Альдецин	124	Флекоксин	754
Умкалор	734	Африн	161	Фортум	763
Фазин	740	Берликорт	176	Цедекс	780
Фариал	742	Гексапневмин	242	Цеклор	780
Фенкарол	749	Длянос	307	Циннабсин	793
Фликсоназе	756	Зиртек	322	Ципринол	795
Целестон	782	Клариназе	389	Цифлоксинал	803
Цетрин	785	Олинт	533	Эрмицед	826
Эвкабал бальзам С ...	804	Перитол	560	Эуфорбиум компо-	
Эуфорбиум компо-		Супрастин	679	зитум Назентроп-	
фен С	835	Тинсет	701	фен С	835
Эфедрина гидрох-		Фазин	740	Эхинацин ликви-	
лорид	835	Эуфорбиум компо-		дум	837
Эхинацин ликви-		зитум Назентроп-		10.18.1. Гайморит	
дум	837	фен С	835	Амоксиклав	135
10.17.1. Поллиноз		10.17.3. Ринит ги-		Асинис	151
Аллержи	119	перпластический		Бронхо-мунал	
Альдецин	124	Альдецин	124	Бронхо-мунал П	203
Асмовал	152	Эуфорбиум компо-		Геломиртол форте	244
Африн	161	зитум Назентроп-		Декарис	278
Берликорт	176	фен С	835	Мукодин	491
Гексапневмин	242	10.18. Синусит		Нафтизин	502
Гистаглобулин		Амол	136	Орелокс	536
сухой	257	Ампицилин	136	Реницин	614
Гисталонг	258	Асинис	151	Сульфадиметоксин	675
Димебон	300	Африн	161	Таривид	687
Задитен	317	Бактрим	167	Циннабсин	793
Задитен СРО	317	Биодроксил	187	Эуфорбиум компо-	
Зиртек	322	Биопарокс	190	зитум Назентроп-	
Интал	352	Бронкатар	201	фен С	835
Кестин	384	Грюнамицин сироп	269	10.18.2. Фронтит	
Клариназе	389	Гумизоль	270	Амоксиклав	135
Кларитин	390	Данемокс	273	Асинис	151
Кромолин	416	Делуфен	280	Бронхо-мунал	
Ломилан	442	Длянос	307	Бронхо-мунал П	203
Ломузол	443	Доксилан	308	Геломиртол форте	244
Назакорт	498	Доксициклин	309	Декарис	278
Нафтизин	502	Доналгин	312	Мукодин	491
Олинт	533	Зиннат	321	Орелокс	536
Перитол	560	Ибуклин	327	Реницин	614
Пиносол	567	Ибуклин юниор	327	Таривид	687
Противазин Экспек-		Капли Бронховерн	370	Умкалор	734
торант	596	Карбоцистеин	376	Циннабсин	793
Ринитал	621	Клиндамицин	396	Эуфорбиум компо-	
Санорин-Аналергин ..	638	Леконил	430	зитум Назентроп-	
Тавегил	680	Леконил П	430	фен С	835
Тинсет	701	Нелорен	504	10.19. Трахеит	
Трексил	715	Отривин	544	Ангин-Хель С	141
				Антрима	144

Бикарминт.....	185	Густель.....	270	Суметролим.....	677
Биолайн Колд.....	189	Доксициклин.....	310	Тантум Верде.....	686
Биопарокс.....	190	Ибуклин.....	327	Трансамча.....	714
Бронхикум.....	201	Ибуклин юниор.....	327	Умкалор.....	734
Бронхикум бальзам с эвкалиптовым маслом.....	202	Календулы настойка.....	361	Уназин.....	734
Бронхикум ингалят.....	202	Нелорен.....	504	Фалиминт.....	740
Бронхикум медицинских ванны с тимьяном.....	202	Пакселадин.....	547	Фарингосепт.....	742
Бронхикум пастилки от кашля.....	203	Рибомунил.....	619	Фелексин.....	746
Бронхикум сироп от кашля.....	203	Сбор грудной N 4.....	640	Фервекс.....	750
Грипп-Хель.....	268	Сульфадиметоксин.....	675	Цедекс.....	780
Грюнамокс.....	269	Таривид.....	687	Цеклор.....	780
Густель.....	270	Тартефедрель.....	687	Эвкабал бальзам С.....	804
Доксициклин.....	310	Тонзан-акут.....	706	Эрмицед.....	826
Дурацеф.....	315	Флекоксин.....	754	Эхинацин ликвидум.....	837
Календулы настойка.....	361	Цефотаксим.....	787		
Ликопид.....	436	Эвкабал бальзам С.....	804		
Ментоклар.....	464				
Нелорен.....	504	10.21. Фарингит			
Пантенол.....	549	Альфацет.....	126		
Пиносол.....	567	Ампицилин.....	136		
Ретинола ацетат (Витамин А).....	617	Ангин-Хель С.....	141		
Рибомунил.....	619	Асинис.....	151		
Сбор грудной N 4.....	640	Бактрим.....	167		
Сульфадиметоксин.....	675	Бикарминт.....	185		
Таривид.....	687	Биодроксил.....	187		
Тонзан-акут.....	706	Биокалпitol.....	188		
Эвкабал бальзам С.....	804	Биолайн Колд.....	189		
Эрмицед.....	826	Биопарокс.....	190		
Эхинацин ликвидум.....	837	Вокара.....	231		
		Гексадрепс.....	241		
10.20. Трахеобронхит		Гексализ.....	241		
Ангин-Хель С.....	141	Гексапневмин.....	242		
Антрима.....	144	Гексаспрей.....	243		
Биокалпitol.....	188	Гексорал.....	243		
Биолайн Колд.....	189	Грюнамокс.....	269		
Бромгексин.....	198	Гумизоль.....	270		
Бронкатар.....	201	Данемокс.....	273		
Бронхалис-Хель.....	201	Дикломелан.....	295		
Бронхикум.....	201	Динабак.....	301		
Бронхикум бальзам с эвкалиптовым маслом.....	202	Доксилап.....	308		
Бронхикум ингалят.....	202	Доксициклин.....	309		
Бронхикум медицинских ванны с тимьяном.....	202	Доналгин.....	312		
Бронхикум пастилки от кашля.....	203	Дрилл боль в горле.....	314		
Бронхикум сироп от кашля.....	203	Дурацеф.....	315		
Бронхо-мунал.....	203	Зиннат.....	321		
Бронхо-мунал II.....	203	Ибуклин.....	327		
Бронхосан.....	203	Ибуклин юниор.....	327		
Геломиртол форте.....	244	Ингалипт.....	342		
Грюнамокс.....	269	Калпол.....	364		
		Калпол 6 плюс.....	364		
		Клиндамицин.....	396		
		Мегациллин орал.....	458		
		Нелорен.....	504		
		Орелокс.....	536		
		Пакселадин.....	547		
		Палитрекс.....	547		
		Пантенол.....	549		
		Пиносол.....	567		
		Рибомунил.....	619		
		Рифамор.....	623		
		Ромазулан.....	627		
		Септолете.....	646		
		Стопангин.....	669		
		Сульфадиметоксин.....	675		
				11. Заболевания ОРГАНОВ СЛУХА	
				11.1. Дегенеративные заболевания внутреннего уха (отосклероз)	
				Гумизоль.....	270
				Дартелин.....	275
				11.2. Инфекции наружного слухового прохода	
				Банеоцин.....	167
				Гаразон.....	238
				Деперзолон.....	282
				Нитрофунгин.....	517
				Нифлурил.....	519
				Пимафукорт.....	566
				Пимафуцин.....	566
				Софрадекс.....	663
				Таривид.....	687
				Фортум.....	763
				Фурацилин.....	770

Ципринол	795
Эрмицед	826

11.3. Нарушения кровообращения в органах слуха

Агапурин	106
Вазонит	207
Дартелин	275
Кавинтон	361
Мемоплант	462
Пентамон	558
Предуктал	586
Радомин	601
Трентал	716
Трентал 400	716

11.4. Отит средний

Бронкатар	201
Вольтарен	232
Вольтарен рапид	232
Грипп-Хель	268
Губка гемостатическая коллагеновая	270
Гумизоль	270
Дикломелан	295
Доксилан	308
Доксициклин	309
Доналгин	312
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Карбоцистеин	376
Клиндамицин	396
Отипакс	544
Отривин	544
Палитрекс	547
Септрин	647
Септрин-форте	647
Сульпирид	675
Сумамед	677
Фазин	740
Фортум	763
Фурацилин	770
Цеклор	780
Цефалексин	786
Ципринол	795
Эуфорбиум композитум Назентроп-фен С	835

11.4.1. Отит средний аллергический

Мукодин	491
Отипакс	544

11.4.2. Отит средний инфекционный

Альфацет	126
Ампицилин	136
Биодроксил	187
Бронхо-мунал	
Бронхо-мунал П	203
Грюнамицин сироп	269
Грюнамокс	269
Данемокс	273
Доксициклин	310
Доксициклина гид-	

рохлорид	310
Зиннат	321
Клиацил	392
Лендацин	432
Мегациллин орал	458
Мукодин	491
Нифлурил	519
Отипакс	544
Реницин	614
Рибомунил	619
Ровамицин	625
Ромазулан	627
Солексин	
Солексин-КИД	
Солексин-Форте	658
Стандациллин	667
Сулотрим	674
Сульфадиметоксин	675
Сумамед	677
Таривид	687
Уназин	734
Фелексин	746
Флуклоксациллин	759
Фурацилин	770
Цефаклен	785
Ципринол	795
Цифлоксиал	803
Эрмицед	826

11.5. Снижение остроты слуха

Агапурин	106
Вазонит	207
Винпоцетин	223
Кавинтон	361
Предуктал	586
Трентал	716
Трентал 400	716

12. Заболевания ПОЛОСТИ РТА

12.1. Гингивит

Амоксиклав	135
Бонафтон	194
Вокара	231
Гексадрепс	241
Гексализ	241
Гексорал	243
Гипозоль	256
Медазол	459
Мундизал гель	495
Ноготков цветки	524
Орунгал	541
Пансорал	549
Пародиум	554
Пиралвекс	570
Повидон-йод	576
Пропосол	592
Ромазулан	627
Солкосерил	659
Солкосерил дентал адгезивная паста	659
Стопангин	669

Тантум Верде	686
Траумель С	714
Эльгидиум	811
Эльгифлуор	811
Элюгель	811
Элюдрил	812
Эрмицед	826

12.2. Гиперсаливация

Вокара	231
Метацин	467

12.3. Инфекции вирусные полости рта

Бонафтон	194
Вокара	231
Календулы настойка	361
Ноготков цветки	524

12.4. Кариес зубов

Брустан	204
Лизоплак	435
Сенсигель	646
Шайни	804
Эльгидиум	811
Эльгифлуор	811

12.5. Отслойка десневого края

Лизоплак	435
Мундизал гель	495
Септолете	646

12.6. Пародонтит

Амоксиклав	135
Витамин Е Словакофарма	227
Гексадрепс	241
Гексализ	241
Гипозоль	256
Мундизал гель	495
Ноготков цветки	524
Пансорал	549
Пленка с линкомицином	574
Пропосол	592
Солкосерил	659
Солкосерил дентал адгезивная паста	659
Стопангин	669
Траумель С	714
Элюдрил	812

12.7. Пародонтоз

Витамин Е Словакофарма	227
Гексорал	243
Гипозоль	256
Гумизоль	270
Кальцитрин	366
Лизоплак	435
Мундизал гель	495
Порталак	582
Стопангин	669
Траумель С	714

Тыквеол	728
Эльгидиум	811
Эндур-Е 200	817

12.8. Повреждения зубной эмали

Сенсигель	646
Эльгифлуор	811

12.9. Пульпит

Пропосол	592
Тантум Верде	686

12.10. Стоматит

Амоксиклав	135
Вокара	231
Гексадрепс	241
Гексализ	241
Гексорал	243
Гипозоль	256
Декарис	278
Доксициклин	310
Ингалипт	342
Лизоплак	435
Мундизал гель	495
Ноготков цветки	524
Орунгал	541
Пансорал	549
Пантенол	549
Пиралвекс	570
Повидон-йод	576
Пропосол	592
Ромазулан	627
Септолете	646
Солкосерил	659
Солкосерил ден- тал адгезивная паста	659
Стопангин	669
Тантум Верде	686
Трансамча	714
Фарингосепт	742
Фурацилин	770
Элюдрил	812

12.10.1. Стоматит герпетический

Бонафтон	194
Солкосерил	659
Солкосерил ден- тал адгезивная паста	659

13. Заболевания СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

13.1. Ангипатия

Доксиум	309
Никошпан	509
Пентамон	558
Редергин	611
Танакан	685
Эндурацин	817

13.1.1. Ангипатия диабетическая

Агапурин	106
Вазонит	207
Дартелин	275
Дицинон	307
Доксилек	309
Доксиум	309
Изодибут	330
Кальция добезилат	367
Компламин	403
Ксантинола нико- тинат	416
Липостабил	440
Мидокалм	476
Никотиновая кис- лота	509
Пентамон	558
Радомин	601
Солкосерил	659
Танакан	685
Трентал	716
Трентал 400	716
Цинедил	792
Циннаризин	793
Циннасан	794
Этамзилат	831

13.2. Атеросклероз

Аллитера	119
Антисклерин	143
Аспифат	157
Буерлецитин	205
Витрум Атеролитин ..	229
Йода спиртовой раствор	359
Квадевит	380
Квестран	381
Компливит	403
Липоевая кислота	440
Морская капуста	490
Никотиновая кис- лота	509
Пармидин	554
Пентамон	558
Пепонен	559
Поливит гериатрик ..	578
Сант-Е-гал	638
Струмель	673
Тыквеол	728
Убихинон компози- тум	729
Уолш поливит для взрослых	735
Уолш поливит для детей	736
Церебрум компози- тум	784
Эндур-ВМ	816
Эспа-липон	828

13.2.1. Атероскле- роз периферичес- ких сосудов

Агапурин	106
Аевит	110
Вазонит	207
Компламин	403
Ксантинола нико- тинат	417
Липостабил	440
Никошпан	509
Пармидин	554
Пентамон	558
Трентал	716
Трентал 400	716
Флекситал	755
Цинедил	792
Циннарон	793
Эндурацин	817

13.2.2. Атероскле- роз сосудов мозга

Аминалон	131
Антисклерин	143
Вазонит	207
Винпоцетин	223
Гаммалон	237
Дартелин	275
Инстенон	347
Кавинтон	361
Ксантинола нико- тинат	417
Липостабил	440
Мемоплант	462
Пармидин	554
Стугерон	674
Трентал	716
Трентал 400	716
Убихинон компози- тум	729
Церебрум компози- тум	784
Циннаризин	793
Циннарон	793

13.2.3. Атероскле- роз сосудов сердца

Компламин	403
Липамид	439
Липостабил	440
Мевакор	457
Никошпан	509
Пармидин	554
Струмель	673

13.3. Варикозное расширение вен

Агапурин	106
Анавенол	138
Аспифат	157
Вазонит	207
Венза	212
Венитан	212
Венорутон	212
Венорутон форте	212
Гепатромбин	250

Доксилек	309	Капотен	372	Каверил	360
Индерал	343	Коргард	409	Капотен	372
Лиотон 1000	438	Моноприл	487	Каптопрес	373
Репарил-гель Н	616	Нитроджект	514	Кардил	378
Солкосерил	659	Нобритем	520	Катопил	379
Стиламин	669	13.5.1. Гипертензия			399
Траумель С	714	артериальная			399
Тромбовар	726	Адалат	107	Козаар	401
Ультралан	732	Адалат СЛ	108	Корандил	407
Фибро-Вейн	753	Адельфан-Эзидрекс ...	108	Корвалол	408
Цикло 3 крем	788	Аквафор	112	Корвитол	408
Цикло 3 форт	788	Аккупро	112	Кордафлекс	410
Циннасан	794	Алдизем	117	Кордипин	411
Эскузан	827	Алкадил	118	Кордипин XL	411
Эскулюс компози-		Аллитера	119	Кордипин-ретард	411
тум	827	Алтиазем РР	122	Корнам	411
13.4. Гиперлипиде-		Альдактон	123	Кортиазем	412
мия		Амазол	127	Кралонин	414
Аллитера	119	Аминалон	131	Лазикс	420
Безалип	169	Анаприлин	139	Лазилактон	421
Буерлецитин	205	Апрессин	147	Лекоптин	430
Гепар композитум	248	Арифон	148	Локрен	442
Гепарин	248	Аспифат	157	Магния сульфат	449
Компливит	403	Атенобене	158	Модуретик	485
Липанор	439	Атенолан	159	Моэкс	491
Липомал	440	Атенолол	159	Нитро	512
Липостат	440	Атеносан	159	Нифадил	517
Мевакор	457	Ацекор*	161	Нифедикор	517
Пепонен	559	Аценозин	161	Нифекард	518
Цитрат бетаина		Берлиприл 5	180	Нифелат	518
Бофур	802	Беталок	183	Нифелат Q	518
Эндур-Е 200	817	Бромазепам Ланна-		Нифелат Р	518
Эндурацин	817	хер	197	Норваск	526
13.4.1. Гипертригли-		Бутироксан	206	Обзидан	530
церидемия		Вазокардин	207	Ормидол	536
Бетаин цитрат		Валосердин	209	Памид	548
УПСА	183	Велорин	211	Папазол	551
Зокор	324	Верапамил	215	Плендил	574
Компламин	403	Верапамила гид-		Позикор	577
Липанор	439	рохлорид	217	Празозин	583
Липостабил	440	Верошпирон	218	Престариум	587
Липостат	440	Вискалдикс	225	Принорм	587
Никотиновая кис-		Вискен	225	Пумпан	600
лота	509	Галиум-Хель	235	Пустырника на-	
13.4.2. Гиперхолес-		Гаммалон	237	стойка	601
теринемия		Гизаар	253	Пустырника трава	
Антисклерин	143	Гипотиазид	256	резано-прессован-	
Бекунис легкий	172	Гоптен	265	ная	601
Бетаин цитрат		Дибазол	290	Редергин	611
УПСА	183	Дилакор XR	299	Ренитек	614
Гуарем	269	Дилтиазем гидрох-		Санфидипин	639
Зокор	324	лорид	299	Сбор успокоитель-	
Квестран	381	Дилтиазем Ланна-		ный N 3	641
Компламин	403	хер	300	Сектраль	643
Лескол	432	Дильрен	300	Синепрес	653
Липанор	439	Допегит	312	Спинонол	665
Липомал	440	Изоптин	333	Спониф 10	665
Липостабил	440	Изоптин SR 240	334	Стамло	667
Липостат	440	Изоптин СР	334	Струмель	673
Мевакор	457	Инворил	342	Тензиомин	690
13.5. Гипертензия		Индап	342	Тенормин	690
Анаприлин	139	Индапамид	343	Тиакем	694
Капозид	371	Индапсан	343	Тонокардин	708
		Индерал	343	Тразикор	710
				Триам-ко	718

Тримепранол	722
Тритаце	724
Тромбо АСС	726
Урактон	737
Финоптин	753
Фуросемид	770
Фуросемид Ланна- хер	771
Фурсемид	772
Цинт	794
Эднит	807
Эналаприл	813
Энам	813
Энап	813
Энап НL	815
Энап-5	813
Энап-Н	815
Эпситрон	825

13.5.2. Гипертензия гиперкинетическая

Атенобене	158
Атенолан	159
Бромэргон	200
Вискен	225
Инворил	342
Корвитол	408
Памид	548
Тразикор	710
Тримепранол	722

13.5.3. Гипертензия малого круга кровообращения

Вентакс	213
Изомонат	332
Кардикс	377
Ретафил	617
Спониф 10	665
Тримепранол	722
Эуфиллин	834

13.5.4. Гипертонический криз

Адалат	107
Апрессин	147
Верапамил	216
Клофелин	399
Кордипин	411
Кордипин XL	411
Кордипин-ретард	411
Лекоптин	430
Нифадил	517
Нифекард	518
Пентамин	558
Перлингнит	560
Пирроксан	572
Санфидипин	639
Спониф 10	665
Фуросемид	770
Фуросемид Ланна- хер	771
Фурсемид	772

13.6. Гиповолемия

Добутрекс	307
Перфторан	562

Раствор Натрия хлорида 0,9%	604
Раствор Натрия хлорида с глюко- зой 5%	604
Раствор Рингера	605
Раствор Хартмана	605
Рефортан	618
Стабизол	666

13.7. Гипотензия артериальная

Женьшеня настой- ка	317
Раствор Рингера	605
Эфедрина гидрох- лорид	835

13.7.1. Гипотензия артериальная ортостатическая

Дитамин	305
---------------	-----

13.8. Диагностика

13.8.1. Ангиография

Йодамид 300 и 380 ...	359
Триомбраст	723
Ультравист-240, 300, 370	731
Урографин	738

13.8.2. Ангиокардиография

Йодамид 300 и 380 ...	359
Триомбраст	723

13.8.3. Флебография

Триомбраст	723
Ультравист-240, 300, 370	731
Этиотраст	832

13.8.4. Эхокардиография

Эховист-200	838
-------------------	-----

13.9. Дистония вегето-сосудистая

Адонис-бром	110
Амол	136
Анаприлин	139
Атенолан	159
Боярышника на- стойка	195
Валерианы настой- ка	208
Валидол	208
Кардиплант	378
Корвалдин	408
Кралонин	414
Ново-Пассит	522
Обзидан	530
Пентамон	558
Пикамилон	564
Пумпан	600
Пустырника на- стойка	601

Пустырника трава резано-прессован- ная	601
Сбор успокоитель- ный N 3	641

13.10. Заболевания артерий

13.10.1. Заболевания артерий окклюзионные

Вазонит	207
Галидор	235
Гепарин	249
Дартелин	275
Ксантинола нико- тинат	416
Мидокалм	476
Никошпан	509
Пентамон	558
Спониф 10	665
Стрептаза	671
Стугерон	674
Танакан	685
Трентал	716
Трентал 400	716
Цинедил	792
Эндур-Е 200	817
Эндурацин	817
Эскулюс компози- тум	827

13.10.2. Нарушения периферического кровообращения

Агапурин	106
Апизартрон	144
Вазонит	207
Галидор	235
Дартелин	275
Мемоплант	462
Никошпан	509
Пентамон	558
Радомин	601
Спониф 10	665
Стугерон	674
Тиклид	698
Трентал	716
Трентал 400	716
Фосфобин	765
Цинедил	792
Циннаризин	793
Циннарон	793
Циннасан	794
Эндурацин	817
Эскулюс компози- тум	827

13.10.3. Синдром Рейно

Агапурин	106
Адалат	107
Вазонит	207
Дартелин	275
Компламин	403

Ксантинола никотинат	416
Мемоплант	462
Мидокалм	476
Никошпан	509
Пентамон	558
Радомин	601
Санфидипин	639
Спаскупрель	664
Спониф 10	665
Стугерон	674
Танакан	685
Тиклид	698
Трентал	716
Трентал 400	716
Флекситал	755
Фосфобион	765
Цинедил	792
Циннарон	793
Циннасан	794
Эндурацин	817
Эскулюс компози- тум	827

13.10.4. Спазм периферических артерий

альфа-Токоферола ацетат	125
Галидор	235
Дартелин	275
Дибазол	290
Дротаверина гид- рохлорид	314
Никотиновая кис- лота	509
Никошпан	509
Но-шпа	520
Павестезин	546
Папаверина гид- рохлорид	551
Пентамин	558
Спаскупрель	664
Фенобарбитал	749
Циннарон	793
Эндурацин	817

13.10.5. Тромбангит облитерирующий

Вазaproстан	206
Дартелин	275
Ксантинола никотинат	416
Мидокалм	476
Спаскупрель	664
Тиклид	698
Фосфобион	765
Цинедил	792
Эскулюс компози- тум	827

13.10.6. Эндартерит облитерирующий

Агапурин	106
Аевит	110
Вазaproстан	206
Вазонит	207

Дартелин	275
Компламин	403
Ксантинола никотинат	416
Никошпан	509
Папаверина гид- рохлорид	551
Пентамон	558
Солкосерил	659
Тиклид	698
Флекситал	755
Фосфобион	765
Циннаризин	793
Эндур-Е 200	817
Эндурацин	817
Эскулюс компози- тум	827

13.11. Заболевания вен

Пентамон	558
Солкосерил	659

13.11.1. Недостаточность венозного кровообращения

Вазонит	207
Венза	212
Венитан	212
Венорутон	212
Венорутон форте	212
Гинкор форт	255
Детралекс	285
Доксилек	309
Доксиум	309
Цикло 3 крем	788
Эндотелон	816
Эскузан	827
Эскулюс компози- тум	827
Эссавен	829

13.11.2. Перифлебический поверхностный

Лиотон 1000	438
Репарил-гель Н	616
Фастум	745

13.11.3. Преварикозный синдром

Анавенол	138
Гепальпан	247
Доксилек	309
Цикло 3 крем	788
Эскулюс компози- тум	827

13.11.4. Тромбофлебит

Анавенол	138
Аспирин плюс С	155
Венза	212
Гепарин	248
Гепариновая мазь	250
Гумизоль	270
Ксантинола никотинат	416

Лиотон 1000	438
Фенилин	748

13.11.4.1. Тромбофлебит поверхностных вен

Аспизол	153
Гепальпан	247
Гепариновая мазь	250
Гепатромбин	250
Доналгин	312
Кальция добезилат	367
Колфарит	402
Ксантинола никотинат	417
Репарил-гель Н	616
Эссавен	829

13.11.5. Флебит

Венза	212
Гепальпан	247
Гепариновая мазь	250
Лиотон 1000	438
Нифлурил	519
Фастум	745
Эскузан	827

13.11.5.1. Постфлебитный синдром

Венза	212
Гепальпан	247
Пентамон	558
Радомин	601
Эскузан	827

13.12. Ишемическая болезнь сердца

Адалат	107
Адалат СЛ	108
Алдизем	117
Алтиазем РР	122
Анаприлин	139
Аспирин плюс С	155
Атенолан	159
Атенолол	159
Ацекор	161
Беталок	183
Вазокардин	207
Верапамил	215
Витрум Витамин Е	230
Галидор	235
Депонит 5, 10	282
Дипиридамол	302
Зильден	319
Зокор	324
Изоптин	333
Изоптин SR 240	334
Изоптин СР	334
Инозие-Ф	346
Калия глутаминат	363
Корвитол	408
Кордафлекс	410
Коэнзим компози- тум	413
Кралонин	414
Лидокаин	434
Липостат	440

Монизол	485	Нитроминт	515	Корвалдин	408
Моночинкве	489	Перлинганит	560	Корвалол	408
Моночинкве ретард ..	489	Стрептаза	671	Корватон	408
Неотон	505	Тромбо АСС	726	Корвитол	408
Нифедикор	517	13.12.1.2. Последни-		Коргард	409
Норваск	526	фарктный период		Кордафлекс	410
Обзидан	530	Алтиазем РР	122	Кордипин	411
Парседил	554	Зильден	319	Кордипин XL	411
Плендил	574	Изо Мак ретард	329	Кордипин-ретард	411
Ренитек	614	Индерал	343	Кортиазем	412
Рибоксин	619	Капотен	372	Липостабил	440
Рикавит	620	Кардикс	377	Милдронат	480
Убихинон компози-		Кардикс Моно	377	Монолонг	486
тум	729	Корвитол	408	Мононит	487
Фосфобион	765	Курантил N 25	418	Моночинкве	489
Эндур-Е 200	817	Липостабил	440	Моночинкве ретард ..	489
Эндурацин	817	Моночинкве	489	Неотон	505
Эринит	826	Моночинкве ретард ..	489	Нит-рет	510
Эскулюс компози-		Нифедикор	517	Нитрадиск	511
тум	827	Ормидол	536	Нитро	512
Эфокс	836	Тримепранол	722	Нитро-дур	513
Эфокс лонг	836	Тритаце	724	Нитроглицерин	514
13.12.1. Инфаркт		Финоптин	753	Нитроджект	514
миокарда		Эндурацин	817	Нитроминт	515
Аспаркам	153	Эскулюс компози-		Нитронг	516
Аспирин	154	тум	827	Нитроперкутен	
Аспирин УПСА	155	13.12.2. Стенокар-		ТТС	516
Аспирин УПСА с		дия		Нитросорбид	516
витамином С	156	Адалат	107	Нифадил	517
Аспифат	157	Адалат СЛ	108	Нифедикор	517
Велорин	211	Алдизем	117	Нифекард	518
Гепарин	249	Алтиазем РР	122	Нифелат	518
Гидрокортизон	252	Анаприлин	139	Нифелат Q	518
Изомонат	332	Аспаркам	153	Нифелат Р	518
Изоптин	333	Атенобене	158	Норваск	526
Калия-магния-аспа-		Атенолан	159	Обзидан	530
рагинат	363	Атенолол	159	Ормидол	536
Колфарит	402	Атеносан	159	Папаверина гид-	
Корвитол	408	Беталок	183	рохлорид	551
Курантил	417	Валидол	208	Пентакард-10, 20,	
Курантил N 25	418	Валидол с глюко-		40	557
Курантил N 75	418	зой	209	Предуктал	586
Милдронат	480	Велорин	211	Принорм	587
Нирмин	510	Верапамил	215	Пумпан	600
Нитро	512	Верапамил гидрох-		Рибоксин	619
Рибасан форте	618	лорид	217	Санфидипин	639
Рибоксин	619	Верапамила гид-		Седокард-ретард	642
Тенормин	690	рохлорид	217	Сектраль	643
Тиклид	698	Вискен	225	Сустанк форте	679
Тромбо АСС	726	Депонит 5, 10	282	Тиакем	694
Энам	813	Дилакор XR	299	Тразикор	710
13.12.1.1. Инфаркт		Дилтиазем гидрох-		Финоптин	753
миокарда острый		лорид	299	Эндурацин	817
Аспирин Кардио	154	Дилтиазем Ланна-		Эринит	826
Гепарин	248	хер	300	Эфокс	836
Добутрекс	307	Зильден	319	Эфокс лонг	836
Изокет	331	Изолонг	332	13.12.2.1. Стенокар-	
Кардикет	376	Изомонат	332	дия коронароспасти-	
Корвитол	408	Изоптин	333	ческая	
Нирмин	510	Изоптин SR 240	334	Адалат	107
Нитро Поль инфуз	512	Изоптин СР	334	Валосердин	209
Нитроджект	514	Индерал	343	Верапамил	216
Нитролингвал-		Инозие-Ф	346	Дибазол	290
Аэрозоль	515	Кардил	378	Дротаверина гид-	

рохлорид	314	Монизол.....	485	Обзидан.....	530
Изо Мак ретард.....	329	Монолонг.....	486	Ормидол.....	536
Изокет.....	331	Нитро-Мак ретард.....	513	Санфидипин.....	639
Изолонг.....	332	Нитроглицерин.....	514	Тримепранол.....	722
Каверил.....	360	Нитроджект.....	514	13.13.2. Кардио-склероз	
Кардикет.....	376	Нитролингвал-Аэрозоль.....	515	Аспаркам.....	153
Кардикс.....	377	Нитроперкутен		Липамид.....	439
Кардикс Моно.....	377	ТТС.....	516	Неотон.....	505
Корвалол.....	408	Тримепранол.....	722	13.13.3. Миокардио-дистрофия	
Кордипин.....	411	Эндурацин.....	817	альфа-Токоферола	
Кордипин XL.....	411	Эфокс.....	836	ацетат.....	125
Кордипин-ретард.....	411	Эфокс лонг.....	836	Анаприлин.....	139
Лекоптин.....	430	13.12.2.4. Стенокар-дия стабильная		Аспаркам.....	153
Монизол.....	485	Адалат.....	107	Инозие-Ф.....	346
Монолонг.....	486	Адалат СЛ.....	108	Калия оротат.....	363
Нирмин.....	510	Аспаркам.....	153	Пумпан.....	600
Нитро-Мак ретард.....	513	Велорин.....	211	Рибоксин.....	619
Нитроглицерин.....	514	Верапамил.....	216	13.14. Нарушения возбудимости, проводимости и автоматизма сердца	
Нитролингвал-Аэрозоль.....	515	Изо Мак ретард.....	329	Анаприлин.....	139
Нитроперкутен		Изолонг.....	332	Ацекор.....	161
ТТС.....	516	Каверил.....	360	Беталок.....	183
Норваск.....	526	Кардикс.....	377	Дифенин.....	305
Спаскупрель.....	664	Кардикс Моно.....	377	Индерал.....	343
Спониф 10.....	665	Корватон.....	408	Инозие-Ф.....	346
Стамло.....	667	Курантил N 25.....	418	Калия глутаминат.....	363
13.12.2.2. Стенокар-дия нестабильная		Лекоптин.....	430	Калия-магния-аспа-рагинат.....	363
Аспаркам.....	153	Монизол.....	485	Коргард.....	409
Аспирин Кардио.....	154	Монолонг.....	486	Кордарон.....	409
Велорин.....	211	Нитро-Мак ретард.....	513	Лидокаин.....	434
Верапамил.....	216	Нитроглицерин.....	514	Принорм.....	587
Изокет.....	331	Нитролингвал-Аэрозоль.....	515	Рикавит.....	620
Изолонг.....	332	Нитроперкутен		Седакорон.....	642
Каверил.....	360	ТТС.....	516	Соталекс.....	662
Кардикет.....	376	Норваск.....	526	13.14.1. Аритмии желудочковые	
Кардикс.....	377	Позикор.....	577	Анаприлин.....	139
Кардикс Моно.....	377	Спониф 10.....	665	Вазокардин.....	207
Корватон.....	408	Стамло.....	667	Велорин.....	211
Монизол.....	485	Тримепранол.....	722	Калинор.....	362
Монолонг.....	486	Эндурацин.....	817	Лидокаин.....	434
Нирмин.....	510	13.13. Кардиомиопатия		Панангин.....	548
Нитро.....	512	Инозие-Ф.....	346	Профенан.....	597
Нитро Поль инфуз.....	512	Корвитол.....	408	Соталекс.....	662
Нитро-Мак ретард.....	513	Коэнзим компози-тум.....	413	Тримепранол.....	722
Нитроглицерин.....	514	Кралонин.....	414	13.14.1.1. Аритмии на фоне дигиталис-ной интоксикации	
Нитроджект.....	514	Неотон.....	505	К-Дур.....	360
Нитролингвал-Аэрозоль.....	515	Рибоксин.....	619	Калинор.....	362
Нитроперкутен		Рикавит.....	620	Калия глутаминат.....	363
ТТС.....	516	Тензиомин.....	690	Корапейс.....	407
Обзидан.....	530	Тиклид.....	698	Лидокаин.....	434
Перлинганил.....	560	13.13.1. Кардиомиопатия гипертрофи-ческая обструк-тивная		Лидокаина гидрох-лорид.....	435
Седакорон.....	642	Адалат.....	107	Рибоксин.....	619
Тримепранол.....	722	Анаприлин.....	139		
13.12.2.3. Стенокар-дия после инфаркта		Верапамил.....	216		
Аспаркам.....	153	Индерал.....	343		
Велорин.....	211	Лекоптин.....	430		
Изо Мак ретард.....	329				
Изолонг.....	332				
Кардикс.....	377				
Кардикс Моно.....	377				
Корватон.....	408				

Тримепранол	722
Унитиол	735

13.14.2. Аритмии наджелудочковые

Аденокор	109
Алдизем	117
Анаприлин	139
Атенолан	159
Беталок	183
Вазокардин	207
Велорин	211
Верапамил	215
Вискен	225
Дароб	275
Дигоксин	292
Дилтиазем гидрох- лорид	299
Дилтиазем Ланна- хер	300
Кардил	378
Кордарон	409
Кортиазем	412
Ормидол	536
Панангин	548
Профенан	597
Соталекс	662
Тримепранол	722

13.14.2.1. Аритмии при WPW-синдроме

Аденокор	109
Дароб	275
Корапейс	407
Кордарон	409
Профенан	597
Ритмонорм	622
Седакорон	642
Соталекс	662

13.14.2.2. Аритмия мерцательная

Боярышника на- стойка	195
Верапамил	216
Дигоксин	292
Изоптин SR 240	334
Изоптин СР	334
Каверил	360
Калия оротат	363
Седакорон	642
Сектраль	643

13.14.2.3. Аритмия мерцательная парок- сизмальная

Верапамил гидрох- лорид	217
Верапамила гид- рохлорид	217
Дароб	275
Дигоксин	292
Изоптин SR 240	334
Изоптин СР	334
Соталекс	662
Этацизин	831
Этмозин	832

13.14.2.4. Аритмия мерцательная тахи- систолическая

Верапамил гидрох- лорид	217
Верапамила гид- рохлорид	217
Дигоксин	292
Изоптин	333
Ланатозид Ц	425
Лекоптин	430
Ритмонорм	622
Строфантин-Г	673

13.14.3. Брадикар- дия

Галидор	235
Финоптин	753

13.14.4. Тахикардия желудочковая

Велорин	211
Дароб	275
Корапейс	407
Корвитол	408
Кордарон	409
Лидокаин	434
Лидокаина гидрох- лорид	435
Нобритем	520
Ормидол	536
Профенан	597
Ритмонорм	622
Этацизин	831

13.14.4.1. Тахикар- дия желудочковая пароксизмальная

Кинидин дурулес	389
Корапейс	407
Ритмонорм	622
Седакорон	642
Этмозин	832

13.14.5. Тахикардия наджелудочковая

Анаприлин	139
Атенобене	158
Атеносан	159
Беталок	183
Валосердин	209
Дароб	275
Дилтиазем Ланна- хер	300
Каверил	360
Корвалдин	408
Корвалол	408
Корвитол	408
Нобритем	520
Ормидол	536
Профенан	597
Ритмонорм	622
Строфантин-Г	673
Финоптин	753

13.14.5.1. Тахикар- дия наджелудочно- вая

Аденокор	109
Беталок	183
Боярышника на- стойка	195
Верапамил	215
Дигоксин	292
Кинидин дурулес	389
Корапейс	407
Ланатозид Ц	425
Лекоптин	430
Новодигал	522
Ритмонорм	622
Седакорон	642
Соталекс	662
Фосфобин	765

13.14.5.2. Тахикар- дия синусовая

Атенобене	158
Атенолан	159
Атенолол	159
Атеносан	159
Валосердин	209
Велорин	211
Лекоптин	430
Ритмонорм	622
Соталекс	662
Тенормин	690

13.14.6. Трепетание предсердий

Беталок	183
Верапамил	216
Дигоксин	292
Дилтиазем Ланна- хер	300
Корапейс	407
Лекоптин	430
Седакорон	642
Сектраль	643
Строфантин-Г	673

13.14.7. Экстрасис- толия

Изоптин	333
Калия оротат	363
Кордарон	409
Лидокаина гидрох- лорид	435
Профенан	597
Пумпан	600
Тразикор	710

13.14.7.1. Экстра- систолия желудоч- ковая

Анаприлин	139
Велорин	211
Кинидин дурулес	389
Корапейс	407
Кордарон	409
Лидокаин	434

Лидокаина гидрохлорид	435
Профенан	597
Риталмекс	621
Ритмонорм	622
Седакорон	642
Сектраль	643
Тразикор	710
Этацизин	831
Этмозин	832

13.14.7.2. Экстрасистолия наджелудочковая

Анаприлин	139
Велорин	211
Верапамил	215
Верапамил гидрохлорид	217
Верапамила гидрохлорид	217
Дилтиазем Ланнахер	300
Корапейс	407
Кордарон	409
Лекоптин	430
Профенан	597
Ритмонорм	622
Седакорон	642
Сектраль	643
Тразикор	710
Финоптин	753
Этмозин	832

13.15. Недостаточность артериовенозного кровообращения

Гинкор форт	255
Добутрекс	307
Кальция добезилат	367
Флекситал	755
Цикло 3 форт	788
Циннасан	794

13.16. Недостаточность лимфатического кровообращения

Лимфомиозот	437
Цикло 3 крем	788
Цикло 3 форт	788

13.17. Отечный синдром

Альдактон	123
Буфенокс	206
Гипотиазид	256
Дианил	289
Лимфомиозот	437
Модуретик	485
Памид	548
Спироаксан	664
Спиронол	665
Триам-ко	718
Урактон	737
Урегит	738

Фурезис компози-тум	770
Фуросемид	770
Фуросемид Ланнахер	771
Цикло 3 крем	788
Эуфиллин	834
Эуфилонг	835

13.17.1. Анасарка

Лазикс	420
Фуросемид	770
Фурсемид	772

13.17.2. Отек легких

Дексазон	278
Лазикс	420
Нитро Поль инфуз	512
Пентамин	558
Фуросемид	770
Фуросемид Ланнахер	771
Фурсемид	772

13.17.3. Отеки периферические

Аквафор	112
Верошпирон	218
Диклонат П	296
Лазикс	420
Лазилактон	421
Модуретик	485
Нифлурил	519
Памид	548
Спиронол	665
Триам-ко	718
Урактон	737
Фуросемид	770
Фурсемид	772
Эндотелон	816
Эскузан	827

13.18. Перикардит

V-Пенициллин	842
Словакофарма	842
Пенициллин G натриевая соль	555
Реопирин	615

13.19. Повышенная проницаемость сосудов

Аскорутин	152
Викасол	220
Доксиум	309
Кальция глюконат	367

13.20. Ревмокардит

Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Ацесал	162
Ацетилсалициловая кислота	162
Витамин E Словакофарма	227
Дексазон	278
Индометацин	345

Ортофен	540
Преднизолон	585
Профенид	597
Профенид гель 2,5%	597
Ронал	627
Триамцинолон	718
Целестон	782
Экстенциллин	809
Эндур-Е 200	817

13.21. Сердечная недостаточность

Адонис-бром	110
Алкадил	118
Апрессин	147
Берлиприл 5	180
Дигоксин	292
Добутрекс	307
Допмин	313
Инворил	342
Калия-магния-аспарагинат	363
Кальция пантотенат	368
Капотен	373
Кардиплант	378
Квадевит	380
Корнам	411
Кофеин-бензоат натрия	412
Липамид	439
Мононит	487
Нитро-Мак ретард	513
Нитросорбид	516
Празозин	583
Престариум	587
Пумпан	600
Ренитек	614
Рикавит	620
Спиронол	665
Строфантин-Г	673
Сульфокамфокаин	677
Урактон	737
Фурсемид	772
Энам	813
Эпситрон	825
Эфокс	836
Эфокс лонг	836

13.21.1. Легочно-сердечная недостаточность

Аминофиллин	132
Вентакс	213
Дигоксин	292
Изо Мак ретард	329
Ланатозид Ц	425
Сульфокамфокаин	677
Тенормин	690
Эуфиллин	834
Эуфилонг	835

13.21.2. Сердечная недостаточность левожелудочковая

Изокет	331
Изомонат	332
Кардикет	376
Кардикс	377
Кардикс Моно	377
Корватон	408
Нирмин	510
Нит-рет	510
Нитро Поль инфуз	512
Нитроминт	515
Нитроперкутен	
ТТС	516
Перлингнит	560
Фуросемид	770
Фуросемид Ланна-хер	771
Эуфиллин	834

13.21.3. Сердечная недостаточность острая

Добутрекс	307
Изокет	331
Изомонат	332
Кардикет	376
Морфина гидрохлорид	490
Нирмин	510
Нитро Поль инфуз	512
Нитролингвал	
Аэрозоль	515
Нитроминт	515
Омнопон	534
Перлингнит	560
Сульфокамфокаин	677

13.21.4. Сердечная недостаточность хроническая

Альдактон	123
Буфенокс	206
Дигоксин	292
Добутрекс	307
Изо Мак ретард	329
Инворил	342
Индап	342
Капотен	372
Кардикс	377
Кардикс Моно	377
Катопил	379
Корандил	407
Корнам	411
Курантил	417
Курантил N 25	418
Курантил N 75	418
Ланатозид Ц	425
Милдронат	480
Монизол	485
Нит-рет	510
Нитрадиск	511
Нитро-дур	513
Нитроджект	514

Новодигал	522
Спиронаксан	664
Сульфокамфокаин	677
Тензиомин	690
Триам-ко	718
Тритаце	724
Фуросемид	770
Фуросемид Ланна-хер	771
Эднит	807
Эналаприл	813
Энап	813
Энап-5	813

13.22. Тромбоз артерий

Аспизол	153
Аспирин	154
Аспирин Кардио	154
Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Аспифат	157
Ацетилсалициловая кислота	162
Гепарин	248
Гепарин Биохеми	249
Кальципарин	366
Колфарит	402
Компламин	403
Ксантинола никотинат	416
Курантил	417
Курантил N 25	418
Курантил N 75	418
Парседил	554
Рибасан форте	618
Синкумар	654
Тромбо АСС	726
Укидан	729
Фенилин	748

13.22.1. Тромбоз артерий периферических

Гепарин	248
Гепатромбин	250
Стрептаза	671

13.23. Тромбоз венозный

Аспизол	153
Аспирин	154
Аспифат	157
Гепарин	248
Гепарин Биохеми	249
Кальципарин	366
Клексан	391
Кливарин	392
Колфарит	402
Курантил	417
Курантил N 25	418
Курантил N 75	418
Парседил	554
Рибасан форте	618
Синкумар	654

Стрептаза	671
Тромбо АСС	726
Укидан	729
Фенилин	748
Флуksум	760
Фраксипарин	766

13.23.1. Тромбоз вен геморроидальных

Гепариновая мазь	250
------------------------	-----

13.24. Тромбоэмболия

Аспизол	153
Аспирин	154
Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Аспифат	157
Гепарин	248
Гепарин Биохеми	249
Дипиридамол	302
Кальципарин	366
Клексан	391
Кливарин	392
Колфарит	402
Компламин	403
Курантил N 25	418
Липостабил	440
Парседил	554
Синкумар	654
Стрептаза	671
Тромбо АСС	726
Укидан	729
Фенилин	748
Фраксипарин	766

13.24.1. Эмболия жировая

Липостабил	440
------------------	-----

13.25. Шок

Гидрокортизон	252
Гордокс	266
Допмин	313
Дроперидол	314
Пентаглобин	556
Перфторан	562
Преднизолон	585
Раствор Рингера	605
Раствор Хартмана	605
Урбазон	737
Целестон	782

13.25.1. Шок анафилактический

Адреналина гидрохлорид	110
Метипред	468
Пипольфен	567
Сульфокамфокаин	677
Урбазон	737



13.25.2. Шок кардиогенный

Добутрекс	307
Сульфокамфокаин	677
Урбазон	737

13.25.3. Шок ожоговый

Плазма-Лит 148	
Водный Раствор	572
Урбазон	737

13.26. Эндокардит

Амикацин	129
Ампициллин	137
Бонцефин	195
Ванкоцин	210
Ванмиксан	210
Илозон	335
Кефзол	388
Линкомицина гид- рохлорид	438
Оспен	542
Оспен 750	542
Пенициллин G на- триевая соль	555
Пентрексил	558
Стандациллин	667
Флуклоксациллин	759
Цефазолин	785
Цефотаксим	786
Эдицин	806

13.26.1. Эндокардит септический

V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Абактал	105
Ампициллин	136
Ванмиксан	210
Грюнамокс	269
Доксициклина гид- рохлорид	310
Клиацил	392
Мегациллин орал.....	458
Медазол	459
Мефоксин	473
Оспамокс	542
Пенодил	556
Перти	562
Пефлацин	563
Тамицин	683
Тиенам	696
Тотацеф	709
Цефотаксим	787
Эдицин	806

14. Заболевания УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

14.1. Аднексит

Абактал	105
Вольтарен	232
Вольтарен рапид.....	232

Гинекохель	254
Диклобене	293
Дикломелан	295
Диклонат П	296
Диклофенак	297
Диклофенак-Ре- тард	298
Дифен	305
Доналгин	312
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Ибупрофен	327
Коэнзим компози- тум	413
Нифлурил	519
Норилет	527
Реопирин	615
Санапрокс	635
Цифлоксинал	803

14.2. Атония мочевого пузыря

Прозерин	589
----------------	-----

14.3. Бактериурия

Абактал	105
Амоксиклав	135
Зинацеф	320
Эхинацея компози- тум С	837

14.4. Баланопостит

Канестен	369
Пимафуцин	566

14.5. Бесплодие

Билем	186
Витрум Витамин Е	230
Гинекохель	254
Гормель С	267
Метродин	471
Метродин ВЧ	471
Тамоксифен	684
Эндур-Е 200	817

14.5.1. Бесплодие женское

Гонадотропин хо- рионический	264
Гонал-Ф	265
Данодиол	273
Данол	273
Декапептил	277
Декапептил-депо	277
Кломид	397
Клостилбегит	399
Мастодион	456
Меногон	463
Метродин	471
Метродин ВЧ	471
Новофен	524
Нон-Овлон	525
Парлодел	553
Пергонал	559
Профазин	596
Серофен	648
Синэстрол	655
Тамоксифен	684

Хорагон	777
Эгестренол	805
Этинилэстрадиол	832

14.5.2. Бесплодие мужское

Меногон	463
Пергонал	559
Тамоксифен	684
Хорагон	777

14.5.3. Бесплодие на фоне гиперпролактинемии

Абергин	106
Бромокриптин	199
Бромокриптин Поли	199
Бромэргон	200
Мастодион	456
Парлодел	553

14.6. Вагинит

Абактал	105
Амоксиклав	135
Батрафен	168
Бетадин	181
Бетадине	182
Гине-Лотримин	254
Гинекохель	254
Гино-дактанол	255
Гино-Травоген	256
Дафнеджин	276
Дифен	305
Клион-Д	397
Ликопид	436
Макмирор	451
Макмирор ком- плекс 500	451
Метилурациловая мазь	467
Мукоза компози- тум	492
Низорал	508
Ноготков цветки	524
Облепиховое масло ...	530
Орвагил	535
Пантоцид	550
Пимафуцин	566
Пливасепт	575
Повидон-йод	576
Солкотриховак	660
Суппозитории рек- тальные с эвкали- мином	678
Тантум Роза	686
Тержинан	692
Флагил	754
Фурагин	769
Цитеал	799
Экалин	807

14.7. Вульвит

Абактал	105
Амоксиклав	135
Батрафен	168
Бетадин	181

Гине-Лотримин	254
Гинекохель	254
Гино-дактанол	255
Гипозоль	256
Дифен	305
Канестен	369
Макмирор	451
Макмирор ком- плекс 500	451
Мукоза компози- тум	492
Ноготков цветки	524
Облепиховое масло ...	530
Пантоцид	550
Пимафуцин	566
Суппозитории рек- тальные с эвкали- мином	678
Фурагин	769
Цитеал	799

14.8. Вульвовагинит

Амоксиклав	135
Батрафен	168
Бетадин	181
Бифидумбактерин сухой	191
Гине-Лотримин	254
Гинекохель	254
Дафнеджин	276
Кандибене	369
Макмирор	451
Макмирор ком- плекс 500	451
Менорест	463
Мукоза компози- тум	492
Ноготков цветки	524
Пантоцид	550
Пимафуцин	566
Пливасепт	575
Суппозитории рек- тальные с эвкали- мином	678
Тержинан	692
Фурагин	769
Экалин	807

14.9. Гипоплазия**14.9.1. Дисгенезия
гонад (синдром Тер-
нера)**

Нон-Овлон	525
Нордитропин Пен- Сет	527
Хуматроп	778

**14.10. Диагностика
заболеваний уроге-
нитальных органов****14.10.1. Гистеро-
сальпингография**

Ультравист-240, 300, 370	731
-----------------------------------	-----

Урографин	738
Эховист-200	838

**14.10.2. Диагности-
ка заболеваний
почек и мочевыводя-
щих путей**

Йодамид 300 и 380 ...	359
Триомбраст	723

**14.10.3. Диагности-
ка заболеваний
почек****14.10.3.1. Компью-
терная томография**

Ультравист-240, 300, 370	731
Урографин	738

14.10.4. Урография

Йодамид 300 и 380 ...	359
Триомбраст	723
Ультравист-240, 300, 370	731
Урографин	738

14.11. Дизурия

Гентос	247
Проставерн Урти- ка ликвид	593
Туриплекс	728
Уротрактин	739
Цистрин	798

14.12. Дисменорея

альфа-Токоферола ацетат	125
Бромазепам Ланна- хер	197
Вольтарен	232
Вольтарен рапид	232
Гинекохель	254
Гонадотропин хо- рионический	264
Гормель С	267
Гумизоль	270
Данол	273
Диклобене	293
Диклонат П	296
Диклофен	297
Диклофенак	297
Ибупрофен Ланна- хер	328
Индовис ЕС	344
Индотард	346
Каффетин	380
Климен	394
Мастодион	456
Мексавит	461
Минизистон	482
Мирена	483
Наклофен	499
Наклофен Дуо	499
Новиган	521
Нон-Овлон	525
Пливалгин	575
Премарин	586

Примолют-Нор	587
Пронаксен	592
Ригевидон	620
Санапрокс	635
Санфинак	639
Спаскупрель	664
Три-регол	717
Цикло-Прогинова	788
Этинилэстрадиол	832

14.12.1. Аменорея

Витамин Е Слова- кофарма	227
Гонал-Ф	265
Клостилбегит	399
Микрофоллин форте	478
Оксипрогестерона капронат	531
Премарин	586
Примолют-Нор	587
Ременс	612
Серофен	648
Синэстрол	655
Цикло-Прогинова	788
Этинилэстрадиол	832

**14.12.2. Аменорея
вторичная**

Витамин Е Слова- кофарма	227
Декапептил	277
Декапептил-депо	277
Климен	394
Кломид	397
Клостилбегит	399
Лютрелеф	448
Примолют-Нор	587
Провирон-25	588
Ременс	612
Серофен	648

**14.12.3. Аменорея
пролактинзависимая**

Абергин	106
Бромокриптин	199
Бромокриптин Поли	199
Бромэргон	200
Парлодел	553
Серокриптин	648

**14.12.4. Олигомено-
рея**

Бромокриптин	199
Гонал-Ф	265
Кломид	397
Клостилбегит	399
Микрофоллин форте	478
Серофен	648

**14.12.5. Полимено-
рея**

Данодиол	273
Дицинон	307
Микрофоллин	

форте	478
Оксипрогестерона	
капронат	531
Ременс	612
Стресс формула с	
железом	672
Этамзилат	831

14.12.6. Укорочение секреторной фазы менструального цикла

Бромокриптин	
Поли	199
Норколут	528

14.13. Диспермия

14.13.1. Олигоспермия

Кломид	397
Клостилбегит	399
Лютрелеф	448
Пергонал	559
Провирон-25	588
Профазин	596
Хорагон	777

14.13.2. Сперматогенез стимуляция

Лютрелеф	448
Пергонал	559
Профазин	596
Хорагон	777

14.14. Затрудненное мочеиспускание

Биолайн Простейт	189
Гентос	247
Копривит	407
Корнам	411

14.15. Импотенция

альфа-Токоферола	
ацетат	125
Копривит	407
Кошачий Коготь	413
Леузея	433
Провирон-25	588
Эдекс	805

14.16. Инфекции урогенитальные

V-Пенициллин	
Словакофарма	842
Ампициллин	136
Ампициллин	
АМП-КИД	
АМП-Форте	137
Ампициллина натриевая соль кристаллическая	137
Берлоцид	180
Берлоцид 480	180
Берлоцид 960	180
Бонцефин	195
Гарамицин	238
Гентамицин	245

Гинекохель	254
Глауфос	259
Данемокс	273
Дардум	274
Доксилаан	308
Доксициклин	310
Заноцин	318
Зиндолин 250	320
Зиннат	321
Илозон	335
Кейтен	382
Кефадим	388
Кефзол	388
Клафоран	390
Коэнзим компози-	
тум	413
Лидаприм	433
Ликацин	435
Макропен	451
Максаквин	452
Максипим	453
Мефоксин	473
Моноклин	486
Нетромицин	506
Нитроксолин	514
Норилет	527
Оспамокс	542
Оспексин	542
Офрамекс	544
Палитрекс	547
Перти	562
Пипрацил	569
Ровамицин	625
Роксимизан	626
Рулид	631
Септрин	647
Септрин-форте	647
Стандациллин	667
Стрептоцид	672
Сумамед	677
Суппозитории рек-	
тальные с эвкали-	
мином	678
Таривид	687
Тиенам	696
Уназин	734
Уротрактин	739
Фелексин	746
Флемоксин Солю-	
таб	755
Цефазолин	785
Цефобид	786
Циклоферон	790
Ципролет	796
Ципросол	797
Ципрофлоксацина	
гидрохлорид	797
Эхинацея компози-	
тум С	837
Юнидокс Солютаб	838

14.16.1. Инфекции мочевыводящих путей

5-НОК	840
Абактал	105
Азактам	110
Амоксиклав	135
Амоксициллин	135
Ампициллин	137
Ампициллина три-	
гидрат	138
Антрима	144
Бактрим	167
Бассадол	168
Берлоцид	180
Берлоцид 480	180
Берлоцид 960	180
Биодроксил	187
Гентамицин	246
Гентамицина суль-	
фат	246
Гентос	247
Глауфос	259
Грюнамокс	269
Доксал	308
Доксициклин	309
Доксициклина гид-	
рохлорид	310
Дурацеф	315
Заноцин	318
Зинацеф	320
Канефрон	369
Кейтен	382
Климицин	395
Клиндамицин	396
Коэнзим компози-	
тум	413
Лендацин	432
Лонгацеф	443
Макмирор	451
Максаквин	452
Максипим	453
Мандол	454
Меронем	465
Модивид	483
Небцин	502
Нелорен	504
Нитазол	511
Нитроксолин	514
Нолицин	525
Норилет	527
Офрамекс	544
Палин	547
Палитрекс	547
Пенициллин G на-	
триевая соль	555
Пентрексил	558
Пефлацин	563
Пипрацил	569
Простафлин	593
Рифамор	623
Ромазулан	627
Роцефин	629
Сбора Бруснивер-	

Т брикет круглый.....	641	Пефлацин.....	563	Глауфос.....	259
Сулотрим.....	674	Пипрацил.....	569	Заноцин.....	318
Сульфадиметоксин.....	675	Роцефин.....	629	Кейтен.....	382
Сульфален.....	676	Тазоцин.....	680	Климицин.....	395
Суметролим.....	677	Тамицин.....	683	Лендацин.....	432
Суппозитории рек- тальные с эвкали- мином.....	678	Таривид.....	687	Нелорен.....	504
Таривид.....	687	Тотацеф.....	709	Нетромицин.....	506
Тотацеф.....	709	Цефаклен.....	785	Пефлацин.....	563
Тримопан.....	722	Цефобид.....	786	Роцефин.....	629
Тримосул.....	722	Цефотаксим.....	786	Сбора Бруснивер- Т брикет круглый.....	641
Уназин.....	734	Ципробай.....	796	Таривид.....	687
Уротрактин.....	739	Ципролет.....	796	Тотацеф.....	709
Фелексин.....	746	Ципрофлоксацина гидрохлорид.....	797	Тримосул.....	722
Флемоксин Солю- таб.....	755	Цитерал.....	800	Цефаклен.....	785
Флуклоксациллин.....	759	Цифлоксинал.....	803	Цефотаксим.....	786
Фортум.....	763	Цифран.....	803	Ципробай.....	796
Фурадонин.....	769	14.16.3. Инфекции половых органов ви- русные		Цифлоксинал.....	803
Цедекс.....	780	14.16.3.1. Герпес ге- нитальный		Энгистол.....	815
Цеклор.....	780	Ацикловир.....	164	14.16.6. Инфекции тазовой клетчатки	
Цефаклен.....	785	Ацикловир-Акри.....	164	Абактал.....	105
Цефобид.....	786	Ацикловир-Акри мазь.....	165	Амоксиклав.....	135
Цефотаксим.....	786	Валтрекс.....	209	Гентамицина суль- фат.....	246
Цинобак.....	794	Виролекс.....	224	Заноцин.....	318
Ципринол.....	795	Гевизош.....	240	Зинацеф.....	320
Ципробай.....	796	Лизавир.....	435	Климицин.....	395
Ципрофлоксацина гидрохлорид.....	797	Ребиф.....	607	Лендацин.....	432
Цистум Солидаго раствор.....	799	Цикловакс.....	789	Нелорен.....	504
Цитерал.....	800	Циклоферон.....	790	Пипрацил.....	569
Цифлоксинал.....	803	14.16.4. Инфекции послеродовые		Тамицин.....	683
Эноксор.....	818	Абактал.....	105	Таривид.....	687
Эхинацин ликви- дум.....	837	Амоксиклав.....	135	Тотацеф.....	709
14.16.2. Инфекции органов малого таза		Гентамицина суль- фат.....	246	Цефаклен.....	785
Абактал.....	105	Климицин.....	395	Цефотаксим.....	786
Амоксиклав.....	135	Лендацин.....	432	14.17. Климакс	
Бонцефин.....	195	Нелорен.....	504	Валерианахель.....	208
Гентамицина суль- фат.....	246	Нетромицин.....	506	Витамин Е Слова- кофарма.....	227
Глауфос.....	259	Нифлурил.....	519	Витрум Витамин Е.....	230
Доксициклин.....	310	Палитрекс.....	547	Кавинтон.....	361
Доксициклина гид- рохлорид.....	310	Пипрацил.....	569	Капли Береш Плюс.....	370
Заноцин.....	318	Тамицин.....	683	Напотон.....	501
Зинацеф.....	320	Таривид.....	687	Нервохель.....	505
Зиндолин 250.....	320	Тотацеф.....	709	Ново-Пассит.....	522
Климицин.....	395	Фелексин.....	746	Сант-Е-гал.....	638
Клиндамицин.....	396	Цефаклен.....	785	Сбор успокоитель- ный N 3.....	641
Лендацин.....	432	Цефотаксим.....	786	Эндур-Е 200.....	817
Максипим.....	453	14.16.5. Инфекции почек		Этинилэстрадиол.....	832
Медазол.....	459	Абактал.....	105	14.17.1. Климакс у женщин	
Меронем.....	465	Амоксиклав.....	135	Гинодиан-Депо.....	256
Мефоксин.....	473	Антрима.....	144	Гормель С.....	267
Нелорен.....	504	Берлоцид.....	180	Дерместрил.....	283
Нетромицин.....	506	Берлоцид 480.....	180	Дивина.....	291
Оспамокс.....	542	Берлоцид 960.....	180	Дивитрен.....	291
Офрамакс.....	544	Гарамицин.....	238	Климадинон.....	394
Палитрекс.....	547	Гентамицина суль- фат.....	246	Климакт-Хель.....	394
Перти.....	562			Климактоплан.....	394

Клиогест.....	396	Норколут.....	528	Урактон.....	737
Менорест.....	463	Норплант.....	529	Фуросемид.....	770
Микрофоллин		Постинор.....	583	Фуросемид Ланна-	
форте.....	478	Ригевидон.....	620	хер.....	771
Никошпан.....	509	Силест.....	650	Цитоксан.....	800
Премарин.....	586	Три-регол.....	717	14.25. Нефроуроли-	
Прогинова.....	588	Тризистон.....	720	тиаз	
Регенерин.....	609	Триквиляр.....	721	Ангирол.....	141
Ременс.....	612	Фемоден.....	747	Гипотиазид.....	256
Синэстрол.....	655	Эгестренол.....	805	Дротаверина гид-	
Тестостерона про-		14.20. Нейрогенный		рохлорид.....	314
пионат.....	693	мочевой пузырь		Канефрон.....	369
Трисеквенс.....	724	Гентос.....	247	Норилет.....	527
Фарма-Мед Ле-		Новитропан.....	521	Ренель.....	613
ди'с формула Ме-		Норилет.....	527	Санфипурол.....	639
нопауза.....	744	Цистрин.....	798	Сбор урологичес-	
Хормоплекс.....	777	14.21. Нефрит		кий (мочегонный).....	641
Цикло-Прогинова.....	788	Гипотиазид.....	256	Сбора Бруснивер-	
Эстрогель.....	830	Гифларина рас-		Т брикет круглый.....	641
Эстрофем.....	830	твор для инъекций.....	259	Уралит-У.....	737
14.17.2. Климакс у		Дексазон.....	278	Фортум.....	763
мужчин		Кальция глюконат.....	367	Цистум Солидаго	
Тестостерона про-		Преднизолон.....	585	раствор.....	799
пионат.....	693	Ренель.....	613	14.25.1. Нефроуро-	
14.18. Колика по-		Цефаклен.....	785	литиаз уратный	
чечная		14.21.1. Гломеруло-		Аллопуринол.....	120
Аспизол.....	153	нефрит		Алопрон.....	121
Вольтарен.....	232	Буфенокс.....	206	Блемарен.....	193
Вольтарен рапид.....	232	Канефрон.....	369	Милурит.....	481
Дибазол.....	290	Оспен.....	542	14.26. Опухоли уро-	
Дикломелан.....	295	Оспен 750.....	542	генитиальных орга-	
Диклонат II.....	296	14.22. Нефроз		нов	
Дротаверина гид-		Гипотиазид.....	256	14.26.1. Аденома	
рохлорид.....	314	Гифларина рас-		предстательной же-	
Кетонал.....	386	твор для инъекций.....	259	лезы	
Метацин.....	467	Псоринохель.....	598	Аденостоп.....	109
Наклофен.....	499	14.23. Нефропатия		Биолайн Простейт.....	189
Наклофен Дуо.....	499	Алопрон.....	121	Гентос.....	247
Но-шпа.....	520	Капотен.....	372	Дальфаз.....	272
Новиган.....	521	Тензиомин.....	690	Депостат.....	282
Павестезин.....	546	Энам.....	813	Ипертрофан 40.....	358
Папаверина гид-		Энап.....	813	Кардура.....	379
рохлорид.....	551	Энап-5.....	813	Копривит.....	407
Пентамин.....	558	14.23.1. Нефропа-		Корнам.....	411
Ренель.....	613	тия беременных		Омник.....	534
Спазмoverалгин		Альдактон.....	123	Пепонен.....	559
Нео.....	663	Аскорбиновая кис-		Пермиксон.....	561
Спаскупрель.....	664	лота.....	152	Проскар.....	592
Тропацин.....	727	14.24. Нефротичес-		Проставерн Урти-	
14.19. Контрацепция		кий синдром		ка ликвид.....	593
14.19.1. Контрацеп-		Альдактон.....	123	Простагут.....	593
ция местная		Берликорт.....	176	Простаплант.....	593
Мирена.....	483	Гидрокортизон.....	252	Ренель.....	613
Стерилин.....	668	Дексазон.....	278	Серпенс.....	649
14.19.2. Контрацеп-		Дексаметазон.....	279	Синэстрол.....	655
ция оральная		Кенакорт.....	382	Трианол.....	719
Ацетомепрегенол.....	163	Лазилактон.....	421	Туриплекс.....	728
Демулен.....	280	Сандиммун.....	636	Тыквеол.....	728
Диане-35.....	289	Сандиммун-Неорал.....	636	Уротрактин.....	739
Микрогинон.....	478	Спинонол.....	665	14.26.2. Рак матки	
Минизистон.....	482	Триам-ко.....	718	Депостат.....	282
Нон-Овлон.....	525	Триамцинолон.....	718	Доксорубицин-	

Эбеве	311
Космеген	412
Мегейс	458
Метотрексат	468
Оксипрогестерона капронат	531
Ребиф	607
Тамоксифен Эбеве	685
Флурокс	760
Циклотал	790
Цисплатил	798

14.26.3. Рак мочево- го пузыря

5-Фторурацил- Эбеве	840
Бластокарб	192
Бластолем	192
Вумон	233
Гемзар	244
Доксолем	311
Доксорубицин- Эбеве	311
Интрон-А	355
Карбоплатин-Эбеве	375
Метотрексат	469
Платимит	573
Платинол	573
Растоцин	606
Тиотепа-Тиоплекс	702
Трексан	715
Триксилем	721
Флурокс	760
Цисанплат	797
Цисплатил	798
Эпилем	823

14.26.4. Рак поло- вых органов у дево- чек

Винкристин	222
Флурокс	760

14.26.5. Рак почек

Альфаферон	126
Вэллферон	234
Гемзар	244
Пролейкин	590
Реальдирон	606
Роферон А	628
Тамоксифен	684
Тамоксифен Эбеве	685
Флурокс	760
Циклотал	790

14.26.6. Рак пред- стательной железы

5-Фторурацил- Эбеве	840
Анандрон	139
Андрокур	141
Андрокур-Депо	142
Гемзар	244
Декапептил	277
Декапептил-депо	277
Доксорубицин- Эбеве	311

Зитазониум	323
Золадекс	325
Мамомит	454
Микрофоллин форте	478
Новантрон	520
Ориметен	536
Премарин	586
Синэстрол	655
Флулем	760
Флурокс	760
Флутакан	761
Флуцином	761
Хормоплекс	777
Цисплатин-Эбеве	798
Этинилэстрадиол	832

14.26.7. Рак шейки матки

5-Фторурацил- Эбеве	840
Билем	186
Бластокарб	192
Бластолем	192
Блеоцин	193
Винкристин	222
Доксорубицин- Эбеве	311
Карбоплатин-Эбеве	375
Ледоксина	428
Метотрексат	469
Оксипрогестерона капронат	531
Платимит	573
Ребиф	607
Трексан	715
Триксилем	721
Флурокс	760
Цисанплат	797
Цисплатин-Эбеве	798

14.26.8. Рак яичек

Бластокарб	192
Бластолем	192
Велбе	211
Вепезид	214
Винбластин	221
Доксорубицин- Эбеве	311
Карбоплатин-Эбеве	375
Космеген	412
Метотрексат	468
Метотрексат-Эбеве	470
Платимит	573
Платинол	573
Трексан	715
Триксилем	721
Флурокс	760
Цисанплат	797
Цисплатил	798
Цисплатин-Эбеве	798
Этопозид	833

14.26.9. Рак яичника

5-Фторурацил- Эбеве	840
------------------------------	-----

Алкеран	118
Бластокарб	192
Бластолем	192
Гемзар	244
Доксолем	311
Карбоплатин-Эбеве	375
Ледоксина	428
Лейкеран	428
Метотрексат	468
Метотрексат-Эбеве	470
Параплатин	551
Платимит	573
Платинол	573
Растоцин	606
Таксол	681
Тиотепа-Тиоплекс	702
Трексан	715
Триксилем	721
Флурокс	760
Циклофосфан	791
Цисанплат	797
Цисплатил	798
Цисплатин-Эбеве	798
Цитоксан	800
Эпилем	823
Этопозид-Эбеве	833

14.26.10. Фибромио- ма матки

Декапептил	277
Декапептил-депо	277
Золадекс	325
Норколут	528

14.26.11. Хорион- карцинома, пузыр- ный занос

Велбе	211
Метотрексат	468
Метотрексат на- трия АДС	469
Метотрексат-Эбеве	470
Триксилем	721
Этопозид	833
Этопозид-Эбеве	833

14.27. Орхит

Гентос	247
Лендацин	432

14.28. Параметрит

Гинекохель	254
Дифен	305
Доналгин	312
Лендацин	432
Нифлурил	519
Реопирин	615
Цефотаксим	786

14.29. Пиелонефрит

Альфацет	126
Бактрим	167
Гентос	247
Гифларина рас- твор для инъекций	259
Грюнамокс	269
Доксилан	308
Доксициклин	309

Зинацеф	320
Зиннат	321
Канамицин сульфат	369
Канефрон	369
Кошачий Коготь	413
Коэнзим компози- тум	413
Лендацин	432
Максипим	453
Нитроксолин	514
Норилет	527
Палитрекс	547
Пенодил	556
Ренель	613
Рифамор	623
Сбор урологичес- кий (мочегонный)	641
Тобрацин-АДС	705
Уназин	734
Уротрактин	739
Фелексин	746
Фортум	763
Фурагин	769
Фурадонин	769
Цеклор	780
Цефазолин	785

14.29.1. Пиелит

Абактал	105
Бактрим	167
Канамицин суль- фат	369
Мукоза компози- тум	492
Оксациллин натри- евая соль	531
Палин	547
Сбора Бруснивер- Т брикет круглый	641
Уротрактин	739
Урофлукс	739
Фортум	763
Фурадонин	769
Цефаклен	785
Цефотаксим	786

14.29.2. Пиелостит

Абактал	105
Аденостоп	109
Лендацин	432
Оксациллин натри- евая соль	531
Палин	547
Рифамор	623
Уротрактин	739
Цефаклен	785
Цефотаксим	786
Ципринол	795

14.30. Половое со- зревание преждевре- менное

Данол	273
Декапептил	277
Декапептил-депо	277

14.31. Половые на- рушения

Андрокур-Депо	142
Копривит	407
Лютрелф	448
Провирон-25	588

14.32. Почечная не- достаточность

Гипотиазид	256
Гифларина рас- твор для инъекций	259
Лазикс	420
Фуросемид	770
Эуфиллин	834

14.32.1. Гиперазоте- мия

Гифларина рас- твор для инъекций	259
Леспенефрил	433

14.32.2. Почечная недостаточность ост- рая

Дианил	289
Фуросемид	770

14.32.3. Почечная недостаточность хроническая

Ангирол	141
Дианил	289
Карбактин	374
Леспенефрил	433
Пилозурил	564
Фуросемид	770
Фуросемид Ланна- хер	771
Эпомакс	823

14.33. Предменстру- альный синдром

Аллитера	119
Алталекс	122
Бромокриптин	199
Поли	200
Бромэргон	200
Данодиол	273
Данол	273
Мастодион	456
Напотон	501
Норколут	528
Парлодел	553
Примолют-Нор	587
Регенерин	609
Серокриптин	648
Триам-ко	718
Фарма-Мед Ле- ди'с формула	

Предменструаль- ный синдром	744
Цикло 3 форт	788

14.34. Простатит

Абактал	105
Антрима	144
Биолайн Простейт	189
Гентос	247
Доксилан	308
Доксициклин	310
Кошачий Коготь	413
Лендацин	432
Мукоза компози- тум	492
Нитроксолин	514
Но-шпа	520
Норилет	527
Палин	547
Пефлацин	563
Ровамицин	625
Серпенс	649
Суметролим	677
Тримосул	722
Фелексин	746
Фортум	763
Цефазолин	785
Цефаклен	785
Цифлоксинал	803
Эноксор	818

14.34.1. Простатит хронический

Антрима	144
Простагут	593
Простаплант	593
Реницин	614
Сбор урологичес- кий (мочегонный)	641
Тыквеол	728

14.35. Сальпингит

Гинекохель	254
Ципринол	795

14.35.1. Сальпингоо- форит

Гинекохель	254
Ременс	612
Ципринол	795

14.36. Тенезмы мо- чевого пузыря

Гентос	247
Спаскупрель	664

14.37. Уретрит

Абактал	105
Амоксиклав	135
Ампицилин	136
Антрима	144
Бактрим	167
Гентос	247
Доксициклин	309
Зиннат	321
Лендацин	432
Макмирор	451
Макмирор ком-	

плекс 500	451
Менорест	463
Нитроксолин	514
Орвагил	535
Палин	547
Ровамицин	625
Сбор урологический (мочегонный)	641
Сбора Бруснивер-Т брикет круглый	641
Сумамед	677
Суметролим	677
Уротрактин	739
Урофлукс	739
Фортум	763
Фурагин	769
Фурадонин	769
Цеклор	780
Цефазолин	785
Цефаклен	785
Эноксор	818
Эрмицед	826

14.38. Цервицит

Абактал	105
Гинекохель	254
Гипозоль	256
Зиннат	321
Лендацин	432
Облепиховое масло	530
Ременс	612
Сумамед	677
Суппозитории ректальные с эвкалиптом	678
Цитеал	799

14.39. Цистит

Абактал	105
Альфацет	126
Амоксиклав	135
Антрима	144
Бактрим	167
Гентос	247
Грюнамокс	269
Диоксидин	301
Доксициклин	309
Зинацеф	320
Зиннат	321
Канефрон	369
Кошачий Коготь	413
Лендацин	432
Макмирор	451
Макмирор комплекс 500	451
Метилурацил	467
Мукоза компози-тум	492
Нитроксолин	514
Норилет	527
Оксациллин натрия соль	531
Палин	547
Палитрекс	547
Пливасепт	575
Ренель	613

Сбор урологический (мочегонный)	641
Сбора Бруснивер-Т брикет круглый	641
Урофлукс	739
Фелексин	746
Фортум	763
Фурагин	769
Фурадонин	769
Цеклор	780
Цефазолин	785
Цефаклен	785
Цефалексин	786
Цистрин	798

14.40. Эндометриоз

Данодиол	273
Данол	273
Декапептил	277
Декапептил-депо	277
Золадекс	325
Неместран	505
Норколут	528
Примолут-Нор	587

14.41. Эндометрит

Абактал	105
Амоксиклав	135
Гинекохель	254
Дифен	305
Доксилан	308
Клиндамицин	396
Лендацин	432
Норилет	527
Пипрацил	569
Ременс	612
Тазоцин	680
Цефалексин	786
Цефобид	786
Ципринол	795

14.42. Энурез

Аденостоп	109
Адиуретин СД	109
Амизол	129
Амирол	133
Амитриптилин	134
Словакофарма	140
Анафранил	219
Вибуркол	398
Кломинал	413
Кофеин-бензоат натрия	413
Мелипрамин	462
Ренель	613
Сбора Бруснивер-Т брикет круглый	641
Седуксен	642
Триптизол	723
Цистрин	798
Эфедрина гидрохлорид	835

14.43. Эпидидимит

Лендацин	432
Норилет	527

14.44. Эрозии шейки матки

Гипозоль	256
Ликопид	436
Облепиховое масло	530
Солковагин	658
Тыквеол	728

15. Заболевания ЭНДОКРИННЫЕ**15.1. Андрогензависимые заболевания**

Андрокур	141
Диане-35	289
Провирон-25	588
Флулем	760

15.2. Гиперпролактинемия

Абергин	106
Бромокриптин	199
Поли	200
Бромэргон	271
Даверинум	456
Мастодином	553
Парлодел	553

15.2.1. Гиперпролактинемия медикаментозная

Бромокриптин	199
Серокриптин	648

15.3. Гипогонадизм

Бромокриптин	199
Поли	199
Гонадотропин хорионический	264
Гормель С	267
Нордитропин Пен-Сет	527
Флулем	760

15.3.1. Андрогенная недостаточность

Абергин	106
альфа-Токоферола ацетат	125
Витамин Е Словакофарма	227
Гонадотропин хорионический	264
Лютрелф	448
Пергонал	559
Провирон-25	588
Профазин	596
Серокриптин	648
Тестостерона пропионат	693
Хорагон	777
Эндур-Е 200	817

15.3.2. Гипофункция желтого тела

Лютрелф	448
Мастодинон	456
Профазин	596
Хорагон	777

15.3.3. Гипофункция яичников

Витамин Е Слова-кофарма	227
Гинодиан-Депо	256
Гонадотропин хорионический	264
Климакт-Хель	394
Кломид	397
Пергонал	559
Синэстрол	655
Этинилэстрадиол	832

15.3.4. Посткастрационный синдром

Витамин Е Слова-кофарма	227
Гинодиан-Депо	256

15.3.5. Эстрогенная недостаточность

Витамин Е Слова-кофарма	227
Гинодиан-Депо	256
Гонадотропин хорионический	264
Гормель С	267
Климен	394
Клиогест	396
Менорест	463
Пергонал	559
Премарин	586
Прогинова	588
Трисеквенс	724
Хормоплекс	777
Цикло-Прогинова	788
Эстрогель	830
Эстрофем	830
Этинилэстрадиол	832

15.4. Заболевания гипоталамо-гипофизарные

Бутироксан	206
Гонадотропин хорионический	264
Гонал-Ф	265

15.4.1. Адипозогенитальный синдром

Гонадотропин хорионический	264
Кломид	397

15.4.2. Акромегалия

Абергин	106
Бромкриптин	199
Бромкриптин	199
Поли	199
Бромэргон	200

Парлодел	553
Сандостатин	636
Серокриптин	648

15.4.3. Диабет несахарный

Адиуретин СД	109
Гипотиазид	256
Карбапин	374
Карбасан	375
Карбасан ретард	375
Тегретол	689
Тегретол ЦР	689

15.4.4. Иценго-Кушинга болезнь

Мамомит	454
---------------	-----

15.4.5. Нанизм гипофизарный

Гонадотропин хорионический	264
Нордитропин Пен-Сет	527
Сайзен	632

15.5. Заболевания надпочечников

15.5.1. Адреногенитальный синдром

Дексаметазон	279
Преднизолон	585
Флоринеф	757

15.5.2. Гиперальдостеронизм

Альдактон	123
Верошпирон	218
Лазилактон	421
Спиронаксан	664
Спинол	665
Урактон	737

15.5.3. Надпочечниковая недостаточность

Аскорбиновая кислота	151
Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Дексаметазон	279
Преднизолон	585
Раствор Натрия хлорида 0,9%	604
Раствор Натрия хлорида с глюкозой 5%	604
Флоринеф	757
Целестон	782

15.5.4. Феохромоцитома

Индерал	343
Ормидол	536
Тримепранол	722

15.6. Заболевания паращитовидной железы

15.6.1. Гиперпаратиреоз

Альфа Дз-Тева	125
Калько	364
Тонокальцин	707

15.6.2. Гипопаратиреоз

Альфа Дз-Тева	125
Кальция глюконат	367
Рокальтрол	625
Тахистин	688

15.7. Заболевания щитовидной железы

15.7.1. Гипертиреоз

Бевилекс	169
Вазокардин	207
Витамин Е Слова-кофарма	227
Гидрокортизон	252
Индерал	343
Коргард	409
Мерказолил	465
Обзидан	530
Ормидол	536
Остеогенон	543
Перитол	560
Тримепранол	722

15.7.2. Гипотиреоз

L-Тирок	840
L-Тироксин 25 Берлин-Хеми	841
L-Тироксин 50, 100 Берлин-Хеми	841
Дексаметазон	279
Кальция глюконат	367
Морская капуста	490
Остеогенон	543
Струмель	673
Тиреоконб	703
Тиреотом	703
Трийодтиронин	720

15.7.3. Зоб токсический диффузный

Анаприлин	139
Мерказолил	465

15.7.4. Зоб эндемический

L-Тирок	840
L-Тироксин 25 Берлин-Хеми	841
L-Тироксин 50, 100 Берлин-Хеми	841
Струмель	673
Тиреоконб	703
Тиреотом	703
Трийодтиронин	720

15.7.5. Рак щитовидной железы

L-Тирок	840
L-Тироксин 25 Берлин-Хеми	841
L-Тироксин 50, 100 Берлин-Хеми	841
Блеоцин	193
Доксолем	311
Доксорубицин-Эбеве	311
Растоцин	606
Тиреотом	703
Трийодтиронин	720
Флуорокс	760

15.7.6. Тиреоидит

Гидрокортизон	252
Дексазон	278
Дексаметазон	279
Целестон	782

15.8. Нарушение эндокринной функции поджелудочной железы**15.8.1. Диабет сахарный**

Актрапид НМ	116
Актрапид НМ Пенфилл	116
Аспифат	157
Глюкобай	263
Изодибут	330
Илетин II Ленте	335
Илетин II НПХ	335
Илетин II Регуляр	335
Инсулин Ленте	
СПП	347
Инсулин-семилонг	
СМК	348
Инсуман Базал	348
Инутрал СПП	356
Кошачий Коготь	413
Липоевая кислота	440
Моносуинсулин МК	487
Монотард НМ	488
Поливит гериатрик	578
Сахарин	640
Сукламат	674
Тиклид	698
Хумалог	778
Хумулин Л	778
Хумулин М2 20/80	779
Хумулин М3 30/70	779
Хумулин НПХ	779
Хумулин Регуляр	779
Цюкли	803
Эндур-ВМ	816

15.8.1.1. Диабет сахарный инсулинзависимый

Актрапид НМ	116
Актрапид МС	116
Актрапид НМ Пенфилл	116
Берлинсулин Н 20/80 U-40	176
Берлинсулин Н 20/80 пен	177
Берлинсулин Н 30/70 U-40	177
Берлинсулин Н 30/70 пен	177
Берлинсулин Н 40/60 U-40	177
Берлинсулин Н 40/60 пен	178
Берлинсулин Н Базаль U-40	178
Берлинсулин Н Базаль пен	179
Берлинсулин Н Нормаль U-40	179
Глиформин	262
Глюкобай	263
Депо-инсулин С	282
Изофан Инсулин ЧМ	334
Инсулин максирапид "ВО-С"	348
Инсулин С	348
Инсулин-семилонг СМК	348
Инсуман Базал	348
Инсуман Базал 100 для Оптипена	348
Инсуман Комб 15/85	349
Инсуман Комб 25/75	349
Инсуман Комб 25/75 для Оптипена	349
Инсуман Комб 50/50	349
Инсуман Рапид	351
Инсуман Рапид для Оптипена	351
Инутрал Инсулин ЧМ	356
Капотен	372
Комб-инсулин С	402
Микстард 10 НМ	
Пенфилл	479
Микстард 20 НМ	
Пенфилл	479
Микстард 30 НМ	
Пенфилл	479
Микстард 40 НМ	
Пенфилл	480
Микстард 50 НМ	
Пенфилл	480

Моносуинсулин МК	487
Монотард МС	488
Монотард НМ	488
НовоПен 3	523
Протафан НМ	594
Протафан НМ Пенфилл	594
Протафан МС	595
Ультратард НМ	733
Хумалог	778
Хумулин Л	778
Хумулин М2 20/80	779
Хумулин М3 30/70	779
Хумулин НПХ	779
Хумулин Регуляр	779

15.8.1.2. Диабет сахарный инсулиннезависимый

Актрапид НМ	116
Актрапид МС	116
Актрапид НМ Пенфилл	116
Берлинсулин Н 20/80 U-40	176
Берлинсулин Н 20/80 пен	177
Берлинсулин Н 30/70 U-40	177
Берлинсулин Н 30/70 пен	177
Берлинсулин Н 40/60 U-40	177
Берлинсулин Н 40/60 пен	178
Берлинсулин Н Базаль U-40	178
Берлинсулин Н Базаль пен	179
Берлинсулин Н Нормаль U-40	179
Бутаид	205
Глибамид	260
Глибенкламид	260
Глипизид	261
Глитизол	261
Глиформин	262
Глюкобай	263
Глюкотрол ХЛ	264
Гуарем	269
Депо-инсулин С	282
Диабетон	286
Диабрезид	287
Изофан Инсулин ЧМ	334
Инсулин С	348
Инсуман Базал	348
Инсуман Комб 15/85	349
Инсуман Рапид	351
Инутрал Инсулин ЧМ	356



Комб-инсулин С	402
Манинил.....	454
Манинил 5.....	455
Микстард 10 НМ	
Пенфилл.....	479
Микстард 20 НМ	
Пенфилл.....	479
Микстард 30 НМ	
Пенфилл.....	479
Микстард 40 НМ	
Пенфилл.....	480
Микстард 50 НМ	
Пенфилл.....	480
Монотард МС	488
Монотард НМ.....	488
НовоПен 3	523
Предиан	585
Протафан НМ.....	594
Протафан НМ	
Пенфилл.....	594
Протафан МС	595
Силубин ретард.....	651
Сиофор 500.....	655
Сиофор 850.....	655
Ультратард НМ.....	733
Хумалог.....	778
Хумулин Л	778
Хумулин М2	
20/80.....	779
Хумулин М3	
30/70.....	779
Хумулин НПХ	779
Хумулин Регуляр	779

15.8.1.3. Кома диабетическая

Берлинсулин Н	
Нормаль U-40	179
Инсулин С.....	348
Инсуман Рапид	351
Инсуман Рапид	
для Оптипена.....	351
Инутрал СПП	356
Комб-инсулин С	402
Стиламин.....	669

15.9. Нарушения роста

Гонадотропин хорионический.....	264
Нордитропин Пен-Сет.....	527
Олиговит	532
Хуматроп.....	778

15.10. Эндокринные опухоли гастро-энтеропанкреатической системы

Сайзен.....	632
Сандостатин.....	636

16. Нарушения ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Галиум-Хель	235
Галстена	237
Мульти-Саностол	493
Олигогал-Se.....	533
Сант-Е-гал.....	638

16.1. Иммунодефицит

Витабекс	226
Витрум Атеролитин	229
Витрум Лайф.....	230
Витрум Центури.....	231
Галиум-Хель	235
Диа-Активанад-N.....	286
Иммуноглобулин.....	337
Интраглобин.....	354
Кальцевита	365
Капли Береш Плюс	370
Компливит	403
Левамизол-Эбеве	426
Мега Вите	458
Мультитест КИ.....	494
ОртоИммун	538
ОртоИммун Г	
Юниор	539
Пентаглобин	556
Поливит гериатрик	578
Ретровир	617
Рибасан форте	618
Стресс формула 600	672
Стресс формула с цинком	672
Сулотрим	674
Тактивин	682
Тонзилгон.....	706
Уолш поливит для детей.....	736
Целаскон Эффервесценс	781
Циклоферон	790
Эндобулин.....	816
Эндур-ВМ	816
Эстифан	830
Эхинацин ликвидум	837

16.2. Реакция отторжения при трансплантации органов

Имуран	341
Интраглобин.....	354
Консупрен	404
Сандиммун	636
Сандиммун-Неорал.....	636
Селлсепт	644
Тимоглобулин	698
Урбазон	737
Целестон	782
Цитотект	802

16.2.1. Реакция "Трансплантат-против хозяина"

Консупрен.....	404
Ледоксина.....	428
Тимоглобулин.....	698
Урбазон	737

17. Нарушения ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

17.1. Астения

Акти-5	114
Аллитера	119
Амол	136
Витамин 15 Солко	227
Витамин Е Словакофарма.....	227
Витрум Витамин Е.....	230
Деманол.....	280
Капли Береш Плюс.....	370
Когитум.....	401
Коэнзим компози-тум	413
Лимонтар	437
Менорест	463
Пирацетам	570
Сандра.....	637
Семакс.....	645
Фенибут	747
Этимизол	832

17.2. Белковая недостаточность

Аминосол (600; 800 ккал)	131
Аминосол КЕ	131
Аминостерил II	
Новум.....	132
Аминостерил III	
Новум.....	132
Изокал	330
Инфезол 40.....	357
Метионин.....	468
Прегестимил.....	584

17.2.1. Гипоальбуминемия

Иммуноглобулин человека нормальный	337
Триамцинолон	718

17.3. Гемосидероз

Десферал	285
----------------	-----

17.4. Гипервитаминоз D

Калько.....	364
Тонокальцин	707

17.5. Гиперурикемия

Алломарон	119
Аллопуринол.....	120
Алопрон.....	121

Дезурик	277	Мульти-Саностол.....	493	Ревиталайз-К-АДС	608
Милурит	481	Мульти-табс DD-4	493	Таблетки витами-	
Санфипурол	639	Мульти-табс GD	494	нов В ₁ , В ₂ , С	680
17.5.1. Подагра		Мульти-табс LJ	494	УПСАВИТ мульти-	
Алломарон	119	Мульти-табс LK	494	витамин	736
Аллопуринол	120	Нова вита (прена-		17.6.4. Гиповитами-	
Алопрон	121	тал формула)	520	ноз В₂	
Амбене	127	Олиговит	532	Аэровит	166
Вольтарен	232	Олигогал-Se	533	Бевиплекс.....	169
Вольтарен рапид	232	ОртоИммун Г		Витабекс.....	226
Дезурик	277	Юниор	539	Виталюкс	226
Диклобене	293	Пантенол	549	Мульти-Саностол	493
Диклофен.....	297	Поливит бэби	577	Ревит	608
Диклофенак	297	Поливит гериатрик ...	578	Ревиталайз-АДС.....	608
Диклофенак-Ре-		Прегнавит	585	Ревиталайз-К-АДС	608
тард	298	Ревиталайз-АДС	608	Рибофлавин	619
Дискус композитум ...	304	Ревиталайз-К-АДС.....	608	Рикавит	620
Дифен.....	305	Ревиталайз-Муль-		Таблетки витами-	
Ибупрофен	327	ти-М АДС.....	608	нов В ₁ , В ₂ , С	680
Ибупрофен Ланна-		Стресс формула		УПСАВИТ мульти-	
хер	328	600	672	витамин	736
Индометацин	344	Стресс формула с		17.6.5. Гиповитами-	
Кеналог.....	383	железом	672	ноз В₆	
Кетонал.....	386	Стресс формула с		Аэровит	166
Кнавон.....	399	цинком	672	Бевиплекс.....	169
Милурит	481	Супрадин Рош.....	678	Витабекс.....	226
Наклофен.....	499	Уолш поливит для		Виталюкс	226
Наклофен Дуо	499	взрослых	735	Кальцевита	365
Нифлугель	519	Уолш поливит для		Мульти-Саностол	493
Пироксикам.....	572	детей	736	Нейротрат форте	503
Реметан.....	613	Эндур-ВМ.....	816	Придоксина гид-	
Ремоксикам	613	Эндур-Е 200.....	817	рохлорид	571
Санфинак.....	639	17.6.1. Гиповитами-		Ревиталайз-АДС.....	608
Санфипурол	639	ноз А		Ревиталайз-К-АДС	608
Теникам	690	Аэровит	166	Рикавит	620
Тобитил	705	Виталюкс	226	УПСАВИТ мульти-	
Траумель С	714	Мориамин форте	490	витамин	736
Хотемин	777	Мульти-Саностол.....	493	17.6.6. Гиповитами-	
17.6. Гиповитаминоз		Мульти-табс Е.....	494	ноз В_с	
Аскорутин	152	Ревит.....	608	Аэровит	166
Аэровит.....	166	Ревиталайз-АДС	608	Бевиплекс.....	169
Видайлин-М	219	Ревиталайз-К-АДС.....	608	Виталюкс	226
Витабекс	226	Ретинола ацетат		Гино-тардиферон	255
Виталюкс	226	(Витамин А)	617	Кальциумфолинат-	
Витамин 15 Солко.....	227	УПСАВИТ мульти-		Эбеве	368
Витамульт	228	витамин	736	Кальция фолинат	368
Витрум.....	229	17.6.2. Гиповитами-		Лейковорин АДС	428
Витрум Атеролитин ...	229	ноз В		Ревиталайз-АДС.....	608
Витрум Витамин Е	230	Бевиплекс	169	Ревиталайз-К-АДС	608
Витрум Лайф.....	230	Витабекс	226	УПСАВИТ мульти-	
Витрум Пренатал	230	Ревиталайз-АДС	608	витамин	736
Витрум Супер-		Ревиталайз-К-АДС.....	608	Фолинат кальция	761
стресс	230	17.6.3. Гиповитами-		17.6.7. Гиповитами-	
Витрум Центури	231	ноз В₁		ноз С	
Витрум Циркус	231	Аэровит	166	Аскорбиновая кис-	
Декамевит	277	Бевиплекс	169	лота	151
Дуовит	315	Витабекс	226	Аэровит	166
Квадевит	380	Виталюкс	226	Виталюкс	226
Компливит	403	Мориамин форте	490	Кальцевита	365
Коэнзим компози-		Мульти-Саностол.....	493	Лековит С-Са.....	430
тум	413	Нейротрат форте	503	Мориамин форте	490
Лековит.....	430	Ревит.....	608	Мульти-Саностол	493
Матерна	456	Ревиталайз-АДС	608	Мульти-табс Е	494
Мега Вите	458				

Мульти-табс с Витаминном С	494
Ревит	608
Ревиталайз-АДС	608
Ревиталайз-К-АДС	608
Рикавит	620
Таблетки витаминов В ₁ , В ₂ , С	680
УПСАВИТ витамин С	736
УПСАВИТ мульти-витамины	736
Целаскон Эффект-рвесценс	781

17.6.8. Гиповитаминоз D

Витрум Кальций	230
Кальцевита	365
Кальция глицерофосфат	367
Мориамин форте	490
Мульти-Саностол	493
Мульти-табс Е	494
Остеопан	543
Ревиталайз-АДС	608
Ревиталайз-К-АДС	608

17.6.9. Гиповитаминоз PP

Аэровит	166
Витабекс	226
Виталюкс	226
Мульти-Саностол	493
Никотиновая кислота	509
Ревиталайз-АДС	608
Ревиталайз-К-АДС	608
Рикавит	620
УПСАВИТ мульти-витамины	736

17.7. Гипотрофия

Апилак	145
Аскорбиновая кислота	151
Витамин Е Словакофарма	227
Витамульт	228
Изокал	330
Калия оротат	363
Кальция глицерофосфат	367
Мульти-табс LJ	494
Прегестимил	584
Эндур-Е 200	817
Энфалак	819
Энфамил	820
Энфамил 1	820
Энфамил 2	821
Энфамил с железом	821
Энфамил Юниор	822

17.8. Диатез экссу-дательный

Лимфомнозот	437
Пипольфен	567
Пиридоксина гидрохлорид	571

17.9. Кахексия

Витамин Е Словакофарма	227
Витамульт	228
Галиум-Хель	235
Изокал	330
Кальция глицерофосфат	367
Коэнзим компози-тум	413
Левулоза	427
Метнионин	468
Перитол	560
Прегестимил	584

17.10. Минеральная недостаточность

Видайлин-М	219
Витрум	229
Витрум Атеролитин	229
Витрум Лайф	230
Витрум Пренатал	230
Витрум Центури	231
Дуовит	315
Изокал	330
Капли Береш Плюс	370
Коэнзим компози-тум	413
Магне Б6	448
Мега Вите	458
Нова Вита (пренатал формула)	520
ОртоИммун	538
ОртоИммун Г	539
Юниор	539
Остеопан	543
Поливит гериатрик	578
Ревиталайз-Мульти-М АДС	608
Убихинон компози-тум	729
Уолш поливит для взрослых	735
УПСАВИТ мульти-витамины	736
Ферроплект	752
Эндур-ВМ	816

17.11. Нарушение КЩС

Нормикс	528
Раствор Хартманна	605
Составной натрия лактат	661

17.11.1. Ацидоз

Калинор	362
Раствор Хартманна	605
Стиламин	669

17.12. Нарушения водно-электролитного обмена

Дианил	289
Инфезол 40	357
Левулоза	427
Лимфомнозот	437
Остеопан	543
Плазма-Лит 148	572
Водный Раствор Глюкозы	604
Раствор Натрия хлорида 0,9%	604
Раствор Натрия хлорида с глюкозой 5%	604
Раствор Рингера	605
Раствор Хартмана	605
Ревиталайз-Мульти-М АДС	608
Составной натрия лактат	661

17.12.1. Гиперкальциемия

Аредиа	148
Бондронат	194
Бонефос	195
Гидрокортизон	252
Калько	364
Миакальцик	474
Тонокальцин	707
Целестон	782

17.12.2. Гипокалиемия

Альдактон	123
Аспаркам	153
Верошпирон	218
Дианил	289
К-Дур	360
Калий-нормин	362
Калинор	362
Калия глутаминат	363
Калия-магния-аспарагинат	363
Панангин	548

17.12.3. Гипокальциемия

Витамин D ₃	227
Б.О.Н.	227
Витрум Кальций	230
Кальцевита	365
Кальция глицерофосфат	367
Кальция глюконат	367
Магне Б6	448
Матерна	456
Остеопан	543
Тахистин	688

17.12.4. Гипонатриемия

Раствор Натрия хлорида 0,9%	604
-----------------------------------	-----

Раствор Натрия
хлорида с глюко-
зой 5% 604

17.12.5. Дефицит в организме железа

Активферрин 115
Витрум Супер-
стресс 230
Витрум Циркус 231
Гино-тардиферон 255
Сорбифер Дурулес 661
Стресс формула с
железом 672
Тардиферон 687
Фарма-Мед Ле-
ди'с формула Же-
лезо плюс 744
Ферлатум 750
Ферретаб комп. 751
Ферро-градумет 751
Ферронал 751
Ферронат 752
Феррум Лек 753
Хеферол 774
Энфамил 2 821
Энфамил с желе-
зом 821

17.13. Нарушения развития костной системы и зубов

Акти-5 114
Витрум Кальциум 230
Остеогенон 543

17.14. Обменно-дис- трофические заболе- вания внутренних органов

Инозие-Ф 346
Кальцитрин 366
Коэнзим компози-
тум 413
Псоринохель 598
Рибасан форте 618
Убихинон компози-
тум 729
Уолш поливит для
детей 736

17.15. Ожирение

Бекунис легкий 172
Витрум Атеролитин ... 229
Гуарем 269
Диетпласт гомеопа-
тический пластырь
для похудения 293
Диетрин 293
Изолипан 332
Минифаж 482
ОртоИммун 538
Сахарин 640
Струмель 673
Сукламат 674
Цюкли 803

17.16. Парентераль- ное питание

Аминосол (600;
800 ккал) 131
Аминостерил II
Новум 132
Аминостерил III
Новум 132
Левулоза 427
Раствор Глюкозы 604

17.17. Повышенная потребность в вита- минах и минераль- ных веществах

Активферрин 115
Аминосол КЕ 131
Аскорбиновая кис-
лота 151
Аэровит 166
Бевиплекс 169
Видайлин-М 219
Витабекс 226
Витамин 15 Солко 227
Витамульт 228
Витрум 229
Витрум Лайф 230
Витрум Супер-
стресс 230
Витрум Центури 231
Витрум Циркус 231
Дуовит 315
Изокал 330
Кальцевита 365
Кальций-Сандоз
форте 365
Капли Береш Плюс .. 370
Квадевит 380
Компливит 403
Коэнзим компози-
тум 413
Лековит 430
Лековит С-Са 430
Мориамин форте 490
Мульти-Саностол 493
Мульти-табс DD-4 493
Мульти-табс GD 494
Мульти-табс LK 494
Мульти-табс с Ви-
тамином С 494
Олиговит 532
ОртоИммун 538
ОртоИммун Г
Юниор 539
ОртоКор Плюс 539
Остеопан 543
Ревит 608
Ревиталайз-АДС 608
Ревиталайз-К-АДС 608
Рикавит 620
Сант-Е-гал 638
Стресс формула с
железом 672
Стресс формула с

цинком 672
Супрадин Рош 678
Убихинон компози-
тум 729
Ферлатум 750
Ферронат 752
Хеферол 774
Целаскон Эффе-
рвесценс 781
Эндур-Е 200 817

17.17.1. Беремен- ность и лактация

Аскорбиновая кис-
лота 151
Бевиплекс 169
Венорутон форте 212
Видайлин-М 219
Витабекс 226
Витамин 15 Солко 227
Витамульт 228
Витрум 229
Витрум Пренатал 230
Гино-тардиферон 255
Дуовит 315
Кальций-Сандоз
форте 365
Капли Береш Плюс ... 370
Матерна 456
Мега Вите 458
Мориамин форте 490
Нова вита (прена-
тал формула) 520
Олиговит 532
Остеогенон 543
Прегнавит 585
Ревит 608
Ревиталайз-Муль-
ти-М АДС 608
Тардиферон 687
УПСАВИТ вита-
мин С 736
УПСАВИТ мульти-
витамин 736
Фарма-Мед Ле-
ди'с формула для
беременных и кор-
мящих женщин 743
Фарма-Мед Ле-
ди'с формула Же-
лезо плюс 744
Ферретаб комп. 751
Ферро-градумет 751
Ферроплект 752
Хеферол 774
ЭнфаМама 819

17.17.2. Период ин- тенсивного роста, пожилой возраст

Акти-5 114
Буерлецитин 205
Витабекс 226
Витамин 15 Солко 227
Витамульт 228



Витрум	229	Ревиталайз-К-АДС	608	Тардиферон.....	687
Витрум Витамин Е....	230	Ревиталайз-Муль-		Убихинон компози-	
Витрум Лайф	230	ти-М АДС	608	тум.....	729
Витрум Супер-		Стресс формула		Уолш поливит для	
стресс	230	600	672	взрослых.....	735
Декамевит.....	277	Стресс формула с		Уолш поливит для	
Дуовит	315	железом	672	детей	736
Изокал	330	Стресс формула с		УПСАВИТ вита-	
Кальцевита	365	цинком	672	мин С	736
Кальций-Сандоз		Супрадин Рош	678	УПСАВИТ мульти-	
форте	365	Уолш поливит для		витамин	736
Коэнзим компози-		взрослых	735	Фарма-Мед Ле-	
тум.....	413	Уолш поливит для		ди'с формула	
Мульти-Саностол....	493	детей.....	736	Анти-стресс	742
Олиговит	532	УПСАВИТ вита-		Эндур-ВМ.....	816
Поливит бэби	577	мин С	736	Эндур-Е 200.....	817
Протеин-спорт	595	УПСАВИТ мульти-		17.18. Порфирия	
Ревиталайз-АДС	608	витамин.....	736	Блемарен	193
Ревиталайз-К-АДС....	608	Эндур-Е 200	817	Десферал	285
Ревиталайз-Муль-		17.17.4. Физичес-		Рибоксин	619
ти-М АДС.....	608	кие и умственные		Уралит-У	737
Рикавит	620	перегрузки		17.19. Углеводная	
Стресс формула с		Активанад-N	115	недостаточность	
железом	672	Аскорбиновая кис-		17.19.1. Гипоглике-	
Тардиферон	687	лота	151	мия	
Уолш поливит для		Аэровит.....	166	Адреналина гид-	
взрослых	735	Берокка Са + Mg	181	рохлорид	110
Уолш поливит для		Буерлецитин	205	ГлюкаГен 1 мг Ги-	
детей	736	Витабекс	226	поКит	262
УПСАВИТ вита-		Витамульт	228	Глюкагон	263
мин С	736	Витрум.....	229	17.20. Фенилкетону-	
УПСАВИТ мульти-		Витрум Витамин Е	230	рия	
витамин	736	Витрум Супер-		Лофеналак	446
Ферроплект	752	стресс.....	230	Фенил-фри	747
Хеферол	774	Витрум Циркус	231	17.21. Цистинурия	
17.17.3. Реконвале-		Декамевит	277	Артамин.....	149
сценция		Диа-Активанад-N.....	286	Уралит-У	737
Активанад-N.....	115	Дуовит	315		
Буерлецитин	205	Калия оротат	363		
Видайлин-М.....	219	Кальцевита	365		
Витабекс	226	Капли Береш Плюс ..	370		
Витамин 15 Солко	227	Коэнзим компози-			
Витамульт.....	228	тум	413		
Витрум	229	Кралонин	414		
Витрум Лайф	230	Леузея	433		
Витрум Супер-		Мега Вите	458		
стресс	230	Морнамин форте.....	490		
Витрум Циркус	231	Мульти-Саностол	493		
Декамевит	277	Мульти-табс с Ви-			
Диа-Активанад-N	286	тамином С	494		
Кальцевита	365	ОртоВиталь Ф	537		
Капли Береш Плюс ..	370	Остеопан	543		
Компливит	403	Поливит гериатрик ...	578		
Коэнзим компози-		Протеин-спорт	595		
тум.....	413	Ревит	608		
Леузея	433	Ревиталайз-Муль-			
Мега Вите	458	ти-М АДС	608		
Мульти-Саностол....	493	Рикавит.....	620		
Олиговит	532	Стресс формула			
Поливит гериатрик ...	578	600	672		
Прегнавит	585	Стресс формула с			
Протеин-спорт	595	железом	672		
Ревит	608	Стресс формула с			
Ревиталайз-АДС	608	цинком	672		

18. Нарушения ПСИХИКИ

18.1. Абстиненция

Аллитера	119
Анаприлин	139
Атаракс.....	158
Берокка Са + Mg.....	181
Биолайн Стоп Смо-	
укин	190
Биотредин.....	190
Бутироксан	206
Гептрал.....	251
Грандаксин.....	267
Диазепам	288
Кальция пантоте-	
нат	368
Карбапин	374
Карбасан.....	375
Карбасан ретард	375
Коаксил	400
Лимонтар	437
Медихронал	460
Напотон.....	501

Ноотропил.....	526
Ойкамид.....	531
Пикамилон.....	564
Пирацетам.....	570
Пирроксан.....	572
Сибазон.....	649
Тиоприд.....	695
Тиодазин.....	701

18.2. Алкоголизм

Атаракс.....	158
Биотредин.....	190
Бутироксан.....	206
Видайлин-М.....	219
Галоперидол.....	236
Гаммалон.....	237
Геминеврин.....	245
Грандаксин.....	267
Деманол.....	280
Диазепам.....	288
Инозие-Ф.....	346
Коаксил.....	400
Контемнол.....	405
Лимонтар.....	437
Мебикар.....	457
Медихронал.....	460
Мезапам.....	460
Метадоксил.....	466
Меттионин.....	468
Напотон.....	501
Ноотропил.....	526
Ойкамид.....	531
Орвагил.....	535
Пикамилон.....	564
Пирацетам.....	570
Поливит гериатрик.....	578
Сант-Е-гал.....	638
Сенорм.....	646
Сибазон.....	649
Супрадин Рош.....	678
Тегретол.....	689
Тегретол ЦР.....	689
Тетурам.....	694
Тиоприд.....	695
Тиопридал.....	695
Тиодазин.....	701
Топрал.....	708
Унитиол.....	735
Уолш поливит для взрослых.....	735
Эспераль.....	828

18.3. Бессонница

Алталекс.....	122
Амол.....	136
Апо-Флуразепам.....	146
Берлидорм 10.....	176
Берлидорм 5.....	176
Бромазепам Ланна- хер.....	197
Буерлецитин.....	205
Валерианахель.....	208
Валерианы настой- ка.....	208
Валосердин.....	209
Галидор.....	235

Геминеврин.....	245
Глицин.....	262
Диазепам.....	288
Димедрол.....	301
Дормикум.....	313
Ивадал.....	329
Имован.....	338
Инсомния.....	347
Капли Береш Плюс ..	370
Корвалдин.....	408
Корвалол.....	408
Лекселиум.....	431
Мелатонекс.....	462
Менорест.....	463
Морфина гидрох- лорид.....	490
Напотон.....	501
Натрия оксibuти- рат.....	501
Нервофлукс.....	505
Нервохель.....	505
Нитрам.....	512
Ново-Пассит.....	522
Нозепам.....	524
Омнопон.....	534
Саносон.....	638
Сбор успокоитель- ный N 3.....	641
Седуксен.....	642
Танакан.....	685
Терален.....	692
Тизерцин.....	697
Фенибут.....	747
Фенобарбитал.....	749
Циркулин драже валерианы.....	797

18.3.1. Нарушения засыпания

Апо-Флуразепам.....	146
Валокордин.....	209
Донормил.....	312
Дормикум.....	313
Инсомния.....	347
Лорам.....	444
Мелатонекс.....	462
Мерлит.....	465
Нервофлукс.....	505
Нитразепам.....	511
Нитрам.....	512
Персен форте.....	562
Циркулин драже валерианы.....	797
Эуноктин.....	833

18.3.2. Раннее пробуждение

Апо-Флуразепам.....	146
Донормил.....	312
Дормикум.....	313
Инсомния.....	347
Лорам.....	444
Мелатонекс.....	462
Нитразепам.....	511
Нитрам.....	512

Персен форте.....	562
Эуноктин.....	833

18.4. Истерия

Валерианы настой- ка.....	208
Валидол.....	208
Валидол с глюко- зой.....	209
Глицин.....	262
Неулептил.....	506

18.5. Катаlepsия

Анафранил.....	140
Кломинал.....	398

18.6. Нарколеpsия

Анафранил.....	140
Кломинал.....	398
Натрия оксibuти- рат.....	501
Эфедрина гидрох- лорид.....	835

18.7. Нарушения восприятия информации**18.7.1. Галлюцинации**

Галопер.....	235
Галоперидол.....	236
Зипрекса.....	322
Мажептил.....	450
Мебикар.....	457
Пипортил.....	568
Рисполепт.....	621
Тизерцин.....	697

18.7.2. Кома мозговая

Ноотропил.....	526
Пирацетам.....	570

18.7.3. Спутанность сознания

Барнетил.....	167
Галопер.....	235
Галоперидол.....	237
Геминеврин.....	245
Глиатилин.....	260
Эглониал.....	805

18.8. Нарушения мыслительной деятельности

Аминалон.....	131
Нервохель.....	505
Пиридитол.....	571
Церебрум компози- тум.....	784

18.8.1. Бредовые состояния

Барнетил.....	167
Зипрекса.....	322
Мажептил.....	450
Пипортил.....	568
Пипортил Л4.....	568

Рисполепт	621
Тизерцин	697
ЭглониЛ.....	805

18.8.2. Дезориентация

Глиатилин.....	260
Зипрекса.....	322
Инстенон	347

18.8.3. Деменция

Аминалон.....	131
Галоперидол.....	236
Глиатилин.....	260
Давериум.....	271
Кавинтон	361
Нимотоп	509
Ново-Пассит.....	522
Ноотропил	526
Ойкамид.....	531
Церебролизин.....	783
Церебрум компози- тум.....	784
Цинедил	792

18.8.4. Затрудненное сосредоточение

Антисклерин	143
Биотредин.....	190
Давериум.....	271
Мемоплант.....	462
Персен форте	562
Пиридитол	571
Семакс.....	645

18.8.5. Интеллектуально-мнестические расстройства

Аллитера	119
Аминалон.....	131
Антисклерин	143
Биотредин.....	190
Глицин	262
Давериум.....	271
Инстенон	347
Кавинтон	361
Мемоплант.....	462
Ноотропил	526
Пирацетам	570
Пиридитол	571
Семакс.....	645
Танакан	685
Трентал	716
Церебрум компози- тум.....	784

18.8.6. Инфантилизм психический

Аминалон.....	131
Пиридитол	571
Церебролизин.....	783

18.8.7. Олигофрения

Галоперидол.....	236
Гаммалон	237
Ойкамид.....	531
Тизерцин	697
Церебрум компози-	

тум	784
Цианокобаламин	787

18.8.8. Сниженная концентрация внимания

Аминалон	131
Антисклерин	143
Биотредин	190
Буерлецитин	205
Галидор.....	235
Глиатилин	260
Кавинтон.....	361
Мемоплант	462
Мульти-Саностол	493
Нобритем	520
Ноотропил.....	526
Ойкамид	531
Персен форте.....	562
Семакс	645
Танакан.....	685
Трентал.....	716
Трентал 400	716
Церебролизин	783
Цинедил	792

18.9. Нарушения эмоциональной сферы

Амизол.....	129
Атаракс	158
Винпоцетин	223
Лекселиум.....	431
Церебрум компози- тум	784

18.9.1. Агрессивность

Азалептин.....	111
Аминазин	130
Барнетил	167
Галоперидол	236
Глицин	262
Зипрекса	322
Контемнол.....	405
Модитен.....	484
Сенорм.....	646
Тиопридал	695
Топрал	708

18.9.2. Апатия

Амитриптилин	
Словакофарма	134
Глицин	262
Грандаксин	267
Сиднокарб.....	649

18.9.3. Возбуждение

Антисклерин	143
Апо-Клоразепат.....	145
Атаракс	158
Барнетил	167
Биолайн Нервоуз- нес.....	189
Валерианахель	208
Валерианы насто- йка	208

Валокордин.....	209
Вибуркол	219
Галоперидол.....	236
Глицин	262
Диазепекс	288
Дормикум	313
Зипрекса.....	322
Нервофлукс	505
Нервохель.....	505
Неулептил.....	506
Нобритем	520
Пипортил	568
Пустырника на- стойка.....	601
Пустырника трава резано-прессован- ная	601
Седуксен.....	642
Сенорм	646
Сибазон	649
Тиопридал.....	695
Тиодазин.....	701
Топрал.....	708
Фенобарбитал	749
Циркулин драже валерианы	797

18.9.3.1. Возбуждение психомоторное

Азалептин	111
Аминазин	130
Апо-Тиоридазин.....	145
Барнетил	167
Галоперидол.....	236
Дроперидол.....	314
Модитен	484
Пролинат	591
Сибазон	649
Тиоприд.....	695
Тизерцин	697
Тиодазин.....	701
Хлоракон	775

18.9.4. Заторможенность

Амитриптилин	
Словакофарма	134
Биотредин.....	190
Кавинтон	361
Кломинал.....	398
Пирацетам	570
Сиднокарб	649
ЭглониЛ.....	805

18.9.5. Навязчивые расстройства

Анафранил.....	140
Кломинал.....	398
Портал	581
Пролинат	591
Рисполепт	621
Сенорм	646
Тиодазин.....	701

18.9.6. Напряженность

Апо-Клоразепат	145
Атаракс	158
Биолайн Нервоуз-нес	189
Бромазепам Ланна-хер	197
Валерианахель	208
Глицин	262
Диазепам	288
Диазепекс	288
Лайкан	422
Лексيليум	431
Мерлит	465
Нобритем	520
Ново-Пассит	522
Персен форте	562
Седуксен	642
Сибазон	649
Тиодазин	701

18.9.7. Паранойя

Галоперидол	236
Мебикар	457
Неулептил	506
Тразин	710

18.9.8. Псевдомеланхолия старческая

Глиатилин	260
Глицин	262

18.9.9. Раздражительность

Адонис-бром	110
Антисклерин	143
Атаракс	158
Биолайн Нервоуз-нес	189
Биотредин	190
Валерианахель	208
Валосердин	209
Глиатилин	260
Глицин	262
Диазепекс	288
Корвалдин	408
Корвалол	408
Мебикар	457
Нобритем	520
Ново-Пассит	522
Персен форте	562
Саносон	638

18.9.10. Сниженная инициативность

Биотредин	190
Глиатилин	260
Грандаксин	267

18.9.11. Тревожно-депрессивные состояния

Глицин	262
Кломинал	398
Коаксил	400
Нозепам	524

Сенорм	646
Терален	692
Тиодазин	701
Этимизол	832

18.9.11.1. Беспокойство

Апо-Клоразепат	145
Биолайн Нервоуз-нес	189
Валерианахель	208
Валерианы настой-ка	208
Геминеврин	245
Диазепам	288
Диазепекс	288
Индерал	343
Лайкан	422
Леузея	433
Нобритем	520
Пипольфен	567
Пролинат	591
Пустырника на-стойка	601
Пустырника трава резано-прессован-ная	601
Рудотель	631
Седуксен	642
Транксен	713
Туринойрин	728
Фенибут	747

18.9.11.2. Депрессия

Азона	112
Алзолам	117
Амизол	129
Амиксид	130
Амиксид-5	130
Амиксид-Н	130
Аминалон	131
Амирол	133
Амитриптилин	134
Словакофарма	140
Анафранил	140
Аурорикс	160
Биолайн Нервоуз-нес	189
Гептрал	251
Глютаминовая кис-лота	264
Грандаксин	267
Деманол	280
Диазепекс	288
Золофт	325
Карбамазепин-Акри	374
Кломинал	398
Коаксил	400
Людюмил	447
Мелипрамин	462
Мерлит	465
Миансан	474
Напотон	501
Нервохель	505
Пикамилон	564

Пирацетам	570
Портал	581
Продеп	589
Прозак	589
Сульпирид	675
Триптизол	723
Триттико	725
Туринойрин	728
Церебролизин	783
Церебрум компози-тум	784

18.9.11.2.1. Депрессия ажитированная

Пролинат	591
Тизерцин	697

18.9.11.3. Ипохондрия

Миансан	474
Терален	692

18.9.11.4. Тревога

Алзолам	117
Амиксид	130
Амиксид-5	130
Амиксид-Н	130
Апо-Клоразепат	145
Атаракс	158
Барнетил	167
Бромазепам Ланна-хер	197
Валерианахель	208
Диазепам	288
Диазепекс	288
Кломинал	398
Лексиллум	431
Лорам	444
Мебикар	457
Мерлит	465
Модитен	484
Ново-Пассит	522
Саносон	638
Сибазон	649
Терален	692
Тразин	710
Транксен	713
Тримепранол	722
Фенибут	747

18.9.11.5. Фобия

Алзолам	117
Аминазин	130
Анафранил	140
Апо-Клоразепат	145
Бромазепам Ланна-хер	197
Валерианахель	208
Валокордин	209
Грандаксин	267
Кломинал	398
Лайкан	422
Лексيليум	431
Лорам	444
Мебикар	457
Мерлит	465
Ново-Пассит	522



Пролинат.....	591
Рудотель.....	631
Саносон.....	638
Сибазон.....	649
Танакан.....	685
Тиодазин.....	701
Туринойрин.....	728

18.9.12. Эмоциональная лабильность

Амитриптилин	
Словакофарма.....	134
Бромазепам Ланна-хер.....	197
Глиатилин.....	260
Глицин.....	262
Мебикар.....	457
Нобритем.....	520
Ново-Пассит.....	522
Ойкамид.....	531
Транксен.....	713

18.10. Неврастения

Валерианахель.....	208
Витрум Витамин Е.....	230
Глицин.....	262
Деманол.....	280
Женьшень настойка.....	317
Лайкан.....	422
Мебикар.....	457
Натрия оксибутират.....	501
Ново-Пассит.....	522
Пиридитол.....	571
Сбор успокоительный N 3.....	641
Сибазон.....	649
Фенибут.....	747

18.11. Невроз

Адонис-бром.....	110
Апо-Клоразепат.....	145
Атаракс.....	158
Бромазепам Ланна-хер.....	197
Валерианахель.....	208
Валидол.....	208
Валидол с глюкозой.....	209
Валосердин.....	209
Витамин Е Словакофарма.....	227
Глицин.....	262
Грандаксин.....	267
Диазепам.....	288
Корвалдин.....	408
Корвалол.....	408
Лайкан.....	422
Ледоксина.....	428
Лексилум.....	431
Леузея.....	433
Лорам.....	444
Мебикар.....	457
Мезапам.....	460
Мерлит.....	465

Напотон.....	501
Натрия оксибутират.....	501
Нервохель.....	505
Нитразепам.....	511
Нобритем.....	520
Нозепам.....	524
Пипольфен.....	567
Пирацетам.....	570
Пустырника настойка.....	601
Пустырника трава резано-прессованная.....	601
Рудотель.....	631
Сбор успокоительный N 3.....	641
Седуксен.....	642
Сибазон.....	649
Сиднокарб.....	649
Сульпирид.....	675
Терален.....	692
Тизерцин.....	697
Тиодазин.....	701
Транксен.....	713
Церебрум композитум.....	784
Эглонил.....	805

18.12. Психоз

Апо-Тиоридазин.....	145
Барнетил.....	167
Галопер.....	235
Галоперидол.....	236
Глютаминовая кислота.....	264
Зипрекса.....	322
Мажептил.....	450
Мебикар.....	457
Модитен.....	484
Модитен депо.....	484
Натрия оксибутират.....	501
Ойкамид.....	531
Пипортил.....	568
Пипортил Л4.....	568
Пролинат.....	591
Рисполепт.....	621
Седуксен.....	642
Сульпирид.....	675
Тизерцин.....	697
Топрал.....	708
Тразин.....	710
Эглонил.....	805

18.12.1. Психоз алкогольный

Аминазин.....	130
Атаракс.....	158
Галоперидол.....	236
Лексилум.....	431
Пирацетам.....	570
Сенорм.....	646
Сибазон.....	649
Сульпирид.....	675
Тиаприд.....	695

18.12.2. Психоз инволюционный

Амитриптилин	
Словакофарма.....	134
Галоперидол.....	236
Мебикар.....	457
Пикамилон.....	564
Пипольфен.....	567
Пролинат.....	591
Цинедил.....	792

18.12.3. Психоз маниакально-депрессивный

Амизол.....	129
Амитриптилин	
Словакофарма.....	134
Апо-Тиоридазин.....	145
Галопер.....	235
Галоперидол.....	237
Контемнол.....	405
Лития карбонат.....	441
Мажептил.....	450
Мелипрамин.....	462
Пипольфен.....	567
Пипортил.....	568
Пролинат.....	591
Сенорм.....	646
Тегретол.....	689
Тегретол ЦР.....	689
Тиодазин.....	701

18.13. Психопатия

Бромазепам Ланна-хер.....	197
Галоперидол.....	236
Неулептил.....	506
Нозепам.....	524
Сибазон.....	649
Терален.....	692

18.14. Токсикомания

Атаракс.....	158
Контемнол.....	405
Ойкамид.....	531
Пирацетам.....	570

18.15. Шизофрения

Азалептин.....	111
Апо-Тиоридазин.....	145
Галопер.....	235
Галоперидол.....	236
Деманол.....	280
Зипрекса.....	322
Лорам.....	444
Мажептил.....	450
Мебикар.....	457
Модитен.....	484
Модитен депо.....	484
Неулептил.....	506
Пипортил.....	568
Пипортил Л4.....	568
Пролинат.....	591
Рисполепт.....	621
Сенорм.....	646
Сибазон.....	649
Сиднокарб.....	649

Сульпирид	675
Тизерцин	697
Тиодазин	701
Топрал	708
Тразин	710
Эглонил	805

18.16. Энцефалопатия

Аминалон	131
Бевиплекс	169
Вазонит	207
Гаммалон	237
Гепастерил А	250
Глицин	262
Кавинтон	361
Лактулоза сироп	423
Орницетил	537
Пиридитол	571
Эуноктин	833

18.17. Ювенильные и другие нарушения поведения

Андрокур-Депо	142
Галоперидол	237
Гаммалон	237
Глицин	262
Даверинум	271
Депакин	281
Депакин 300 энтерик	281
Депакин хроно	281
Депакин хроно 500	281
Модитен	484
Ойкамид	531
Сенорм	646
Тиапридал	695
Топрал	708

19. Нарушения СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ

19.1. Геморрагический синдром

Аскорбиновая кислота	151
Викасол	220
Дицинон	307
Этамзилат	831

19.2. Гиперагрегация

Гепарин	248
Ласпал	425

19.3. Гиперкоагуляция

Вессел Дуэ Ф	219
Гепарин	248
Клексан	391
Курантил N 25	418
Укидан	729

19.4. Гиперфибринолиз

Экзацил	808
---------------	-----

19.5. Гипокоагуляция

19.5.1. Дефицит фактора свертывания крови II

Викасол	220
Фейба ТИМ 4 Иммуно	746

19.5.2. Дефицит фактора свертывания крови IX

Викасол	220
Фейба ТИМ 4 Иммуно	746

19.5.3. Дефицит фактора свертывания крови VII

Викасол	220
Фейба ТИМ 4 Иммуно	746

19.5.4. Дефицит фактора свертывания крови VIII

Гемофил М	245
Фейба ТИМ 4 Иммуно	746

19.5.5. Дефицит фактора свертывания крови X

Викасол	220
Фейба ТИМ 4 Иммуно	746

19.6. ДВС-синдром

Гепарин	248
---------------	-----

19.7. Кровотечение

Адреналина гидрохлорид	110
Викасол	220
Гемофил М	245
Кальция глюконат	367
Пленка с линкомицином	574
Поликапран	578
Протамин сульфат	594
Реместип	613
Рефортан	618
Стабизол	666
Трансамча	714
Фейба ТИМ 4 Иммуно	746
Ферретаб комп.	751
Ферро-градумет	751
Эфедрина гидрохлорид	835

19.7.1. Кровотечение в полости рта

Гексорал	243
Геласпон	243
Дицинон	307
Пародиум	554
Пленка с линкомицином	574
Стопангин	669
Тиссукол Кит	704
Целаскон Эффервесценс	781

19.7.2. Кровотечение в послеоперационном периоде

Викасол	220
Геласпон	243
Дицинон	307
Нейтронорм	504
Пленка с линкомицином	574
Поликапран	578
Протамин сульфат	594
Реместип	613
Рефортан	618
Симесан	651
Стабизол	666
Стиламин	669
Тиссукол Кит	704
Трансамча	714
Экзацил	808
Этамзилат	831

19.7.3. Кровотечение геморроидальное

Викасол	220
Дицинон	307
Ферро-градумет	751

19.7.4. Кровотечение гиперфибринолитическое

Гордокс	266
Памба	548
Поликапран	578
Трансамча	714
Трасилол	714
Экзацил	808

19.7.5. Кровотечение желудочно-кишечное

Аксид	113
Викасол	220
Гепастерил А	250
Гистак	257
Дицинон	307
Зантак	318
Индерал	343
Квамател	381
Нейтронорм	504
Раниберл	602
Ранитал	602
Реместип	613



Симесан.....	651
Стиламин.....	669
Тиссукол Кит.....	704
Ферро-градумет.....	751
Экзацил.....	808
Этамзилат.....	831

19.7.6. Кровотечение капиллярное

Викасол.....	220
Губка гемостатическая коллагеновая.....	270
Дицинон.....	307
Пленка с линкомицином.....	574
Поликапран.....	578
Тиссукол Кит.....	704

19.7.7. Кровотечение легочное

Аскорбиновая кислота.....	151
Викасол.....	220
Дицинон.....	307
Тиссукол Кит.....	704
Трансамча.....	714

19.7.8. Кровотечение маточное

Апилак.....	145
Аскорбиновая кислота.....	151
Ацетомепрегенол.....	163
Викасол.....	220
Дицинон.....	307
Метилэргобревин.....	467
Микрофоллин форте.....	478
Мирена.....	483
Норколут.....	528
Окситоцин.....	531
Премарин.....	586
Ременс.....	612
Реместип.....	613
Тестостерона пропионат.....	693
Трансамча.....	714
Ферро-градумет.....	751
Цикло 3 форт.....	788
Эгестренол.....	805
Экзацил.....	808
Этамзилат.....	831

19.7.9. Кровотечение носовое

Аскорбиновая кислота.....	151
Викасол.....	220
Губка гемостатическая коллагеновая.....	270
Дицинон.....	307
Нафтизин.....	502
Трансамча.....	714
Ферро-градумет.....	751
Экзацил.....	808

19.7.10. Кровотечение печеночное

Аскорбиновая кислота.....	151
Викасол.....	220
Дицинон.....	307
Пленка с линкомицином.....	574
Поликапран.....	578
Тиссукол Кит.....	704

19.7.11. Кровотечение у больных с лейкозами

Дицинон.....	307
Трансамча.....	714

19.7.12. Кровотечение у больных с тромбоцитопенической пурпурой

Дицинон.....	307
Трансамча.....	714
Этамзилат.....	831

20. Синдром БОЛЕВОЙ

Анальгин.....	139
Аспизол.....	153
Аспирин-директ.....	156
Ацесал.....	162
Ацетилсалициловая кислота.....	162
Випросал В мазь.....	223
Вольтарен.....	232
Вольтарен рапид.....	232
Диклобене.....	293
Дикломелан.....	295
Диклофенак ЕС.....	298
Кетанов.....	385
Кетонал.....	386
Кломинал.....	398
Лекадол.....	429
Мигренол ПМ.....	475
Новиган.....	521
Нопан.....	526
Ортофен.....	540
Перофен.....	562
Пронаксен.....	592
Протрадон.....	596
Реметан.....	613
Ремоксикам.....	613
Спаскупрель.....	664
Траумель С.....	714
Фебрицет.....	745
Хотемин.....	777

20.1. Артралгия

Алталекс.....	122
Амол.....	136
Анопирин.....	143
Апизартрон.....	144
Аскофен-П.....	152
Аспизол.....	153

Аспирин-директ.....	156
Афлубин.....	160
Ацесал.....	162
Ацилпирин.....	165
Ацифеин.....	166
Бурана.....	205
Гумизоль.....	270
Диклобене.....	293
Диклориум.....	296
Диклофенак ЕС.....	298
Диклофенак-Ретард.....	298
Ибуклин.....	327
Ибуклин юниор.....	327
Индометацин-Акри.....	345
Капли Береш Плюс.....	370
Кетонал.....	386
Ким бальзам жидкий.....	388
Мексавит.....	461
Меновазин.....	463
Ментоклар.....	464
Мефенаминовая кислота.....	473
Мигренол.....	475
Мигренол ПМ.....	475
Муравьиный спирт.....	495
Нифлугель.....	519
Остеопан.....	543
Пейн.....	555
Пенталгин-Н.....	557
Перца стручкового настойка.....	563
Пливалгин.....	575
Протрадон.....	596
Реметан.....	613
Саридон.....	639
Тобитил.....	705
Флугалин.....	758
Форталгин Ц.....	762
Цитрамон П.....	802
Эльдерин.....	811

20.2. Болевой синдром выраженный

Диклоберл 100.....	294
Диклоберл 25.....	294
Диклоберл 50.....	294
Диклоберл 75.....	294
Диклоберл ретард.....	294
Диклонат П.....	296
Дипидолор.....	302
Диприван.....	302
Кетонал.....	386
Кеторол.....	387
Морадол.....	489
Морфина гидрохлорид.....	490
Нопан.....	526
Омнопон.....	534
Перца стручкового настойка.....	563
Промедол.....	591
Протрадон.....	596
Скенап.....	657

Стадол.....	666	Аспирин УПСА с		Аспро С форте.....	157
Стадол НС.....	667	витамином С.....	156	Ацесал.....	162
Тиапридал.....	695	Аспро витамин С.....	157	Ацетаминифен.....	162
Торадол.....	708	Аспро С форте.....	157	Ацилпирин.....	165
Трамадол Ланнахер.....	711	Ацесал.....	162	Ацифеин.....	166
Трамадол-Акри.....	712	Ацетаминифен.....	162	Брустан.....	204
Трамал.....	712	Ацилпирин.....	165	Диклоберл 100.....	294
Трамал ретард.....	713	Ацифеин.....	166	Диклоберл 25.....	294
Фентанил.....	750	Брустан.....	204	Диклоберл 50.....	294
Эльдерин.....	811	Диклоберл 100.....	294	Диклоберл 75.....	294
20.3. Болевой син-		Диклоберл 25.....	294	Диклоберл ретард.....	294
дром в родах и		Диклоберл 50.....	294	Диклориум.....	296
послеродовой пери-		Диклоберл 75.....	294	Диклофенак-Ре-	
од		Диклоберл ретард.....	294	тард.....	298
Кетанов.....	385	Диклориум.....	296	Доналгин.....	312
Кетонал.....	386	Ибуклин.....	327	Ибуклин.....	327
Магния сульфат.....	449	Ибуклин юниор.....	327	Ибуклин юниор.....	327
Маркаин.....	456	Ибупрофен.....	327	Ибупрофен.....	327
Маркаин адрена-		Ибупрофен Ланна-		Ибупрофен Ланна-	
лин.....	456	хер.....	328	хер.....	328
Промедол.....	591	Индометацин.....	344	Индометацин.....	344
Протрадон.....	596	Калпол.....	364	Индометацин-Акри.....	345
Стадол.....	666	Калпол 6 плюс.....	364	Калпол.....	364
Стадол НС.....	667	Каффетин.....	380	Калпол 6 плюс.....	364
Эльдерин.....	811	Кетанов.....	385	Каффетин.....	380
20.4. Болевой син-		Кетонал.....	386	Кетанов.....	385
дром при инфаркте		Ласпал.....	425	Кетонал.....	386
легкого		Лупоцет.....	447	Ласпал.....	425
Кетонал.....	386	Мексавит.....	461	Лупоцет.....	447
Эльдерин.....	811	Мигренол.....	475	Мексавит.....	461
20.5. Болевой син-		Мигренол ПМ.....	475	Мигренол.....	475
дром при инфаркте		Парацетамол.....	552	Мигренол ПМ.....	475
миокарда		Парацетамол 120		Морадол.....	489
Кетонал.....	386	Берлин-Хеми.....	552	Наклофен.....	499
Морфина гидрох-		Парацетамол 200		Наклофен Дуо.....	499
лорид.....	490	Берлин-Хеми.....	552	Нопан.....	526
Омнопон.....	534	Парацетамол 500.....	552	Парацетамол.....	552
Протрадон.....	596	Пейн.....	555	Парацетамол 120	
Эльдерин.....	811	Пенталгин-Н.....	557	Берлин-Хеми.....	552
20.6. Болевой син-		Про-эфффералган.....	588	Парацетамол 200	
дром при остром		Профенид.....	597	Берлин-Хеми.....	552
панкреатите		Профенид гель		Парацетамол 500.....	552
Кетонал.....	386	2,5%.....	597	Пейн.....	555
Протрадон.....	596	Ронал.....	627	Пенталгин-Н.....	557
Эльдерин.....	811	Саридон.....	639	Про-эфффералган.....	588
20.7. Болевой син-		Спаздолзин.....	663	Профенид.....	597
дром при прорезы-		Фебрицет.....	745	Профенид гель	
вании зубов		Форталгин Ц.....	762	2,5%.....	597
Калгель.....	361	Цитрамон П.....	802	Репарил-гель Н.....	616
Калпол.....	364	Эльдерин.....	811	Ронал.....	627
Калпол 6 плюс.....	364	Эфффералган.....	836	Санфинак.....	639
Мундизал гель.....	495	Эфффералган с ви-		Саридон.....	639
Пиралвекс.....	570	тамином С.....	837	Спаздолзин.....	663
Солкосерил.....	659	20.9. Болевой син-		Стадол.....	666
20.8. Болевой син-		дром умеренный		Стадол НС.....	667
дром слабый		Анальгин.....	139	Сургам.....	679
Анальгин.....	139	Анопирин.....	143	Торадол.....	708
Анопирин.....	143	Аскофен-П.....	152	Трамадол Ланнахер.....	711
Аспирин.....	154	Аспирин.....	154	Трамадол-Акри.....	712
Аспирин плюс С.....	155	Аспирин плюс С.....	155	Трамал.....	712
Аспирин УПСА.....	155	Аспирин УПСА.....	155	Трамал ретард.....	713
		Аспирин УПСА с		Фебрицет.....	745
		витамином С.....	156	Форталгин Ц.....	762
		Аспро витамин С.....	157	Цитрамон П.....	802
				Эльдерин.....	811



Эффералган 836
Эффералган с ви-
тамином С 837

20.10. Боли в глазах

Диглофтон 292
Кетонал 386
Эльдерин 811

20.11. Боли при но- шении зубных про- тезов

Кетонал 386
Мундизал гель 495
Пансорал 549
Пародиум 554
Пиралвекс 570
Солкосерил 659
Эльдерин 811

20.12. Боли фантом- ные

Капли Береш Плюс .. 370
Кетонал 386
Эльдерин 811

20.13. Боль голов- ная

Алка-зельтцер 117
Алталекс 122
Альдолор 124
Аминалон 131
Амол 136
Анальгин 139
Анопирин 143
Аскофен-П 152
Аспирин плюс С 155
Аспирин-директ 156
Ацесал 162
Ацетаминофен 162
Ацилпирин 165
Ацифеин 166
Биолайн Колд 189
Брустан 204
Бруфен 205
Бурана 205
Винпоцетин 223
Галидор 235
Давернуум 271
Дитамин 305
Ибуклин 327
Ибуклин юниор 327
Ибупрофен Ланна-
хер 328
Ибусан 328
Калпол 364
Калпол 6 плюс 364
Каффетин 380
Кетонал 386
Ким бальзам жид-
кий 388
Лекадол 429
Лупоцет 447
Мексавит 461
Мемоплант 462
Мерлит 465
Мефенаминовая

кислота 473
Мигренол 475
Мигренол ПМ 475
Никошпан 509
Новиган 521
Ново-Пассит 522
Парацетамол 553
Пейн 555
Пенталгин-Н 557
Пливалгин 575
Санапрокс 635
Саридон 639
Синусан 655
Спаздолзин 663
Спигелон 664
Фебрицет 745
Форталгин Ц 762
Циннасан 794
Цитрамон П 802
Эльдерин 811

20.14. Боль зубная

Альдолор 124
Анопирин 143
Аскофен-П 152
Аспирин плюс С 155
Аспирин-директ 156
Ацесал 162
Ацетаминофен 162
Ацилпирин 165
Ацифеин 166
Брустан 204
Бруфен 205
Бурана 205
Ибуклин 327
Ибуклин юниор 327
Ибупрофен Ланна-
хер 328
Ибусан 328
Калпол 364
Калпол 6 плюс 364
Каффетин 380
Кетанов 385
Кетонал 386
Кеторол 387
Лекадол 429
Лупоцет 447
Мигренол 475
Мигренол ПМ 475
Парацетамол 553
Пенталгин-Н 557
Пливалгин 575
Санапрокс 635
Саридон 639
Сенсигель 646
Солкосерил 659
Спаздолзин 663
Фебрицет 745
Эльдерин 811

20.15. Гастралгия

Алталекс 122
Анестезин 143
Бимарал 187
Бисмофальк 191
Гестид 251

Зантак 318
Кетонал 386
Маалокс 448
Метамол 466
Ренни 615
Синусан 655
Эльдерин 811

20.16. Глоссалгия

Кетонал 386
Эльдерин 811

20.17. Дисальгеме- норея

Аскофен-П 152
Аспирин плюс С 155
Ацетаминофен 162
Брустан 204
Бруфен 205
Бурана 205
Дикломелан 295
Диклонат П 296
Ибуклин 327
Ибуклин юниор 327
Индовис ЕС 344
Индометацин 345
Индотард 346
Каффетин 380
Кетонал 386
Кнафон 399
Лекадол 429
Лупоцет 447
Мигренол 475
Мигренол ПМ 475
Наклофен 499
Наклофен Дуо 499
Пливалгин 575
Ременс 612
Саридон 639
Спазмовеалгин 663
Нео 663
Фебрицет 745
Флугалин 758
Эльдерин 811

20.18. Ишиалгия

Амол 136
Анальгин 139
Анопирин 143
Апизартрон 144
Ацилпирин 165
Ацифеин 166
Бруфен 205
Випросал В мазь 223
Диклобене 293
Дикломелан 295
Диклофенак-Ре-
тард 298
Ибуклин 327
Ибуклин юниор 327
Индовис ЕС 344
Индометацин-Акри 345
Индотард 346
Капли Береш Плюс 370
Капсикам 373
Каффетин 380

Кетанов.....	385	Диклориум.....	296	Валтрекс	209
Кетонал.....	386	Диклофенак	297	Випросал В мазь	223
Миоластан.....	482	Диклофенак-Ре-		Гумизоль	270
Муравьиный спирт	495	тард.....	298	Диклобене	293
Наклофен.....	499	Ибуклин	327	Дикломелан	295
Наклофен Дуо.....	499	Ибуклин юниор.....	327	Диклориум	296
Нейромультивит.....	503	Ибупрофен	327	Диклофенак.....	297
Нифлугель	519	Ибупрофен Ланна-		Диклофенак-Ре-	
Нифлурил.....	519	хер	328	тард	298
Перофен.....	562	Ибусан	328	Ибуклин.....	327
Перца стручкового		Индометацин-Акри ..	345	Ибуклин юниор	327
настойка.....	563	Йода спиртовой		Ибупрофен	327
Пироксикам.....	572	раствор.....	359	Ибупрофен Ланна-	
Пливалгин.....	575	Каффетин	380	хер	328
Профенид.....	597	Кетанов	385	Ибусан	328
Профенид гель		Кетонал	386	Индометацин	345
2,5%.....	597	Ким бальзам жид-		Индометацин-Акри ..	345
Ревма-гель.....	609	кий.....	388	Йода спиртовой	
Ревмон гель.....	609	Мексавит	461	раствор.....	359
Реметан.....	613	Меновазин	463	Калпол.....	364
Репарил-гель Н.....	616	Ментоклар	464	Калпол 6 плюс.....	364
Санапрокс	635	Мефенаминовая		Кальция пантоте-	
Санфинак.....	639	кислота	473	нат	368
Синусан	655	Мигренол.....	475	Капсикам.....	373
Стекловидное тело	668	Мигренол ПМ	475	Карбамазепин-	
Сургам.....	679	Миоспрей	483	Акри	374
Теникам	690	Муравьиный спирт ..	495	Карбапин.....	374
Тобитил	705	Наклофен	499	Карбасан	375
Торадол	708	Наклофен Дуо.....	499	Карбасан ретард.....	375
Унгапивен	735	Нифлугель.....	519	Каффетин.....	380
ФиБС.....	753	Нифлурил.....	519	Кетонал.....	386
Эльдерин	811	Ортофен	540	Кеторол.....	387
20.19. Кардиалгия		Остеопан	543	Ким бальзам жид-	
Амол.....	136	Парацетамол	553	кий	388
Валокордин	209	Пейн	555	Мазепин	450
Валосердин.....	209	Пливалгин	575	Мексавит	461
Грандаксин	267	Ревма-гель	609	Меновазин	463
Кетонал.....	386	Ревмон гель	609	Мефенаминовая	
Милдронат	480	Ремоксикам.....	613	кислота	473
Пумпан	600	Санапрокс	635	Муравьиный спирт	495
Эльдерин	811	Санфинак	639	Наклофен.....	499
20.20. Масталгия		Спаскупрель	664	Наклофен Дуо	499
Кетонал.....	386	Торадол	708	Нейромультивит	503
Мастодинон	456	Унгапивен.....	735	Парацетамол	553
Норколут	528	Фебрицет	745	Пейн.....	555
Эльдерин	811	ФиБС.....	753	Пенталгин-Н.....	557
20.21. Миалгия		Флугалин	758	Пироксикам	572
Альдолор	124	Форталгин Ц.....	762	Пливалгин.....	575
Амол.....	136	Эльдерин	811	Протрадон	596
Анальгин.....	139	20.22. Невралгия		Ремоксикам	613
Анопирин	143	Амбене	127	Санапрокс	635
Апизартрон.....	144	Амол	136	Санфинак	639
Аскофен-П	152	Анальгин	139	Стекловидное тело	668
Аспизол	153	Анопирин.....	143	Сторилат	670
Аспирин-директ	156	Апизартрон	144	Тегретол.....	689
Ацесал.....	162	Аскофен-П	152	Тегретол ЦР	689
Ацилпирин	165	Аспизол	153	Торадол.....	708
Ацифеин	166	Аспирин-директ	156	Фебрицет	745
Брустан.....	204	Афлубин.....	160	Форталгин Ц	762
Бурана.....	205	Ацетаминофен	162	Хлорэтил.....	775
Випросал В мазь	223	Ацилпирин.....	165	Цианокобаламин	787
Детралекс.....	285	Ацифеин.....	166	Цитрамон П.....	802
Диклобене	293	Бевиплекс	169	Эльдерин.....	811
Дикломелан.....	295	Бурана.....	205	Эпиал	823

20.23. Цисталгия

Гентос	247
Кетонал	386
Спазмoverалгин	
Нео	663
Эльдерин	811

21. Синдром ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

Анопирин.....	143
Артрекс	150
Аспирин	154
Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Ацесал.....	162
Ацетилсалициловая кислота	162
Ацилпирин.....	165
Вольтарен	232
Вольтарен рапид.....	232
Диклобене	293
Дикломелан	295
Диклонат П	296
Диклофен	297
Ибуклин	327
Ибуклин юниор.....	327
Ибупрофен	327
Индометацин-Акри	345
Кетонал	386
Лимфомиозот	437
Нифлурил	519
Олигогал-Se	533
Ортофен	540
Пенталгин-Н	557
Реметан	613
Сандра	637
Тобитил	705
Траумель С	714
Форталгин Ц.....	762
Целестон.....	782
Эльдерин	811
Эскузан	827

22. Синдром ГИПОКСИЧЕСКИЙ

Коэнзим компози- тум.....	413
Натрия оксibuти- рат	501
Семакс.....	645
Убихинон компози- тум.....	729
Церебрум компози- тум.....	784

23. Синдром ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ

Анексат	142
Аскорбиновая кис- лота	151
Биолайн Детокси- кация	188
Вибуркол	219
Галиум-Хель	235
Гепар композитум.....	248
Дианил	289
Инозие-Ф	346
Коэнзим компози- тум	413
Липоевая кислота	440
Натрия оксibuти- рат.....	501
Ноотропил.....	526
Олигогал-Se.....	533
Перфторан	562
Пирацетам	570
Плазма-Лит 148	
Водный Раствор	572
Полисорб МП	580
Раствор Хартмана	605
Раствор Хартманна	605
Рикавит	620
Сиднокарб	649
Триамцинолон.....	718
Убихинон компози- тум	729
Фуросемид	770
Энгистол	815

23.1. Гепатопораже- ния лекарственные

Инозие-Ф	346
Калия оротат	363
Сирепар	656
Эссенциале	829

23.2. Интоксикация алкалоидами

Уголь активирован- ный.....	729
Уголь активирован- ный ФАС-Э.....	729

23.3. Интоксикация алкогольная

Апо-Клоразепат.....	145
Кофеин-бензоат на- трия	412
Левулоза	427
Лимонтар	437
Медихронал	460
Орницетил.....	537
Пикамилон	564
Пирацетам	570

23.4. Интоксикация антагонистами фо- лиевой кислоты

Кальциумфолинат- Эбеве.....	368
Кальция фолинат.....	368
Лейковорин АДС.....	428
Фолинат кальция.....	761

23.5. Интоксикация антихолинэстераз- ными средствами

Тропацин	727
----------------	-----

23.6. Интоксикация бензольная

Метилурацил.....	467
Пентоксил.....	558

23.7. Интоксикация металлами (редкозе- мельными, тяжелы- ми)

Артамин.....	149
Гидрокортизон	252
Медетопект	459
Олигогал-Se	533
Уголь активирован- ный	729
Уголь активирован- ный ФАС-Э	729
Унитиол.....	735

23.8. Интоксикация мышьяком

Унитиол.....	735
--------------	-----

23.9. Интоксикация наркотиками

Бемегрид	173
Кофеин-бензоат на- трия	412
Ойкамид	531
Пирацетам	570
Эфедрина гидрох- лорид	835

23.10. Интоксика- ция никотином

Биолайн Стоп Смо- укин	190
Поливит гериатрик	578
Уолш поливит для взрослых.....	735

23.11. Интоксика- ция радионуклидами

Олигогал-Se	533
-------------------	-----

23.12. Интоксика- ция сердечными гли- козидами

Аспаркам	153
Инозие-Ф	346
Калия глутаминат	363
Калия-магния-аспа- рагинат	363

Обзидан	530
Панангин	548
Рибоксин	619

23.13. Интоксикация снотворными и транквилизаторами

Анексат	142
Бемегрид	173
Кофеин-бензоат натрия	412
Ойкамид	531
Фуросемид	770
Фурсемид	772
Эфедрина гидрохлорид	835

23.14. Интоксикация щавелевой и фтористой кислотами

Кальция глюконат	367
------------------------	-----

23.15. Кардиопоражения антрациклиновые

Кардиоксан	378
------------------	-----

24. Синдром ЛИХОРАДОЧНЫЙ

Альдолор	124
Анальгин	139
Анопирин	143
Аскофен-П	152
Аспирин	154
Аспирин плюс С	155
Аспирин УПСА	155
Аспирин УПСА с витамином С	156
Аспирин-директ	156
Аспро витамин С	157
Аспро С форте	157
Ацесал	162
Ацетаминофен	162
Ацилпирин	165
Ацифеин	166
Бевиплекс	169
Брустан	204
Бурана	205
Валерианахель	208
Вибуркол	219
Видайлин-М	219
Гриппекс	268
Дексаметазон	279
Ибуклин	327
Ибуклин юниор	327
Ибупрофен	327
Ибупрофен Ланна-хер	328
Калпол	364
Калпол 6 плюс	364
Каффетин	380
Ласпал	425
Лекадол	429

Лупоцет	447
Мексавит	461
Мефенаминовая кислота	473
Мигренол	475
Парацетамол	552
Парацетамол 120	552
Берлин-Хеми	552
Парацетамол 200	552
Берлин-Хеми	552
Парацетамол 500	552
Пенталгин-Н	557
Пливалгин	575
Про-эффэралган	588
Ронал	627
Сандра	637
Саридон	639
Спаздолзин	663
Фебрицет	745
Фервекс	750
Форталгин Ц	762
Целестон	782
Эффэралган	836
Эффэралган с витамином С	837

25. Синдром СНИЖЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Активанад-N	115
Биотредин	190
Видайлин-М	219
Витамин Е Словакофарма	227
Глицин	262
Декамевит	277
Диа-Активанад-N	286
Женьшеня настойка	317
Калия оротат	363
Кальцевита	365
Кальция глицерофосфат	367
Кофеин-бензоат натрия	413
Лековит	430
Лековит С-Са	430
Леузея	433
Лимонтар	437
Милдронат	480
Мориамин форте	490
ОртоВиталь Ф	537
Пумпан	600
Рикавит	620
Семакс	645
УПСАВИТ витамин С	736

26. Состояния АКУШЕРСКИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ

26.1. Асфиксия

26.1.1. Асфиксия новорожденных

Компламин	403
Этимизол	832

26.1.2. Асфиксия плода внутриутробная

Компламин	403
Намацит	501

26.2. Атония матки

Окситоцин	531
Фосфобин	765

26.3. Беременность недоношенная

Профазин	596
----------------	-----

26.4. Выкидыш

26.4.1. Выкидыш в первом триместре беременности

Ацетомепрегенол	163
Оксипрогестерона капронат	531
Профазин	596

26.4.2. Выкидыш несостоявшийся

Окситоцин	531
Профазин	596

26.4.3. Выкидыш угрожающий

альфа-Токоферола ацетат	125
Ацетомепрегенол	163
Бриканил	197
Витамин Е Словакофарма	227
Гонадотропин хорионический	264
Оксипрогестерона капронат	531
Профазин	596
Седуксен	642
Эндур-Е 200	817

26.5. Инволюция матки медленная

Метилэргобревин	467
Окситоцин	531

26.6. Расслабление матки

Дротаверина гидрохлорид	314
Но-шпа	520

26.7. Роды

Кандибене.....	369
Метилэргобревин.....	467
Раниберл.....	602
Трасилол.....	714

26.7.1. Родовой деятельности слабость

Амиридин.....	133
Анаприлин.....	139
Окситоцин.....	531
Прозерин.....	589
Фосфобион.....	765

26.7.2. Роды преждевременные

Алопрол.....	121
Бриканил.....	197
Сальбутамол.....	635
Тропацин.....	727

26.7.3. Усталость роженицы

Натрия оксидбутират.....	501
--------------------------	-----

26.8. Токсикоз беременности

Кальция пантотенат.....	368
Пиридоксина гидрохлорид.....	571
Эссенциале.....	829

26.8.1. Токсикоз беременности поздний

Аскорбиновая кислота.....	152
Буфенокс.....	206
Гипотиазид.....	256
Фурсемид.....	772

26.8.2. Эклампсия

Апрессин.....	147
Геминеврин.....	245
Кальция глюконат.....	367
Магния сульфат.....	449
Пентамин.....	558
Седуксен.....	642
Тромбо АСС.....	726
Фенобарбитал.....	749
Фуросемид.....	770
Фуросемид Ланнахер.....	771
Фурсемид.....	772

27. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Абактал.....	105
Агиолакс.....	107
Азактам.....	110
Аминостерил II.....	132
Новум.....	132
Аминостерил III.....	132
Новум.....	132

Амоксиклав.....	135
Ампициллина натриевая соль кристаллическая.....	137
Анекаин.....	142
Ардуан.....	148
Аспизол.....	153
Аспирин Кардио.....	154
Аспифат.....	157
Атаракс.....	158
Ацетилцистеин.....	163
Аятин.....	166
Бактрим.....	167
Беломет.....	173
Бетадин.....	181
Бетадине.....	182
Бриетал.....	195
Бриканил.....	197
Бромазепам Ланнахер.....	197
Бруфен.....	205
Бурана.....	205
Видалин-М.....	219
Вольтарен.....	232
Вольтарен рапид.....	232
Галидор.....	235
Галоперидол.....	237
Гарамицин.....	238
Гексорал.....	243
Геласпон.....	243
Геминеврин.....	245
Гепарин Биохеми.....	249
Гипозоль.....	256
Гистак.....	257
Губка гемостатическая коллагеновая.....	270
Дефламон.....	286
Диклоберл 100.....	294
Диклоберл 25.....	294
Диклоберл 50.....	294
Диклоберл 75.....	294
Диклоберл ретард.....	294
Дикломелан.....	295
Диклонат II.....	296
Диоксидин.....	301
Диприван.....	302
Добутрекс.....	307
Доксициклина гидрохлорид.....	310
Дормикум.....	313
Дроперидол.....	314
Зантак.....	318
Зинацеф.....	320
Зофран.....	326
Ибупрофен Ланнахер.....	328
Изокал.....	330
Инсуман Базал.....	348
Ируксол.....	359
Калипсол.....	362
Канамицин сульфат.....	369
Каффетин.....	380
Квамател.....	381
Кеталар.....	385

Кетанест.....	385
Кетанов.....	385
Кетонал.....	386
Кеторол.....	387
Кефзол.....	388
Клафоран.....	390
Кливарин.....	392
Климицин.....	395
Клион.....	397
Комбутек-2.....	402
Консупрен.....	404
Коргард.....	409
Креон.....	414
Ксилокаин.....	417
Ксилокаин адреналин.....	417
Левулоза.....	427
Лендацин.....	432
Лидокаин.....	434
Лидокаина гидрохлорид.....	435
Ликацин.....	435
Ликопид.....	436
Лиотон 1000.....	438
Лонгацеф.....	443
Мандол.....	454
Маркаин.....	456
Маркаин адреналин.....	456
Мерлит.....	465
Метилурацил.....	467
Мефоксин.....	473
Мивакрон.....	475
Морадол.....	489
Морфина гидрохлорид.....	490
Наклоф.....	498
Наклофен.....	499
Наклофен Дуо.....	499
Натрия оксидбутират.....	501
Нелорен.....	504
Неотон.....	505
Нетромидин.....	506
Нитро.....	512
Нитроджект.....	514
Нитроксолин.....	514
Новокаин.....	523
Норгалакс.....	527
Нормикс.....	528
Омнопон.....	534
Осетрон.....	541
Оспамокс.....	542
Офрамакс.....	544
Панцитрат.....	550
Пентрексил.....	558
Перлинганит.....	560
Перфторан.....	562
Пефлацин.....	563
Пипрацил.....	569
Плазма-Лит 148.....	572
Водный Раствор.....	572
Пленка с линкомицином.....	574
Пливасепт.....	575

Повидон-йод.....	576	Тромбо АСС.....	726	Кларитин.....	390
Поливит гериатрик....	578	Тромбовар.....	726	Кутивейт.....	420
Поликапран.....	578	Тубокурарин.....	728	Лимфомиозот.....	437
Прегестимил.....	584	Ультракаин Д-С.....	732	Ломилан.....	442
Промедол.....	591	Фелексин.....	746	Метипред.....	468
Протамин сульфат.....	594	Фенилин.....	748	Нутрамиген.....	529
Протрадон.....	596	Фентанил.....	749	Перитол.....	560
Профенид.....	597	Флагил.....	754	Пипольфен.....	567
Раствор Натрия		Флормидал.....	758	Прегестимил.....	584
хлорида 0,9%.....	604	Фортранс.....	762	Рибасан форте.....	618
Раствор Натрия		Фраксипарин.....	766	Синафлана мазь.....	652
хлорида с глюко-		Фталазол.....	767	Совентол.....	658
зой 5%.....	604	Фторотан.....	768	Тавегил.....	680
Раствор Хартмана.....	605	Хлорэтил.....	775	Триамцинолон.....	718
Раствор Хартманна.....	605	Цефазолин.....	785	Фенистил.....	748
Ремоксикам.....	613	Цефобид.....	786	Фенкарол.....	749
Ретарпен.....	616	Цефотаксим.....	786	Целестон.....	782
Рефортан.....	618	Ципринол.....	795	Энгистол.....	815
Рифамор.....	623	Цистрин.....	798	Эфедрина гидрох-	
Роцефин.....	629	Цифран.....	803	лорид.....	835
Седуксен.....	642	Экзацил.....	808	28.1. Острые аллер-	
Синекод.....	652	Элюдрил.....	812	гические реакции	
Сомбревин.....	661	Эмла.....	812	на лекарства, пищу,	
Стабизол.....	666	Эскузан.....	827	укусы насекомых и	
Стадол.....	666	Эспумизан.....	828	др.	
Стадол НС.....	667	Этамзилат.....	831	Адреналина гид-	
Стандациллин.....	667	Эфедрина гидрох-		рохлорид.....	110
Стеригал.....	668	лорид.....	835	Акортин.....	113
Стиламин.....	669			Аллержи.....	119
Стопангин.....	669			Бетновейт.....	184
Стресс формула с		28. Хронические		Гидрокортизон.....	252
железом.....	672	и острые АЛЛЕР-		Гисталонг.....	258
Стресс формула с		ГИЧЕСКИЕ ЗА-		Дексаметазон.....	279
цинком.....	672	БОЛЕВАНИЯ		Диазолин.....	289
Тамицин.....	683	Адреналина гид-		Кларитин.....	390
Тантум Верде.....	686	рохлорид.....	110	Кутерид.....	419
Тержинан.....	692	Аллержи.....	119	Кутивейт.....	420
Тиберал.....	696	Бронал.....	200	Ломилан.....	442
Тиенам.....	696	Гидрокортизон.....	252	Метипред.....	468
Тизерцин.....	697	Гистаглобулин		Налкром.....	500
Тиопентал.....	702	сухой.....	257	Перитол.....	560
Тисасен.....	703	Гисталонг.....	258	Пипольфен.....	567
Тиссукол Кит.....	704	Дексаметазон.....	279	Рифогал.....	624
Томицид.....	706	Диазолин.....	289	Синодерм.....	654
Тотацеф.....	709	Димедрол.....	301	Совентол.....	658
Тракриум.....	711	Зиртек.....	322	Тавегил.....	680
Трамадол Ланнахер... 711		Кальция глюконат	367	Трансамча.....	714
Трамадол-Акри.....	712	Кальция пантоте-		Трексил.....	715
Трамал.....	712	нат.....	368	Ультралан.....	732
Трансамча.....	714	Кенакорт.....	382	Фенистил.....	748
Трасилол.....	714	Кеналог.....	383	Целестон.....	782
Траумель С.....	714				

Описания лекарственных средств

Абактал® (Abaktal®)

Пефлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пефлоксацина мезилат дигидрата 400 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 400 мг; в упаковке 2 и 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: После перорального приема быстро всасывается и достигает максимальной концентрации через 90 мин. Биодоступность полная. Степень связывания с белками плазмы - 25-30%, объем распределения - 1,7 л/кг. Равномерно распределяется по органам и тканям. Благодаря высокой скорости диффузии в ткани и жидкости организма, такие как: клапаны аорты, митральный клапан, сердечная мышца, кости, брюшная полость, перитонеальная жидкость, желчный пузырь, простата, слюна, мокрота. В них накапливается в концентрациях более высоких, чем в плазме крови. Период полужизни составляет 8 ч. Около 60% выделяется с мочой в течение 72 ч и 30% выводится с желчью в неизмененном виде, а частично в виде метаболитов: диметил-пефлоксацина, пефлоксацин-N-оксида и пефлоксацин-глюкуронида.

Фармакодин.: Ингибирует репликацию ДНК бактерии на уровне ДНК-гиразы, действует на РНК и синтез белков бактерий. Грамотрицательные бактерии чувствительны к пефлоксацину как на стадии деления, так и в стадии покоя; на грамположительные микроорганизмы он действует только на делящиеся клетки. Бактерициден для многих микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. К нему чувствительны: *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *Proteus mirabilis*, индол положительный протей, *Citrobacter* spp., *Salmonellae*, *Shigellae*, *Haemophilus*, *Staphylococcus* spp., *Neisseria gonorrhoea*. Среднечувствительные микроорганизмы: *Streptococcus* spp., *Pneumococcus*, *Pseudomonas* spp., *Acinetobacter* spp., *Clostridium perfringens*, *Mycoplasmae*, *Chlamydia*. Генетически устойчивы: грамотрицательные анаэробы, *Spirochaetae*, *Mycobacterium tuberculosis*. Из фармакодинамических эффектов по от-

ношению к макроорганизму следует отметить способность пефлоксацина угнетать микросомальное окисление в клетках печени.

Показ.: Инфекции мочеполового тракта, респираторного тракта, ЛОР-органов, гепатобилиарной системы, брюшной полости, костей и соединительной ткани, кожи и мягких тканей; септицемия, эндокардит, менингитальные инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 15 лет), недостаточность глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, миалгия и/или артралгия, фоточувствительность, неврологические нарушения: головная боль, бессонница; тромбоцитопения (при дозах 1600 мг в сутки).

Взаим.: Циметидин увеличивает период полувыведения, снижает общий клиренс, не влияя на объем распределения и почечный клиренс абактала. Обволакивающие средства (антациды, содержащие гидроокись алюминия и магния) замедляют абсорбцию абактала. Пефлоксацин повышает концентрацию теофиллина в плазме и ЦНС, угнетая его метаболизм в печени. Абактал может значительно снизить протромбиновый индекс, поэтому у пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты, необходим постоянный контроль картины крови.

Передоз.: Специфических симптомов не существует. Лечение симптоматическое. Гемодиализ неэффективен.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, в/в (капельно в течение часа, содержимое одной ампулы - 400 мг разбавляют 250 мл 5% глюкозы) - по 800 мг в сутки (средняя доза для взрослых и детей старше 15 лет) за 2 приема утром и вечером; при инфекциях мочеполового тракта - 400 мг 1 раз в сутки утром или вечером, в случае заболевания печени назначают 8 мг/кг в виде инфузии в течение 1 ч (при желтухе - 1 раз в сутки, при асците - каждые 36 ч, при желтухе и асците - каждые 48 ч). При тяжелых инфекциях начальная доза составляет 800 мг.

Предост.: Вследствие возможного проявления фоточувствительности при лечении абакталом противопоказано УФ-излучение. С осторожностью препарат назначают пациентам с неврологически-

ми расстройствами, т.к. он может стимулировать ЦНС. Для больных с тяжелыми заболеваниями печени требуется коррекция дозы пропорционально степени нарушения. Абактал нельзя разбавлять растворителями, содержащими ионы хлора.

Произв.: Lek (Словения)

Абергин (Aberginum)

Бромокриптин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромокриптина 0,004 г; в упаковке 10 и 30 шт.

Фарм. действ.: Дофаминмиметическое, подавление секреции пролактина, гормона роста.

Показ.: Нарушения менструального цикла и женское бесплодие (зависимые от гиперпролактинемии); пролактиномы (с синдромом персистирующей галактореи-аменореи у женщин и гипогонадизме у мужчин), подавление послеродовой лактации, акромегалия.

Противопоказ.: Тяжелые формы гипотонии, заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит).

Бер. и корм. гр.: Следует воздержаться.

Поб. действ.: Тошнота, головокружение, общая слабость, гипотензия (требуют снижения дозы); аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды по схеме: 1/2 таблетки 2-3 раза в день, затем дозу увеличивают на 1/4 таблетки каждые 1-2 дня, доводя до 3-4 таблеток в сутки при гиперпролактинемических состояниях (под контролем пролактина крови) и до 5-6 таблеток в сутки при акромегалии (под контролем соматотропного гормона и пролактина крови). Максимальная суточная доза - 10 таблеток.

Произв.: ВИЛАР НПО ПЭЗ (Россия)

Агапурин (Agapurin®)

Пентоксифиллин*

Агапурин ретард (Agapurin® retard)

Пентоксифиллин*

Агапурин 600 ретард (Agapurin® 600 retard)

Пентоксифиллин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит пентоксифиллина 100 мг; в упаковке 60 шт.

1 таблетка ретард, покрытая оболочкой, с пролонгированным высвобождением - 400 или 600 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, ангиопротективное, понижение вязкости крови, улучшение микроциркуляции и перфузии тканей, повышение пластичности эритроцитов.

Фармакокин.: Распределяется равномерно, выделяется почками (около 94%) и кишечником (около 4%) в виде метаболитов - за первые 4 ч выводится до 90% дозы. Из пролонгированной формы высвобождается медленно, максимальная концентрация в плазме - через 2 ч после приема. Через 12 ч концентрация в плазме снижается до 25% максимальной. Большая часть выделяется в виде метаболитов (лишь около 2% в неизмененном виде).

Показ.: Нарушения периферического кровообращения (атеросклероз, перемежающаяся хромота, диабетическая ангиопатия, облитерирующий эндартериит и др.), трофические нарушения (постинсультный синдром, варикозные язвы, гангрена, отморожения и др.), ангионевропатии (парестезии, акроцианоз, болезнь Рейно); нарушения мозгового кровообращения (атеросклероз), острая и хроническая недостаточность кровоснабжения сетчатой и сосудистой оболочки глаза; острые функциональные нарушения внутреннего уха.

Противопоказ.: Острый инфаркт миокарда, массивное кровотечение, церебральные геморрагии.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головокружение, чувство жара, зуд, крапивница.

Взаим.: Синергизм с гипотензивными средствами (симпатолитиками, ганглиоблокаторами, вазодилататорами и др.)

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, по 1 таблетке ретард

2 раза в сутки или 2 драже 3 раза в сутки в течение 1 нед; при резком снижении давления дозу уменьшают до 1 драже 3 раза в сутки, такие же дозы применяют при длительном курсе лечения.

Предост.: Лечение следует проводить под контролем АД. При гипотонии и лабильности кровообращения может вызвать резкую гипотензию и приступ стенокардии. При сердечной недостаточности необходимо введение сердечных гликозидов. У диабетиков, принимающих гипогликемические средства, назначение больших доз агапурина может вызвать выраженную гипогликемию, поэтому дозы гипогликемических средств должны быть скорректированы.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Агиолакс (Agiolax®)

Сост. и ф.в.: 5 г гранулята (1 чайная ложка) для приема внутрь содержат семян индийской блошницы (*Plantago ovata*) семейства подорожника 2,6 г, кожуры семян индийской блошницы 0,11 г и плодов сенны (*Tinnevelly-Sennes*) 0,62 г, что соответствует 15 мг сеннозидов и 0,9 г сахарозы; в упаковке 250 г.

Фарм. действ.: Слабительное.

Клин. фарм.: Ускоряет прохождение по толстой кишке и связывает жидкость, благодаря чему достигается увеличение объема и размягчение каловых масс.

Показ.: Запор, например, при постельном режиме; для облегчения прохождения каловых масс при геморрое, трещинах заднего прохода, в послеоперационном периоде; подготовка к рентгенологическому исследованию и эндоскопии.

Противопоказ.: Кишечная непроходимость любого генеза.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью (только с разрешения лечащего врача).

Поб. действ.: При постоянном длительном применении - потеря электролитов, особенно калия, гематурия, альбуминурия, отложения пигментов в слизистой оболочке кишечника.

Взаим.: На фоне постоянного и длительного применения возможно усиление эффекта сердечных гликозидов (как следствие гипокалиемии).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая большим количеством воды (около 250 мл). При запорах взрослым и детям старше 12 лет - по 1 чайной ложке вечером, после еды и, при необходимости, утром, до завтрака; в тяжелых случаях - по 1 чайной ложке каждые 6 ч в течение 1-3 дней; детям от 7 до 12 лет - по 1 чайной ложке ежедневно. Для

подготовки к исследованиям - однократно по 3-6 чайных ложек за 1 день (24 ч) до обследования.

Предост.: Не рекомендуется длительное применение.

Произв.: Madaus (Германия)

Адалат® (Adalat®)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит нифедипина 0,1 мг.

Адалат для вливаний - 1 шприц "Перфузор", полиэтиленовая трубка "Перфузор" и флакон с 50 мл инфузионного раствора или 1 шприц "Инъектомат", полиэтиленовая трубка "Перфузор" и флакон с 50 мл инфузионного раствора.

1 капсула содержит нифедипина 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, сосудорасширяющее, коронарорасширяющее, блокада кальциевых каналов.

Показ.: Парентерально: гипертонический криз, спазм коронарных сосудов; перорально: стенокардия, гипертония, гипертрофическая кардиомиопатия, болезнь Рейно, хроническая сердечная недостаточность, гипертонический криз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженный аортальный стеноз, декомпенсированная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, недавно перенесенный инфаркт миокарда, кардиогенный шок, беременность, лактация.

Поб. действ.: При парентеральном введении: гипотония, тахи- или брадикардия, асистолия, повышение давления в левом желудочке, жжение в месте инъекции; при пероральном применении: диспептические расстройства, головная боль, головокружение, слабость, нарушение зрения, гиперемия, беспокойство, страх, тахикардия, снижение АД, отеки голени, парестезия рук и ног, мышечные боли, тремор, гинекомастия, гиперплазия десен, внутрипеченочный холестаз, анемия, лейкопения, тромбоцитопеническая пурпура, гипергликемия, боли за грудиной (требуют отмены препарата), аллергические реакции.

Взаим.: Не следует парентерально вводить адалат одновременно с бета-адреноблокаторами.

Примен. и доз.: В/в, в дозе 0,005 г в течение 4-8 ч (0,0104-0,0208 мг/мин или соответственно 6,3-12,5 мл/ч). Максимальная доза - 15-30 мг в сутки (не больше 3 дней); внутрь, не разжевывая, независимо от приема пищи, с небольшим количеством воды - 10 мг 3-4 раза

в сутки (до 20 мг 3-6 раз в сутки); максимальная суточная доза - 120 мг. Купирование гипертонического криза и приступа стенокардии: капсулу раскусить и проглотить содержимое.

Произв.: Bayer (Германия)

Адалат® СЛ (Adalat® SL)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 рапид-ретард таблетка содержит 20 мг нифедипина (5 мг нифедипина в быстро высвобождающейся форме и 15 мг в медленно высвобождающейся форме); в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, сосудоуспокаивающее, коронарорасширяющее, блокада кальциевых каналов.

Показ.: Лечение ишемической болезни сердца, лечение артериальной гипертензии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженный аортальный стеноз, кардиогенный шок, декомпенсированная сердечная недостаточность, беременность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, слабость, нарушение зрения, гиперемия, беспокойство, страх, тахикардия, снижение АД, отеки голени, парестезия рук и ног, мышечные боли (миалгия), тремор. В крайне редких случаях - гинекомастия, гиперплазия десен, внутрипеченочный холестаз, анемия, лейкопения, тромбоцитопеническая пурпура, гипергликемия, боли за грудиной (требуют отмены препарата), аллергические реакции.

Взаим.: При сочетании с гипотензивными средствами, нитратами, трициклическими антидепрессантами происходит усиление гипотензивного эффекта. При комбинировании с бета-адреноблокаторами возможно усиление гипотонии и развитие сердечной недостаточности. При сочетании с сердечными гликозидами, хинидином, теофиллином требуется контроль их содержания в плазме.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, с небольшим количеством воды 1-2 раза в день - по 1 рапид-ретард таблетке; доза может быть увеличена до 60 мг в день в 2 приема.

Произв.: Bayer (Германия)

Адвантан (Advantan®)

Метилпреднизолона ацепонат*

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит метилпреднизолона ацепоната 1 мг; в тубиках по 15 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Экзема: экзогенная (атопический дерматит, нейродермит), себорейная, контактная, профессиональная, анальная, дисгидротическая, обыкновенная монетовидная, экзема у детей, контактный дерматит.

Противопоказ.: Туберкулез или сифилитические процессы на подвергающихся лечению участках кожи, вирусная инфекция.

Бер. и корм. гр.: Не следует применять на больших поверхностях и длительно.

Поб. действ.: При длительном применении (более 12 нед у взрослых и 4 нед у детей) возможны атрофия кожи, телеангиэктазия, периоральный дерматит, гипертрихоз, системные резорбтивные эффекты, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в день.

Предост.: Следует избегать продолжительного и захватывающего обширные участки кожи применения.

Произв.: Schering (Германия)

Адельфан-Эзидрекс® (Adelphane-Esidrex®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ди-гидралазина 10 мг, резерпина 0,1 мг и гидрохлоротиазида 10 мг; в упаковке 250 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, депрессия (в т.ч. в анамнезе), болезнь Паркинсона, эпилепсия, электросудорожная терапия, феохромоцитомы, сопутствующая или недавно проводившаяся терапия ингибиторами МАО, острая пептическая язва, язвенный колит, выраженная тахикардия, сердечная недостаточность с высоким сердечным выбросом, недостаточность миокарда вследствие механической обструкции, изолированная правожелудочковая недостаточность при легочной гипертензии, идиопатическая системная красная волчанка, анурия, выраженная почечная или печеночная недостаточность, рефрактерная гипокалиемия, ги-

понатриемия, гиперкальциемия, гиперурикемия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Депрессия, головная боль, головокружение, кардиоваскулярные реакции, гипокалиемия, гиперлипидемия, экстрапирамидные симптомы, пептическая язва, желудочно-кишечное кровотечение, гепатит, желтуха, сердечные аритмии, сердечная недостаточность, волчаночноподобный синдром, нарушения кроветворения, васкулит, панкреатит, пневмония, отек легких.

Примен. и доз.: Внутрь. Средняя суточная доза составляет 1-3 таблетки, принимаемых в 2-3 приема.

Предост.: Назначают осторожно при сердечной недостаточности, недавно перенесенном инфаркте миокарда, коронарном или церебральном артериосклерозе, дисфункции почек или печени, пептической язве в анамнезе, нарушениях сердечной проводимости, цереброваскулярных заболеваниях, проведении хирургических вмешательств, нарушениях электролитного баланса в сыворотке крови, в период кормления грудью, пациентам, управляющим механизмами (снижается скорость реакции). Длительное лечение может провоцировать развитие волчаночноподобного синдрома; рекомендуется периодическое определение антинуклеарного фактора. Соблюдать осторожность при комбинировании с другими антигипертензивными средствами или препаратами лития.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Аденокор (Adenocor)

Аденозина фосфат*

Сост. и ф.в.: 1 мл инъекционного раствора содержит аденозина фосфата 3 мг в 0,9% растворе натрия хлорида в стерильной воде для инъекций; в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Антиаритмическое.

Показ.: Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (в том числе при WPW-синдроме), дифференциальная диагностика наджелудочковых тахикардий (тахикардия с уширенными комплексами QRS), диагностические электрофизиологические исследования (определение локализации АВ-блока).

Противопоказ.: АВ-блокада II и III степени, синдром синусовой недостаточности (за исключением больных с искусственным водителем ритма).

Бер. и корм. гр.: В случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Головокружение, фобия, неясность зрения, головная боль, боли в области сердца, тахикардия, брадикардия, АВ-блокада различной степени, тошнота, гипервентиляция, бронхоспазм, приливы, усиленное потоотделение, боли в руках, спине и шее, металлический привкус во рту.

Взаим.: Дипиридамо́л усиливает эффект; теофиллин, кофеин и другие ксантины - ингибируют.

Примен. и доз.: В/в, быстро (в течение 2 с) - 3 мг, дополнительно - 6 мг через 1-2 мин, если нет эффекта - еще 12 мг через 1-2 мин.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Аденостоп (Adenostop)

Сост. и ф.в.: 1 флакон со 100 мл концентрата для приготовления раствора для приема внутрь содержит 85 мл экстракта травы дурнишника колючего.

Фарм. действ.: Противоотечное, противомикробное, снижение пролиферации клеток предстательной железы.

Фармакодин.: Уменьшает размеры гипертрофированной предстательной железы, задерживает в организме (незначительно) ионы магния и калия.

Показ.: Аденома предстательной железы (при невозможности аденомэктомии); вспомогательное лечение до и после аденомэктомии, цистопиелит, недержание мочи.

Противопоказ.: Надпочечниковая недостаточность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, перед приемом дозу разводят в 30 мл воды; по 30-45 капель 2 раза в сутки за 30 мин до еды. Курс лечения - 5 мес, при необходимости продлевают еще на 3-4 мес однократным приемом в сутки (утром).

Произв.: Romfchim (Румыния)

Адиуретин СД (Adiuretin® SD)

Десмопрессин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит десмопрессина ацетата 4 мкг; в упаковке 5 шт.

1 мл раствора для закапывания в нос - 0,1 мг (1 капля - 3,5 мкг); во флаконах с капельницей по 5 мл.

Фарм. действ.: Антидиуретическое.

Показ.: Капли: несахарный диабет, ночное недержание мочи. Раствор для инъекций: несахарный диабет (диагностика

и лечение), временная полиурия после операций в области гипофиза, гемофилия, болезнь Вилебранта.

Примен. и доз.: Интраназально, по 1-4 капли 2-3 раза в день. При ночном недержании мочи - 2-8 капель на ночь. В/в и в/м, при несахарном диабете - 1 мл (1 ампула) на 8 ч, более высокие дозы следует вводить в/в медленно в виде капельной инфузии. Инъекции используются также в случаях, когда невозможно интраназальное применение или нужна точная дозировка.

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Адонис-бром (Adonis-Brom)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит калия бромида 0,25 г и экстракта горичвета сухого 0,125 г; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Седативное, кардиотоническое.

Показ.: Раздражительность, неврозы сердца, легкие формы недостаточности кровообращения.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Борисовский ЗМП (Беларусь)

Адреналина гидрохлорид (Adrenalin hydrochloridum)

Эпинефрин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций или для местного применения содержат адреналина гидрохлорида 1 мг; в ампулах по 1 мл; в упаковке 5 шт. или во флаконах по 30 мл соответственно.

Фарм. действ.: Альфа- и бета-адреномиметическое, сосудосуживающее, гипертензивное, бронхолитическое, противоаллергическое, гипергликемическое.

Показ.: Анафилактический шок, аллергический отек гортани и др. аллергические реакции немедленного типа, бронхиальная астма (купирование приступов), передозировка инсулина; местно: в комбинации с местноанестезирующими препаратами, остановка кровотечения.

Противопоказ.: Гипертония, выраженный атеросклероз, аневризмы, тиреотоксикоз, сахарный диабет, закрытоугольная глаукома, беременность.

Поб. действ.: Повышение АД, тахикардия, аритмии, боли в области сердца.

Примен. и доз.: Парентерально: при анафилактическом шоке и др. аллерги-

ческих реакциях, гипогликемии - п/к, реже - в/м или в/в медленно; взрослым - по 0,2-0,75 мл, детям - по 0,1-0,5 мл; высшие дозы для взрослых при п/к введении: разовая - 1 мл, суточная - 5 мл. При приступе бронхиальной астмы у взрослых - п/к по 0,3-0,7 мл. При остановке сердца - внутрисердечно 1 мл. Местно, для остановки кровотечений - тампоны, смоченные раствором препарата; в раствор местных анестетиков добавляют несколько капель непосредственно перед введением.

Предост.: Не следует применять на фоне наркоза фторотаном, циклопропаном, хлороформом (во избежание аритмий).

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Аевит (Aevitum)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ретинола пальмитата 100 000 МЕ и альфа-токоферола ацетата 0,1 г; в упаковке 25 шт.

1 ампула с 1 мл инъекционного раствора содержит ретинола ацетата 0,035 г и альфа-токоферола ацетата 0,1 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Повышение устойчивости тканей к гипоксии, нормализация проницаемости капилляров.

Показ.: Атеросклероз сосудов, трофические нарушения, облитерирующий эндартериит.

Противопоказ.: Тиреотоксикоз, хронический гломерулонефрит, застойная сердечная недостаточность, беременность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 капсулы 2-3 раза в день. В/м (слегка подогрев), по 1 мл 1 раз в день ежедневно в течение 20 дней; при трофических нарушениях и при эндартериите - в течение 30-40 дней. Через 4-6 мес курс повторяют.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Азактам (Azactam®)

Азтреонам*

Сост. и ф.в.: 1 флакон на 15 мл с порошком для приготовления в/м и в/в инъекций содержит азтреонама 0,5 или 1 г в комплекте с водой для инъекций в ампулах по 1,5 или 3 мл (для в/м введения); 1 флакон на 100 мл с порошком для приготовления в/в вливаний содержит азтреонама 0,5; 1 или 2 г.

Фарм. действ.: Антимикробное, бактерицидное.

Показ.: Тяжелые генерализованные или системные инфекции, вызванные грамотрицательными микроорганизмами

(инфекции мочевых путей, септицемия, локализованные паренхиматозные абсцессы, например, абдоминальные), особенно у ослабленных больных и при нарушениях иммунной системы; профилактика инфекций в хирургии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: У беременных женщин и новорожденных детей можно использовать только по абсолютным показаниям и под непосредственным контролем врача. Во время лактации в молоко попадает менее 1% от концентрации препарата в сыворотке крови матери.

Поб. действ.: Головные боли, спутанность сознания, повышенное потоотделение, увеличение протромбинового времени, тромбоцитопения; понос, тошнота, рвота, нарушение чувства вкуса, повышение (более чем вдвое) уровней щелочной фосфатазы, СГОТ и СГПТ; флебиты и тромбофлебиты (после в/в введения), неприятные ощущения в месте введения, боли в мышцах и костях, кожные высыпания, зуд.

Взаим.: Комбинации азактама с пенициллином, цефалоспорином, аминогликозидами, клиндамицином или метронидазолом дают эффект суммации или синергизма.

Примен. и доз.: В/м (глубокая инъекция), в/в. Для в/м введения доза 0,5 г разводится в 1,5 мл, 1 г - в 3 мл физиологического раствора или воды для инъекций. Для прямого в/в введения: 1 г разводится в 6-10 мл и вводится в течение 2-5 мин; для капельного (флаконы 100 мл) - 0,5-1 г разводится в 50-100 мл растворителя (вода для инъекций, физиологический раствор, раствор Рингера, 5 и 10% глюкоза, Айзолайт Е, Нормосол-R, 5 и 10% маннит и др.). Инфекции мочевых путей: однократно в дозе 0,5-1 г с интервалом 8-12 ч, у больных с креатининовым клиренсом менее 30 мл/мин дозировку снизить наполовину. Для больных на гемодиализе: 0,5, 1 или 2 г, поддерживающая доза 1/4 от исходной дозы, с интервалом 6, 8 или 12 ч. При тяжелых инфекциях - после каждого сеанса гемодиализа вводится 1/8 исходной дозы. Профилактика инфекций в хирургии: доза - 1 г, вводят непосредственно перед операцией и через 8-16 ч после первой дозы. Новорожденным и маленьким детям: 30 мг/кг в/в с интервалом 6-8 ч.

Предост.: С осторожностью назначать больным с недостаточностью печени, с аллергическими реакциями на лекарственные препараты. У детей до 6 лет не

применять растворители, содержащие бензиловый спирт.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Азалептин (Azaleptinum)

Клозапин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит клозапина 25 или 100 мг; в упаковке 50 шт.

Одноразовый пакет с гранулами (0,5 или 1 г) содержит клозапина 5 или 10 мг соответственно.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, блокада дофаминовых рецепторов в ЦНС, центральное и периферическое холиноблокирующее, периферическое альфа-адреноблокирующее.

Клин. фарм.: Обладает выраженным антипсихотическим действием в сочетании с седативным компонентом. Не вызывает экстрапирамидных расстройств и выраженного общего угнетения.

Показ.: Острые и хронические формы шизофрении, психомоторное возбуждение при психозах, агрессивности, расстройстве сна.

Противопоказ.: Заболевания кровеносной системы (в анамнезе), алкогольные и токсические психозы, тяжелые заболевания печени, почек и сердечно-сосудистой системы, миастения, глаукома, гипертрофия предстательной железы.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Мышечная слабость, сонливость, спутанность сознания, сухость во рту, тахикардия, повышение температуры.

Взаим.: Усиливает эффект снотворных и анальгетиков.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды 2-3 раза в день. Разовая доза для взрослых - 0,05 - 0,2 г, суточная доза - 0,2 - 0,4 г. Высшая суточная доза 0,6 г. Для поддерживающей терапии и амбулаторным больным назначают по 0,025-0,2 г. Гранулы из одноразового пакета разводят в 5-10 мл воды. Разовая доза для детей 6-8 лет - 5-10 мг, 8-15 лет - 10-20 мг, суточная - 15-30 мг (6-8 лет), 30-60 мг (8-15 лет). Высшая суточная доза для детей 100 мг. Суточную дозу делят на 2-3 приема.

Предост.: При приеме не следует управлять транспортными средствами. Необходим контроль за картиной крови (перед и во время назначения препарата). При появлении симптомов гранулоцитопении рекомендуется немедленно прекратить прием.

Произв.: Органика (Россия)

Азона (Azona®)

Тразодон*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит тразодона гидрохлорида 25, 50 или 100 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, серотонинмиметическое, альфа-адренолитическое.

Показ.: Депрессии (эндогенная, реактивная и др.).

Противопоказ.: Беременность.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, слабость, боль в эпигастрии, гипотония.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО; усиливает действие алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, по 150-200 мг (не более 600 мг) в день.

Предост.: Лактирующие женщины на период лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Произв.: Orion (Финляндия)

Аквафор (Aquaphor)

Ксипамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ксипамида 10 или 40 мг; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Артериальная гипертензия; отеки при заболеваниях сердца, печени и почек, в т.ч. резистентные к др. диуретикам, сердечная и почечная недостаточность, асцит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции печени (печеночная кома), гипокалиемия, гипонатриемия, подагра в анамнезе, гиперуриемия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гипокалиемия, гипонатриемия, гипوماгнемия, гипохлоремический алкалоз, головная боль, головокружение, сухость во рту, ортостатическая гипотензия, сонливость, мышечные спазмы, тревога, возбуждение, диспептические расстройства, гиперурикемия, повышение свертывания крови, острый интерстициальный нефрит, желтуха, васкулит, апластическая анемия, агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект могут усиливать другие диуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, нитраты, вазодилататоры, барбитураты, фенотиазины, трициклические антидепрессанты, алкоголь, ослаблять - НПВС. Снижает действенность противо-

диабетических и противоподагрических средств, норадреналина, адреналина; повышает - недеполяризующих миорелаксантов, увеличивает кардио- и нейротоксичность препаратов лития; нейротоксичность салицилатов.

Примен. и доз.: Внутрь, после завтрака - 10-80 мг в сутки.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Акинетон (Akineton®)

Бипериден*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит биперидена гидрохлорида 2 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - биперидена лактата 5 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, центральное холинолитическое.

Показ.: Синдром Паркинсона, экстрапирамидные расстройства, обусловленные приемом медикаментов.

Противопоказ.: Закрывугольная глаукома, мегаколон, механический стеноз ЖКТ. Относительно противопоказан при гипертрофии предстательной железы, тахикардиях.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Нарушение аккомодации, сухость во рту, диспептические расстройства, тахикардия, понижение АД, утомляемость, головокружение, сонливость, спутанность сознания, нарушения памяти, галлюцинации.

Взаим.: Усиливает нейротропные эффекты холинолитиков, антигистаминных, антипаркинсонических и противосудорожных средств. Несовместим с алкоголем. При совместном приеме с хинидином может увеличиваться холинолитическое действие, с леводопой - повышается риск развития дискинезии.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в или в/м. Дозировка и частота приема варьируются и зависят от показаний и возраста пациента.

Произв.: Knoll (Германия)

Аккупро (Accupro®)

Хинаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит хинаприла гидрохлорида 5, 10 или 20 мг; в упаковке 30, 50 или 100 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибирование АПФ, активация кининовых систем.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек; стеноз почечных артерий и аорты; состояния после трансплантации почек; недостаточность митрального клапана, гипертрофические миокардиопатии и др. состояния с нарушением оттока крови из левого желудочка; декомпенсированная сердечная недостаточность, первичный гиперальдостеронизм; выраженные нарушения функции почек, печени, беременность, лактация; детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Выраженная гипотензия, аритмии, инфаркт миокарда, ишемические нарушения мозгового кровообращения и др. расстройства сердечно-сосудистой системы, нарушения функции почек и печени, сухость во рту, глоссит, кашель, бронхит, бронхоспазм, ринит, синусит; аллергические реакции (ангионевротический отек, васкулиты), головная боль, нарушения сознания и сна, депрессия, нарушения чувствительности, зрения, слуха, вкуса, лейкопения, тромбоцитопения, гипертермия, миалгия, артралгия, импотенция, алоpecia, псориаз, онихолизис, крапивница, фотосенсибилизация, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь (независимо от приема пищи), взрослым - в начальной дозе - по 10 мг 2 раза в сутки. При необходимости - дозу увеличивают; максимальная разовая доза - 20 мг, суточная - 40 мг (однократно или в 2 приема (утром и вечером)). Курс лечения устанавливают индивидуально. Пациентам с нарушением функции почек (с клиренсом креатинина 30-60 мл/мин) и старше 65 лет - в дозе 5 мг в сутки (начальная) и 5-10 мг (поддерживающая); максимальная суточная доза - 20 мг.

Произв.: Parke-Davis/Gödecke (Германия)

Акортин (Acortine®)

Гидрокортизон*

Сост. и ф.в.: Гидрокортизона ацетата 1% на кремовой основе; крем в тубах.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Зуд анальный, кожи, половых органов, укусы насекомых, контакт с ядовитыми растениями, экзема, себорейный дерматит, псориаз; реакции на мыло, детергенты, косметику, украшения.

Противопоказ.: Бактериальные и грибковые поражения кожи, гинекологические инфекции, возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Только по строгим показаниям.

Поб. действ.: Развитие вторичной инфекции (при длительном применении).

Примен. и доз.: Наружно. Наносят на место поражения 1-4 раза в день.

Предост.: Используют только для наружного применения; нельзя применять для лечения и профилактики опрелостей у детей.

Произв.: American Drug Company (США)

Аксид (Axid)

Низатидин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит низатидина 150 или 300 мг.

1 мл раствора для инъекций - 25 мг; в ампулах по 4 мл.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения и профилактика обострений, рефлюкс-эзофагит, острый или обострение хронического панкреатита; кровотечение из верхних отделов ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: При беременности назначают в том случае, когда возможная польза от применения оправдывает риск для плода. Кормление материнским молоком следует прекратить.

Поб. действ.: Нарушение функции печени (повышение уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы); сонливость, спутанность сознания, тахикардия или брадикардия, анемия, гинекомастия, потливость, крапивница, сыпь и др.

Взаим.: При назначении с аспирином (3,9 г в сутки) повышает уровень салициловой кислоты в крови.

Примен. и доз.: При язве двенадцатиперстной кишки в фазе обострения и доброкачественной язве желудка назначают внутрь - по 150 мг 2 раза в день или по 300 мг 1 раз в день вечером. Для профилактики обостренной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - 150 мг 1 раз в сутки вечером. Для в/в вливания разводят 300 мг (12 мл) в 150 мл совместимого раствора для в/в введения и вливают со скоростью 10 мг/ч. При быстром и коротком в/в введении может вводиться без дополнительного раствора в дозе 100 мг (4 мл) 3 раза в день. Суточная доза не должна превышать 480 мг. Пациентам с нарушением функции почек режим дозирования

корректируется с учетом клиренса креатинина.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Акт-ХИБ (Act-HIB)

Сост. и ф.в.: 1 доза (0,5 мл) вакцины после растворения лиофилизата содержит полисахарида *Haemophilus influenzae* типа b (Hib), конъюгированного со столбнячным анатоксином - 10 мкг; гидроксиметил аминметана - 0,6 мг, сахарозы 42,5 мг. Порошок лиофилизированный для инъекций во флаконах по 1 дозе в комплекте с растворителем в шприцах по 0,5 мл. Растворитель содержит натрия хлорид 2 мг, воды для инъекций q.s. до 0,5 мл.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против *Haemophilus influenzae* типа b.

Фармакодин.: Конъюгация ПРФ с белком-носителем придает полисахариду свойства Т-зависимого антигена. Механизм формирования иммунного ответа в результате вакцинации заключается в активации стимулированными Т-лимфоцитами В-лимфоцитов посредством медиаторов иммунитета (лимфокинов), что обуславливает выработку антител со специфичностью к ПРФ (главным образом, класса IgG). Кроме того, при повторных инъекциях наблюдается ярковыраженный бустерный эффект, являющийся подтверждением формирования иммунологической памяти в результате первичной вакцинации. Препарат обеспечивает профилактику инфекций, вызываемых *Haemophilus influenzae* типа b, как минимум, у 95% полностью вакцинированных пациентов.

Показ.: Профилактика инфекций, вызванных *Haemophilus influenzae* типа b (менингита, септицемии, пневмонии, эпиглоттита и др.), у детей в возрасте от 2 мес до 5 лет.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к составляющим компонентам вакцины, в частности к столбнячному анатоксину; острые инфекционные заболевания, повышенная температура тела.

Поб. действ.: Местные реакции: быстро проходящая болезненность, эритема и уплотнение в месте инъекции. Общие реакции (редко): повышение температуры тела, раздражительность, капризность, сонливость.

Примен. и доз.: П/к или в/м. Детям до 2-х летнего возраста вводят в переднебоковую область бедра или в ягодичную, детям старше 2-х лет - в область дельтовидной мышцы. Рекомендуются

три схемы курса вакцинации: 1) у детей в возрасте от 2 до 6 мес - 3 инъекции по одной дозе (0,5 мл) с интервалом 1-2 мес, ревакцинация - одна доза (0,5 мл) через 12 мес после третьей инъекции; 2) у детей в возрасте от 6 до 12 мес - 2 инъекции по одной дозе (0,5 мл) с интервалом 1-2 мес, ревакцинация - одна доза (0,5 мл) через 12 мес после второй инъекции; 3) у детей в возрасте от 1 года до 5 лет - однократная инъекция одной дозы (0,5 мл). Перед употреблением содержимое флакона развести в растворителе (находящемся в прилагаемом шприце). Флакон необходимо взболтать до полного растворения лиофилизата.

Предост.: Не вводить в/в. Во время инъекции следить, чтобы игла не проникла в кровеносный сосуд.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Акти-5 (Acti-5-syrup®)

Сост. и ф.в.: 100 мл сиропа содержат глютамата (пиро) диметиламиноэтанола (деанол) 1 г, монохлоргидрата лизина 4 г, глюконоглюкогептона кальция 3 г, фосфорной кислоты 0,5 мл, сорбитола 15 г; во флаконах по 125 мл.

Фарм. действ.: Участие в формировании костного скелета, а также в развитии телосложения и увеличении массы тела ребенка; желчегонное; психостимулирующее и ингибирование холинэстеразы; стимуляция межнейронной передачи.

Фармакокин.: При приеме натощак всасывается в тонком кишечнике на 80%. C_{max} в плазме достигается примерно через 6 ч после приема. Связывание с белками плазмы - 99%. Метаболический клиренс составляет около 1,2 л/сутки, биотрансформация осуществляется, главным образом, в печени, головном мозге и мышцах.

Показ.: Функциональные астении, задержка физического развития у детей.

Противопоказ.: Непроходимость желчных путей, эпилепсия.

Поб. действ.: Боли в животе, диарея, в частности, у лиц, страдающих функциональными запорами.

Примен. и доз.: Внутрь, детям от 2,5 до 6 лет - 2-3 чайные ложки сиропа в день, детям старше 6 лет - 4-6 чайных ложек сиропа в день.

Предост.: Больным диабетом необходимо учитывать количество сахара в дневной дозе препарата (1,925 г в дозе для одного приема).

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Активанад-N (Aktivanad®-N)

Сост. и ф.в.: 100 мл сока содержат печеночного экстракта 1,75 г, дрожжевого экстракта 0,75 г, экстракта плодов шиповника 1,0 г, кофеина 0,375 г, метилпарагидроксibenзоата 60 мг и натриевой соли пропилпарагидроксibenзоата 50 мг; во флаконах по 200, 500 или 1000 мл.

1 драже содержит тиамин нитрата (витамин B₁) 0,001 г, рибофлавина (витамин B₂) 0,0005 г, никотинамида 0,005 г, аскорбиновой кислоты (витамин C) 0,05 г и кофеина 0,025 г; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Общетонизирующее, укрепляющее, повышение умственной и физической работоспособности, восполнение недостатка витаминов группы B и витамина C.

Фармакокин.: После перорального приема кофеин, входящий в состав препарата, быстро и почти полностью всасывается, Стах достигается через 30-40 мин, равномерно распределяется по тканям, проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, поступает в материнское молоко; выводится (в т.ч. метаболиты), в основном, почками.

Фармакодин.: Улучшает обменные процессы в ЦНС и других тканях, регулирует кровообращение, оптимизирует кроветворение, повышает защитные силы организма, оказывает антистрессовое действие; кофеин, взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами, стимулирует ЦНС, улучшает физическую и психическую активность, расширяет сосуды кожи, почек, сердца, не изменяет АД (при использовании в рекомендованных дозах).

Показ.: Снижение умственной и физической работоспособности, период реконвалесценции.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью используют во время беременности.

Поб. действ.: Бессонница, тахикардия, расстройства ЖКТ (при гиперчувствительности к кофеину), усиление потоотделения.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 15 мл (1 столовая ложка) сока или по 1 драже 3 раза в день; подросткам - по 15 мл сока или по 1 драже 2 раза в день (драже должно раствориться во рту). В период выздоровления в течение первой недели - по 15 мл сока 3 раза в день, в

течение второй недели - 2-3 раза в день по 15 мл.

Предост.: При повышенной чувствительности желудка и желчных путей не рекомендуется принимать натощак; при склонности пациентов к нарушениям засыпания последнюю часть дневной дозы дают в первые послеполуденные часы. Следует иметь в виду, что препарат содержит 11 об.% алкоголя и должен с осторожностью использоваться при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, повреждениях головного мозга и у детей.

Произв.: Knoll (Германия)

Активферрин (Aktiferrin®)

Железа сульфат

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит железа сульфата 113,85 мг (железо (II) - 34,5 мг, а также D,L-серина 129 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

5 мл сиропа - 171 мг (железо (II) - 34,5 мг, а также D,L-серина 129 мг; во флаконах по 100 мл.

1 мл каплей для приема внутрь - 47,2 мг (железо (II) - 9,8 мг), а также D,L-серина 35,6 мг; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа, стимуляция кроветворения.

Показ.: Железодефицитные анемии, латентный дефицит железа при чрезмерных потерях или повышенной потребности.

Противопоказ.: Анемии: апластическая, гемолитическая, сидероахрестическая, при свинцовом отравлении, талассемия и не обусловленные дефицитом железа; гемохроматоз, гемосидероз.

Поб. действ.: Чувство тяжести в эпигастриальной области, метеоризм, запоры или диарея.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, запивая водой, по 1 капсуле 2-3 раза в сутки в начале терапии, затем дозу ежедневно снижают на 1 капсулу до однократного приема препарата в сутки; детям старше 6 лет по 1 капсуле ежедневно. Сироп: назначают детям старше 2 лет (суточная доза 5 мл на 12 кг массы тела). Капли: детям первого года жизни внутрь (суточная доза из расчета 5 капель на 1 кг массы тела 2-3 раза в сутки); грудным детям 10-15 капель 3 раза в сутки; детям дошкольного возраста по 25-35 капель 3 раза в сутки, школьникам по 50 капель 3 раза в сутки. Лечение препаратом продолжают в течение не менее 4 нед после достижения нормальных показателей сывороточного железа и гемоглобина.

Произв.: Merckle (Германия)

Актрапид® НМ (Actrapid® НМ)

Инсулин человеческий*

Актрапид® НМ Пенфилл® (Actrapid® НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит биосинтетического человеческого инсулина 40 ЕД; во флаконах по 10 мл или 100 ЕД в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования с инсулиновой шприц-ручкой НовоПен и НовоПен II и в картриджах Пенфилл 3 мл для использования в шприц-ручках НовоПен 3.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 30 мин после п/к введения, достигая максимума к 1-3 ч и продолжается 8 ч.

Показ.: Сахарный диабет (I и II типов).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Гипогликемия, аллергические реакции; нарушения рефракции (обычно в начале терапии).

Взаим.: Ингибиторы МАО, неселективные бета-адреноблокаторы, сульфаниламиды, алкоголь усиливают эффект, пероральные контрацептивы, кортикостероиды, тиреоидные гормоны, тиазидные диуретики - ослабляют.

Передоз.: Симптомы: гипогликемия (холодный пот, сердцебиение, тремор, чувство голода, возбужденность, раздражительность, бледность, головная боль, сонливость, неуверенность движений, нарушение речи и зрения, депрессия), кома (потеря сознания, напряжение тканей глазного яблока, судороги по типу Джексона, вплоть до конвульсий, рефлекс Бабинского). Лечение: внутрь сахар или раствор глюкозы (если больной в сознании), п/к, в/м или в/в вводят глюкагон или в/в глюкозу.

Примен. и доз.: Доза определяется индивидуально. При переводе больного с высокоочищенного свиного инсулина на человеческий, доза остается прежней. При переводе с бычьего или смешанного инсулина дозу необходимо снизить на 10%, за исключением тех случаев, когда исходная доза менее 0,6 ЕД/кг массы тела. Вводится п/к 3 раза в сутки (возможно 5-6). Картридж Пенфилл предназначен только для индивидуального ис-

пользования. После инъекции с помощью шприц-ручки игла должна оставаться под кожей минимум 6 сек. Кнопку держат в нажатом состоянии до полного изъятия иглы из-под кожи.

Предост.: Следует иметь в виду, что способность к управлению автомобилем после перевода больных на человеческий инсулин может временно снизиться. Препарат можно применять, если он абсолютно прозрачен и бесцветен. При использовании двух видов препаратов инсулина в картриджах Пенфилл, нужны 2 шприц-ручки, отдельно для каждого типа инсулина.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Актрапид® МС (Actrapid® МС)

Инсулин нейтрал для инъекций*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит монокомпонентного свиного инсулина 40 ЕД; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Начало действия через 30 мин после п/к введения, максимальный эффект - через 1-3 ч, длительность действия - 8 ч.

Показ.: Сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа (при резистентности к производным гуанидина и сульфонилмочевины, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в постоперационном периоде, при беременности).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Гипогликемическое состояние, аллергические реакции (кожная сыпь, отек гортани, крайне редко - ангионевротический отек, анафилактический шок); липодистрофия (при длительном применении).

Передоз.: Симптомы: холодный пот, сердцебиение, нервозность, дрожь. Лечение: дать сахар или содержащий его продукт, ввести в/в глюкозу, инъекция глюкагона.

Примен. и доз.: Доза определяется индивидуально. П/к, в/в, в/м. При дневной дозе, превышающей 0,6 ЕД/кг массы тела, препарат следует вводить в виде двух и более инъекций в разные места.

Предост.: Не рекомендуется использовать препарат в инсулиновых дозаторах в связи с возможностью преципитации в некоторых катетерах.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Алдизем (Aldizem®)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит дилтиазема гидрохлорида 90 мг; в упаковке 30, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Фармакокин.: C_{max} достигается через 3-4 ч после приема внутрь. Связывание с белками плазмы составляет 80%. Выводится преимущественно в виде метаболитов с мочой, $T_{1/2}$ - 4-9 ч.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, артериальная гипертензия, наджелудочковая аритмия.

Противопоказ.: Синдром слабости синусного узла, АВ-блокада II-III степени, кардиогенный шок, сердечная недостаточность в фазе декомпенсации, выраженная брадикардия, артериальная гипотония, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, головокружение, брадикардия.

Примен. и доз.: Взрослым внутрь, перед едой, не разжевывая, по 90 мг 2 раза в сутки. При недостаточной эффективности дозу увеличить до 180 мг 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 360 мг.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с нарушением функции печени; следует избегать комбинации с бета-адреноблокаторами, сердечными гликозидами и антиаритмическими средствами.

Пронзв.: Alkaloid (Македония)

Алзолам (Alzolam)

Алпразолам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит алпразолама 0,25, 0,5 или 1 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, снотворное, анксиолитическое, миорелаксирующее.

Показ.: Состояния тревоги, депрессии, фобии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая закрытоугольная глаукома, миастения, острая легочная недостаточность, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность, лактация, возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, депрессия, головная боль, спутанность сознания, бессонница, нервозность, обморок, актазия, нарушения зрения, сухость во рту, запор, диарея, тош-

нота, рвота, повышенное слюноотделение, тахикардия, артериальная гипотония, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает депримирующий эффект противосудорожных, антигистаминных средств. Циметидин снижает печеночный клиренс.

Примен. и доз.: Внутрь, при состоянии беспокойства и тревоги - по 0,25-0,5 мг 3 раза в день, средняя поддерживающая доза - 0,5-4 мг/сутки в 3 приема. Пожилым и ослабленным пациентам назначают по 0,25 мг 2-3 раза в день, при хорошей переносимости возможно увеличение дозы. Прекращение лечения проводят постепенно, не более, чем на 0,5 мг в 3 дня.

Пронзв.: Sun Pharma (Индия)

Алка-зельтцер (Alka-Seltzer®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 растворимая таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 0,325 г, а также бикарбоната натрия 1,625 г и лимонной кислоты 0,965 г; в упаковке 10, 20 и 40 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное.

Показ.: Головная боль различного генеза (особенно у пациентов с гиперсекрецией желудка).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, хроническая или рецидивирующая диспепсия, склонность к кровотечениям, нарушение функции почек, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, бронхиальная астма, беременность, детский возраст (до 3 лет).

Поб. действ.: Тошнота, анорексия, боли в эпигастриальной области, кровотечения в ЖКТ, тромбоцитопения, анемия, синдром Рея, аллергические реакции (бронхоспазм, сыпь).

Взаим.: Усиливает действие антикоагулянтов и пероральных гипогликемических средств, основные и побочные эффекты НПВС, побочное действие метотрексата, снижает эффективность противовоспалительных средств.

Примен. и доз.: Для взрослых разовая доза составляет 1-2 таблетки, суточная - до 8 таблеток. Для детей старше 3-х лет разовая доза - 0,5-1,5 таблетки, суточная доза - 1-4 таблетки.

Предост.: Детям и подросткам с заболеваниями, сопровождающимися гипертермией, аспирин следует назначать только при неэффективности других

препаратов. Если при назначении аспирина имеет место долго не прекращающаяся рвота, это может быть признаком синдрома Рея.

Произв.: Bayer (Германия)

Алкадил (Alkadil®)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 25 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, блокада АПФ.

Показ.: Артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, двусторонний стеноз почечных артерий, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, ортостатическая гипотония, гиперкалиемия, протеинурия, нейтропения, диспептические расстройства, бронхоспазм, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, за 1 ч до еды. При артериальной гипертензии взрослым в начале терапии следует принимать по 25 мг 3 раза в сутки. Если через 2 нед не происходит эффективного снижения давления, дозу увеличивают до 150 мг в сутки в течение 2 нед (при неудовлетворительном эффекте дополнительно назначают какой-либо диуретик салуретик). Дозы повышают до тех пор, пока не будет достигнут желаемый терапевтический эффект. Максимальная суточная доза составляет 450 мг. При злокачественной гипертензии дозу можно увеличивать каждые 24 ч (до 450 мг в сутки). Детям: начальная доза составляет 0,3 мг/кг массы тела в сутки (под строгим наблюдением врача). Для грудных младенцев и детей более старшего возраста (с опасностью возникновения гипотензии), а также для детей, принимающих диуретики, начальная доза - 0,15 мг/кг массы тела. Препарат обычно назначают 3 раза в сутки, с учетом индивидуальной реакции пациентов. В случае отсутствия гипотензивного эффекта последующее повышение дозы необходимо проводить с семидневными интервалами по 0,6; 1,2 и 2 мг/кг массы тела. Пациентам со злокачественной гипертензией дозу можно повышать каждые 24 ч. Суммарная суточная доза не должна превышать 6 мг/кг массы тела.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Алкеран® (Alkeran®)

Мелфалан*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мелфалана гидрохлорида 2 или 5 мг.

1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора - 50 или 100 мг; в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Множественная миелома, аденокарцинома яичников, карцинома молочной железы, истинная полицитемия, локализованная злокачественная меланома и саркома мягких тканей конечностей, нейробластома (у детей).

Противопоказ.: Абсолютных нет.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Миелосупрессия, диспептические расстройства, стоматит, пневмофиброз, гемолитическая анемия, облысение; у женщин (в период перед менопаузой) подавление функций яичников, аллергическая сыпь..

Примен. и доз.: Множественная миелома: внутрь - 0,15 мг/кг в день в несколько приемов в течение 4 дней, перерыв между курсами - 6 нед; в/в - от 8 мг/кв.м до 30 мг/кв.м поверхности тела с перерывами в 4-6 нед (при комбинировании с цитостатиками) или 0,4 мг/кг (16 мг/кв.м) 1 раз в 4 нед - при монотерапии, или однократное в/в введение от 100 до 200 мг/кв.м (2,5-5,0 мг/кг). Аденокарцинома яичников: внутрь - по 0,2 мг/кг в день в течение 5 дней, курс повторяют каждые 4-8 нед. В/в - при монотерапии - 1 мг/кг (40 мг/кв.м поверхности тела) с интервалами в 4 нед. При сочетании с цитостатиками - 0,3-0,4 мг/кг (12-16 мг/кв.м поверхности тела) с интервалами 4-6 нед. Карцинома молочной железы: внутрь - 0,15 мг/кг в день или 6 мг/кв.м поверхности тела в течение 5 дней с интервалами 6 нед. Полицитемия истинная: 6-10 мг/сутки в течение 5-7 дней (индукция ремиссии), затем - 2-4 мг/сутки. Поддерживающая терапия - 2-6 мг 1 раз в неделю. Нейробластома у детей - 100-240 мг/кв.м поверхности тела (иногда в течение 3 дней). Злокачественная меланома и саркома мягких тканей - гипертермическая региональная перфузия.

Предост.: С осторожностью назначают больным, недавно проходившим курс радио- или химиотерапии, с нарушением функции почек. Необходим постоянный

контроль показателей периферической крови.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Аллергин (Allergin™)

Дифенгидрамин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит дифенгидрамина гидрохлорида 25 мг; в упаковке 15 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое.

Показ.: Аллергические реакции верхних дыхательных путей (насморк, слезотечение, першение в горле или носу), простудные заболевания.

Бер. и корм. гр.: Под контролем врача.

Поб. действ.: Повышенная возбудимость (особенно у детей).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 2 таблетки каждые 6 ч, но не более 12 таблеток в сутки. Детям от 6 до 12 лет - по 1 таблетке (не более 6) в сутки. Детям до 6 лет необходима консультация врача.

Предост.: С осторожностью (под врачебным контролем) назначают больным, принимающим препараты для лечения хронического бронхита, глаукомы, аденомы предстательной железы. Во время лечения нельзя употреблять алкогольные напитки, необходима осторожность при вождении автомобиля и работе с механизмами.

Произв.: Four Ventures (США)

Аллержи (Allergy)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Echinacea angustifolia 4X, 12X, 20X, 30X, Ignatia amara 6X, Lycopodium clavatum 6X, Sulphur 6X, 12X, 20X, 30X, Thuja occidentalis 6X, Ledum palustre 8X, Phosphorus 8X, Antimonium Crudum 12X, Histaminum 12X, Selenium 12X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Аллергические реакции: насморк, чихание, слезотечение, жжение и зуд в глазах, кожный зуд, отек слизистой носоглотки, расстройства желудка, сенная лихорадка.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Возможно (рекомендуется консультация врача до начала приема).

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения. Взрослым - по 1 таблетке каждые 1-2 ч до облегчения состояния, затем - по 1 таблетке каждые 4 ч (или по необходимости); для

профилактики - по 1 таблетке 2 раза в день (утром и на ночь) в течение 3 мес. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослых.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. В начале лечения возможно обострение симптоматики. Если улучшение не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться у врача.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Аллитера (Allithera®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит масло чеснока и масло ослинника 500 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, гипополипидемическое, гипотензивное, противовоспалительное, иммуностимулирующее.

Фармакодин.: Купирует проявления предменструального синдрома, уменьшает похмельный синдром, улучшает функции мозга (у пожилых людей), повышает естественную сопротивляемость организма.

Показ.: Артериальная гипертензия (в составе комбинированной терапии), гиперлипидемия II типа, профилактика атеросклероза, предменструальный и похмельный синдромы, астенические состояния, снижение ментальной функции (у пожилых пациентов), артрит (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Редко: головная боль, тошнота, диарея.

Взаим.: Усиливает гипотензивный эффект других препаратов.

Передоз.: Симптомы: головная боль, тошнота, диарея. Лечение: кратковременная отмена препарата.

Примен. и доз.: Внутрь. В первую неделю назначают по 2 капсулы 3 раза в сутки, затем - по 1 капсуле 3 раза в сутки. Принимают длительно (для купирования проявлений похмельного или предменструального синдромов используют короткие курсы).

Произв.: Biogal (Венгрия)

Алломарон (Allomaron®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит аллопуринола 100 мг и бензбромарона 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоподагрическое, антигиперурикемическое.

Показ.: Гиперурикемия различного генеза, подагра.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гемохроматоз, тяжелые нарушения функции почек (с уровнем креатинина в сыворотке выше 132,6 мкмоль/л (1,5 мг/100 мл) или со скоростью клубочковой фильтрации ниже 40 мл/мин), беременность, лактация, возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, диарея, васкулиты с кожными проявлениями и повышением температуры, поражение печени и почек, изменение картины крови (лейкопения, тромбоцитопения), аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает токсичность азатиоприна и меркаптопурина, антикоагулянтный эффект производных кумарина, удлиняет действие хлорпропамида; тиазидные диуретики, производные этикриновой и салициловой кислоты снижают эффект (повышают уровень мочевой кислоты в сыворотке). При лечении препаратами железа усиливается накопление железа в печени.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-3 таблетки в день после еды, с обязательным потреблением жидкости не менее 1,5-2 л в сутки (под контролем диуреза). Лечение следует начинать с 1 таблетки в день с постепенным повышением дозы.

Предост.: При тяжелых почечных нарушениях (уровень креатинина в сыворотке более 1,5 мг% и скорости клубочковой фильтрации ниже 40 мл/мин) следует использовать аллопуринол (без бензбромарона).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Аллопуринол (Allopurinolum)

Аллопуринол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аллопуринола 0,1 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противоподагрическое, ингибирование ксантиноксидазы.

Показ.: Лечение и профилактика подагры и гиперурикемии любого генеза; рецидивирующие смешанные оксалатно-кальциевые почечные камни при наличии гиперурикозурии; повышенное образование уратов вследствие ферментных нарушений; профилактика острой нефропатии при цитостатической и лучевой терапии опухолей и лейкозов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические явления, кожные реакции (сыпь, гиперемия и т.д.). Редко - гепатит, интерстициальный нефрит.

Взаим.: Несовместим с препаратами железа, усиливает токсическое действие 6-меркаптопурина.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, взрослым при легком течении заболевания - в дозе 100-200 мг/сутки; при заболеваниях средней тяжести - 300-600 мг/сутки; при тяжелом течении - 700-900 мг/сутки. При необходимости приема более 300 мг в сутки суточную дозу разделить на два приема. Детям до 15 лет в дозе 10-20 мг на 1 кг массы тела или 100-400 мг в сутки; при нарушениях функции почек максимальная суточная доза должна составлять не более 100 мг.

Произв.: Акрихин (Россия)

Аломид (Alomid)

Лодоксамид*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит лодоксамида трометамин 1,78 мг, что эквивалентно 1 мг лодоксамида; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противоаллергическое.

Фармакодин.: Стабилизирует мембраны тучных клеток, предотвращает антиген-индуцированное выделение гистамина и др. медиаторов аллергии, подавляет миграцию эозинофилов и выброс из них ферментов и цитотоксических факторов.

Показ.: Аллергические конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты (весенний катар, атопический конъюнктивит, сезонный конъюнктивит и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 4 лет).

Поб. действ.: Ощущение жжения, зуд или покалывания в глазах, слезотечение.

Примен. и доз.: Взрослым и детям - 1-2 капли в каждый глаз 4 раза в день с постоянным интервалом. При необходимости можно сочетать с кортикостероидами.

Предост.: Применяют только местно (капли в глаз). С осторожностью следует назначать беременным и кормящим матерям. Во время лечения рекомендуется воздержаться от ношения мягких (гидрофильных) контактных линз. После вскрытия флакона допускается хранение не более 1 мес.

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Алопрол (Aloprol)**Сальбутамол***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сальбутамола сульфата 2 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, противоаллергическое, токолитическое (бета₂-адреномиметическое).

Показ.: Бронхиальная астма, бронхит (хронический, астматический), эмфизема легких, преждевременные роды (ведение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тиреотоксикоз, пароксизмальная тахикардия, острая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, угроза выкидыша в связи с кровотечением во II-III триместре, беременность (I триместр), возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Расстройства сна, тремор кистей рук, дрожь, напряженность, тахикардия, головная боль, головокружение, судороги, тошнота, рвота, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с бета-блокаторами.

Примен. и доз.: Внутрь по 3-4 мг 3-4 раза в сутки (до 8 мг 4 раза); детям 2-6 лет по 1-2 мг, 6-12 лет - по 2 мг 3-4 раза в сутки.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Алопрон (Alopron)**Аллопуринол***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аллопуринола 100 или 300 мг; в упаковке 50 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоподагрическое, гипоурикемическое, ингибирование синтеза мочевой кислоты.

Показ.: Гиперурикемия (первичная, вторичная), связанная с хронической подагрой; нефропатия на фоне нарушения обмена мочевой кислоты; периодическое образование мочекислых камней; ферментная патология; болезни крови; рак; рецидивирующие приступы подагры (в комбинации с противовоспалительными препаратами, колхицином).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые приступы подагры.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью; при беременности - только по строгим показаниям, при лактации необходимо приостановить грудное вскармливание.

Поб. действ.: Кожная сыпь (макулопапулезная, зудящая), эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонса, токсический эпидермальный некроз, ли-

хорадка, артралгии, лейкопения или лейкоцитоз, эозинофилия, васкулиты, печеночно-почечная недостаточность, периферические невриты, алоpecia, тошнота, рвота, боли в животе, диарея, головная боль, головокружение, сонливость.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, взрослым - начальная средняя доза 100 мг в день однократно; через 1-3 нед, исходя из содержания мочевой кислоты в плазме крови и моче, дозу увеличивают до 300 мг/сутки; средняя поддерживающая доза - 200-600 мг (редко 900 мг) в сутки; разовая доза не выше 300 мг. Детям при неопластических процессах и ферментной патологии - по 10-20 мг/кг массы тела в сутки.

Предост.: С осторожностью следует назначать при печеночной и/или почечной недостаточности. Необходимо отменить препарат при появлении кожной сыпи, др. проявлениях гиперчувствительности. Во время лечения рекомендуется поддерживать высокий суточный диурез (не менее 2 л).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Алоэ экстракт жидкий для инъекций (Extractum Aloes fluidum pro injectionibus)

Сост. и ф.в.: 1 ампула содержит 1 мл водного экстракта из выдержанных при пониженной температуре в темноте свежих или высушенных листьев алоэ; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Адаптогенное.

Показ.: Воспалительные заболевания глаз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма.

Противопоказ.: Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, острые желудочно-кишечные расстройства, нефрозонефрит, беременность.

Примен. и доз.: П/к. Ежедневно по 1 мл (детям до 5 лет - 0,2-0,3 мл, старше 5 лет - 0,5 мл); максимальная суточная доза - 3-4 мл. Курс - 30-50 инъекций; повторяют через 2-3 мес; при бронхиальной астме в течение 10-15 дней - по 1-1,5 мл ежедневно, а затем 1 раз в два дня; всего - 30-35 инъекций.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия); Борисовский ЗМП (Беларусь)

Алсукрал (Alsucral®)**Сукральфат***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сукральфата 500 или 1000 мг; в упаковке 60 и 250 шт. (табл. 500 мг) или 30, 50 и 120 шт. (табл. 1000 мг).

Фарм. действ.: Противоязвенное, гастропротективное (образование защитной пленки на слизистой желудка), адсорбирующее.

Показ.: Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, рефлюкс-эзофагит.

Противопоказ.: Беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Сухость во рту, запоры.

Взаим.: Тормозит всасывание тетрациклинов; несовместим с антацидами (между их приемами должен быть 30 мин интервал).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 г 3-4 раза в день за 1 ч перед едой и перед сном.

Предост.: Лактирующие женщины на период лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Произв.: Orion (Финляндия)

Алталекс® (Altalex®)

Сост. и ф.в.: 2,5% смесь эфирных масел мелиссы, мяты перечной, фенхеля, мускатного ореха, гвоздики, чабреца, сосновой хвои, аниса, шалфея, корицы и лаванды в разбавленном этаноле; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое, седативное, противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, желчегонное, повышение аппетита, снижение газообразования в кишечнике, увеличение потоотделения.

Показ.: Сниженный аппетит, метеоризм, боли в желудке и кишечнике, нарушение желчевыведения, бессонница, головная боль, мигрень, мышечный спазм, артралгия, боли в крестце, насморк, кашель, зуд, царапины, порезы, укусы насекомых, грипп, слабость, усталость, недомогания и нервозность, обусловленные менструацией.

Противопоказ.: Возраст (до 3 лет).

Примен. и доз.: Внутрь и наружно. Внутрь, по 10-20 капель при болях в желудке, кишечнике, метеоризме - в горячем мятном чае; при отсутствии аппетита - с чайной ложкой сахара за полчаса до еды; при недомогании, связанном с менструацией, бессоннице - на сахаре; при гриппе - по 1 чайной ложке в стакане горячей воды или чая с одной ложкой сахара; при кашле - по 10-20 капель на

сахаре 4-5 раз в день и дополнительно несколько раз в день полощут горло (1/2 чайной ложки разводят в стакане теплой воды); при насморке - 1/2 чайной ложки вливают в стакан горячей воды и вдыхают пары, остывшей жидкостью полощут горло; детям до 5 лет - 1/4-1/3, 6-8 лет - 1/3-1/2 и 9-12 лет - 1/2 дозы для взрослых; при головной боли, мигрени, слабости и усталости втирают в кожу лба и виски, одновременно вдыхая пары; при мышечных спазмах и невралгии втирают в кожу болезненных участков; при болях в суставах и крестце втирают в болезненные места, затем покрывают ватой, небольшие царапины и порезы смазывают и перевязывают; при укусах насекомых и зуде увлажняют больное место.

Произв.: Lek (Словения)

Алтиазем® PP (Altiazem® RR)**Дилтиазем***

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит дилтиазема гидрохлорида (в форме резината) 180 мг; в блистерной упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, снижение общего периферического сосудистого сопротивления, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется. После приема 1 капсулы (180 мг) C_{max} (69,5-77,3 нг/мл) достигается через 3,9-4,3 ч. Снижение концентрации - линейное. $T_{1/2}$ - 7,3-14,7 ч. Эффективные уровни в крови сохраняются в течение 12 ч. Биотрансформируется в основном печенью с образованием дезацетилдилтиазема.

Показ.: Профилактика и лечение ИБС: стенокардия (в т.ч. спонтанная, смешанная), постинфарктное состояние, первичная артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальная гипотония (систолическое давление менее 90 мм рт.ст.), застойная сердечная недостаточность, синдром слабости синусового узла, синоаурикулярная или АВ-блокада II-III степени, брадикардия (частота пульса менее 55 ударов/мин).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано. Во время лечения женщинам детородного возраста рекомендуется эффективная контрацепция.

Поб. действ.: Сонливость или бессонница, астения, головная боль, головокружение, сухость во рту, тошнота, запор или понос, боль в эпигастрии, диспептические расстройства, синусовая бради-

кардия, синусно-предсердная блокада, отеки ног, зуд, сыпь, незначительное повышение ферментов печени.

Взаим.: Усиливает эффект др. гипотензивных средств, отрицательное дромоторное действие бета-блокаторов и препаратов наперстянки. Нитроглицерин и нитраты длительного действия усиливают терапевтическое действие.

Передоз.: Симптомы передозировки: брадикардия, артериальная гипотензия. Лечение: атропин, адреналин, допамин, глюконат кальция и др. симптоматические средства. При выраженной брадикардии возможна электростимуляция.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле через каждые 12 ч. При необходимости у больных с артериальной гипертензией возможно снижение дозы до 1 капсулы в день.

Предост.: Рекомендуется осторожное назначение препарата больным с АВ-блокадой I степени, пожилым; при необходимости хирургической операции под общим наркозом следует предупредить врача-анестезиолога о применении препарата. Во время лечения больных с патологией печени и почек рекомендуется периодический контроль функции этих органов.

Пр о и з в .: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Альгимаф (Algimafum)

Сост. и ф.в.: 1 г препарата содержит альгината натрия 0,72 г, глюконата кальция 0,234 г, мафенида ацетата 0,036 г и фенозановой кислоты 0,01 г; в пористых листах толщиной 10 мм и размером 50x50, 60x100, 150x150 и 135x250 мм. Каждый лист стерилен и герметически упакован в пакет из полимерной пленки.

Фарм. действ.: Дерматопротективное, адсорбирующее, антимикробное, стимуляция регенерации.

Показ.: Ожоги, длительно незаживающие трофические язвы и раны.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Преходящее ощущение жжения.

Примен. и доз.: Накожно, накладывают непосредственно после туалета ожоговой раны или после хирургической обработки и фиксируют марлевой повязкой.

Произв.: Архангельский опытный водорослевый комбинат (Россия)

Альгипор (Algiporum)

Сост. и ф.в.: 1 г лиофилизированного геля содержит альгината натрия 0,7276

г, глюконата кальция 0,2374 г и фурацилина 0,035 г; в пористых листах толщиной 5-10 мм размером 135x250, 150x160, 60x100 и 40x50 мм. Каждый лист стерилен и герметически упакован в пакет из полимерной пленки.

Фарм. действ.: Адсорбирующее, дезинтоксикационное, стимуляция регенерации и эпителизации, ускорение очищения ран.

Показ.: Ожоги, глубокие ожоги с влажным струпом и обильными отделениями, вялозаживающие послеожоговые раны и язвы, трофические язвы, пролежни.

Поб. действ.: Жжение, болезненность при удалении.

Примен. и доз.: Накожно, накладывают на раневую поверхность (края должны выходить за пределы пораженного участка на 0,5-1 см), фиксируют марлевой повязкой; смену производят по мере промокания и рассасывания. Курс - от 1 до 10 перевязок.

Произв.: Архангельский опытный водорослевый комбинат (Россия)

Альдактон (Aldactone®)

Спиронолактон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит спиронолактона 25 или 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, калийсберегающее, конкурентный антагонизм с альдостероном.

Показ.: Гиперальдостеронизм (первичный и идиопатический), диагностика гиперальдостеронизма, аденомы надпочечников, продуцирующие альдостерон; отечный синдром при хронической сердечной недостаточности, циррозе печени, нефротическом синдроме, нефропатии беременных; артериальная гипертензия, гипокалиемия.

Противопоказ.: Анурия, почечная недостаточность (острая, хроническая со значительным снижением функции почек); гиперкалиемия.

Поб. действ.: Диспепсия, диарея, головная боль, сонливость, атаксия, летаргия, психические расстройства, гинекомастия, снижение эрекции, расстройства менструального цикла, менструальноподобные кровотечения в климактерическом периоде, гирсутизм, снижение тембра голоса, гиперхлоремический алкалоз, аллергические реакции (сыпь, крапивница, лихорадка).

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым: при первичном гиперальдостеронизме в период подготовки к операции - 100-400 мг в сутки, при отказе от операции подби-

рается минимальная эффективная доза; при отеках (сердечного, печеночного и почечного происхождения) - в начальной дозе 100 мг в сутки в несколько приемов, через 5 дней, в зависимости от клинического эффекта, дозу уменьшают до 25 мг или увеличивают до 200 мг; при артериальной гипертензии - в начальной дозе по 50-100 мг в сутки в несколько приемов, через 2 нед возможно увеличение или снижение дозы (в зависимости от эффекта); при гипокалиемии, вызванной диуретиками, - 25-100 мг в сутки. Детям - по 3,3 мг/кг массы тела в сутки.

Предост.: Во время лечения следует избегать избыточного поступления калия в организм. При одновременном назначении с гипотензивными и диуретическими средствами необходимо уменьшать их дозы. Не рекомендуется комбинировать с другими калийсберегающими диуретиками.

Произв.: Searle (США)

Альдецин (Aldecin®)

Беклометазон*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляционного или интраназального использования содержит беклометазона дипропионата 50 мкг; в аэрозольной упаковке (баллон) 200 доз, в комплекте с мундштуком и носовым аппликатором.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит (ингаляционно), аллергические и вазомоторные риниты, полипы носа (интраназально).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, астматический приступ или статус, возраст до 6 лет.

Поб. действ.: При ингаляционном применении: реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа (бронхоспазм, сыпь, уртикарии, сосудистый отек), признаки гиперкортицизма, местная грибковая инфекция в полости рта, глотке, гортани, бронхах и пищевode, охриплость голоса, сухость во рту. При интраназальном применении: раздражение и жжение в носу, кашель, чихание, появление кровянистого отделяемого, местные грибковые инфекции носа и глотки, изъязвления слизистой носа, перфорация носовой перегородки, повышение внутриглазного давления, реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа.

Примен. и доз.: Оральные ингаляции: взрослым - по 2 ингаляции (по 50 мкг каждая) 3-4 раза в сутки; в тяжелых

случаях лечение начинают с суточной дозы 600-800 мкг, снижая ее по мере наступления улучшения; детям 6-12 лет - по 1-2 ингаляции (50-100 мкг) 2-4 раза в сутки. Интраназальные ингаляции: взрослым и детям старше 6 лет - по 1 дозе аэрозоля (50 мкг) в каждую ноздрю 2-4 раза в сутки, затем дозу снижают в зависимости от реакции больного. Максимальная суммарная доза не должна превышать 20 мерных доз (1 мг) для взрослых и 10 доз (0,5 мг) для детей в возрасте 6-12 лет. Препарат может быть использован комбинированно как ингалятор и носовой спрей, в суммарной ежедневной дозе до 1000 мкг у взрослых и 500 мкг у детей. Перед употреблением баллон необходимо встряхнуть.

Предост.: Требуется особая осторожность при переводе больных, получавших системные кортикостероиды или АКТГ на интраназальное применение препарата. Следует с осторожностью применять у больных с туберкулезом легких, нелеченной грибковой, бактериальной, системной вирусной или герпетической инфекцией глаз. Прекращать лечение необходимо постепенно.

Произв.: Schering-Plough (США)

Альдолор (Aldolor®)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 каплетта, 1 чайная ложка (5 мл) сиропа без сахара и 1 мл капель для приема внутрь содержат парацетамол 500, 120 и 100 мг соответственно; в упаковке 20, 50 или 1000 шт., во флаконах по 110 и 20 мл.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Инфекции верхних дыхательных путей, тонзиллиты, грипп, простуда, головная и зубная боль, миалгия, реакции на иммунизацию и вакцинацию у взрослых и детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Безопасность применения во время беременности не установлена. Осторожно назначать во время лактации.

Поб. действ.: Аллергические реакции, нарушения функций печени и почек (при длительном применении в больших дозах), изменения клеточного состава крови.

Взаим.: Вероятность нарушений функции печени увеличивают антикоагулянты, противосудорожные средства, рифампицин и алкоголь.

Передоз.: При приеме доз более 150 мг/кг поражается печень. Ранние симптомы: тошнота, рвота, профузное потоотделение; лабораторные признаки регистрируются через 48-72 ч. Смертельный исход (в том числе у детей) - крайне редко.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1-2 капли 3-4 раза в день. Детям 6-12 лет - по 1 капле или по 3-4 чайные ложки сиропа 3-4 раза в день, детям 4-6 лет - по 1,5-2 чайные ложки сиропа или по 66-88 капель 4-5 раз в день, 1-3 лет - по 1-1,5 чайной ложки сиропа или по 44-60 капель 4-5 раз в день, до 1 года - по 1/2 чайной ложки сиропа или по 22 капли 4-5 раз в день.

Предост.: Осторожно назначать пациентам с нарушением функции печени или почек. При длительном применении необходимо контролировать функцию печени и кроветворной системы.

Произв.: CTS (Израиль)

Альфа Д3-Тева (Alpha D₃®-Teva)

Альфакальцидол*

Сост. и ф.в.: 1 мягкая желатиновая капсула содержит альфакальцидола 0,25 или 1 мкг; в упаковке 50 и 60 шт.

Фарм. действ.: D-витаминное, регуляция фосфорно-кальциевого обмена, нормализация дифференцировки клеток в организме.

Клин. фарм.: Является предшественником активного метаболита витамина D. Восстанавливает положительный кальциевый баланс при кальциевой мальабсорбции, связанной с постменопаузальным, сенильным или стероидным остеопорозом, снижает интенсивность резорбции костей и частоту развития переломов, уменьшает костные и мышечные боли.

Показ.: Почечная остеодистрофия, гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз (с поражением костей), рахит и остеомалация, связанные с недостаточностью питания или всасывания, гипофосфатический витамин D-резистентный рахит и остеомалация, псевдодефицитный (витамин D-зависимый) рахит и остеомалация, остеопороз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиперкальциемия, гиперфосфатемия (кроме таковой при гипопаратиреозе), гипермагниемия, интоксикация витамином D.

Бер. и корм. гр.: Применение при беременности допустимо только по абсолютным показаниям, если ожидаемый эф-

фект превышает возможный риск. Во время лечения препаратом грудное вскармливание должно быть прекращено.

Поб. действ.: Гиперкальциемия, гиперфосфатемия, аллергические реакции.

Передоз.: При развитии гиперкальциемии прием должен быть прекращен до нормализации содержания кальция в плазме крови (обычно на одну неделю), а затем возобновлен с половины от последней применявшейся дозы. В тяжелых случаях необходимо в/в введение жидкостей и, при необходимости, назначение петлевых диуретиков или кортикостероидов. При острой передозировке - промывание желудка в ранние сроки и/или назначение минерального масла (может снизить всасывание и увеличить выведение с фекалиями).

Примен. и доз.: Внутрь. При первичном и стероидном остеопорозе - 0,5-1,0 мкг; при пищевом дефиците витамина D, остеомалации при заболеваниях ЖКТ и остеомалации при противосудорожной терапии - 1,0-3,0 мкг; при хронической почечной недостаточности - 0,25-1,5 мкг; при гиперпаратиреозе - 1,0-4,0 мкг; при синдроме Фанкони - 0,25-4,0 мкг; при почечно-канальцевом ацидозе - 2,0-4,0 мкг; при гипофосфатемической D-витаминной резистентной остеомалации - 2,0-6,0 мкг; при D-витаминзависимой остеомалации II типа - 10,0-15,0 мкг. Во всех вышеперечисленных случаях указанную дозу принимают 1 раз в день, утром. С целью предотвращения гиперкальциемии доза должна постепенно изменяться в соответствии с динамикой биохимических показателей. Содержание кальция в плазме крови в начале лечения следует определять 1 раз в 2 недели. Дозу Альфа Д3-Тева можно повышать по 0,25 или 0,5 мкг/день. При стабилизации дозы анализ уровня кальция можно производить 1 раз в 3 мес. При остеопорозе рекомендуемая поддерживающая доза составляет 0,5-1 мкг/сутки.

Произв.: Teva (Израиль)

альфа-Токоферола ацетат (alfa-Tocopheroli acetas)

Витамин Е

Сост. и ф.в.: 10 или 30% масляный раствор альфа-токоферола ацетата для инъекций в ампулах по 1 мл.

50% раствор альфа-токоферола ацетата; в капсулах по 0,5 г.

Фарм. действ.: Антиоксидантное, участие в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании и других процессах клеточного метаболизма.

Показ.: Мышечная дистрофия, дерматомиозит, амиотрофический боковой склероз, дисменорея, угрожающий аборт, гиподисфункция половых желез у мужчин; дерматозы, псориаз, красная волчанка, миокардиодистрофии, спазм периферических артерий, заболевания печени.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиосклероз, инфаркт миокарда.

Поб. действ.: При в/м инъекциях возможны болезненность, инфильтраты в месте введения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, при заболеваниях нервно-мышечной системы - по 50-100 мг/сутки в течение 1-2 мес, повторно - через 2-3 мес; мужчинам при нарушении сперматогенеза и потенции - 100-300 мг/сутки в течение 1 мес; при угрожающем аборте - по 100-150 мг/сутки в течение 1 мес, при привычном аборте и ухудшении внутриутробного развития - по 100-150 мг/сутки в первые 2-3 мес ежедневно или через день; при заболеваниях периферических сосудов, миокардиодистрофии, атеросклерозе - по 100 мг/сутки в течение 20-40 дней, повторно - через 3-6 мес. При заболеваниях кожи - 15-100 мг/сутки на протяжении 20-40 дней. Грудным детям - по 5-10 мг/сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ФармаДон (Россия)

Альфаферон (Alfaferone)

Интерферон альфа*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит интерферона альфа (приготовленного из донорских человеческих лейкоцитов) 1, 3 или 6 млн.МЕ.

Фарм. действ.: Противовирусное, иммуностимулирующее, антипролиферативное, противоопухолевое.

Показ.: Волосатоклеточный лейкоз, множественная миелома (стадия ремиссии), неходжкинская лимфома (в комбинации с доксорубицином, циклофосфамидом, тенипозидом, преднизолоном), грибовидный микоз, хронический миелолейкоз; саркома Капоши на фоне СПИДа, почечная карцинома, злокачественная меланома; вирусный гепатит В, С и D; остроконечные кондиломы.

Противопоказ.: Заболевания щитовидной железы (гипо- или гипертиреоз),

беременность, лактация, детский возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Гриппозоподобные симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, мышечные боли и др.; нарушения функции щитовидной железы (необратимые), расстройства ЦНС у пожилых (в высоких дозах), индивидуальная непереносимость (при длительном применении).

Примен. и доз.: В/м и п/к. Вводят по схеме, в зависимости от заболевания. Рекомендуют индивидуальный подбор доз - от 3 до 12 млн.МЕ, назначают каждый день или 3 раза в неделю (длительность лечения зависит от патологии). При остроконечных кондиломах возможно дополнительное местное использование препарата.

Предост.: Перед началом лечения необходимо измерить уровень тиреотропного гормона. С осторожностью назначают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркт миокарда, аритмии и др.). У всех больных рекомендуется контролировать состав периферической крови, функцию печени, показатели электролитного баланса, ЭКГ (у больных с патологией сердечно-сосудистой системы). Фертильным женщинам и мужчинам следует использовать специальные меры предосторожности.

Произв.: CSC (Италия)

Альфацет (Alfacet)

Цефаклор*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефаклора (в виде моногидрата) 250 или 500 мг, в упаковке 16 шт.

5 мл приготовленного сиропа - 125 или 250 мг (для приготовления 60 мл сиропа во флакон с 1,5 или 3 г сухого вещества добавляют 36 мл дистиллированной воды).

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Воспаление среднего уха, инфекции верхних (фарингит, тонзиллит) и нижних дыхательных путей (в т.ч. пневмония), мочевых путей (цистит, пиелонефрит), кожи и ее структур.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. беталактаминам).

Поб. действ.: Расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея, боли в животе), кандидоз, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - 250-500 мг каждые 8 ч; при необходимости - до 4 г/сутки; детям - 20-40 мг/кг/сутки в 3 приема. Максимальная суточная доза - 1 г.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Альфогель (Alfogel)

Алюминия фосфат

Сост. и ф.в.: 1 пакетик (16 г) содержит геля алюминия фосфата 55%, остальные компоненты - гель пектина и агар-агара; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, антацидное, адсорбирующее, обволакивающее.

Фармакодин.: Не нарушает физиологические условия пищеварения и не вызывает реактивную секрецию соляной кислоты.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения); гастрит, желудочные диспепсии, цирроз, hiatus hernia, гастроэзофагальный рефлюкс, эзофагит; колопатии, энтероколит, сигмоидит, проктит, дивертикулит; поносы у лиц после гастроэктомии; отравления, профилактика и лечение медикаментозных поражений ЖКТ.

Противопоказ.: Тяжелая хроническая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Запор.

Взаим.: Снижает всасывание тетрациклинов.

Примен. и доз.: Внутрь, в чистом виде или растворенным в 1/2-стакане воды, 1-2 пакетика 2-3 раза в день. Время приема зависит от показаний: язвенная болезнь - через 1-2 ч после еды (при болях дозу можно увеличить приемом еще 1 пакетика); hiatus hernia, гастроэзофагальный рефлюкс, эзофагит - в конце обеда и перед сном; гастрит, диспепсии - перед едой; колопатии - перед завтраком и на ночь. При ожоге каустическими средствами или желудочно-кишечной геморрагии - 3-5 пакетиков в один прием.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Амазол (Amazolum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амидопирин (аминофеназон) 0,3 г и дибазол (бендазол) 0,02 г; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Анальгетическое, вазодилатирующее.

Показ.: Артериальная гипертензия, мигрень.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Амбене (Ambene®)

Сост. и ф.в.: Комплект из раствора А, содержащего в 2 мл дексаметазона 3,5 мг и фенилбутазона 375 мг, а также 4 мг

лидокаина гидрохлорида, и из раствора В, содержащего в 1 мл цианокобаламина 2,5 мг, а также 2 мг лидокаина гидрохлорида, в ампулах соответственно по 2 и 1 мл; в упаковке 3 и 10 шт. или в двухкамерных шприцах (2+1 мл растворов А и В соответственно); в упаковке 3 и 9 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, урикозурическое.

Показ.: Суставной синдром при ревматоидном артрите, остеоартрите, анкилозирующем спондилите, подагре; неврит, невралгия, радикулит (в т.ч. дегенеративных заболеваний позвоночника).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, в т.ч. к НПВС, острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. в анамнезе), острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность в фазе декомпенсации, заболевания миокарда с нарушением проводимости, желудочковые аритмии; выраженные нарушения функции почек, печени или щитовидной железы; вирусная инфекция; системный микоз, глаукома, миелосупрессия, выраженная миопатия, миастения, синдром Шегрена, системная красная волчанка, геморрагический диатез, гигантоклеточный (височный) артериит, ревматическая полимиалгия, панкреатит, стоматит, период до (8 нед) и после (2 нед) плановой вакцинации, лимфаденит после введения вакцины BCG; хирургические операции, беременность, лактация, детский (до 14 лет) и старческий возраст.

Поб. действ.: Ульцерогенное, анорексия, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, кровотечения и перфорации ЖКТ; нарушения функции печени; угнетение костномозгового кроветворения; синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, волчаночный синдром, бронхоспазм; головокружение, головная боль, нарушение сна, возбуждение; психозы, эйфория, судороги, расстройства зрения и слуха; артериальная гипотония, ортостатический коллапс; синдром Иценко-Кушинга, микоз, нарушение функции почек; геморрагический панкреатит, иммуносупрессивное действие, лимфаденопатия, сиаденоит; аллергические и иммунопатологические реакции (экзантема, кожный зуд, лихорадка), в месте инъекции - боль, абсцессы и некроз тканей.

Примен. и доз.: В/м, медленно - по 1 инъекции в сутки ежедневно или через день (не более 3 введений в неделю) глубоко и в разные области. Интервал

между курсами должен составлять не менее нескольких недель. При применении препарата в форме комплекта из двух ампул сначала в шприц набирают раствор А, затем раствор В.

Произв.: Merckle (Германия)

Амбробене (Ambrobene®)

Амброксол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амброксола гидрохлорида 30 мг, в упаковке 20 шт.

1 капсула ретард - 75 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

1 мл раствора для приема внутрь и ингаляций - 7,5 мг; во флаконах по 40 и 100 мл.

1 мл раствора для инъекций - 7,5 мг; в ампулах по 2 мл в упаковке 5 шт.

5 мл сиропа - 15 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, секретомоторное, муколитическое, противокашлевое, стимуляция выработки сурфактанта.

Показ.: Бронхиты (острые, хронические), пневмония, бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатическая болезнь, респираторный дистресс-синдром у недоношенных детей и новорожденных.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность (первый триместр).

Поб. действ.: Слабость, головная боль, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, экзантема; при быстром в/в введении препарата - интенсивные головные боли, слабость, адинамия.

Примен. и доз.: Таблетки: взрослым - внутрь после еды, в первые 2-3 дня по 1 таблетке 3 раза в сутки, затем по 1 таблетке 2 раза или по 1/2 таблетки 3 раза в сутки; детям в возрасте 5-12 лет - по 1/2 таблетки 2-3 раза в сутки. Капсулы ретард: взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле ежедневно. Раствор для приема внутрь и ингаляций: внутрь, взрослым в первые 2-3 дня - по 4 мл 3 раза в сутки, затем - по 4 мл 2 раза или по 2 мл 3 раза в сутки; детям до 2 лет - по 1 мл 2 раза в сутки, 2-5 лет - по 1 мл 3 раза в сутки, 5-12 лет - по 2 мл 2-3 раза в сутки. Ингаляции: взрослым и детям старше 5 лет - по 1-2 ингаляции в день по 2-3 мл, детям до 5 лет - по 1-2 ингаляции в день по 2 мл. Сироп: взрослым в первые 2-3 дня - по 10 мл 3 раза в сутки, затем по 10 мл 2 раза или по 5 мл 3 раза в сутки; детям до 2 лет - по 2,5

мл 2 раза в сутки, 2-5 лет - по 2,5 мл 3 раза в сутки, 5-12 лет - по 5 мл 2-3 раза в сутки. Раствор для инъекций: вводят в/м, п/к или в/в (медленно струйно или капельно): взрослым - по 2 мл (в тяжелых случаях до 4 мл) 2-3 раза в сутки; детям - в суточной дозе из расчета 1,2-1,6 мг/кг массы тела. В качестве растворителя применяют 0,9% раствор натрия хлорида, 5% глюкозы и др. с рН не выше 6,3.

Произв.: Merckle (Германия)

Амбролан (Ambrolan®)

Амброксол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амброксола 30 мг; в упаковке 20 шт.

1 капсула ретард - 75 мг; в упаковке 10, 20 шт.

1 мл раствора для приема внутрь или ингаляций - 7,5 мг; во флаконах по 40 или 100 мл.

5 мл сиропа (чайная ложка) - 15 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Муколитическое.

Показ.: Острые и хронические бронхиты, бронхиальная астма (с затрудненным отхождением мокроты), бронхоэктатическая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек); тошнота, рвота, боли в эпигастрии (при длительном применении высоких доз).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 12 лет - в первые 2-3 дня - по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в сутки, затем - по 30 мг 2 раза или по 15 мг 3 раза или по 1 капсуле ретард (75 мг) в день, утром. Детям от 5 до 12 лет - по 15 мг (1/2 таблетки) 2-3 раза в сутки. Раствор для приема внутрь (дозировать с помощью прилагаемого стаканчика) - взрослым - в первые 2-3 дня - по 4 мл 3 раза, затем - по 4 мл 2 раза или по 2 мл 3 раза в сутки. Детям до 2 лет - по 1 мл 2 раза, от 2 до 5 лет - по 1 мл 3 раза, от 5 до 12 лет - по 2 мл 2-3 раза. Проведение ингаляций (с использованием ингалятора): взрослым и детям старше 5 лет - по 1-2 ингаляции по 2-3 мл в день; детям до 5 лет - по 1-2 ингаляции по 2 мл в день. Сироп: взрослым - по 10 мл 3 раза в день 2-3 дня, затем - по 10 мл 2 раза или по 5 мл 3 раза в день. Детям до 2 лет - по 2,5 мл 2 раза, от 2

до 5 лет - по 2,5 мл 3 раза, от 5 до 12 лет - по 5 мл 2-3 раза.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Амизол (Amyzol®)

Амитриптилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амитриптилина гидрохлорида 10 или 25 мг; в упаковке 100 и 30 шт. соответственно.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 20 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, ингибирование нейронального захвата катехоламинов и серотонина, седативное, холинолитическое, антигистаминное, седативное.

Показ.: Депрессии, депрессивная фаза маниакально-депрессивного психоза, смешанные эмоциональные расстройства, нарушения в поведении, ночной энурез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфаркт миокарда в анамнезе, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, нарушение способности к концентрации, спутанность сознания, бессонница, тревога, нарушение координации движений, тремор, сухость во рту, тошнота, анорексия, запоры, редко - диарея, потливость, зуд, крапивница, отеки, алопеция; при длительном лечении - паркинсонизм, гепатит, ортостатическая гипотензия, нарушения функции печени.

Взаим.: Усиливает действие седативных и снотворных препаратов, алкоголя. Несовместим с ингибиторами МАО (интервал должен быть не менее 14 дней).

Примен. и доз.: Внутрь, в/м, в/в. Взрослым - 75-100 мг в сутки в 3 приема, подросткам и пожилым пациентам назначают меньшие дозы препарата. Для лечения ночного энуреза детям младше 6 лет - 10 мг на ночь, от 6 до 10 лет - по 10-20 мг в день, от 11 до 16 лет - по 25-50 мг в день.

Предост.: Не следует назначать детям до 12 лет для лечения депрессии. Не рекомендуется маниакальным больным и пациентам с суицидальными наклонностями. Требуется осторожность при лечении больных с нарушениями функции сердца, печени, почек, щитовидной железы, при глаукоме, эпилепсии, гипертрофии предстательной железы. Снижает способность к концентрации внимания.

Произв.: Lek (Словения)

Амикацин (Amikacin)

Амикацин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит амикацина (в форме сульфата) 100 или 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Перитонит, сепсис, менингит, остеомиелит, эндокардит, пневмония, эмпиема плевры, абсцесс легкого и др. тяжелые инфекционно-воспалительные заболевания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам), тяжелая почечная недостаточность, неврит слухового нерва, беременность.

Поб. действ.: Поражения почек, слухового аппарата.

Примен. и доз.: В/м, в/в струйно (в течение 2 мин) и капельно. Суточная доза для взрослых и детей составляет 10-15 мг/кг массы тела, в 2-3 приема. Новорожденным и недоношенным детям назначают в начальной дозе 10 мг/кг, затем по 7,5 мг/кг каждые 12 ч. Продолжительность лечения при в/в введении - 3-7 дней, при в/м - 7-10 дней.

Предост.: Больным с нарушением выделительной функции почек требуется коррекция режима дозирования (в зависимости от значений клиренса креатинина).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Амикин (Amikin)

Амикацин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 2 мл раствора для инъекций содержит амикацина сульфата 100; 250 или 500 мг.

1 флакон с 4 мл раствора для инъекций - 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: После в/м введения быстро всасывается и проникает в экстрацеллюлярную жидкость. Выделяется в неизмененном виде с мочой в основном за счет гломерулярной фильтрации; 20% связано с белками сыворотки. Бактерицидные концентрации присутствуют в крови 10-12 ч.

Показ.: Инфекции, вызванные чувствительными штаммами бактерий (в том числе резистентными к другим аминогликозидам).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности и в раннем детском возрасте можно исполь-

зовать лишь при наличии строгих показаний и под контролем врача.

Поб. действ.: Нарушения функции почек: альбуминурия, гематурия, появление цилиндрических клеток в моче, гиперазотемия, олигурия; поражения слухового аппарата: тиннит, шум в ушах, частично обратимая или необратимая глухота; тошнота, рвота, артериальная гипотония, кожные высыпания, лихорадка, головные боли, эозинофилия, анемия.

Взаим.: При парентеральном введении с анестетиками и миорелаксантами возможна блокада нервно-мышечного проведения и паралич дыхания. Несовместим с другими ото- и нефротоксичными препаратами: (стрептомицин, полимиксины В и Е, неомицин, гентамицин, виомицин). Одновременное использование быстродействующих диуретиков: этакриновая кислота, фуросемид, меркаптомерин натрия, маннит - повышает риск развития необратимой глухоты.

Примен. и доз.: В/м; в/в (медленно, в течение 7 мин). Взрослые и дети: 15 мг/кг в сутки двумя равными дозами, в тяжелых случаях и при инфекциях, вызванных *Pseudomonas*, - 10 мг/кг в день в три приема. Новорожденные и недоношенные дети: исходная доза 15 мг/кг с последующим введением суточной дозы 15 мг/кг в два приема. На курс лечения не более 15 г (в течение 3-7 дней при в/в и 7-10 дней при в/м введении). Для в/в инфузии флакон разбавляют нормальным физиологическим солевым раствором, 5% глюкозой, раствором Рингера с лактатом или с 5% глюкозой в количестве, достаточном для вливания в течение 30-90 мин. У больных с ограниченной функцией почек концентрация креатинина в сыворотке умножается на 9, что соответствует интервалу между инъекциями в часах.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Амиксид (Amixide)

Амиксид-5 (Amixide-5)

Амиксид-Н (Amixide-N)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амитриптилина гидрохлорида 25 мг и хлордиазепоксида 10 мг, или 25 и 5 мг (Амиксид-5), или 12,5 и 5 мг (Амиксид-Н); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, транквилизирующее.

Показ.: Депрессия, состояние тревоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфаркт миокарда, планируемое оперативное вмешательство.

Бер. и корм. гр.: Не следует назначать препарат во время беременности и лактации.

Поб. действ.: Нарушение концентрации внимания, беспокойство, бессонница или сонливость, двигательное возбуждение, судорожный синдром, головокружение, головная боль, спутанность сознания, дезориентация, атаксия, тремор, периферическая нейропатия, галлюцинации, дизартрия, шум в ушах, тахикардия, сердцебиение, блокады сердца, аритмии, гипотензия, задержка мочеиспускания, повышение секреции антидиуретического гормона, нечеткость зрения, нарушение аккомодации, повышение внутриглазного давления, мириаза, сухость во рту, диспепсия, изменение массы тела, припухание яичек, гинекомастия, увеличение молочных желез, галакторея, алоpecia, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с нейролептиками, ингибиторами МАО, холинолитиками, алкоголем, электрошоковой терапией.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день, не более 6 таблеток в сутки.

Предост.: Необходимо соблюдать осторожность при лечении больных с наличием в анамнезе судорожного синдрома, аденомой предстательной железы, закрытоугольной глаукомой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертиреозом (или принимающим гормоны щитовидной железы), печечно-почечной недостаточностью. Не следует заниматься видами деятельности, требующими быстрой умственной или физической реакции.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Аминазин (Aminazinum)

Хлорпромазин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит хлорпромазина гидрохлорида 25 мг; в ампулах по 1, 2 и 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, противорвотное, гипотермическое, гипотензивное, антигистаминное, умеренное противовоспалительное.

Показ.: Психические заболевания, сопровождающиеся психомоторным возбуждением, страхом, бессонницей; острые алкогольные психозы; рвота беременных, болезнь Меньера, зудящие дерматиты.

Противопоказ.: Заболевания печени и почек, нарушение функции желудка, сердечно-сосудистая декомпенсация, выраженная гипотония, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гипотензия (вплоть до коллапса), паркинсонизм, аллергические реакции (со стороны кожи и слизистых оболочек), фото-сенсibilизация.

Взаим.: Усиливает эффект снотворных, обезболивающих и противосудорожных средств.

Примен. и доз.: В/м или в/в в виде 2,5% раствора. Высшая разовая доза для в/м введения - 0,15 г, суточная - 0,6 г. Обычно в/м вводят 1-5 мл 2,5% раствора не более 3 раз в сутки. При остром психическом возбуждении вводят в/в по 2-3 мл 2,5% раствора в 20 мл 40% раствора глюкозы. Высшая разовая доза при в/в введении - 0,1 г, суточная - 0,25 г.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Аминалон (Aminalonum)

Гамма-аминомасляная кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит гамма-аминомасляной кислоты 0,25 г; во флаконах оранжевого стекла по 100 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное, повышение продуктивности мышления, улучшение памяти.

Клин. фарм.: Поскольку ГАМК - медиатор, участвующий в процессах торможения в ЦНС, повышающий энергетические процессы мозга и обладающий мягким психостимулирующим эффектом, улучшается динамика нервных процессов, мышление, память, внимание, восстанавливается речь после нарушения мозгового кровообращения. Малотоксичен и хорошо переносится.

Показ.: Сосудистые заболевания головного мозга (атеросклероз, гипертоническая болезнь) и динамические нарушения мозгового кровообращения, постинсультный период и травмы мозга (с целью восстановления памяти, речи), слабоумие, алкогольные полиневриты, симптомокомплекс укачивания.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Диспептические явления, нарушения сна, ощущение жара, колебания АД в первые дни приема.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - 0,5-1,25 г 3 раза в день. Суточная доза - 1,5-3,0 г. Курс лечения - от 2-3 нед до 2-6 мес. Для лечения симптомокомплекс-

са укачивания - 0,5 г 3 раза в день в течение 3 дней.

Произв.: Акрихин (Россия); Фармак (Украина)

Аминосол (600; 800 ккал) (Aminosol® (600; 800 kkal))

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для инфузий Л-600 содержит изолейцина 1,4 г, лейцина 2,2 г, лизина 1,6 г, метионина 2,2 г, фенилаланина 2,2 г, треонина 1,0 г, триптофана 0,5 г, валина 1,6 г, аргинина 5,0 г, гистидина 1,2 г, орнитина аспарата 0,5 г, гликоколя 10 г, аланина 17,1 г, пролина 3,5 г, яблочной кислоты 3,5 г, натрия 30 ммоль, калия 25 ммоль, хлора 55 ммоль, сорбита 100 г, рибофлавина 0,002 г, никотинамида 0,015 г, декспантенола 0,01 г и пиридоксина хлорида 0,002 г; во флаконах по 500 мл.

1 л раствора для инфузий Л-800 форте - изолейцина 2,8 г, лейцина 4,4 г, лизина 3,2 г, метионина 4,4 г, фенилаланина 4,4 г, треонина 2,0 г, триптофана 1,0 г, валина 3,2 г, аргинина 10 г, гистидина 2,4 г, орнитина аспарата 1,0 г, гликоколя 20 г, аланина 34,2 г, пролина 7,0 г, яблочной кислоты 7,0 г, натрия 30 ммоль, калия 30 ммоль, хлора 60 ммоль, сорбита 100 г, рибофлавина 0,002 г, никотинамида 0,015 г, декспантенола 0,01 г, пиридоксина хлорида 0,002 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита белков и микроэлементов, нормализация азотного баланса.

Показ.: Парентеральное питание, белковая недостаточность.

Противопоказ.: Нарушения белкового обмена, гепатопатия, почечная и декомпенсированная сердечная недостаточность, гиперкалиемия, непереносимость фруктозы, отравление метанолом.

Поб. действ.: Тошнота, тахикардия, потливость, лихорадка.

Примен. и доз.: В/в, капельно (20-40 капель/мин) в дозе 3,0 г сорбита/кг массы тела в сутки (не более).

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Аминосол КЕ (Aminosol® КЕ)

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для инфузий содержит изолейцина 2,5 г, лейцина 3,7 г, лизина 3,3 г, метионина 2,15 г, фенилаланина 2,55 г, треонина 2,2 г, триптофана 1,0 г, валина 3,1 г, аргинина 6,0 г, гистидина 1,5 г, гликоколя 7,0 г, аланина 75,0 г, пролина 7,5 г, сорбита 150 г,

яблочной кислоты 4,7 г, натрия 30 ммоль, калия 20 ммоль, хлора 60 ммоль, рибофлавина 0,002 г, никотинамида 0,015 г, пантенола 0,01 г и пиридоксина хлорида 0,002 г; во флаконах по 500 мл.
Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов, аминокислот и микроэлементов.

Показ.: Профилактика и терапия белковой недостаточности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение обмена белков, тяжелая почечная недостаточность, нарушения функции печени, гиперкалиемия, хроническая сердечная недостаточность в фазе декомпенсации, отравление метанолом.

Поб. действ.: Тошнота, тахикардия, потливость, лихорадочное состояние, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, капельно, со средней скоростью 20-40 капель в мин в дозе 30 мл/кг в сутки (что соответствует 3 г сорбита на 1 кг массы тела в сутки). Препарат следует вводить медленно для уменьшения вероятности возникновения побочных реакций.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Аминостерил® II Новум (Aminosteril® II Novum®)

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для инфузий с энергетической ценностью 370 ккал содержит смесь L-аминокислот 94,4 г (в т.ч. незаменимых 39,7 г, или 42%); во флаконах по 100, 500 и 1000 мл. Общее содержание азота 14,2 г/л, хлорида 39,7 ммоль/л.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита аминокислот, в т.ч. незаменимых.

Показ.: Выраженный дефицит белка: потеря белка после операций, травм, ожогов, тяжелых инфекций, невозможность питания через рот, злокачественные опухоли ЖКТ, снижение или отсутствие аппетита, голодание.

Противопоказ.: Тяжелая печеночная и острая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Тромбофлебит - редко.

Примен. и доз.: В/в, капельно, медленно - со скоростью 2 мл/кг/ч (0,2 г протеина/кг/ч). Взрослым и детям школьного возраста - в суточной дозе 1,25-1,3 г протеина/кг/8 ч, т.е. 1000 мл раствора в течение 8 ч; при выраженной потере белка суточную дозу можно увеличить в 2 раза.

Предост.: Перед назначением препарата следует скорректировать дегидратацию,

тяжелые электролитные и гемодинамические нарушения.

Произв.: Orion (Финляндия)

Аминостерил® III Новум (Aminosteril® III Novum®)

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для инфузий с энергетической ценностью 125 ккал и pH 4-6 содержит смесь L-аминокислот 30 г (3%) (в т.ч. незаменимых 12 г); во флаконах по 500 и 1000 мл. Общее содержание азота 4,75 г/л.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита аминокислот, в т.ч. незаменимых.

Показ.: Дефицит белка (потеря белка после перенесенных операций, травм, ожогов и др.).

Противопоказ.: Тяжелая печеночная и острая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Тромбофлебит - редко.

Примен. и доз.: В/в, капельно (в периферические или центральные вены). Взрослым в суточной дозе - 1-2 л; если для лечения применяется исключительно аминостерил III новум, возможно применение в дозах 30-35 мл/кг. Детям раннего возраста - по 2,5 г/кг в сутки.

Предост.: Начинать применение препарата следует после того, как скорректированы дегидратация, электролитные и гемодинамические нарушения. Необходимо учитывать возможность врожденных нарушений метаболизма.

Произв.: Orion (Финляндия)

Аминофиллин (Aminophylline®)

Аминофиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит аминофиллина 350 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для внутривенного введения содержит аминофиллина 250 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, вазодилатирующее, спазмолитическое, диуретическое, стимуляция дыхательного центра.

Показ.: Бронхообструктивный синдром (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема легких), легочно-сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый период инфаркта миокарда, артериальная гипертензия, тахикардия, обструктивная кардиомиопатия, гипертиреоз, эпилепсия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

(таблетки), тяжелая печеночная недостаточность, беременность, лактация, возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Головная боль, беспокойство, нарушение сна, тремор, раздражение слизистой желудка, тошнота, рвота, диарея, артериальная гипотония, сердцебиение, нарушения ритма.

Примен. и доз.: В/в медленно (2 мл/мин), в дозе 4-6 мг/кг 1-3 раза в сутки. Внутрь, начальная доза - 1/2 таблетки каждые 12 ч, доза повышается каждые 3 дня до достижения оптимального эффекта, при этом концентрация теофиллина в плазме не должна превышать 20 мкг/мл. Снижение дозы требуется при хронической сердечной и печеночной недостаточности, острой пневмонии (особенно на фоне лечения макролидами), вирусных инфекциях, у больных пожилого возраста.

Произв.: Lek (Словения)

Аминофиллин (Aminophilline)

Аминофиллин*

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий ректальный содержит аминофиллина 360 мг; в упаковке 12 шт.

Фарм. действ.: Бронхорасширяющее, диуретическое, стимуляция ЦНС, ингибирование фосфодиэстеразы.

Показ.: Бронхоспастические состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота и др. расстройства ЖКТ, головная боль, аритмии, учащение пульса и дыхания, головокружение, бессонница, беспокойство (симптомы стимуляции ЦНС, включая подергивание, судороги), повышение уровня мочевой кислоты.

Взаим.: Циметидин, эритромицин, противогриппозная вакцина и оральные контрацептивы усиливают эффект. Карбамазепин, фенитоин, рифампицин снижают уровень в плазме. Усиливает действие др. бронхолитиков, экскрецию лития.

Примен. и доз.: Ректально, взрослым - по 1 суппозиторию (360 мг) 1-2 раза в день.

Предост.: С осторожностью используют при заболеваниях печени и сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, лихорадке, у пожилых, при беременности (рекомендуется контроль уровня препарата в плазме) и лактации (необходимо приостановить грудное вскармливание). Суппозитории, подвергшиеся при хранении

нагреванию, перед использованием и открытием упаковки охлаждают (в холодильнике, холодной воде).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Амиридин (Amiridinum)

Амиридин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амиридина 20 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антихолинэстеразное, стимуляция нервно-мышечной передачи.

Показ.: Заболевания периферической нервной системы, болезнь Альцгеймера, миастения, миастенические синдромы, демиелинизирующие заболевания, бульбарные параличи и парезы, стимуляция родов.

Противопоказ.: Эпилепсия, экстрапиримидные расстройства, стенокардия, брадикардия, бронхиальная астма.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Гиперсаливация, тошнота, рвота, усиление перистальтики, понос, головокружение, брадикардия, частое мочеиспускание, подергивание мышц языка и скелетной мускулатуры, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает влияние ацетилхолина, адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина на гладкомышечные клетки.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10-20 мг 1-3 раза в день. При тяжелых нарушениях нервно-мышечной проводимости (при миастенических кризах) - по 1-2 таблетки (20-40 мг) до 5-6 раз в день. Для стимуляции родовой деятельности - однократно по 1 таблетке, при недостаточном эффекте - по 1 таблетке двукратно с часовым перерывом.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Амирол (Amirol)

Амитриптилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка в сахарной оболочке содержит амитриптилина гидрохлорида 10 или 25 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, седативное, блокада м-холинорецепторов, снижение обратного захвата норадреналина и серотонина.

Показ.: Депрессии (особенно эндогенные); ночной энурез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, недавно перенесенный инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма и проводимости, ИБС, мании, тяжелые заболевания печени, детский возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в I и II триместрах беременности. Лактирующие женщины должны приостановить грудное вскармливание.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, запоры, "черный" язык, паралитическая непроходимость кишечника, затрудненное мочеиспускание, нарушение зрения, слабая раздражимость, поведенческие нарушения (особенно у детей), гипомания, помрачение сознания (особенно у пожилых), аритмии, тахикардия, ортостатическая гипотензия, обморок, тремор, судороги, кожные высыпания, потливость, изменение либидо, сахара в крови и массы тела, агранулоцитоз, лейкопения, эозинофилия, пурпура, желтуха.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - в обычной дозе по 75 мг 1 раз или в несколько приемов, при необходимости увеличивая до 150 мг в день и принимая дополнительную дозу вечером, или начиная с 50-100 мг однократно на ночь, добавляя по 25-50 мг до необходимой дозы 150 мг в день. Средняя поддерживающая доза - 50-100 мг/сутки; стационарным больным - до 200-300 мг в день. Курс - длительностью не менее 3 мес, затем постепенно отменяют. Подросткам, пожилым - в начальной дозе по 10-50 мг в день 1 раз (предпочтительно на ночь) или в несколько приемов; в поддерживающей дозе - по 5-25 мг в день.

Предост.: С осторожностью назначают при диабете, заболеваниях сердца (особенно аритмиях) и щитовидной железы, эпилепсии, нарушениях функции печени, психозах, глаукоме, при задержке мочи, анестезии. Больных следует предупредить об опасности управления машинами, механизмами и др. во время лечения. Прекращают лечение постепенно.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Амитриптилин Словакофарма (Amitriptylin Slovakofarma®)

Амитриптилин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит амитриптилина 25 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессантное, седативное, центральное холинолитическое, антигистаминное, повышение уровня катехоламинов и серотонина в межнейронных синапсах.

Показ.: Депрессивный синдром при психозе, депрессии (эндогенные, инволюционные, реактивные, невротические, при органических повреждениях мозга, медикаментозные), депрессии в детском возрасте (боязливость, робость, тревога, боязнь общества), эмоциональные расстройства, нарушения в поведении, энурез, энкопрез, психогенная анорексия.

Противопоказ.: Глаукома, эпилепсия, паралитическая непроходимость кишечника, пилоростеноз.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Сонливость, слабость, дезориентация, галлюцинации, психозы, делирий, экстрапирамидные расстройства, дрожь, сухость и кисло-горький привкус во рту, запоры (вплоть до паралитической непроходимости кишечника), желтуха, задержка мочи, потливость, нарушения зрения, расстройства аккомодации, тахикардия, ортостатическая гипотония, нарушения сердечной проводимости, экстрасистолия, остановка сердца, нарушение кроветворения; снижение потенции, изменение либидо, гинекомастия, галакторея, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект антипаркинсонических средств (холинолитический), фенотиазинов, вазодилататоров, тиазидных диуретиков, наркотических анальгетиков, алкоголя, психостимуляторов, ослабляет - противосудорожных средств и гипотензию, вызываемую резерпином, гуанетидином. Повышает действие симпатомиметиков.

Передоз.: Проявляется спазмами (возможно лишь через 3-5 дней), расширением комплекса QRS на ЭКГ.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, в определенное время суток (обычно вечером) - по 25-50 мг с постепенным увеличением в течение 5-14 дней до 150-300 мг в сутки. При исчезновении признаков депрессии дозу уменьшают до 50-100 мг и продолжают лечение не менее 3 мес. В пожилом возрасте и при легких нарушениях - 50-100 мг в сутки (1 раз на ночь). При ночном энурезе у детей - 12,5-25 мг на ночь. Детям школьного возраста - по 12,5-25 мг 1-3 раза в сутки.

Предост.: Соблюдать осторожность при ишемической болезни сердца, тахикардии, аритмии, сердечной недостаточности, гипертрофии предстательной железы (относительные противопоказания). Не следует назначать более 6-8 мес.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Амоксиклав® (Amoxiclav®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка 375 или 625 мг содержит амоксициллина (в виде тригидрата) 250 или 500 мг соответственно и клавулановой кислоты (в виде калиевой соли) 125 мг; в упаковке 15 и 20 шт.

5 мл суспензии и 5 мл суспензии форте для приема внутрь содержат 125 и 31 мг и 250 и 62 мг активных веществ соответственно; в порошке во флаконах для приготовления 100 мл суспензии.

1 мл капель - 50 и 13 мг в порошке; во флаконах для приготовления 20 мл капель.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора - 500 или 1000 мг амоксициллина (в виде тригидрата) и 100 или 200 мг клавулановой кислоты (в виде калиевой соли) соответственно; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра, бактерицидное, ингибирование микробных бета-лактамаз II-V типа.

Фармакокин.: Быстро всасывается после перорального приема, прием пищи не оказывает влияния на всасывание. Максимальная концентрация в плазме достигается через 45 мин. Имеет большой объем распределения - высокие концентрации обнаруживаются в плазме, мокроте, бронхиальном секрете, плевральной жидкости, ткани легкого, предстательной железе, перитонеальном абсцессе, жировой ткани, ишемической язве голени. Период полужизни амоксициллина - 78 мин, клавулановой кислоты - 60-70 мин; 68% экскретируется с мочой, меньшая часть с калом и выдыхаемым воздухом.

Фармакодин.: Клавулановая кислота препятствует ферментативной деградации амоксициллина под действием бета-лактамаз и он, как и в чувствительных бактериальных клетках, ингибирует полимеразу пептидогликана.

Клин. фарм.: При тяжелой почечной или печеночной недостаточности требуется коррекция режима дозирования (уменьшение дозировки или увеличение интервала между приемами препарата) вследствие уменьшения клиренса Амоксиклава.

Показ.: Инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей и респираторного тракта, ЖКТ, кожи и мягких тканей, гинекологические инфекции, септицемия, хирургические инфекции

(профилактика и лечение), укушенные раны.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к пенициллинам, инфекционный мононуклеоз, лимфатическая лейкемия.

Бер. и корм. гр.: Прямых противопоказаний нет. Не обладает тератогенным эффектом (исследования на экспериментальных животных).

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, рвота, диарея), аллергические реакции (эритема, сыпь).

Взаим.: Несовместим с аминогликозидными антибиотиками. Усиливает действие непрямых антикоагулянтов.

Передоз.: Симптомы: тошнота, диарея, рвота. Лечение симптоматическое; эффективен гемодиализ.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 14 лет - по 1 таблетке 3 раза в сутки; суспензия и суспензия форте - детям до 1 года по 1/2 чайной ложки 3 раза в сутки, от 1 года до 7 лет - по 1 чайной ложке 3 раза в сутки; капли - детям до 1 года по 0,75-1,25 мл 3 раза в сутки. Суспензию и капли готовят добавлением к сухому веществу соответственно 85 и 18 мл воды с последующим взбалтыванием. В/в, медленно или в виде инфузии взрослым и детям старше 12 лет - по 1,2 г через 8 ч (в тяжелых случаях через 6 ч), детям от 3 мес до 12 лет - по 0,03 г/кг через 8 ч (в тяжелых случаях через 6 ч). Детям до 3 мес: недоношенным и в перинатальный период - 0,03 г/кг через 12 ч; в постперинатальный период - через 8 ч. Курс лечения - 5-14 дней.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, склонным к аллергическим реакциям, с гиперчувствительностью к цефалоспорином (риск развития перекрестной чувствительности).

Произв.: Lek (Словения)

Амоксициллин (Amoxicillin)

Амоксициллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит амоксициллина 250 или 500 мг, в упаковке 16 и 100 шт.

1 флакон объемом 60 мл содержит амоксициллина в количестве, достаточном для приготовления оральной суспензии 250 мг/5 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, менингит, колиэнтерит, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфекционный мононуклеоз, беременность.

Поб. действ.: Диспептические явления, суперинфекция, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 500-1000 мг 3 раза в день; детям от 2 до 5 лет - по 125 мг 3 раза в день, от 5 до 10 лет - по 250 мг 3 раза в день, до 2 лет - 20 мг/кг в сутки в 3 приема. Детям до 10 лет желательно назначать препарат в виде суспензии. При гонорее - 3 г однократно (у женщин рекомендуется повторить дозу).

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Амол (Amol®)

Сост. и ф.в.: 100 мл спиртового раствора содержат масла индийской мелиссы 1 г, гвоздичного масла 1 г, коричнеого масла 2,4 г, лимонного масла 5,7 г, масла мяты перечной 2,4 г, лавандового масла 2,4 г, ментола 17,23 г.

Фарм. действ.: Общеукрепляющее, повышение жизненного тонуса, анальгезирующее, успокаивающее, нормализация пищеварения, местнораздражающее, дезинфицирующее.

Показ.: Недомогание, астения, тяжесть в желудке, головокружение, кардиалгия, нарушения кровообращения, возникающие на нервной почве, бессонница, мигрень, простудные заболевания. Местное применение (растирания) - ишиас, артралгия, миалгия, невралгия, ревматизм, головная боль.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь - по 10-15 капель на кусок сахара или растворив в 1/2 стакана воды или чая. Ингаляционно - растворить 1 чайную ложку в стакане горячей воды и вдыхать пар. Наружно - в виде растираний или повязок (без использования изолирующих средств), пропитанных раствором препарата (1:3).

Предост.: Новорожденным и грудным детям нельзя накладывать повязки на кожу лица, особенно в области носа; не следует допускать попадания препарата в глаза.

Произв.: Roland (Германия)

Амол (Amol®)

Сост. и ф.в.: 1 пастилка содержит ментола 10 мг, витамина С 30 мг, масла цитранеллы 1,342 мг, гвоздичного масла 1,342 мг, коричнеого масла 3,222 мг, масла мяты перечной 3,222 мг, лавандового масла 3,222 мг, лимонного масла 7,650 мг.

Фарм. действ.: Устранение симптомов простуды, воспаления горла и зева, стимуляция защитных сил организма (витамины С).

Показ.: Простудные заболевания (боль в горле, насморк, кашель, хрипота, заложенность пазух носа, бронхит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 4 лет).

Поб. действ.: У чувствительных пациентов возможно усиление бронхоспазма.

Примен. и доз.: По 1 пастилке по мере необходимости (держат в полости рта до полного рассасывания).

Произв.: Roland (Германия)

Ампицилин (Ampicilin)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ампициллина в форме тригидрата 250 или 500 мг; в упаковке 16, 100 шт.

1 флакон для приготовления 100 мл суспензии содержит 5 г сухого вещества ампициллина в форме тригидрата; содержимое флакона суспендируется в 57 мл воды (5 мл суспензии содержат 250 мг ампициллина в форме тригидрата); во флаконе 70 г сухой смеси для приготовления суспензии.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Абсцесс мозга, эндокардит, фарингит, бронхит, энтероколит, гонорея, гонококковый уретрит и артрит; инфекции билиарной и урогенитальной системы, ЖКТ, кожи и мягких тканей, листериоз, менингит, пневмония, синуситы, воспаление среднего уха, профилактика инфекций у жертв изнасилования.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (глоссит, стоматит, гастрит, сухость во рту, изменение вкуса, рвота, тошнота, понос, боль в животе, псевдомембранозный колит), анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, понижение уровня гемоглобина, интерстициальный нефрит, нефропатия, эпилептические приступы, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, боли в суставах, лихорадка, анафилактический шок).

Взаим.: Эффект снижают бактериостатические антибиотики, уменьшает эффективность оральных контрацептивов.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, 250-500 мг (доза варьируется в зависимости от возбудителя, тяжести заболевания, возраста и функции почек) каждые

6 ч; детям с массой тела до 20 кг - 12-25 мг/кг каждые 6 ч. Для профилактики инфекций у жертв изнасилования - внутрь 3,5 г с 1 г пробенецида. Суточная доза для новорожденных старше 7 дней и с массой тела более 2 кг - до 100 мг/кг (при менингите 200 мг/кг) в 4 приема, старше 7 дней и с массой тела до 2 кг - до 75 мг/кг (при менингите 150 мг/кг) в 3 приема. Новорожденным до 7 дней и с массой тела более 2 кг - до 75 мг/кг в сутки (при менингите 150 мг/кг) в 3 приема, с массой тела до 2 кг - до 50 мг/кг в сутки (при менингите 100 мг/кг) в 2 приема. Детям препарат назначают в виде суспензии сиропообразной консистенции. Суспензию взбалтывать перед употреблением.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Ампициллин (Ampicillin)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 5 мл приготовленной суспензии для приема внутрь содержат ампициллина 125 или 250 мг (в форме тригидрата); гранулят по 18 и 30 г во флаконах для приготовления 60 или 100 мл суспензии.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных, мочевыводящих путей, ЖКТ, кожи и мягких тканей, перитонит, сепсис, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения функции печени.

Поб. действ.: Диспептические явления, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям с 6 лет - 2-6 г в сутки за 3-4 приема. Детям до 6 лет - 100-200 мг/кг в сутки за 3-4 приема.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Ампициллин (Ampicillin)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ампициллина тригидрата 250 или 500 мг; в упаковке 16 и 100 шт.

5 мл сиропа - 250 мг; во флаконах по 60 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, ЖКТ, менингит, эндокардит, сепсис, коклюш.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени, беременность, детский возраст (до 1 мес).

Поб. действ.: Диспептические явления, нарушения ЦНС, дисбактериоз, кандидоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за 0,5-1 ч до еды, детям - 25-50 мг/кг 4 раза в день, при менингите - 100-200 мг/кг 6-8 раз в сутки. Суточная доза - 100-200 мг/кг (до 3-х лет), 50-100 мг/кг. Продолжительность лечения - 5-14 дней. Гонококковый уретрит - 3,5 г однократно.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Ампициллин (Ampicillin)

АМП-КИД (AMP-KID)

АМП-Форте (AMP-Forte)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 диспергируемая таблетка содержит ампициллина (в виде ампициллина тригидрата) 125 мг (АМП-КИД) или 250 мг (АМП-ФОРТЕ); в упаковке 10 блистеров по 10 шт.

1 капсула содержит ампициллина (в виде ампициллина тригидрата) 250 или 500 мг; в упаковке 10 блистеров по 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции органов дыхания, мочеполовой сферы, ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, стоматит, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, для взрослых - по 250 и 500 мг каждые 8 ч. Для детей с массой тела до 20 кг - 12,5-25 мг/кг массы тела каждые 6 ч или 16,7-33,3 мг/кг массы тела каждые 8 ч; с массой тела 20 кг и выше - обычная доза для взрослых.

Произв.: Sol Pharmaceuticals (Индия)

Ампициллина натриевая соль кристаллическая (Ampicillinum-natrium crystallisatum)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит ампициллина натрия 250 или 500 мг; в комплекте с водой для инъекций в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Заболевания органов дыхания, перитонит, холецистит, сепсис, кишечные инфекции, послеоперационные инфекции, инфекции мочевых путей, гонорея, инфекции кожи и мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени.

Поб. действ.: Тошнота, метеоризм, дисбактериоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, в/в (микроструйно или капельно) введение, введение в полости. Взрослым - 0,25-0,5 г каждые 4-6 ч, суточная доза - 1-3 г. При тяжелых инфекциях - до 10 г/сутки и более. Новорожденным - 0,1 г/кг, до 1 года - по 0,005 г/кг, от 1 до 4 лет - по 0,05-0,075 г/кг, старше 4 лет - 0,05 г/кг. При тяжелых инфекциях дозы могут быть удвоены.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Ампициллина тригидрат (Ampicillini trihydraz)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ампициллина тригидрата 0,25 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Пневмония, бронхит, ангина, инфекции моче- и желчевыводящих путей, ЖКТ, кожи и мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Диспепсия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 0,5 г 4-6 раз в день. При тяжелых инфекциях - до 6 г и более в сутки. Детям - 0,1 г/кг/сутки в 4-6 приемов. Длительность курса устанавливается врачом.

Произв.: Акрихин (Россия)

Амсидил (Amsidyl®)

Амсакрин*

Сост. и ф.в.: 1 мл концентрата для приготовления инфузий содержит амсакрина 50 мг; в ампулах по 1,7 мл в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое, нарушение синтеза ДНК.

Фармакодин.: Действует в основном на переход клеток из G- в S-фазу.

Показ.: Острый миелолейкоз, хронический лимфолейкоз (индукционная и поддерживающая терапия).

Противопоказ.: Выраженное угнетение костного мозга (при химио- или лучевой терапии).

Поб. действ.: Поражение костного мозга, лейкопения, панцитопения; тошнота, рвота, диарея, стоматит, эзофагит; нарушения функции печени (гепатит, печеночная недостаточность) и почек;

галлюцинации, двигательные расстройства; эпилептические припадки, экстрасистолы, тахикардии, сердечная недостаточность, остановка сердца, геморрагический синдром; нарушения функции сердца; конъюнктивит, мидриаз, нарушения зрения, развитие инфекции, сыпь, крапивница, пурпура; местные реакции (раздражение, флебит).

Примен. и доз.: В/в. Индукционная монотерапия - по 90 мг/кв.м поверхности тела 1 раз в сутки в течение 5 дней (при ежедневном контроле картины крови); курс сокращают до 3-4 дней при выраженной миелосупрессии или удлиняют до 8 дней при отсутствии миелосупрессии; при необходимости курс может быть неоднократно повторен с интервалом 1-3 нед; при нарушении функции печени и почек - по 65-75 мг/кв.м 5 дней (при усугублении нарушений возможно дальнейшее снижение дозы). Поддерживающая терапия - 150 мг/кв.м однократно или по 50 мг/кв.м ежедневно в течение 3 дней; возможно повторение курса через 3-4 нед.

Произв.: Parke-Davis/Gödecke (Германия)

Анавенол (Anavenol®)

Сост. и ф.в.: 1 мл капле для приема внутрь содержит дигидроэргокристина мезилата 0,5 мг, эскулина 1,5 мг, рутозида 30 мг; во флаконах по 25 мл.

Фарм. действ.: Венотонизирующее, капилляропротективное, улучшение микроциркуляции, снижение проницаемости сосудистой стенки.

Фармакодин.: Уменьшает ломкость капилляров (рутозид), оказывает антиэкссудативное действие (эскулин); вызывает расширение артериол (за счет альфа-адреноблокирующей активности дигидроэргокристина), тонизирует мышцы вен, улучшает периферическое кровообращение.

Показ.: Варикозное расширение вен, предварикозный синдром, посттромботический синдром; вспомогательная терапия: посттравматические нарушения микроциркуляции, варикозные язвы, тромбофлебит.

Противопоказ.: Кровотечения.

Поб. действ.: Головные боли, головокружение, чувство усталости; тошнота, рвота, диарея, кожные аллергические реакции (крапивница); редко - набухание слизистой оболочки носа, метроррагия.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 20 капель 4 раза в сутки в течение 1 нед,

затем - по 20 капель (поддерживающая доза) 2-3 раза в сутки. При отмеривании капель флакон следует держать вертикально, дном вверх.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Анальгин (Analgin)

Метамизол натрия*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метамизола натрия 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее.

Показ.: Боли (головная, миалгии, при коликах, невралгия), радикулиты, миозиты, лихорадочные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угнетение кроветворения, тяжелые нарушения функций печени и почек, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Поб. действ.: Угнетение кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 250-500 мг 2-3 раза в день. Максимальные дозы: разовая - 1000 мг, суточная - 3000 мг; детям - 50-100 мг (в 2-3 года), 100-200 мг (в 4-5 лет), 200 мг (в 6-7 лет), 250-300 мг (в 8-14 лет) 2-3 раза в сутки.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Анальгин (Analginum)

Метамизол натрия*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит метамизола натрия 250 или 500 мг; в ампулах по 1 и 2 мл.

1 таблетка - 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Болевой (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты) и лихорадочный синдромы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, агранулоцитоз.

Поб. действ.: Гранулоцитопения, агранулоцитоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м или в/в (при сильных болях) - по 1-2 мл 50 или 25% раствора 2-3 раза в день, максимальная доза - 2 г/сутки. Внутрь, после еды - по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день, при ревматизме - по 1 г 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия)

Анандрон (Anandron®)

Нилутамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нилутамида 50 мг; в упаковке 20, 40 и 60 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиандрогенное.

Показ.: Метастазирующий рак предстательной железы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, анемия, нарушение функции печени.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, нарушение аккомодации, интерстициальный легочный синдром, анемия.

Взаим.: Блокируя микросомальное окисление ксенобиотиков, усиливает эффекты пропранолола, хлордиазепоксида, диазепама, теофиллина; несовместим с алкоголем (антабус-эффект).

Примен. и доз.: Внутрь, по 300 мг/сут в течение 4 нед, далее поддерживающая терапия - 150 мг/сут.

Предост.: Лечение следует прекратить при появлении симптомов поражения легких, необъяснимых абдоминальных болей, признаков желтухи, увеличении уровня трансаминаз сыворотки (в 3 раза по сравнению с нормой) или снижении уровня гемоглобина. Необходимо воздерживаться от употребления алкоголя и вождения транспорта.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Анаприлин (Anaprilinum)

Пропранолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пропранолола гидрохлорида 10 или 40 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Блокада бета-адренорецепторов, гипотензивное, антиаритмическое, антиангинальное, усиление сократимости матки.

Показ.: Стенокардия, аритмии, артериальная гипертензия, мигрень (профилактика), первичная слабость родовой деятельности.

Противопоказ.: AV-блокада, застойная сердечная недостаточность, бронхиальная астма, бронхоспастический синдром, беременность, лактация.

Поб. действ.: Слабость, головокружение, диспепсия, бронхоспазм, брадикардия, AV-блокада, сердечная недостаточность, спазм периферических артерий, кожный зуд.

Взаим.: Несовместим с нейролептиками и транквилизаторами.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - 20-40 мг 3-4 раза в день.

Средняя суточная доза - 60-480 мг, максимальная - 640 мг. Для стимуляции родовой деятельности - по 20 мг через 30 мин 4-6 раз.

Произв.: Акрихин (Россия); Олайн-фарм (Латвия)

Анафранил® (Anafranil®)

Кломипрамин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая сахарной оболочкой, содержит кломипрамина гидрохлорида 10 и 25 мг; в упаковке 30 и 30 и 1000 шт. соответственно.

1 таблетка-ретард - 75 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 25 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессантное.

Показ.: Депрессии, обсессивно-компульсивные синдромы, фобии и навязчивые страхи, нарколепсия, сопровождающаяся катаlepsией, хронические болевые синдромы, ночной энурез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (включая другие трициклические антидепрессанты дибензазепиновой группы), недавно перенесенный инфаркт миокарда, одновременное лечение ингибиторами МАО.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Реакции, обусловленные антихолинергическим действием (сонливость, утомляемость, тремор, миоклонус, повышение аппетита, сухость во рту, нарушения мочеиспускания, расстройства зрения, глаукома), повышение массы тела, неадекватная реакция на внешние стимулы, галлюцинации, возбуждение, повышение уровня трансаминаз в крови, желудочно-кишечные расстройства, активация симптомов психоза, судороги, атаксия, аритмии, гипертензия, нарушения сердечной проводимости, гепатит, изменения количества клеток крови, аллергический альвеолит, анафилактические / анафилактоидные реакции, гиперпирексия.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Внутрь, п/к. Обычно в дозе - 75-100 мг в сутки (при навязчивых страхах - 25-100 мг в сутки). Лечение начинается с 25 мг 2-3 раза в сутки или с таблетки-ретард 1 раз в сутки (в случае навязчивых страхов - с 10 мг). Длительность курса зависит от характера заболевания. Не следует прекращать лечение одномоментно.

Предост.: В процессе лечения необходимо регулярное определение клеточного

состава крови и показателей функции печени.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Анацид (Anacid®)

Сост. и ф.в.: 5 мл суспензии для приема внутрь содержат алгелдрата 250 мг и магния гидроксида 250 мг; в пакетиках по 5 мл; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, адсорбирующее, обволакивающее.

Фармакодин.: Нейтрализует свободную соляную кислоту, уменьшая пептическую активность желудочного сока; уменьшает влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку; связывает фосфаты и нарушает их абсорбцию в ЖКТ (алгелдрат).

Клин. фарм.: Действует в течение 1 ч после приема.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, симптоматические язвы ЖКТ, эрозии слизистой ЖКТ, гастрит (гиперацидный, острый, в т.ч. при отравлении каустическими веществами), синдром "раздраженного желудка", рефлюкс-эзофагит, острый дуоденит, панкреатит (острый и хронический рецидивирующий), диспептические явления (и их профилактика) при применении НПВС, глюкокортикостероидов; дискомфорт или боли в эпигастрии, изжога, диспепсия (броидильная, гнилостная), гиперфосфатемия.

Противопоказ.: Выраженные нарушения функции почек.

Поб. действ.: Гипофосфатемия, гиперкальциурия (при дозе более 200 мл/сутки); остеомалация, боли в костях (у пожилых пациентов), нефрокальциноз и нарушение функций почек (у молодых пациентов); гипермагниемия: жажда, гипотония, понижение рефлексов (у пациентов с нарушением функции почек).

Взаим.: Замедляет абсорбцию сульфаниламидов, производных кумарина, барбитуратов, салицилатов, некоторых антибиотиков. М-холинолитики усиливают и пролонгируют действие.

Примен. и доз.: Внутрь (необходимо размять содержимое пакетика пальцами), в промежутках между приемами пищи 4-6 раз в сутки, а также при болях и изжоге (возможно и в ночное время), по 5-10 мл (1-2 пакетика) в среднем в течение 4-6 нед. При рефлюкс-эзофагите - 5 мл (1 пакетик) вскоре после еды. При эпизодическом применении (например, при дискомфорте после погрешностей в

диете) - однократно содержащее 1-2 пакетиков.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Ангин-Хель С (Angin-Heel® S)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Nhydrargirum bicyanatum D8, Phytolacca D4, Apis mellifica D4, Arnica D4 по 30 мг, Hepar sulphuris D6, Dulcamara D4, Belladonna D4 по 60 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, противоотечное, антисептическое, стимуляция лимфооттока от миндалин.

Показ.: Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания гортани (ангина, тонзиллярный абсцесс, хронический тонзиллит), увеличение миндалин, почечные и другие осложнения после ангины, хронический ринит и другие заболевания слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Возможно слюнотечение (целесообразно прекратить прием препарата).

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Heel (Германия)

Ангирол (Anghirol)

Цинарин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит цинарина 250 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Желчегонное, гипоазотемическое.

Фармакодин.: Выводит из организма мочевины и токсичные нитросоединения, оказывает холекинетическое действие, может повышать уровень холестерина в крови (в начале лечения).

Показ.: Хронический холецистит, гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря, хронический гепатит, хроническая и подострая почечная недостаточность, почечно-каменная болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые заболевания печени и желчевыводящих путей, почек, ЖКТ, обострение желчнокаменной болезни, дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 750 мг 2 раза в сутки, детям 7-10 лет - по 250 мг в сутки, 10-15 лет - по 750 мг

в сутки, в два приема. Курс лечения - 15-25 дней, после месячного перерыва может быть повторен.

Предост.: В начале лечения возможно преходящее повышение уровня холестерина в крови.

Произв.: Romferchim (Румыния)

Андрокур (Androcur®)

Ципротерон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципротерона ацетата 10 или 50 мг; в упаковке с календарной шкалой 15 шт. и во флаконах по 50 (или 20) шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, гестагенное.

Показ.: У мужчин - неоперабельный рак предстательной железы (без и после орхиэктомии); у женщин - выраженные явления андрогенизации (в том числе различные формы гирсутизма и акне).

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени (в т.ч. в анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, серповидноклеточная анемия, тромбоэмболические процессы, тяжелые хронические депрессии, идиопатическая желтуха или зуд во время бывшей беременности, предшествующая герпетическая инфекция.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Снижение способности к зачатию и оплодотворению, гинекомастия - у мужчин; ощущение напряжения в грудных железах - у женщин, снижение физической активности, слабость, депрессия, изменение массы тела.

Примен. и доз.: Внутрь после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Мужчинам - по 1-2 таблетки 1-3 раза в день. Женщинам при выраженных явлениях андрогенизации (при абсолютной уверенности в отсутствии беременности) - по 2 таблетки 1 раз в день с 1-го по 10-й день цикла, по окончании которого делают перерыв 7 дней (одновременно с андрокуром принимают по 1 драже Диане-35 с 1-го по 21-й день цикла). При лечении акне применяют таблетки по 10 мг. При отмене препарата суточную дозу снижают постепенно.

Произв.: Schering (Германия)

Андрокур-Депо (Androcur®-Depot)

Ципротерон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 3 мл масляного раствора для инъекций содержит ципротерона ацетата 300 мг; в упаковке 3 шт.

Фарм. действ.: Антиандрофенное, гестагенное, антигонадотропное.

Показ.: Неоперабельная карцинома предстательной железы (без и после орхиэктомии); коррекция патологического полового поведения (необходимость снижения сексуальной активности).

Противопоказ.: Заболевания и опухоли (в т.ч. в анамнезе) печени (при карциноме предстательной железы - только в случаях, если опухоли не обусловлены метастазами), наследственные доброкачественные гипербилирубинемии (синдромы Дубина-Джонсона и Ротора); кахексия (за исключением пациентов с карциномой предстательной железы), тяжелые хронические депрессивные состояния, тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе), тяжелый сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, серповидноклеточная анемия, подростковый возраст до завершения периода полового созревания.

Поб. действ.: Изменения массы тела, депрессия, ухудшение концентрации внимания; снижение способности к оплодотворению (восстанавливается через 3-4 мес после прекращения приема препарата), нарушения функции печени, гинекомастия; при быстром введении - одышка и кашель.

Примен. и доз.: В/м медленно глубоко в мышцу. При карциноме предстательной железы после удаления яичка - по 3 мл (1 ампула) каждые 14 дней; при сохранении ткани яичка - по 3 мл (1 ампула) 1 раз в неделю. Для коррекции полового поведения и повышенного полового влечения - от 3 мл (1 ампула) до 6 мл (2 ампулы) каждые 10-14 дней.

Предост.: У пациентов с повышенным половым влечением прием алкоголя снижает эффективность терапии. У больных сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы, инсулина или других гипогликемических препаратов. Необходим контроль функции печени, картины периферической крови и уровня глюкозы в крови.

Произв.: Schering (Германия)

Анекаин (Anekain)

Бупивакаин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит бупивакаина гидрохлорида 5 мг; во флаконах по 20 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 5-10 мин. Анальгезия сохраняется и после прекращения анестезии.

Показ.: Проводниковая, эпидуральная и каудальная анестезия; анестезия при вправлении вывихов суставов конечностей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, внутривенная региональная анестезия, парацервикальная блок-анестезия при родовспоможении (возможна брадикардия и гибель плода).

Взаим.: Ингибиторы МАО, фенипразин, празозин, бета-адреноблокаторы могут увеличивать токсичность (замедляют выделение), барбитураты снижают концентрацию (ускоряют биотрансформацию за счет индукции печеночных ферментов); не рекомендуется смешивать с другими местными анестетиками и щелочными веществами.

Примен. и доз.: Вводят медленно и в возможно более низкой дозе (концентрации). Разовая доза не должна превышать 150-175 мг (2 мг/кг массы тела). Для эпидуральной анестезии используют 10-20 мл (50-100 мг), для каудальной анестезии - 15-30 мл (75-150 мг), для проводниковой анестезии (периферические нервы) - по 5-30 мл (25-150 мг).

Предост.: С осторожностью следует назначать детям до 12 лет, больным с гипотонией, внутрисердечными блокадами и с сердечно-сосудистой недостаточностью, особенно осторожно - при повторном применении у больных с почечной и печеночной недостаточностью. После вскрытия флакон следует использовать немедленно.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Анексат (Anexate®)

Флумазенил*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит флумазенила 0,1 мг, в ампулах по 5 или 10 мл; в упаковке 5 и 25 шт.

Фарм. действ.: Конкурентный антагонизм с бензодиазепинами, блокада бензодиазепиновых рецепторов.

Показ.: Устранение центральных эффектов бензодиазепинов (в т.ч. выведение из наркоза, дифференциальная диа-

гностика и лечение передозировки бензодиазепинами).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сыпь, приливы крови к лицу, тошнота, рвота; страх, сердцебиение (при быстром в/в введении); припадки (особенно при эпилепсии в анамнезе); симптомы бензодиазепиновой абстиненции.

Примен. и доз.: В/в (предварительно разбавляют 5% раствором глюкозы или 0,9% раствором натрия хлорида). В анестезиологии - в начальной дозе 0,2 мг в течение 15 с; при необходимости - по 0,1 мг через 60 с до суммарной дозы 1 мг; обычная доза - 0,3-0,6 мг. В интенсивной терапии - в начальной дозе 0,3 мг; при необходимости инъекцию повторяют каждые 60 с до суммарной дозы 2 мг.

Предост.: Не рекомендуется назначать больным эпилепсией, получающим длительно бензодиазепины. Следует воздерживаться в течение 24 ч после приема препарата от работы с механизмами, вождения и др. деятельности, требующей повышенного внимания.

Пронзв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Анестезин (Anesthesinum)

Бензокаин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бензокаина 0,3 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Гастралгия, колика, повышенная чувствительность пищевода, болезненность изъязвленных поверхностей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, при болях в желудке и повышенной чувствительности пищевода - по 0,3 г 3-4 раза в день. Высшие дозы: разовая - 0,5 г, суточная - 1,5 г.

Пронзв.: ICN Октябрь (Россия)

Анопирин (Anopyrin®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1. буферная таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 400 мг, а также карбоната кальция 111 мг и глицина 100 мг в качестве буферных веществ; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное (ацетилсалициловая кислота), антацид-

ное (карбонат кальция) и гастропротективное (глицин).

Фармакокин.: Хорошо всасывается в ЖКТ.

Клин. фарм.: Применение т.н. отбуференных таблеток уменьшает вероятность появления нежелательных реакций пищеварительного тракта.

Показ.: Боли (головная, зубная, мышечные, суставные, поясничная, невралгии) и лихорадочные состояния, особенно при острых респираторных заболеваниях, ревматизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, геморрагический диатез, хирургические вмешательства, связанные со значительным кровотечением, язвенная болезнь, бронхиальная астма, подагра.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, повышенная кровоточивость, скрытые кровотечения в ЖКТ, гипохромная анемия, нарушение кроветворения, папиллярный некроз почек, поражения печени, синдром Рейе у детей, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов, метотрексата, барбитуратов, оральных гипогликемических средств, антибиотиков, ульцерогенное действие кортикостероидов, пиразолонов, снижает - диуретиков, уровень в крови витамина С. Действие анопирина повышают антациды, вещества, закисляющие мочу, антикоагулянты, ПАСК, прокаин; уменьшают - барбитураты, кортикостероиды, холестирамин, вещества, ощелачивающие мочу. Несовместим с алкоголем.

Передоз.: Типичный признак - гипервентиляция (дыхание Куссмауля).

Примен. и доз.: Внутрь, предварительно растворить в небольшом количестве воды, по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки, но не более 6 г; детям от 1 до 6 лет - 150-200 мг, от 6 до 15 лет - по 250-500 мг 3 раза в сутки. При остром ревматизме - 100 мг/кг массы тела в сутки в 5-6 приемов.

Предост.: При длительном назначении необходимо контролировать картину крови и учитывать возможность скрытого кровотечения.

Пронзв.: Slovakofarma (Словакия)

Антисклерин (Antisclerin®)

Сост. и ф.в.: Биологически активная пищевая добавка. 1 капсула содержит мацерата чеснока в масле сахарной свеклы (1:1) с содержанием аlicина 800-1000 млн-1 - 350 мг, DL-альфа-токофе-



рола ацетата из масла проросшей пшеницы 51 мг и соевого лецитина (65% фосфатидов) 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиоксидантное, ноотропное, улучшение мозгового кровообращения, противоатеросклеротическое, антиагрегационное, гипотензивное, восполнение относительного дефицита витамина Е и холина.

Клини. фарм.: Алицин и др. активные вещества чесночного масла, входящего в состав препарата, уменьшают концентрацию холестерина и липидов в крови, предохраняя стенки сосудов от атеросклеротических повреждений, улучшают мозговое кровообращение, снижают повышенное АД. Лецитин со стандартизованным содержанием холина является питательной субстанцией для мозга, корректирует нарушения речи, настроения и др. интеллектуально-мнестические нарушения. Витамин Е предохраняет мембраны клеток мозга от воздействия окислительных повреждающих агентов (при загрязнении внешней среды, нерациональном питании и др.).

Показ.: Профилактика гиперхолестеринемии и атеросклероза сосудов головного мозга. Профилактика расстройств памяти и способности сосредоточения, головокружения, повышенной возбудимости, плохого настроения и др. нарушений вследствие атеросклеротических изменений мозговых сосудов; недостаточность мозгового кровообращения.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи; в начальной дозе - по 2 капсулы 2 раза в день, утром и вечером, в течение первых 10 дней, затем дозу снижают и принимают по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером - в течение длительного периода времени. Одна упаковка рассчитана на 15 дней. Прием капсул антисклерина рекомендован как дополнение к пищевому рациону.

Произв.: Diet Pharma (Германия)

Антрима (Antrima®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфадиазина 400 мг и триметоприма 80 мг; в упаковке 10 шт.

2,5 мл суспензии для детей (мерная ложка) - соответственно 100 и 20 мг; в бутылках по 50 мл с мерной ложкой (2,5 мл).

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: Полностью всасывается при приеме внутрь. C_{max} в плазме - через

2-4 ч. Связь с белками плазмы: сульфадиазин - 58%, триметоприм - 45%. $T_{1/2}$ сульфадиазина 9 ч, триметоприма - 11 ч.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей (особенно простатит), ЖКТ (в т.ч. брюшной тиф, сигмоидит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, лактация, недоношенные и новорожденные дети.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, гастралгия), тромбоцитопения, нейтропения, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с тиазидными диуретиками, пероральными противодиабетическими средствами, непрямыми антикоагулянтами.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1 таблетке 2 раза в день или по 1 мерной ложке (2,5 мл) суспензии на 5 кг массы тела 2 раза в день (но не более 8 ложек). При клиренсе креатинина 15-30 мл/мин - прием один раз в день.

Предост.: При продолжительном лечении необходим контроль клеточного состава крови, функции печени и почек. Необходимо учитывать наличие сахара в суспензии (в 1 мерной ложке - 1 г сахарозы) (при назначении диабетикам).

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Апизартрон (Apisarthron)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат пчелиного яда 3 мг, метилсалицилата 10 г и аллилизотиоцината 1 г; в тубах по 20, 30, 50 или 100 г.

Фарм. действ.: Раздражающее, местное вазодилатирующее.

Показ.: Субхронический и хронический полиартриты, миалгия, ишиас, люмбаго, невралгия, хронический неврит, нарушение периферического кровообращения, артроз, нарушения функции мышц, связок и сухожилий; для разогрева мышц до и после занятий спортом.

Противопоказ.: Кожные заболевания, острый артрит, аллергия на пчелиный яд.

Поб. действ.: Кожные аллергические явления (в месте нанесения препарата).

Примен. и доз.: Полоску мази длиной 3-5 см и толщиной 1 мм (в зависимости от размера обрабатываемой поверхности) наносят на кожу; после появления покраснения и чувства тепла (через 2-5 мин) медленно и интенсивно втирают массажными движениями в кожу. Обработанные места рекомендуется держать

в тепле. Мазь применяют 2-3 раза в день ежедневно до исчезновения симптомов.

Предост.: Не следует наносить на большие поверхности кожи пациентов с почечной недостаточностью.

Произв.: Esparma (Германия)

Апилак (Apilac)

Апилак

Сост. и ф.в.: 50 г мази содержат апилака 1,5 г или апилака лиофилизированного 0,5 г, водно-эмульсионной основы до 50 г; в алюминиевых тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Тонизирующее, трофическое, антиспастическое, противозудное, противовоспалительное, стимуляция регенеративных процессов.

Показ.: Себорея кожи лица, экзема (себорейная и микробная), нейродермит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, болезнь Аддисона.

Поб. действ.: Расстройства сна, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, наносят на пораженные участки кожи (можно под повязку) от 2 до 10 г 1-2 раза в сутки. Срок лечения - от 1 нед до 2 мес.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Апилак (Apilac)

Апилак

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит апилака лиофилизированного 0,01 г; в контурной ячейковой упаковке по 25 шт.

Фарм. действ.: Тонизирующее, трофическое, антиспастическое.

Показ.: Гипотрофия, анорексия и хронические расстройства питания у новорожденных, нарушение лактации и кровопотери в послеродовом периоде.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, болезнь Аддисона.

Поб. действ.: Расстройства сна, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Сублингвально, взрослым - по 1 таблетке (0,01 г) 3 раза в сутки в течение 10-15 дней.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Апо-Клоразепат (Apo-Clorazepate®)

Дикалия клоразепат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит дикалия клоразепата 3,75; 7,5 или 15 мг; во флаконах по 100 и 500 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, снотворное, седативное, миорелаксирующее, возбуждение бензодиазепиновых рецепторов, повышение чувствительности ГАМК-рецепторов к ГАМК.

Клин. фарм.: Вызывает симптоматическое облегчение патологического состояния тревоги, беспокойства; уменьшает или устраняет напряжение мышц и приводит к их релаксации, купирует психомоторное возбуждение.

Показ.: Неврозы, сопровождающиеся чувством беспокойства, страха, тревоги, возбуждением, напряженностью, в том числе у пациентов с соматическими жалобами; острая алкогольная интоксикация (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, депрессивные неврозы, психотические реакции, возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сонливость (или бессонница), головокружение, головная боль, раздражительность, слабость, спутанность сознания, нарушение координации движений, диплопия, сухость во рту, диспептические расстройства, артериальная гипотензия, сыпь.

Взаим.: Усиливает действие алкоголя и других депримирующих препаратов.

Передоз.: Симптомы: угнетение ЦНС, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, в тяжелых случаях - кома. Лечение: промывание желудка, при необходимости - симптоматическая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь. При неврозах средняя терапевтическая доза для взрослых - 30 мг/сутки (с вариациями в пределах от 15 до 60 мг) в течение одной недели. Для пожилых и ослабленных пациентов - начальная доза 3,75 мг на ночь. При острой алкогольной интоксикации начинают с 30-90 мг в первые 24 ч в несколько приемов, снижая до 15-30 мг на 4 день, с последующим прекращением лечения как можно раньше.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам пожилого возраста, с закрытоугольной глаукомой, дебильностью, а также во время занятий, требующих повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций.

Произв.: Apotex (Канада)

Апо-Тиоридазин (Apo-Thioridazine®)

Тиоридазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиоридазина гидрохлорида 10, 25, 50 или

100 мг; во флаконах по 100, 500 или 1000 шт., в блистерной упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, антидепрессивное (малые дозы), нейролептическое, антипсихотическое умеренное (высокие дозы), противорвотное, антигистаминное, альфа-адреноблокирующее, м-холиноблокирующее.

Фармакокин.: Около 90% связывается с белками; метаболизируется в печени; выводится почками, частично с желчью. Равновесная концентрация создается через 4-7 суток.

Клин. фарм.: Антипсихотическое действие развивается постепенно (в течение нескольких недель). Максимальный терапевтический эффект наблюдается через 6 нед-6 мес.

Показ.: Возбуждение, ажитация и эмоциональное напряжение при психотических расстройствах; поведенческие нарушения у взрослых, престарелых и детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; острое угнетение ЦНС, комы любого генеза; нарушения костномозгового кроветворения (в том числе и в анамнезе), поражение печени; артериальная гипер- и гипотония.

Бер. и корм. гр.: Беременным назначать только в случае необходимости. Применение во время лактации следует избегать.

Поб. действ.: Гиперседация, спутанность сознания, психомоторные нарушения, отсроченные дискинезии; парадоксальные - ажитация, возбуждение, бессонница, галлюцинации, усиление психотических реакций, экстрапирамидные реакции, паркинсонизм; дистонические реакции; эмоциональные нарушения, нарушения терморегуляции, снижение судорожного порога, гипосаливация, обмороки, заложенность носа, фотофобия, нарушение зрения, анорексия, повышенный аппетит, диспептические расстройства (тошнота, рвота, диарея), паралитический илеус, снижение либидо, нарушение эякуляции, дисменорея, гиперпролактинемия, гинекомастия, ложноположительные тесты на беременность, увеличение массы тела, кожные аллергические реакции, эритема, сыпь, гипертрофия сосочков языка, ангионевротический отек, эксфолиативный дерматит, контактный дерматит, гипотония, тахикардия, агранулоцитоз, лейкопения, гранулоцитопения, эозинофилия, тромбоцитопения, апластическая анемия, панцитопения, бронхоспастический синдром, холестатический гепатит, дизурия.

Взаим.: Синергизм с действием общих анестетиков, опиатов, барбитуратов, ал-

коголя и других препаратов, угнетающих ЦНС, а также атропином. Потенцирование кардиодепрессивного действия хинидина. Возможно парадоксальное дальнейшее снижение АД при совместном назначении с эфедрином. Сочетание с симпатомиметиками приводит к усилению аритмогенного действия.

Передоз.: Симптомы: сонливость, спутанность сознания, нарушение ориентации (в более тяжелых случаях - кома, арефлексия), сухость во рту, заложенность носа, нарушение зрения, постуральная гипотония, угнетение дыхания, гиперрефлексия, судороги, гипотермия. Специфического антитоксика не существует. Подобно другим фенотиазинам практически не выводится при гемодиализе. Лечение симптоматическое, а также направленное на снижение всасывания и ускорение выведения препарата.

Примен. и доз.: Внутрь. Психиатрия: при легких умственных и эмоциональных расстройствах - 30-75 мг в сутки, при среднетяжелых расстройствах - 50-200 мг, при острых психозах, мании, шизофрении и ажитационных депрессиях - 150-400 мг (в амбулаторных условиях) или 250-800 мг в сутки (в стационарах). Общая практика: легкие расстройства - 10 мг 3 раза в день; в более тяжелых случаях - 50-200 мг в сутки. Гериатрия: 25 мг 3 раза в день. Педиатрия: 20-40 мг в сутки, обычно 10 мг 3 раза в день.

Предост.: Снижает внимание и скорость реакции, что требует предупреждения больных, особенно водителей автомобилей и операторов механизированных производств.

Произв.: Apotex (Канада)

Апо-Флуразепам (Apo-Flurazepam®)

Флуразепам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флуразепама гидрохлорида 15 или 30 мг; во флаконах по 100, 500 и 1000 шт. или в блистерных упаковках по 100 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, снотворное.

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется из ЖКТ. В крови не определяется уже через несколько часов, так как быстро метаболизируется. Его основной метаболит - дезалкилфлуразепам имеет период полувыведения - 47 - 1000 ч.

Клин. фарм.: Сокращает период засыпания, уменьшает число пробуждений.

Показ.: Нарушения сна (затруднение засыпания, ночные пробуждения, раннее пробуждение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим производным бензодиазепина), нарушение дыхания вследствие угнетения дыхательного центра (в т.ч. приступы апноэ во сне), парадоксальная реакция на алкоголь и/или седативные препараты, возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Нарушение памяти, мышления, концентрации внимания, изменения психики, депрессия, тревожность, слабость, головокружение, головная боль, сонливость, атаксия, боли в груди, жжение в области сердца, сердцебиение; боли в области желудка и/или кишечника, тошнота, рвота, диарея, запор; дизурические явления.

Взаим.: Усиливает угнетающее влияние на ЦНС антигистаминных, психотропных средств и алкоголя. Препараты, ингибирующие ферменты печени (циметидин, эритромицин) усиливают активность апо-флуразепама.

Передоз.: Симптомы: усугубление побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь, перед сном. Взрослым - 15-30 мг, пожилым и debильным больным начинают с 1 мг. Длительность лечения - 7-10 дней.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом и расстройствами психики (возможно развитие лекарственной зависимости), депрессией (возможно усиление симптомов), с нарушениями функции печени и почек, а также пожилого возраста. Во время лечения следует воздержаться от занятий, требующих повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций. Следует избегать резкой отмены препарата и снижать дозу постепенно.

Произв.: Apotex (Канада)

Апрессин (Apressinum)

Гидралазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гидралазина 0,01 или 0,025 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, вазодилатирующее, снижение постнагрузки.

Показ.: Артериальная гипертензия, гипертонический криз, застойная сердечная недостаточность с высокой постнагрузкой, эклампсия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, системная красная волчанка, пе-

риферические невропатии, выраженный атеросклероз артерий.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, повышение температуры, гипотония, тахикардия, кардиалгия, стенокардия, приливы, потливость, слезотечение, тошнота, рвота, эритема, отеки.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, начиная с 10-25 мг 2-4 раза в день, с постепенным повышением до 100-200 мг/сутки (в 4 приема). Высшие дозы: разовая - 100 мг, суточная 300 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Апулеин (Apulein)

Будесонид*

Сост. и ф.в.: 1 тубик мази (15 г) содержит 3,75 мг будезонида в вазелиновой мазевой основе.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, десенсибилизирующее.

Показ.: Атопический дерматит, псориаз, экзема.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, вирусные, грибковые, бактериальные (включая туберкулез) инфекции кожи, обыкновенный лишай, розацея, периоральный дерматит, беременность, лактация.

Поб. действ.: Системные эффекты глюкокортикостероидов (при длительном использовании окклюзионной повязки), кровоизлияния, атрофия кожи, суперинфекция, дерматит, чувство жжения, зуд, фолликулит, гипопигментация, стрии, гипертрихоз, папулезный дерматит.

Примен. и доз.: Накожно, на пораженную область наносят тонкий слой мази или крема 1-2 раза в день; при поддерживающей терапии достаточно применения 1 раза в день. Курс лечения - обычно не более 4 нед.

Предост.: Нельзя наносить на слизистые оболочки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Арбидол (Arbidolum)

Арбидол

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит арбидола 0,1 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное, иммуностимулирующее.

Фармакодин.: Стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета, активирует фагоцитарную функцию макрофагов; является индуктором сывороточного интерферона.

Показ.: Лечение и профилактика гриппа типов А и В у взрослых.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. Для лечения - по 0,2 г 4 раза в сутки ежедневно в течение 3 дней. Для профилактики: при контакте с больными гриппом - по 0,2 г в сутки в течение 10-14 дней; в период эпидемии гриппа и сезонного роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями - по 0,1 г 1 раз в сутки через каждые 3-4 дня в течение 3 нед. При осложнении ОРВИ пневмонией и ослаблении иммунитета - по 0,2 г 3 раза в сутки в течение 5 дней, затем - по 0,2 г 1 раз в неделю в течение 3-4 нед.

Пронзв.: Мосхимфармпрепараты (Россия)

Ардуан (Arduan)

Пипекурония бромид*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит пипекурония бромида 4 мг; в комплекте с растворителем в ампулах по 2 мл, в упаковке 25 комплектов.

Фарм. действ.: Миорелаксирующее, блокада н-холинорецепторов соматической мускулатуры.

Показ.: Релаксация поперечнополосатых мышц при операциях и диагностических процедурах в условиях искусственной вентиляции легких.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения.

Поб. действ.: Брадикардия, артериальная гипотония; редко - анафилактические реакции.

Взаим.: Эффекты усиливают и/или пролонгируют ингаляционные (галотан, метоксифлуран, диэтиловый эфир) и неингаляционные (кетамин, фентанил, пропанидид, барбитураты) наркотические препараты, антибиотики (аминогликозиды, тетрациклины, полипептиды, имидазол, метронидазол), диуретики, бета-адренергические блокаторы, тиамин, ингибиторы МАО, гуанидин, протамин, фенитоин, альфа-адренергические блокаторы, антагонисты кальция, лидокаин (при в/в введении), снижают - глюкокортикостероиды, неостигмин, норадреналин, теofilлин, кальция хлорид, натрия хлорид.

Примен. и доз.: В/в по 0,07-0,08 мг/кг, повторные дозы - по 0,01-0,015 мг/кг.

Пронзв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Аредиа (Aredia®)

Памидроновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит памидроната динатрия 15 или 30 мг в комплекте с растворителем (вода для инъекций) в ампулах; в упаковке 4 и 2 комплекта соответственно.

Фарм. действ.: Антиостеолитическое, ингибирование резорбции костной ткани.

Показ.: Метастазы (преимущественно литические) опухолей в кости, множественная миелома, опухолевая гиперкальциемия, костная болезнь Педжета.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к препарату или к другим бисфосфонатам, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Лихорадка (слабо выраженная транзиторная), гипокальциемия и гипофосфатемия, лимфоцитопения, реакции в месте инфузии, транзиторные мышечноскелетные боли, симптомы со стороны ЖКТ, гипомагниемия, гипокальциемия, ухудшение течения имевшегося ранее заболевания почек, тромбоцитопения, судороги, увеит.

Примен. и доз.: В/в медленно в виде инфузии. При метастазах в кости и множественной миеломе - 90 мг путем однократной инфузии каждые 3-4 нед. При гиперкальциемии, вызванной опухолью, суммарная доза - 30-90 мг, вводимая путем однократной или множественных инфузий. При костной болезни Педжета - 30 мг еженедельно или 60 мг через неделю, до достижения суммарной дозы - 180-210 мг.

Предост.: Нельзя вводить струйно, с другими бисфосфонатами или совместно с инфузионными растворами, содержащими кальций. Лечение следует проводить под контролем уровня электролитов в сыворотке крови, содержания кальция и фосфатов, показателей функции почек. Применяют с осторожностью при выраженной почечной недостаточности, заболеваниях сердца, у водителей автотранспортных средств и лиц, эксплуатирующих механизмы.

Пронзв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Ариффон (Arifon®)

Индапамид*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит индапамида гемигидрата 2,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, уменьшение периферического сопротивления, стимуляция синтеза простагландина E₂, блокада кальциевых каналов (нарушение миграции ионов кальция через мембраны клеток гладкой мускулатуры), диуретическое (слабое).

Фармакокин.: Быстро всасывается. Максимальная концентрация в крови достигается через 1 ч. Накапливается в желудке, печени почках, легких. Выводится - 57% с мочой, 18% с калом.

Показ.: Эссенциальная артериальная гипертония.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые церебральные кровотечения, печеночная недостаточность, гиперальдостеронизм, сахарный диабет, подагра.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Очень редко - гипокалиемия, ортостатическая гипотония, головокружение, беспокойство, мышечные спазмы, тошнота, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с препаратами лития, калийвыводящими диуретиками.

Передоз.: Проявляется резким увеличением диуреза.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 драже в день, утром.

Предост.: У больных, принимающих препараты дигиталиса, слабительные, при гиперальдостеронизме и в пожилом возрасте следует контролировать уровень калия и креатинина в крови.

Произв.: Zorka (Югославия)

Арифон (Arifon®)

Индапамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит индапамида гемигидрата 2,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, диуретическое, повышение синтеза PgE₂.

Фармакокин.: Быстро и полностью всасывается в ЖКТ. C_{max} - 1-2 ч. T_{1/2} - 18 ч. Связь с белками плазмы - 79%. 60% выводится почками (лишь 5% в неизменном виде).

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Нарушения мозгового кровообращения, тяжелая печеночная недостаточность, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Слабость, ортостатическая гипотония, гипокалиемия, гиперурикемия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с препаратами лития, винкамином.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день.

Произв.: Servier (Франция)

Артамин (Artamin®)

Пеницилламин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пеницилламина 150 или 250 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Комплексообразующее, иммунодепрессивное, снижение уровня нерастворимого коллагена.

Показ.: Отравление тяжелыми металлами (медь, золото, свинец, ртуть, кобальт, цинк), болезнь Вильсона-Коновалова, ревматоидный артрит (в том числе ювенильный), первичный билиарный цирроз, хронический гепатит, склеродермия, цистинурия, цистиноз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение гемопоэза, агранулоцитоз, миастения, нефропатии, беременность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, угнетение кроветворения, холестатический синдром, периферическая нейропатия, миастения, полимиозит, дерматомиозит, алоpecia, лихорадка, артралгия, лимфаденит, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с антибиотиками.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак (не принимать пищу 1,5 ч до и после приема). При ревматоидном артрите, гепатите, склеродермии: первые 4 нед - по 1 капсуле (150 мг) в день (до 250 мг); вторые 4 нед - по 1 капсуле (250 мг) в день (до 450 мг); третьи 4 нед - по 1 капсуле (150 мг) 2 раза в день (до 600 мг), увеличивать дозу на 50-150 мг в день с 4-12 нед интервалами до 750 мг в день. Ювенильный ревматоидный артрит - при массе тела менее 20 кг - по 1 капсуле (50 мг) в день, свыше 20 кг - по 1 (50 мг) 2 раза в день. Увеличивать дозу на 50 мг с 2-4 нед интервалами до 15-20 мг/кг или 600 мг в день. Болезнь Вильсона - Коновалова - взрослым - постепенное увеличение дозировки с 250 мг до 2 г в день, детям - со 150 до 750 мг в день. Цистинурия - 1000 мг/кв.м. Отравления - 0,9-1,8 г в день (по 2-4 капсулы по 150 мг 3 раза).

Предост.: Следует постоянно контролировать кровь, мочу (общий анализ, щелочная фосфатаза, трансаминазы).

Произв.: Biochemie (Австрия)

Артрекс (Arthrex®)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: Гель, содержащий 1% диклофенака натрия; в тубах по 50 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное (ингибция циклооксигеназы), анальгезирующее, жаропонижающее.

Фармакокин.: При местном нанесении проникает через кожу и накапливается в терапевтических концентрациях в месте действия. Дозы, вводимые в форме 1% геля, сравнимы с обычными суточными дозами при оральном приеме. Для терапевтического действия препарата концентрация, создаваемая в месте действия, имеет более важное значение, чем его концентрация в плазме. Сравнение выведения препарата и его метаболитов при приеме внутрь и местном применении показало, что происходит выделение почти тех же самых метаболитов.

Клин. фарм.: Благодаря местному применению, возможно избежать системной нагрузки, происходящей при приеме препарата внутрь или при его парентеральном введении.

Показ.: Травмы сухожилий, связок, мышц и суставов (для снятия боли и воспаления при растяжениях, вывихах, ушибах), локализованные формы ревматизма мягких тканей (устранение боли и воспаления).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим нестероидным противовоспалительным средствам), возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется во время беременности и лактации в связи с отсутствием клинических данных.

Поб. действ.: Местные аллергические реакции (экзантема, эрозия, эритема, экзема, изъязвления), фотосенсибилизация; возможно развитие системных побочных эффектов.

Передоз.: Наиболее вероятна при попадании препарата в ЖКТ. Лечение: промывание желудка, введение активированного угля; симптоматическая терапия, направленная на устранение: повышения артериального давления, нарушения функции почек; судорог, раздражения ЖКТ, угнетения дыхания. Специфическая терапия (форсированный диурез, гемодиализ, гемоперфузия) малоэффективна, т.к. нестероидные противовоспалительные препараты быстро связываются с белками и подвергаются интенсивному метаболизму.

Примен. и доз.: Осторожно втирают в кожу от 2 до 4 г геля (соответствует 2-2,5

см выдавливаемой полоски геля) 2-4 раза в сутки. После нанесения препарата необходимо вымыть руки, т.к. препарат проникает через кожу.

Предост.: Не следует наносить на поврежденные участки кожи, на открытые раны или в сочетании с окклюзивной повязкой. Избегать попадания в глаза и на слизистые. Больным старческого возраста назначать осторожно (склонность к побочным реакциям). При развитии побочных реакций о них необходимо сообщить врачу.

Произв.: Knoll (Германия)

Артротек (Artrotec)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака натрия 50 мг и мизопростола 200 мкг; в блистерной упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Фармакокин.: Мизопростол быстро всасывается и метаболизируется до активного метаболита - кислоты мизопростоловой, последняя имеет период распада около 30 мин. 70% введенной дозы мизопростола выводится с мочой в виде неактивных метаболитов. Диклофенак натрия также быстро и почти полностью всасывается, обратимо связывается с белками плазмы; от 40 до 60% выводится с мочой, остальное - с желчью и фекалиями.

Клин. фарм.: Диклофенак в составе Артротекса обеспечивает противовоспалительное действие, мизопростол действует профилактически, предотвращая желудочные и дуоденальные изъязвления, которые могут возникнуть вследствие действия Диклофенака.

Показ.: Остеоартриты, ревматоидный артрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Расстройства ЖКТ (боли в животе, диарея).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды. Таблетку принимают целиком, не разжевывая.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с застойной сердечной недостаточностью, нарушениями функции почек, предрасположенностью к задержке жидкости в организме.

Произв.: Searle (США)

Арутимол (Arutimol®)

Тимолол**

Сост. и ф.в.: 1 мл 0,25% раствора содержит тимолола малеата 3,4 мг (что соответствует 2,5 мг тимолола); 1 мл 0,5% раствора - 6,8 мг (5 мг); во флаконах-капельницах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противоглаукомное, бета-адреноблокирующее.

Фармакокин.: Хорошо всасывается через сетчатку глаза и слизистую носа, выделяется с мочой.

Клин. фарм.: При местной аппликации внутриглазное давление снижается через 20 мин, максимум эффекта - через 2-3 ч, длительность - до 24 ч.

Показ.: Глаукома (все формы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые обструктивные заболевания дыхательных путей, синусовая брадикардия, АВ-блокада, сердечная недостаточность, тяжелый аллергический ринит.

Бер. и корм. гр.: При применении в I триместре беременности необходимо сопоставлять возможную пользу и потенциальный риск.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, слабость и быстрая утомляемость, дезориентация, галлюцинации, нарушения дыхания, брадиаритмия, гипотония, бронхоспазм, уменьшение слезной секреции, блефарит, конъюнктивит, кератит, аллергические реакции, тахифилаксия.

Взаим.: Совместим с миотическими средствами и ингибиторами карбоангидразы.

Примен. и доз.: По одной капле в глаз утром и вечером в течение не более 6 нед.

Произв.: Ankerpharm (Германия)

Асинис (Asinis®)

Сост. и ф.в.: 100 мл каплей для приема внутрь содержат Armoracia D1 10 мл, Kalium bichromicum D6 10 мл, Hydrastis D6 10 мл, Calcium sulfuricum D12 10 мл, Cinnabaris D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое, иммуностимулирующее, дезинтоксикационное.

Показ.: Гайморит, фронтит, этмоидит, хронические - ринит и фаринголарингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды 3 раза в день, взрослым и подросткам - по 10-20 капель, в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года - по 1-3 капли, разведенных в 1 чайной ложке воды или молока; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды. При острых состояниях - каждые 0,5-1 ч: взрослым и подросткам - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли; детям до 1 года - по 1 капле до наступления улучшения (не более 8 раз), затем - 3 раза в день.

Предост.: При появлении повышенного слюноотделения прием препарата следует прекратить.

Произв.: Bittner (Австрия)

Аскорбиновая кислота (Acidum ascorbinicum)

Аскорбиновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит аскорбиновой кислоты 50 мг.

1 мл раствора для инъекций - 50 или 100 мг, в ампулах по 1 и 2 мл; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 50 мг; в упаковке 100 шт.

1 таблетка для детей - 25 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витамина С.

Показ.: Гиповитаминоз С, геморрагический диатез, кровотечения (носовые, легочные, печеночные, маточные), инфекции, интоксикации, заболевания печени, надпочечниковая недостаточность, вялозаживающие раны, язвы, переломы костей, дистрофия, усиленная физическая и умственная нагрузка, беременность и лактация.

Противопоказ.: Тромбофлебиты, склонность к тромбозам, сахарный диабет.

Поб. действ.: Гипергликемия, глюкозурия, артериальная гипертензия.

Примен. и доз.: Внутрь, для профилактики - 50-100 мг/сутки (детям - по 25 мг/сутки, для лечения - 50-100 мг/сутки после еды), при беременности и лактации - 300 мг в течение 10-15 дней, далее - по 100 мг/сутки. В/м, в/в, по 1 мл 10% или 1-3 мл 5% раствора. Высшая доза: разовая - не выше 200 мг, суточная - 500 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Марбиофарм (Россия)

Аскорбиновая кислота (*Acidum ascorbinicum*)

Аскорбиновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит аскорбиновой кислоты 0,05 г, в комплекте с водой для инъекций, в ампулах по 2 мл; в упаковке 5 комплектов.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витамина С.

Фармакодин.: Участвует в регуляции углеводного обмена окислительно-восстановительных процессов, свертываемости крови, проницаемости капилляров, регенерации тканей, синтезе стероидных гормонов, коллагена, проколлагена.

Показ.: Авитаминоз и гиповитаминоз С; геморрагические диатезы, кровотечения (носовые, легочные, печеночные, маточные, вызванные лучевой болезнью); передозировка антикоагулянтов; инфекционные заболевания и интоксикации; болезнь Аддисона, нефропатия беременных; вялозаживающие раны и переломы костей; дистрофия; умственное и физическое напряжение.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы (при длительном применении).

Примен. и доз.: В/м, в/в, перед введением лиофилизированный порошок растворяют в 1-2 мл стерильной воды для инъекций, взрослым - 1-3 мл 5% раствора (2-6 мл 2,5% раствора) в день; детям - 1-2 мл 5% раствора (2-4 мл 2,5% раствора) в день.

Предост.: С осторожностью назначают при повышенной свертываемости крови, тромбофлебитах, склонности к тромбозам, сахарном диабете. Необходимо контролировать функцию почек и АД, особенно при назначении больших доз.

Произв.: УфаВита (Россия)

Аскорутин (*Ascorutinum*)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аскорбиновой кислоты 50 мг и рутина 50 мг.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витамина С, увеличение прочности капилляров.

Показ.: Гиповитаминоз, заболевания, сопровождающиеся повышенной проницаемостью капилляров.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Аскофен-П® (*Ascorphenum-P*)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 0,2 г, парацетамола 0,2 г и кофеина 0,04 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное.

Показ.: Купирование лихорадочного и умеренно выраженного болевого синдрома различной этиологии (головная, зубная боль, мигрень, невралгия, миалгия, артралгия, дисальгоменорея, заболевания, сопровождающиеся лихорадкой и болями).

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, гипокоагуляция, печеночно-почечная недостаточность, портальная гипертензия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, индивидуальная непереносимость ацетилсалициловой кислоты и/или парацетамола, беременность, лактация.

Поб. действ.: При длительном применении в больших дозах - обострение бронхиальной астмы, диспептические расстройства, язвенно-геморрагические поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, гепато- и нефротоксическое действие, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает антиагрегационное действие других средств, побочные действия глюкокортикоидов, сульфонилмочевины, метотрексата. Не рекомендуется сочетать с барбитуратами, противосудорожными средствами, салицилатами, рифампицином, алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 3 раза в день после еды, запивая большим количеством жидкости (молоко, щелочная минеральная вода). Курс лечения - 10-12 дней. Для купирования болевого синдрома - 2 таблетки однократно.

Произв.: ICN Лексредства (Россия)

Асмовал (*Asmoval™*)

Астемизол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит астемизола 10 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное (блокада H₁-гистаминовых рецепторов), м-холиноблокирующее (слабое).

Показ.: Аллергический ринит (в т.ч. сезонный, хронический), конъюнктивит, кожные заболевания, включая крапивницу (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания сердца, нарушения метаболизма, беременность.

Поб. действ.: Повышение аппетита, увеличение массы тела; редко - угнетение ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. Взрослым и детям 12 лет и старше - по 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день. Детям 6-12 лет - по 5 мг (1/2 таблетки) 1 раз в день.

Предост.: Не рекомендуется принимать кормящим матерям (экскретируется с молоком). Не следует превышать рекомендованные дозы (во избежание возникновения желудочковой аритмии). Во время лечения необходимо воздерживаться от употребления алкоголя. С осторожностью назначают водителям транспорта и др. лицам, профессия которых связана с быстрой психической и двигательной реакцией, детям младше 6 лет и престарелым (поскольку безопасность применения у них не установлена).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Аспаркам (Asparcamum)

Калия и магния аспарагинат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит смесь калия и магния аспарагината в соотношении 1:1 (по 0,175 г); в упаковке 10 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, улучшение проводимости и сократимости миокарда, повышение содержания ионов калия и магния в клетке, восполнение дефицита аспарагиновой кислоты, стимуляция окислительного фосфорилирования и образования АТФ, улучшение сократимости скелетных мышц и моторики ЖКТ (облегчение освобождения ацетилхолина), диуретическое.

Показ.: Стенокардия, кардиосклероз, миокардиодистрофия, инфаркт миокарда, аритмии, в т.ч. связанные с абсолютной или относительной гипокалиемией или гипокалийгистидией миокарда, интоксикацией сердечными гликозидами. Для восполнения калия на фоне терапии салуретиками, слабительными средствами, кортикостероидами; при рвоте, диарее.

Противопоказ.: Острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, гемолиз, острый метаболический ацидоз, миастения, нарушение атрио-

вентрикулярной проводимости (AV-блокады 2-3 степени).

Поб. действ.: Неприятные ощущения или жжение в подложечной области (у больных анацидным гастритом или холециститом), гиперкалиемия (тошнота, рвота, диарея, парестезии), гипермагниемия (покраснение лица, жажда, снижение АД, гипорефлексия, нервно-мышечная блокада, угнетение дыхания, судороги).

Взаим.: Усиливает действие и улучшает переносимость сердечных гликозидов; предупреждает и устраняет гипокалиемию, связанную с приемом салуретиков и кортикостероидов; усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. Профилактическая доза - по 1 таблетке 3 раза в сутки, лечебная - по 1-2 таблетки 3 раза в день в течение 3-4 нед. При необходимости курс повторяют.

Предост.: Необходим контроль содержания калия в плазме крови (например, по данным ЭКГ).

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Санитас (Литва)

Аспизол® (Aspisol®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 флакон с сухим веществом для приготовления инъекционного раствора содержит 900 мг D,L-лизинмоно(ацетилсалицилата), что соответствует 500 мг ацетилсалициловой кислоты и 100 мг аминокусусной кислоты.

1 ампула с растворителем содержит 5 мл воды для инъекций; в упаковке по 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное.

Показ.: Болевой синдром (миалгия, артралгия, невралгия, после операций), лихорадка, ревматические заболевания, невриты, тромбофлебит поверхностных вен; послеоперационные тромбозы и эмболии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная кровоточивость, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, бронхиальная астма.

Бер. и корм. гр.: Противопоказан.

Поб. действ.: НПВС-гастропатия, желудочно-кишечные кровотечения, тромбоцитопения, анемия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с антикоагулянтами. Усиливает эффект НПВС и произ-

водных сульфонилмочевины, токсичность метотрексата. Снижает действие фуросемида, спиронолактона, противоподагрических средств.

Примен. и доз.: В/в и глубоко в/м - 1-2 флакона (в сутки не более 10 г). Обычная суточная доза ацетилсалициловой кислоты для грудных младенцев и детей составляет 10-25 мг/кг массы тела, что соответствует 0,1-0,25 мл готового раствора для инъекций. Эта суточная доза должна быть разделена на 2-3 разовых дозы. Раствор каждый раз должен готовиться заново.

Произв.: Bayer (Германия)

Аспирин (Aspirin®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 100 или 500 мг; в упаковке 10, 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное.

Показ.: Воспалительный синдром, болевой синдром слабой и средней интенсивности, ревматические заболевания, лихорадка; профилактика тромбозов, эмболий и инфаркта миокарда.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, склонность к кровоизлияниям, заболевания почек, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, бронхиальная астма, детский возраст (до 5 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: НПВС-гастропатия, эрозивно-язвенные поражения и кровотечения в ЖКТ, тромбоцитопения, анемия, синдром Рея, аллергические реакции.

Взаим.: Снижает эффект фуросемида, спиронолактона, гипотензивных и противоподагрических средств, усиливает - НПВС, производных сульфонилмочевины, побочное действие метотрексата. Антикоагулянты, алкоголь, глюкокортикоиды повышают риск ЖКТ-кровотечений.

Примен. и доз.: Внутрь, 0,5-1 г (до 3 г в сутки); детям старше 5 лет разовая доза - 0,25-0,75 г; в сутки - 0,75-1,5 г. Разовую дозу при необходимости можно применять 3 раза в сутки с интервалом 4-8 ч. При нарушениях мозгового кровообращения - 0,125-0,3 г/сутки; при ИБС - 0,3-0,325 г в 3 приема.

Произв.: Bayer (Германия)

Аспирин Кардио (Aspirin® Cardio)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, растворимой в кишечнике, содержит ацетилсалициловой кислоты 100 или 300 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное.

Показ.: Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда (острый, профилактика повторного), операции (постоперационный период) на сосудах (аортокоронарное шунтирование, чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика); преходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, тромбозы коронарных артерий, мигрени (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим салицилатам), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (стадия обострения), геморрагический диатез.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в последнем триместре беременности, в течение первых 6 мес - только под контролем врача. Во время лактации назначать с осторожностью. При приеме более 300 мг в сутки грудное вскармливание следует прекратить.

Поб. действ.: Болевые ощущения и микрогеморрагии в ЖКТ, тошнота, рвота, диарея, желудочные кровотечения, обострение (и ее возникновение) язвы желудка, мелена, нарушения функций печени и почек, гипогликемия, аллергические реакции (приступы одышки, кожные высыпания, экссудативная мультиформная эритема).

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов (непрямых и гепарина), нестероидных болеутоляющих и противоревматических препаратов, пероральных сахароснижающих средств (производных сульфонилмочевины), метотрексата, сульфаниламидов (включая ко-тримоксазол), трийодтиронина, ослабляет - спиронолактона, канреноата, фуросемида, гипотензивных препаратов, пробенецида, сульфинпиразона. Кортикостероиды и алкоголь повышают риск желудочно-кишечного кровотечения. Увеличивает концентрацию в плазме крови дигоксина, барбитуратов, солей лития.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая большим количеством жидкости; при стенокардии, после операций на сосудах, профилактике нарушений мозгового кровообращения и инсультов рекомендуется 100 мг/сутки (до 300 мг в

день), при остром инфаркте миокарда - 100 мг в сутки (профилактика повторного - 300 мг в сутки); для профилактики тромбозов коронарных артерий и мигрени - 100-200 мг в сутки или по 300 мг через день.

Предост.: С осторожностью (под наблюдением врача) используют при бронхиальной астме (возможна провокация приступа), язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки (рецидивирующая или хроническая), заболеваниях почек и печени в сочетании с антикоагулянтами (исключая малые дозы гепарина), при гиперчувствительности (аллергизации) к НПВС и другим препаратам, при лихорадочных состояниях у детей и подростков (возможно развитие синдрома Рея). Поскольку уменьшается выведение солей мочевой кислоты, у предрасположенных пациентов возможно обострение (приступ) подагры.

Произв.: Bayer (Германия)

Аспирин плюс С (Aspirin® plus C)

Сост. и ф.в.: 1 растворимая таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 400 мг и аскорбиновой кислоты (витамин С) 240 мг; в упаковке 10 или 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное, снижение проницаемости сосудов.

Показ.: Болевой синдром слабой и средней интенсивности (головная и зубная боль, альгодисменорея), лихорадка, тромбофлебит, тромбоз сосудов сетчатки, нарушения мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, гипокоагуляция, портальная гипертензия, венозный застой, поражения почек, бронхиальная астма, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, детский возраст (до 4 лет).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, кровоизлияния в слизистую ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения, тромбоцитопения, бронхоспазм, синдром Рея, аллергические реакции.

Взаим.: Снижает эффект фуросемида и противоподагрических средств. Не сочетать с антикоагулянтами.

Примен. и доз.: Внутрь (растворить в стакане воды) - 1-2 таблетки (до 8 таблеток в сутки); для детей старше 4 лет

разовая доза - 1/2-1 таблетка, суточная - 1-4 таблетки. При нарушении мозгового кровообращения - 0,125-0,3 мг/сутки; при ИБС - 0,3-0,325 мг/сутки в 3 приема.

Произв.: Bayer (Германия)

Аспирин УПСА (Aspirine UPSA)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 быстрорастворимая "шипучая" таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 325 или 500 мг; в упаковке 10 или 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее, антиагрегационное.

Фармакокин.: Быстро резорбируется и подвергается гидролизу в плазме с образованием салициловой кислоты, которая соединяется с белками плазмы, достигая максимальной концентрации в крови через 2-4 ч. $T_{1/2}$ - 3-9 ч и удлиняется с увеличением дозы. Выделяется с мочой в виде конъюгата с глицином.

Показ.: Боль, лихорадка, ревматические заболевания, профилактика тромбозов, тромбоэмболий, инфаркта миокарда и ишемических нарушений мозгового кровообращения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к НПВС, ацетилсалициловой кислоте, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; повышенная склонность к кровотечениям; детский возраст до 4-х лет; третий триместр беременности; одновременное применение НПВС, урикозурических препаратов, не прямых антикоагулянтов.

Поб. действ.: Со стороны ЖКТ в некоторых случаях - тошнота, анорексия, боли в животе, эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка и других отделов ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение; со стороны системы гемостаза - возможен геморрагический синдром (носовое кровотечение, кровоточивость десен, пурпура и др.), удлинение времени тромбообразования; аллергические реакции: крапивница, бронхоспазм, ангионевротический отек, анафилаксия.

Взаим.: Не рекомендуется сочетание с другими нестероидными противовоспалительными средствами, с антикоагулянтами, урикозурическими средствами, гипогликемизирующими препаратами, глюкокортикоидами, тиклопидином, мочегонными, антигипертензивными сред-

ствами, невсасывающимися антацидами, антибиотиками, с интерфероном-альфа.

Примен. и доз.: Внутрь, растворив в стакане воды непосредственно перед употреблением. При болевом синдроме слабой и средней интенсивности и/или лихорадке различного генеза взрослым - разовая доза 0,25-1 г в несколько приемов (но не более 4 г в сутки), при ревматических заболеваниях - по 0,5-2 г в один прием (но не более 6 г в сутки). Детям - по 25-50 мг/кг массы тела в 4-5 приемов с интервалом между приемами не менее 4 ч, максимально допустимая доза - 100 мг/кг в сутки. В возрасте 10-15 лет суточная доза - 1,5-2,5 г; 4-10 лет - 0,8-1,5 г.

Произв.: UPSA (Франция)

Аспирин УПСА с витамином С (Aspirine UPSA with Vitamin C)

Сост. и ф.в.: 1 быстрорастворимая "шипучая" таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 330 мг и аскорбиновой кислоты (витамина С) 200 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное, компенсация дефицита витамина С.

Показ.: Боли, лихорадка, ревматические заболевания, профилактика тромбозов, тромбоэмболий, инфаркта миокарда и ишемических нарушений мозгового кровообращения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к НПВС, ацетилсалициловой кислоте, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; повышенная склонность к кровотечениям; детский возраст до 4-х лет; третий триместр беременности; одновременное применение НПВС, урикозурических препаратов, не прямых антикоагулянтов.

Поб. действ.: Со стороны ЖКТ в некоторых случаях - тошнота, анорексия, боли в животе, эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка и других отделов ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение; со стороны системы гемостаза - возможен геморрагический синдром (носовое кровотечение, кровоточивость десен, пурпура и др.), удлинение времени кровотечения; аллергические реакции: крапивница, бронхоспазм, ангионевротический отек, анафилаксия.

Взаим.: Не рекомендуется сочетание с другими нестероидными противовоспа-

лительными средствами, с антикоагулянтами, урикозурическими средствами, гипогликемизирующими препаратами, глюкокортикоидами, тиклопидином, мочегонными, антигипертензивными средствами, невсасывающимися антацидами, антибиотиками (возможно взаимное усиление эффектов), с интерфероном-альфа.

Примен. и доз.: Внутрь, растворив таблетку в стакане воды непосредственно перед употреблением. При болевом синдроме слабой и средней интенсивности и/или лихорадке различного генеза взрослым - разовая доза 0,25 - 1 г в несколько приемов (но не более 4 г в сутки). При ревматических заболеваниях - по 0,5- 2 г в один прием (но не более 6 г в сутки); детям - по 25 до 50 мг/кг массы тела в 4-5 приемов (с интервалом не менее 4 ч); максимально допустимая доза - 100 мг/кг в сутки. В возрасте 10-15 лет суточная доза - 1,5-2,5 г; 4-10 лет - 0,8-1,5 г.

Произв.: UPSA (Франция)

Аспирин-директ (Aspirin®-direct)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для разжевывания содержит ацетилсалициловой кислоты 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, ингибирование агрегации тромбоцитов.

Показ.: Боли (головная, зубная, невралгия, артралгия, миалгия), простуда, грипп, инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, склонность к кровоизлияниям, нарушение функции почек, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, анорексия, боли в эпигастриальной области, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, скрытые кровотечения ЖКТ, бронхоспазм, анемия, тромбоцитопения, кожная сыпь.

Взаим.: Усиливает эффекты антикоагулянтов, НПВС, производных сульфаниламочевина, нежелательные эффекты метотрексата.

Примен. и доз.: Внутрь, разжевать и проглотить, взрослым - 1-2 таблетки, при необходимости 4-6 раз в день.

Произв.: Bayer (Германия)

Аспифат (Aspifat)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ацетилсалициловой кислоты 100 или 325 мг (ядро таблетки) и сукральфата 200 мг (оболочка); в блистерной упаковке 10 шт., по 2 блистерные упаковки в пачке из картона.

Фарм. действ.: Антиагрегационное (ингибирование циклооксигеназы), гастропротекторное.

Показ.: Тромбоэмболические состояния: тромбоз вен (варикозное расширение, послеоперационный период, длительный постельный режим и др.), тромбоз артерий (особенно при гипертензии, атеросклерозе, диабете, злостном курении, малоподвижном образе жизни); тромбоэмболии после операций (включая протезирование) на сосудах или сердце; коронарный тромбоз с инфарктом миокарда; профилактика повторных инфарктов миокарда; транзиторные ишемические инсульты мозга.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Ацетилсалициловая кислота: тошнота, диспепсия, рвота, образование эрозий и язв ЖКТ, кровотечение в ЖКТ, мелена, гипокоагуляция, головокружение, шум в ушах, глухота, аллергические реакции (бронхоспазм, крапивница, ангионевротический отек); Сукральфат: запоры.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая. Средняя доза для профилактики тромбозов и повторных инфарктов миокарда - 1 таблетка в день; при тромбоэмболических состояниях - 3 таблетки в день. При необходимости (в зависимости от тяжести состояния) дозу можно увеличивать.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Аспро® витамин С (Aspro® Vitamine C)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит ацетилсалициловой кислоты 500 или 320 мг и аскорбиновой кислоты 300 или 200 мг соответственно; в упаковке 12 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное, восполнение дефицита витамина С.

Показ.: Лихорадка и боли при простудных заболеваниях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, склонность к кровотечениям, тяжелые нарушения функции печени и почек, желудочно-кишечные кровотечения, почечнокаменная болезнь с окса-

лурией при кислом и нормальном значении рН мочи, беременность (последний триместр), детский возраст (до 4 лет).

Поб. действ.: Шум в ушах и снижение остроты слуха, головные боли, кровотечения (в т.ч. желудочно-кишечные), нарушения сердечно-сосудистой деятельности, боли в области желудка, изжога, ulcerация ЖКТ, аллергические реакции (отек, крапивница, астма).

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов (кумаринов, гепарина), гипогликемическое действие производных сульфаниламочевина, побочные эффекты метотрексата и противовоспалительных препаратов. Возможно ослабление действия некоторых НПВС, урикозурических (пробенецида, сульфипиразона) и диуретических (спиронолактона, фуросемида) средств.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 2-3 раза в день, высшая суточная доза - 6 таблеток. Детям от 4 до 7 лет - по 1/2 таблетки до 3 раз в день (высшая суточная доза - 1,5 таблетки), от 8 до 11 лет - по 1/2 таблетки до 4 раз в день (высшая суточная доза - 2 таблетки), от 12 до 15 лет - по 1 таблетке до 4 раз в день (высшая суточная доза - 4 таблетки). Курс лечения - 3-5 дней. Замечание для диабетиков: 1 таблетка содержит 118 мг маннита.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Аспро® С форте (Aspro® C forte)

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с гранулятом для приготовления шипучего напитка содержит ацетилсалициловой кислоты 500 мг и аскорбиновой кислоты 300 мг; в упаковке 10 или 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное, восполнение дефицита витамина С.

Показ.: Лихорадка и боли при простудных заболеваниях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, склонность к кровотечениям, тяжелые нарушения функции печени и почек, желудочно-кишечные кровотечения, почечнокаменная болезнь с оксалурией при кислом и нормальном значении рН мочи, беременность (последний триместр), детский возраст (до 4 лет).

Поб. действ.: Шум в ушах и снижение остроты слуха, головные боли, кровотечения (в т.ч. желудочно-кишечные), нарушения сердечно-сосудистой деятельности, боли в области желудка, изжога,

ульцерация ЖКТ, аллергические реакции (отек, крапивница, астма).

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов (кумаринов, гепарина), гипогликемическое действие производных сульфаниламочевина, побочные эффекты метотрексата и противовоспалительных препаратов. Возможно ослабление действия некоторых НПВС, урикозурических (пробенецида, сульфипиразона) и диуретических (спиронолактона, фуросемида) средств.

Примен. и доз.: Взрослым - по 1-2 пакетика шипучего гранулята на прием, высшая суточная доза - 6 пакетиков. Детям от 4 до 7 лет - по 1/2 пакетика гранулята до 3 раз в день, высшая суточная доза - 1,5 пакетика. Детям от 8 до 11 лет - по 1/2 пакетика до 4 раз в день, высшая суточная доза - 2 пакетика гранулята. Детям от 12 до 15 лет - по 1 пакетик до 4 раз в день, высшая суточная доза - 4 пакетика. Курс - 3-5 дней. Замечание для диабетиков: 1 пакетик шипучего гранулята содержит 1,727 г сахарозы.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Атаракс® (Atarax®)

Гидроксизин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит гидроксизина гидрохлорида 10 мг, в упаковке 25 шт. или 25 мг, в упаковке 10 и 25 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 100 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, седативное, миорелаксирующее, противорвотное, анальгезирующее, антигистаминное, противозудное.

Показ.: Возбудимость и напряжение, связанные с психоневротическими состояниями, органические заболевания, сопровождающиеся повышенной возбудимостью (в качестве дополнительного средства); премедикация перед наркозом, в ходе и после общей анестезии; атопический (зудящий) дерматит; купирование ажитации и эмоциональных расстройств у психических и кардиологических больных; острый и хронический алкоголизм с симптомами возбуждения при абстиненции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая форма порфирии, беременность, лактация, период родовой деятельности; риск острой глаукомы и задержка мочеиспускания при заболеваниях простаты, связанные с антихолинергическим действием.

Поб. действ.: Сонливость, слабость (особенно в начале лечения, для устранения следует снизить дозу); сухость во рту, тремор и судороги (при передозировке), головная боль, головокружение. очень редко - спутанность сознания.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м (в область крупных мышц). Дозу подбирают индивидуально (в зависимости от реакции больного). Взрослым в общей практике - по 25-100 мг в несколько приемов в течение дня или на ночь; в психиатрии - по 100-300 мг в день; в анестезиологии - по 100-200 мг в день, для премедикации - в ночь перед хирургическим вмешательством. Для кратковременного эффекта применяют половинную дозу. В/м введение особенно показано для экстренной терапии.

Предост.: Необходимо постоянное врачебное наблюдение больных с почечной недостаточностью. Следует воздержаться от управления автомобилем или механизмами. Раствор для инъекций можно вводить только в/м (во избежание значительных повреждений тканей при п/к, в/в или в/а введении).

Произв.: UCB (Бельгия)

Атенобене (Atenobene®)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит атенолола 50 или 100 мг; в упаковке по 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное и антиаритмическое, блокада бета1-рецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия (профилактика приступов), синусовая тахикардия, наджелудочковые тахиаритмии (профилактика), гиперкинетический кардиальный синдром функционального генеза.

Противопоказ.: АВ-блокада II, III степени, синоаурикулярная блокада, брадикардия, синдром слабости синусового узла, артериальная гипотония, хроническая сердечная недостаточность IIБ-III стадии, острая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз, бронхиальная астма.

Поб. действ.: Усталость, головокружение, депрессия, головная боль, усиленное потоотделение, нарушение сна, тошнота, запоры, диарея, ощущение холода и парестезии в конечностях, снижение реакционной способности, симптомы бронхиальной обструкции, брадикардия, гипотония, нарушение АВ-проводимости, появление симптомов сердечной недостаточности, уменьшение секреции

слюны и слезной жидкости, конъюнктивит, снижение потенции, гипогликемия (у больных с сахарным диабетом), покраснение кожи, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости. При артериальной гипертензии назначают в начальной дозе по 50 мг 1 раз в сутки, при недостаточной выраженности гипотензивного эффекта дозу постепенно увеличивают до 200 мг в сутки в 1-2 приема. При стенокардии, нарушениях сердечного ритма назначают в начальной дозе по 50 мг 1 раз в сутки; при недостаточной выраженности эффекта дозу увеличивают до 100-150 мг в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг. При гиперкинетическом кардиальном синдроме функционального генеза назначают по 25 мг 1 раз в сутки.

Произв.: Merckle (Германия)

Атенолан (Atenolan®)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с пленочной оболочкой содержит атенолола 50 или 100 мг; в упаковке 20 или 50 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, антиангинальное, антиаритмическое, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, синусовая тахикардия, профилактика приступов стенокардии и наджелудочковых тахикардий; нейроциркуляторная дистония (по гипертоническому типу).

Противопоказ.: AV- и синоаурикулярная блокада, синдром слабости синусового узла, хроническая сердечная недостаточность IIБ и III стадии, острая сердечная недостаточность, кардиогенный шок, артериальная гипотония, выраженная брадикардия, бронхиальная астма, метаболический ацидоз.

Поб. действ.: Брадикардия, нарушения AV-проводимости, симптомы сердечной недостаточности, артериальная гипотония, усталость, подавленность, головокружение, головная боль, нарушения сна, снижение реакционной способности, парестезии, судороги мышц, мышечная слабость, снижение либидо, сухость во рту, тошнота, запоры или диарея, усиленное потоотделение, одышка, бронхоспазм, покраснение кожи, зуд, обострение течения псориаза, гипогликемические состояния (у больных сахарным диабетом), снижение секреции слезной жидкости, конъюнктивит.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, начиная с 50 мг 1 раз в день, затем дозу можно постепенно повышать до 100-200 мг в сутки за 1-2 приема.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Атенолол (Atenolol)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит атенолола 50 или 100 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: ИБС, гипертоническая болезнь, стенокардия, синусовая тахикардия.

Противопоказ.: Сердечная недостаточность, AV-блокада II-III степени, брадикардия, гипотония, бронхиальная астма, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Брадикардия, гипотония, головная боль, головокружение, нарушения сна, депрессия, диспептические расстройства, усиление потоотделения, сердечная недостаточность, гипогликемия, снижение потенции.

Взаим.: Усиливает эффект инсулина, пероральных сахаропонижающих и антигипертензивных средств. Брадикардию повышают резерпин, альфа-метилдопа, клонидин, верапамил.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50-100 мг в сутки. Людям пожилого возраста доза может быть уменьшена (особенно при почечной недостаточности).

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Атеносан (Atenosan)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит атенолола 50 или 100 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертония, стенокардия (профилактика приступов), синусовая тахикардия, наджелудочковая тахикардия (профилактика), гиперкинетический кардиальный синдром функционального генеза.

Противопоказ.: AV-блокада II и III степени, синоатриальная блокада, брадикардия, синдром слабости синусового узла, артериальная гипотония, хроническая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз, бронхиальная астма.

Поб. действ.: Слабость, головокружение, депрессия, нарушение сна, снижение реакционной способности, тошнота, запоры, диарея, ощущение холода и парестезии в конечностях, брадикардия, гипотония, нарушение AV-проводимости, сердечная недостаточность, симптомы бронхиальной обструкции, уменьшение секреции слезной жидкости, конъюнктивит, снижение потенции, гипогликемия, покраснение кожи, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, запивая большим количеством жидкости, при артериальной гипертензии и нарушении сердечного ритма - от 50 до 200 мг 1 или 2 раза в сутки. При гиперкинетическом кардиальном синдроме - по 25 мг 1 раз в день.

Предост.: Контроль за функцией почек.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Ауробин (Aurobin)

Сост. и ф.в.: 1 тубик (20 г) содержит 40 мг преднизолона капроната, 400 мг лидокаина гидрохлорида, 400 мг d-пантенола и 20 мг триклозана в мазевой основе.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное, анальгетическое, способствующее регенерации эпителия, антисептическое.

Показ.: Зуд заднепроходного отверстия, экзема, дерматит перианальной области, геморрой, свищ заднепроходного отверстия, анопапиллит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, вирусная инфекция.

Поб. действ.: Атрофия кожи, стрии, местный гипертрихоз (в редких случаях); системные реакции, характерные для глюкокортикостероидов (при длительном применении и/или нанесении на большие поверхности кожи); брадикардия.

Примен. и доз.: Накожно, на пораженную область наносят тонкий слой мази 2-4 раза в сутки. При внутренних геморроидальных узлах небольшое количество мази вводят в прямую кишку. После уменьшения выраженности симптомов мазь применяют 1-2 раза в сутки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Аурорикс (Aurorix®)

Моклобемид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит моклобемид 100 или 150 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, повышение психомоторной активности, обратимое ингибирование моноаминоксидазы А.

Показ.: Депрессивные синдромы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острое нарушение сознания, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Расстройство сна, жажда, тревога, раздражительность, головокружение, головная боль, парестезии, расстройство зрения, сухость во рту, желудочно-кишечные нарушения, кожные реакции (сыпь, зуд, крапивница, приливы), признаки спутанности сознания (быстро исчезают после отмены препарата).

Взаим.: Усиливает и пролонгирует эффект симпатомиметиков и, возможно, опиатов. Увеличивает вероятность тяжелых реакций со стороны ЦНС при сочетании с петидином, кломипрамином. Циметидин замедляет биотрансформацию.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - 300-600 мг в 2-3 приема. Начальная суточная доза - 300 мг, при тяжелых депрессиях может быть увеличена - до 600 мг. Повышение дозы производится не ранее, чем через 1 нед после начала лечения. При получении клинического эффекта дозу снижают.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Афлубин (Aflubin®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Gentiana D1 1 мл, Aconitum D6 10 мл, Bryonia D6 10 мл, Ferrum phosphoricum D12 10 мл, Acidum sarcolacticum D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, иммуностимулирующее.

Показ.: Грипп, парагриппозные и простудные заболевания верхних дыхательных путей, воспалительные и ревматические заболевания с болями в суставах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза в день, взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года - по 1-3 капли, разведенных в 1 чайной ложке воды или молока; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой

ложке воды. В начале заболевания принимать каждые 0,5-1 ч: взрослым и подросткам - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли; детям до 1 года - по 1 капле до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Произв.: Bittner (Австрия)

Африн (Afrin®)

Оксиметазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для интраназального применения содержит оксиметазолина гидрохлорида 0,5 мг; в аэрозольных баллонах по 20 мл.

1 мл глазных капель - 0,25 мг; в пластиковых бутылочках дозаторах по 10 мл.

Фарм. действ.: Вазоконстрикторное, альфа-адреностимулирующее, антиконгестивное.

Показ.: Спрей: отечность слизистой носа при простудных заболеваниях, синуситах, сенной лихорадке и других респираторных аллергиях. Глазные капли: конъюнктивальная гиперемия и отечность при аллергических и неинфекционных конъюнктивитах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нелеченная закрытоугольная глаукома (глазные капли); возраст до 6 лет.

Бер. и корм. гр.: Безопасность и эффективность применения глазных капель у беременных и кормящих женщин не исследовалась.

Поб. действ.: Спрей: жжение, раздражение, чихание, увеличение отделяемого из носа. Глазные капли: раздражение глаза, ретракция века.

Примен. и доз.: Интраназальный раствор: взрослым и детям старше 6 лет назначают по 2-3 капли в каждую ноздрю 2 раза в день (утром и вечером). Длительность лечения - не более 3 дней. Глазные капли: взрослым и детям старше 6 лет закапывают по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в день. Курс - 7-10 дней.

Предост.: Спрей предназначен для индивидуального использования (риск распространения инфекции). Глазные капли: нельзя касаться дозатором глаза или любой другой поверхности. Использование одного дозатора несколькими лицами может способствовать распространению инфекции. Перед закапыванием глазных капель мягкие контактные линзы рекомендуется снимать. Не следует использовать раствор для закапывания в глаза, если он изменил цвет или помутнел.

Произв.: Schering-Plough (США)

Ацекор (Асесор)

Ацебутолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацебутолола 200 или 400 мг; в упаковке 20 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Гипертензия, острая и хроническая коронарная недостаточность, нарушения ритма сердца, обусловленные избыточной стимуляцией симпатической нервной системы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхиальная астма, тяжелые заболевания почек, сердечная недостаточность, брадикардия, нарушение АВ или внутрижелудочковой проводимости.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, диспептические расстройства, астения, нарушение сна.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, с наркотическими галогенсодержащими средствами (усиливается отрицательный инотропный эффект). Ускоряет опустошение катехоламиновых депо на фоне симпатолитиков (резерпин).

Примен. и доз.: Внутрь по 400-600 мг в день (1 таблетка каждые 8-12 ч); предпочтительно перед едой.

Предост.: С осторожностью назначают при низком АД (следует периодически контролировать появление симптомов сердечной недостаточности), сахарном диабете, в сочетании с резерпином. Прекращать лечение необходимо постепенно.

Произв.: CSC (Италия)

Аценозин (Acenosin)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит дигидроэргокристина 0,5 мг, резерпина 0,1 мг и клопамида 5 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, вазодилатирующее (блокада альфа-адренорецепторов сосудов), снижение общего периферического сосудистого сопротивления, диуретическое (выведение ионов натрия, хлора, калия и воды).

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, депрессия, паркинсонизм, тяжелые формы стенокардии и аритмий, недавно перенесенный инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, язвенный колит, нарушения функции печени и почек, феохромоцитома, заболе-

вания крови, гипокалиемия, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гипокалиемия, гипонатриемия, заложенность носа, депрессия, ортостатическая гипотония, мышечная слабость, гиперурикемия, гипергликемия, аллергические реакции; при длительном применении высоких доз - парестезии, импотенция, гинекомастия, нарушения зрения и мочеиспускания.

Взаим.: Ослабляет эффективность пероральных гипогликемических препаратов, трициклических антидепрессантов, антикоагулянтов. Гипотензию усиливают барбитураты и алкоголь. Глюкокортикостероиды и слабительные средства повышают риск развития гипокалиемии.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже в сутки (утром), при недостаточно выраженном гипотензивном эффекте - по 2 драже в сутки в 2 приема, при стабилизации эффекта - поддерживающая доза - 1 драже ежедневно или через день.

Предост.: С осторожностью назначают при сахарном диабете, подагре, бронхообструктивном синдроме. Необходимо иметь в виду, что снижается скорость реакции. Рекомендуются диета с повышенным содержанием калия (обязателен его контроль в крови). Не следует одновременно использовать ингибиторы МАО, леводопу, ацетазоламид.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Ацесал (Acesal®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 500 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Жаропонижающее, противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Лихорадочные состояния, боли (головные, зубные, суставные, мышечные и др.), ревматические заболевания, профилактика тромбозов (особенно при уже имеющейся предрасположенности) и инфаркта миокарда.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения функции почек, бронхиальная астма, геморрагический диатез, беременность, лактация, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, повышение уровня мочевой кислоты.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, в редких случаях скрытые желудочно-кишечные кровотечения, аллергические реакции, снижение метаболизма

мочевой кислоты (подагрический приступ у предрасположенных больных); при длительном применении возможны головная боль, головокружение, шум в ушах, расстройства зрения, сонливость, железодефицитная анемия, тромбоцитопения, нарушения водно-солевого обмена; почечная недостаточность (особенно в комбинации с болеутоляющими средствами).

Взаим.: Усиливает действие антикоагулянтов, препаратов сульфаниламидов, НПВС, снижает действие диуретиков, урикозурических препаратов. Ульцерогенное действие потенцируют кофеин, алкоголь, ослабляют - циметидин, антациды, глюкагон.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды, запивая водой, при ревматических заболеваниях доза может быть повышена до 10 таблеток в сутки. Максимальная суточная доза для детей - 13 мг/кг массы тела.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Ацетаминофен (Acetaminophen)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит парацетамола 500 мг; в упаковке 12 и 30 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное.

Показ.: Болевой (головная и зубная боль, боль при травмах, мигрень, дисальгоменорея, невралгия) и лихорадочный синдромы, воспалительные процессы, грипп.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная печечно-почечная недостаточность, анемия, детский возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Применять с осторожностью.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 500 мг 3-4 раза в сутки (но не более 4 г в сутки).

Произв.: Unipharm (США)

Ацетилсалициловая кислота (Acidum acetylsalicylicum)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 100, 250 и 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное.

Показ.: Воспалительные заболевания, ревматизм, болевой синдром, профилактика тромбозов, гипертермия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, желудочно-кишечные кровотечения, портальная гипертензия, венозный застой, гиперкоагулянтные синдромы. Дети до 12 лет (грипп и ветряная оспа).

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, шум в ушах, слабость, тошнота, анорексия, боли в эпигастрии, диарея, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, кровотечения из ЖКТ, нарушение функции печени и почек, анемия, тромбоцитопения, аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке, бронхоспазм).

Взаим.: Потенцирует эффект антикоагулянтов, ulcerогенное действие кортикостероидов, НПВС, резерпина.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая водой, молоком, щелочными минеральными водами, - по 250, 500 или 1000 мг 3-4 раза в день. Детям - по 50-200 мг на прием 3-4 раза в день. Разовая доза для детей 1 года - 50 мг, 2-х лет - 100 мг, 3-х лет - 150 мг, 4-х лет - 200 мг, начиная с 5 лет - 250 мг. Суточная доза - 200 мг на 1 год жизни.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия)

Ацетилцистеин (Acetylcysteinum)

Ацетилцистеин*

Сост. и ф.в.: Ампула содержит 5 мл 20% раствора для ингаляций (ацетилцистеин 1 г).

Фарм. действ.: Отхаркивающее (разжижение мокроты и увеличение ее объема), муколитическое (разрушение дисульфидных связей кислых мукополисахаридов).

Показ.: Затрудненное отделение мокроты (бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь), бронхиальная астма, муковисцидоз легких; осложнения при операциях на органах дыхания (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхиальная астма с нормальным отхождением мокроты.

Поб. действ.: Тошнота.

Взаим.: Фармацевтически несовместим с антибиотиками и протеолитическими

ферментами, с металлами, резиной (образуются сульфиды с характерным запахом - необходимо пользоваться стеклянной посудой).

Примен. и доз.: Ингаляционно, по 2-5 мл 20% раствора в течение 15-20 мин.

Произв.: Кальцекс (Латвия)

Ацетомепрегенол (Acetomepraegenolum)

Ацетомепрегенол

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетомепрегена 0,5 мг; в упаковке 10 или 30 шт.

Фарм. действ.: Гестагенное.

Показ.: Привычные и угрожающие выкидыши в первом триместре беременности, нарушения менструального цикла, контрацепция.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, холестаза, гиперкоагуляция, новообразования.

Поб. действ.: Тошнота, головная боль, нагрубание молочных желез.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. При угрожающем выкидыше - 0,5-1 мг 1-3 раза в день в течение 7-10 дней. При привычном выкидыше - 0,5-2 мг в течение 1-2 мес (курс 30-60 мг). При дисфункциональных маточных кровотечениях - 0,5-2,5 мг/сутки с 15-го по 24-й день цикла. Для контрацепции - 0,5 мг на ночь (в течение не более 1 года).

Произв.: Биореактор (Россия)

Ацидекс (Acidex)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ранитидина 150 или 300 мг.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение кислотопродукции, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона, эрозивный и рефлюкс-эзофагит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, детский возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, алоpecia (очень редко), тромбоцитопения, кожная сыпь.

Взаим.: Антациды могут вызвать нарушение абсорбции (при совместном назначении интервал между их приемом должен быть не менее 1-2 ч).

Примен. и доз.: Внутрь, по 150-300 мг 1-2 раза в день; курс - 4-8 нед.

Предост.: Перед началом лечения необходимо исключить злокачественные заболевания пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки. Отмену препарата следует проводить постепенно.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Ацикловир (Acyclovir)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: Крем содержит 5% ацикловира; в тубиках по 10 и 15 г.

Фарм. действ.: Противовирусное, противогерпетическое.

Показ.: Герпетические поражения кожи и слизистых оболочек, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местно - кратковременное жжение, эритемы, сухость, шелушение кожных покровов.

Примен. и доз.: Местно, наносят на пораженную поверхность 5-6 раз в день (каждые 3-4 ч) на протяжении 5-10 дней.

Предост.: Во избежание местного раздражения не рекомендуется наносить на слизистую оболочку полости рта, глаз; с осторожностью - на слизистую половых органов.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Ацикловир® (Acyclovir®)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацикловира 400 или 800 мг; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Показ.: Инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусом простого герпеса, опоясывающий герпес, ветряная оспа, профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса у больных со сниженным иммунитетом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Допустимо в случае, если ожидаемый эффект лечения превосходит потенциальный риск для плода.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, диарея, лейкопения, тромбоцитопения, повышение уровней мочевины, креатинина, трансаминаз и билирубина, гематурия, кристаллурия, кожная сыпь.

Взаим.: Циклоспорин, меперидин и зидовудин усиливают нефротоксический эффект. Пробенецид уменьшает почеч-

ный клиренс ацикловира (увеличивает $T_{1/2}$).

Передоз.: Проявляется симптомами поражения почек (повышение уровней мочевины крови и креатинина), обратимой почечной недостаточностью, клиническими признаками энцефалопатии. Лечение: гемодиализ.

Примен. и доз.: Внутрь. При инфекциях, вызванных вирусом простого герпеса, - по 200 мг каждые 4 ч 5 раз в сутки. Курс лечения - 5-10 дней; при ректальной герпетической инфекции - по 400 мг пятикратно в течение 10 дней; при опоясывающем герпесе (на фоне нормального иммунного статуса) - по 800 мг каждые 4 ч 5 раз в день в течение 7-10 дней; при ветряной оспе - по 200 мг/кг (но не более 800 мг) 4 раза в день в течение 5 дней; для профилактики рецидивов генитальной герпетической инфекции - по 200 мг 2-5 раз в день или 400 мг 2 раза в день. Пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина больше 10 мл/мин) при генитальном герпесе - по 200 мг каждые 4 ч 5 раз в сутки, для профилактики - 400 мг каждые 12 ч, при опоясывающем герпесе - по 800 мг каждые 8 ч. С клиренсом креатинина (0-10 мл/мин): при генитальном герпесе и для профилактики - по 200 мг каждые 12 ч; при опоясывающем герпесе - по 800 мг каждые 8 ч (с клиренсом креатинина больше 25 мл/мин - по 800 мг каждые 4 ч). Режим дозирования для детей старше 2 лет тот же, что и для взрослых.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, принимающим нефротоксические препараты (в т.ч. на фоне почечной недостаточности), - высок риск развития реверсивной нефропатии и почечной дисфункции, а также пожилым людям - увеличенная вероятность побочных явлений. Признаки нефропатии требуют отмены препарата. Пациентам, использующим гемодиализ, необходим контроль за концентрацией ацикловира в плазме крови.

Произв.: Lek (Словения)

Ацикловир-Акри® (Aciclovir-Akri)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацикловира 0,2 г; в упаковке по 20 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Показ.: Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (типа 1, 2), включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес; профилактика инфекций кожи и слизистых оболочек, вызван-

ных вирусом простого герпеса у больных с нарушением иммунной системы; первичные и рецидивирующие инфекции, вызванные вирусом опоясывающего лишая.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, головная боль, повышенная утомляемость, сонливость, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, - по 0,2 г 5 раз в сутки; для профилактики - по 0,2 г 4 раза в сутки. Инфекции, вызванные вирусом опоясывающего лишая, - по 0,8 г 5 раз в сутки. Детям до 2 лет - половину дозы взрослых.

Предост.: При беременности и кормлении грудью назначают только в случае инфекций, представляющих угрозу для жизни.

Произв.: Акрихин (Россия)

Ацикловир-Акри® мазь (Unguentum Aciclovir-Akri)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит ацикловира 0,05 г; в тубах по 5 г.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Показ.: Инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусом простого герпеса (типа 1, 2), включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес, и вирусом опоясывающего лишая.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Эритема, жжение, сухость и шелушение кожи.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженное место сразу после появления первых признаков заболевания 5 раз в сутки (каждые 4 ч) в течение 5-10 дней.

Произв.: Акрихин (Россия)

Ацилпирин (Acylpyrin®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или 1 шипучая водорастворимая таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 500 мг; в упаковке 10 и 15 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, противоревматическое.

Фармакокин.: Максимальный уровень в крови достигается через 2 ч после введения. Период полуэлиминации - 2,5-8,5 ч - значительно зависит от дозы и pH

мочи (при большой дозе удлиняется до 16-19 ч). Выделяется в основном с мочой, большей частью в форме салициловой кислоты и ее конъюгатов.

Показ.: Боли различного генеза (воспалительные, ревматические) и локализации (головные, суставные, мышечные, зубные, боли в позвоночнике, невралгии и др.); гипертермия при острых респираторных заболеваниях гриппозного характера.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, геморрагический диатез, хирургические вмешательства (сопряженные со значительным кровотечением), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, подагра.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности (проникает через плацентарный барьер) и при лактации (поступает в материнское молоко) принимать лишь коротковременно.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, скрытые кровотечения (в том числе в ЖКТ), гипохромная анемия, нарушения кроветворения, поражения печени, некроз паренхимы почек, синдром Рейе у детей, "аспириновая" астма, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов, метотрексата, барбитуратов, пероральных антидиабетических средств, сульфонамидов, пенициллинов, тетрациклинов, кортикостероидов и пиразолонов (ульцерогенный), повышает плазматические уровни антидепрессантов; снижает действие сульфипиразона, спиронолактона, уровень нестероидных противовоспалительных средств. Замедляет всасывание гистамино- и холинолитиков, наркотических анальгетиков, хлорамфеникола и др. (необходимы паузы 2-3 ч между приемом внутрь этих лекарств). Антациды, антикоагулянты увеличивают действие ацилпирина; барбитураты, кортикостероиды, холестирамин и др. - ослабляют. Несовместим с алкоголем.

Передоз.: Основным признаком интоксикации является гипервентиляция (дыхание Куссмауля).

Примен. и доз.: Внутрь, во время или сразу после еды, по 1-2 таблетки (рекомендуется растворять в небольшом количестве воды) 2-3 раза в день (но не более 6 г в сутки). Детям назначают в исключительных случаях: от 1 до 6 лет - по 150-250 мг; от 6 до 15 лет - по 250-500 мг 3 раза в день. В острой стадии ревматизма - по 100 мг/кг в сутки в 5-6 приемов. Противовоспалительные дозы - 3-6 г в сутки (кратковременно).

Предост.: При длительном применении необходимо контролировать клеточный состав крови и иметь ввиду возможность возникновения скрытого кровотечения из ЖКТ. При назначении больным, для которых избыток ионов натрия противопоказан, следует учитывать наличие натрия в составе шипучих таблеток.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Ацифеин (Acifein®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 250 мг, парацетамола 200 мг и кофеина 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное.

Показ.: Боли (головная, мышечная, зубная, суставная), невралгии, лихорадочные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, геморрагический диатез, хирургические вмешательства, сопровождающиеся обильным кровотечением, язвенная болезнь, бронхиальная астма, заболевания почек, подагра.

Бер. и корм. гр.: При беременности и лактации назначать с осторожностью, кратковременно.

Поб. действ.: Диспептические явления, головокружение, повышенная кровоточивость, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов и противодиабетических средств, ulcerогенное действие глюкокортикостероидов и пиразолонов.

Примен. и доз.: Внутрь по 1-3 (до 6) таблетки в сутки во время или после еды, растворив таблетку в небольшом количестве жидкости.

Предост.: Не рекомендуется назначать детям.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Аэровит (Aerovitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола ацетата 0,0027 г, тиамина бромид 0,00258 г, рибофлавина нуклеотида 0,002 г, пиридоксина гидрохлорида 0,01 г, цианокобаламина 0,000025 г, аскорбиновой кислоты 0,1 г, токоферола ацетата 0,02 г, никотинамида 0,015 г, рутина 0,05 г, фолиевой кислоты 0,0002 г и пантотената кальция 0,01 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение поливитаминовой недостаточности.

Показ.: Гиповитаминоз, витаминизация рациона питания лиц, подвергающихся воздействию экстремальных факторов

(укачивание, вибрация, шум, низкое барометрическое давление, перегрузки, действие УВЧ).

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки, при длительной нагрузке и пониженной витаминной ценности питания - до 2 таблеток в день в течение длительного времени.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Аятин (Ajatin®)

Бензододециния бромид

Сост. и ф.в.: В 100 мл спиртовой настойки содержится бензододециния бромида 1 г; во флаконах по 50 и 1000 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, антисептическое, дезинфицирующее.

Показ.: Обработка операционного поля и ран.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сыпь.

Примен. и доз.: Наружно. Тщательно протереть кожу хорошо смоченным тампоном, подождать до полного высыхания настойки.

Предост.: Цветной компонент препарата прочно окрашивает пластмассы и волокна. С кожи легко удаляется бензин-алкоголем.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Бактисубтил (Bactisubtil)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит не менее 1 млрд. чистой сухой культуры бациллы штамма IP 5832 с вегетативными спорами; в упаковке 16 шт.

Фарм. действ.: Нормализация флоры кишечника.

Показ.: Острая и хроническая диарея различного генеза (включая инфекционную), кишечный дисбактериоз, энтериты, энтероколиты, профилактика и лечение нарушений функции кишечника, вызванных химио- или радиотерапией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, при острых заболеваниях - по 1 капсуле 3-6 раз в сутки, в тяжелых случаях - ударная доза до 10 капсул в сутки; при хронических заболеваниях - по 1 капсуле 2-3 раза в сутки. Препарат следует принимать за 1 ч до еды. Для применения препарата у грудных детей и детей до 3 лет, а также в случаях, когда у пациентов затруднено проглатывание капсулы, ее следует вскрыть и смешать содержимое с неболь-

шим количеством сока, молока, воды; препарат нельзя запивать горячими напитками, не следует принимать одновременно с алкоголем.

Произв.: Marion Merrell Dow (США)

Бактрим (Bactrim)

Ко-тримоксазол

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триметоприма 80 мг и сульфаметоксазола 400 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

1 таблетка для детей - 20 и 100 мг соответственно; в упаковке 20 шт.

5 мл суспензии для приема внутрь - 40 и 200 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, угнетение биосинтеза и активации фолиевой кислоты.

Показ.: Инфекции дыхательных (бронхит, бронхоэктазия, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема, тонзиллит, синусит, фарингит) и мочевых (цистит, пиелит, пиелонефрит, уретрит) путей, ЖКТ, кожи; хирургические инфекции, септицемия, сепсис, гнойный менингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. сульфаниламидам), тяжелые заболевания сердца и почек, паренхиматозные поражения печени, выраженные нарушения гемопоэза, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, утром и вечером после еды, для взрослых и детей старше 12 лет - 2 таблетки 2 раза в день. Минимальная суточная доза и доза для длительной терапии (свыше 14 дней) - 1 таблетка 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 3 таблетки 2 раза в день. Таблетки для детей и суспензия: детям 6 нед-5 мес - половина чайной ложки (2,5 мл) 2 раза в день; 6 мес-5 лет - 1 чайная ложка (5 мл) 2 раза в день; 2-5 лет - 2 детские таблетки 2 раза в день, 6-12 лет - 2 чайные ложки (10 мл) 2 раза в день или 4 детские таблетки 2 раза в день.

Предост.: Не следует назначать недоношенным детям и новорожденным в первые 6 нед жизни. Рекомендуются регулярное наблюдение за картиной крови.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Бальзамический линимент по А.В.Вишневскому (Linimentum balsamicum Wishnevsky)

Сост. и ф.в.: Линимент, содержащий дегтя 3 части, ксероформа 3 части и масла касторового 94 части; во флаконах по 100 г и тубах по 35 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, ускорение регенерации, раздражение (слабое) кожных рецепторов.

Показ.: Лечение язв, ран, пролежней.

Примен. и доз.: Наружно.

Произв.: Московская фармфабрика (Россия)

Банеоцин (Baneocin®)

Сост. и ф.в.: 1 г порошка или мази содержит бацитрацина цинка 250 МЕ и неомицина сульфата 5000 МЕ (5 мг); порошок во флаконах-дозаторах по 10 г, мазь в тубах по 20 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции кожи, вторичные бактериальные инфекции при ожогах, экземе, дерматозах, варикозной язве, травмах, пупочные инфекции, наружный отит, опоясывающий лишай и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции сердца или почек, поражения слухового нерва, беременность, лактация.

Поб. действ.: Нарушение вестибулярной функции, поражение слухового нерва, почек, нервно-мышечная блокада, покраснение и сухость кожи, аллергические реакции.

Взаим.: Не сочетать с цефалоспоридами, аминогликозидами, некоторыми диуретиками (потенцирование ото- и/или нефротоксичности), наркозными средствами, анестетиками и миорелаксантами (потенцирование нервно-мышечной блокады).

Примен. и доз.: Местно, 2-3 раза в сутки (но не более 1 г) в течение 7 дней; при обширных ожогах (более 20% поверхности тела) порошок наносят 1 раз в день.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Барнетил® (Barnetil®)

Сультоприд*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл инъекционного раствора содержит сультоприда (гидрохлорида) 200 мг; в упаковке 6 шт.

1 делимая таблетка - 400 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, анальгезирующее.

Показ.: Острые и хронические психозы (тревога, нарушение сознания, мания, бред); купирование агрессивности и возбуждения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, брадикардия (менее 65 ударов в мин), подозрение на феохромоцитому; гипокалиемия, лактация (раствор для инъекций).

Поб. действ.: Аритмии, пароксизмальная тахикардия, заторможенность, сонливость, дискинезии, экстрапирамидные расстройства, ортостатическая гипотония, гиперпролактинемия, аменорея, галакторея, гинекомастия, импотенция, фригидность, увеличение массы тела, злокачественный нейролептический синдром (гипертермия, бледность, вегетативные расстройства).

Взаим.: Несовместим с препаратами, снижающими ЧСС или проводимость, средствами, вызывающими или усиливающими приступы пароксизмальной тахикардии, трициклическими антидепрессантами, алкоголем.

Примен. и доз.: В/м, при маниакальных состояниях - по 400-1200 мг/сутки в несколько введений в течение 1-2 нед, максимальная суточная доза - 1600 мг. Внутрь, по 400-1600 мг/сутки, по 1 таблетке на прием, при улучшении состояния дозу снижают - до 400-600 мг/сутки (при необходимости лечение продолжают малыми дозами). Для купирования возбуждения - в/м - 400-800 мг/сутки. Препарат предназначен только для стационарного использования.

Предост.: С осторожностью назначают больным с эпилепсией, паркинсонизмом, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью, пожилым и новорожденным, при беременности; у работающих с техникой, транспортными средствами. Желательно избегать совместного применения с леводопой, фенотиазинами; осторожно сочетать с гипотензивными и угнетающими ЦНС средствами.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Бассадо (Bassado)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит доксициклина гиклата 115,4 мг, что соответствует 100 мг доксициклина основания (Европ. Фармакопея II изд. (1986)); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактериостатическое.

Показ.: Острый и хронический бронхит, пневмония, плеврит, инфекции мочевых путей, гонорея, угревая сыпь, холера.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст до 8 лет.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Понижение аппетита, тошнота, рвота, расстройства функции кишечника, изменение слизистых оболочек полости рта и желудочно-кишечного тракта, аллергические кожные реакции, отек Квинке.

Взаим.: Гидрокарбонат натрия, антациды, содержащие соли алюминия, висмута и магния, препараты железа, карбамазепин, гидантоины снижают всасывание и уровень в плазме крови.

Примен. и доз.: Внутрь по 100-200 мг в день (1 капсула каждые 12 ч) после еды.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушениях функции печени и почек; пациентам с лейкопенией.

Произв.: CSC (Италия)

Батрафен (Batrafen®)

Циклопирокс*

Сост. и ф.в.: Раствор, пудра или крем для местного применения, содержащие 1% циклопироксоламина. Раствор во флаконах по 20 мл, крем в тубах по 20 г, пудра по 30 г.

1 г лака для ногтей содержит циклопироксоламина 0,08 г; во флаконах по 3 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Микозы кожи, ногтей, грибковые вагиниты; профилактика грибковых заболеваний.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Зуд или жжение в местах аппликации (редко).

Примен. и доз.: Для лечения микозов кожи в течение 2 нед на пораженные участки 2 раза в сутки наносят крем или раствор с последующим подсушиванием. После исчезновения симптомов (для предотвращения рецидива) препарат применяют еще 1-2 нед. Для лечения грибковых заболеваний ногтей лак Батрафен наносят 1 раз в день тонким слоем на пораженный ноготь. Перед первым нанесением удаляют как можно большую часть пораженного ногтя и надпиливают его с помощью приложенной пилки (для создания неровной поверхности). Раз в неделю весь слой лака удаляют с помощью обычного растворителя, при этом стремятся удалить как

можно больше пораженного материала. В течение второго месяца лечения достаточно двухразовой аппликации Батрафен-лаком в неделю, а начиная с третьего месяца - раз в неделю. Длительность применения зависит от тяжести поражений, но не должна превышать 6 мес. Для лечения вагинитов применяют вагинальный крем в дозе 5 г: крем вводят глубоко во влагалище с помощью прилагаемого наконечника 1 раз в сутки, курс - не более 14 дней. Для профилактики появления микозов применяют пудру, которую насыпают в носки и/или обувь.

Произв.: Hoechst (Германия)

Бевиплекс (Beviplex)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит витамина В₁ 4 мг, витамина В₂ 5 мг, витамина В₆ 2 мг, витамина В₁₂ 0,001 мг, кальция пантотената 5 мг, никотиамида 25 мг и п-аминобензойной кислоты 20 мг; в упаковке 30 шт.

1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекций - витамина В₁ 40 мг, витамина В₂ 4 мг, витамина В₆ 8 мг, витамина В₁₂ 0,004 мг, кальция пантотената 10 мг и никотиамида 100 мг, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) в ампулах по 2 мл; в упаковке 5 комплектов.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов группы В.

Показ.: Повышенная потребность в витаминах группы В (лихорадочные состояния, гипертиреоз, беременность, лактация); дефицит комплекса витаминов В (диета, нарушение всасывания: диарея, рвота, хронические заболевания ЖКТ, пероральный прием антибиотиков); полиневриты, невралгии, энцефалопатии при хроническом алкоголизме; состояния после рентгеновского облучения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции (сыпь, зуд, крапивница).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды; взрослым - для терапии - по 3-4 драже в день, для профилактики - по 1-2 драже в день; детям (для профилактики) - по 1 драже в день. Парентерально: взрослым - в/м (глубоко) по 1-2 ампулы 1-2 раза в день или в/в струйно (медленно) или капельно по 1 ампуле 1-4 раза в день; детям - в/м (глубоко) или в/в (струйно, медленно) по 1 ампуле 1 раз в день.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Безалип (Bezalip)

Безафибрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит безафибрата 200 мг; в упаковке 30 или 100 шт.

Фарм. действ.: Гиполипидемическое.

Показ.: Гиперлипидемия.

Противопоказ.: Нарушение функции печени и почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические явления, холестаза, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 200 мг 3 раза в день.

Произв.: Boehringer Mannheim (Германия)

Бекарбон (Becarbonum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит экстракта красавки густого 0,01 г и натрия гидрокарбоната 0,3 г; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, антисекреторное, антацидное.

Фармакодин.: Спазмолитический и антисекреторный эффекты (уменьшение секреции желудочных, поджелудочной, бронхиальных, слюнных, потовых желез и выделения желчи) обусловлены М-холиноблокаторами (экстракт красавки), антацидный - натрия гидрокарбонатом.

Показ.: Спазмы кишечника, гиперацидные гастриты, диспепсия.

Противопоказ.: Глаукома, аденома предстательной железы.

Поб. действ.: Сухость во рту, жажда, запор, тахикардия, мидриаз, нарушение аккомодации.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30-40 мин до еды - по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Высшая разовая доза для взрослых - 5 таблеток, высшая суточная доза - 15 таблеток.

Произв.: Татхимфармпрепараты (Россия)

Беклазон (Beclason)

Беклометазон*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит беклометазона дипропионата 50, 100 или 250 мкг; во флаконе 200 доз.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное.

Фармакодин.: При местном (ингаляция) воздействии уменьшает гиперактивность бронхов, восстанавливает реакцию на бронхорасширяющие средства.

Клин. фарм.: Эффект развивается постепенно и выходит на плато через 5-7 дней.

Показ.: Лечение бронхиальной астмы при недостаточной эффективности бронходилататоров и/или кромогликата натрия, тяжело протекающая гормонозависимая астма у взрослых и детей.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Раздражение в горле, охриплость голоса; кашель, чихание; парадоксальный бронхоспазм. При длительном применении в высоких дозах возможны скрытая недостаточность надпочечников и создаются предпосылки для кандидоза полости рта и верхних дыхательных путей.

Примен. и доз.: Ингаляционно, взрослым - 100 мкг 3-4 раза в день или 200 мкг 2 раза в сутки; в тяжелых случаях - до 600-800 мкг в сутки, уменьшая дозу при стабилизации состояния больного. Детям - по 50-100 мкг 2-4 раза в сутки (в зависимости от состояния и реакции на лечение).

Предост.: Препарат не предназначен для купирования острых астматических приступов. С осторожностью применяют при активном туберкулезе легких, недостаточности коры надпочечников. Для профилактики парадоксального спазма (в ответ на ингаляцию) за 10-15 мин до нее следует ингалировать бронходилататор (например, сальбутамол). Необходимо предохранять глаза от попадания препарата.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Беклазон легкое дыхание (Beclason Easy Breathe)

Беклометазон*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит бекламетазона дипропионата 50; 100 или 250 мкг; во флаконе-ингаляторе с оптимизатором 200 доз.

Фарм. действ.: Противоастматическое.

Показ.: Лечение (профилактика приступов) бронхиальной астмы, особенно в случаях неэффективности бронходилататоров и у больных, зависящих от систематического приема кортикостероидов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (для ингалятора, содержащего Беклазон 250 мкг).

Примен. и доз.: Ингаляционно. Для взрослых - обычно в течение 24 ч можно

сделать максимум 16 ингаляций Беклазона 50 мкг или 8 ингаляций Беклазона 100 и 250 мкг. Для детей - обычно в течение 24 ч можно сделать максимум 8 ингаляций Беклазона 50 мкг или 4 ингаляции Беклазона 100 мкг.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Бекломет (Beclomet®)

Беклометазон*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит беклометазона дипропионата 50 или 250 мкг; в упаковке 200 доз.

Фарм. действ.: Противовоспалительное.

Показ.: Бронхиальная астма.

Противопоказ.: Туберкулез, беременность (первый триместр).

Поб. действ.: Кандидамикоз, охриплость голоса.

Взаим.: Совместим с бронходилататорами, инталом, антибиотиками и др.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Бекломет 50 мкг/доза: взрослым - по 400 мкг в день в 2-4 приема (не более 2000 мкг/день), детям - по 200-400 мкг в день в 2-4 приема

. Бекломет 250 мкг/доза: поддерживающая доза - по 500 мкг (2 ингаляции) 2 раза в день или по 250 мкг (1 ингаляция) 4 раза в день. Максимальная суточная доза - 2 ингаляции 3-4 раза в день.

Произв.: Orion (Финляндия)

Беконазе® (Beconase®)

Беклометазон*

Сост. и ф.в.: 1 доза спрея для интраназального применения содержит беклометазона 50 мкг; в 1 баллоне 200 доз.

Фарм. действ.: Противоаллергическое.

Клин. фарм.: В сравнении с системным действием при интраназальном применении (ингаляция) значительно снижает риск развития побочных эффектов.

Показ.: Аллергический ринит - круглогодичный и сезонный (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Допустимо, но следует оценить предполагаемую пользу для матери и возможный риск для ребенка.

Поб. действ.: Приступы чиханья (сразу после ингаляции); перфорация носовой перегородки (единичные случаи).

Передоз.: При ингаляции высоких доз возможно угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой функции. Следует продолжить применение пре-

парата в рекомендованных дозировках, и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая функция через 1-2 дня вернется к норме.

Примен. и доз.: Интраназально. По 2 ингаляции в каждую ноздрю 2 раза в день (400 мкг/сутки) или по 1 ингаляции в каждую ноздрю 3-4 раза в день, но не более 8 ингаляций в сутки. В случае приема сразу 2 ингаляций в каждую половину носа, следует первую ингаляцию направить в верхнюю, а вторую - в нижнюю часть носовой полости. Для получения полного терапевтического эффекта необходимо регулярное применение, т.к. эффект наступает только после нескольких ингаляций.

Предост.: Баллон следует согреть (эффект препарата может снижаться, если он холодный). При инфекции носовых ходов и придаточных пазух показано соответствующее лечение. Рекомендуются с осторожностью переводить больных со стероидов общего действия на Беконазе, если у них нарушена функция надпочечников.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Бекотид® (Becotide®)

Беклометазон*

Бекодиск® (Becodisk®)

Беклометазон*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит беклометазона дипропионата 50 мкг; в ингаляторе с дозирующим устройством 200 доз (Бекотид).

1 доза порошка для ингаляций - 100 или 200 мкг; в ротадисках по 8х15 шт. для применения с дисковым ингалятором (Бекодиск).

Фарм. действ.: Противовоспалительное (местное).

Клин. фарм.: Для достижения эффективных результатов необходим регулярный прием. Особенно показан (бекотид) больным, ранее не получавшим (или получавшим короткие курсы) стероидную терапию. Больным, получающим стероидную терапию, начиная со 2-й недели применения ингаляций, пероральные стероиды постепенно отменяют (уменьшая суточную дозу преднизолона или его эквивалентов на 1 мг в неделю).

Показ.: Бронхиальная астма (в т.ч. при неэффективности бронхолитиков или их сочетания с кромогликатом натрия, у

больных с тяжелой и гормонозависимой астмой), астма у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез легких (включая латентный).

Бер. и корм. гр.: Возможно, но следует оценить вероятные пользу и риск.

Поб. действ.: Осиплость голоса, раздражение слизистой горла; парадоксальный бронхоспазм, кандидозный стоматит, кандидоз слизистой полости рта.

Передоз.: Проявляется угнетением функции системы гипоталамус - гипофиз - надпочечники; лечение ингаляциями нужно продолжать в рекомендованной дозе, функция системы восстанавливается через 1-2 дня.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Взрослым - от 200 мкг 3-4 раза в день, в тяжелых случаях - до 2000 мкг в день, постепенно снижая дозу. Детям - по 100 мкг 2-3-4 раза в день. После ингаляции необходимо тщательно прополоскать рот.

Предост.: У больных с нарушенной функцией коры надпочечников при стрессовых ситуациях, операциях, инфекциях и т.д. необходимо увеличивать дозировку ингаляций и дополнительно назначить стероиды перорально; после отмены пероральных стероидов рекомендуется снизить дозу ингаляций до поддерживающего уровня. Терапевтический эффект снижается, если баллончик холодный. Как при применении всех ингаляционных кортикостероидов, необходимо соблюдать особую осторожность при назначении больным активным или вялотекущим туберкулезом.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Бекунис драже (Bekunis® dragees)

Сеннозиды А и Б

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит сухого экстракта плодов тиннелеской сенны 150-220 мг, что соответствует 20 мг производных гидроксидантрацена, рассчитанным как сеннозид Б; в упаковке 45 шт.

Фарм. действ.: Слабительное.

Показ.: Запоры (в т.ч. хронический, привычный, в больничной практике при длительном постельном режиме).

Противопоказ.: Кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания кишечника, боли в брюшной области неизвестного происхождения, детский возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: В первом триместре беременности рекомендуется применять в случае, если изменения в питании или использование средств, увеличивающих объем каловых масс, не дают результата.

Поб. действ.: Спазмы желудка или кишечника (редко).

Примен. и доз.: Внутрь, перед сном, 1-2 драже, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

Предост.: Не рекомендуется применять продолжительно.

Произв.: Roha (Германия)

Бекунис легкий (Bekunis® Leicht)

Сост. и ф.в.: 3,5 г гранулята (около 1 чайной ложки) содержат семян подорожника яйцевидного 1,86 г; во флаконах по 175 г.

Фарм. действ.: Регуляция деятельности ЖКТ, очищение организма от шлаков, физиологическая регуляция стула, снижение содержания холестерина и уровня глюкозы в крови, восполнение недостатка балластных веществ в питании.

Показ.: Повышенный вес тела, нарушения деятельности (запоры) и заболевания ЖКТ (профилактика).

Противопоказ.: Кишечная непроходимость (в т.ч. возможная), болезненные сужения в ЖКТ, тяжелая форма сахарного диабета.

Бер. и корм. гр.: Рекомендуется.

Поб. действ.: Аллергические реакции (редко).

Примен. и доз.: Внутрь, за полчаса до еды, взрослым - по 2 чайные ложки гранулята 2-3 раза в день, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды (1-2 стакана).

Произв.: Roha (Германия)

Белогент (Belogent®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержит бетаметазона (в форме дипропионата) 0,5 мг и гентамицина (в форме сульфата) 1 мг (1000 ЕД); в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, сосудосуживающее, противоаллергическое, антибактериальное (широкого спектра).

Показ.: Дерматозы вторично инфицированные (лечение и профилактика), инфицированные аллергические и экзематозные заболевания кожи (острые, подострые и хронические формы), инфицированные острые неаллергические дерматиты (типа солнечного, рентгеновского, после укуса насекомых), инфициро-

вание кожи при обыкновенном псориазе, эксфолиативном дерматите, красном плоском лишае.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, вакцинальная болезнь, ветряная оспа, туберкулез кожи.

Поб. действ.: Жжение, зуд, раздражение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация. При применении окклюзионных повязок - мацерация кожи, атрофия кожи, стрии, потница. При продолжительном лечении или нанесении препарата на большую поверхность возможно развитие системных побочных эффектов.

Примен. и доз.: Наносят, слегка втирая, на поврежденный участок кожи 2 раза в сутки.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Белодерм (Beloderm®)

Бетаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержит бетаметазона (в форме дипропионата) 0,5 мг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, противоаллергическое, сосудосуживающее.

Показ.: Дерматиты (контактный, аллергический, эксфолиативный, себорейный, атопический, инфантильный, монетоподобный экзематозный), нейродермит, опрелость, анальная и генитальная экземы, дисгидроз, острые неаллергические дерматиты (солнечный, рентгеновский, фотодерматит, укусы насекомых), псориаз, пузырчатка, красный плоский, бородавчатый и простой хронический лишай; хроническая дискоидная красная волчанка; эритродермия; многоформная экссудативная эритема.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез кожи, ветряная оспа, околоротовой дерматит, розовые угри, вакцинация.

Бер. и корм. гр.: В период беременности (первый триместр) и лактации можно применять белодерм только кратковременно.

Поб. действ.: Зуд, сыпь, раздражение, сухость, атрофия кожи, стрии, угри, гипертрихоз, гипопигментация (лейкодермия, депигментация волос), иммунодепрессия (инфицирование кожи), экхимозы. При длительном применении (более 4 нед), при нанесении на большие участки кожи (10% совокупной площади тела и более) возможно появление системных побочных явлений (задержка роста, снижение толерантности к углево-

дам, супрессия гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Кушинга).

Примен. и доз.: Накожно (не на волосистых участках) в количестве, необходимом для покрытия больного участка, наносят 1-2 раза в день, слегка втирая. При хронических заболеваниях лечение необходимо продолжать еще некоторое время после исчезновения симптомов (во избежание рецидива). Нельзя наносить на глаза и на кожу вблизи глаз. На лице применяют в исключительных случаях и кратковременно (из-за возможности развития периорального дерматита).

Произв.: Belupo (Хорватия)

Беломет (Belomet®)

Циметидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циметидина 200 мг; в упаковке 100 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 200 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, H₂-гистаминоблокирующее, ингибирование базальной и стимулированной секреции желудочной кислоты, пепсина.

Показ.: Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острые эрозии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера - Эллисона, язвы и кровотечения, вызванные стрессом, патологическая гиперсекреция, профилактика аспирации кислоты (синдром Мендельсона).

Противопоказ.: Беременность, лактация, возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Диарея, боли в мышцах, головокружение, депрессия, слабость, гинекомастия, повышение уровня трансаминаз и креатинина в сыворотке, спутанность сознания, парестезии, интерстициальный нефрит, кожная сыпь.

Взаим.: Является ингибитором микросомального окисления, усиливает эффект производных кумарина, замедляет элиминацию диазепама и хлордиазепоксида.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозу подбирают индивидуально. Назначают по 2 таблетки утром во время завтрака и вечером перед сном или по 1 таблетке 3 раза в день (во время еды) и 2 таблетки перед сном (суточная доза - 800 мг-1,6 г). Курс интенсивного лечения - 6 нед. Затем вводят сниженные дозы (400 мг в день перед сном) в течение 6 мес или (в сочетании с другими противоязвенными средствами) до исчезновения симптомов. В/в, по 200 мг струйно или капельно

(со скоростью 100-150 мг/ч) каждые 4-6 ч; максимальная суточная доза - 2 г.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Белосалик (Belosalic®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит бетаметазона (в форме дипропионата) 0,5 мг и салициловой кислоты 30 мг; в тубах по 30 г.

1 г водно-спиртового раствора - 0,5 мг и 20 мг соответственно; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, противоаллергическое, противоотечное, кератолитическое, антимикробное.

Показ.: Подострые и хронические дерматозы с гиперкератозом (в том числе и волосистых участков): псориаз, острые и хронические экземы, нейродермит, плоский лишай, дисгидроз, себорейный и монетоподобный экзематозный дерматит, ихтиоз и другие ихтиозные поражения, себорея волосистых участков кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез кожи, ветряная оспа, вакцинация.

Поб. действ.: Зуд, угревидные высыпания, раздражение кожи, гипертрихоз, жжение, гипопигментация, фолликулит; при применении окклюзионных повязок: мацерация кожи, вторичные инфекции, атрофия кожи, стрии, потница.

Примен. и доз.: Местно, наносят 2 раза в день на пораженные участки кожи (в количестве, достаточном для полного покрытия их), слегка втирая в кожу. При появлении признаков раздражения или сенсibilизации лечение следует прекратить.

Предост.: Нельзя наносить на глаза, вблизи глаз и на слизистые оболочки.

Произв.: Belupo (Хорватия)

БемеGRID (Bemegridum)

БемеGRID*

Сост. и ф.в.: Ампула с 10 мл раствора бемеGRIDа в физиологическом растворе (бемеGRID 50 мг); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Аналептическое, стимуляция дыхательного и сосудодвигательного центров.

Показ.: Интоксикация барбитуратами, наркозными средствами, тяжелая гипоксия.

Противопоказ.: Психомоторное возбуждение.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, мышечные подергивания, судороги.

Взаим.: Синергизм с мезатоном, кофеином.

Примен. и доз.: В/в, медленно 5-10 мл; возможно повторное введение через 2-3 мин. Детям разовая доза снижается (пропорционально весу).

Произв.: Кальцекс (Латвия)

Бензилбензоат (Benzyl benzoas)

Бензилбензоат

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит бензилбензоата 0,1 или 0,2 г; в банках по 25 г.

Фарм. действ.: Противопаразитарное.

Фармакодин.: Токсичен для чесоточных клещей и всех видов вшей.

Показ.: Чесотка, педикулез.

Поб. действ.: Ощущение жжения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно. При лечении чесотки: после мытья, на ночь, мазь наносят на весь кожный покров (исключая лицо и волосистую часть головы) и втирают руками (руки не моют до утра), на одно втирание расходуют 30-40 г мази. После втирания мази надевают обеззараженное белье и одежду. На 4-ый день обработку повторяют, на 5-й день назначают мытье со сменой нательного белья. При лечении головного педикулеза мазь втирают в волосистую часть головы, после этого голову повязывают хлопчатобумажной тканью. При лобковом педикулезе мазь втирают в кожу лобка, живота, ягодиц, половых органов, паховых складок и внутренней поверхности бедер. При педикулезе мазь втирают на 1, 3 и 7 сутки, после завершения лечения назначают мытье с мылом, а волосы ополаскивают 3% раствором уксусной кислоты. Для взрослых применяют 20% мазь, для детей - 10% мазь. На участки с нежной кожей мазь наносится без интенсивного втирания.

Предост.: Обязательно обеззараживание нательного и постельного белья, верхней одежды и головных уборов. Следует избегать попадания мази в глаза.

Произв.: Нижфарм (Россия)

Бензилбензоат (Benzyl benzoas)

Бензилбензоат

Сост. и ф.в.: 100 г эмульсии содержат бензилбензоата 20 г; во флаконах по 50, 100, 150 и 200 мл.

Фарм. действ.: Поражение чесоточных клещей.

Показ.: Чесотка.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Раздражение кожи, ощущение жжения.

Примен. и доз.: По схеме: в течение 4 дней втирают в вымытую с мылом кожу рук, туловища и ног, включая подошвы и пальцы; после каждой обработки производят смену белья. Нельзя допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Произв.: Ретиноиды (Россия)

Бензилбензоата мазь (Unguentum Benzyl benzoatis)

Бензилбензоат

Сост. и ф.в.: 30 г мази содержат бензилбензоата медицинского 6,6 г, САКАПа 0,66 г, натра едкого 0,066 г, твина-80 0,33 г, нипагина 0,024 г, нипазола 0,006 г и воды очищенной до 30 г; в алюминиевых тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Противопедикулезное, противочесоточное.

Показ.: Чесотка, педикулез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Ощущение жжения на месте аппликации, аллергические реакции.

Примен. и доз.: При головном педикулезе мазь втирают в кожу волосистой части головы и волосы и повязывают волосы хлопчатобумажной тканью; при лобковом педикулезе мазь втирают в кожу лобка, живота, паховых складок и внутренней поверхности бедер. Мазь втирают в 1, 3 и 5 сутки 1 раз в день (на ночь). На 8-й день - мытье с мылом, волосы споласкивают 3% раствором уксусной кислоты. При необходимости обработку повторяют. Обязательна дезинсекция постельного и нательного белья и одежды. При лечении чесотки мазь наносят 1 раз в сутки после мытья (на ночь) на весь кожный покров, исключая лицо и волосистую часть головы. Мазь втирают руками и их не моют до утра. На четвертый день мазь наносят повторно. После втирания мази используют обеззараженное белье и одежду. На 5-й день - мытье, смена нательного и постельного белья. На одно втирание - 30-40 г мази, на курс лечения - 60-80 г.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Бепантен® (Bepanthen®)**Декспантенол***

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержит декспантенола по 50 мг; в тубах по 30 г.

1 г лосьона - 25 мг; во флаконах по 200 мл.

1 г крема Бепантена плюс - декспантенола 50 мг и хлоргексидина гидрохлорида 5 мг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Дерматопротективное, регенерирующее, дезинфицирующее, антисептическое (для крема с хлоргексидином).

Фармакокин.: Быстро абсорбируется кожей, превращается в пантотеновую кислоту и депонируется. Пантотеновая кислота связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация ее в цельной крови составляет 500-1000 мкг/л, а в сыворотке около 100 мкг/л. Пантотеновая кислота включается в Ко-А (в другие реакции биотрансформации не включается). Экскретируется в неизмененном виде. После приема внутрь 60-70% ее выводится с мочой, остальная часть - кишечником. Взрослые выделяют с мочой 2-7 мг/сутки, дети 2-3 мг. Данные, свидетельствующие о проникновении хлоргексидина (для препарата Бепантен плюс) через неповрежденную кожу взрослых, отсутствуют. После купания грудных детей в 4% моющем растворе хлоргексидина глюконата в их крови обнаруживаются незначительные концентрации хлоргексидина (менее 1 мкг/мл).

Фармакодин.: Декспантенол (активный ингредиент) в клетках организма человека быстро превращается в пантотеновую кислоту. Последняя является единственным и незаменимым компонентом кофермента А (КоА), который в виде ацетил-КоА играет центральную роль в обмене веществ. Пантотеновая кислота необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых.

Показ.: Бепантен м а з ь: профилактика и лечение различных повреждений кожных покровов, трещин и воспаления сосков молочных желез у женщин в период кормления; предотвращение опрелостей и лечение дерматитов от пеленок у грудных детей; лечение трофических язв голени; при мелких хирургических вмешательствах; при поверхностной атрофии кожи после длительного употребления кортикостероидных мазей. Бепантен к р е м: для ежедневного ухода за участками кожного покрова, подверженных наи-

большому воздействию внешних факторов (например, руки, локтевые сгибы); лечение мест сдавливания, покраснений, солнечных ожогов, легких ожогов и раздражений (но неповрежденной кожи). Бепантен л о с ь о н: для ухода за сухой и шершавой кожей; лечение покрасневших кожных покровов (солнечные ожоги и раздражения, но неповрежденной кожи). Бепантен п л ю с: обработка ран любого рода при опасности инфицирования (ссадины, порезы, царапины, трещины, ожоги, опрелости, кожные воспаления); хронические раны (пролежни, язвы нижних конечностей); кожные инфекции (вторично инфицированные экзема и нейродермит), обработка операционных ран.

Противопоказ.: Гиперчувствительность. Бепантен плюс нельзя наносить на перфорированную барабанную перепонку (в связи с наличием в нем хлоргексидина).

Бер. и корм. гр.: Для Бепантен плюс: при беременности следует избегать применения препарата на больших участках тела. В период кормления грудью можно применять только на небольших участках кожи.

Поб. действ.: Аллергические кожные реакции. Для Бепантена плюс, кроме того, жжение.

Взаим.: Хлоргексидин (Бепантен плюс) несовместим с мылами и другими анионными веществами.

Примен. и доз.: Наружно. Бепантен крем, мазь, лосьон наносят 1 или несколько раз в день. Для мокрых повреждений, открытых частей тела (лица) или волосистых участков кожи рекомендуется применять Бепантен крем. Для применения на больших участках кожи лучше подходит Бепантен лосьон ввиду его жидкой консистенции. Кормящим матерям смазывать мазью поверхность соска после каждого кормления грудью. Грудным детям мазь наносить на спину, ягодицы и паховую область после каждой смены белья и после водных процедур.

Предост.: Нельзя допускать попадания Бепантен плюс в глаза или на слизистые оболочки. Следует избегать совместного применения Бепантена плюс с другими антисептическими средствами из-за возможной интерференции (антагонизм - инактивация). Не рекомендуется применять Бепантен плюс для лечения раздражения кожи при небольшом риске инфекции (например, при солнечном ожоге); вместо него можно использовать Бепантен крем или лосьон.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Берлидорм® 5 (Berlidorm® 5)

Нитразепам*

Берлидорм 10 (Berlidorm® 10)

Нитразепам*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитразепама 5 или 10 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, седативное, миорелаксантное, противосудорожное.

Показ.: Нарушение сна; припадки в раннем детском возрасте: пропульсивные малые, акинетические, клонико-астатические малые.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, закрытоугольная глаукома, острая интоксикация алкоголем или др. средствами, угнетающими ЦНС, наркомания, алкоголизм, беременность, лактация.

Поб. действ.: Сонливость, вялость, снижение реакции, головокружения, оглушенность, спутанность сознания, депрессия, атаксия, миастения, головная боль, повышение аппетита, сухость во рту, тошнота, понос, гипотония, угнетение дыхания, снижение либидо, парадоксальные реакции, антероградная амнезия.

Примен. и доз.: Внутрь (между приемами пищи). При бессоннице - по 1-2 таблетки Берлидорма 5 или 1/2-1 таблетке Берлидорма 10 за 20-30 мин до сна; пожилым - по 1/2 таблетки Берлидорма 5. При детских припадках - в начальной дозе 1 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, затем дозу повышают на 1/2 таблетки Берлидорма 5 с интервалом в 3 дня; максимальная доза - 1,5 мг/кг в сутки.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берликорт (Berlicort®)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триамцинолона 4 мг; в упаковке 25, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, мембраностабилизирующее.

Показ.: Бронхиальная астма, хронический эмфизематозный бронхит, аллергический или вазомоторный ринит, аллергические дерматозы, крапивница, ревматическая полимиалгия, коллагенозы, хронический полиартрит, нефротический синдром, фиброз легких, саркоидоз, лимфолейкоз, лимфогранулематоз, лимфосаркома, гемолитическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура.

Противопоказ.: Язвенная болезнь, прогрессирующий остеопороз, психические заболевания в анамнезе, латентные бактериальные инфекции (туберкулез), системные микозы, вирусные инфекции, амебные инфекции, глаукома, беременность (особенно первый триместр), полиомиелит.

Поб. действ.: Синдром Кушинга, недостаточность надпочечников, нарушение секреции половых гормонов, остеопороз, миастения, сахарный диабет, угнетение иммунитета, повышение внутричерепного давления, тромбозы, расстройства психики и др.

Примен. и доз.: Внутрь. Лечение начинают с высоких доз с постепенным переходом к более низким поддерживающим дозам. Обычно начальная доза у больных, ранее не леченных, составляет 0,024-0,04 г в сутки; для детей с массой тела меньше 27 кг или младше 9-10 лет 0,004-0,012 г в сутки. При длительной терапии поддерживающая доза - 0,002-0,008 г в сутки или 0,004-0,012 г через день. Детям с массой тела меньше 27 кг (младше 9-10 лет) назначают от 1/3 до 1/2 поддерживающей дозы. Суммарную суточную дозу принимают, по возможности, в 1 прием утром (между 6-8 ч после завтрака).

Предост.: Нельзя внезапно прерывать лечение - следует постепенно уменьшать дозировку.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин Н 20/80 U-40 (Berlinsulin® Н 20/80 U-40)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 40 ЕД (20% растворимого нормаль-инсулина и 80% кристаллической суспензии с протамином) и протамин сульфата 0,11 мг (что соответствует 0,086 мг протамин основания), во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Комбинированный инсулин с небольшим начальным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 1,5-8 ч, продолжительность - 14-16 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета I и II типа.

Противопоказ.: Гипогликемия, гиперчувствительность (относительное).

Поб. действ.: Гипогликемия.

Примен. и доз.: Обычно суточную дозу распределяют на две инъекции в соотношении 2:1 (две трети утром и одну треть вечером) и вводят п/к (нельзя вводить в/в) за 30-45 мин до завтрака и ужина. В особых случаях - в/м. При каждом инъектировании меняют место введения.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н 20/80 пен (Berlinsulin® Н 20/80 pen)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 100 ЕД (20% растворимого нормаль-инсулина и 80% кристаллической суспензии с протамином) и протамин сульфата 0,28 мг (что соответствует 0,216 мг протамин основания); в патронах по 1,5 мл; в упаковке 5 и 20 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Комбинированный инсулин с умеренным начальным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 1,5-8 ч, продолжительность - 14-16 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета (I и II типа).

Примен. и доз.: Обычно суточную дозу распределяют на две инъекции в соотношении 2:1 (2/3 - утром и 1/3 - вечером) и вводят п/к за 30-45 мин до завтрака и ужина. При каждом инъектировании место введения меняют.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н 30/70 U-40 (Berlinsulin® Н 30/70 U-40)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 40 ЕД (30% растворимого нормаль-инсулина и 70% кристаллической суспензии с протамином) и протамин сульфата 0,10 мг (что соответствует 0,076 мг про-

тамина основания); во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Комбинированный инсулин с выраженным начальным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 1-8 ч, продолжительность - 14-16 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета (I и II типа).

Примен. и доз.: Обычно суточную дозу распределяют на две инъекции в соотношении 2:1 (две трети утром и одну треть вечером) и вводят п/к (нельзя в/в) за 30-45 мин до завтрака и ужина. В особых случаях - в/м. При каждом инъектировании меняют место введения.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н 30/70 пен (Berlinsulin® Н 30/70 pen)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 100 ЕД (30% растворимого нормаль-инсулина и 70% кристаллической суспензии с протамином) и протамин сульфата 0,24 мг (что соответствует 0,189 мг протамин основания); в патронах по 1,5 мл; в упаковке 5 и 20 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Комбинированный инсулин с выраженным начальным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 1-8 ч, продолжительность - 14-15 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета I и II типа.

Противопоказ.: Гипогликемия, гиперчувствительность (относительное).

Поб. действ.: Гипогликемия.

Примен. и доз.: Обычно суточную дозу распределяют на две инъекции в соотношении 2:1 (2/3 - утром и 1/3 - вечером) и вводят п/к за 30-45 мин до завтрака и ужина. При каждом инъектировании место введения меняют.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н 40/60 U-40 (Berlinsulin® Н 40/60 U-40)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого

40 ЕД (40% растворимого нормаль-инсулина и 60% кристаллической суспензии с протамином) и протамина сульфата 0,08 мг (что соответствует 0,065 мг протамина основания); во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Комбинированный инсулин с усиленным начальным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 1-8 ч, продолжительность - 14-15 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета I и II типов.

Противопоказ.: Гипогликемия, гиперчувствительность (относительное).

Поб. действ.: Гипогликемия.

Примен. и доз.: Обычно суточную дозу распределяют на две инъекции в соотношении 2:1 (две трети утром и одну треть вечером) и вводят п/к (нельзя в/в) за 30-45 мин до завтрака и ужина. В особых случаях - в/м. При каждом инъектировании меняют место введения.

Пр о и з в.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н 40/60 пен (Berlinsulin® Н 40/60 pen)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 100 ЕД (40% растворимого нормаль-инсулина и 60% кристаллической суспензии с протамином) и протамина сульфата 0,21 мг (что соответствует 0,162 мг протамина основания); в патронах по 1,5 мл; в упаковке 5 и 20 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Комбинированный инсулин с усиленным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 1-8 ч, продолжительность - 14-15 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета I и II типов.

Противопоказ.: Гипогликемия, гиперчувствительность (относительное).

Поб. действ.: Гипогликемия.

Примен. и доз.: Обычно суточную дозу распределяют на две инъекции в соотношении 2:1 (2/3 - утром и 1/3 - вечером) и вводят п/к за 30-45 мин до завтрака и ужина. При каждом инъектировании меняют место введения.

Пр о и з в.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н Базаль U-40 (Berlinsulin® Н Basal U-40)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 40 ЕД и протамина сульфата 0,14 мг (что соответствует 0,108 мг протамина основания), во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Изофан-инсулин с замедленным начальным эффектом и средней продолжительностью действия. Максимум действия - 2-10 ч, продолжительность - 18-20 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета (I и II типа); непереносимость других препаратов инсулина.

Противопоказ.: Гипогликемия; аллергия (к инсулину) немедленного типа (относительное противопоказание), в/в назначение.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности и в период кормления грудью может потребоваться новый подбор дозировки инсулина и диеты. В первый триместр потребность снижена, с четвертого месяца она повышается и после родов нередко вновь быстро уменьшается.

Поб. действ.: Гипогликемия (вплоть до комы); преходящие отеки; изменения содержания воды в хрусталике; липодистрофия, гиперемия (в месте инъекции), аллергические реакции.

Взаим.: Усиление эффекта (снижение потребности в инсулине) возможно при приеме алкоголя, альфа- и бета-адреноблокаторов, амфетамина, анаболических стероидов, клофибрата, циклофосфида, фенфлурамина, ифосфамида, ингибиторов МАО, метилдофы, тетрациклинов и тропосфамида, ослабление (увеличение потребности в инсулине) - хлорпотиксена, диазоксида, гепарина, стероидных контрацептивов, кортикостероидов, солей лития, никотиновой кислоты, фенолфталеина, фенотиазин, фенитоина, тиазидных диуретиков, гормонов щитовидной железы, симпатомиметиков, трициклических антидепрессантов. Резерпин, салицилаты изменяют (повышают или снижают) действие. Симптомы гипогликемии маскируют бета-адреноблокаторы и клонидин. Уменьшает переносимость алкоголя.

Передоз.: Проявляется гипогликемией: внезапное появление пота, сердцебие-

ние, тремор, чувство голода, возбужденность, парестезия в области рта, бледность, головная боль, сонливость, боязливость, депрессия, раздражительность, неуверенность движений, нарушение речи и зрения. При тяжелой гипогликемии: потеря сознания, холодный пот, высокое напряжение тканей глазного яблока, судороги по типу Джексона, вплоть до конвульсий; рефлекс Бабинского. Терапия: при легкой гипогликемии - прием сахара; при тяжелых формах необходимо ввести в/м 1-2 мг глюкагона или глюкозу (40-80 мл 40% раствора в/в).

Примен. и доз.: Обычно назначают по 1-2 п/к инъекций; при дозе, превышающей 50 ЕД, назначают 2 инъекции в день. Дозу вводят за 30-45 мин до первого завтрака и до ужина. В особых случаях вводят в/м (нельзя вводить в/в). При каждом инъектировании место введения меняют.

Предост.: При повышенной чувствительности к инсулинам животного происхождения необходимо проверить переносимость человеческого инсулина (кожная проба). При аллергической реакции немедленного типа на протамина сульфат рекомендуется перейти на инсулин, не содержащий протамина.

Пр о и з в .: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н Базаль пен (Berlinsulin® Н Bazal pen)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 100 ЕД и протамина сульфата 0,35 мг (что соответствует 0,27 мг протамина основания) (изофан-инсулин); в патронах по 1,5 мл; в упаковке 5 и 20 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Инсулин с замедленным начальным эффектом и средней продолжительностью действия (инсулин промежуточного действия). Максимум действия - 2-10 ч, продолжительность - 18-20 ч.

Показ.: Все формы сахарного диабета (I и II типа), непереносимость других препаратов инсулина.

Противопоказ.: Гипогликемия, аллергия (к инсулину) немедленного типа (относительное противопоказание); в/в назначение.

Поб. действ.: Гипогликемия (вплоть до комы), изменение содержания воды в хрусталике, липодистрофия, гиперемия (в месте инъекции), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Вводят п/к за 30-45 мин до первого завтрака и до ужина. При каждом инъектировании место инъекции меняют, нельзя вводить в/в. Обычно суточную дозу вводят в виде 1-2 инъекций. Если разовая доза при однократном введении превышает 50 ЕД, то следует перейти на режим 2-х разового введения. Патроны с инсулином были разработаны специально для использования их в шприц-ручке "B-D-Pen". Необходимо тщательно соблюдать указания по применению этого устройства, предназначенного для инъектирования инсулина, которые касаются заправки патрона с инсулином, а также подготовке и проведению инъекции. Патроны с инсулином заполнять повторно не разрешается. Их нельзя также использовать для приготовления в них смесей инсулинов. Если патрон с инсулином из инъекционного устройства вынут, вставлять его вновь не разрешается.

Предост.: При повышенной чувствительности к инсулинам животного происхождения необходимо проверить переносимость человеческого инсулина (кожная проба). При аллергической реакции немедленного типа на протамина сульфат рекомендуется перейти на инсулин, не содержащий протамина.

Пр о и з в .: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлинсулин® Н Нормаль U-40 (Berlinsulin® Н Normal U-40)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит инсулина человеческого 40 ЕД, во флаконах по 10 мл; в упаковке 1 и 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Инсулин с быстрым начальным эффектом и короткой продолжительностью действия. Максимум действия - 1-3 ч, продолжительность - 6-8 ч.

Показ.: Сахарный диабет I и II типа (все формы), диабетическая кома.

Противопоказ.: Гипогликемия, гиперчувствительность (относительное).

Поб. действ.: Гипогликемия, липодистрофии и покраснение кожи в месте введения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Дозировка устанавливается индивидуально. Обычно вводят п/к (в особых случаях - в/м) за 10-15 мин до приема пищи 3-4 раза в день. Разовая доза составляет 6-20 ЕД. У больных сахарным диабетом с повышенной чувствительностью к инсулину и у детей эту дозу снижают, у пациентов с незначительной чувствительностью к инсулину - повышают. При диабетической коме сначала Берлинсулин Н Нормаль U-40 вводят в/в в дозе из расчета 0,1-0,3 ЕД/кг, затем длительное в/в вливание из расчета 0,1-0,2 ЕД/кг в час.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлиприл® 5 (Berlipril® 5)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 5 мг; в упаковке 30, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, сосудорасширяющее, ингибирование АПФ, подавление образования ангиотензина II.

Показ.: Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность (в сочетании с сердечными гликозидами и/или диуретиками).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, первичный гиперальдостеронизм, стеноз почечных артерий, стеноз аортального или митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия, заболевания печени и почек, пересаженная почка, диализ, коллагенозы, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, изменение вкуса, гипотония, нарушения ортостатической регуляции, загрудинная боль, аритмии, тахикардия, инфаркт миокарда, церебральный инсульт, головокружения, головная боль, слабость, спутанность сознания, нервозность, бессонница, гиперкалиемия, флебиты, нарушение функции почек, печени, гепатит, рефлексорный кашель, изменение картины крови, нарушения слуха и зрения, синкопе, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонса, фотосенсибилизация, ангионевротический отек.

Взаим.: Эффект снижается нестероидными противовоспалительными средствами и повышается наркотическими препаратами. Иммунодепрессанты, аллопуринол, цитостатики, кортикостероиды усили-

вают гематотоксичность. При одновременном применении с калием, калийсберегающими диуретиками, гепарином возможна гиперкалиемия. Усиливает действие алкоголя и повышает концентрацию лития в плазме.

Примен. и доз.: Внутрь. При гипертонии - начальная доза 5 мг 1 раз в день (утром), поддерживающая - 10 мг в день (максимально - 40 мг/сутки). При сердечной недостаточности начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в день (утром), поддерживающая доза - 5-10 мг (максимально - 20 мг/сутки).

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берлоцид® (Berlocid®)

Ко-тримоксазол

Берлоцид 480 (Berlocid® 480)

Ко-тримоксазол

Берлоцид 960 (Berlocid® 960)

Ко-тримоксазол

Общее описание

Сост. и ф.в.: 5 мл готовой или приготовленной из гранулята суспензии для приема внутрь (1 мерная ложка) содержат сульфаметоксазола 200 мг и триметоприма 40 мг; во флаконах предварительного заполнения по 100 мл или в гранулах во флаконах по 50 г для приготовления 100 мл суспензии.

1 таблетка - сульфаметоксазола 400 мг и триметоприма 80; в упаковке 20 шт.

1 таблетка - сульфаметоксазола 800 мг и триметоприма 160 мг; в упаковке 10 или 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, уха, горла и носа, почек и мочеполового тракта, ЖКТ, бруцеллез, нокардиоз, южно-американский бластомикоз, псевдомикотическая мицетома и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, экссудативная мультиформная эритема, синдром Лайела, синдром Стивенса-Джонсона (в т.ч. в анамнезе), болезни крови, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гипербилирубинемия, тяжелые поражения почек и печени, беременность (первый триместр), лактация, недоношенность.

Поб. действ.: Нарушения аппетита и вкуса, диспептические расстройства, экзантемы, пурпура, узловатая эритема, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиатив-

ный дерматит, головные боли, артралгия, анемия, холестатический гепатоз, некрозы печени, острый панкреатит, кристаллурия, интерстициальный нефрит, асептический менингит, острый психоз, агранулоцитоз, гипогликемия, суперинфекция, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, детям 2 раза в день (утром и вечером), от 6 нед до 5 мес - по 1/2-1 мерной ложке суспензии, от 5 мес до 5 лет - по 1 мерной ложке, от 6 до 12 лет - по 2 мерные ложки; профилактика инфекций мочевых путей: детям - 1 раз в день (вечером), до 1 года - по 2-3 мл, от 1 года до 6 лет - по 4-6 мл, от 7 до 12 лет - по 6-9 мл. Берлоцид 480 - внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 2 таблетки 2 раза в день (утром и вечером). При неосложненном цистите (женщины) - однократно 6 таблеток, при гонорее - утром и вечером по 5 таблеток (один день). Берлоцид 960 - внутрь, запивая большим количеством жидкости. Обычно - 1/2-1 таблетку вечером. Кратковременная терапия неосложненного цистита у женщин - 3 таблетки 1 раз в день. При гонорее взрослым - по 2 1/2 таблетки один день утром и вечером. При пневмонии, вызываемой *Pneumocystis carinii*, - до 120 мг/кг в день.

Пр о и з в.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Берокка® Ca + Mg (Berocca® Ca + Mg)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина B₁ 15 мг, витамина B₂ 15 мг, витамина B₆ 10 мг, витамина B₁₂ 10 мкг, витамина C 500 мг, биотина 150 мкг, никотиамида 50 мг, пантотеновой кислоты 23 мг, кальция 100 мг, магния 100 мг; в упаковке 30 шт.

1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит те же компоненты, но витамина C 1000 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов группы B, аскорбиновой кислоты, кальция и магния, стимуляция клеточного метаболизма.

Показ.: Хроническое психоэмоциональное напряжение, физическое переутомление, абстинентный синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиперкальциемия, почечнокаменная болезнь, тяжелая почечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Окрашивание мочи в желтый цвет (обусловлено присутствием в препарате витамина B₂).

Примен. и доз.: Внутрь, 1-2 таблетки в день. Таблетки принимают с достаточным количеством воды; шипучую таблетку растворяют в стакане воды.

Прозв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Бесалол (Besalolum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит экстракта красавки густого 0,01 г и фенолсалицилата 0,3 г; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, антисекреторное, антисептическое, противовоспалительное.

Фармакодин.: Спазмолитический и антисекреторный эффекты (уменьшение секреции желудочных, поджелудочной, бронхиальных, слюнных, потовых желез и выделение желчи) обусловлены М-холиноблокаторами (экстракт красавки), антисептический - фенолом (высвобождается из фенолсалицилата в щелочной среде кишечника), противовоспалительный - салициловой кислотой.

Показ.: Заболевания желудочно-кишечного тракта (энтериты, колиты).

Противопоказ.: Глаукома, аденома предстательной железы.

Поб. действ.: Сухость во рту, жажда, мидриаз, нарушение аккомодации.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки.

Прозв.: Татхимфармпрепараты (Россия)

Бетадин (Betadin®)

Повидон-йодин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для местного применения содержит активного йода 10 мг; во флаконах с пробкой-пипеткой по 30, 120 и 1000 мл;

1 г мази - поливидона йодида 100 мг; в тубиках по 20 г.

1 вагинальный суппозиторий - 200 мг поливидона йодида; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое.

Показ.: Ожоги, ссадины, резаные раны, трофические язвы, пролежни, инфекции кожи, инфекционные дерматиты (мазь); смешанные, неспецифические и грибковые вагиниты, трихомониаз (супп.ваг); дезинфекция кожи и слизистых оболочек перед операцией, обработка асептических ран, бактериальные и грибковые инфекции кожи (раствор).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, герпетиформный дерматит Дюринга, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, перед терапией радиоактивным йодом,

второй и третий триместр беременности, лактация. Не следует применять у недоношенных и новорожденных детей.

Поб. действ.: Раздражение кожи или слизистых оболочек на местах аппликации.

Взаим.: Несовместим фармацевтически с дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть, и (раствор) с окислителями, солями щелочей и веществами с кислой реакцией.

Примен. и доз.: Накожно, местно. Для лечения ожогов и ран мазь наносят тонким слоем на пораженную поверхность кожи несколько раз в день. Для дезинфекции кожи и обработки ран применяют 1% или 10% раствор в концентрированном виде в зависимости от пораженной области. Свечи вводят перед сном в течение 14 дней.

Произв.: Egis (Венгрия)

Бетадин (Betadin®)

Повидон-йодин

Сост. и ф.в.: 1 мл жидкого мыла содержит активного йода 7,5 мг; во флаконах с пробкой-пипеткой по 120 и 1000 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, дезинфицирующее, с широким спектром антимикробного действия, противогрибковое, антипротозойное.

Показ.: Гигиеническая дезинфекция рук, подготовка рук хирурга перед операцией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, герпетиформный дерматит Дюринга, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность. Не рекомендуется с 3-го месяца беременности и во время лактации.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с другими дезинфицирующими средствами.

Примен. и доз.: Накожно. Гигиеническая дезинфекция рук: намочить руки водой и налить на одну руку 5 мл мыла, равномерно растереть и в течение минуты тщательно мыть руки. Сполоснуть теплой водой. Хирургическая дезинфекция: продолжительность дезинфекции 5 мин (два раза по 2,5 мин).

Произв.: Egis (Венгрия)

Бетадине (Betadine®)

Повидон-йодин

Сост. и ф.в.: Раствор для наружного применения, содержащий 10, 7,5 или 1% комплекса поливинилпирролидона с йодом (что соответствует 1, 0,75 или 0,1% активного йода); во флаконах по

100, 500, 1000 и 5000 мл (10 и 7,5% раствор) и по 100 мл (1% раствор).

1 вагинальный суппозиторий содержит 200 мг данного комплекса; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое, широкого спектра (бактерии, грибы, вирусы, простейшие).

Показ.: Инфекции полости рта и глотки, острые и хронические вагиниты, смешанные инфекции, неспецифические инфекции, инфекции, вызванные трихомонадами, грибковые поражения. Лечение и предупреждение инфицирования ран, порезов, разрывов, абразий, ожогов, дезинфекция кожи и слизистой до и после проведения операции, др. исследований (биопсии, пункции, инъекции и т.д.), пред- и послеоперационная обработка рук хирургического персонала, дезинфекция инструментов, предметов ухода и госпитальных помещений.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, беременность, лактация, новорожденные и дети грудного возраста.

Поб. действ.: Неприятные ощущения в полости рта, зуд, гиперемия.

Взаим.: Исключить применение препарата в комплексе с дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть, с окислителями и солями щелочей.

Примен. и доз.: Интравагинально, перед сном, по 1 свече в течение 14 дней (независимо от фазы менструального цикла). Местно, полоскание полости рта и глотки 3 раза в день разбавленным (1 чайную ложку на 1/2 стакана воды) или неразбавленным 1% раствором. Для обработки рук хирургического персонала после их смачивания водой наносят 5 мл 7,5% раствора и растирают до локтей ладонями или щеткой до образования пены, после смывания водой процедуру повторяют. Для предоперационной подготовки больных (1 мл 7,5% раствора достаточно для поверхности 50-70 кв.см) экспозиция в течение 3-5 с, затем после смывания (стерильной водой) обработку повторить. Для дезинфекции раневых и ожоговых поверхностей кожи и слизистых применяется 10% раствор, который наносится в течение 1-2 с, а затем смывается.

Предост.: Разведенный раствор хранить нельзя. Следует избегать попадания в глаза.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Бетайн цитрат УПСА (Betaine citrate UPSA)

Бетайн

Сост. и ф.в.: 1 быстрорастворимая "шипучая" таблетка содержит бетаина цитрата 2 г, натрия бикарбоната 1,5 г, лимонной кислоты 0,2 г; в упаковке 2 тубы по 15 таблеток.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, холелепозитическое, желчегонное, липотропное.

Показ.: Гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия; стеатозные состояния, связанные с жировым перерождением гепатоцитов, атероматоз; гепатиты любого происхождения; диспепсия; дискинезии желчных путей; гиперацидные состояния; угроза тромбообразования.

Примен. и доз.: Внутрь, до или после еды, растворив в стакане воды, по 1 таблетке 1-3 раза в день.

Произв.: UPSA (Франция)

Беталок (Betaloc®)

Метопролол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метопролола гидротартрата 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, блокада β_1 -адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия, аритмии (синусовая тахикардия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия), гиперкинетический кардиальный синдром.

Противопоказ.: АВ-блокада II и III степени, кардиогенный шок, брадикардия (менее 60 ударов в минуту), сердечная недостаточность, предстоящее в ближайшие 48 ч хирургическое вмешательство.

Поб. действ.: Гиперчувствительность, слабость, бессонница, диспепсия, спазм периферических артерий, брадикардия; аллергические реакции (кожная сыпь).

Взаим.: Возможно усиление эффекта при совместном назначении с антагонистами кальция (требуется осторожность).

Примен. и доз.: Внутрь. Требуется индивидуальный режим дозирования. При артериальной гипертензии - 100-200 мг 1 раз в день утром или в 2 приема (утром и вечером). В отдельных случаях может быть необходимо увеличение дозы или комбинирование с другими гипотензивными препаратами. При стенокардии - 100-200 мг в 2 приема (утром и вечером). В тяжелых случаях доза может быть увеличена до 300-400 мг. При нарушении

ях сердечного ритма - 100 мг в день в 2 приема (утром и вечером); при необходимости доза может быть увеличена до 200-300 мг. Отмену препарата следует производить постепенно.

Произв.: Egis (Венгрия)

Беталок (Betaloc®)

Метопролол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метопролола тартрата 100 мг; в упаковке 100 шт.

1 мл раствора для инъекций - 1 мг, в ампулах по 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антиаритмическое, гипотензивное, селективная блокада β_1 -адренорецепторов.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма (суправентрикулярные тахикардии, пароксизмальная предсердная тахикардия, фибрилляция и мерцание предсердий), артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, АВ-блокада II-III степени, декомпенсированная сердечная недостаточность, синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, тяжелое нарушение периферического артериального кровообращения; инфаркт миокарда с частотой сердечных сокращений меньше 45 ударов в мин, интервалом PQ > 0,24 с, систолическим давлением < 100 мм рт.ст. и/или с тяжелой сердечной недостаточностью - для парентерального введения.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, брадикардия, постуральные явления (иногда с синкопе), тошнота, рвота, запор или понос, боли в брюшной полости, ксеростомия, изменения в функциональных пробах печени, повышенная светочувствительность, усиление потоотделения, одышка при физической нагрузке, бронхоспазм (на фоне обструктивных заболеваний легких), ринит, нарушение зрения, конъюнктивит, тромбоцитопения, увеличение массы тела, алопеция.

Взаим.: Может усиливать отрицательный ино- и дромотропный эффекты противоаритмических средств (типа хинидина и амиодарона); ингаляция анестетиков повышает кардиодепрессивное действие. Антигипертензивный эффект снижается индометацином. Рифампицин - уменьшает, а циметидин увеличивает концентрацию препарата в плазме.

Примен. и доз.: Внутрь, по 100-200 мг, при гипертензии - однократно или утром и вечером (в два приема), при стенокар-

дии - в 2 приема (утром и вечером). В/в, начиная с 5 мг, вводя со скоростью 1-2 мг/мин, дозу можно повторять с 5-минутным интервалом, максимально - до 20 мг.

Предост.: С осторожностью назначают при обструктивных заболеваниях легких, декомпенсированной сердечной недостаточности, предшествующих нарушениях АВ-проводимости, циррозе печени. Перед проведением хирургического вмешательства необходимо проинформировать анестезиолога о приеме препарата.

Произв.: Astra (Швеция)

Бетаферон (Betaferon®)

Интерферон бета*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит интерферона бета-16 9,6 млн.ЕД, в комплекте с растворителем; в упаковке 15 шт.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее.

Фармакокин.: После п/к введения 0,5 мг Бетаферона максимальные концентрации в плазме достигаются через 1-8 ч. Биодоступность после п/к введения составляет 50%. Средний клиренс 30 мл/мин/кг, период полувыведения около 8 ч. На фоне курсового лечения, фармакокинетические параметры препарата существенно не меняются.

Фармакодин.: Тормозит репликацию вирусов, снижает образование гамма-интерферона и активизирует функцию Т-супрессоров, тем самым ослабляя действие антител против основных компонентов миелина.

Показ.: Рассеянный склероз ремиттирующего течения (для уменьшения частоты и тяжести обострений болезни).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Общее гриппоподобное недомогание, депрессивные состояния, лейкопения; в месте инъекции - болезненность, покраснение, истончение подкожной клетчатки, некрозы. Побочные эффекты обычно проявляются в течение первых нескольких недель лечения.

Взаим.: Возможно сочетание с кортикостероидами и АКТГ во время обострения.

Примен. и доз.: П/к через день в дозе 8 млн.ЕД (1 мл раствора). Раствор готовят путем добавления (медленно по стенке) во флакон с лиофилизированным веществом 1,2 мл растворителя до пол-

ного растворения сухого вещества (1 мл приготовленного раствора содержит 8 млн.ЕД интерферона бета-16). Лечение проводят длительно, в течение нескольких месяцев и лет. Терапию начинают в стационаре, затем переходят на амбулаторное лечение (врачебные осмотры не реже нескольких раз в год).

Предост.: Следует периодически контролировать картину периферической крови (уровень лейкоцитов), уровень кальция и активность печеночных трансаминаз в плазме крови. Не допускается повторное частое введение в один и тот же участок кожи. При развитии реакций гиперчувствительности терапия препаратом должна быть прекращена и назначено соответствующее лечение. Не применять препарат, если содержимое раствора не полностью или изменился цвет раствора. Флакон не встряхивать. Приготовленный раствор использовать сразу. Хранить не более 3-х ч при температуре 2-8 град.С.

Произв.: Schering (Германия)

Бетновейт® (Betnovate®)

Бетаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержат бетаметазона 1 мг (в виде валерата); в тубиках по 15 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противоудное.

Показ.: Дерматозы, псориаз (кроме распространенного бляшечного), экзема (атопическая, детская, дискоидная), узловатая чесуха (Гайда), нейродерматиты (включая простой и плоский лишай, себорейный дерматит); реакции контактной чувствительности; дискоидная красная волчанка; генерализованная эритродермия (как вспомогательное средство).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угри розовые и обыкновенные, первичные вирусные, грибковые, бактериальные инфекции кожи, перианальный и анальный зуд. Сыпь (на фоне опрелости), дерматит, дерматоз у детей младше 1 года.

Поб. действ.: Атрофические изменения кожи (стрии, истончения, расширение поверхностных сосудов) - при длительном применении под окклюзионные повязки; признаки гиперкортицизма и подавления гипоталамо-гипофизарно-адреналовой функции (при длительном применении больших количеств на обширных участках).

Примен. и доз.: Наружно. Небольшое количество наносить на пораженный участок 2-3 раза в день до появления улучшения. Поддерживающая терапия - один раз в день или реже (до 4 нед). При резистентных поражениях - достаточно одноразовой ночной повязки (под полиэтиленовой пленкой), затем регулярное нанесение без повязки.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Бетоптик (Betoptic®)

Бетаксолол*

Сост. и ф.в.: 1 мл стерильного раствора содержит бетаксолола гидрохлорида 5,6 мг; во флаконах по 5 мл с дозатором Дроп-Тейнер.

Фарм. действ.: Противоглаукомное, блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Хроническая открытоугольная глаукома, глазная гипертензия, состояние после лазерной трабекулопластики, длительная гипотензивная терапия после оперативного вмешательства.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синусовая брадикардия, атрио-вентрикулярная блокада II-III степени, кардиогенный шок, выраженная сердечная недостаточность в анамнезе.

Поб. действ.: Слезотечение (непосредственно после инстилляций), уменьшение чувствительности роговицы, эритема, зуд, светобоязнь, анизокория, пятнистая окрашенность роговицы, кератит; резорбтивные эффекты: бессонница, невроз.

Взаим.: При одновременном приеме бета-адреноблокаторов внутрь возможно усиление эффекта бетоптика и системного - бета-блокатора (гипотония, брадикардия).

Примен. и доз.: По 1 капле 2 раза в день в пораженный глаз (под контролем внутриглазного давления). При переходе от лечения другими (аналогичными) препаратами к бетоптику в первый день также дважды закапывают по 1 капле, но наряду с назначенными ранее.

Предост.: Осторожно назначают пациентам, страдающим сахарным диабетом; перед оперативным вмешательством с использованием общей анестезии бета-адреноблокаторы следует отменить (постепенно).

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Бикарминт (Bicarmintum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит натрия тетрабората 0,4 г, натрия гидрокарбоната 0,4 г, натрия хлорида 0,2 г, ментола 0,002 г и масла мятного 0,004 г; в стеклянных пробирках по 10 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное.

Фармакодин.: Местнораздражающий эффект, обуславливающий улучшение капиллярного кровообращения и блокаду воспаления, оказывают ментол и мятное масло, антисептический - натрия тетраборат; натрия хлорид и натрия гидрокарбонат оказывают противомикробное действие. Кроме того, сдвиг pH в щелочную сторону (гидрокарбонат) разжижает мокроту и облегчает ее выведение.

Показ.: Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ринит, тонзиллит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Полоскания, промывания и ингаляции (паровые, ультразвуковые и др.). По 1-2 таблетки на 1/2 стакана воды.

Произв.: Татхимфармпрепараты (Россия)

БиКНУ (BiCNU®)

Кармустин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инфузий содержит кармустина 100 мг, в комплекте с растворителем во флаконе по 3 мл.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, алкилирование ДНК и РНК.

Фармакокин.: После в/в введения подвергается быстрой деградации (неизменный препарат не обнаруживается уже через 15 мин). Хорошо растворяется в липидах и проходит через гематоэнцефалический барьер. В течение 96 ч 60-70% дозы выделяется с мочой, около 10% - в виде выдыхаемого CO₂.

Показ.: Опухоли мозга: глиобластома, глиома ствола мозга, медуллобластома, астроцитомы, эпендимомы, метастазирующие опухоли мозга; множественная миелома, лимфогранулематоз, рецидивы лимфомы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При лечении во время беременности или при ее наступлении (рекомендуется избегать) следует помнить об опасности для плода; рекомендуется отказаться от кормления грудью.

Поб. действ.: Миелосупрессия (тромбоцитопения, лейкопения, острая лейкемия, дисплазия костного мозга, анемия); инфильтраты в легких; фиброз; летальные проявления легочной токсичности, тошнота, рвота, поражения печени (повышение уровней трансаминаз, щелочной фосфатазы, билирубина), почек (азотемия, уменьшение размера почек, почечная недостаточность); нейроретинит; ощущение жжения и гиперпигментация при контакте с кожей; при быстром в/в введении - ощущение жжения в точке введения (редко - тромбоз), покраснение кожи, набухание конъюнктивы.

Примен. и доз.: В/в, капельно (в течение не менее 1-2 ч). Монотерапия - однократно от 150 до 200 мг/кв.м (или по 75-100 мг/кв.м два дня подряд) с интервалом 6 нед. Последующие дозы подбираются в соответствии с гематологической реакцией на предыдущее введение: вводится 100% от предыдущей дозы при минимальном количестве лейкоцитов 3000 и более в 1 куб.мм и тромбоцитов 75000 и более в 1 куб.мм; 70% - при количестве лейкоцитов 2000-2999/куб.мм и тромбоцитов 25000-74999/куб.мм и 50% - при количестве лейкоцитов менее 2000/куб.мм и тромбоцитов менее 25000/куб.мм. Повторный курс назначают, если тромбоцитов более 100000/куб.мм, лейкоцитов более 4000/куб.мм (обычно через 6 нед).

Предост.: На протяжении 6 нед после введения препарата следует еженедельно определять содержание форменных элементов крови. Рекомендуются следить за функциональным состоянием легких, печени, почек. При попадании препарата или его раствора на кожу или слизистые необходима тщательная обработка водой с мылом.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Билем (Bilem)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тамоксифена цитрата 10 или 20 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы в постменопаузном периоде, запущенная эндометрическая карцинома, ановуляторное бесплодие.

Противопоказ.: Беременность, лактация.

Поб. действ.: Потеря аппетита, тошнота, рвота и другие расстройства ЖКТ,

гиперемия с ощущением жара, вагинальные кровотечения или выделения, расстройства менструального цикла, тромбозы, гиперкальциемия, периферические отеки, зуд половых органов, депрессия, головные боли, головокружения, болезненность опухоли, снижение остроты зрения, помутнение роговицы и ретинит, временная тромбоцитопения, кожная сыпь.

Передоз.: Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь. При раке эндометрия: 20-30 мг 1-2 раза в день, при раке молочной железы: 20-40 мг 1-2 раза в день, при ановуляторном бесплодии: 10 мг 2 раза в день в течение 4 дней подряд, начиная со 2 дня менструации. При последующих 4-дневных циклах можно увеличить дозу до 20-40 мг 2 раза в день.

Произв.: CSC (Италия)

Билигност® (Bilignostum®)

Адипиодон*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 372,4 мг билигноста (адипиодона) или 500 мг N-метилглюкаминовой соли билигноста, в ампулах по 20 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Рентгеноконтрастное.

Показ.: Холангиохолецистография.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, острые и подострые холангиты, тяжелые поражения почек, печени, миокарда, гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации, шок, коллапс, гиперпротромбинемия, активные формы туберкулеза, миеломная болезнь.

Поб. действ.: Ощущение жара, головокружение, тошнота, рвота, тахикардия, цианоз, слезотечение, аритмии, фибрилляция желудочков сердца, отек легких, крапивница, анафилактикоидные реакции.

Примен. и доз.: В/в, медленно. Доза на одно исследование - 20 мл, детям - 0,5-0,75 мл/кг. Через 20-25 мин можно получить изображение желчных ходов, а через 2,5 ч - желчного пузыря.

Предост.: Необходимо определять чувствительность к йоду.

Произв.: Фармак (Украина)

Билтрицид® (Biltricide®)

Празиквантел*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит празиквантела 600 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Антигельминтное.

Показ.: Трематодозы печени (описторхоз, клонорхоз), шистосомозы, парагонимоз, цестодозы (тениаринхоз, тениоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, цистицеркоз глаз, беременность (первый триместр), лактация.

Поб. действ.: Боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, крапивница; кожный зуд, лихорадка, дезориентация в пространстве и времени.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 20-25 мг/кг 1-3 раза, однократно. Таблетки проглатывают целиком, с небольшим количеством жидкости. При разовых дневных дозах лучше принимать вечером, при 2-3-разовом приеме перерыв должен составлять 4-6 ч. Слабительное при приеме Билтрицида не назначают.

Произв.: Bayer (Германия)

Бимарал (Bymaral®)

Бромоприд*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 20 мл раствора для приема внутрь (для детей) содержит бромоприда 200 мг (1 капля - примерно 0,1 мг).

Фарм. действ.: Регуляция моторики ЖКТ, повышение тонуса и усиление перистальтики, устранение тошноты и рвоты функционального происхождения, противоикотное.

Показ.: Диспепсия (тошнота, рвота, гастралгия, аэрофагия, метеоризм, отрыжка, изжога), диафрагмальная грыжа, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезия желчевыводящих путей, спастический колит, рентгенодиагностика пищеварительного тракта.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, сонливость, дискинезия мышц головы, шеи и плечевого пояса, сухость во рту.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой - по 0,5-1 мг/кг (5-10 капель/кг массы тела) в сутки в 2 приема.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Биодроксил (Biodroxil)

Цефадроксил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит цефадроксила 1000 мг.

1 капсула - 500 мг.

Гранулы для приготовления оральной суспензии с содержанием цефадроксила

125 или 250 мг/5 мл; во флаконах по 60 и 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакодин.: Подавляет синтез бактериальной клеточной стенки.

Показ.: Инфекции: верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (хронический средний отит, синусит, фарингит, тонзиллит), нижних дыхательных путей (острый и хронический бронхит, бронхопневмония, бактериальная пневмония), мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно в случаях, когда ожидаемая польза для женщины преобладает над негативным влиянием на плод. При лечении кормящих матерей необходимо сцеживать грудное молоко и не использовать его для вскармливания во время лечения и два дня спустя после его окончания.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, боли в животе, зуд, аллергические высыпания, очень редко - глоссит, головкружение, нервозность, бессонница, в отдельных случаях - вагинальный микоз, кандидозный стоматит.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и подросткам (свыше 40 кг) - 1-2 г (1-2 таблетки) однократно или за два приема; детям от 9 до 12 лет (30-40 кг) - по 2 капсулы 1 раз в сутки или по 1 капсуле каждые 12 ч; детям от 5 до 12 лет (20-40 кг) - 4 мерные ложечки суспензии 250 мг/5 мл 1 раз в сутки или 2 мерные ложечки суспензии 250 мг/5 мл каждые 12 ч; детям от 1 года до 5 лет (10-20 кг) - 2-4 мерные ложечки суспензии 250 мг/5 мл 1 раз в сутки или 1-2 мерные ложечки суспензии 250 мг/5 мл каждые 12 ч; детям 2-12 мес (5-10 кг) - 1 мерная ложечка суспензии 125 мг/5 мл или 1/2 мерной ложечки суспензии 250 мг/5 мл каждые 12 ч; детям до 2 мес (5 кг) - 1/2 мерной ложечки суспензии 125 мг/5 мл каждые 12 ч. Длительность лечения 7-10 дней, при инфекциях, вызванных *Streptococcus pyogenes*, - не менее 10 дней.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с гиперчувствительностью к пенициллинам (возможны аллергические реакции). В период лечения не рекомендуется употреблять алкоголь.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Биокалиптол (Biocalyptol®)

Сост. и ф.в.: 100 г сиропа содержат эвкалиптола 0,14 г, фолкодина 0,1 г, настойки белладонны 0,6 г и гваякола 0,015 г; во флаконах по 200 мл.

Фарм. действ.: Противокашлевое, отхаркивающее, муколитическое, антисептическое.

Фармакодин.: Успокаивает раздражающий болезненный кашель (не меняет физиологию кашля).

Показ.: Острые и хронические заболевания дыхательных путей (ринофарингит, трахеобронхит, хронический бронхит), грипп, сопровождающийся раздражающим кашлем.

Противопоказ.: Возраст (до 2,5 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - по 3-6 столовых ложек сиропа в день, детям от 2,5 до 8 лет - по 1-2 чайные ложки в день, от 8 до 15 лет - по 4-8 чайных ложек в день.

Произв.: Laboratoires Laphal (Франция)

Биолайн Артритис (Bioline® Arthritis)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Bryonia alba 4X, Cimicifuga racemosa 4X, Rhus toxicodendron 4X, 12X, 30X, Coffea cruda 6X, Colchicum autumnale 6X, Dulcamara 6X, 12X, 30X, Apis Mellifica 9X, Rhododendron chrysanthum 12X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Артрит острый и ревматоидный, сопровождающиеся контрактурой и припухлостью суставов (монотерапия или в комбинации с аллопатическими препаратами).

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача перед началом приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения. Взрослым: в остром периоде - по 1 таблетке каждые 20 мин до облегчения состояния, затем - по 1 таблетке 4 раза в день. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослых.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. Если симптомы

не исчезают в течение 10 дней, следует прекратить прием и проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биолайн Детоксикация (Bioline® Detoxification)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Solidago virgaurea 4X, Berberis vulgaris 6X, Carduus marianus 6X, Gelsemium sempervirens 6X, Nux Vomica 6X, 9X, 12X, Iris versicolor 9X, Taraxacum officinale 9X, Sulphur 12X, Thuja occidentalis 12X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Острые и хронические отравления (монотерапия и в комбинации с аллопатическими препаратами).

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача перед началом приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения; взрослым - по 1 таблетке 3-4 раза в день, курс лечения - не менее 2 нед. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослых.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. Если симптомы не исчезают через 10 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биолайн Кандида Ист (Bioline® Candida Yeast)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Baptisia tinctoria 4X, Bryonia 4X, Echinacea angustifolia 4X, Eupatorium perfoliatum 4X, Helonias dioica 4X, Thuja occidentalis 4X, 12X, 30X, Viscum album 4X, Kreosotum 8X, 20X, 30X, Candida albicans 12X, Candida parapsilosus 12X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Грибковые инфекции (в т.ч. молочница), сопровождающиеся зудом, жжением, выделениями; профилактика реинфекции.

Противопоказ.: Детский возраст (до 12 лет), боли в животе, тяжелый гнилостный запах изо рта, лихорадка.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача до начала приема препарата.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения; при первых симптомах (зуд, дискомфорт) - по 1 таблетке каждые 2 ч до облегчения состояния, затем - по 1 таблетке 4 раза в день в течение 2 нед. Возможно изменение схемы применения препарата.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. В начале лечения возможно обострение симптоматики. Если улучшение не наступает в течение 10 дней, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биолайн Колд (Bioline® Cold)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Echinacea angustifolia 4X, Eupatorium perfoliatum 4X, Aconitum napellus 6X, 12X, 30X, Dulcamara 6X, Euphrasia officinalis 6X, Gelsemium sempervirens 6X, 12X, 30X, Kali Bichromicum 6X, Pulsatilla nigricans 6X, Sanguinaria canadensis 6X, Sulphur 8X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Простудные заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем, насморком, чиханием, болью в горле, головной болью.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуется консультация врача до начала приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения. Взрослым в остром периоде - по 1 таблетке каждые 1-2 ч до облегчения состояния или в течение 3 дней, затем - по 1 таблетке 3-4 раза в день до выздоровления. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослых.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. Если симптомы не исчезают после 5 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биолайн Нервоузнес (Bioline® Nervousness)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Ignatia amara 4X, 12X, 30X, Passiflora incarnata 4X, Valeriana officinalis 4X, Agnus

castus 6X, Cinchona officinalis 6X, Kali Phosphoricum 6X, Moschus 6X, Phosphoricum Acidum 6X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Успокаивающее, имуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Беспокойство, раздражительность, повышенная возбудимость, нервное напряжение, депрессия (монотерапия или в комбинации с др. аллопатическими препаратами).

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуется консультация врача перед началом приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения - по 1 таблетке каждый час до облегчения состояния, затем - по 1 таблетке 4 раза в день. При необходимости возможно изменение схемы приема препарата.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. В начале лечения возможно обострение симптоматики. Если улучшение не наступает после 10 дней, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биолайн Простейт (Bioline® Prostate)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Chimaphila umbellata 4X, Clematis erecta 4X, Sabal serrulata 4X, 12X, 30X, Solidago virgaurea 6X, Sulphur 6X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Заболевания предстательной железы (простатит, гипертрофия предстательной железы) и мочевого пузыря; нарушения мочеиспускания.

Противопоказ.: Детский и подростковый возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения - по 1 таблетке каждые 1-2 ч в течение 3 дней, затем - по 1 таблетке 3-4 раза в день. При необходимости возможно изменение схемы приема препарата.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. Если симптоматика не исчезает после 10 дней, следует проконсультироваться у врача.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биолайн Стоп Смоукин (Bioline® Stop Smoking)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Daphne indica 4X, Plantago major 4X, Cinchona officinalis 6X, 12X, 30X, Lobelia inflata 6X, Nux vomica 6X, 12X, 30X, Staphysagria 6X, Calcarea Phosphorica 12X, Ignatia amara 12X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Никотиновая зависимость, сопровождающаяся симптомами раздражительности, нервного напряжения, депрессии, кашля, одышки и др. проявлениями табакозависимости.

Противопоказ.: Детский возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача до начала приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения - по 1 таблетке каждые 4 ч или при остром желании курить.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. Если симптомы не исчезают после 10 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Биопарокс (Bioparox)

Фузафунжин*

Сост. и ф.в.: 100 г раствора содержат фузафунжина 1,18 г; во флаконах по 5 мл (400 доз) с наконечниками для полости носа и рта.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противовоспалительное.

Показ.: Инфекции верхних дыхательных путей (синуситы, ринит, ринофарингит, фарингит, ларингит, трахеит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 2,5 лет).

Поб. действ.: Раздражение носоглотки, чихание, бронхоспазм, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Ингаляционно, по 4 вдыханий ртом и/или каждой ноздрей через 4 ч в течение 10 дней.

Произв.: Servier (Франция)

Биотредин® (Biotredin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит L-треонина 0,1 г и пиридоксина гидрохлорида 0,005 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиалкогольное, антиабстинентное; повышение умственной работоспособности, нормализация обмена веществ.

Показ.: Сниженная умственная работоспособность и концентрация внимания; хронический алкоголизм, патологическое влечение к алкоголю, сопровождающееся раздражительностью, снижением настроения, внутренним дискомфортом, чувством голода; алкогольный абстинентный синдром.

Противопоказ.: Период опьянения (снижение лечебного эффекта).

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Несовместим с нейролептиками, антидепрессантами, транквилизаторами, барбитуратами.

Примен. и доз.: Сублингвально, для повышения внимания и умственной работоспособности: детям - по 2 мг/кг массы тела, подросткам и взрослым - по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3-10 дней. При необходимости курс повторяют 3-4 и более раз в год. Для лечения хронического алкоголизма - по 0,1-0,3 г на прием 2-3 раза в день в течение 4-5 дней. При необходимости курс повторяют до 5-10 раз в год. Для лечения алкогольного абстинентного синдрома (наибольший эффект достигается при сочетанном приеме с глицином - 0,1 г сублингвально за 10-15 мин до приема биотредина) - в первые сутки 1-4 таблетки 3-4 раза в день (суточная доза 0,3-1,6 г), далее - по 1-2 таблетки на прием 2-3 раза в день (суточная доза 0,3-0,6 г) в течение 21-28 дней. Курс можно сократить до 10-14 дней. В период ремиссии для выявления скрытого влечения к алкоголю принимают 2-3 таблетки натошак, для которого характерно появление в течение 10-20 мин легкого головокружения, успокаивающего эффекта, гиперемии, потоотделения. В этих случаях рекомендуется 5-10-дневный курс по 1-2 таблетки 2-3 раза в день вместе с глицином.

Произв.: Биотики (Россия)

Бисакодил (Bisacodyl)

Бисакодил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, содержит бисакодила 5 мг; в упаковке 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Слабительное, стимуляция моторики толстого кишечника.

Показ.: Запоры (хронические, острые); очищение толстого кишечника (в качестве замены клизмы) перед операцией,

диагностическим (инструментальным, рентгенологическим, радиологическим) исследованием и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кишечная непроходимость (в т.ч. подозрение на нее).

Бер. и корм. гр.: Допустимо (только при крайней необходимости).

Поб. действ.: Боли в животе, колики; при длительном применении или передозировке - диарея с обезвоживанием и потерей электролитов (особенно калия), атония толстого кишечника.

Взаим.: Молоко, антациды ускоряют растворение оболочки таблетки и повышают вероятность раздражения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Примен. и доз.: Внутрь, перед сном, не разжевывая и не измельчая. Взрослым (включая лиц старше 65 лет) и детям старше 10 лет, при запорах - по 2 таблетки, при необходимости - по 3-4 таблетки. Для замены клизмы - по 2 таблетки. При подготовке к радиологическим исследованиям - по 2 таблетки за сутки до и накануне исследования.

Предост.: Следует с осторожностью назначать при воспалительных заболеваниях кишечника, детям до 6 лет (только по предписанию врача). Необходимо избегать длительного использования.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Бисмофальк (Bismofalk®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит субгаллата висмута 50 мг и субнитрата висмута 100 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, бактерицидное в отношении *Helicobacter pylori*, антацидное.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит в фазе обострения, гастралгия.

Противопоказ.: Тяжелая почечная недостаточность, беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Окрашивание каловых масс в черный цвет.

Взаим.: Уменьшает всасывание тетрациклина.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1-2 ч до еды - по 2 таблетки (не разжевывая) 3 раза в день в течение 4-8 (не более 8) нед. Повторный курс лечения препаратом можно проводить не ранее, чем через 8 нед после окончания предыдущего курса.

Произв.: Dr. Falk (Германия)

Бифидумбактерин сухой (Bifidumbacterinum siccum)

Сост. и ф.в.: Лиофильно высушенная микробная масса живых бифидобактерий; во флаконах по 5 доз.

Фарм. действ.: Антагонизм со многими патогенными и условно-патогенными бактериями, нормализация деятельности ЖКТ, ликвидация дисбактериоза.

Показ.: Кишечная дисфункция различной этиологии (дисбактериоз после антибактериальной, гормональной и лучевой терапии, стрессовые ситуации и экстремальные условия); профилактика и купирование расстройств функции кишечника при острых кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, вирусная диарея и др.), у детей с гнойно-инфекционными заболеваниями (пневмония, сепсис и др.), у новорожденных группы риска (с отягощенным преморбидным анамнезом, преждевременно родившимся, с признаками недоношенности, получающим антибиотики, от матерей, страдавших токсикозом и экстрагенитальными заболеваниями в дородовой период, от кормящих матерей с лактостазом, трещинами соска, после мастита), у ослабленных детей с анемией, гипотрофией, рахитом, аллергией (диатезом и др.), коклюшем; острые и хронические воспалительные заболевания тонкого и толстого кишечника (энтероколит, колит) на фоне дисбактериоза у детей старшего возраста и взрослых; кишечная дисфункция при раннем переводе детей грудного возраста на искусственное вскармливание; санация женских половых путей при бактериальных и сенильных кольпитах, предродовой подготовке беременных группы "риска" с нарушением чистоты вагинального секрета до III-IV степени; профилактика мастита в период кормления грудью (у матерей группы "риска").

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не установлены.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при воспалительных заболеваниях кишечника - по 5 доз 2-3 раза в день, детям при кишечных заболеваниях до 6 мес - по 3 дозы 3 раза в день, от 6 мес до 1 года и старше - по 5 доз 3 раза в день, новорожденным - по 1-2 дозы 3 раза в день (с первых суток жизни до выписки). Курс лечения - от 2-3 нед до 3 мес, профилактика - 1-2 нед. Детям при комплексном лечении инфекционных заболеваний - по 2-3 дозы 3 раза в день для профилактики

и до 10 доз в сутки для купирования расстройств кишечника; интравагинально - по 5-10 доз 1 раз в день в течение 5-8 дней. Местно - тампон в области соска за 20-30 мин до кормления по 2-2,5 дозы в течение 5 дней.

Предост.: Недопустимо растворение препарата горячей водой. Непригоден к применению препарат во флаконах с нарушенной целостностью, без этикеток, в виде массы темнокоричневого цвета, резко уменьшенной в объеме.

Произв.: Восток (Россия)

Бифиформ (Bifiform)

Сост. и ф.в.: Капсулы с желудочно-растворимым покрытием, содержащие не менее 10⁷ бифидум бактерий, а также энтерококки; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Нормализация кишечной флоры.

Показ.: Дисбактериоз кишечника (лечение и профилактика), диарея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 капсулы в день; при необходимости можно увеличить дозу до 4 капсул в день.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Бифоназол (Bifonazolum)

Бифоназол*

Сост. и ф.в.: Крем 1% в тубах или банках по 30 г.

Раствор 1% во флаконах по 15 мл.

Присыпка 1% в банках по 30 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Клин. фарм.: Глубоко проникает в кожу, создавая высокие концентрации в течение 48-72 ч.

Показ.: Дерматофитии: микроспория, трихофития, руброфития (стоп, кистей, гладкой кожи), отрубевидный лишай, кандидозы кожи (ногтевых валиков, ногтей, гениталий), эритразма, межпальцевая опрелость и гипергидроз стоп.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Крем и раствор наносят на очаги поражения тонким слоем, слегка втирая, 1-2 раза в день. При экссудативных формах начинают с раствора, затем после снятия острого воспаления применяют крем и только потом переходят на присыпку. Продолжительность курса - от 2 нед (микроспория гладкой кожи) до 3-4 мес (поражения ногтевых валиков и ногтей); 2-5 нед лечат руброфитию, 2-4 нед - поражения кожи поло-

вых органов, 3-4 нед - отрубевидный лишай, эритразму; 2-3 нед - гипергидроз стоп (только присыпку).

Произв.: Синтез (Россия)

Бластокарб (Blastocarb)

Карбоплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит карбоплатина 50, 150 или 450 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Рак яичников (запущенный), мелкоклеточный рак легкого (моно- и комбинированная терапия) и др. солидные опухоли (включая опухоли мочевого пузыря, шейки матки, яичек).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к платине, почечная недостаточность, миелосупрессия, беременность.

Поб. действ.: Нарушения функции почек (вплоть до почечной недостаточности), миелосупрессия, потеря вкуса, тошнота, рвота, нарушение слуха, периферические нейропатии, алопеция, гипертермия, повышение уровня АСТ, припадки, сыпь, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, медленная инфузия (в течение 15-60 мин) по 400 мг на 1 кв.м поверхности тела. Следующую дозу вводят не ранее, чем через 4 нед. Дозу уменьшают при выраженном угнетении функции костного мозга или при сочетании с др. противоопухолевыми средствами. Содержимое флакона растворяют в стерильной воде для инъекций, 5% растворе декстрозы или 0,9% растворе хлорида натрия.

Предост.: Необходимо регулярно контролировать состав периферической крови, функцию печени, неврологический статус. Не следует использовать для введения препарата иглы, содержащие алюминий.

Произв.: CSC (Италия)

Бластолем (Blastolem)

Цисплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цисплатина 10 или 50 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Метастатический рак яичника и яичек, рак мочевого пузыря, шейки матки, легких, головы и шеи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, недостаточность функции почек, костного мозга, нарушения слуха.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Нарушение функции почек с повышением уровня креатинина и мочевой кислоты в сыворотке крови, тошнота, рвота, анорексия, нарушение слуха (глухота) и вкуса, периферическая нейропатия, припадки, миелосупрессия, изменение электролитного баланса (снижение уровня кальция, магния, калия, натрия в сыворотке крови), аллергические и анафилактические реакции.

Взаим.: Несовместим с нефротоксичными препаратами (аминогликозиды и др.)

Примен. и доз.: В/в 50-120 мг/кв.м поверхности тела каждые 3 нед. При комбинированном лечении дозы препарата могут быть снижены - минимальная доза 20 мг/кв.м с интервалом 3-4 нед. При комбинированном лечении рака яичка с применением винбластина и блеомицина назначают в дозе 200 мг/кв.м ежедневно в течение 5 дней каждые 3 нед.

Предост.: До начала лечения рекомендуется инфузия (1-2 л 5% декстрозы и 0,5% физиологического раствора в течение 8-12 ч). На протяжении последующих 24 ч необходимы адекватная гидратация и диурез (маннитол, маннитол с фуросемидом). Во время лечения необходимо контролировать функцию почек, органов слуха, нервной системы.

Произв.: CSC (Италия)

Блемарен (Blemaren)

Сост. и ф.в.: 100 г гранулированного порошка для приготовления раствора для приема внутрь содержат лимонной кислоты 39,9 г, цитрата натрия 27,85 г и бикарбоната калия 32,25 г; в упаковке 200 г в комплекте с мерной ложкой (3 г), индикаторной бумагой, контрольным календарем.

Фарм. действ.: Предупреждение образования и растворение мочекислых камней, ощелачивание мочи.

Показ.: Мочекаменная болезнь, растворение и предупреждение образования мочекислых камней, порфирия (симптоматическое лечение).

Противопоказ.: Острая сердечная или почечная недостаточность, хронические инфекционные заболевания мочевыводящих путей, вызванные бактериями, расщепляющими мочевины; рН мочи выше 7,0.

Поб. действ.: Образование фосфатных камней.

Примен. и доз.: Средняя суточная доза колеблется от 6 до 18 г гранулята. Суточную дозу делят на 2-3 приема, принимают во время еды. Порошок растворяют в жидкости (вода, сок). Контроль эффективности препарата проводится 3 раза в день перед каждой разовой дозой путем определения рН мочи. Доза препарата считается правильно подобранной в том случае, если рН мочи в течение суток колеблется в пределах 7-6,2 (при растворении мочекислых камней). Если значение рН выше 7 - дозу уменьшают. Для растворения цистеиновых камней значение рН должно быть 7,5-8,5. На фоне лечения порфирии значение рН должно быть 7,2-7,5. На фоне химиотерапии значение рН мочи должно быть, как минимум, 7. Длительность терапии - от 4 нед до 6 мес. Значение рН мочи определяют при помощи приложенных индикаторных полосок и заносятся больным в контрольный календарь.

Предост.: Во время терапии необходимо соблюдать режим питания (ограничение приема богатой белками и пуриновыми основаниями пищи, а также обеспечить достаточное количество потребляемой жидкости - не менее 1,5-2 л).

Произв.: Espargma (Германия)

Блеоцин (Bleocin)

Блеомицин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит блеомицина гидрохлорида 15 мг; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Рак кожи, рак ротовой полости, языка и губ, карцинома глотки и гортани, рак легкого (особенно плоскоклеточный), карцинома пищевода, щитовидной железы, рак шейки матки, ретикулосаркома, лимфосаркома, болезнь Ходжкина, глиома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, фиброз легких и легочная недостаточность, заболевания сердца, почечная недостаточность.

Поб. действ.: Интерстициальная пневмония, фиброз легких; редко - головная боль, понижение аппетита, диарея, олигурия, лейкопения, аллергические реакции (кожные высыпания, гипертермия, анафилактический шок).

Взаим.: Вероятность побочных эффектов возрастает под влиянием других про-

тивоопухолевых средств, лучевой терапии.

Примен. и доз.: Парентерально (предварительно растворяют в 5-20 мл изотонического раствора): в/в (медленно) и в/м - по 15-30 мг, п/к - по 1 мг, в/а - по 5-15 мг; вводят обычно 2 раза в неделю. В зависимости от состояния можно вводить чаще - ежедневно, или реже - 1 раз в неделю. Курсовая доза - не более 300 мг.

Предост.: Следует с осторожностью (под врачебным контролем, корректировать дозы и др.) назначать пациентам с воспалительными заболеваниями легких, с патологией почек и печени, пожилым (старше 60 лет), получающим лучевую терапию или другие противоопухолевые препараты; при беременности.

Произв.: Iskra (Япония)

Бонафтон (Bonaphthonum)

Бонафтон

Сост. и ф.в.: 100 г глазной мази содержат бонафтона 50 мг; в алюминиевых тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Фармакодин.: Уменьшает тяжесть течения инфекционного процесса, уменьшает гиперемию конъюнктивы свода и глазного яблока, улучшает эпителизацию язв с последующей нормализацией структуры роговицы. Эффект определяется подавлением в клетках синтеза цитоплазматических белков, включающихся в состав капсидов, и нарушением транспорта компонентов капсида в клеточное ядро.

Показ.: Вирусные заболевания глаз (различные формы поверхностного герпетического кератита; глубокие формы офтальмогерпеса и аденовирусного кератоконъюнктивита). Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта (герпетический стоматит и гингивит с обширными эрозиями и язвами).

Поб. действ.: Ощущение жжения в глазу (проходит через 5-10 мин).

Примен. и доз.: При глубоких формах герпетического кератита, а также при осложненных рецидивирующих поверхностных кератитах применяют комбинированно: 0,05% мазь и таблетки. Мазь закладывают за веки 3-4 раза в сутки, ежедневно в течение 10-12 дней. При поверхностных герпетических кератитах и аденовирусных кератоконъюнктивитах препарат применяют только местно в виде 0,05% мази, которую закладывают за веки 3-4 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При тяжелых поражениях слизистой оболочки полости рта с обширными

эрозиями и язвами мазь наносят 4-6 раз в сутки на 5-10 мин.

Произв.: Татхимфармпрепараты (Россия)

Бондронат (Bondronat®)

Ибандронат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл концентрата для приготовления инфузий содержит 1,125 мг ибандроновой кислоты однонатриевой соли моногидрата, соответствующих 1 мг ибандроновой кислоты.

Фарм. действ.: Регуляция содержания кальция в костной ткани, ингибирование костной резорбции, увеличение костной массы.

Клин. фарм.: Эффективен в лечении остеолитической гиперкальциемии, вызванной злокачественными новообразованиями (множественная миелома, рак молочной железы) и гуморальной гиперкальциемии вследствие постоянно повышенного уровня паратиподобного белка, продуцируемого клетками опухоли, при раке почек или мелко-клеточном раке легкого. В большинстве случаев однократная инфузия бондроната приводит к нормализации уровня кальция в сыворотке крови и предотвращает рецидив гиперкальциемии в течение нескольких недель.

Показ.: Гиперкальциемия при злокачественных опухолях (при наличии или без метастазов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. бифосфонатам); выраженная почечная недостаточность (креатинин сыворотки крови > 5 мг% или 442 мкмоль/л); детский возраст (нет опыта клинического применения).

Бер. и корм. гр.: Не следует использовать при беременности и лактации.

Поб. действ.: Повышение температуры тела и др. симптомы гриппоподобного синдрома (озноб, ломящие боли в костях, мышцах), снижение почечной экскреции кальция, гипокальциемия; уменьшение сывороточного уровня фосфора, нарушения ЖКТ, бронхоспазм (у больных с бронхиальной астмой, гиперчувствительных к ацетилсалициловой кислоте).

Взаим.: Аминогликозиды усиливают гипокальциемический эффект.

Примен. и доз.: В/в, в виде инфузии в течение 2 ч (предварительно содержимое ампулы разводят в 500 мл изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора декстрозы). Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от выра-

женности гиперкальциемии и вида опухоли; больным с остеолитическими костными метастазами рекомендуется более низкая доза, чем больным с гуморальным типом гиперкальциемии. При выраженной гиперкальциемии (сывороточный уровень кальция с поправкой на сывороточный альбумин 3 ммоль/л или - 12 мг% и более) однократная доза - 4 мг; при умеренной гиперкальциемии (уровень кальция менее 3 ммоль/л) - по 2 мг. Максимальная доза - 6 мг. При необходимости (рецидив гиперкальциемии или недостаточная эффективность терапии) возможна повторная инфузия через 18-19 дней (после доз 2 и 4 мг) или 26 дней (после дозы 6 мг).

Предост.: Необходим тщательный контроль функции почек, уровня сывороточного кальция и магния. С осторожностью назначают на фоне гипомagneмии, в сочетании с аминогликозидами. У взрослых и больных преклонного возраста перед лечением следует проводить регидратацию (но не излишнюю, особенно у больных с риском развития сердечной недостаточности) 0,9% физиологическим раствором. Не рекомендуется в/а и п/к введение (из-за возможного повреждения окружающих тканей).

Произв.: Boehringer Mannheim (Германия)

Бонефос (Bonefos®)

Клодроновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит клодроната 400 мг; в упаковке 100 шт.

1 ампула с 5 мл концентрата для приготовления инфузий - 300 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Регуляция содержания кальция в костной ткани, ингибирование костной резорбции.

Показ.: Повышенная резорбция костной ткани при злокачественных заболеваниях, гиперкальциемия при злокачественных опухолях.

Поб. действ.: Диспепсия (оральный прием); протеинурия, повышение уровня креатинина, увеличение активности щелочной фосфатазы (при болюсном в/в введении).

Примен. и доз.: Внутрь и в/в капельно.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Бонцефин (Boncefina®)

Цефокситин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления

инъекционного раствора содержит цефокситина натрия 1 или 2 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, мочеполовых органов, костей и суставов, кожи и мягких тканей, внутрибрюшные и внутритазовые инфекции, перитонит, септицемия, эндокардит, смешанные инфекции, вызванные штаммами аэробных и анаэробных бактерий.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции почек, менингит, беременность, лактация, детский возраст (до 3 мес).

Поб. действ.: Тромбофлебит, диспепсия, лейкопения, нейтропения, гемолитическая анемия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: После предварительного разведения вводят в/м или в/в. Доза зависит от тяжести течения и локализации инфекции, чувствительности возбудителя. Обычная доза для взрослых 1-2 г каждые 8 ч, детям с 3 мес рекомендуется назначать по 20-40 мг/кг с интервалом 6-8 ч. Максимальная суточная доза - 200 мг/кг.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Боярышника настойка (Tinctura Crataegi)

Сост. и ф.в.: Жидкость во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Нормализация периферического кровотока, антиаритмическое.

Показ.: Функциональные расстройства сердечной деятельности, ангионеврозы, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 капель 3 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Бриетал (Brietal®)

Метогекситал*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит метогекситаля натрия 100 или 500 мг.

Фарм. действ.: Наркозное.

Клин. фарм.: Обладает ультракоротким действием.

Показ.: Вводный наркоз; общая анестезия при кратковременных оперативных вмешательствах; наркоз при длительных хирургических операциях (в комбинации с наркотическими анальгетиками и

ингаляционными анестетиками); наркоз при кратковременных хирургических, диагностических и терапевтических процедурах, сопровождающихся минимальными болевыми ощущениями.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции печени и сердечно-сосудистой системы, порфирия, наличие противопоказаний к проведению общей анестезии, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Тромбофлебит, гипотония, судороги, диспноэ, апноэ, ларингоспазм, бронхоспазм, икота, гиперактивность скелетных мышц (подергивание), головная боль и сонливость в послеоперационном периоде, беспокойство, тревожность, слюнотечение, тошнота, рвота, боль в животе, ринит, аллергические реакции (краснота, зуд, крапивница, анафилаксия) и боль в месте инъекции.

Взаим.: Депримирующие эффекты усиливаются препаратами, угнетающими ЦНС (включая этиловый спирт и пропиленгликоль). Может влиять на всасывание и выведение ряда препаратов (дифенилгидантоин, галотан, антикоагулянты, кортикостероиды, этиловый спирт, растворы, содержащие пропиленгликоль).

Примен. и доз.: В/в струйно - 1% раствор, капельно - 0,2% раствор. Для вводного наркоза 1% раствор вводится со скоростью 1 мл/5 с. Доза для вводного наркоза 50-120 мг или более, в среднем около 70 мг. Эта доза обеспечивает наркоз на 5-7 мин. Средняя доза для взрослых 1-1,5 мг/кг. Для поддержания наркоза можно применять струйное введение 1% раствора в разовой дозе 20-40 мг (2-4 мл 1% раствора) каждые 4-7 мин. Для непрерывной капельной инфузии вводят 0,2% раствор со средней скоростью около 3 мл/мин (1 капля/с). Скорость введения устанавливают индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Бриканил (Bricanyl®)

Тербуталин*

Бриканил инхалер (Bricanyl® Inhaler)

Тербуталин*

Бриканил Турбухалер (Bricanyl® Turbuhaler®)

Тербуталин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля (Бриканил инхалер) или 1 доза порошка (Бриканил турбухалер) для ингаляций содержит тербуталина сульфата соответственно 250 или 500 мкг; в упаковке по 400 или 200 доз.

1 таблетка - 2,5 или 5 мг; в упаковке 100 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 0,5 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое; стимуляция бета₂-адренорецепторов, противоотечное, улучшение оттока слизи.

Показ.: Бронхиальная астма, бронхоспастические заболевания легких, хронический бронхит, эмфизема.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертрофическая кардиомиопатия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Тремор, дрожание, тонические судороги, крапивница, нарушения сна (у детей).

Взаим.: Сочетание с ксантинами, стероидами, диуретиками увеличивает риск гипокалиемии.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Дозированный ингалятор: взрослым и детям старше 12 лет - 0,25 - 0,5 мг (1-2 ингаляции) каждые 6 ч (или по мере необходимости), в тяжелых случаях одна доза может быть увеличена до 6 ингаляций (не более 24 ингаляций в сутки); детям 5-12 лет - 0,25-0,5 мг (1-2 ингаляции) каждые 6 ч, в тяжелых случаях - доза до 4 ингаляций (не более 16 ингаляций в сутки). Ингаляции порошка: взрослым и детям старше 12 лет - 0,5 мг (1 ингаляция) каждые 6 ч или по мере необходимости, в тяжелых случаях одна доза может быть увеличена до 3 ингаляций (не более 12 ингаляций в сутки); детям 5-12 лет - 0,5 мг (1 ингаляция) каждые 6 ч, в тяжелых случаях доза - 2 ингаляции (но не более 8 ингаляций в сутки). Внутрь: взрослым в течение первых 1-2 нед - 2,5 мг 3 раза в день (до 5 мг 3 раза

в день); детям при массе меньше 20 кг - 1/4-1/2 таблетки или 2,5 мг 3 раза в день; при 20-30 кг - 1/2-1 таблетка (2,5 мг) 3 раза в день, при массе более 30 кг - 1-2 таблетки (2,5 мг) 3 раза в день. В/в, медленно взрослым - по 0,25-0,5 мг (0,5-1 мл) в 10 мл стерильного физиологического раствора в течение 5 мин, не более 2 мг в сутки (повторное введение возможно через несколько часов). В/в инфузии взрослым - 1-2 мг (2-4 мл) в течение 24 ч. Начальная ударная доза - до 0,1 мг (0,2 мл) вводится в течение первых 10 мин. Детям - до 25 мкг/кг (0,05 мл/кг) за 24-часовой период. Начальная доза - до 1,5 мкг/кг (0,003 мл/кг) вводится в течение первых 10 мин. П/к, взрослым - 1-2 мг (2-4 мл) за 24 ч, доза вводится в 4 приема; детям - до 25 мкг/кг (0,05 мл/кг) за 24 ч в 4 приема. Разводят 5 мг в 1000 мл раствора декстрозы (но не щелочными и солевыми растворами).

Произв.: Astra (Швеция)

Бриканил (Bricanyl®)

Тербуталин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тербуталина сульфата 2,5 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 0,5 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, токолитическое, стимуляция бета2-адренорецепторов.

Показ.: Бронхиальная астма, хронический бронхит, бронхоспастический синдром, эмфизема легких, угроза преждевременных родов, угрожающий аборт (с 16-й недели беременности), наложение швов для устранения преждевременных сокращений матки.

Противопоказ.: Гипертиреоз, тахикардия, метроррагия во время беременности, преждевременная отслойка плаценты, внутриматочная инфекция, хронический пиелит.

Поб. действ.: Тремор, сердцебиение.

Взаим.: Усиливает аритмогенный эффект галогенсодержащих общих анестетиков, гипертензивное действие ингибиторов МАО, выраженность повышения внутриглазного давления на фоне глюкокортикостероидов, с блокаторами бета-адренорецепторов - взаимный антагонизм. Запрещается назначать совместно с адреналином при астматическом статусе.

Примен. и доз.: При бронхиальной астме: внутрь, взрослым - по 2,5-5 мг 2-3 раза в день; детям 3-6 лет - 1/4-1/2

таблетки, 7-15 лет - 1/2-1 таблетка 3 раза в день. П/к, взрослым - по 0,25 мг до 3 раз в день. При акушерских показаниях: в/в капельно - длительность инфузии до 8 ч. Для приготовления раствора 5 мг препарата (10 мл) разводят в 1 л изотонического раствора глюкозы или натрия хлорида. Скорость введения определяется индивидуально с учетом эффективности и переносимости препарата и составляет 7-10 мкг/мин.

Произв.: Egis (Венгрия)

Бромазепам Ланнахер (Bromazepam Lannacher)

Бромазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит бромазепам 3 или 6 мг; в упаковке 20 или 50 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, анксиолитическое.

Показ.: Неврозы и психопатии (сопровождающиеся фобиями, тревогой, напряжением), нарушения сна (при неврозах страха), функциональные психосоматические расстройства сердечно-сосудистой (псевдостенокардия, артериальная гипертензия эмоционального генеза), дыхательной (гипервентиляция, затруднение дыхания, одышка), желудочно-кишечной (синдром раздражения толстого кишечника), урогенитальной (учащенное мочеиспускание, дисменорея) систем, психогенные головная боль и дерматозы, снятие тревоги и страха перед хирургическими и эндоскопическими манипуляциями.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к бензодиазепинам), лекарственная или алкогольная зависимость, миастения.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, ощущение усталости, сонливость, нарушение концентрации внимания, замедление психических и двигательных реакций, снижение памяти, атаксия, мышечная слабость, повышение аппетита, снижение либидо; редко - возбуждение, агрессивность, ощущение страха, расстройства сна, галлюцинации, суицидальные тенденции, сухость во рту, тошнота, диарея, нарушения функции печени и почек, артериальная гипотония, изменение картины периферической крови.

Примен. и доз.: Внутрь, на ночь 1,5-3 мг, при необходимости повышают вечернюю дозу до 6 мг, возможно назначение дополнительной дозы - по 1,5-3 мг 1-2 раза в течение дня. В стационаре - до 12-18 мг в сутки за 3-4 приема (снижение

суточной дозы проводят, сокращая дневной прием). Длительный курс лечения прекращают постепенно, снижая дозу.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Бромгексин (Bromhexinum)

Бромгексин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромгексина гидрохлорида 0,008 г; в упаковке 10 или 20 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, стимуляция синтеза сурфактанта.

Показ.: Хронические воспалительные заболевания легких (бронхиальная астма, муковисцидоз, туберкулез, трахеобронхит, спастический бронхит, бронхоэктазия, эмфизема легких, пневмокониоз), травмы грудной клетки, пред- и послеоперационный период.

Противопоказ.: Беременность (I триместр), детский возраст (до 3 лет).

Поб. действ.: Диспепсия, повышение активности аминотрансфераз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 3-4 раза в день; детям от 3 до 5 лет - 0,002 г, от 6 до 14 лет - 0,004 г 3 раза в день. Курс - от 4 до 28 дней.

Предост.: С осторожностью назначать при язвенной болезни ЖКТ.

Произв.: Акрихин (Россия)

Бромгексин 4 Берлин-Хеми (Bromhexine 4 Berlin-Chemie)

Бромгексин*

Бромгексин 8 Берлин-Хеми (Bromhexine 8 Berlin-Chemie)

Бромгексин*

Бромгексин 10 Берлин-Хеми (Bromhexine 10 Berlin-Chemie)

Бромгексин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 5 мл микстуры (1 мерная ложка или мерный колпачок) содержат бромгексина гидрохлорида 4, 8 или 10

мг; во флаконах по 60 и 100 мл.

1 драже - 8 мг; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, бронхосекретолитическое, секретомоторное.

Фармакокин.: После приема внутрь практически полностью всасывается. Связывание с белками плазмы 99%. Объем распределения около 7 л/кг. Проникает через гемато-энцефалический и плацентарный барьер, а также в грудное молоко кормящих. $T_{1/2}$ - от 1 до 16 ч. Выводится только с мочой в форме метаболитов.

Показ.: Острые и хронические заболевания бронхов и легких с нарушением отхождения мокроты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции.

Взаим.: Способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 14 лет - по 8-16 мг; детям до 6 лет - 4 мг, до 14 лет и пациентам с массой тела менее 50 кг - 8 мг 3 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают при язве желудка. Не разрешается применять с противокашлевыми средствами (кодеином), так как при подавленном кашлевом рефлексе возможен застой секрета в дыхательных путях.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Бромгексин 8-капли (Bromhexin 8-drops)

Сост. и ф.в.: 1 мл каплей для приема внутрь содержит бромгексина гидрохлорида 8 мг, фенхелевого масла 750 мкг, ментола 1,5 мг, анисового масла, масла тимьяна, масла мяты и эвкалиптового масла по 250 мкг; во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Секретолитическое, секретомоторное, спазмолитическое, антибактериальное.

Клин. фарм.: Увеличивает количество мокроты и серозный компонент бронхиального секрета, улучшает его отхождение за счет понижения вязкости и активации мерцательного эпителия. Входящие в состав препарата фенхелевое и анисовое масла (активные вещества анетол и фенхол) оказывают спазмолитический и противомикробный эффекты.

Показ.: Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания

дыхательных путей; бронхоэктатическая болезнь, сопровождающаяся нарушением образования бронхиального секрета и/или патологическим увеличением его вязкости.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью, только по назначению врача.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, тошнота, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, с жидкостью или на кусочке сахара. Взрослым и детям старше 6 лет - по 20 капель 4 раза в сутки; детям от 2 до 6 лет - по 10 капель 4 раза в сутки, до 2 лет - по 5 капель 4 раза в сутки. В начале лечения возможен прием более высоких доз (при условии врачебного контроля). Больным с тяжелой почечной недостаточностью следует уменьшить разовую дозу или увеличить интервал между приемами.

Предост.: Во время лечения для усиления секретолитического эффекта рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости. Следует учитывать, что в состав препарата входит этиловый спирт (41 об.%).

Произв.: Krewel Meuselbach (Германия)

Бромокриптин (Bromocriptin)

Бромокриптин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромкриптина 2,5 мг (в форме мезилата); в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ингибирование секреции пролактина и соматотропина, стимуляция дофаминовых рецепторов в ЦНС, антипаркинсоническое.

Показ.: Пролактинзависимая аменорея, олигоменорея, бесплодие, медикаментозная гиперпролактинемия, пролактиномы, торможение лактации, акромегалия, доброкачественные заболевания молочных желез, паркинсонизм.

Противопоказ.: Эссенциальный и семейный тремор, хорея Гентингтона, тяжелые формы артериальной гипертензии и заболеваний периферических артерий, эндогенные психозы, токсикоз беременности, повышенная чувствительность к алкалоидам спорыньи.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, рвота, запоры, ортостатическая гипотензия, спазм периферических артерий, головная боль, головокружение, утомляемость, психозы, галлюцинации, наруше-

ния зрения, дискинезия, судороги в икроножных мышцах.

Взаим.: Несовместим с алкалоидами спорыньи. Эффект снижается дофамин-блокаторами (бутирофеноны, фенотиазины); концентрацию в крови увеличивает эритромицин; переносимость ухудшается алкоголем.

Примен. и доз.: При пролактинзависимых нарушениях менструального цикла, женском бесплодии, пролактиномах, акромегалии, доброкачественных заболеваниях молочных желез начальная доза составляет 2,5-3,75 мг, принимается в 2-3 приема в день во время еды, в случае необходимости дозу постепенно увеличивают. Для торможения лактации после родов и аборта - 2,5 мг 2 раза в день в течение 14 дней (лечение начинают как можно раньше после родов или аборта, но не ранее, чем через 4 ч). Паркинсонизм - начальная доза 1,25 мг перед сном, при необходимости дозу увеличивают каждые 7 дней на 1,25 мг, средняя доза препарата - 10-20 мг в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Бромокриптин Поли (Bromocriptin Poli)

Бромокриптин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромкриптина мезилата 2,5 мг; в упаковке 30 шт.

1 капсула - 5 или 10 мг; в упаковке 30 или 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, дофаминомиметическое, ингибирование секреции пролактина (в малых дозах) и СТГ (у больных акромегалией).

Показ.: Галакторея (послеродовая, идиопатическая, опухолевая, лекарственная), пролактинзависимая аменорея без галактореи, гиперпролактинемическое бесплодие, нарушение менструального цикла (предменструальный синдром, укорочение лютеиновой фазы), пролактинзависимый гипогонадизм у мужчин, акромегалия, болезнь Паркинсона, паркинсонизм.

Противопоказ.: Беременность (в т.ч. предполагаемая), детский возраст (до 15 лет).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, головокружение, утомляемость, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации, психомоторные нарушения, гипотония, спазм периферических сосудов, бледность пальцев рук и ног при переохлаждении, дискинезии, обстипация.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды. Галакторея, пролактинзависимая амено-

рея, гиперпролактинемическое бесплодие - по 1,25-2,5 мг 2-3 раза в день (до прекращения лактации или нормализации менструального цикла). Нарушение менструального цикла (укорочение лютеиновой фазы) - по 1/2 таблетки 3 раза в день, затем дозу увеличивают до 1 таблетки 2 раза в день; предменструальный синдром, начиная с 14 дня цикла, - 1/2 таблетки в день, затем дозу увеличивают на 1/2 таблетку в день до 1 таблетки 2 раза в день до появления менструации. Мужской гипогонадизм - 1/2 таблетки 3 раза в день, дозу постепенно увеличивают до 1 таблетки 3 раза в день, курс лечения - 2-3 мес. Акромегалия - 1 таблетка в день с постепенным увеличением в течение 1-2 нед до 4-8 таблеток (в зависимости от клинического эффекта, индивидуальной потребности и толерантности). Болезнь Паркинсона - вначале по 2,5 мг 2 раза в день в течение одной недели, затем постепенное увеличение дозы на 5 мг (не более) каждые 2-3 дня - до 20 мг в день (и более при необходимости) до достижения оптимального эффекта.

Предост.: С осторожностью следует назначать больным с психическими расстройствами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ (язвы, кровотечения), работающим с механизмами и транспортными средствами. Не рекомендуется сочетать с гипотензивными и психотерапевтическими средствами, с алкалоидами спорыньи. Желательно тщательное обследование пациентов с плевро-пульмональными симптомами (возможно выпотевание жидкости в плевральную полость) и регулярное измерение АД у амбулаторных больных в первые дни лечения.

Произв.: CSC (Италия)

Бромэргон (Bromergon®)

Бромокриптин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромокриптина мезилата 2,5 или 10 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ингибирование секреции пролактина, гормона роста, дофамин-миметическое, антипаркинсоническое, гипотензивное.

Клин. фарм.: Уменьшает тремор, ригидность, акинезию и нарушение осанки при паркинсонизме.

Показ.: Гиперпролактинемия с бесплодием, аменореей, галактореей или нарушениями в лютеиновой фазе яичникового цикла, галакторея с нормальным содержанием пролактина в крови, фиброз-

но-кистозная мастопатия, лактационный и нелактационный маститы, мастопатия, предменструальный синдром, пролактинома, акромегалия, паркинсонизм, эссенциальная гипертензия, резистентная к терапии другими лекарствами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к алкалоидам спорыньи, неконтролируемая артериальная гипертензия, беременность.

Поб. действ.: Заложенность носа, тошнота, рвота, запоры, диспепсия, ортостатическая гипотензия, слабость, сонливость, психомоторное возбуждение, нарушения психики (галлюцинации, душевное смятение, психотические, паранойяльные и маниакальные состояния); холодовой ангиоспазм, нарушение функции мочевого пузыря, спазмы сосудов пальцев, дискинезия (у больных паркинсонизмом).

Взаим.: Алкоголь и другие средства, угнетающие ЦНС, усиливают влияние препарата на психофизические способности.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, по 2,5 мг 2-3 раза в сутки в течение нескольких месяцев (гиперлактинемия, бесплодие, галакторея, мастопатия, пуэрперальный, непуэрперальный мастит), при циклической и нециклической мастопатии - 2,5 мг 2 раза в сутки в течение периода овуляции, при предменструальном синдроме - по 2,5 мг 2 раза в сутки с 14-го дня менструального цикла до начала менструации, при акромегалии и пролактиноме - 5-10 мг 2 раза в сутки (до 60 мг в сутки), при паркинсонизме (при неэффективности "леводопа+карбидопа") начальная доза - 1,25 мг вечером, далее - 2,5 мг 2 раза в день с постепенным увеличением дозы до 30-100 мг в сутки (в сочетании с "леводопа+карбидопа" - средняя доза 15-30 мг в сутки).

Предост.: Необходима осторожность при вождении автомобиля и работе с механизмами.

Произв.: Lek (Словения)

Бронал (Bronal)

Терфенадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит терфенадина 60 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антигистаминное, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Фармакодин.: Не проникает через гематоэнцефалический барьер, не оказывает влияния на ЦНС.

Показ.: Аллергические заболевания: ринит, конъюнктивит, дерматозы, анги-

оневротический отек, бронхиальная астма.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, диспептические расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - средняя доза 60 мг 2 раза в день. Детям от 6 до 12 лет - суточная доза 30 мг (1/2 таблетки 2 раза в день).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Бронкатар® (Broncatar®)

Карбоцистеин*

Сост. и ф.в.: 100 мл сиропа (для детей или взрослых) содержит карбоцистеина 2 г (1 чайная ложка - 100 мг) или 5 г (1 столовая ложка - 750 мг); во флаконах по 125 или 300 мл соответственно.

Фарм. действ.: Муколитическое (отхаркивающее), нормализация соотношения кислых и нейтральных сиаломуцинов секрета бронхов, восстановление вязкости и эластичности мокроты, улучшение регенерации слизистой оболочки.

Показ.: Бронхит, трахеобронхит, ринит, ринофарингит, синуситы, отиты (у детей).

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поб. действ.: Тошнота, боли в желудке.

Взаим.: Несовместим с противокашлевыми препаратами или средствами, снижающими секреторную функцию бронхов.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 столовой ложке 3 раза в день; детям в возрасте до 5 лет - по 1 чайной ложке 1-2 раза в день, старше 5 лет - по 1 чайной ложке 3 раза в день, при отите - дозу можно удвоить. Курс лечения при острых заболеваниях - 8-10 дней, при хронических или повторных (ЛОР-инфекции, бронхиты) - 10 дней - 3 нед несколько раз в год.

Предост.: Осторожно следует назначать пациентам с сахарным диабетом (1 чайная или 1 столовая ложка содержат соответственно 3,5 и 6 г сахарозы), беременным и при лактации.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Бронхалис-Хель (Bronchalis-Heel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Belladonna D4, Sticta D4, Tartarus stibiatus D4, Kreosotum D5, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4 по 30 мг, Hyoscyamus D4, Bryonia D4 по 60 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, отхаркивающее, спазмолитическое, противокашлевое.

Показ.: Обструктивные и воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (катар курильщика, хронический бронхит, бронхиальная астма и др.).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Heel (Германия)

Бронхикум (Bronchicum®)

Сост. и ф.в.: 100 мл эликсира содержат настойки травы гринделии (1:5) 1 г, настойки корня полевого цвета (1:5) 200 мг, настойки корня первоцвета (1:5) 500 мг, настойки коры квебрахо (1:5) 700 мг и настойки тимьяна (1:5) 1 г; во флаконах по 130 и 325 мл; 100 мл капель для приема внутрь - настойки тимьяна (1:5) 22 мл, настойки белого мыльного корня (1:5) 19 мл и настойки коры квебрахо (1:5) 14 мл; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, противовоспалительное, отхаркивающее - капли. Противовоспалительное, муколитическое, уменьшение отека слизистой оболочки бронхов, устранение болезненного приступообразного кашля - эликсир.

Показ.: Острые и хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей, приступообразный кашель (эликсир).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Раздражение слизистой оболочки желудка.

Примен. и доз.: Капли назначают взрослым и подросткам внутрь - по 20-30 капель 3-5 раз в день, детям в возрасте 6-14 лет - по 20 капель, детям младшего возраста - до 15 капель на сахар или с горячим чаем. Перед употреблением флакон взболтать, слегка постучав по дну. Эликсир назначают взрослым - по 1 чайной ложке внутрь каждые 2-3 ч (до 6 раз в день). Детям младшего возраста - по 0,5-1 чайной ложке 2-3 раза в день.

Предост.: Следует помнить, что капли содержат 29,5% алкоголя, эликсир - 1,5% алкоголя. Больные сахарным диабетом могут принимать препарат, поскольку 20-30 капель соответствует 0,02-0,03 ХЕ; 5 мл (1 чайная ложка) эликсира соответствует 0,34 ХЕ.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхикум (Bronchicum® Hustentee)

Сост. и ф.в.: 25 г растворимого чая содержат 6,875 г обезвоженного экстракта следующего состава: кора корней *Piscidia* 2 г, кора ивы 6 г, плод аниса 1 г, масло аниса 0,02 г, плод фенхеля 0,75 г, масло фенхеля 0,029 г, трава медуницы 4 г, стебель плюща выющегося 3 г, корень цимицифуги 9,5 г, корень лакричника 6,5 г, хлористый аммоний 0,25 г, сапонин 0,1 г; порошок по 37,5 г во флаконе вместимостью 150 мл и порошок по 75 г во флаконе вместимостью 300 мл.

Фарм. действ.: Отхаркивающее.

Показ.: Заболевания верхних и нижних дыхательных путей с затрудненным отделением мокроты.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чашке чая 3 раза в день: одну чайную ложку чая кладут в чашку, заливают горячей водой и размешивают, чай можно подсластить. После взятия чая флакон следует немедленно закрыть.

Предост.: При наличии сахарного диабета необходимо принимать во внимание, что 1 чайная ложка чая соответствует 0,08 ХЕ.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхикум бальзам с эвкалиптовым маслом (Bronchicum® balsam)

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат эвкалиптового масла 14 г, хвойного масла 10 г, камфоры 4 г; во флаконах по 55 г.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, антимикробное, противовоспалительное.

Фармакокин.: Бальзам выделяет пары эфирных масел, попадающие в дыхательные пути. Кроме того, эфирные масла всасываются и через кожу и с током крови также достигают легких.

Показ.: Простудные заболевания верхних и нижних дыхательных путей.

Противопоказ.: Повреждения кожи, ожоги, бронхиальная астма, коклюш.

Поб. действ.: Раздражение кожи и слизистых оболочек, бронхоспазм, экзема.

Примен. и доз.: Наружно, ежедневно втирают гель в кожу груди и спины (следует избегать попадания на кожу

лица и носа, особенно у маленьких и грудных детей).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхикум ингалат (Bronchicum® inhalate)

Сост. и ф.в.: 100 мл эмульсии содержат эвкалиптового масла 7 г, хвойного масла 1 г, масла тимьяна 1 г; во флаконах по 50 мл с дозирующим стаканом.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, антимикробное, противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Простудные заболевания верхних и нижних дыхательных путей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхиальная астма, коклюш.

Поб. действ.: Усиление симптомов раздражения слизистой оболочки дыхательных путей, бронхоспазм, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Ингаляционно, по 5 мл 3 раза в день; мерный флакон заполняется до 5 мл метки, отмеренная доза выливается в миску, куда добавляют 1-2 л кипящей воды. Наклонившись над миской, накрывают голову платком и в течение 5 мин вдыхают пары через нос и рот.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхикум медицинские ванны с тимьяном (Bronchicum® medicinal bath with thyme)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для лечебной ванны содержат масла тимьяна 15 г; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, муколитическое, отхаркивающее.

Фармакокин.: Масло тимьяна частично всасывается через кожу.

Показ.: Заболевания верхних дыхательных путей, хронические бронхиты, простудные заболевания (без лихорадки).

Противопоказ.: Лихорадочный синдром, туберкулез, тяжелая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: 20-30 мл раствора добавляется к ванне с теплой водой (32-35 град.С) - заполняется примерно 1/3 ванны. Начинают принимать ванну и, постепенно заполняя ее водой, доводят температуру до 40 град.С. После ванны следует сохранять тепло тела. Перед ис-

пользованием флакон необходимо взболтать.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхикум пастилки от кашля (Bronchicum® Husten-pastillen)

Сост. и ф.в.: 1 пастилка содержит жидкого экстракта тимьяна 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, противокашлевое, противовоспалительное.

Показ.: Кашель при бронхите и других заболеваниях верхних дыхательных путей, затрудненное отделение мокроты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Несколько раз в день медленно рассасывать по 1-2 пастилки.

Предост.: Необходимо принимать во внимание, что 1 пастилка соответствует 0,07 ХЕ (для больных сахарным диабетом).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхикум сироп от кашля (Bronchicum® Husten sirup)

Сост. и ф.в.: 100 мл сиропа содержат меда 45 г, настойки травы гринделии (1:5) 0,2 мл, настойки корня пимпинеллы (1:5) 0,2 мл, настойки корня первоцвета (1:5) 1 мл, настойки цветков шиповника (1:5) 1 мл и настойки тимьяна (1:5) 1,2 мл; во флаконах по 130 или 325 г.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, противокашлевое, спазмолитическое, жаропонижающее.

Показ.: Заболевания верхних и нижних дыхательных путей с затрудненным отделением мокроты, кашель.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 чайной ложке каждые 2-3 ч (до 6 раз в день), детям младшего возраста - по 0,5-1 чайной ложке 2-3 раза в день.

Предост.: Следует помнить, что сироп содержит 1,7% алкоголя, и 5 мл (1 чайная ложка) препарата соответствуют 0,35 ХЕ (для больных сахарным диабетом).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Бронхо-мунал (Broncho-munal®) Бронхо-мунал П (Broncho-munal® P)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит лизат бактерий 3,5 (для детей) или 7 мг; в упаковке 10 шт. Лиофилизированный лизат бактерий, чаще всего вызывающих инфекции дыхательных путей (*Str.pneumoniae*, *St.aureus*, *Str.viridans*, *Str.pio-genes*, *Branhamella catarrhallis*, *H.influenzae*, *Kl.ozae-nae*).

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее (повышение гуморального и клеточного иммунитета), стимуляция перитонеальных макрофагов, повышение количества циркулирующих Т-лимфоцитов и анти-тел (иммуноглобулинов классов А, Г и М).

Показ.: Инфекционные заболевания дыхательных путей (острый и хронический бронхит, тонзиллит, ларингит, фарингит, ринит, синусит), в том числе резистентные к терапии антибиотиками, отит, бактериальные осложнения вирусных заболеваний дыхательных путей.

Противопоказ.: Первый триместр беременности.

Поб. действ.: Диспепсия (гастралгия, рвота, понос).

Примен. и доз.: Внутрь, утром натощак - 7 мг (детям - 3,5 мг) в течение 10-30 дней. В профилактических целях - по 1 капсуле в день в течение 10 дней подряд в месяц; курс - 3 мес (желательно начинать терапию каждый месяц в один и тот же день). При необходимости лечения антибиотиками препарат принимают одновременно с ними.

Произв.: Lek (Словения)

Бронхосан (Bronchosan®)

Бромгексин*

Сост. и ф.в.: В 100 мл раствора содержится бромгексина гидрохлорида 0,8 г, ментола 0,15 г, масла фенхеля 0,075 г, анисового масла 0,025 г, масла душицы обыкновенной 0,025 г, масла мяты перечной 0,025 г, масла эвкалипта 0,025 г, сахарозы 10 г, соляной кислоты 35% 0,039 г, калия дигидрофосфата 0,6 г, натрия дигидрофосфата 0,031 г, триглицоля 0,6 г, полисорбата 80 0,4 г, этилового спирта 95% 36 г; во флаконах по 25 мл.

Фарм. действ.: Муколитическое, отхаркивающее, усиление активности мерцательного эпителия, повышение секреции альвеолярного и бронхиального сурфактанта, стимуляция секреторной активности слюнных желез, антисептическое, обезболивающее, успокаивающее, спазмолитическое, противовоспалительное.

Фармакокин.: При приеме внутрь всасывается (бромгексин) почти полностью, максимальные концентрации в плазме достигаются через 1 ч. При первом прохождении через печень метаболизируется (путем конъюгации) почти на 80%, при этом образующиеся продукты усиливают эффект. Связывается с белками плазмы на 99%. Период полужизни в плазме составляет 4-5 ч, относительный период полуэлиминации (при в/в введении) - 10-12 ч (идет обратная диффузия из тканей). Выводится преимущественно почками; через 24 ч (после однократного приема) с мочой выделяется 35% (с калом 15%) дозы.

Показ.: Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемого бронхиального секрета (трахеобронхит, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма и др. бронхообструктивный синдром, пневмокониоз, муковисцидоз).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, желудочное кровотечение, первый триместр беременности, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции (эритема, отек кожи и слизистых оболочек), обратимое увеличение концентрации сывороточных трансаминаз.

Взаим.: Улучшает диффузию антибиотиков в бронхиальный секрет. Не рекомендуется комбинированное назначение бромгексина с цефалоспориновыми антибиотиками, препаратами, подавляющими кашлевой центр (накапливается большое количество слизи в дыхательных путях).

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 капель 4 раза в день, детям от 2 до 6 лет - по 10 капель 4 раза в день, детям младше 2 лет - по 5 капель 4 раза в день в небольшом объеме жидкости или на кусочке сахара. Для ингаляций препарат следует разбавить дистиллированной водой в соотношении 1:1 и нагреть до температуры тела. Ингаляцию проводят 2 раза в день, взрослым - по 4 мл на 1 ингаляцию, детям старше 10 лет - по 2 мл, от 6 до 10 лет - по 1 мл, от 2 до 6 лет - по 10 капель,

детям младше 2 лет - по 5 капель. При наличии у больного бронхообструктивного синдрома до ингаляции рекомендуется прием бронхолитика.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Брустан (Brustan®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ибупрофена ВР 400 мг и парацетамола ВР 325 мг; блистер с 10 таблетками в картонной упаковке.

Фарм. действ.: Анальгетическое, противовоспалительное, жаропонижающее.

Фармакокин.: Компоненты препарата не влияют на фармакокинетику друг друга.

Фармакодин.: Компоненты препарата обладают синергизмом и взаимодополняющими механизмами действия, что обеспечивает более быстрый и выраженный эффект.

Показ.: Легкий и умеренный болевой синдром при дегенеративных мышечно-скелетных заболеваниях (остеоартроз, остеохондроз, спондилез и др.); обострении ревматоидного артрита и др. воспалительных артропатий; внесуставных ревматических поражениях мягких тканей (миозит, фибромиалгия и др.); травмах (ушибы, переломы и вывихи, растяжение связок и т.д.) и операциях; зубная боль (кариес, периодонтит, после экстракции зуба); головная боль; боли в теле и при лихорадке; дисменорея; лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к компонентам препарата, эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ, тяжелое и умеренное поражение печени, почек или костного мозга, бронхиальная астма, заболевания зрительного нерва, беременность и лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, эрозивно-язвенное поражение ЖКТ, задержка натрия и жидкости, нарушение функции печени, почек, нарушение кроветворения, аллергические реакции.

Взаим.: Ибупрофен может вытеснять из связи с белками плазмы другие препараты (дигоксин, соли лития, метотрексат и др.), повышая их концентрацию. Парацетамол при назначении с гепатотоксическими средствами может усиливать их гепатотоксический эффект. Повышает действие непрямых антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая жидкостью, взрослым по 1 таблетке 3-4 раза в день, максимальная суточная доза 6 таблеток. Детям с массой

тела более 30 кг - по 1/2 таблетки 3 раза в день.

Предост.: Если на фоне лечения сохраняются лихорадка более 3-х дней или боли более 10-ти дней, следует обратиться к врачу.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Бруфен (Brufen®)

Ибупрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ибупрофена 200 или 400 мг соответственно; в упаковке 30 шт.

5 мл сиропа - 100 мг; во флаконах по 100 и 200 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, плечелопаточный периартрит (капсулит), бурсит, тендинит, тендосиновит, боли поясничные, послеоперационные, травматические, зубная, головная (мигрень), дисменорея и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст (при массе тела менее 7 кг).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, желудочно-кишечные кровотечения, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, в несколько приемов, взрослым - 1200-2400 мг в день; детям - 20 мг/кг, при ювенильном ревматоидном артрите в тяжелых случаях доза может быть увеличена до 40 мг/кг в день.

Произв.: Knoll (Германия)

Буерлецитин (Buerlecithin®)

Лецитин

Сост. и ф.в.: 100 мл жидкости содержат 9 г соевого лецитина; во флаконах по 250 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция нервной системы, клеточного обмена и дыхания, тонизирующее, общеукрепляющее, гипополидемическое.

Показ.: Ослабление внимания, снижение работоспособности, стресс, физические и эмоциональные перегрузки, переутомление, нервозность, бессонница, кардиалгия, профилактика атеросклероза, возрастные заболевания, период реабилитации после тяжелых заболеваний или родов, гиперлипидемия.

Примен. и доз.: Внутрь, ежедневно по 3-6 столовых ложек в течение длительного времени.

Предост.: С осторожностью назначают при болезнях печени, алкоголизме, эпилепсии, заболеваниях мозга, беременности и в детском возрасте, поскольку содержание этанола в препарате 16.4%.

Произв.: Roland (Германия)

Бурана (Burana®)

Ибупрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ибупрофена 200 или 400 мг; в упаковке 20 или 100 шт. и 10 или 100 шт., соответственно.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Остеохондроз, остеоартроз, артриты, боли (ревматоидные, послеоперационные, посттравматические, головная, зубная, невралгия, миалгия, артралгия), мигрень, дисменорея с сопутствующими болями, лихорадка.

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвенный колит, заболевания зрительного нерва, "аспириновая" бронхиальная астма.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, нарушения зрения.

Примен. и доз.: Внутрь, по 400-600 мг 3 раза в сутки, максимальная суточная доза - 2400 мг, поддерживающая - 800-1600 мг в сутки; детям - 20-40 мг/кг 3-4 раза в сутки.

Произв.: Orion (Финляндия)

Бутаамид (Butamidum)

Толбутаамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит толбутаамида 0,25 или 0,5 г; в упаковке 50 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Сахарный диабет инсулиннезависимый (II типа).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кетоацидоз, диабетическая кома, острые инфекционные заболевания, печеночно-почечная недостаточность, лейкопения, гранулоцитопения, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, диспепсия, нарушение функции печени, лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, начальная доза - 2 г в сутки (1 г утром за час до еды и

1 г в 5-6 ч вечера). Через 2 нед - 1 г утром и 0,5 г вечером. В дальнейшем дозу понижают до 0,5 и 0,25 г, соответственно, и менее. Высшие дозы: разовая - 1,5 г, суточная - 4 г.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Бутироксан (Butyrochanum)

Бутироксан

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бутироксана гидрохлорида 0,01 г; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 1 мл инъекционного раствора - 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Адренолитическое и центральное н-холинолитическое.

Показ.: Абстиненция (при алкоголизме и наркоманиях), артериальная гипертензия, аллергодерматозы, постинфекционные гипоталамические поражения.

Противопоказ.: Застойная сердечная недостаточность, гипотония, алкоголизм III степени.

Поб. действ.: Брадикардия, сосудистый коллапс.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 1-3 таблетки 2-4 раза в сутки в течение 1-4 нед. П/к и в/м - по 1-2 мл 1% раствора 1-4 раза в день. Высшие дозы: разовая - 30 мг, суточная - 150 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Буфенокс (Buphenoxum)

Буметанид*

Сост. и ф.в.: Ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит буметанида 0,5 мг.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отечный синдром при сердечной недостаточности, циррозе печени, гломерулонефрите, при позднем токсикозе беременности.

Противопоказ.: Гипокалиемия, острая почечная недостаточность, печеночная кома, острый гепатит, сахарный диабет, подагра.

Поб. действ.: Сухость во рту, жажда, слабость, тошнота, гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз.

Примен. и доз.: В/в и в/м. В/в медленно (растворив в 5% растворе глюкозы или физиологическом растворе). Разовая доза - 0,5-1,5 мг; повторное введение - через 4-8 ч. Суточная доза - до 5 мг. Курс - 3-4 дня.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Вазаппростан (Vazaprostan®)

Алпростадил*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 48,2 мг сухого вещества содержит алпростадил 20 мкг (в комплексе с альфадексом).

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антиагрегационное.

Фармакодин.: Вызывает дилатацию артериол и сфинктеров прекапилляров, улучшает микроциркуляцию за счет повышения гибкости эритроцитов, тормозит активацию нейтрофилов, повышает фибринолитическую активность.

Показ.: Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей III и IV стадий (по классификации Фонтейна).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, нарушения ритма сердца, перенесенный (в течение ближайших 6 мес) инфаркт миокарда, заболевания легких, язвенная болезнь ЖКТ, нарушение функции печени, беременность, лактация.

Поб. действ.: В месте введения - боль, отек, эритема, нарушение чувствительности. Головная боль, диспептические явления, снижение АД, ангиальные симптомы, тахикардия, судорожный синдром, повышение уровня трансаминаз, лейкопения или лейкоцитоз, изменение С-реактивного белка. Гиперостоз трубчатых костей (при лечении более 4 нед); отек легких и сердечная недостаточность (отдельные случаи).

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных средств, антикоагулянтов и антиагрегантов (вплоть до риска кровотечений).

Примен. и доз.: В/а или в/в. Для в/в введения 10 мкг препарата растворяют в 50 мл физиологического раствора. Вводят в течение 60-120 мин, используя устройство для инфузии. При необходимости дозу можно увеличить до 20 мкг. При введении через катетер - доза 0,1-0,6 нг/кг/мин в течение 12 ч через инфузор (эквивалентно 1/4-1/2 ампулы препарата). Для в/в введения 40 мкг препарата растворяют в 50-250 мл физиологического раствора, вводят в течение 3 ч 1 раз в сутки. При почечной недостаточности и уровне креатинина более 1,5 мг/дл введение препарата начинают с 20 мкг, продолжительность инфузии - 2 ч, кратность введения - 2 раза в сутки. В дальнейшем при хорошей переносимости дозу можно постепенно увеличить. Мак-

симальная продолжительность курса терапии - 4 нед.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Вазокардин (Vasocardin®)

Метопролол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метопролола тартрата 100 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, антиангинальное, антиаритмическое, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, аритмия, тиреотоксикоз.

Противопоказ.: AV-блокада, кардиогенный шок, сердечная недостаточность, хронические обструктивные заболевания легких, лабильный инсулинзависимый диабет, заболевания периферических сосудов.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, слабость, бессонница, депрессия, ухудшение зрения, одышка, брадикардия, гипотензия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 100 мг в день в два приема с последующим повышением дозы на 100 мг в день каждые 5-6 дней до достижения терапевтического эффекта.

Произв.: Slovakoфарма (Словакия)

Вазонит (Vasonit®)

Пентоксифиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард, покрытая оболочкой, содержит пентоксифиллина 600 мг; в упаковке 20 или 50 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, ангиопротективное, антиагрегационное, снижение вязкости крови, улучшение микроциркуляции.

Показ.: Нарушения периферического артериального и венозного кровообращения (облитерирующий эндартериит, атеросклероз, диабетическая ангиопатия, болезнь Рейно); ишемические нарушения мозгового кровообращения (ишемический церебральный инсульт, атеросклеротическая и дисциркуляторная энцефалопатия); трофические нарушения тканей, связанные с поражением артерий, вен или с нарушением микроциркуляции (посттравматический синдром, варикозное расширение вен, трофические язвы, гангрена, отморожение); острая, подострая и хроническая недостаточность кровообращения в сетчатке и в

сосудистой оболочке глаза; нарушения функции внутреннего уха, сопровождающиеся тугоухостью.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, острый геморрагический инсульт, массивное кровотечение, кровоизлияние в сетчатку глаза.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головные боли, головокружение, беспокойство, расстройства сна, ощущение прилива, нарушения сердечного ритма, тахикардия, снижение АД, потеря аппетита, чувство тяжести и боли в области желудка, тошнота, рвота, диарея, петехии на коже, слизистых оболочках, в ЖКТ, тромбоцитопения, апластическая анемия, кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1 таблетке (600 мг) 2 раза в сутки.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Ваксигрип (Vaxigrip)

Сост. и ф.в.: 1 доза вакцины содержит инактивированный очищенный вирус гриппа 3-х штаммов, состав которых и содержание НА-антигена изменяются каждый год в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Европейского комитета, тиомерсал (меньше или равно 0,05 мг), формальдегид (меньше или равно 0,10 мг), следы неомицина, буферный раствор (из натрия хлорида, калия хлорида, натрия гидрофосфата двуводного, калия дигидрофосфата и воды для инъекций) - до 0,5 мл. Раствор для инъекций в шприцах по 1 дозе.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против вирусов гриппа.

Фармакодин.: При иммунизации у 80-95% пациентов индуцируется формирование специфического гуморального и клеточного иммунитета. Противовирусные антитела вырабатываются через 10-15 дней после вакцинации и сохраняются как минимум в течение 1 года. Антигенность вакцины максимальна в связи с содержанием не только поверхностных, но и внутренних антигенов.

Показ.: Профилактика гриппа, особенно у лиц пожилого возраста (старше 65 лет), пациентов с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, серповидноклеточной анемией, врожденными и приобретенными иммунодефицитами; рекомендуется лицам, по роду своей деятельности имеющим ши-

рокие общественные контакты (медицинский персонал, учителя и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к белкам куриных яиц и неомицину, детский возраст (до 6 мес).

Бер. и корм. гр.: Нет данных, свидетельствующих о возможном риске для плода и угрозе фертильности при использовании данной вакцины. Для уменьшения теоретического риска нарушений внутриутробного развития плода рекомендуется воздержаться от использования препарата в течение первой четверти беременности. Целесообразность использования вакцины в этот период должна оцениваться с учетом потенциального риска заражения гриппом.

Поб. действ.: Местные реакции: болезненность, уплотнение, покраснение в месте инъекции. Общие реакции (в первые 48 ч): повышение температуры тела, головная боль, кашель.

Взаим.: Не имеется данных, свидетельствующих о несовместимости с другими препаратами. Особенный интерес представляет комбинация с вакциной для профилактики заболеваний, вызываемых пневмококками, т.к. лица, входящие в группу риска развития осложнений после перенесенного гриппа, входят также и в группу риска возникновения осложнений в результате пневмококковых инфекций.

Примен. и доз.: В/м или п/к. Рекомендуется следующая схема вакцинации: 1) у лиц старше 10 лет - одна инъекция 0,5 мл; 2) у детей в возрасте от 6 мес до 10 лет - две инъекции по 0,25 мл (1/2 дозы) с интервалом в 1 мес. Перед употреблением взболтать до гомогенизации. Ежегодная вакцинация должна проводиться осенью.

Предост.: Для вакцинации пациентов с иммунодефицитами необходимо решение врачебного консилиума.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Валерианахель (Valerianaheel®)

Сост. и ф.в.: 100 г 60% спиртового раствора содержат Valeriana 65 г, Lupulus, Crataegus, Hypericum D1 по 5 г, Melissa 3 г, Chamomilla, Avena sativa по 2 г, Acidum picrinicum D5 10 г, Kalium bromatum D1, Ammonium bromatum D1, Natrium bromatum D1 по 1 г; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Седативное, снотворное, анальгезирующее.

Клин. фарм.: Не влияет на безопасность при управлении транспортом.

Показ.: Беспокойство, тревога, невращения, повышенная нервная возбудимость, чувство страха, бессонница, в т.ч. вследствие нарушений функций печени (слабость по утрам); климактерические невроты (в сочетании с Кралонин, Климакт-Хель), лихорадка и острые инфекционные заболевания (сочетать с Грипп-Хель, Траумель С).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, обычно - 15 капель 3 раза в день; по вечерам - 25 капель. Детям от 2 до 6 лет - по 5 капель, от 6 до 12 лет - 10 капель.

Произв.: Heel (Германия)

Валерианы настойка (Tinctura Valerianae)

Сост. и ф.в.: Настойка на 70% спирте (1:5); во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Седативное, спазмолитическое.

Показ.: Повышенная нервная возбудимость, бессонница, мигрень, вегето-сосудистая дистония, спазмы ЖКТ, кишечная колика, истерия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сонливость, снижение работоспособности, подавленность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20-30 капель 3-4 раза в день; детям - 1 капля на год жизни.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Валидол (Validolum)

Сост. и ф.в.: Раствор ментола в метиловом эфире изовалериановой кислоты в капсулах; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Седативное, рефлекторное сосудорасширяющее.

Показ.: Стенокардия, невроты, истерия; морская и воздушная болезнь (тошнота, рвота).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Тошнота, слезотечение, головокружение.

Примен. и доз.: Сублингвально (до полного рассасывания) - по 0,05-0,1 г (до 0,6 г в сутки).

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Валидол® (Validolum®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 0,06 г раствора ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты; в контурной

ячейковой упаковке по 10 шт.

Капли для приема внутрь; во флаконах-капельницах оранжевого стекла по 5 мл.

Фарм. действ.: Седативное, сосудорасширяющее (рефлекторное).

Показ.: Стенокардия (купирование приступов), неврозы, истерия, морская и воздушная болезнь.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Легкая тошнота, слезотечение, головокружение (проходят самостоятельно).

Примен. и доз.: Таблетки держат под языком до полного растворения. Разовая доза для взрослых - 0,06-0,12 г, суточная - до 0,6 г. Жидкость - 4-5 капель наносят на кусочек сахара и держат во рту до полного рассасывания.

Произв.: Фармак (Украина)

Валидол с глюкозой (Validolum cum Glucoso)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит валидола 0,06 г, сахара 0,548 г и глюкозы 0,188 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, вазодилатирующее.

Показ.: Стенокардия, неврозы, истерия, морская болезнь.

Поб. действ.: Головокружение, слезотечение.

Примен. и доз.: Сублингвально (таблетку держать под языком до полного растворения), 2-4 раза в сутки.

Произв.: ICN Лексредства (Россия)

Валокордин® (Valocordin®)

Сост. и ф.в.: 1 мл (20 капель) содержит альфа-бромизовалериановокислого сложного этилового эфира и фенобарбитала по 0,018 г, а также хмелевое и мятное масла и спирт этиловый; во флаконах по 20 и 50 мл.

Фарм. действ.: Седативное, сосудорасширяющее (рефлекторное), снотворное, спазмолитическое.

Показ.: Боли в сердце (невротические), повышенная возбудимость, страх, нервозность, вегетативное возбуждение; психосоматические расстройства, нарушения засыпания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к брому, острая гепатитная порфирия, тяжелые нарушения функции почек и печени.

Бер. и корм. гр.: Применение во время беременности возможно только в случае крайней необходимости. Назначение

при лактации требует прекращения грудного вскармливания.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, снижение скорости реакции, аллергические реакции (на бром); при длительном применении - лекарственная зависимость, бромизм; при внезапной отмене препарата возможны явления абстиненции.

Взаим.: Усиливает эффект (взаимно) средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. алкоголя), снижает - производных кумарина, гризеофульвина, глюкокортикоидов, пероральных противозачаточных средств, повышает токсичность метотрексата. Действие возрастает на фоне вальпроевой кислоты и ее препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, с небольшим количеством жидкости; взрослым - по 15-20 капель 3 раза в день.

Предост.: Следует учитывать, что препарат содержит алкоголь (55 град).

Произв.: Krewel Meuselbach (Германия)

Валосердин® (Valoserdinum)

Сост. и ф.в.: 100 г жидкости содержат 2 г этилового эфира альфа-бромизовалериановой кислоты, 2 г фенобарбитала, 0,14 г масла мяты перечной и 0,02 г масла душицы (испанское хмелевое масло); во флаконах-капельницах по 15 мл.

Фарм. действ.: Седативное, спазмолитическое, отрицательное хронотропное.

Показ.: Неврозы, раздражительность, бессонница, кардиалгия, артериальная гипертензия, спазм коронарных сосудов, тахикардия, кишечная колика.

Поб. действ.: Головокружение, сонливость.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды - по 15-20 капель 2-3 раза в день. При тахикардии и спазмах сосудов разовую дозу увеличивают до 40-45 капель.

Произв.: Московская фармфабрика (Россия)

Валтрекс® (Valtrex®)

Валацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит валацикловира (L-валиновый эфир ацикловира) 500 мг.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Фармакокин.: Хорошо всасывается и превращается в ацикловир и валин. Биодоступность ацикловира при приеме 1000 мг составляет 54% и не снижается под влиянием пищи. С_{тах} ацикловира

(3,3-5,7 мкг/мл) после однократного приема (500-1000 мг) достигается через 1,5 ч. C_{max} валацикловира в плазме составляет лишь 4% от уровня ацикловира и определяется через 45-60 мин после приема; через 3 ч валацикловир из плазмы исчезает. $T_{1/2}$ ацикловира после однократного и повторного применения валацикловира - 3 ч. Менее 1% введенной дозы обнаруживается в моче. Выводится в виде ацикловира и его метаболита 9-карбоксиметоксиметилгуанина.

Фармакодин.: In vitro активен в отношении вирусов простого герпеса 1 и 2 типов, вируса Варицеллы Зостер, цитомегаловируса, вируса Эпштейн-Барр, человеческого вируса герпеса 6 типа. После фосфорилирования с образованием активного трифосфата конкурентно ингибирует вирусную ДНК-полимеразу и приводит к прекращению синтеза вирусной ДНК и блокаде репликации вируса.

Показ.: Опоясывающий герпес (в т.ч. боли при острой и постгерпетической невралгии); инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусом простого герпеса (в т.ч. впервые выявленный и рецидивирующий генитальный герпес); профилактика рецидива простого герпеса.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к ацикловиру).

Поб. действ.: Головная боль, тошнота. Возможны - почечная недостаточность, микроангиопатическая гемолитическая анемия, тромбоцитопения (при длительном приеме 8 г/сутки на фоне иммунодефицита).

Передоз.: Возможно удаление с помощью гемодиализа.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при опоясывающем герпесе - по 1000 мг 3 раза в день (7 дней), простом герпесе - по 500 мг 2 раза в день; при рецидивах в течение 5 дней. При первом эпизоде с тяжелым течением длительность лечения может быть увеличена до 10 дней.

Предост.: У больных с почечной недостаточностью необходима коррекция дозы. У пожилых людей следует поддерживать адекватную гидратацию.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Ванкоцин (Vancocin)

Ванкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инфузионного раствора содержит ванкомицина 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции, вызванные метициллинрезистентными стафилококками, и при непереносимости пенициллинов и цефалоспоринов, сепсис, остеомиелит, инфекции нижних дыхательных путей, кожи и кожных структур, эндокардит, псевдомембранозный колит, энтероколит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Анафилактические реакции (гипотензия, затруднение и нарушение дыхания, крапивница и зуд); покраснение верхней части тела, боль и мышечный спазм в области спины и груди, почечная недостаточность, азотемия, интерстициальный нефрит, нарушение слуха, головокружение, шум в ушах, обратимая нейтропения; тромбоцитопения, лихорадка, тошнота, озноб, эозинофилия, сыпи (включая эксфолиативный дерматит), синдром Стивенса - Джонсона, васкулит, флебит в месте введения.

Взаим.: Увеличивает вероятность развития побочных эффектов одновременное применение с анестетиками (эритема, гистаминоподобные приливы и анафилактоидные реакции), усиливает нейротоксичность/или нефротоксичность других препаратов (аминогликозиды, полимиксин В, колистин, виомицин, циспластин).

Примен. и доз.: В/в капельно, со скоростью не более 10 мг/мин; продолжительность инфузии не менее 60 мин. Взрослым назначают по 500 мг каждые 6 ч или по 1 г 2 раза в сутки (через 12 ч). Новорожденным и детям раннего возраста начальная доза 15 мг/кг, затем по 10 мг/кг каждые 12 ч (в первую неделю жизни) и каждые 8 ч (до 1 мес). Детям старше 1 мес - 10 мг/кг каждые 6 ч. У больных с нарушением почечной функции и у пожилых больных режим дозирования корректируют с учетом значений клиренса креатинина.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Ванмиксан (Vanmixan®)

Ванкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для парентерального введения содержит ванкомицина 500 мг; в коробке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, подавление биосинтеза микробной стенки.

Показ.: Инфекции, вызванные стафилококками (включая метициллинрезистентные): респираторные, остеомиелит,

эндокардит, септицемия; стрептококками (включая энтерококки); при переносимости бета-лактаминов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, снижение слуха.

Бер. и корм. гр.: Безопасность применения при беременности не установлена.

Поб. действ.: Анафилактические реакции (при быстром в/в введении): зуд; высыпания на лице, шее, плечах, спине; пульсирующая боль в мышцах спины и шеи; ототоксичность, нефротоксичность, тошнота, рвота, крапивница, кожная пятнистая сыпь, эозинофилия, нейтропения.

Взаим.: Несовместим с другими нефро- и ототоксичными препаратами.

Примен. и доз.: В/в, капельно, в течение не менее 60 мин. Взрослым - по 500 мг каждые 6 ч или по 1 г каждые 12 ч (30 мг/кг/день). Детям и младенцам - 10 мг/кг каждые 6 ч (40 мг/кг/день). При поражениях ЦНС - 15 мг/кг каждые 6 ч (60 мг/кг/день). Новорожденным 0-7 дней - начиная с 15 мг/кг, затем - 10 мг/кг в 30-минутном вливании каждые 12 ч; 7-30 дней - 15 мг/кг каждые 8 ч (при мониторинге содержания антибиотика в сыворотке).

Предост.: Пациентам пожилым или с нарушением функции почек необходим контроль почечных и слуховых функций. Вводить следует только в/в.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Велбе (Velbe)

Винбластин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит винбластин сульфата 10 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Генерализованная форма болезни Ходжкина; лимфоцитарная лимфома (узловая и диффузная формы, высоко- и малодифференцированная); гистиоцитарная лимфома; грибовидный микоз; рак яичек, молочной железы; саркома Капоши; болезнь Леттерера-Сиве; хориокарцинома.

Противопоказ.: Выраженная гранулоцитопения, не являющаяся следствием лечения основного заболевания; бактериальные инфекции.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Лейкопения, гранулоцитопения, анемия, тромбоцитопения, алоpecia, тошнота, рвота, боли в животе, паралитическая непроходимость кишечника, изъязвления в полости рта, фарингит, диарея, геморрагический энтероко-

лит, кровотечения из ЖКТ, парестезии, снижение глубоких сухожильных рефлексов, периферические невриты, депрессия, головная боль, судороги, гипертония, усиление симптоматики болезни Рейно, общее недомогание, боли в костях, головокружение, изъязвление кожи, аспермия у мужчин, светобоязнь, поражение VIII пары черепно-мозговых нервов, дыхательная недостаточность, бронхоспазм, прогрессирующая одышка, нарушение секреции антидиуретического гормона, воспаление, флебит и некроз в месте инъекции.

Взаим.: Снижает концентрацию фенитоина в крови (уменьшает противосудорожную активность). Необходима осторожность при комбинированном применении с другими ототоксичными препаратами (содержащие платину онколитики и др).

Примен. и доз.: В/в 1 раз в неделю. Начальная доза для взрослых - 3,7 мг/м² поверхности тела, для детей - 2,5 мг/м²; дозу повышают постепенно по схеме до максимальной (не более 18,5 мг/м² для взрослых и 12,5 мг/м² для детей). В случае снижения лейкоцитов до 3000/мм³ дальнейшее повышение дозы не проводят, а для поддерживающей терапии выбирают дозу предыдущей ступени (средняя доза составляет 5,5-7,4 мг/м²). Следующая доза не назначается до тех пор, пока число лейкоцитов не достигнет 4000 клеток/мм³.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Велорин (Velorin)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит атенолола 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертония, стенокардия, аритмии, инфаркт миокарда.

Противопоказ.: Синусовая брадикардия, АВ-блокада II и III степени, кардиогенный шок, выраженная сердечная недостаточность.

Поб. действ.: Чувство холода в конечностях, мышечная утомляемость, брадикардия, нарушение сна, сухость глаз, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь (взрослым). При гипертонии - обычно по 50-100 мг в день однократно. При стенокардии - по 100 мг 1 раз в день или по 50 мг 2 раза в день. При аритмии - по 50-100 мг в день однократно (после устранения аритмии

в/в вливанием). При инфаркте миокарда - в течение первых 12 ч по 5 мг каждые 15 мин, в поддерживающей дозе - по 50 мг через 12 ч и далее по 100 мг в день в течение 10 дней.

Предост.: Не рекомендуется давать детям. Следует отменить прием перед операцией (интервал между последней дозой и наркозом должен быть не менее 2 дней). С осторожностью назначают при застойной сердечной недостаточности (особенно в сочетании с препаратами дигиталиса), больным с бронхоспазмом, беременным (только, если польза для матери превышает потенциальную опасность для плода). Лицам престарелого возраста и при тяжелых нарушениях функции печени и почек требуется снижение дозы. Необходимо иметь в виду, что атенолол может маскировать проявление гипогликемии (устраняет тахикардию). Нельзя внезапно прекращать лечение у больных ИБС.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Венза (Vensa®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Aesculus D1 15 мл, Hamamelis D6 10 мл, Carduus D6 10 мл, Pulsatilla D12 10 мл, Lachesis D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Противоотечное, противовоспалительное, венотонизирующее, анальгезирующее, снижение хрупкости и проницаемости капилляров, улучшение микроциркуляции.

Показ.: Осложненный и неосложненный варикозный симптомокомплекс: варикозное расширение вен нижних конечностей, флебит, посттравматический тромбоз, варикозная экзема, трофические язвы, геморрой.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды, 3 раза в день за 30 мин до или через 1 ч после еды. При острых состояниях - каждые 0,5-1 ч по 5-7 капель до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Произв.: Bittner (Австрия)

Венитан® (Venitan®)

Сост. и ф.в.: 100 г крема содержат экстракт семян конского каштана 5 г (20% эсцина); в тубах по 50 г.

100 г геля содержат эсцина 1 г; в тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Противоотечное, венотонизирующее, снижение хрупкости и проницаемости капилляров, устранение венозного застоя.

Показ.: Нарушения периферического кровообращения, венозный застой, воспалительные и варикозные заболевания вен, чувство тяжести в ногах при беременности или продолжительном стоянии, отеки и гематомы, обусловленные ударами или уколами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Наносят на пораженные участки 3-4 раза в день.

Произв.: Lek (Словения)

Венорутон® (Venoruton®)

Рутозид*

Венорутон® форте (Venoruton® forte)

Рутозид*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит рутозида 300 мг; в упаковке 50 шт.

1 г геля - 20 мг; в тубах по 40 г.

1 таблетка форте - 500 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ангиопротективное, уменьшение проницаемости и ломкости капилляров.

Показ.: Боль, отечность, трофические язвы и другие симптомы при варикозной болезни и хронической венозной недостаточности; варикоз и геморрой при беременности (начиная с 4-го месяца); посттромботический синдром; геморрой (в т.ч. осложнения), профилактика и лечение гипертонической, атеросклеротической и диабетической ретинопатии, профилактика состояний преходящей слепоты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Диспептические явления, головная боль, приливы, аллергические высыпания на коже, местные кожные реакции (гель).

Примен. и доз.: Таблетки форте: по 1 таблетке 2 раза в сутки во время еды

(при ретинопатии - по 1-2 таблетки 2 раза во время еды). Капсулы: по 2-3 капсулы в сутки во время еды. После исчезновения патологических симптомов (обычно через 2-4 нед) продолжить лечение в течение нескольких недель для закрепления достигнутых результатов. Гель: наносить на кожу и втирать легкими массирующими движениями.

Произв.: Novartis Consumer Health (Швейцария)

Вентакс® (Ventax®)

Теофиллин

Сост. и ф.в.: 1 капсула ретард содержит теофиллина безводного 100, 200 или 300 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, уменьшение сосудистого сопротивления (в легочной артерии), повышение сердечного выброса, диуретическое.

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность - 88-100%. Бронходилатирующий эффект появляется при концентрации теофиллина 5 мкг/мл и нарастает пропорционально увеличению логарифма концентрации. Связь с белками плазмы составляет около 60%. Проникает через плацентарный барьер, обнаруживается в грудном молоке. Метаболизируется в печени. $T_{1/2}$ у некурящих - 5-10 ч, у курильщиков - 4-5 ч, удлиняется при легочной и сердечной недостаточности, поражениях печени, вирусных инфекциях, лихорадке. Около 10% выводится почками в неизмененном виде.

Фармакодин.: Ингибирует фосфодиэстеразу и увеличивает внутриклеточную концентрацию ц-АМФ; блокирует высвобождение медиаторов воспаления и действие аденозина, стимулирует дыхательный центр, нормализует перфузионные процессы в легких, увеличивает выброс адреналина и норадреналина надпочечниками, частоту и силу сердечных сокращений, гастро-эзофагальный рефлюкс, стимулирует секрецию желудочного сока. Повышая почечный кровоток и клубочковую фильтрацию, увеличивает диурез.

Показ.: Лечение и профилактика бронхоспазма при хронических обструктивных заболеваниях легких, расстройства дыхания центрального генеза, ночное апноэ, легочная гипертензия, легочно-сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эпилепсия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в

фазе обострения), детский возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: В период беременности (особенно в I триместре) может использоваться, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. С осторожностью назначают лактирующим женщинам (выделяется с грудным молоком).

Поб. действ.: Редко - тошнота, рвота, диарея, головная боль, беспокойство, возбуждение, расстройство сна, тремор, ощущение сердцебиения, аритмия.

Взаим.: Снижает активность бета-блокаторов, солей лития. Эффект усиливают: фуросемид, бета₂-адреномиметики, метилксантины, эфедрин и эфедринсодержащие препараты; последние, кроме того, повышают риск развития побочных эффектов. Фенобарбитал, рифампицин, фенитоин, карбамазепин, сульфипиразон, курение увеличивают клиренс теофиллина (снижают действенность), а макролиды, линкомицин, аллопуринол, бета-блокаторы, циметидин, пероральные контрацептивы, напротив - уменьшают.

Примен. и доз.: Внутрь, капсулы принимают целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Взрослым - по 300 мг после еды 2 раза в день (утром и вечером). При первом назначении пациентам с массой тела 60 кг и выше начинают с вечернего приема 200 мг, затем - по 200 мг 2 раза в сутки; при массе менее 60 кг - с вечернего приема 100 мг, затем - по 100 мг 2 раза в сутки; дозу постепенно повышают, с интервалом в 1-2 дня, увеличивая суточную дозу на 100-200 мг. Поддерживающая доза для пациентов с массой выше 60 кг - 600 мг в сутки, ниже 60 кг - 400 мг. У пациентов с поражениями сердца и печени и массой тела выше 60 кг поддерживающая доза - 400 мг в сутки (возможно до 720 мг), менее 60 кг - 200 мг в сутки (возможно - до 480 мг в сутки) за 2 приема (утром и вечером). Пациентам с ускоренным метаболизмом (курильщики) и массой тела выше 60 кг назначают 600 мг вечером и 300 мг утром (возможно - 1,08-1,26 г в сутки); с массой менее 60 кг - 400 мг вечером и 200 мг утром (0,72-1,08 г в сутки). Детям 6-8 лет - 400-600 мг в сутки, 8-12 лет - 600-800 мг в сутки, 12-18 лет - 0,72-1,08 г в сутки (кратность назначения - 2 раза в сутки.).

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Вентер (Venterum)**Сукральфат***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сукральфата 0,5 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, повышение синтеза простагландинов в слизистой желудка.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказ.: Выраженные нарушения функции почек, беременность.

Поб. действ.: Запоры.

Взаим.: Снижает всасывание тетрациклинов.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин-1 ч до еды в суточной дозе 4 г (8 таблеток): по 1 г перед завтраком, обедом и ужином и на ночь. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения - 4-6 нед (может быть продлен до 12 нед).

Произв.: Акрихин (Россия)

Вентодиск® (Ventodisk®)**Сальбутамол*****Вентолин® (Ventolin®)****Сальбутамол****Общее описание*

Сост. и ф.в.: 1 доза порошка для ингаляций (Вентодиск) содержит сальбутамола сульфата 200 или 400 мкг; в ротадисках по 8х15 шт. (120 доз) в комплекте с дискхайлером.

1 таблетка (Вентолин) содержит сальбутамола сульфата 2 мг; в упаковке 100 шт.

5 мл сиропа - 2 мг; во флаконах по 150 мл.

1 доза аэрозоля для ингаляций - 100 мкг; в баллончиках по 200 доз.

Фарм. действ.: Бронходилатирующее, селективная стимуляция бета₂-адренорецепторов бронхов.

Фармакодин.: Предотвращает антиген-индуцированное высвобождение гистамина и других медиаторов из тучных клеток. Оказывает минимальное влияние на бета₁-рецепторы.

Клин. фарм.: Бронходилатация после ингаляции сохраняется в течение 4 ч.

Показ.: Бронхиальная астма (лечение и профилактика), обструктивные заболевания дыхательных путей (бронхит, эмфизема), купирование бронхоспазма при хроническом бронхите, физических нагрузках.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом и втором триместре беременности.

Поб. действ.: Судороги мышц, тремор, головная боль, парадоксальный бронхоспазм, расширение периферических сосудов и тахикардия у больных с повышенной чувствительностью к бета-адреностимуляторам и при превышении пероральных доз. Аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, гипотония, коллапс).

Взаим.: Совместим с ингибиторами МАО.

Передоз.: Проявляется гиперстимуляцией бета-адренорецепторов. Лечение - кардиоселективные бета-блокаторы.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Ингалятор "Вентолин Дискхайлер": взрослым - купирование бронхоспазма - 200 или 400 мкг, профилактика - 400 мкг 3-4 раза в день. Детям: купирование бронхоспазма - 200 мкг, профилактика - 200 мкг 3-4 раза в сутки. Для предотвращения бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, перед началом работы, взрослым - 400 мкг, детям - 200 мкг. Дозированный аэрозоль: купирование бронхоспазма - одна или 2 ингаляции однократно, профилактика - две ингаляции 3-4 раза в день. Детям - купирование бронхоспазма - одна ингаляция, профилактика - одна ингаляция 3-4 раза в день. Внутрь, взрослым - 4 мг (или 10 мл сиропа) 3-4 раза в день, при отсутствии адекватной бронходилатации разовую дозу увеличивают до 8 мг, пожилым пациентам или с повышенной чувствительностью к бета-адреностимуляторам - начальная доза 2 мг 3-4 раза в день. Детям от 2 до 6 лет - по 1-2 мг (или 2,5-5 мл сиропа) 3-4 раза в день; от 6 до 12 лет - 2 мг (5 мл сиропа), свыше 12 лет - 2-4 мг 3-4 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью применяют при тиреотоксикозе. Не следует назначать в сочетании с неселективными бета-блокаторами (пропранололом). Сироп, разбавленный очищенной водой, можно использовать не более 28 дней. Не рекомендуется смешивать с другими жидкими препаратами.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Вепезид (Vepesid®)**Этопозид***

Сост. и ф.в.: 1 мягкая желатиновая капсула содержит этопозид 50 и 100 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, остановка митоза на стадии G₂ клеточного цикла.

Фармакокин.: У взрослых выделение из плазмы крови носит двухфазный характер. Время полупрохождения терминальной фазы (T_{1/2} бета) составляет 7 ч (интервал 3-12 ч). Стационарный объем распределения - 28% от массы тела. При концентрации 10 мкг/мл 94% препарата связано с белками сыворотки. После в/в введения в течение 72 ч 44-60% выделяется с мочой (67% в виде неизмененного препарата, остальная часть - метаболиты) и 2-16% - с фекалиями.

Показ.: Опухоли яичка, устойчивые к другим видам терапии, лимфогранулематоз, злокачественные лимфомы (особенно гистиоцитарного типа), острый нелимфоцитарный лейкоз, мелкоклеточные анапластические опухоли легких.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности и возможности зачатия. При кормлении грудью принимать с учетом важности препарата для матери.

Поб. действ.: Миелосупрессия: лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, понос, анорексия, стоматит, алоpecia, гипотензия (при быстром в/в введении), анафилактические реакции (озноб, тахикардия, бронхоспазм, одышка, гипотензия); периферическая нейропатия; сонливость, чувство усталости, поражения печени, привкус во рту, повышение артериального давления, кожные высыпания, дерматит.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды; 100-200 мг/кв.м поверхности тела с 1-го по 5-й день или 200 мг/кв.м/сутки в 1-й, 3-й и 5-й дни с интервалом 3-4 нед. В/в, медленно (в течение 30-60 мин). Препарат разбавить 5% раствором глюкозы и 0,9% раствором хлористого натрия до конечной концентрации от 0,2 до 0,4 мг/мл. Доза - от 50 до 100 мг/кв.м/сутки с 1-го по 5-й день или 100 мг/кв.м в 1-й, 3-й или 5-й дни с интервалом 3-4 нед.

Предост.: Перед началом, во время и после окончания терапии необходим контроль картины крови (количество тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина, дифференциальная формула крови). При содержании тромбоцитов менее 50000/куб.мм или нейтрофилов менее 500/куб.мм дальнейшее лечение пре-

кращают до восстановления картины крови.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Верапамил (Verapamil)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит верапамила гидрохлорида:

40 мг; в упаковке 50, 100 и 500 шт.

80 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое.

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия и пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотония, кардиогенный шок, АВ-блокады, сердечная недостаточность, выраженная брадикардия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, брадикардия, гипотония, сердечная недостаточность, головная боль, гиперемия (лицо).

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, запивая небольшим количеством воды; взрослым - 40-120 мг в день (при стенокардии и суправентрикулярной тахикардии - в 3 приема, при гипертонии - в 2), суточная доза при гипертонии - до 320 мг (возможна комбинация с диуретиками). Детям при гипертонии - 10 мг/кг (в разделенных дозах), при суправентрикулярной аритмии - до 2 лет - по 20 мг 2-3 раза в день, в более старшем возрасте - дозы аналогичны взрослым.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Верапамил (Verapamil)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит верапамила гидрохлорида 80 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антиаритмическое, гипотензивное (блокада "медленных" кальциевых каналов).

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов), ишемическая болезнь сердца, аритмии, артериальная гипертония.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, левожелудочковая недостаточность, кардиогенный шок, АВ-блокада II-III степени, синдром слабости синусового узла, артериальная гипотония, синдром WPW.



Поб. действ.: Головокружение, тошнота, головная боль, покраснение лица, гипотония, васкулиты, нарушения AV-проводимости, запоры.

Взаим.: Усиливает отрицательные ино-, хроно- и дромотропные эффекты бета-адреноблокаторов, других антиаритмических средств, несовместим с ингаляционными анестетиками.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, запивая небольшим количеством воды, - по 80 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 480 мг.

Прозв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Верапамил (Verapamil)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит верапамила хлорида 80 или 120 мг; в упаковках 50 шт. по 80 мг или 20 шт. по 120 мг.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиаритмическое, антиангинальное.

Показ.: Острая и хроническая коронарная недостаточность, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий с высокой частотой сокращения желудочков, суправентрикулярная экстрасистолия, стабильная и нестабильная стенокардия, стенокардия Принцметала, артериальная гипертензия, гипертрофическая кардиомиопатия, гипертонический криз (в/в введение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, AV-блокада II-III степени (кроме больных с искусственным вентрикулярным пейсмейкером), тяжелая гипотония, дисфункция синусного узла (кроме больных с искусственным пейсмейкером), WPW-синдром и Лоуна-Ганона-Левина с трепетанием или фибрилляцией предсердий (кроме больных с искусственным пейсмейкером), выраженная брадикардия, застойная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, острый инфаркт миокарда.

Бер. и корм. гр.: Только по строгим показаниям.

Поб. действ.: Запор, тошнота, головокружение, слабость, головная боль, отек легких, диспноэ, периферические отеки, гипотония, застойная сердечная недостаточность, брадикардия, AV-блокада, отек десен, кожная сыпь, гемодинамические расстройства при в/в введении (у новорожденных и грудных детей).

Взаим.: Бета-адреноблокаторы повышают риск возникновения гипотонии, бра-

дикардии, застойной сердечной недостаточности. Снижает выведение и увеличивает концентрацию в плазме крови карбамазепина, циклоспорина, хинидина и дигоксина. Несовместим с дизопирамидом, прокаинамидом и др. препаратами, удлиняющими QT-интервал.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - 120-480 мг в сутки в 3 приема; максимальная суточная доза - 720 мг (кратковременно, в исключительных случаях). При стенокардии - 80-120 мг 3 раза в день. При аритмии больным, принимающим препараты наперстянки, - 240-320 мг в сутки в 3-4 приема. Для профилактики пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии больным, не принимающим препараты наперстянки, - 240-480 мг в сутки в 3-4 приема. При артериальной гипертензии начальная доза - 80 мг 3 раза в сутки (гипотензивное действие стабилизируется к концу первой недели), далее дозу подбирают в зависимости от состояния. При гипертрофической кардиомиопатии - до 720 мг в сутки. Грудным и детям младшего возраста - по 20 мг 2-3 раза в сутки, детям дошкольного возраста - по 40-120 мг 2-3 раза в сутки, детям школьного возраста - до 320 мг в сутки в 3 приема. Пожилым, больным с небольшой массой тела или с нарушениями функции печени суточная доза не должна превышать 120 мг (по 40 мг 3 раза). При гипертоническом кризе и пароксизмальной тахикардии вводят в/в медленно (в течение 2 мин) 5 мг (под контролем АД и ЭКГ) с возможным повторением через 5-10 мин или капельно (5-10 мг/ч) - до суточной дозы 100 мг. Новорожденным - в/в - 0,75 мг (0,3-0,4 мл), детям грудного возраста - 0,75-2 мг (при сердечной недостаточности необходимо сначала назначить сердечные гликозиды наперстянки), детям 1-5 лет - 2-3 мг, детям 6-14 лет - 2,5-5 мг. При гипертоническом кризе у детей введение начинают с дозы 0,05-0,1 мл/кг/ч, при необходимости дозу увеличивают в течение 30-60 мин до общей суточной дозы 1,5 мг/кг.

Прозв.: Belupo (Хорватия)

Верапамила гидрохлорид (Verapamilum hydrochloridum)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит верапамила гидрохлорида 0,04 или 0,08 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антиаритмическое, гипотензивное, отрицательное ино-, хроно- и дромотропное, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия, пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, предсердная экстрасистолия, стенокардия, артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная брадикардия, кардиогенный шок, застойная сердечная недостаточность, АВ-блокада, артериальная гипотония, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, тошнота, гиперемия (лица), застойная сердечная недостаточность, запоры. Редко - нервозность, заторможенность, повышенная утомляемость.

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных средств и ослабляет действие сердечных гликозидов.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды. Взрослым - по 0,04-0,08 г 3 раза в сутки. При необходимости разовая доза может быть увеличена до 0,16 г. Максимальная суточная доза - 0,48 г. Детям до 5 лет - по 0,04-0,06 г в сутки, 6-14 лет - 0,08-0,36 г в 3-4 приема. Курс - от 14 дней до 6-8 мес. Поддерживающая доза может применяться годами.

Произв.: Акрихин (Россия); Тюменский химфармзавод (Россия)

Верапамил гидрохлорид (Verapamili hydrochloridum)

Верапамил*

Верапамил (Verapamilum)

Верапамил*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл инъекционного раствора содержит верапамила гидрохлорида 5 мг.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 80 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное и антиаритмическое (блокада "медленных" кальциевых каналов).

Показ.: Суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия, пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, предсердная экстрасистолия, стенокардия.

Противопоказ.: Застойная сердечная недостаточность, АВ-блокада, беременность.

Поб. действ.: Брадикардия, гипотония, головокружение.

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных средств и ослабляет действие сердечных гликозидов.

Примен. и доз.: В/в струйно в течение 1-2 мин - по 2-4 мл 0,25% раствора (5-10 мг). Повторное введение можно проводить через 30 мин. Поддерживающее капельное введение проводят со скоростью 0,005 мг/кг/мин 1 раз в день - 2 мл 0,25% раствора препарата в 100-150 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы. Внутрь, независимо от приема пищи - по 0,04-0,08 г 3-4 раза в день. При необходимости разовая доза может быть увеличена до 0,16 г. Курс - от 14 дней до 6-8 мес. Поддерживающая доза может применяться годами.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Вермокс (Vermox)

Мебендазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 100 мг мебендазола; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Антигельминтное.

Показ.: Энтеробиоз, трихоцефалез, аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз, тениоз, комбинированные инвазии, вызываемые указанными гельминтами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Преходящие боли в животе, диарея (в отдельных случаях), аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек).

Взаим.: Циметидин повышает концентрацию в плазме.

Примен. и доз.: При энтеробиозе взрослым и детям старше 1 года - 100 мг однократно; повторный однократный прием препарата через 2 и 4 нед. При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомидозе и комбинированных гельминтных инвазиях взрослым и детям старше 1 года - 100 мг 2 раза в день, утром и вечером, в течение 3 последовательных дней. При тениозе и стронгилоидозе взрослым - 200 мг 2 раза в день в течение 3 последовательных дней, до полного излечения; детям - 100 мг 2 раза в день в течение 3 последовательных дней.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Верошпирон (Verospiron)**Спиринолактон***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 25 мг микронизированного кристаллического спиринолактона; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, калийсберегающее, конкурентный антагонизм с альдостероном. диуретическое, калийсберегающее.

Показ.: Гиперальдостеронизм (включая его диагностику), гипокалиемия, артериальная гипертензия, отеочный синдром.

Противопоказ.: Значительные нарушения функции почек, острая почечная недостаточность, анурия, гиперкалиемия, первый триместр беременности, лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, кишечная колика, диарея, головная боль, сонливость, летаргия, психические расстройства, атаксия, дисменорея, метроррагия в климактерическом периоде, гинекомастия, гирсутизм, огрубление голоса, снижение эрекции, лекарственная лихорадка, крапивница.

Взаим.: Усиливает эффект диуретиков и гипотензивных препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь по 25-200 мг/сутки за 2-4 приема (при гиперальдостеронизме до 400 мг/сутки), при улучшении состояния дозу постепенно уменьшают до 25 мг/сутки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Вертигохель (Vertigoheel®)

Сост. и ф.в.: 100 г 35% спиртового раствора содержат Coccus D4 70 г, Conium D3, Ambra D6 и Petroleum D8 по 10 г, во флаконах-капельницах по 30 мл. 1 таблетка содержит Coccus D4 210 мг, Conium D3, Ambra D6 и Petroleum D8 по 30 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Психотропное; стимуляция метаболических процессов в ЦНС.

Фармакодин.: Не оказывает седативного действия.

Клин. фарм.: Не влияет на безопасность при управлении транспортом.

Показ.: Головокружения неврогенного и сосудистого генеза, церебральный атеросклероз, сотрясения головного мозга и его последствия; морская и воздушная болезнь, синдром Меньера.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Совместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10 капель или по 1 таблетке 3 раза в сутки, при

приступах головокружения и тошноты - по 10 капель или 1 таблетке каждые 15 мин.

Произв.: Heel (Германия)

Весаноид (Vesanoid)**Третиноин***

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит третиноина 10 мг; в упаковке (блистеры или флаконы) 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Индукция ремиссии при остром промиелоцитарном лейкозе (у больных, ранее нелеченных, с рецидивами, рефрактерных к стандартной химиотерапии).

Противопоказ.: Беременность, лактация; нельзя назначать женщинам детородного возраста, если не используется надежная контрацепция (не позже, чем за месяц до начала, во время и не менее месяца после окончания лечения).

Поб. действ.: "Синдром ретиноевой кислоты" (лихорадка, одышка, чувство нехватки воздуха, острый респираторный дистресс-синдром, легочные инфильтраты, гиперлейкоцитоз, гипотония, плевральный выпот, почечная, печеночная или полиорганная недостаточность, летальный исход; ксеродермия, хейлит, сыпь, эритема, зуд, целлюлит, сухость слизистых, внутрикожные кровоизлияния, ксерофтальмия, усиленное потоотделение, дерматит, отеки, тошнота, рвота, диарея, запоры, стоматит, головные боли, спутанность сознания, внутричерепная гипертензия, возбуждение, депрессия, боли в костях, повышение уровней триглицеридов, холестерина, трансаминаз в сыворотке; нарушение сердечного ритма, кашель, заложенность носа, фарингит, дыхательная недостаточность, пневмония, нарушение зрения и слуха, свертываемости крови, слабость, летаргия, аномалии развития плода.

Примен. и доз.: Внутрь, в суммарной суточной дозе 45 мг/кв.м поверхности тела, разделенной на 2 приема. Лечение продолжают от 30 до 90 дней, до полной ремиссии, затем переходят на стандартную схему химиотерапии (два семидневных курса дауномицина и цитозина арабинозида с интервалом 5-6 нед).

Предост.: При значительном повышении количества лейкоцитов в крови, с целью профилактики "синдрома ретиноевой кислоты" следует присоединить полнодозную химиотерапию.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Вессел Дуэ Ф (Vessel Due F)

Сулодексид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит сулодексида 250 ЕД; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 600 ЕД; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное, антиадгезивное, фибринолитическое.

Показ.: Сосудистая патология с повышенным риском тромбообразования.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, геморрагический диатез, заболевания, связанные с повышенным риском кровотечений.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Диспептические расстройства - тошнота, рвота и др. (капсулы), боль, жжение и гематомы в месте введения (ампулы), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь (между приемами пищи) по 1 капсуле 2 раза в день. В/м или в/в 1 ампула в день в течение 15-20 дней, затем 30-40 дней прием капсул. Полный курс лечения следует повторять не менее 2 раз в год.

Произв.: CSC (Италия)

Вибуркол (Viburcol®)

Сост. и ф.в.: 1 свеча содержит Chamomilla D1, Belladonna D2, Dulcamara D4 и Plantago major D3 по 1,1 мг, Pulsatilla D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 мг; в упаковке 12 шт.

Фарм. действ.: Седативное, противовоспалительное, противосудорожное, спазмолитическое, анальгезирующее.

Показ.: Симптоматическое лечение синдрома интоксикации (лихорадка, головная боль, диспептические расстройства, бессонница, возбуждение и т.п.) при инфекционно-воспалительных заболеваниях внутренних органов; спазмы ЖКТ и пищеварительные расстройства у детей (метеоризм); энурез.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Ректально, по 1 свече несколько раз в сутки; после улучшения - по 1 свече 2-3 раза в день. Детям с первых дней жизни до 6-месячного возраста максимальная доза - 1 свеча 2 раза в сутки.

Произв.: Heel (Германия)

Видайлин-М (Vidaylin-M)

Сост. и ф.в.: 5 мл сиропа содержат ретинола пальмитата 0,9 мг (3000 МЕ), эргокальциферола 10 мкг (400 МЕ), тиамина хлорида 1,5 мг, рибофлавина 1,2 мг, пиридоксина хлорида 1 мг, цианокобаламина 3 мкг, аскорбиновой кислоты 50 мг, никотинамида 10 мг, пантенола 5 мг, фосфата (в виде кальция гипофосфата и гипофосфорной кислоты) 43 мг, магния (глюконата) 3 мг, цинка (в виде глюкогоптоната) 0,5 мг, йода (йодида калия) 75 мг, железа (глюконата) 3 мг, марганца (глюконата) 0,5 мг, холина (битартрата) 5 мг, инозитола 5 мг; во флаконах по 90 мл.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минералов.

Показ.: Отставание в росте и развитии у детей (в т.ч. в грудном возрасте); снижение аппетита, потеря в весе; период реконвалесценции после заболеваний, сопровождающихся высокой температурой, послеоперационный период, рахит (латентный), позднее прорезывание зубов; переутомление у детей (после напряженных занятий в школе или спортом); дефицит витаминов и минеральных солей (заболевания ЖКТ, печени и желчных путей, алкоголизм, беременность, лактация), в качестве добавки к неполноценному питанию.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 2-3 чайных ложки в день; детям всех возрастов, кроме грудных - по 1 чайной ложке в день; грудным детям - по 1/2 чайной ложки в день.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Видекс (Videx®)

Диданозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для разжевывания или диспергирования содержит диданозина 25, 50, 100 или 150 мг; во флаконах по 60 шт.

1 однократный пакетик с порошком для приготовления орального раствора - 100, 167, 250 или 375 мг; в упаковке 30 шт.

1 флакон вместимостью 125 или 250 мл с порошком для приготовления педиатрического раствора - 2 или 4 г.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Фармакокин.: При пероральном приеме биодоступность составляет 33+/-14% дозы и снижается вдвое, если препарат принимается через 1-2 ч после еды. Распределяется равномерно, объем распределения - 0,81+/-0,22 л/кг. Т_{1/2} - 1,58+/-0,6 ч; не кумулирует. Равновес-

ная концентрация в спинномозговой жидкости составляет 20% от плазменной. Почечный клиренс - 6,4 мл/мин/кг. На 20% выделяется с мочой путем гломерулярной фильтрации и канальцевой секреции.

Фармакодин.: В клетке диданозин под действием ферментов превращается в дидезоксиаденозин 5'-трифосфат, который подавляет активность обратной транскриптазы ВИЧ-1, как за счет конкуренции с природным субстратом, так и за счет включения в вирусную ДНК, нарушает элонгацию цепи ДНК и останавливает рост молекулы вирусной ДНК.

Показ.: ВИЧ инфекция.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности используется только при наличии убедительных показаний; во время лечения кормление грудью следует прекратить.

Поб. действ.: Панкреатит, тошнота, рвота, боли в животе, увеличение активности амилазы или липазы, нарушение функции печени, анорексия, диспепсия, повышенное газообразование в кишечнике, периферическая нейропатия, онемение, ощущение покалывания или боли в ступнях ног или кистях рук, понос, озноб, головная боль, астения, сиалоаденит, гипертрофия околоушных слюнных желез, сухость во рту и глазах, артралгия, миопатия, гипо- и гипергликемия; высыпания и зуд, анафилактические реакции; редко - рабдомиолиз, острая почечная недостаточность, депигментация сетчатки и неврит зрительного нерва, гепатит, сахарный диабет, миалгия, алоpecia, лейкопения, тромбоцитопения, изменение уровня мочевой кислоты.

Взаим.: Антациды, содержащие магний или алюминий, усиливают побочные эффекты. Препараты, всасывание которых зависит от кислотности в желудке (кетоконазол, дапсон) должны приниматься за 2 ч до приема Видекса. Не рекомендуется одновременный прием с тетрациклинами.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до приема пищи. Перед приемом 2 таблетки разжевывают, измельчают вручную или диспергируют в 1/4 стакана воды (суспензию можно разбавить 1/4 стакана яблочного сока). Порошок растворяют в стакане воды (не смешивать с жидкостями, содержащими кислоту), хорошо размешивая. Взрослым с массой более 60 кг - по 200 мг (в таблетках) 2 раза в день или по 250 мг порошка 2 раза в день; с массой менее 60 кг - по 125 мг (в таблетках) или 167 мг (порошка) 2 раза в день.

Интервал между приемами составляет 12 ч. Детям: 120 мг/кв.м 2 раза в день. Больным с анурией (находящимся на диализе) - используют 1/4 общей суточной дозы 1 раз в день.

Предост.: Лечение следует прекратить при появлении признаков панкреатита. С осторожностью назначают пациентам с панкреатитом в анамнезе, употребляющим алкоголь, с повышенным содержанием триглицеридов, нарушением функции почек.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Викасол (Vicasolum)

Менадиона натрия бисульфит*

Сост. и ф.в.: 1 мл инъекционного раствора содержит менадиона (водорастворимая форма витамина К3) 10 мг.

Фарм. действ.: Гемостатическое, стимуляция синтеза факторов свертывания крови (II, VII, IX, X).

Показ.: Гипопротромбинемия, обтурационная желтуха, гепатит, цирроз печени, паренхиматозные и капиллярные кровотечения; лучевая болезнь, повышенная ломкость сосудов, диспротеинемия.

Противопоказ.: Гиперкоагуляция, тромбоз эмболии, гемолитическая болезнь новорожденных.

Поб. действ.: Гемолитическая анемия.

Примен. и доз.: В/м, по 10-15 мг, суточная доза - 0,03 г; для детей: до 1 года - 2-5 мг, до 2 лет - 6 мг, 3-4 лет - 8 мг, 5-9 - 10 мг, 10-14 лет - 15 мг, новорожденным - до 4 мг в течение 3-4 дней подряд, после чего делают перерыв на 4 дня.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Викасол (Vicasolum)

Менадиона натрия бисульфит*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит викасола 0,015 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Повышение свертываемости крови, стимуляция синтеза II, VII и др. факторов свертывания, АТФ, креатинфосфата.

Показ.: Кровотечения (геморроидальные, носовые, маточные, легочные при язве ЖКТ, операциях, ранениях и др.), гипопротромбинемия (кровоточивость, геморрагические диатезы), обтурационная желтуха, гепатиты, цирроз печени; длительная диарея, миастения, атония кишечника, геморрагическая болезнь новорожденных, повышенная ломкость сосудов, диспротеинемия.

Противопоказ.: Гиперкоагуляция, тромбоэмболия, гемолитическая болезнь новорожденных.

Бер. и корм. гр.: Показано профилактическое применение в последнем месяце беременности (5-6 раз).

Поб. действ.: Гемолиз эритроцитов, метгемоглобинемия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 15-30 мг/сутки, суточная доза для детей до 1 года - 2,5 мг, до 2 лет - 6 мг, 3-4 лет - 8 мг, 5-9 лет - 10 мг, 10-14 лет - 15 мг, новорожденным - до 4 мг в течение 3-4 дней подряд, после чего делают перерыв на 4 дня.

Произв.: Акрихин (Россия)

Винбластин (Vinblastine)

Винбластин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит винбластин сульфата 5 мг; в комплекте с растворителем в ампулах по 5 мл, в упаковке 10 комплектов.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Лимфогранулематоз, лимфо- и ретикулосаркома, хронический лейкоз, рак яичка.

Противопоказ.: Лейкопения, бактериальные инфекции.

Поб. действ.: Агранулоцитоз, лейкопения, стоматит, анорексия, тошнота, рвота, понос, парестезии, головная боль, депрессия, носовые кровотечения, алоpecia, крапивница.

Примен. и доз.: В/в, в/в капельно, начальная доза - 0,025-0,1 мг/кг, ежедневно контролируют число лейкоцитов, при отсутствии снижения их до менее 2000-3000 через неделю повторяют инъекцию в дозе 0,15 мг/кг (при числе лейкоцитов не менее 4000). В дальнейшем, при отсутствии лейкопении, разовую дозу можно увеличить до 0,2 мг/кг. Между инъекциями необходимо соблюдать 7-дневный интервал и регулярно контролировать число лейкоцитов в крови. После достижения терапевтического эффекта назначают поддерживающую дозу - 0,15 мг/кг, которую вводят каждые 7-14 дней до достижения ремиссии. При числе лейкоцитов меньше 3000 необходимо прервать лечение и профилактически назначить антибиотики. Детям: 1 раз в неделю по 0,075-0,3 мг/кг. Повторно препарат вводят после нормализации числа лейкоцитов. Если первая доза не вызвала уменьшения числа лейкоцитов, дозу увеличивают.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Винизоль (Vinisolum)

Сост. и ф.в.: 1 аэрозольный баллон по 60 г содержит винилина (бальзам Шостаковского) - 15 г, линетола - 14,9 г и цитраля - 0,1 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, ускорение регенерации.

Показ.: Ожоги, гранулирующие и инфицированные раны, трофические язвы, пролежни.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наружно, распыляют на пораженную поверхность в течение 1-3 с с расстояния 20-30 см 2-3 раза в неделю. В тяжелых случаях - ежедневно 2 раза в сутки или чаще.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Винилин (Бальзам Шостаковского) (Vinylinum - Balsamum Schostakowsky)

Поливинилбутиловый эфир

Сост. и ф.в.: Жидкость во флаконах по 100 г.

Фарм. действ.: Бактериостатическое, противовоспалительное, ускорение эпителизации.

Показ.: Фурункулез, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, маститы, ранения мягких тканей, ожоги, отморожения; изжога, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дизентерия, колиты.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чайной ложке в первый прием, последующие - по 1 десертной ложке 1 раз в сутки (при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - спустя 5-6 ч после последнего приема пищи, удобнее - в 11-12 ч ночи с таким расчетом, чтобы легкий ужин был принят больным в 6 ч вечера). Курс лечения - 16-18 дней. При гастритах с высокой кислотностью, при мучительных изжогах принимают на ночь: первый день - 1 чайная ложка, затем - по 1 десертной ложке через день в течение 10-12 дней. При дизентерии и колитах - местно через ректоскоп по 25-30-40 мл от 3 до 9 дней.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Винкристин (Vincristine)

Винкристин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит вин-

кристина сульфата 0,5 мг, в комплекте с изотоническим раствором хлорида натрия в ампулах по 10 мл; в упаковке 10 комплектов.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Острый лимфобластный лейкоз, лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы, рабдомиосаркома, нейробластома, опухоль Вильмса, саркома костей и мягких тканей, саркома Юинга, рак молочной железы, рак легких мелкоклеточный, опухоли плотной консистенции у взрослых (в качестве компонента химиотерапии), идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Противопоказ.: Гипоплазия костного мозга, заболевания нервной системы.

Поб. действ.: Лейкопения, нейропатия, парестезии, атаксия, невриты черепно-мозговых нервов, миастения, запоры, боль в животе, тошнота, алоpecia, гиперурикемия, урикемическая нефропатия, лихорадка.

Примен. и доз.: В/в струйно или капельно 1 раз в неделю, разводя содержимое одного флакона в 10 мл изотонического раствора хлорида натрия. Разовая доза для взрослых - 1-1,4 мг/кв.м (максимум 2 мг/кв.м), курсовая - не более 10-12 мг/кв.м. При нарушениях функции печени назначают меньшую дозу. Детям: 1,5 мг/кв.м раз в неделю в течение 4-6 нед.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Винкристин (Vincristine®)

Винкристин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит винкристина сульфата 1 мг, во флаконах по 1, 2 и 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Фармакокин.: После в/в введения более 90% связывается с тканями. Плохо проникает в спинномозговую жидкость. Подвергается метаболизму в печени. Выводится с калом (80%) и с мочой. Кинетика выведения трехфазная, $T_{1/2}$ составляет 19-155 ч.

Показ.: Острые лейкозы (монокимиотерапия); лимфогранулематоз, рабдомиосаркома, нейробластома, лимфомы, опухоль Вильмса, остеогенная саркома, саркома Юинга, рак молочной железы и шейки матки, мелкоклеточный рак легких, опухоли половых органов у девочек (полихимиотерапия).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Судороги с повышением АД, парестезии, парез кишечника, рвота, потеря массы тела, полиурия, дизурия, нарушение секреции АДГ, одышка, бронхоспазм, лихорадка, головная боль, поражение черепно-мозговых нервов, атаксия, алоpecia, аменорея, азооспермия.

Взаим.: Несовместим с рентгенотерапией. Снижает элиминацию L-аспарагиназы.

Передоз.: Лечение сводится к предупреждению синдрома нарушения секреции АДГ (ограничение потребления жидкости, назначение диуретика, действующего на уровне петли Генле и дистальных канальцев), введению фенобарбитала (для предупреждения судорог), других симптоматических средств, промыванию кишечника (с целью предупреждения его непроходимости).

Примен. и доз.: В/в, с интервалом между двумя инъекциями не менее одной недели. Средняя доза для ребенка - 2 мг/кв.м, для взрослого - 1,4 мг/кв.м (но не более 2 мг на одну инъекцию). При печеночной недостаточности доза не должна превышать 1 мг. Раствор препарата может быть введен непосредственно в вену или в резиновую трубку другой, уже осуществляемой перфузии. Длительность инъекции должна составлять примерно 1 мин.

Предост.: Вводится строго в/в (нельзя вводить в спинномозговой канал - риск смертельного исхода, избегать попадания препарата в глаза). При лечении винкристином отменяют рентгенотерапию. Рекомендуются ощелачивание мочи и контроль содержания мочевой кислоты (может вызывать поражения почек, обусловленные мочевой кислотой, образующейся при массовом распаде опухоли). Не следует комбинировать с другими средствами, обладающими нейротоксическим действием.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Винкристин сульфат (Vincristine sulfate)

Винкристин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с порошком для приготовления инъекционного раствора или 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержат винкристина сульфата 1 мг. Порошок в ампулах в комплекте с растворителем в ампулах.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Острый лейкоз, болезнь Ходжкина, нелимфогранулематозные злокачественные лимфомы (лимфоцитарные, смешанноклеточные, гистиоцитарные, недифференцированные, узелковых и диффузных типов); рабдосаркома; нейробластома; опухоль Вильямса; остеогенная саркома; грибовидный микоз; саркома Юинга; рак молочной железы; злокачественная меланома; овсяно-клеточная карцинома легкого; гинекологические опухоли у детей; тромбоцитопеническая пурпура (при неэффективности других методов).

Противопоказ.: Демиелинизирующая форма синдрома Шарко-Мари-Тус.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Спазмы ЖКТ, тошнота, рвота, запор, диарея, паралитическая непроходимость кишечника, язвы в ротовой полости, некроз или перфорация стенки кишечника, анорексия, потеря чувствительности, парестезия, невралгии, нарушения двигательной функции, снижение глубоких сухожильных рефлексов, атаксия, изолированный парез, паралич мышц, нарушение функций черепно-мозговых нервов (особенно VIII пары: глухота, головокружение, нистагм), боли в костях, спине, конечностях, мышцах, полиурия, дизурия, задержка мочеиспускания, гипертензия или гипотензия, нарушение секреции антидиуретического гормона, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, выпадение волос, чувство жара, головная боль, дыхательная недостаточность, бронхоспазм, аллергические реакции (анафилаксия, сыпь, отек).

Взаим.: Снижает содержание фенитоина в крови. Усиливает нейротоксичность других лекарств. Конкурентное действие винкристина сульфата и нитраконазола (ингибитор печеночного метаболизма) является причиной более быстрого начала действия и/или увеличения количества нервно-мышечных осложнений, несовместим с L-аспарагиной (последнюю можно вводить только через 12-24 ч).

Примен. и доз.: Вводится только в/в 1 раз в неделю. Средняя доза взрослым 1,4 мг/м². Больным с высоким уровнем билирубина в сыворотке (выше 3 мг/100 мл) дозу снижают на 50%. Для детей средняя доза 2 мг/м², для детей с массой тела до 10 кг начальная доза составляет 0,05 мг/кг в неделю.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Винпоцетин (Vinpocetine)

Винпоцетин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит винпоцетина (этилового эфира аповинкаминной кислоты) 5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антигипоксантающее, антиагрегационное, блокада фосфодиэстеразы.

Фармакокин.: Препарат хорошо всасывается (степень резорбции при приеме внутрь близка к 57%); T_{1/2} - около 5 ч. Оптимальная концентрация в плазме - от 10 до 20 нг/мл.

Фармакодин.: Улучшает мозговой кровоток и тем самым снабжение мозга кислородом и глюкозой при снижении давления в сосудах. Ослабляет расстройства, вызванные гипоксией или недостаточным мозговым метаболизмом. Угнетает потребление аденозина эритроцитами.

Показ.: Нарушения мозгового кровообращения различного происхождения (инсульт, травмы головного мозга, атеросклероз мозговых сосудов), сопровождающиеся нарушением памяти, двигательными расстройствами, головокружением, головной болью; преходящая недостаточность и спазм сосудов мозга, ишемические поражения мозга. В офтальмологии: тромбоз артерий сетчатки и сосудистой оболочки, дегенеративные изменения желтого пятна (вследствие атеросклероза или ангиоспазма), вторичная глаукома. В ЛОР-практике: понижение слуха (возрастное васкулярное или медикаментозное), головокружения лабиринтного происхождения.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гипотония, тахикардия, экстрасистолия, увеличение времени возбуждения желудочка.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Covex (Испания)

Випросал В® мазь (Viprosal B®)

Сост. и ф.в.: 50 г мази содержат яда гадюки 0,01 масс.%, салициловой кислоты 0,5 г, камфоры 1,5 г, пихтового масла или скипидара 1,5 г и водно-эмульсионной основы до 50 г; в алюминиевых тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Болеутоляющее, раздражающее, антисептическое, кератолитическое.

Показ.: Артриты (ревматические и ревматоидные), невралгии, миалгии, ишиас, радикулит и др. заболевания с болевым синдромом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кожные заболевания (в т.ч. аллергические и гнойные), активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, общее истощение; выраженная недостаточность мозгового и коронарного кровообращения, склонность к тяжелым ангиоспазмам, тяжелые нарушения функции печени и почек, беременность.

Поб. действ.: Кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, наносят на кожу болезненных участков 1 раз в сутки - 10-15 г (1-2 чайные ложки) по частям и втирают в кожу, при сильных болях - 2 раза в сутки, до исчезновения болевого синдрома.

Предост.: Избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Випсогал (Vipsogal)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат бетаметазона дипропионата 0,0175 г, флуоцинонида 0,0175 г, гентамицина сульфата 35000 МЕ, салициловой кислоты 5 г и пантенола 0,5 г; в упаковке 30 или 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противомикробное, кератолитическое, противозудное, улучшение регенерации.

Показ.: Псориаз, псориазоформные дерматиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, поражения кожи туберкулезного, сифилитического, вирусного, грибкового происхождения, беременность, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Телеангиоэктазии, атрофия кожи, угри, фотосенсибилизация, снижение барьерных функций кожи.

Примен. и доз.: Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки 2 раза в день и слегка втирают. Длительность курса - не более 21 дня. Терапию можно повторить через 14-21 день.

Предост.: Следует избегать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Нельзя применять с окклюзионной повязкой. Не рекомендуется сочетать с препаратами, содержащими салициловую кислоту.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Виролекс (Virolex®)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацикловира 200 мг; в упаковке 20 и 25 шт.

1 г крема - 50 мг; в тубах по 2 и 5 г.

1 г глазной мази - 30 мг; в тубах по 4,5 г.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инфузионного раствора - 250 мг (в виде натриевой соли); в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное (включая вирус герпеса).

Фармакодин.: Проникая в клетку, фосфорилируется и превращается в активную форму: ацикловир трифосфат. Последний, являясь ингибитором и субстратом герпесной ДНК полимеразы, предотвращает синтез ДНК вируса. Подавляет развитие вирусов Herpes simplex типа 1 и 2 и Varicella zoster.

Показ.: Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (типа 1 и 2), в т.ч. генитальный герпес (первичный и вторичный), герпесная экзема, герпес кожи, глаз слизистых и др. поражения (эзофагит, гепатит) у больных с ослабленной иммунной системой, ветряная оспа (у больных с нормальной и ослабленной иммунной системой); профилактика заболеваний, вызванных вирусом Herpes simplex: после трансплантации, вторичного генитального герпеса (6-летний и более), ветрянки новорожденных.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности не рекомендуется (исключая лечение жизненно опасных состояний). Кормящим матерям - не рекомендуется.

Поб. действ.: При в/в введении - повышение уровня мочевины и креатинина в плазме, увеличение уровня ферментов печени, острая почечная недостаточность; при попадании в околососудистую ткань - местное воспаление. Спутанность сознания, галлюцинации, беспокойство, сонливость, психозы, кома (при сложных формах болезни); слабость, рвота, кожные высыпания, снижение гематологического индекса. В месте нанесения крема - эритема, сухость, шелушение кожи; в месте нанесения мази - жжение, точечная экскориация поверхностного эпителия. При применении внутрь - слабость, рвота, диарея, головная боль, усталость, кожные воспаления.

Взаим.: Пробенецид повышает концентрацию в плазме и удлиняет T_{1/2} ацикловира.

Примен. и доз.: В/в капельно, внутрь, наружно, конъюнктивально. При инфекциях, вызванных вирусом простого герпеса, взрослым и детям (старше 2 лет) - внутрь по 200-400 мг 5 раз в сутки в течение 5-10 дней, для профилактики - по 200-400 мг 4 раза в сутки длительно в течение всего периода риска. При инфекциях, вызванных вирусом ветряной оспы, взрослым - по 800 мг 5 раз в сутки (7 дней), детям (младше 2 лет) - по 200 мг 4 раза. Больным с почечной недостаточностью (при клиренсе креатинина ниже 10 мл/мин) пероральную дозу снижают до 200 мг каждые 12 ч при простом герпесе и до 500 мг каждые 12 ч при заболеваниях, вызванных Herpes zoster. При тяжелом течении инфекции лечение начинают с в/в капельного введения (в течение 1 ч): взрослым и детям старше 12 лет - по 5-10 мг/кг каждые 8 ч, детям от 3 мес до 12 лет - по 250-500 мг/кв.м каждые 8 ч в течение 5-10 дней, для профилактики - по 250 мг/кв.м каждые 8 ч в течение периода риска. Новорожденным - в/в 10 мг/кг каждые 8 ч. Крем (взрослым и детям) наносят на пораженный участок каждые 4 ч (5 раз в день) в течение 5-10 дней. Глазную мазь - 1 см столбика закладывают в нижний конъюнктивальный мешок 5 раз в день через каждые 4 ч в течение 7-20 дней (в т.ч. в течение 3 дней после выздоровления).

Предост.: С осторожностью используют (внутри или в/в) у пожилых людей и страдающих почечной недостаточностью. Инфузионный раствор стабилен в течение 12 ч при температуре до 25 град.С. Раствор нельзя хранить в холодильнике.

Произв.: KRKA (Словения)

Вискалдикс (Viskaldix®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пиндолола 10 мг и клопамида 5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, диуретическое, блокада бета-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый гломерулонефрит, почечно-печеночная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, брадикардия, АВ-блокада, гипокалиемия, бронхоспастический синдром, планируемые хирургические вмешательства под общим наркозом эфиром или хлороформом, беременность.

Поб. действ.: Головокружение, слабость, нарушения сна, депрессия, галлюцинации, диспепсия, аллергические реакции.

Взаим.: Увеличивает концентрацию лития в крови, уменьшает (обоюдно) эффект симпато- и адреномиметиков, трициклических антидепрессантов и ингибиторов МАО, усиливает (обоюдно) - симпатолитиков, периферических вазодилататоров. Повышает гипогликемическое действие оральных противодиабетических средств и инсулина (но маскирует симптомы гипогликемии).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке утром; при отсутствии достаточного снижения АД через 1-2 нед - увеличение дозы до 2-3 таблеток в 2 приема (утром и после обеда).

Произв.: Egis (Венгрия)

Вискен (Visken®)

Пиндолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пиндолола 5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антиаритмическое, гипотензивное, блокада бета-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия, аритмии, гиперкинетический кардиальный синдром.

Противопоказ.: Застойная сердечная недостаточность, легочное сердце, брадикардия, синдром слабости синусного узла, АВ-блокада, бронхоспастический синдром, планируемые под эфирным или хлороформным наркозом хирургические вмешательства, беременность.

Поб. действ.: Брадикардия, бронхоспазм, головокружение, слабость, нарушение сна, депрессия, галлюцинации, диспепсия, кожные реакции.

Взаим.: С блокаторами кальциевых каналов - опасность возникновения брадикардии, с симпатолитиками, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами МАО - обоюдное ослабление эффектов; с симпатолитиками, периферическими вазодилататорами - чрезмерное уменьшение АД; усиливает гипогликемическое действие оральных противодиабетических средств и инсулина.

Примен. и доз.: Устанавливают индивидуально. Внутрь, 2 раза в день (утром и после обеда). Суточная доза при артериальной гипертензии - 10-30 мг, при стенокардии - 7,5-20 мг, при нарушениях сердечного ритма - 15-30 мг, при гиперкинетическом синдроме - 10-20 мг однократно, либо за 2 приема. Для детей суточная доза - 0,2 мг/кг.

Произв.: Egis (Венгрия)

Вита Иодурол трифосфаденин (Vita Ioduro® A.T.P.)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора содержат калия йодида 1,5 г, кальция хлорида 0,3 г, магния хлорида 0,3 г, аденозинтрифосфорной кислоты 2,7 мг, никотиновой кислоты 30 мг, цистеина 30 мг, глутатиона 6 мг и тиамина гидрохлорида 30 мг; во флаконах-капельницах по 15 мл.

Фарм. действ.: Антикатарактное, улучшение трофики хрусталика.

Показ.: Катаракта.

Примен. и доз.: В конъюнктивальный мешок, по 1-2 капли утром и вечером.

Произв.: Ciba Vision Ophthalmics (Франция)

Витабекс (Vitabex®)

Сост. и ф.в.: 1 драже с сахарным покрытием содержит тиамина мононитрата (витамина В₁) 6 мг, рибофлавина (витамина В₂) 3 мг, пиридоксина гидрохлорида (витамина В₆) 1,5 мг, никотиамида 20 мг, кальция пантотената 3 мг; в упаковке 30 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов группы В, активация окислительно-восстановительных процессов, регуляция обмена веществ, повышение сопротивляемости организма инфекциям.

Показ.: Абсолютная или относительная увеличенная потребность, недостаточность витаминов группы В, стимуляция аппетита, полиневриты различной этиологии, беременность, лактация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.

Бер. и корм. гр.: Рекомендовано.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды. Взрослым - по 1-2 драже 3 раза в день, детям - по 1 драже 3 раза в день.

Произв.: CTS (Израиль)

Виталюкс (Vitalux™)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина А 7500 МЕ; витамина Е 30 МЕ, витамина С 90 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, витамина В₁ 2,25 мг, витамина В₂ 2,55 мг, никотиновой кислоты 30 мг, витамина В₆ 3 мг, витамина В₁₂ 9 мкг, витамина В 400 МЕ, биотина 45 мкг, пантотеновой кислоты 15 мг, кальция 162 мг, фосфора 109 мг, йода 150 мкг, железа 18 мг, магния 100 мг, меди 2 мг,

цинка 15 мг, марганца 2,5 мг, калия 40 мг, хлорида 36,3 мг, хрома 25 мкг, молибдена 25 мкг, селена 20 мкг, витамина К₁ 25 мкг, никеля 5 мкг, олова 10 мкг, ванадия 10 мкг, кремния 2 мкг, бора 150 мкг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов.

Фармакодин.: Витамин А нормализует состояние кожи, волос, костей, зубов и десен, улучшает зрение. Витамин В₁ регулирует функцию нервной системы, пищеварения, способствует росту. Витамин В₂ восстанавливает ткани, участвует в энергетическом обмене, способствует антителообразованию и эритропоэзу, нормализует зрение. Никотиновая кислота участвует в превращении жиров, белков и углеводов в энергию, регулирует функцию кожи, нервной и пищеварительной систем. Витамин В₆ необходим для нормального функционирования нервной системы, зубов, десен, эритроцитов; участвует в формировании антител. Биотин нормализует состояние кожи и волос. Витамин В₁₂ улучшает концентрацию внимания и память; стимулирует эритропоэз. Витамин С препятствует разрушению тканей, повышает сопротивляемость инфекциям, сохраняет здоровыми зубы и десны. Фолиевая кислота участвует в образовании эритроцитов и работе ЖКТ. Витамин Е регулирует функции репродуктивных органов. Инозитол служит источником питания клеток мозга, способствует метаболизму жиров и холестерина. Витамин К участвует в процессе гемокоагуляции. Парааминобензойная кислота участвует в образовании фолиевой кислоты. Пантотеновая кислота оказывает защитное действие при физических стрессах и поддерживает нормальный рост. Селен регулирует эластичность тканей (антиокисляющее действие). Кальций участвует в утилизации железа, проницаемости питательных веществ через клеточные мембраны, формировании костей и зубов. Медь способствует превращению железа в гемоглобин. Хром контролирует уровень сахара в крови и гормональный обмен. Цинк и йод участвуют в формировании психических реакций. Железо способствует утилизации витаминов группы В, образованию гемоглобина. Магний способствует расслаблению мышц, утилизации витамина С, кальция, фосфора, натрия и калия. Сера поддерживает нормальный кислородный баланс. Бор сохраняет кальций, магний и фосфор в костях.

Показ.: Гиповитаминозы.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 таблетке в день.

Произв.: Four Ventures (США)

Витамин 15 Солко (Vitamin 15 Solco®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ретинола ацетата 2500 МЕ, тиамина моонитрата и кальция D-пантотената по 2 мг, рибофлавина и пиридоксина гидрохлорида по 1 мг, никотинамида 15 мг, фолиевой кислоты 200 мкг, цианокобаламина 2 мкг, аскорбиновой кислоты 25 мг, эргокальциферола 400 МЕ, dl-токоферола ацетата 0,5 мг, железа фумарата 20 мг, кальция глюконата и кальция фосфата по 100 мг, магния гидрофосфата 30 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минералов.

Показ.: Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах (реконвалесценция, период роста у детей, пожилой и старческий возраст, лактация), нарушения питания, инфекционные заболевания, астенические состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения функции почек, гиперкальциемия, гипервитаминоз А, D.

Поб. действ.: При соблюдении дозировок (даже при длительном приеме) не наблюдаются.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды; взрослым и подросткам - по 1-2 таблетки в сутки; детям - по 1 таблетке в сутки; при необходимости дозу увеличивают - до 4 таблеток в сутки.

Предост.: Препарат не следует назначать, если пациент получает в достаточном количестве витамины А и D или средства их содержащие.

Произв.: Solco Basel (Швейцария)

Витамин D₃ Б.О.Н. (Vitamin D₃ B.O.N.®)

Колекальциферол*

Сост. и ф.в.: Ампула содержит стерильный масляный раствор колекальциферола 5 мг (200000 МЕ) в оливковом масле.

Фарм. действ.: Противорахитическое, повышение всасывания кальция в ЖКТ, регуляция фосфорно-кальциевого обмена, нормализация функции паращитовидных желез и минерализации костей.

Фармакокин.: Всасывается в тонком кишечнике, депонируется в печени.

Показ.: Рахит (профилактика и лечение), спазмофилия, гипокальциемия, остеомаляция, остеопороз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиперкальциемия, гиперкальциурия, кальциевый нефроуролитиаз, длительная иммобилизация (большие дозы).

Бер. и корм. гр.: У беременных рекомендовано назначение однократной низкой дозы (100000 МЕ) на 6-м или 7-м месяце.

Передоз.: Симптомы: анорексия, полипепсия, полиурия, артериальная гипертензия, запоры, гиперкальциемия, гиперкальциурия, почечная недостаточность.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м. Ампула отламывается вручную, без отпиливания. Держа ампулу вертикально, отламывают верхний край. Затем переворачивают ампулу и отламывают другой край, выливая содержимое в уже приготовленный напиток. Для профилактики рахита - 5 мг 1 раз в 6 мес (до 5 лет), если ребенок редко находится на солнце или его кожа сильно пигментирована, дозу повышают до 10 мг. Лечение рахита, спазмофилии и гипокальциемии - 5 мг/неделю в течение 2 нед (с добавлением солей кальция). При лечении остеомаляции и остеопороза - 5 мг каждые 15 дней в течение 3 мес.

Предост.: При профилактическом применении избегать передозировки, особенно у детей (не следует назначать более 10-15 мг в год). Необходим контроль содержания кальция в крови во время лечения.

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Витамин Е Словакофарма (Vitamin E Slovakofarma®)

Витамин Е

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит токоферола ацетата 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витамина Е, антиоксидантное.

Фармакокин.: Всасывается в ЖКТ, большая часть попадает в лимфу. Быстро распределяется по всем тканям, медленно выделяется с желчью и в виде метаболитов с мочой.

Показ.: Бесплодие, гипогонадизм, угрожающий аборт, климакс, дисменорея; атрофия слизистой дыхательных путей, астенический и невротический синдромы, переутомление, ревматические забо-

левания, мышечная дистрофия, парезы, миопатия, миастения, фиброциты, тендопатии, заболевания суставов и позвоночника, тиреотоксикоз, нарушение функции половых желез у мужчин, дистрофия новорожденных, недостаточное питание, синдром мальабсорбции, анемии, хронический гепатит, парадонтопатии, поражения кожи и слизистых половых органов, склеродермия, красный плоский лишай.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, снижение работоспособности, слабость, тромбофлебиты, тромбоэмболия легких, тромбозы, повышение активности креатинкиназы, креатинурия, гиперхолестеринемия, рост белых волос на участках алопеции при пузырьчатом эпидермолизе.

Примен. и доз.: Внутрь. При бесплодии, угрожающем аборте - по 2-3 капсулы в сутки, при нарушениях менструального цикла (дополнение к гормональной терапии) - по 3-4 капсулы каждый 2-й день, повторяя 5 раз, начиная с 17-го дня цикла; при климактерических нарушениях - по 1 капсуле 3 раза в день. При нарушениях менструального цикла в молодом возрасте до начала гормональной терапии - по 1-2 капсулы 1-2 раза в день в течение 2-3 мес; при ревматических заболеваниях - по 1-3 капсулы в течение нескольких недель; при неврастении - по 1 капсуле в день, при первичной мышечной дистрофии - до 2 г в день, при других неврологических заболеваниях - по 300 мг в сутки. При сосудистых заболеваниях - по 1 капсуле в сутки; при эндокринных заболеваниях - по 3-5 капсул в сутки, при анемиях в результате недостаточности питания - по 300 мг в сутки в течение 10 дней. При хронических гепатитах - по 300 мг в сутки длительное время. При парадонтопатии - по 2-3 капсулы в сутки, при болезни Пестрони - по 3-4 капсулы в сутки в течение нескольких недель, затем по 50 мг в течение нескольких месяцев; при других заболеваниях кожи - по 1-2 капсулы в сутки, при необходимости и больше.

Пронзв.: Slovakofarma (Словакия)

Витамулт (Vitamult®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с сахарным покрытием содержит ретинола ацетата (Витамин А) 2500 МЕ, холекальциферола (Витамин D₃) 250 МЕ, тиамин гидрохлорида (Витамин В₁) 1 мг, рибофлавина (Витамин В₂) 0,5 мг, пиридоксина гидрохлорида (Витамин В₆) 0,5 мг и никотинамида 7,5 мг, в упаковке 30 и 1000 шт.; 1 чайная ложка сиропа (5 мл)

- ретинола пальмитата (Витамин А) 500 МЕ, холекальциферола (Витамин D₃) 150 МЕ, тиамин мононитрата (Витамин В₁) 1,25 мг, рибофлавина (Витамин В₂) 1,5 мг, пиридоксина гидрохлорида (Витамин В₆) 1,25 мг, D-пантенола 1,25 мг, аскорбиновой кислоты (Витамин С) 37,5 мг и никотинамида 12,5 мг; во флаконах по 110 мл.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов, повышение сопротивляемости организма инфекциям.

Показ.: Дефицит витаминов при острых и хронических инфекциях (период реконвалесценции), для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте; нарушения роста и развития, неполноценное питание; беременность, лактация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.

Бер. и корм. гр.: Рекомендовано.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды по 1 таблетке в день или по 1-3 столовые ложки (детям по 1-3 чайные) сиропа в день.

Предост.: Следует помнить, что длительное применение больших доз витаминов А и D может привести к гипервитаминозу.

Пронзв.: CTS (Израиль)

Витаон® (Vitaon)

Сост. и ф.в.: Масляный экстракт листа мяты перечной, почек сосны, плодов шиповника, травы полыни горькой, травы тысячелистника, травы зверобоя, травы чистотела, цветков ноготков, цветков ромашки, плодов фенхеля, плодов тмина, травы чабреца; камфора, масло мяты перечной и фенхеля. Во флаконах по 15, 25, 30, 50 и 500 мл.

Фарм. действ.: Регенерирующее, ранозаживляющее, анальгезирующее, противовоспалительное, антимикробное.

Клин. фарм.: Повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды (излучение, тепловое, химическое воздействие и т.д.). Способствует ровному заггару без ожогов, смягчает, тонизирует, предохраняет от увядания и омолаживает кожу. Обладает антиэкссудативной активностью.

Показ.: Повреждения и поражения кожи и слизистых в дерматологии; ожоги (термические, химические, солнечные) I-III степени, респираторные инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наружно. Марлевую повязку пропитывают маслом и накладывают на рану, меняя по мере промокания через 2-3 дня. При открытом способе лечения - масло наносят на раневую поверхность тонким слоем (0,1-0,5 мл на 100 кв.см площади поражения), повторяя процедуру 2 раза в день.

Произв.: ТОС (Россия)

Витасик (Vitacic®)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит аденозина 2 мг, тимидина 2 мг, уридина 7 мг, динатриевой соли 5-монофосфатгуанозина 12 мг и цитидина 6 мг; во флаконах-капельницах по 5 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция регенерации эпителия роговицы.

Показ.: Эпителиальные точечные кератиты, последствие кератопластики, нарушение целостности роговицы любой этиологии: раны, ожоги, язвы (травматические, инфекционные, трофические); защита роговицы при применении кортикостероидов, улучшение условий ношения гибких, гигроскопических линз.

Примен. и доз.: В конъюнктивальный мешок, по 1-2 капли 3-6 раз в день; после снятия линз инстиллируют 1-2 капли.

Произв.: Ciba Vision Ophthalmics (Франция)

Витафакол (Vitaphakol®)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит 74% цитохрома С - 0,50 мг, натрия сукцината - 0,06 мг, аденозина - 2 мг, никотинамида - 10 мг; во флаконах-капельницах по 10 мл.

Фарм. действ.: Антикатарактное, улучшение трофики хрусталика.

Показ.: Катаракта.

Поб. действ.: Чувство жжения, гиперемия конъюнктивы.

Примен. и доз.: В конъюнктивальный мешок, по 2 капли 2 раза в сутки.

Произв.: Ciba Vision Ophthalmics (Франция)

Витрум® (Vitrum®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А 4400 МЕ, бета-каротина 600 МЕ, витамина Е 30 МЕ, витамина С (аскорбиновой кислоты) 60 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, витамина В₁ (тиамина) 1,5 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,7 мг, витамина В₆ 2 мг, витамина В₁₂ (цианокобаламина) 6 мкг, никотинамида 20 мг, витамина К 25 мкг, витамина D 400 МЕ, биотина 30 мкг, пантотената кальция 10 мг, железа

(в виде fumarата) 18 мг, кальция 162 мг, фосфора 125 мг, йода 150 мкг, магния 100 мг, меди 2 мг, цинка 15 мг, марганца 2,5 мг, калия 40 мг, хрома 25 мкг, хлора 36,3 мг, молибдена 25 мкг, селена 25 мкг, никеля 5 мкг, олова 10 мкг, кремния 10 мкг и ванадия 10 мкг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и минералов в организме.

Показ.: Витаминная недостаточность, повышенная потребность в витаминах и минералах (психическая и физическая нагрузка, стрессовые состояния, беременность, инфекционные заболевания).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: При соблюдении дозировки отсутствуют.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1 таблетке в сутки.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Атеролитин (Vitrum® Atherolitin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А (пальмитата) 900 МЕ, витамина Е (ацетат) 5,05 МЕ, витамина С (аскорбиновая кислота) 10,5 мг, витамина В₁ (тиамина гидрохлорида) 0,3 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 2,2 мг, витамина В₆ (пиридоксина) 0,4 мг, фолиевой кислоты 70 мкг, витамина В₁₂ 1,1 мкг, никотинамида 35 мг, пантотеновой кислоты (кальция пантотената) 1,8 мг, цинка (окиси) 10 мг, селена (натрия селената) 10 мкг, отрубей овсяных 85 мг, порошка семян подорожника 85 мг, лецитина соевого 52 мг, дрожжей хромовых 9 мкг, рыбьего жира 42 мг, бета-систерола 17 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ.

Показ.: Дефицит витаминов и минеральных веществ у взрослых и детей старше 12 лет (профилактика), снижение иммунитета при различных заболеваниях, нарушения липидного обмена, жировое перерождение печени, ускоренные процессы старения и ожирения, атеросклероз (профилактика) и сердечно-сосудистые заболевания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 1-3 раза в день.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Витамин Е
(Vitrum® Vitamin E)**Витамин Е**

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит диг-альфа-токоферола ацетата 400 МЕ; в упаковке 30 и 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витамина Е, антиоксидантное.

Показ.: Гиповитаминоз, повышенная потребность в витамине Е, высокие физические нагрузки, пожилой возраст, климакс, атрофия слизистой дыхательных путей, синдромы астенический и невротический, мышечная дистрофия, заболевания суставов, анемия, хронический гепатит, поражение кожи и слизистых половых органов, бесплодие, повышенный риск развития ишемической болезни, недостаточное питание.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Боли в эпигастрии, диарея.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле в сутки.

Предост.: Препараты, содержащие железо, рекомендуется принимать через 8 ч после приема витамина Е. Следует соблюдать рекомендованную дозировку.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Кальций
(Vitrum® Calcium)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит кальция карбоната 500 мг и витамина D₃ 200 МЕ; в упаковке 30 и 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита кальция и витамина D₃.

Показ.: Профилактика кальцийдефицитных состояний, укрепление костей и зубов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Аллергический реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки в сутки.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Лайф
(Vitrum® Life)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А (ретинола ацетат) и бета-каротина 5000 МЕ, витамина Е (ацетат) 200 МЕ, витамина С (аскорбиновая кислота) 250 мг, цинка (окись) 10 мг, меди (окись) 1,1 мг,

марганца (сульфат) 2 мг, селена (натрия селенат) 20 мкг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ, антиоксидантное.

Показ.: Профилактика дефицита витаминов и минеральных веществ у пациентов старше 12 лет, снижение иммунитета при различных заболеваниях (в т.ч. при воздействии неблагоприятных экологических факторов), период реконвалесценции, профилактика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, для замедления процесса старения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Пренатал
(Vitrum® Prenatal)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А 4000 МЕ, витамина Е 11 мг, витамина D 400 МЕ, витамина С 100 мг, витамина В₁ (тиамина) 1,5 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,7 мг, никотинамида 18 мг, витамина В₆ 2,6 мг, витамина В₁₂ 4 мкг, фолиевой кислоты 0,8 мг, железа (в виде фумарата) 60 мг, кальция (в виде карбоната) 200 мг и цинка (окись) 25 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и минералов у беременных и кормящих женщин.

Показ.: Витаминная недостаточность, дефицит минералов, повышенная потребность в витаминах и минералах (беременность, лактация).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки.

Предост.: Необходимо тщательно соблюдать режим дозирования; с осторожностью применяют при пернициозной анемии.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Суперстресс®
(Vitrum® Super Stress)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина Е 30 МЕ, витамина С (аскорбиновой кислоты) 500 мг, фолиевой кислоты 0,4 мг, витамина В₁ (тиамина мононитрата) 15 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 10 мг, никотина-

мида 100 мг, витамина В₆ (пиридоксина гидрохлорида) 5 мг, витамина В₁₂ (цианокобаламина) 12 мкг, биотина 45 мкг, пантотеновой кислоты (кальция пантотената) 20 мг, железа (в виде fumarata) 27 мг; в упаковке 30 и 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и железа в организме, гемостимулирующее.

Показ.: Профилактика и лечение авитаминозов и железодефицитных состояний после операций, травм и болезней, связанных с кровоптерей; профилактика заболеваний при экологическом загрязнении окружающей среды; повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки, стрессовые состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Центури (Vitrum® Century)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А и бета-каротина 6000 МЕ, витамина Е (ацетат) 45 МЕ, витамина С (аскорбиновая кислота) 60 мг, фолиевой кислоты 200 мкг, витамина В₁ (тиамина) 1,5 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,7 мг, витамина В₆ 3 мг, витамина В₁₂ (цианокобаламина) 25 мкг, никотинамида 20 мг, витамина К 10 мкг, витамина D 400 МЕ, биотина 30 мкг, кальция пантотената 10 мг, железа (fumarat) 9 мг, кальция (кальция двузамещенный фосфат) 200 мг, фосфора 48 мг, йода (калия йодид) 150 мкг, магния (окись) 100 мг, меди (окись) 2 мг, цинка (окись) 15 мг, марганца (сульфат) 2,5 мг, калия (хлорид) 80 мг, хрома (хлорид) 100 мкг, хлора (калия хлорид) 72 мг, молибдена (натрия молибдат) 25 мкг, селена (натрия селенат) 20 мкг, никеля (сульфат) 5 мкг, олова (хлорид) 10 мкг, кремния (натрия метасиликат) 10 мкг, ванадия (натрия метаванадат) 10 мкг, бора 150 мкг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ у пожилых людей.

Показ.: Профилактика гиповитаминозов, авитаминозов и дефицита минеральных веществ у людей старше 50 лет, снижение иммунитета (у пожилых) при различных заболеваниях (в т.ч. при воздействии неблагоприятных экологических факторов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки, круглогодично.

Произв.: Unipharm (США)

Витрум® Циркус® (Vitrum® Circus chew's)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для разжевывания в форме цветных зверюшек содержит витамина А 2500 МЕ, витамина Е 15 МЕ, витамина D 400 МЕ, аскорбата натрия 60 мг, фолиевой кислоты 0,3 мг, витамина В₁ (тиамина) 1,05 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,2 мг, никотинамида 13,5 мг, витамина В₆ (пиридоксина) 1,05 мг, витамина В₁₂ 4,5 мкг и железа (в виде fumarata) 15 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и минералов в организме, гемостимулирующее.

Показ.: Витаминная недостаточность, повышенная потребность в витаминах и минералах (психическая и физическая нагрузка, инфекционные заболевания), дефицит железа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, предварительно разжевав, по 1 таблетке ежедневно.

Предост.: Необходимо тщательно соблюдать режим дозирования.

Произв.: Unipharm (США)

Вокара (Vocara®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Salvia D1 7 мл, Belladonna D6 10 мл, Phytolacca D6 10 мл, Lachesis D12 10 мл, Mercurius solubilis H. D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30 и 50 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое, иммуностимулирующее, дезинтоксикационное.

Показ.: Тонзиллит, ангина, фарингит, лимфаденит, стоматит, гингивит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза в день: взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года - по 1-3 капли, разведенных в 1 чайной

ложке воды или молока; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды. При острых состояниях принимать каждые 0,5-1 ч: взрослым и подросткам - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли; детям до 1 года - по 1 капле до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Произв.: Bittner (Австрия)

Волмакс® (Volmax®)

Сальбутамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с контролируемым высвобождением содержит сальбутамол (в форме сульфата) 4 или 8 мг.

Фарм. действ.: Бронхолитическое (селективная стимуляция бета₂-адренорецепторов).

Клин. фарм.: В терапевтических дозах не оказывает воздействия на бета₁-рецепторы сердца, не стимулирует альфа-адренорецепторы (не вызывает затруднений мочеиспускания).

Показ.: Заболевания, сопровождающиеся обратимой обструкцией дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не следует применять при угрожающем аборте в I и II триместрах беременности.

Поб. действ.: Легкий тремор (более выраженный на руках), чувство напряжения скелетной мускулатуры, расширение периферических сосудов, головная боль, компенсаторная тахикардия (при повышенной чувствительности к бета-адреностимуляторам); редко - кратковременные мышечные судороги, аллергические реакции (ангионевротический отек, крапивница, бронхоспазм, гипотония, коллапс).

Взаим.: Несовместим с неселективными бета-адреноблокаторами (пропранолол). Совместим с ингибиторами МАО.

Передоз.: Лечение: кардиоселективные бета-блокаторы (с осторожностью у пациентов с бронхообструктивным синдромом).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая водой. Взрослым - по 1 таблетке (8 мг) 2 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 до 12 лет - 1 таблетка (4 мг) 2 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью назначают при тиреотоксикозе.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Вольтарен® (Voltaren®)

Диклофенак*

Вольтарен® рапид (Voltaren® rapid)

Диклофенак*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, содержит диклофенака натрия 25 или 50 мг; в упаковке 30 и 20 шт. соответственно. # 1 таблетка-ретард, покрытая оболочкой, - 75 или 100 мг; в упаковке 100 и 30 шт. соответственно.

1 суппозиторий ректальный - 25, 50 или 100 мг; в упаковке 10, 10 и 5 шт. соответственно.

1 мл раствора для инъекций - 25 мг, в ампулах по 3 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противоревматическое, противовоспалительное, анальгезирующее.

Фармакодин.: Угнетает биосинтез простагландинов.

Показ.: Воспалительные ревматические заболевания, дегенеративные ревматические заболевания и заболевания внесуставных тканей, посттравматические болевые синдромы, сопровождающиеся воспалением, постоперационные боли (таблетки, таблетки-ретард, ректальные свечи, раствор для инъекций); острый приступ подагры (таблетки, ректальные свечи, раствор для инъекций); дисменорея и аднексит (таблетки, таблетки-ретард, ректальные свечи); приступы мигрени (ректальные свечи, раствор для инъекций), почечная и желчная колика (раствор для инъекций). Выраженные инфекции уха, носа и горла (таблетки, ректальные свечи) - в качестве вспомогательного средства.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к диклофенаку, НПВС, метабисульфиту натрия (содержится в растворе для инъекций) или к другим компонентам препарата; язва желудка или кишечника, проктит (ректальные свечи).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, язва желудка или кишечника, желудочно-кишечное кровотечение, нарушения функции печени, гепатит, панкреатит, головная боль, пошатывание, головокружение, кожные сыпи, повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови, местные реакции после внутримышечной инъекции, появление в кишечнике диафрагмо-подобных структур, асептический менингит, пневмония,

мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, эритродермия, пурпура, нарушения кроветворения, сердечно-сосудистые нарушения, нарушения чувствительности и зрения, аллергические реакции.

Взаим.: Изменяет взаимно эффекты препаратов лития, дигоксина, метотрексата, циклоспорина, диуретиков, антикоагулянтов, оральных противодиабетических средств, хинолоновых производных.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в, в/м. Взрослым - 75-150 мг в сутки в несколько приемов (при дисменорее и приступах мигрени - до 200 мг в сутки). Детям в возрасте 1 год и старше - 0,5-2 мг/кг в сутки. В/м или в/в - содержимое 1-2 (не более) ампул в сутки в качестве начальной терапии (не более 2 дней); раствор, содержащийся в ампулах, нельзя вводить в/в струйно. Перед в/в введением раствор препарата, содержащийся в 1 ампуле, разводят в 100-500 мл 0,9% изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы, добавляют 0,5 мл 8,4% или 1 мл 4,2% раствора бикарбоната натрия (в качестве буфера). Раствор для в/в применения - только для устранения послеоперационных болей.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при наличии симптомов желудочно-кишечных заболеваний, бронхиальной астмы, нарушений функции печени, сердца или почек (в т.ч. в анамнезе), при беременности и кормлении грудью, порфирии, у лиц пожилого возраста, при уменьшении объема внеклеточной жидкости, эксплуатации механизмов (снижает скорость реакции). При длительном лечении рекомендуется периодическое исследование функции печени и формулы крови. Возможны реакции гиперчувствительности к метабисульфиту натрия (раствор для инъекций). НПВС могут маскировать проявление инфекций и временно ингибировать агрегацию тромбоцитов. Требуется осторожность при сочетанном назначении с дигоксинном, хинолонами, антикоагулянтами, диуретиками, оральными антидиабетическими средствами, препаратами лития, циклоспорином, метотрексатом.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Вольтарен® Эмульгель (Voltaren® Emulgel®)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 100 г жировой эмульсии в водном геле содержат диклофенака диэтиламина 1,16 г, что соответствует 1 г диклофенака натрия; в тубах по 20 и 50 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоревматическое, анальгезирующее.

Показ.: Посттравматическое воспаление связок, сухожилий и суставов, вследствие ушибов, растяжений и кровоизлияний, локализованные формы ревматических заболеваний мягких тканей (тендовагинит, бурсит, синдром плечо-кисть, периартропатии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (включая другие НПВС, изопропанол или пропиленгликоль).

Поб. действ.: Контактный дерматит аллергического или неаллергического происхождения, фотосенсибилизация, распространенная кожная сыпь.

Примен. и доз.: Наносится на кожу 3-4 раза в сутки и мягко втирается. 2-4 г препарата (величиной примерно с вишню или грецкий орех) достаточно для нанесения на площадь 400-800 кв.см.

Предост.: Нельзя накладывать на кожные раны или открытые повреждения, следует избегать контакта со слизистыми. Не исключена возможность возникновения системных побочных реакций в случае нанесения на большую поверхность кожи или длительного применения.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Вумон (Vumon)

Тенипозид*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит тенипозид 0,01 г; в ампулах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Фармакодин.: Ингибирует вступление клеток в митоз, препятствует включению тимидина в S-фазе, угнетает митохондриальное деление.

Клин. фарм.: Используется в составе комбинированной цитостатической терапии.

Показ.: Лимфогранулематоз, ретикулосаркома, острый лейкоз, рак мочевого пузыря, нейробластома.

Противопоказ.: Угнетение гемопоэза, выраженное нарушение функции печени и почек.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, коллапс, алоpecia, стоматит, флебит (в месте введения), аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, медленно. Взрослым - 0,04-0,08 г/кв.м поверхности тела, ежедневно в течение 5 дней с 10-14-дневным перерывом; 0,06 г/кв.м поверхности тела ежедневно в течение 6 дней с 3-недельным перерывом; 0,1 г/кв.м поверхности тела в течение 3 дней с 3-недельным перерывом. При опухоли мозга - 0,1-0,13 г/кв.м поверхности тела 1 раз в неделю в течение 6-8 нед. Детям - 0,13-0,18 г/кв.м поверхности тела 1 раз в неделю или 0,1 г/кв.м поверхности тела 2 раза в неделю в течение 4 нед, или 0,1-0,13 г/кв.м поверхности тела каждые 2 нед.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Вэллферон® (Wellferon®)

Интерферон альфа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с раствором для инъекций содержит очищенного интерферона альфа-п₁ 3 или 10 млн. МЕ, стабилизированного человеческим альбумином в растворе тристеаринового буфера до конечной концентрации протеина 1,5 мг/мл.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, противовирусное, иммуномодулирующее.

Фармакокин.: После в/м или п/к введения C_{max} в сыворотке крови - через 4-8 ч. $T_{1/2}$ - 4-12 ч. Не обнаруживается в моче (за исключением случаев тяжелых заболеваний почек). Среднее значение клиренса препарата (без поправки на биодоступность) - 57 мл/мин/кв.м и примерно 2 мл/мин/кг.

Клин. фарм.: Непосредственно действует на опухолевые клетки (при волосатоклеточном лейкозе), ингибирует репродукцию вирусов гепатита В и С.

Показ.: Волосатоклеточный лейкоз, хронический гепатит В или С, рак почки (с метастазами), миелолейкоз (хроническая фаза), рефрактерная форма остроконечной кондиломы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; значительное уменьшение печеночных резервов (для лечения хронического гепатита С); бластный криз или экстрамедуллярная гранулоцитарная саркома (для назначения при хроническом миелолейкозе).

Бер. и корм. гр.: Необходимо соизмерить ожидаемый клинический эффект с возможным риском для плода. Не рекомендуется проводить терапию беременным женщинам с хроническим гепатитом В.

Поб. действ.: Лихорадка, озноб, дрожь, головная боль, миалгии, симптомы, напоминающие грипп, заторможенность, слабость, усталость, снижение числа лейкоцитов (гранулоцитов), тромбоцитов, уровня гемоглобина; тяжелая депрессия, апатия, спутанность сознания, кома, судороги, экстрапирамидные расстройства; гипо- или гипертензия, аритмия, инфаркт миокарда, инсульт, тошнота, рвота, диарея, почечная недостаточность, алоpecia, артралгия, феномен Рейно, уртикария, узловатая эритема, зуд, псориаз, мукозиты, поражения периферических нервов; обострение аутоиммунных нарушений; локальные реакции в месте инъекции; при повторных в/в инфузиях очень высоких доз (100-200 МЕ) - гипокальциемия, гиперкалиемия.

Взаим.: Снижает активность Р-450 цитохромов и замедляет метаболизм циметидина, фенитоина, курантила, теофиллина, диазепама, пропранолола, некоторых цитостатиков. Возможно нарушение психического статуса при назначении со средствами, влияющими на ЦНС. Увеличивает риск тяжелой миелосупрессии на фоне винбластина.

Примен. и доз.: П/к, в/м. Взрослым: волосатоклеточный лейкоз - 3 МЕ ежедневно, через 12-16 нед - 3 МЕ 3 раза в неделю (6 мес и более). Хронический гепатит В - 10-15 МЕ (максимум 7,5 МЕ/кв.м) 3 раза в неделю в течение 12 нед. Хронический гепатит С - 5 МЕ 3 раза в неделю в течение 48 нед. Рак почки - 3 МЕ ежедневно, увеличивая до 30-60 МЕ в неделю. Хронический миелолейкоз - первые 3 нед (после стабилизации количества лейкоцитов на уровне $20 \times 10^9/\text{л}$ в течение 4-х нед на стандартной химиотерапии) - 3 МЕ ежедневно, затем дозу подбирают для поддержания числа лейкоцитов на уровне $2-5 \times 10^9/\text{л}$; курс - 6 мес. Остроконечная кондилома - 5 МЕ (3 МЕ/кв.м) ежедневно в течение 14 дней, затем 3 раза в неделю (6-8 нед). Дети: хронический гепатит В - до 10 МЕ/кв.м.

Предост.: Обязателен регулярный контроль показателей периферической крови. С осторожностью назначают больным с патологией почек, сердечно-сосудистой системы, декомпенсированной болезнью печени, заболеваниями ЦНС, психическими нарушениями (в

анамнезе). Не следует комбинировать с иммуносупрессивными препаратами (включая кортикостероиды), ускоряющими репликацию вируса.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Галидор (Halidor®)

Бенциклан*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит бенциклана фумарата 25 мг; в ампулах по 2 мл; в упаковке 10 шт. 1 таблетка - 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, спазмолитическое, седативное.

Показ.: Нарушения мозгового кровообращения, головокружение, головная боль сосудистого генеза, инсульт, шум в ушах, нарушение сна, снижение концентрации внимания, сосудистые заболевания глаз, облитерирующие заболевания и спазм периферических артерий, синдром слабости синусного узла, синусовая брадикардия, ишемическая болезнь сердца, тенезмы мочевого пузыря и ЖКТ, гастрит, энтерит, колит, холелитиаз, послеоперационный метеоризм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная, печеночная, дыхательная недостаточность, пароксизмальная суправентрикулярная или желудочковая тахикардия.

Поб. действ.: Сухость во рту, диспепсия, тошнота, анорексия, диарея, слабость, головокружение, тахикардия, бессонница, нарушение походки, нарушение речи, галлюцинации, тремор, судороги, повышение уровня печеночных трансаминаз, лейкопения, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект седативных и средств для наркоза, вероятность тахикардии повышают симпатомиметики, опасность угнетения сердечной деятельности - противодиабетические средства.

Примен. и доз.: Внутрь, по 100-200 мг 2 раза в день; курс - 3-4 нед. В/в, в/а медленно, струйно - по 50-100 мг, в/м - по 2 мл.

Произв.: Egis (Венгрия)

Галиум-Хель (Galium-Heel®)

Сост. и ф.в.: 100 мл 35% спиртового раствора содержат Galium aparine D3, Galium album D3 по 4 мл, Sedum acre D3, Sempervivum tectorum D4, Clematis D4, Thuja D3, Caltha palustris D3, Ononis spinosa D4, Juniperus communis D4, Hedera helix D4, Betula alba D2,

Saponaria D4, Echinacea angustifolia D5, Calcium fluoratum D8, Phosphorus D8, Aurum metallicum D10, Argentum D8, Apis mellifica D12, Acidum nitricum D6, Pyrogenium D6 по 5 мл, Urtica urens D3 2 мл; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее, дезинтоксикационное, противовоспалительное, дренажное.

Показ.: Тяжелые формы инфекционной патологии (для активации неспецифического иммунитета и дезинтоксикационных функций), болевой синдром и хронические заболевания внутренних органов (нервно-психическое истощение, септические осложнения), нарушения ферментного обмена (астма, бронхоэктазы, гипертония, заболевания печени, колит, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, невралгии и др.), онкологические заболевания.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь по 10 капель 3 раза в день. При онкопатологии комбинируют с Энгистол Н, Траумель С, Лимфомизот, Хепель, Псоринохель.

Произв.: Heel (Германия)

Галопер (Haloper®)

Галоперидол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит галоперидола 0,5; 1,5; 5 и 10 мг; в упаковке 30, 50 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, противорвотное.

Показ.: Шизофрения, маниакальный психоз, галлюцинации, бред; тики, синдром Жиль де ла Туретта, нарушения поведения, заикание и другие дефекты речи у детей; неукротимая рвота.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, депрессия, кома, паркинсонизм (и другие экстрапирамидные расстройства), угнетение ЦНС.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Экстрапирамидные нарушения, эйфория, бессонница или сонливость, вялость, депрессия, головная боль, головокружение, спутанность сознания, большие эпилептические припадки, обострение психотических симптомов.

Взаим.: Несовместим с трициклическими антидепрессантами, непрямыми антикоагулянтами, холиноблокаторами, гипотензивными средствами; усиливает эффекты препаратов, угнетающих ЦНС.

Передоз.: Симптомы: ярковыраженные экстрапирамидные реакции (ригидность мышц, тремор), гипотензия (возможно повышение давления), желудочковая аритмия; может развиваться коматозное состояние с угнетением дыхания и понижением давления. Лечение: специальных антидотов нет; рекомендуется промывание желудка, индуцирование рвоты (исключая коматозных и конвульсирующих пациентов) с последующим назначением активированного угля.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым при умеренных симптомах - 0,5-2 мг 2-3 раза в день, при выраженных симптомах - 3-5 мг 2-3 раза в день. По достижении удовлетворительного терапевтического эффекта следует постепенно снизить дозу до минимального эффективного поддерживающего уровня. Детям при расстройствах поведения - по 0,05 мг/кг в день, при синдроме Жиль де ла Турретта - до 10 мг в день.

Предост.: С осторожностью назначать больным эпилепсией, с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, предрасположенностью к глаукоме, нарушением функции печени, с тиреотоксикозом, с легочной или почечной недостаточностью. Во время лечения не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания (вождение автомобиля, управление станочным оборудованием и т.д.).

Произв.: CTS (Израиль)

Галоперидол (Haloperidol)

Галоперидол*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит галоперидола 5 мг; в упаковке 5 шт.

1 таблетка - 1,5 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка форте - 5 мг; в упаковке 50 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 2 мг (10 капель=1 мг); во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Нейролептическое, анальгетическое, жаропонижающее, противосудорожное, противорвотное, антигистаминное.

Показ.: Психомоторное возбуждение (маниакальное состояние, деменция, олигофрения, психопатия, шизофрения, алкоголизм), бред и галлюцинации (при шизофрении, параноидных состояниях, острых психозах), хорея Гентингтона, возбуждение, агрессивность, расстройства поведения в пожилом и детском возрасте, синдром Gilles de la Tourette, заикание, стойкие рвота, икота.

Противопоказ.: Пирамидные и экстрапирамидные нарушения, депрессивные состояния.

Поб. действ.: Сонливость, акинезия, симптомы паркинсонизма, поздняя дискинезия.

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных препаратов, барбитуратов, наркотических анальгетиков, антидепрессантов, алкоголя; снижает - оральных антикоагулянтов.

Примен. и доз.: В/м, в/в: при острых психозах - по 5-10 мг, указанную дозу можно повторно вводить с 30-40-минутным интервалом 1-2 раза до получения эффекта. Максимальная доза - 30-40 мг/сутки. Скорость внутривенного введения - 5 мг/мин (не более 10 мг/мин). Внутрь, средняя суточная доза 2,25-18 мг. Детям до 5 лет - 2 капли 2 раза в день, старше 5 лет - 5 капель 2 раза в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Галоперидол (Haloperidol)

Галоперидол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит галоперидола 1,5 или 5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое.

Показ.: Шизофрения, психозы, психосоматические нарушения.

Противопоказ.: Заболевания ЦНС с пирамидной и экстрапирамидной симптоматикой, депрессия, истерия, кома, беременность, лактация.

Поб. действ.: Экстрапирамидные расстройства, бессонница, депрессия, диспептические расстройства, нарушение функции печени, тахикардия, гипотензия, анемия, агранулоцитоз, гинекомастия.

Взаим.: Усиливает эффект наркотических анальгетиков, снотворных средств, антидепрессантов.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, начиная с 1,5-4,5 мг в сутки (до 100-200 мг у наиболее беспокойных больных). Терапевтическая суточная доза - 10-15 мг, при хронических формах шизофрении - 20-40 мг. Курс лечения - 2-3 мес. Дозу снижают постепенно, поддерживающая суточная доза подбирается индивидуально (от 0,5 до 10 мг). Детям - 25-50 мкг/кг в сутки (максимально - до 10 мг), подросткам - до 30-60 мг в сутки (в тяжелых случаях).

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Галоперидол (Haloperidol)

Галоперидол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит галоперидола 2 или 10 мг; в упаковке 25 и 30 шт. соответственно.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 5 мг; в упаковке 10 шт.

1 мл (20 капель) - 2 мг; во флаконе по 10 мл.

Фарм. действ.: Антипсихотическое, противорвотное, блокада дофаминовых рецепторов.

Показ.: Психозы острые (острая шизофрения, амфетаминный, алкогольный с возбуждением, острые маниакальные эпизоды при маниакально-депрессивном психозе) и хронические (шизофрения, мания, маниакально-депрессивный психоз), органические умственные психосиндромы с симптомами возбуждения, гиперактивности, враждебного поведения, галлюцинаций (особенно у пожилых пациентов); тик, заикание, синдром Жиля де ля Туретта; хорей; рвота (в т.ч. послеоперационная); премедикация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые депрессии, паркинсонизм, коматозное состояние, беременность, лактация, детский возраст (до 3 лет).

Поб. действ.: Бессонница, чувство тревоги и страха, эйфория, возбуждение, сонливость, депрессия, летаргия, головная боль, эпилептический приступ, галлюцинации; экстрапирамидные расстройства (акинезия, тремор, ригидность и др.); гипотония, тахикардия, аритмия, анорексия, запор или диарея, гипосаливация, диспепсия, тошнота, рвота; сухость во рту, нарушения зрения, задержка мочи, потливость, ларингоспазм, бронхоспазм, нарушение остроты зрения, катаракта, ретинопатия; гинекомастия, лактация, гиперпролактинемия, нарушения менструального цикла, импотенция, повышение либидо, гипер- и гипогликемия, гипонатриемия, лейкопения или лейкоцитоз; облысение, фотосенсибилизация, кожные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - 0,5-2 мг 2-3 раза в день. Возможно в течение короткого времени назначение 60 мг (но не более 100 мг в сутки) физически здоровым лицам. Поддерживающая доза - 1-15 мг в сутки. В/м (купирование психомоторного возбуждения) - по 2-5 мг (0,4-1 мл 0,5% раствора) 2-3 раза в сутки. По достижении

эффекта переходят на прием препарата внутрь.

Пронзв.: Hemofarm (Югославия)

Галстена (Galstena®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Carduus D1 2 мл, Taraxacum B6 10 мл, Chelidonium D6 10 мл, Natrium sulfuricum D12 10 мл, Phosphorus D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Гепатопротективное, желчегонное, дезинтоксикационное, метаболическое.

Показ.: Острые и хронические заболевания печени, желчного пузыря (гепатит, цирроз печени, хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, жировая дистрофия печени, дискинезия желчевыводящих путей по гипер- и гипомоторному типу, токсические повреждения печени вследствие длительного приема гепатотоксичных препаратов (психотропные средства, контрацептивы, антибиотики, иммунодепрессанты, средства для химиотерапии и наркоза). Как вспомогательное средство для лечения хронического панкреатита, диспепсии печеночного происхождения, дуодено-гастрального рефлюкса, гастро-кардиального синдрома, а также дерматозов, дерматитов и приобретенных иммунодефицитных состояний.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза в день: взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года - по 1-3 капли, разведенных в 1 чайной ложке воды или молока; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды. При острых состояниях - принимать каждые 0,5-1 ч: взрослым и подросткам - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли; детям до 1 года - по 1 капле до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Пронзв.: Bittner (Австрия)

Гаммалон (Gammalon®)

Гамма-аминомасляная кислота

Сост. и ф.в.: Таблетка содержит гамма-аминомасляную кислоту; в упаковке 1000 шт.



Фарм. действ.: Ноотропное, повышение продуктивности мышления, улучшение памяти.

Показ.: Состояния после нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм (в т.ч. у детей); атеросклероз церебральных артерий (с явлениями размягчения мозга); артериальная гипертензия (особенно с головной болью, головокружением, нарушением сна); алкогольные энцефалопатии и полиневриты; педиатрическая практика - церебральный паралич, последствия родовой травмы, отставание умственного развития.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Повышение температуры тела, тошнота, бессонница, возможны колебания АД (в первые дни приема).

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. Взрослым - в суточной дозе по 3-3,75 г; детям от 1 года до 3 лет - по 1-2 г в сутки, 4-6 лет - по 2-3 г в сутки, старше 7 лет - по 3 г в сутки. Длительность лечения - от 2 нед до 4 мес.

Произв.: Iskra (Япония)

Гаразон (Garasone®)

Сост. и ф.в.: 1 мл стерильного раствора (глазные/ушные капли) или 1 г глазной мази содержат гентамицина (в форме сульфата) 3 мг и бетаметазона (в форме натрия фосфата) 1 мг; во флаконах по 5 мл или в тубах по 5 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, антибактериальное (широкого спектра).

Показ.: Стафилококковый блефароконъюнктивит, флюктукулярный кератоконъюнктивит, инфекционно-аллергический кератоконъюнктивит, аллергический конъюнктивит, вторично инфицированный конъюнктивит; блефарит, кератит, эписклерит, дакриоцистит, ячмень, повреждения глаз, вызванные радиацией, ожогом, химическими и послеоперационными факторами. Острый и хронический наружный отит, экзема наружного слухового прохода, себорейный дерматит, контактный дерматит, осложненный вторичной инфекцией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, вакцинация, древовидный кератит, герпетический кератит, ветрянка и другие вирусные заболевания конъюнктивы, туберкулезные и грибковые инфекции глаза или уха, трахома, отсутствие или перфорация барабанной перепонки, возраст до 8 лет.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Жжение, повреждения зрительного нерва, нарушения остроты и поля зрения, задняя субкапсулярная катаракта, острый наружный увеит, миодриаз, птоз верхнего века, парез аккомодации, аллергические реакции; при длительном применении - повышение внутриглазного давления, глаукома.

Примен. и доз.: Глазные капли: вводят по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в сутки. В острой стадии до 2 капель каждые 1-2 ч. Длительность лечения зависит от тяжести и продолжительности заболевания. Ушные капли: закапывают в очищенный от серы и выделений слуховой канал по 3-4 капли от 2 до 4 раз в сутки. Можно также ввести в ушной канал ватный тампон, смоченный препаратом и закапывать в него каждые 4 ч. Тампон может находиться в ухе не более суток. Глазная мазь: в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в сутки. В острых случаях можно применять каждые 2 ч. При хронических заболеваниях необходимо постепенно уменьшать частоту применения препарата, вплоть до его отмены.

Предост.: Предназначен только для местного применения. Нельзя вводить субконъюнктивально или в переднюю камеру глаза. Не рекомендуется лечение корнеальных язв, вызванных *Pseudomonas aeruginosa*. Для предотвращения распространения инфекции, необходимо избегать применения одного флакона для лечения отита и глазных инфекций.

Произв.: Schering-Plough (США)

Гарамицин (Garamycin®)

Гентамицин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит гентамицина сульфата 40 мг; в ампулах по 1 и 2 мл; в упаковке 10 шт.

1 г крема или мази - 1 мг; в тубах по 15 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра.

Показ.: Септицемия, бактериемия, сепсис новорожденных, инфекции почек и мочеполовых путей, внутрибрюшные инфекции (включая перитонит), инфекции ЖКТ, дыхательных путей, органов зрения, ЦНС (включая менингит), кожи, костей и мягких тканей (включая инфицированные ожоги и раны), периперационная профилактика инфекции, гонорея. Крем, мазь: бактериальные поражения кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Нарушение функции почек, поражение преддверной и улитковой ветвей 8 пары черепно-мозговых нервов: головокружение, снижение слуха, шум в ушах; онемение и покалывание кожи, мышечные подергивания, судороги, синдром, напоминающий злокачественную миастению, синдром, сходный с синдромом Франкони.

Взаим.: Несовместим с фуросемидом, этакриновой кислотой, миорелаксантами, нейро- и нефротоксическими препаратами. Не следует смешивать в одном шприце с другими лекарствами. При совместном назначении с карбенициллином пациентам с хронической почечной недостаточностью снижается период полувыведения гентамицина из сыворотки крови.

Примен. и доз.: В/м или в/в. При тяжелых инфекциях суточная доза для взрослых - 3 мг/кг, кратность введения тремя равными порциями через 8 ч или двумя равными порциями через 12 ч. При инфекциях с высоким риском летального исхода - в суточной дозе 5 мг/кг, кратность - 3-4 раза. При клиническом улучшении дозу уменьшают до 3 мг/кг в сутки. Курс - не более 7-10 дней. Больным с инфекцией мочевых путей и нормальной функцией почек - в/м 160 мг 1 раз в сутки на протяжении 7-10 дней. При гонорее: в/м в дозе 240-280 мг однократно. При применении гарамицина для инъекций (40 мг/мл) рекомендуется вводить по половине дозы в каждую ягодичу. Детям: недоношенным и до одной недели по 2,5-3 мг/кг через 12 ч, свыше одной недели и младенцам по 2,5 мг/кг через 8 ч; старше - 6-7,5 мг/кг в день (2,0-2,5 мг/кг через 8 ч). Субконъюнктивально по 10-20 мг в сутки. Ингаляционно (распыление или эндотрахеальное введение) в дозе 20-40 мг для взрослых и 15-30 мг для детей через 8-12 ч при разбавлении физиологическим раствором до объема 2 мл. При наружном применении наносят тонким слоем 3-4 раза в сутки на пораженную поверхность кожи, при необходимости накладывают повязку.

Предост.: Препарат может вызвать нейро-мышечную блокаду и паралич дыхания. Лечение необходимо проводить при постоянном контроле функции почек; желателен мониторинг уровня гентамицина в крови.

Произв.: Schering-Plough (США)

Гастал (Gastal)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит геля алюминия гидроксида и магнезия карбоната 450 мг и магнезия гидроксида 300 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, обволакивающее.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, симптоматические язвы ЖКТ, гастрит (острый, хронический с повышенной и нормальной секрецией в фазе обострения), острый дуоденит; рефлюкс-эзофагит; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, симптомы раздражения слизистой оболочки желудка, вызванные курением, избыточным потреблением кофе, алкоголя, приемом лекарственных средств, погрешностями в диете; изжога.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос или запор.

Взаим.: Усиливает эффекты леводопы, ацетилсалициловой и налидиксовой кислот, угнетает - тетрациклинов, изониазида, пропранолола, напроксена, хинидина, дигоксина и препаратов железа. Эти средства следует принимать не ранее чем через 2 ч после приема гастала (или за 1 ч до еды).

Примен. и доз.: Внутрь, таблетки следует медленно сосать (не глотать целиком). Взрослым - по 1-2 таблетки 4-6 раз в день, через 1 ч после еды и вечером перед сном. При изжоге - независимо от приема пищи в тех же дозах. Детям в возрасте 6-12 лет - 1/2 дозы для взрослых.

Предост.: У больных с пониженной массой тела, кахексией, а также у детей следует соблюдать осторожность при определении дозировки и длительности лечения; у больных с нарушенной функцией почек надо избегать продолжительного применения больших доз препарата.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Гастерин (Gasterin®)

Сост. и ф.в.: 16 г геля (1 пакетик) содержат алюминия фосфата коллоидного 1,2 г и пектина 0,32 г; в упаковке 20 пакетиков.

Фарм. действ.: Антацидное, адсорбирующее.

Фармакодин.: Действует быстро, через 10 мин после приема.



Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, диспепсия, изжога, нарушения пищеварения лекарственного происхождения (цитостатики, глюкокортикостероиды, антитуберкулезные средства); понос, пищевые и другие интоксикации.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 пакетика 6-8 раз в сутки. Гель можно развести водой в соотношении 1:1.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Гастрикумель (Gastricumel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Argentum nitricum D6, Arsenicum album D6 по 30 мг; Pulsatilla D4, Nux vomica D4, Carbo vegetabilis D6, Antimonium crudum D6 по 60 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антиспастическое, седативное, гемостатическое.

Показ.: Острые и хронические гастриты с различной кислотообразующей функцией; функциональные расстройства (изжога, метеоризм, гастрокардиальный синдром) и спазмы ЖКТ, язва двенадцатиперстной кишки, заболевания печени.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день. При спазмах ЖКТ комбинируют со Спаскупрель, при язве двенадцатиперстной кишки - с Дуоденохель, при заболеваниях печени - с Хепель.

Произв.: Heel (Германия)

Гастроzem (Gastrozem®)

Пирензепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пирензепина дигидрохлорида 25 мг; в упаковке 20 или 60 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, селективная блокада m₁-холинорецепторов, снижение базальной и стимулированной секреции соляной кислоты, уменьшение пептической активности желудочного сока.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит, эрозивный гастрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (первый триместр), детский возраст.

Поб. действ.: Сухость во рту, повышение аппетита, диарея, нарушение аккомодации.

Примен. и доз.: Внутрь, в начале терапии - 50 мг (2 таблетки) однократно перед едой, затем после исчезновения нежелательных нарушений - по 1 таблетке утром и вечером в течение 2-3 нед. Дозу можно увеличить до 150 мг в сутки.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Гевизош® (Hevisos®)

Эпервудин*

Сост. и ф.в.: 10 г мази (суспензионной) содержат эпервудина 80 мг; в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противовирусное, противогерпетическое.

Фармакодин.: Активен в отношении вируса простого и опоясывающего герпеса.

Показ.: Простой герпес (labialis и genitalis), опоясывающий герпес (включая рецидивирующие формы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Слабое чувство жжения в месте нанесения мази.

Примен. и доз.: Наружно. Пораженную поверхность кожи покрывают тонким слоем мази 3-5 раз в день, в течение 3-5 дней (курс может быть увеличен до 6-12 дней). Лечение необходимо начинать при появлении первых признаков заболевания.

Произв.: Biogal (Венгрия)

Геделикс (Hedelix®)

Геделикс сироп от кашля (Hedelix® syrup cough control)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл (30 капель) содержит 0,1 г жидкого экстракта листьев плюща (1:1), что соответствует 0,1 г действующего вещества (вспомогательные вещества - пропиленгликоль, глицерол, ароматические вещества); во флаконах по 50 мл.

100 мл ароматизированного сиропа - 2 г густого (1:1) стандартизованного экстракта листьев плюща (1 мерная ложка = 5 мл - 1,75 г сорбита, соответствующих 0,15 ХЕ); во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, спазмолитическое.

Клин. фарм.: Геделикс вызывает разжижение вязкой бронхиальной слизи и снимает спазм бронхов, облегчая процесс откашливания и улучшая дыхание.

Показ.: Катары дыхательных путей; хронические воспалительные заболевания бронхов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Не установлено.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старшего возраста - в неразбавленном виде, детям младшего возраста, грудным - разбавляют во фруктовом соке или чае. Сироп: взрослым и детям 10-16 лет - по 5 мл 3-4 раза в день; детям 4-10 лет - по 2,5 мл 4 раза в день, 1-4 года - по 2,5 мл 3 раза в день, до 1 года - по 2,5 мл 2 раза в день. Капли назначают 3 раза в день; взрослым и детям 10-16 лет - по 30-40 капель, детям 4-10 лет - по 20 капель, детям 1-4 лет - по 15 капель, детям до 1 года - по 10 капель. Длительность лечения зависит от вида и тяжести заболевания, но не менее 1 нед; рекомендуется продолжение лечения в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания. Поскольку Геделикс не содержит ни спирта, ни сахара, его могут применять как диабетики, так и пациенты, которые должны избегать употребления алкоголя.

Предост.: Возможное помутнение, появление осадка и/или незначительное изменение вкуса препарата, что не снижает терапевтического эффекта.

Произв.: Krewel Meuselbach (Германия)

Гексадрепс (Hexadrepс®)

Биклотимол*

Сост. и ф.в.: Пастилка для рассасывания содержит биклотимола 20 мг.

Фарм. действ.: Антисептическое.

Фармакокин.: Биклотимол медленно всасывается через слизистую оболочку полости рта, что обеспечивает длительное действие.

Фармакодин.: Обладает антибактериальной активностью в отношении стафилококков, стрептококков, микрококков и коринебактерий.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Не отмечены.

Взаим.: Избегать одновременного применения других местных антисептиков.

Примен. и доз.: Сублингвально, 4-6 пастилок в сутки. Детям старше 6 лет - 1-3 пастилки в сутки.

Предост.: Если симптомы не исчезли через 5 дней, следует скорректировать лечение. Необходимо учитывать наличие сахара (1,36 г сахарозы в одной пастилке).

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Гексализ (Hexalyse®)

Сост. и ф.в.: Таблетка содержит биклотимола 5 мг, лизоцима 5 мг, эноксолон 5 мг; в упаковке 30 шт. Содержание сахара в таблетке - 1,054 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, анальгезирующее, противовоспалительное, очищающее.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки ротовой полости (в том числе стоматиты) и ротоглотки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к компонентам состава.

Примен. и доз.: Сублингвально, до полного рассасывания таблетки (не разжевывать). Суточная доза - 6-8 таблеток, не более 10 дней.

Предост.: При назначении больным диабетом необходимо принимать во внимание наличие сахара в наполнителе пастилки (1,054 г), избегать длительного применения.

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Гексамидин (Hexamidinum)

Примидон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит примидона 0,25 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное.

Показ.: Эпилепсия (большие судорожные приступы).

Противопоказ.: Печеночно-почечная недостаточность, анемия, лейкопения.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, головная боль, атаксия, тошнота, анемия, лейкопения, лимфоцитоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 0,125 г/сутки, с постепенным повышением до 0,5-1,5 г.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Гексапневмин (Hexapneumine®)

Сост. и ф.в.: Свеча для взрослых (детей и грудных детей) содержит соответственно биклотимола 160 или 80 мг, эвкалиптола 140 или 70 мг, парацетамола 400

или 200 мг, фолкодина 15 или 5 мг; в упаковке 6 шт.

Свеча для грудных детей содержит биклотимола 40 мг, эвкалиптола 35 мг и парацетамола 100 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, антимикробное, жаропонижающее, противокашлевое.

Показ.: Острые заболевания верхних дыхательных путей, в т.ч. сопровождающиеся сухим кашлем.

Противопоказ.: Легочная недостаточность, астматический кашель, печеночно-клеточная недостаточность, беременность (первый триместр), лактация, возраст - свечи для детей до 30 мес, свечи для взрослых - до 15 лет.

Поб. действ.: Тошнота, боли в эпигастрии, очень редко - тромбоцитопения, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке); связанное с фолкодином: сонливость, тошнота, запор, бронхоспазм, угнетение дыхания.)

Примен. и доз.: Ректально, взрослым - по 1 свече для взрослых 3 раза в день; детям до 30 мес - по 1 свече для грудных детей 2 раза в день (утром и вечером), старше 5 лет - по 1 свече для детей 2-3 раза в день.

Предост.: Осторожно назначать водителям транспорта.

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Гексапневмин (Нехарпневмин®)

Сост. и ф.в.: 100 мл сиропа для взрослых и детей содержат соответственно биклотимола 198 и 150 мг, фолкодина 133 и 100 мг, хлорфенамина малеата 13,3 и 10 мг, гвайфенезина 200 мг; во флаконах по 200 мл. 100 мл сиропа для грудных детей содержат биклотимола 100 мг, хлорфенамина малеата 5 мг, экстракта толуанского бальзама 10 мг, гвайфенезина 200 мг, парацетамола 500 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антимикробное, антигистаминное (блокада H₁-рецепторов), стимуляция бронхиальной секреции, противокашлевое центральное (фолкодин, в сиропе для грудных детей - сироп Tolu), жаропонижающее, анальгезирующее (парацетамол для грудных детей), усиление перистальтики желудка, противорвотное.

Фармакодин.: Фолкодин в составе препарата (сироп для взрослых и детей) угнетает кашлевой центр, биклотимол оказывает антимикробное действие,

хлорфенамина малеат - антигистаминное, гвайфенезим стимулирует бронхиальную секрецию.

Показ.: Сухой кашель, в т.ч. аллергический, и при острых заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся лихорадкой.

Противопоказ.: Глаукома, задержка мочи, сироп для взрослых и детей - легочная недостаточность, астматический кашель; сироп для грудных детей - печеночно-клеточная недостаточность (обусловлено действием парацетамола).

Бер. и корм. гр.: Допустимо, но с осторожностью, начальную дозу следует уменьшить вдвое.

Поб. действ.: Сонливость, очень редко - нарушение аккомодации, запоры, дискинезии, лейкопения, агранулоцитоз, аллергические реакции (зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке); обусловленные фолкодином: запоры, тошнота, бронхоспазм, угнетение дыхания, лекарственная зависимость; обусловленные парацетамолом: тошнота, боли в эпигастрии, анемия, тромбоцитопения.

Взаим.: Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - 3-6 столовых ложек в сутки в 3 приема. Детям до 2 лет - 1-2 чайные ложки, до 8 лет - 2-3, до 10 лет - 4-6 чайные ложки, до 15 лет - 2-3 столовые ложки в день.

Предост.: При назначении грудным детям - избегать длительного применения; с осторожностью назначать пациентам пожилого возраста, уменьшая начальную дозу.

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Гексапневмин (Нехарпневмин®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит биклотимола 30 мг, фенилэфрина хлоргидрата (неосинефрита) 10 мг, хлорфенамина малеата 2 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антикongестивное, антисептическое, антигистаминное (блокада H₁-рецепторов гистамина); спазмолитическое, седативное, противоотечное, антисекреторное (уменьшение гиперсекреции слизистой бронхов и носа).

Показ.: Острые ринофарингиты (отек слизистой носа, назальная гиперсекреция), слезотечение.

Противопоказ.: Закрyтоугольная глаукома, утеропростатические нарушения (риск задержки мочи), беременность (I триместр), лактация, возраст (до 15 лет).

Поб. действ.: Дневная сонливость, атропиноподобные эффекты: увеличение вязкости бронхиального секрета, сухость во рту, расстройства аккомодации, запор, задержка мочи, спутанность сознания и возбуждение у пожилых больных.

Взаим.: Несовместим с алкоголем. Потенцирует действие средств, угнетающих ЦНС (снотворные, анестетики), центральное атропиноподобное действие антихолинергических средств (антигистаминные, трициклические антидепрессанты, фенотиазиновые нейролептики, антипаркинсонические, атропиновые спазмолитики и др.).

Передоз.: Симптомы: гипертензия, брадикардия, возбуждение, делирий, галлюцинации, депрессия, кома, судороги, лихорадка, гиперемия кожи. Лечение симптоматическое, включая вспомогательное или искусственное дыхание, противосудорожные средства.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день; детям старше 15 лет - по 1 таблетке 2 раза в день.

Предост.: Может дать положительные результаты при антидопинговом контроле. Необходимо избегать длительного приема. Осторожно назначать водителям транспортных средств и операторам машин (вызывает сонливость).

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Гексаспрей (Hexaspray®)

Биклотимол*

Сост. и ф.в.: Аэрозольный баллон 30 г содержит биклотимола 0,75 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, анальгезирующее, противовоспалительное.

Фармакокин.: Всасывается через слизистую оболочку ротовой полости очень медленно, что обеспечивает длительное действие.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки ротовой полости и носоглотки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст до 2,5 лет (угроза ларингоспазма).

Поб. действ.: Гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата.

Примен. и доз.: Местно в виде аэрозоля, по 2 дозы 3 раза в сутки. Перед применением флакон необходимо встряхивать. Курс не более 10 дней. При увеличении продолжительности лечения необходима консультация врача.

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Гексорал (Hexoral®)

Гексетидин*

Сост. и ф.в.: 10 мл раствора для местного применения содержат гексетидина 10 мг; во флаконах по 60 и 200 мл и в аэрозольных баллонах по 40 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, противогрибковое, гемостатическое (местное), анальгезирующее, обволакивающее, дезодорирующее.

Клин. фарм.: После однократного введения эффект продолжается 10-12 ч.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания (в т.ч. грибковые инфекции) полости рта и гортани (ангины, в т.ч. Плаут-Винцента, тонзиллит, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, пародонтоз, пародонтопатии, альвеолит, афты, молочница и др.); кровоточивость десен; травмы и операции полости рта и гортани; ОРЗ и ОРВИ (вспомогательное средство); профилактика суперинфекций; в качестве гигиенического и дезодорирующего средства.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Нарушение вкуса (при длительном применении).

Примен. и доз.: Местно, 2 раза в сутки, утром и вечером, после еды; при необходимости возможно более частое использование (аэрозоль). 10-15 мл неразведенного раствора применяют для полосканий или промываний горла в течение 30 с или наносят с помощью палочки с ватой на пораженные места. Аэрозолем обрабатывают пораженные участки в течение 1-2 с.

Произв.: Parke-Davis/Gödecke (Германия)

Геласпон (Gelaspon)

Сост. и ф.в.: Губка в форме стерильных пластин размером 85x40x10 мм, содержащая 100 мг желатина, полученного из свиной кожи и сшитого формальдегидом; в герметичной упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Гемостатическое местное.

Показ.: Кровотечения при операциях (нейрохирургических, урологических, стоматологических, гинекологических, акушерских и др.), тампонада.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфицированные раны.

Поб. действ.: Нарушение заживления ран вследствие неправильного применения препарата (загрязненное ложе имплантата, термические травмы при сверлении зубов).

Примен. и доз.: Местно, накладывают на рану или дефект ткани (при необходимости губку вырезают по форме раны стерильными ножницами). При сильных кровотечениях или глубоких дефектах кожи возможна аппликация нескольких слоев губок.

Произв.: Ankerpharm (Германия)

Геломиртол форте (Gelomyrtol® forte)

Сост. и ф.в.: 1 капсула, растворимая в тонком кишечнике, содержит миртола 300 мг, стандартизированного на минимальное содержание лимонена 75 мг, цинеола 75 мг и альфа-пинена 20 мг; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее (стабилизация мукоцилиарного транспорта), муколитическое, противомикробное, дезодорирующее.

Фармакокин.: Хорошо всасывается в тонком кишечнике, выделяется легкими.

Показ.: Острый и хронический бронхиты, синуситы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности (особенно в первый триместр) назначают только по строгим показаниям.

Поб. действ.: Диспепсия, подвижность имеющихся в почках и желчном пузыре камней, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды, обильно запивая холодным напитком, - по 1 капсуле 3-4 раза (при остром воспалении) или 2 раза (при хроническом) в день. Для облегчения утреннего отхаркивания при хроническом бронхите принимают дополнительно 1 капсулу перед сном; детям до 10 лет - половину дозы взрослого.

Произв.: Pohl-Boskamp (Германия)

Гелусил лак (Gelusil® lac)

Сималдрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сималдрата (алюмомагния силиката гидрата) 500 мг и обезжиренного порошкового молока 300 мг; в упаковке 40 шт.

1 г порошка для приготовления орального раствора - 156 и 842 мг соответственно; в пакетиках по 6,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, адсорбирующее.

Показ.: Гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые формы почечной недостаточности.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, через 1-2 ч после еды - по 1 таблетке (разжевать) или 1 пакетiku порошка (растворяют в 1/4 стакана воды) 3-6 раз в день.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Гелусил-суспензия (Gelusil®-suspension)

Сималдрат*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии содержит сималдрата (алюмомагния силиката гидрата) 172 мг; в пакетиках по 12 мл; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, адсорбирующее, обволакивающее.

Показ.: Гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, раздражение желудка, диспепсия.

Противопоказ.: Тяжелая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Гипермагниемия.

Взаим.: Уменьшает всасывание железа, тетрациклинов, пропранолола, изониазида.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 пакетiku через 1-2 ч после приема пищи.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Гемзар (Gemzar)

Гемцитабин гидрохлорид

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит гемцитабина гидрохлорида 200 мг или 1 г.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Немелкоклеточный рак легкого, молочной железы, яичников, простаты, мелкоклеточный рак легкого, почек, поджелудочной железы и мочевого пузыря (запущенные формы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Подавление функции костного мозга (анемия, лейкоцитопения, тромбоцитопения), повышение уровня печеночных трансаминаз, диспептические расстройства, протеинурия, гематурия, одышка, сыпь, зуд, бронхоспазм, сонливость, слабость, парестезия, симптомы гриппа (лихорадка, головная боль, боль в спине, озноб, миалгия, слабость, потеря аппетита, кашель, на-

сморк, потливость, бессонница), отеки, алопеция, стоматит.

Примен. и доз.: В/в (30-минутная инфузия) 1000 мг/м² 1 раз в неделю в течение 3 нед. Повторный курс - через 2 недели.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Геминеврин (Heminevrin®)

Клометиазол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит клометиазола 300 мг; в упаковке 100 шт.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для инъекций - 4 г (в виде клометиазола эдисилата), в комплекте с растворителем (буферный раствор цитрата натрия 0,25 г/мл); в упаковке 5 комплектов.

Фарм. действ.: Снотворное, седативное, противосудорожное.

Показ.: Нарушение сна, спутанность сознания в сочетании с беспокойством (у больных пожилого возраста), алкогольный делирий, выведение из алкогольного состояния, премедикация перед региональной анестезией, эпилептический статус, преэклампсия, эклампсия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая дыхательная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Головные боли, утомляемость, тахикардия, потливость, нарушение температуры тела, тошнота, рвота, расстройства дыхания, подавление кашлевого рефлекса, нарушения сердечного ритма, снижение АД, тромбофлебит (после инъекций), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в. Расстройства сна - 300 мг на ночь, при возбуждении - 300 мг 3 раза в сутки. Синдром алкогольной абстиненции - начинают с 1,92-2,304 г в 3-4 инъекции, затем снижают до 768 мг - 1,152 г/сутки (в течение 10 дней); алкогольный делирий - 384-768 мг (не более 1,536 г в первые 2 ч). При сохранении симптомов переходят на в/в введение - 24-60 мг в мин, затем - 4-8 мг/мин (в течение 6-12 ч). За это время вводят 4-8 г препарата. Премедикация - 200 мг/мин, в/в, в течение 1-2 мин (до 8-32 мг/мин). Преэклампсия - 24 мг/мин в течение 5-10 мин до достижения сонливости. Молниеносная форма эклампсии - с 24-60 мг/мин до 4-8 мг/мин.

Предост.: Осторожно назначать пациентам с сердечной и легочной недостаточностью. Необходимо обеспечить положение

пациента для лучшего оттока секрета, особенно при невозможности больного самостоятельно поддерживать проходимость дыхательных путей. При длительном приеме возможно развитие психической и физической зависимости, при резкой отмене - синдром абстиненции. Во время лечения необходимо избегать деятельности, требующей повышенного внимания и быстроты реакций.

Произв.: Astra (Швеция)

Гемофил М (Hemofil М)

Антигемофильный фактор VIII

Сост. и ф.в.: 1 флакон со стерильным, апиогенным, лиофилизированным порошком для приготовления инъекций содержит антигемофильного фактора VIII человека 250, 500 или 1000 МЕ.

Фарм. действ.: Нормализация свертывания крови у больных гемофилией, восполнение дефицита антигемофильного фактора.

Показ.: Гемофилия А (классическая). Нарушения гемостаза, вызванные циркулирующими ингибиторами фактора VIII, в случаях, если их уровень не превышает 10 Bethesda Ед/мл.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, болезнь фон Виллебранда.

Поб. действ.: Редко - тошнота, лихорадочные состояния, озноб, крапивница.

Примен. и доз.: В/в, в индивидуальной дозе.

Произв.: Baxter (США)

Гентамицин (Gentamicin®)

Гентамицин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит гентамицина сульфата 40, 80 или 120 мг; в упаковке 10 шт.

1 г мази - 1 мг; в тубах по 15 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции мочевыводящих и дыхательных путей, органов ЖКТ, кожи и мягких тканей, костей, инфицированные ожоги, септицемия, перитонит, менингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, неврит слухового нерва, беременность.

Поб. действ.: Олигурия, протеинурия, микрогематурия, почечная недостаточность, снижение слуха, глухота, вестибулярные нарушения, повышение содержания печеночных трансаминаз, гипер-

билирубинемия, анемия, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения; тошнота, рвота, головная боль, сонливость, нарушения нервно-мышечной проводимости, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, лихорадка, редко - отек Квинке).

Примен. и доз.: В/м, в/в (капельно в течение 1-2 ч, разведя в 100-200 мл физиологического раствора или 5% глюкозы до концентрации 1 мг/мл), субконъюнктивально. Курс - 7-10 дней. Суточная доза - 3 мг/кг (на 2 приема), при тяжелой инфекции - 5 мг/кг (на 3-4 приема); при инфекциях мочевых путей - 120-160 мг 1 раз в сутки в течение 7-10 дней. Детям до 2 лет - 6 мг/кг массы в 3 приема, недоношенным и новорожденным - 6 мг/кг в сутки (на 2 приема), детям старше 2 лет - 3-5 мг/кг в сутки (на 3 приема). Субконъюнктивально - 10-20 мг.

Произв.: Lek (Словения)

Гентамицин (Gentamicin)

Гентамицин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит гентамицина сульфата 80 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, костей и мягких тканей, сепсис, менингит, перитонит, раневые и ожоговые инфекции, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, неврит слухового нерва, выраженные нарушения функции почек, уремия, беременность.

Поб. действ.: Нарушения слуха, функции почек и нервно-мышечной проводимости, головная боль, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, повышение уровня сывороточного билирубина и трансаминаз, аллергические реакции.

Взаим.: Диуретические средства (фуросемид, урегит) увеличивают ототоксичность.

Примен. и доз.: В/м, в течение 7-10 дней - по 3-5 мг/кг в сутки (в 2-4 приема). При гонококковых инфекциях и неспецифических уретритах - 240-280 мг однократно. Новорожденным и детям до 2-х лет - 6 мг/кг в сутки (в 2-3 приема). В/в (в исключительных случаях), разовую дозу разводят в 100-200 мл физиологическом или 5% растворе глюкозы и вводят в течение 1-2 ч.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Гентамицин (Gentamicin)

Гентамицин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит гентамицина сульфата 40 мг, в ампулах по 1 и 2 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, мочеполовой системы, глаз, инфицированные ожоги, септицемия, внутрибольничные инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, поражения вестибулярного или кохлеарного аппарата, выраженные нарушения функции почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головокружение, шум в ушах, нистагм, синдром Меньера, нарушение равновесия, глухота, периферические нейропатии, почечные нарушения (поражение клубочков, канальцевый некроз), агранулоцитоз, анемия, тошнота, рвота, потеря массы тела, легочный фиброз, алопеция, суперинфекции, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ото- и нефротоксичными препаратами, усиливает эффект миорелаксантов.

Примен. и доз.: В/м или в/в, эндотрахеально (пневмония), субконъюнктивально (при тяжелых глазных инфекциях). Суточная доза - 2-5 мг/кг в 3-4 приема; курс - 3-10 суток.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Гентамицина сульфат (Gentamicini sulfas)

Гентамицин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит гентамицина сульфата 40 мг; в ампулах по 1 и 2 мл, в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, костей и суставов, мягких тканей, бактериемия, септицемия, раневая инфекция и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, неврит слухового нерва, нарушения функции почек, беременность.

Поб. действ.: Нарушения слуха и вестибулярного аппарата, функции почек, ослабление нервно-мышечной проводимости.

Взаим.: Несовместим с препаратами, оказывающими ото- или нефротоксическое действие, мышечными релаксантами и диуретиками.

Примен. и доз.: В/м, в/в (капельно) 2-3 раза в день. При инфекциях мочевыводящих путей разовая доза - 0,4 мг/кг, суточная - до 1,2 мг/кг. При сепсисе и других тяжелых инфекциях разовая доза - 0,8-1 мг/кг, суточная - 2,4-3,2 мг/кг, максимальная суточная - 5 мг/кг. Курс - 7-8 дней. Суточная доза для новорожденных и детей грудного возраста 2-5 мг/кг, 1-5 лет - 1,5-3 мг/кг, 6-14 лет - 3 мг/кг.

Произв.: Санитас (Литва)

Гентамициновая мазь (Unguentum Gentamycini)

Гентамицин*

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит 0,001 г гентамицина сульфата; в банках по 25 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы.

Показ.: Бактериальные поражения кожи, пиодермия, фолликулиты, фурункулез, раневые и ожоговые инфекции кожи, инфицированные варикозные язвы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Редко - аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница).

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженное место 3-4 раза в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Гентос (Gentos®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Populus D1 7 мл, Sabal D6 10 мл, Conium D6 10 мл, Kalium jodatum D12 10 мл, Ferrum picricum D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, резорбтивное, подавление гиперплазии предстательной железы.

Показ.: Острые и хронические заболевания предстательной железы (простатит, гипертрофия предстательной железы) и мочевых органов (цистит, пиелонефрит), эпидидимит, орхит, нарушения мочеиспускания в послеоперационном периоде, никтурия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и подросткам - 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды, 3 раза в день за 30 мин до или через 1 ч после еды. При острых состояниях - каждые 0,5-1 ч по 5-7 капель до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Предост.: Следует с осторожностью применять при заболеваниях щитовидной железы (по назначению врача).

Произв.: Bittner (Австрия)

Гепабене (Hepabene®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит экстракта дымянки лекарственной 275 мг (фу-марина до 4,13 мг) и экстракта плодов расторопши пятнистой 70-100 мг (сили-марина - 50 мг с не менее 22 мг силиби-нина); в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Желчегонное, спазмолитическое, гепатопротективное.

Фармакодин.: Нормализует количество секретируемой желчи, расслабляет гладкую мускулатуру желчных протоков и желчного пузыря, снижает тонус сфинктера Одди; связывает свободные радикалы в ткани печени, обладает антиоксидантной, мембраностабилизирующей активностью, стимулирует синтез белка, способствует регенерации гепатоцитов.

Показ.: Дискинезии желчевыводящих путей на фоне заболеваний печени; постхолецистэктомический синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей.

Поб. действ.: Диарея, увеличение диуреза.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, запивая небольшим количеством воды, взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки. При ночном болевом синдроме - дополнительно 1 капсула перед сном. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной - 6 капсул (в 3-4 приема).

Предост.: В периоды беременности и лактации назначают только по строгим показаниям под тщательным врачебным контролем. Во время лечения следует строго соблюдать диету, воздерживаться от употребления алкоголя.

Произв.: Merckle (Германия)

Гепальпан (Hepalpan)

Сост. и ф.в.: 100 г геля (желе) содержат гепарина натрия 30000 МЕ, аллантоина и d-пантенола по 250 мг; в упаковке 50 г.

100 г мази - гепарина натрия 30000 МЕ,

аллантиина 300 мг и d-пантенола 400 мг; в упаковке 50 г.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное, стимуляция регенерации, эпителизации, развитие грануляций.

Показ.: Флебит, поверхностный тромбоз, флебит, предварикозный синдром, постфлебитический синдром, травмы (гематомы, ушибы, растяжения).

Противопоказ.: Кровоточащие трофические язвы, сниженная свертываемость крови.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 2-3 раза в день и слегка втирают. Средний курс - 15 дней.

Предост.: Нельзя наносить на слизистые оболочки и на поверхность открытых ран.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Гепар композитум (Hepar compositum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл раствора для инъекций содержит Vitamin B₁₂ D4, Hepar suis D8, Duodenum suis D10, Thy-mus suis D10, Colon suis D10, Vesica fellea suis D10, Pankreas suis D10, China D4, Lycopodium D4, Chelidonium D4, Carduus marianus D3, Histamin D10, Sul-fur D13, Avena sativa D6, Fel tauri D8, Natrium oxalaceticum D10, Acidum a-ke-toglutaricum D10, Acidum DL-malicum D10, Acidum fumaricum D10, a-lipon-saure D8, Orotsaure D6, Cholesterinum D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D28, Taraxacum D4, Cynara scolymus D6, Veratrum D4 по 22 мкл; в упаковке 5, 100 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротективное, дезинтоксикационное, метаболическое.

Показ.: Острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей (гепатит, жировой гепатоз, цирроз, холецистит, холангит), расстройства пищеварения, кожные заболевания при функциональной недостаточности печени (гастрокардиальный синдром, желчные колики, тенезмы, дерматиты, дерматозы, нейродермиты, токсические экзантемы), нарушения жирового и углеводного обмена.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: П/к, в/к, в/м (в случае необходимости в/в) - по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Произв.: Neel (Германия)

Гепарин (Heparin)

Гепарин натрия*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 5 мл раствора для инъекций содержит гепарина 25 000 ЕД.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное прямое.

Показ.: Тромбозы (в том числе коронарных сосудов, осложненные инфарктом миокарда), тромбоэмболии (профилактика и лечение), диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипокоагуляция, язвенные поражения и опухоли ЖКТ, подострый бактериальный эндокардит, тяжелые нарушения функции печени и почек, операции на головном мозге и позвоночнике.

Поб. действ.: Кровотечения из слизистых оболочек и ран, тромбоцитопения, аллергические реакции (бронхоспазм, лихорадка, слезотечение, ринит, крапивница).

Взаим.: Эффект усиливается другими антикоагулянтами и нестероидными противовоспалительными препаратами. Связывается и инактивируется аминами (протамином) и полипептидами, имеющими щелочную реакцию, АКТГ, алкалоидами, тироксином, тетрациклинами.

Примен. и доз.: В/в капельно: лечебное применение - доза 15 МЕ/кг/ч, перед инфузией в/в струйно 5000 МЕ для быстрого антикоагулянтного действия. Суточная доза не должна превышать 60000-80000 МЕ и лишь в исключительных случаях может быть применена более 10 дней. П/к - по 10000 МЕ 4 раза в день. Профилактическое применение - п/к (в область живота) по 5000 МЕ 2 раза в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Гепарин (Heparinum)

Гепарин натрия*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит гепарина натрия 5000 МЕ, во флаконах по 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное прямое, антиагрегационное, фибринолитическое, противовоспалительное.

Показ.: Профилактика и лечение тромбозов, тромбозов, тромбозов, острой окклюзии коронарных артерий, инфаркта миокарда; эмболия: легочных артерий, артерий при заболеваниях периферических сосудов; профилактика гемокоагуляции при диализе и др. вмешательствах с экстракорпоральным кровообращением; приготовление образцов крови для

лабораторных целей и переливания крови.

Противопоказ.: Кровотечения, гипокоагуляция, артериальная гипертензия, язвенные поражения ЖКТ, почечная недостаточность, злокачественные новообразования и тяжелые поражения печени, сахарный диабет, шоковые состояния, операции на головном и спинном мозге, глазах; период после операции на предстательной железе, печени и желчных путях; подозрение на внутричерепное кровоизлияние, беременность.

Поб. действ.: Кровотечения: в месте введения препарата, в областях, подвергающихся давлению, из операционных ран, из ЖКТ, гематурия; алоpecia; аллергические реакции: эритема, бронхиальная астма, лихорадка, коллапс; остеопороз и спонтанные переломы при длительном применении.

Примен. и доз.: В/в, можно капельно, в/м (с осторожностью) - в дозах 7500-80000 ЕД в сутки в зависимости от характера и тяжести заболевания и под контролем свертывания крови (время свертывания должно быть в 2-2,5 раза выше нормы).

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Гепарин (Heparin)

Гепарин натрия*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для в/в введения или с 0,25 мл раствора для п/к введения содержит гепарина (в виде натриевой соли) 5000 МЕ; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное, антиагрегационное, противовоспалительное.

Показ.: Профилактика и лечение тромбозов и тромбофлебитов, острая окклюзия коронарных артерий; инфаркт миокарда; эмболия легочной артерии; эмболия артерий при заболеваниях периферических сосудов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кровотечения, злокачественная гипертензия, язвенные поражения слизистой ЖКТ, подострый бактериальный эндокардит, тяжелые нарушения функции печени и почек, злокачественные опухоли печени, сахарный диабет, операции на головном и спинном мозге, глазах, после операций на предстательной железе, печени и желчных путях, шоковые состояния, подозрение на внутричерепное кровоизлияние, беременность.

Поб. действ.: Геморрагии, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, п/к. Дозу и способ введения устанавливают строго индивидуально; минимальная суточная доза 40000-50000 ЕД (8-10 мл) в/в, разделенная на 4 равные дозы, в течение первых 2-3 дней; в тяжелых случаях - до 80000 МЕ (16 мл) в сутки; по жизненным показаниям - в/в по 25000 МЕ (5 мл) сразу и затем по 80000-120000 МЕ (16-24 мл), разделенных на 5-6 равных доз, в течение 2-3 дней. Профилактические дозы соответствуют терапевтическим. Для профилактики послеоперационных осложнений вводят обычно п/к в дозе 5000 МЕ (0,25 мл) за 2 ч до и каждые 8-12 ч после операции в течение 7-10 дней.

Предост.: Не следует резко прерывать лечение (во избежание формирования тромба дозы уменьшают постепенно).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Гепарин Биохеми (Heparin Biochemie)

Гепарин натрия*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 5 мл раствора для инъекций содержит гепарина натрия 25000 МЕ; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное.

Показ.: Профилактика и лечение тромбозов и эмболий, гепаринизация крови при использовании аппарата искусственного кровообращения (АИК) и проведении гемодиализа.

Противопоказ.: Склонность к кровотечениям, тяжелая гипертоническая болезнь, язвенные поражения ЖКТ, прогрессирующие заболевания печени и почек, острый панкреатит, операции на ЦНС и в офтальмологии, беременность, роды.

Поб. действ.: Кровотечение, гематомы, обратимая алоpecia, аллергические реакции.

Взаим.: Антикоагулянтный эффект усиливается другими антикоагулянтами и антиагрегантами.

Примен. и доз.: Профилактика и лечение тромбозов: в/в - 40 000-50 000 МЕ в сутки, распределяя на 4 введения (по показаниям доза может быть снижена до 25 000 МЕ в сутки или увеличена до 125 000 МЕ в сутки в особо тяжелых случаях). При использовании АИК: 150-400 МЕ/кг массы тела. При гемодиализе дозировка подбирается с учетом значений показателей свертываемости крови.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Гепариновая мазь (Unguentum Heparini)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит гепарина 100 ЕД, анестезина 0,04 г и бензилового эфира никотиновой кислоты 0,0008 г; в тубах или банках по 25 г.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное, противовоспалительное, местноанестезирующее.

Показ.: Поверхностный тромбоз флебит конечностей, постинъекционные флебиты, тромбоз геморроидальных вен.

Противопоказ.: Язвенно-некротические процессы, пониженная свертываемость крови, тромбоцитопения.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженное место 2-3 раза в сутки и осторожно втирают в кожу.

Произв.: Акрихин (Россия)

Гепастерил А (Hepasteril® А)

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для инфузий содержит натрия 37,0 ммоль, калия 40,0 ммоль, хлора 40,0 ммоль, аспарагина 10,0 ммоль, L-яблочной кислоты 14,7 г, L-аргинина 28,9 г, сорбита 50,0 г, рибофлавина натрия фосфата 0,012 г, амида никотиновой кислоты 0,1 г, D-пантенола 0,02 г и пиридоксина 0,08 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов, аминокислот, микроэлементов, стимуляция метаболизма, дезинтоксикационное, гепатопротекторное.

Показ.: Печеночная кома и прекома, гепатит, печеночная энцефалопатия, кровотечение из вен пищевода, состояние после наложения порто-кавального анастомоза, повышение уровня аммиака в крови.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, анурия.

Примен. и доз.: В/в, капельно - 500 мл раствора со скоростью 40 капель в минуту. Введение препарата повторяется каждые 12 ч (до исчезновения неврологических симптомов). Дозировка устанавливается индивидуально с учетом исходной концентрации аммиака в крови и корректируется в зависимости от динамики состояния больного.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Гепатофальк планта (Hepatofalk® planta)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит активные вещества расторопши пятнистой, чистотела большого и турмерика яванского в количестве, соответственно, 140, 100 и 25 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, желчегонное, спазмолитическое.

Показ.: Хронический холецистит, холангит, диспептический синдром после операции на желчевыводящих путях, дискинезия желчных путей и желчного пузыря, жировой гепатоз, острый и хронический гепатиты, цирроз печени.

Противопоказ.: Непроходимость желчных путей, гнойный холецистит.

Поб. действ.: Диспепсия.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, запивая небольшим количеством жидкости. В начале лечения или в тяжелых случаях назначают по 2 капсулы 3 раза в сутки (не более 2 нед). Для поддерживающего лечения или в легких случаях - по 1 капсуле 3 раза в сутки. Курс - 1-3 мес, повторный - через 1-3 мес.

Произв.: Dr. Falk (Германия)

Гепатромбин (Hepatrombin®)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат гепарина 30000 ЕД, аллантаина 300 мг и декспантенола 400 мг; в тубиках по 40 г.

100 г геля - гепарина 30000 ЕД, аллантаина 250 мг, декспантенола 250 мг, масла сосны обыкновенной 80 мг и масла Pinus pumilionis 80 мг; в тубиках по 40 г.

Фарм. действ.: Антитромботическое, противовоспалительное, стимуляция эпителизации.

Показ.: Тромбозы, тромбозы, варикозное расширение вен, язвы голени, спортивные травмы, тендовагинит; лимфангит, мастит, фурункул, карбункул.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, повреждения кожи (для геля).

Поб. действ.: Аллергические реакции (сыпь, ангионевротический отек).

Примен. и доз.: Местно. На пораженные участки 1-3 раза в день по 5 см мази. При заболеваниях вен - в виде повязок с мазью. При варикозных язвах мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см. При лечении фурункулов и карбункулов слой мази наносят с разглаженным марлевым компрессом 2 раза в день.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Гептавит (Heptavitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола ацетата 0,00908 г, тиамина бромиды 0,0129 г, рибофлавина монофосфата 0,01 г, пиридоксина гидрохлорида 0,01 г, никотиамида 0,075 г, рутина 0,1 г и кислоты аскорбиновой 0,2 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов.

Показ.: Обморожения, ожоги, вялогранулирующие раны, экзема, туберкулез кожи, псориаз, пигментный ретинит, гемарология, кератомалиция, ксерофтальмия.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1 таблетке 1-2 раза в день в течение 20 дней, повторный курс - через 1-3 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Гептрал (Heptral®)

Адеметионин*

Сост. и ф.в.: Таблетки в кишечнорастворимой оболочке и флакон с лиофилизатом для инъекций содержат 760 мг адеметионина 1,4-бутандисульфоната, что соответствует 400 мг катиона адеметионина. Ампула с растворителем содержит 5 мл L-лизин-буферного раствора каустической соды. Таблетки - в упаковке 20 шт.; лиофилизат во флаконах в комплекте с растворителем - в упаковке 5 комплектов.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, антидепрессивное; донирование метильной группы в биологических реакциях трансметилирования, активация транссульфурирования (предшественник цистеина, таурина, глутатиона, CoA и др.).

Фармакокин.: Таблетки покрыты специальной оболочкой, растворяющейся только в кишечнике, благодаря чему адеметионин освобождается в двенадцатиперстной кишке, где происходит его всасывание.

Показ.: Внутривенный холестаз при прецирротических и цирротических состояниях, депрессии, включая вторичные, алкогольный абстинентный синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Следует воздержаться от назначения в первые два триместра беременности.

Поб. действ.: Не выявлены (ни при длительном применении, ни при высокой дозировке). У некоторых пациентов могут быть неприятные ощущения в области эпигастрия (активное вещество имеет кислый pH), однако они, как правило, слабо выражены и не являются поводом для прекращения лечения.

Передоз.: О клинических проявлениях сведений не имеется.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м или в/в (очень медленно). Интенсивная терапия - 1-2 флакона в день в/м или в/в в течение первых двух или трех недель лечения. Поддерживающая терапия - 2-4 таблетки в день (между приемами пищи, глотать не разжевывая).

Предост.: Раствор следует готовить непосредственно перед применением. Если цвет лиофилизата или таблетки отличается от должного белого, необходимо воздержаться от их использования. Учитывая тонизирующий эффект, не рекомендуется принимать препарат перед сном. При лечении гептралом пациентов с прецирротическим и цирротическим состоянием, на фоне гиперазотемии, следует строго контролировать уровень азота. Не рекомендуется назначать препарат без строгих показаний детям, т.к. клинические испытания, проведенные у детей, недостаточны.

Произв.: Knoll (Германия)

Гестид (Gestid®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит алюминия гидроксида ВР 300 мг, магния трисиликата ВР 50 мг, магния гидроксида USP 25 мг, симетикона 10 мг. Упаковка 20 таблеток - 5 полосок из алюминиевой фольги по 4 таблетки; упаковка 100 таблеток - 10 полосок из алюминиевой фольги по 10 таблеток.

Фарм. действ.: Антацидное, адсорбирующее.

Фармакодин.: После приема внутрь соли алюминия и магния оказывают быстрый антацидный эффект, симетикон препятствует метеоризму. Всасывание в ЖКТ незначительное.

Показ.: Боль и изжога при остром и хроническом гастрите с повышенной кислотностью, обострениях язвенной болезни; после погрешностей в диете и избыточного употребления алкоголя, кофе и после курения; купирование метеоризма при повышенном газообразовании в ЖКТ.

Противопоказ.: Тяжелая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, мышечная слабость, остеопороз (при длительном непрерывном применении больших доз).

Взаим.: Может уменьшать всасывание ряда препаратов, поэтому рекомендуется соблюдать 2-х часовой интервал между их приемом.

Примен. и доз.: Внутрь, через 1-2 ч после еды, по 1-2 таблетки (разжевать и проглотить) 3-4 раза в день или по мере необходимости для устранения боли в желудке и изжоги.

Предост.: Не рекомендуется длительное применение без врачебного контроля.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Гидреа (Hydrea®)

Гидроксикарбамид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит гидроксикарбамида 500 мг; в стеклянном флаконе по 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое, антиметаболическое.

Фармакокин.: Максимальные значения уровня в крови достигаются через 2 ч после приема. Быстро проникает в ткани, в спинномозговой жидкости находится 10-20%, в асцитической - 15-50% концентрации в плазме. Через 24 ч содержание в сыворотке крови приближается к нулю. Период полураспада - 3-4 ч. 80% выделяется почками в течение 12 ч.

Показ.: Хронический и острый миелолейкоз, бластные кризы при хроническом миелолейкозе, злокачественные меланомы, карцинома молочной железы и желудка, опухоли головы и горла (если невозможны или возможны лишь частично резекция или облучение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, лейкоцитопения (менее 3000/куб.мм), тромбоцитопения (менее 100000/куб.мм).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Обратимая гипоплазия костного мозга, гранулоцитопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, раздражение ЖКТ (язвы слизистой оболочки), частичная алоpecia и пятнистопапулезные реакции кожи.

Взаим.: При одновременном приеме антидепрессивных, антигистаминных препаратов, барбитуратов, успокаивающих, снотворных, наркотических средств и алкоголя увеличивается торможение скорости реакции. Повышает эффект цитарабина, ослабляет - 5-фторурацила и метотрексата.

Передоз.: Лечение симптоматическое, т.к. нет специфического антидота; не подвержен диализу.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, запивая небольшим количеством жидкости. Хронический миелолейкоз, начальная терапия - 1600 мг/кв.м поверхности тела 1 раз в сутки с аллопурином в дозе 300 мг/сутки; поддерживающая терапия: при снижении лейкоцитов ниже 20000/куб.мм доза препарата снижается на 600 мг/кв.м. При снижении лейкоцитов ниже 5000/куб.мм прекращают прием; поддерживающая доза - 0,5-2,0 г/сутки. Другие показания: монотерапия - 800-1200 мг/кв.м поверхности тела - суточная разовая доза или 3 дня в каждые 3 нед по 3200 мг/кв.м. При постоянной терапии - не более 1600 мг/кв.м в сутки.

Предост.: Во время лечения следует избегать облучения (возможна гиперпигментация, эритема).

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Гидрокортизон (Hydrocortisone)

Гидрокортизон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекций содержит гидрокортизона натрий сукцината 500 мг; в комплекте с растворителем в ампулах по 4 мл.

Фарм. действ.: Противошоковое, противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Острая недостаточность надпочечников, острые аллергические реакции, астматический статус, профилактика и лечение шока; инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком; тиреотоксический криз; негнойный тиреоидит; врожденная гипоплазия надпочечников, гиперкальциемия вследствие опухолевого заболевания; ревматические заболевания; коллагеновые болезни; пузырчатка; буллезный герпетиформный дерматит; полиморфная буллезная эритема; эксфолиативный дерматит; грибовидный микоз; тяжелые формы псориаза и себорейного дерматита; тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные поражения глаз; симптоматический саркоидоз; синдром Леффлера, не поддающийся другим видам терапии; бериллиоз; туберкулез (одновременно с противотуберкулезной химиотерапией); туберкулезный менингит с развитием субарахноидального блока или с его угрозой (в сочетании с противотуберкулезной химиотерапией); аспирацион-

ный пневмонит; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура взрослых (только в/в), вторичная тромбоцитопения взрослых, приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия; эритробластопения; врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия; лейкозы и лимфомы у взрослых и острые лейкозы у детей; нефротический синдром (при отсутствии уремии), красная волчанка; язвенный колит, регионарный энтерит, трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда, бронхиальная астма, заболевания суставов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые формы гипертонической болезни и болезни Иценко-Кушинга, психозы, нефрит, остеопороз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, активные формы туберкулеза при отсутствии специфического лечения, сахарный диабет, недавно перенесенные операции, системные грибковые заболевания, беременность.

Поб. действ.: Задержка натрия и жидкости в организме, застойная сердечная недостаточность, потеря калия, гипокалиемический алкалоз, гипертония, асептический некроз головок плечевых и бедренных костей, стероидная миопатия, мышечная слабость, остеопороз, патологические переломы, язвенно-эрозивное действие, тошнота, панкреатит, эзофагит, нарушение регенерации, петехии, экхимозы, истончение и хрупкость кожи, отрицательный азотистый баланс, повышение внутричерепного давления, псевдоопухоль мозжечка, психические расстройства, судорожные припадки, нарушение менструального цикла, синдром Иценко-Кушинга, подавление функции гипофиза и надпочечников, стероидный диабет, подавление роста у детей, задняя субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления, экзофтальм, подавление иммунитета, анафилактические реакции с циркуляторным коллапсом, остановкой сердца, бронхоспазмом, нарушением ритма сердца; гипотония или гипертензия.

Примен. и доз.: В/в (струйно или капельно), в/м. При острых состояниях рекомендуется в/в введение. Начальная доза - от 100 мг (вводится 30 с) до 500 мг (вводится 10 мин) в зависимости от тяжести состояния. Дозу повторяют через каждые 2-4-6 ч, в зависимости от состояния больного. Высокие дозы даются только до стабилизации состояния (не более 48-72 ч); при необходимости более длительной терапии целесообразно перейти на другой кортикостероидный

препарат, не вызывающий задержки натрия в организме. Детям дозу снижают с учетом возраста, массы тела, тяжести состояния (доза составляет не менее 25 мг в день).

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Гидрокортизон ацетат (Hydrocortisoni acetas)

Гидрокортизон*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит гидрокортизона ацетата 25 мг, в ампулах по 2 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, десенсибилизирующее, противоаллергическое, противошоковое.

Показ.: Аллергические заболевания кожи, воспалительные заболевания суставов, ревматизм, артриты, бурситы, бронхиальная астма.

Противопоказ.: Тяжелые формы сахарного диабета, гипертонической болезни, недостаточность кровообращения III степени, болезнь Иценко-Кушинга, психозы, нефрит, остеопороз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сифилис, активная форма туберкулеза.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Вирилизация, ожирение, гирсутизм, нарушения менструального цикла, остеопороз, психические нарушения, симптомокомплекс Иценко-Кушинга.

Взаим.: Эффект ослабляют барбитураты, гипокалиемию усиливают диуретики. Снижает действие гипогликемических средств.

Примен. и доз.: Внутрисуставно или в/м. Средняя доза - 0,2-4 мл 1 раз в неделю, курс лечения - 3-5 инъекций.

Произв.: Фармак (Украина)

Гизаар (Hyzaar®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит лозартана калия 20 мг и гидрохлоротиазида 12,5 мг.

Фарм. действ.: Гипотензивное, блокада AT1-рецепторов ангиотензина II, диуретическое.

Фармакодин.: Максимальный гипотензивный эффект достигается в течение 3 нед после начала лечения. Эффективность не зависит от возраста и пола.

Клин. фарм.: Снижает потерю калия и гиперурикемию, наблюдаемую при изолированном использовании гидрохлоротиазида; не требует подбора дозы для пожилых и пациентов с почечной недостаточностью (кроме тяжелых случаев);

предпочтителен для больных, которым рекомендуется комбинированная терапия.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к производным сульфаниламида), анурия, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказан при беременности, особенно во II и III триместрах из-за возможного риска возникновения дефектов развития или гибели плода. При назначении во время лактации следует учитывать возможность проникновения в материнское молоко. В связи с этим при необходимости рекомендуется отменить препарат или прекратить кормление грудью.

Поб. действ.: Головокружение, редко ангионевротический отек (лица, губ, языка), гиперкалиемия.

Взаим.: Совместим (аддитивный эффект) с др. антигипертензивными препаратами. Вероятность ортостатической гипотензии повышают алкоголь, барбитураты, наркотические анальгетики; потерю электролитов, гипокалиемию - кортикостероиды и АКТГ; усиливает действие антидеполяризующих миорелаксантов, токсичность лития; ослабляет - адреномиметиков; холестирамин и холестипол уменьшают всасывание в ЖКТ, а НПВС могут снижать диуретический, натрийуретический и гипотензивный эффекты.

Передоз.: Наиболее вероятные симптомы, обусловленные лозартаном: гипотония и тахикардия (возможна вагусная брадикардия) и гидрохлоротиазидом: гипокалиемия, гипохлоремия, гипонатриемия, дегидратация (вследствие усиленного диуреза). Лечение симптоматическое, включающее коррекцию дегидратации, электролитных нарушений, гипотонии и функций печени, с предварительной отменой препарата и промыванием желудка (если препарат принят недавно). Следует учитывать, что лозартан и его метаболиты не удаляются гемодиализом (эффективность гемодиализа в отношении тиазида не установлена).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день (вне зависимости от приема пищи; в любое время дня). При необходимости - по 2 таблетки 1 раз в день (максимальная доза).

Предост.: Не рекомендуется назначать пациентам с печеночной и тяжелой почечной (клиренс креатинина менее или равен 30 мл/мин) недостаточностью. Во время лечения следует периодически контролировать показатели водно-электролитного баланса, содержание

глюкозы, холестерина и триглицеридов в плазме крови. Может возникнуть необходимость коррекции дозы при сочетании назначения с антидиабетическими средствами.

Произв.: MSD (США)

Гине-Лотримин (Gyne-Lotrimin®)

Клотримазол*

Сост. и ф.в.: 1 вагинальная таблетка содержит клотримазола 100 мг; в упаковке 6 шт в комплекте с аппликатором. 1 г вагинального крема - 10 мг; в тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра, фунгицидное, трихомонацидное (таблетки).

Показ.: Вульвовагинальный кандидоз, трихомонадный вагинит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к клотримазолу.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано во II и III триместрах беременности (данные о применении в I триместре - отсутствуют).

Поб. действ.: Раздражение слизистой влагалища, ощущение жжения, кожные высыпания, эритема, спастические боли внизу живота, учащение мочеиспускания, интеркуррентный цистит, а также жжение и раздражение половых органов у партнера.

Примен. и доз.: Интравагинально, по 1 таблетке в сутки в течение 6 дней. Альтернативная схема - по 2 таблетки 3 дня подряд. Таблетки следует вводить во влагалище как можно глубже. Крем вагинальный: рекомендуемая доза - полный аппликатор 1 раз в сутки (желательно перед сном) ежедневно в течение 6-14 дней.

Предост.: Не рекомендуется проводить лечение во время менструации. Для предупреждения реинфекции следует одновременно проводить лечение полового партнера кремом.

Произв.: Schering-Plough (США)

Гинекохель (Gynacohel®)

Сост. и ф.в.: 100 мл 35% спиртового раствора содержат Apis mellifica D4, Ammonium bromatum D4, Lilium tigrinum D4, Aurum jodatum D12, Crabro vespa D4, Helonias dioica D4, Palladium D12, Platinum metallicum D12, Naja tripudians D12 по 10 мл, Melilotus officinalis D3, Viburnum opulus D2 по 5 мл; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, регуляция функций женских половых органов.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания женских половых органов (аднексит, оофарит, сальпингит, параметрит, миометрит, кольпит), нарушения менструального цикла (дисменорея, аменорея, полименорея и др.), первичное и вторичное бесплодие.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10 капель 3 раза в сутки, в острых случаях - по 10 капель каждые 15 мин в течение 2 ч (не более). При воспалительных заболеваниях комбинируют с Траумель С, белях - с Траумель С и Климакт-Хель, дисменорея - со Спаскупрель, миоме матки - с Псоринохель и Галиум-Хель.

Предост.: При заболеваниях щитовидной железы не следует принимать без консультации с врачом.

Произв.: Neel (Германия)

Гинкор прокто (Ginkor® procto)

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит экстракта Ginkgo biloba 20 мг и бутамбена (бутоформа) 40 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Венотонизирующее, антиагрегационное, улучшение микроциркуляции, снижение проницаемости сосудов, ангиопротекторное, анестезирующее.

Показ.: Геморроидальный криз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Ректально, по 1 свече утром и вечером на протяжении 7 дней.

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Гинкор форт (Ginkor® fort)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит экстракта Ginkgo biloba 14 мг, гептаминола гидрохлорида 300 мг и троксерутина 300 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Венотонизирующее, антиагрегационное, улучшение микроциркуляции, снижение проницаемости сосудов.

Показ.: Нарушение венозного кровообращения нижних конечностей (ощущение тяжести и боли в ногах), геморроидальный криз.

Противопоказ.: Гипертиреоз (из-за входящего в состав гептаминола).

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО (опасность резкого повышения АД).

Передоз.: Повышение АД, тахикардия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 капсулы в день (венозно-лимфатическая недостаточность) или по 2 капсулы 2 раза в день в течение 7 дней (геморроидальный криз).

Предост.: Следует иметь в виду, что "антидопинговый контроль спортсменов" может давать положительную реакцию (в связи с наличием гептаминола).

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Гино-дактанол (Gino-dactanol)

Миконазол*

Сост. и ф.в.: 1 вагинальный суппозиторий содержит миконазола нитрата 200 мг; в упаковке 7 шт.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное.

Фармакодин.: Препарат не нарушает нормальную флору и не изменяет физиологическую pH-активность вагинальной слизистой оболочки.

Показ.: Вагинальные и вульварные кандидозы и инфекции, вызванные грамположительными микробами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Раздражение слизистой оболочки влагалища (редко).

Примен. и доз.: Интравагинально (глубоко), по 1 суппозиторию, перед сном, в течение 7 дней.

Предост.: Рекомендуются одновременная противогрибковая и антибактериальная терапия полового партнера.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Гино-тардиферон (Gyno-Tardyferon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит сульфата железа 256,3 мг, мукопротеозы 80 мг, фолиевой кислоты 0,35 мг, аскорбиновой кислоты 30 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа и фолиевой кислоты в организме, стимуляция гемопоэза.

Показ.: Фолат- и железodefицитная анемии (в т.ч. при беременности).

Противопоказ.: Повышенное содержание железа в организме (гемолитическая

анемия, гемосидероз, гемохроматоз), нарушение утилизации железа (апластическая анемия), мегалобластическая В₁₂-дефицитная анемия.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, потемнение кала.

Взаим.: Несовместим с тетрациклинами, антацидами и препаратами железа для парентерального введения.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой - по 1-2 таблетки в сутки.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Гино-Травоген (Gyno-Travogen®)

Изоконазол*

Сост. и ф.в.: 1 вагинальный шарик содержит изоконазола нитрата 600 мг; в упаковке 1 шт. в комплекте с 2 напальчниками.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное.

Фармакодин.: Спектр действия включает дерматофиты, дрожжевые, дрожжеподобные, плесневые грибы, грамположительные микроорганизмы (стафилококки, микрококки, стрептококки и др.).

Показ.: Грибковые и смешанные (с грамположительными бактериями) инфекции влагалища.

Противопоказ.: Не известны.

Поб. действ.: Умеренное жжение и зуд в течение первых 12-24 ч.

Примен. и доз.: Интравагинально, шарик вводят глубоко во влагалище в положении лежа вечером перед сном, используя прилагаемые напальчники.

Предост.: Не рекомендуется проводить лечение во время менструации.

Произв.: Schering (Германия)

Гинодиан-Депо (Gynodian®-Depot)

Сост. и ф.в.: 1 мл масляного раствора для внутримышечного введения содержит эстрадиола валерата 4 мг и прастерона энантата 200 мг; в шприц-ампулах по 1 мл.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Климактерические расстройства и симптомы эстрогенной недостаточности (овариоэктомия по поводу незлокачественных заболеваний, лучевая кастрация): депрессивные состояния, "приливы", повышенное потоотделение, нарушение сна, гиперестезия мочевого пузыря,

ря, инволюции кожи; профилактика остеопороза в постменопаузе.

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе); тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, рак молочной железы или эндометрия, эндометриоз, герпес (в анамнезе), серповидноклеточная анемия, нарушения жирового обмена, идиопатическая желтуха, зуд или ухудшение отосклероза во время беременности.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Повышенное половое влечение, чувство напряжения в молочных железах, изменение массы тела, депрессивные состояния, появление пятен коричневого цвета на лице.

Примен. и доз.: В/м, по 1 мл каждые 4 нед.

Произв.: Schering (Германия)

Гипозоль (Hiposolum)

Сост. и ф.в.: Комбинированный пенный препарат, содержащий облепиховое масло, метилурацил и этазол натрия; в аэрозольных баллонах по 57 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, регенерирующее, антисептическое.

Показ.: Неспецифические вульвиты, кольпиты, эрозии шейки матки после удаления тела матки, раны прямой кишки после операций на прямой кишке и промежности, острые и хронические эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта, пародонта (механические, химические, физические травмы, ангина Венсана, воспалительные процессы после криодеструкции, декубитальные язвы), ожоги II и III степени.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Местно, распыляют на пораженный участок, при гинекологических заболеваниях - в течение 1-2 с, при заболеваниях прямой кишки - 2-4 с. Процедуру повторяют 1-2 раза в сутки. Длительность лечения - 2-3 нед.

Произв.: Алтайвитамины (Россия)

Гипотиазид (Hypothiazid®)

Гидрохлоротиазид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гидрохлоротиазида 25 или 100 мг; в упаковке 20 и 100 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Диуретическое (натрий-, калий-, хлоруретическое), гипотензивное.

Показ.: Отеки при недостаточности кровообращения, циррозы печени с портальной гипертензией, гипертоническая болезнь, нефроз и нефрит, токсикозы беременных, глаукома, почечная недостаточность, несахарный диабет, профилактика образования камней в почках.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, анурия, нарушение функции почек и печени, тяжелые формы подагры и сахарного диабета, беременность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Потеря аппетита, гастрит, тошнота, рвота, спазм, понос, запор, чувство жажды, холестатическая желтуха, панкреатит, воспаление слюнных желез, головокружение, головная боль, слабость, парестезии, ортостатическая гипотензия, гемолитическая и гипопластические анемии, агранулоцитоз, аллергические реакции (включая некротизирующий васкулит, анафилактический шок).

Взаим.: При одновременном применении с солями лития может повышаться уровень лития в плазме до токсического. Усиливает эффект гипотензивных препаратов, недеполяризующих миорелаксантов, сердечных гликозидов (токсичность за счет гипокалиемии), снижает оральных противодиабетических средств. На фоне кортикостероидов возрастает гипокалиемия.

Примен. и доз.: Внутрь. При отеках - 2 раза в неделю в среднесуточной дозе 5-250 мг в зависимости от состояния и реакции больного. При гипертонической болезни начальная доза - 100 мг/сутки, при удовлетворительной реакции больного курс лечения продолжают поддерживающей дозой, составляющей 25 мг/сутки. Назначая гипотиазид с другими гипотензивными препаратами, его дозу можно уменьшить. Детям в возрасте от 2 мес до 14 лет - по 1 мг/кг массы тела в сутки, разделив на 2-3 приема. После 3-5 дней лечения рекомендуется сделать перерыв на 3-5 дней. В качестве поддерживающей терапии указанную дозу назначают 2 раза в неделю.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Гистаглобулин сухой (Histaglobulinum siccum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекций содержит комплекс иммуноглобулина человека и гистамина дигид-

рохлорида (наполнитель - натрия тиосульфат), в комплекте с растворителем в ампулах; в упаковке 5 комплектов.

Фарм. действ.: Противоаллергическое.

Фармакодин.: Повышает способность сыворотки крови инактивировать свободный гистамин.

Показ.: Аллергические заболевания: хроническая рецидивирующая крапивница, аллергические дерматиты, экземы, астматический бронхит, аллергические конъюнктивиты, поллинозы, рецидивирующие отеки Квинке.

Противопоказ.: Аллергические заболевания в фазе обострения, острые инфекционные заболевания, обострение очагов хронической инфекции (тонзиллит, гайморит, бронхит, холецистит и др.); язвенная болезнь желудка; тяжелые заболевания нервной, кроветворной, эндокринной систем; беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, недомогание.

Взаим.: Несовместим с проведением специфической гипосенсибилизации, профилактическими прививками, кортикостероидной терапией.

Примен. и доз.: П/к. Дозировка устанавливается индивидуально. Для взрослых - максимальная разовая доза 2 мл, для детей - от 0,5 до 1,5 мл (в зависимости от возраста).

Произв.: Биомед им. И.И.Мечникова (Россия)

Гистак® (Histac®)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ранитидина гидрохлорида USP 150 или 300 мг, в упаковке 20 шт.; 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 50 мг, в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, ингибирование базальной и стимулированной секреции соляной кислоты в желудке (блокада H₂-рецепторов).

Фармакокин.: Хорошо всасывается из ЖКТ, биодоступность составляет 50% от дозы, максимальные концентрации достигаются за 1-3 ч.

Клин. фарм.: Через 10 ч после приема внутрь (150 мг) подавление кислой секреции желудка еще значительно выражено.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, неязвенная диспепсия, гиперацидный гастрит, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, послеоперационные язвы; профилактика: кровотечения из ЖКТ

при стрессовых язвах, рецидивов кровотечения из верхних отделов ЖКТ, аспирации желудочного сока при общей анестезии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Допускается лишь в случае острой необходимости.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, диарея, тошнота, аллергические реакции, раздражение в месте инъекции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 300 мг перед сном или по 150 мг утром и вечером в течение 4-8 нед; для профилактики обострений - по 150 мг перед сном; при синдроме Золлингера-Эллисона - по 150 мг 3 раза в день (возможно повышение дозы до 600 мг/сутки). В/в взрослым - по 50 мг каждые 6-8 ч.

Предост.: Перед началом лечения необходимо исключить злокачественные заболевания ЖКТ. С осторожностью назначают при нарушениях функции почек и детям до 14 лет.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Гисталонг (Histalong)

Астемизол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит астемизола 5 (Гисталонг Юниор) или 10 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Аллергический ринит, конъюнктивиты, крапивница, отек Квинке и др. аллергические состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, грудной возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Угнетение ЦНС, головная боль, нарушение сна и настроения, аритмии, повышение аппетита, повышение активности трансаминаз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, натошак взрослым и детям после 12 лет - по 1 таблетке (10 мг) в день. В тяжелых случаях - до 3 таблеток в день в течение 7 суток, затем - по 1 таблетке в день. Детям от 6 до 12 лет - по 1 таблетке (5 мг) 1 раз в день, детям от 2 до 6 лет - по 2 мг/10 кг 1 раз в сутки.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Гистимет® (Histimet®)

Левакабастин*

Сост. и ф.в.: 1 мл глазных капель или спрея назального содержат левакабасти-

на 0,5 мг; во флаконах по 4 и 10 мл соответственно.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное, селективная блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Аллергический ринит и конъюнктивит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности назначается только в тех случаях, когда предполагаемый положительный эффект от лечения превышает потенциальный риск для плода.

Поб. действ.: Преходящее раздражение конъюнктивы или слизистой носа.

Примен. и доз.: Конъюнктивально (глазные капли) по 1 капле в каждый глаз или интраназально (назальный спрей) - по 2 впрыскивания в каждый носовой проход. Применяют обычно 2 раза в день, при необходимости 3-4 раза в день. Перед применением аэрозоля следует прочистить носовые ходы.

Предост.: С осторожностью применяют спрей при нарушениях функции почек. Использование глазных капель исключает ношение мягких (гидрофильных) контактных линз.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Гистодил (Histodil)

Циметидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циметидина 200 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 200 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение продукции соляной кислоты, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Таблетки: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, эрозивный гастрит и дуоденит, синдром Золлингера-Эллисона. Инъекционный раствор: острая кровоточащая язва желудка, двенадцатиперстной кишки, эрозии, геморрагии пищевода, синдром Золлингера-Эллисона (в послеоперационном периоде).

Противопоказ.: Детский возраст, гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диарея, головная боль, головокружение, утомляемость, сонливость, нарушения ментальных функций, депрессия, гинекомастия, в редких случаях импотенция (обратимая), миалгии, зуд, повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина в крови, изменение картины периферической крови,

изменение показателей иммунного ответа, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект холинолитиков, бензодиазепинов и непрямых антикоагулянтов, несовместим с пентобарбиталом и гентамицином.

Примен. и доз.: Внутрь, по 200 мг 3 раза во время еды и дополнительно на ночь 400 мг в течение 4-6 нед. При недостаточной эффективности - по 400 мг 4 раза в день. Максимальная суточная доза - 2 г, длительность курсового лечения - 4-6 нед. Поддерживающая доза - 400 мг на ночь, в отдельных случаях - 400 мг 2 раза в день. При значительных нарушениях функции почек дозу снижают. При острых желудочно-кишечных кровотечениях - вводят в/м, в/в струйно (по 200 мг каждые 4-6 ч) или в/в капельно в течение 48 ч (средняя скорость - 75 мг/ч); суточная доза - не более 2 г.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Гифларина раствор для инъекций (Solutio Nyflarini pro injectionibus)

Гифларин

Сост. и ф.в.: Ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит 10 мг гифларина; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Гипоазотемическое, диуретическое, противовоспалительное, капилляроукрепляющее и антиоксидантное, стимуляция анаболизма.

Показ.: Острые и хронические нефриты, гломеруло- и пиелонефриты, нефрозы, все стадии хронической почечной недостаточности с явлениями гиперазотемии и диуретическими нарушениями (олигурия, анурия, полиурия).

Противопоказ.: В терминальной стадии хронической почечной недостаточности применять с осторожностью.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м по 8-10 мл 2 раза в сутки. Курс лечения составляет 7-10 дней. В/в капельно 8-10 мл в сутки в течение 3-5 дней.

Произв.: Дарница (Украина)

Глаумол (Glaumol)

Тимолол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит тимолола малеата 5 мг; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противоглаукомное, бета-адреноблокирующее.

Клин. фарм.: Действие проявляется через 20 мин и продолжается 24 ч.

Показ.: Хроническая открытоугольная глаукома; глаукома у пациентов, носящих контактные линзы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Раздражение слизистой оболочки глаза, местные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Начальная доза - 1 капля 0,25% раствора 1-2 раза в день. При недостаточной эффективности применяют 0,5% раствор.

Предост.: С осторожностью следует назначать больным с противопоказаниями к бета-адреноблокаторам (возможны системные побочные явления), беременным, детям (безопасность применения не установлена).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Глауфос (Glaufos®)

Офлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит офлоксацина 200 мг; в контурной ячейковой упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное (широкого спектра), бактерицидное.

Клин. фарм.: Блокируя ДНК-гиразу, дестабилизирует цепи ДНК бактериальных клеток. Антибактериальный эффект проявляется в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. продуцирующих бета-лактамазу), многих штаммов стафилококков, стрептококков, гемофильной, кишечной, синегнойной палочки, менингококков, шигелл, сальмонелл, некоторых видов энтерококков, легионелл, микоплазм, хламидий.

Показ.: Острые, хронические и рецидивирующие инфекции дыхательных путей (бронхиты, пневмонии), включая вызванные гемофильной палочкой и др. грамотрицательными полирезистентными возбудителями, золотистым стафилококком; хронические и рецидивирующие инфекции ЛОР-органов, особенно вызванные грамотрицательными возбудителями, включая синегнойную палочку или стафилококк; инфекции мягких тканей и кожи; инфекционно-воспалительные заболевания органов брюшной полости и малого таза, включая брюшину; инфекции почек, мочевыводящих путей, половых органов; гонорея.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения, боли в суставах и мышцах, нарушения ЦНС,

диспептические расстройства, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Взаим.: Антациды, содержащие минеральные компоненты, снижают эффект. Усиливает действие гипотензивных средств (вплоть до резкого падения АД).

Примен. и доз.: Внутрь, по 200 мг 2 раза в день; в тяжелых случаях - по 400 мг 2 раза в день. Курс лечения - от 3 до 7-10 дней, но не более 8 нед.

Предост.: Во время лечения следует избегать ультрафиолетового облучения (особенно при совместном использовании с гипотензивными и содержащими барбитураты препаратами).

Произв.: ЈАКА-80 (Македония)

Глиатилин (Gliatilin)

Холина альфосцерат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит холина альфосцерата 400 мг; в упаковке 14 шт.

1 ампула с 4 мл раствора для инъекций - 1000 мг; в упаковке 3 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное (регуляция метаболизма фосфатидилхолина и холина в мозге), улучшение церебрального кровотока.

Показ.: Нарушение памяти, спутанность сознания, дезориентация, снижение мотивации, инициативности и концентрации внимания, эмоциональная нестабильность, раздражительность, снижение интереса, старческая псевдомеланхолия, острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения, хроническая цереброваскулярная недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота.

Примен. и доз.: Внутрь по 1 капсуле 2-3 раза в день, в/м или в/в (медленно) по 4 мл в день (утром) в течение 15-20 суток, затем по 3 капсулы (2 капсулы утром, 1 капсула днем) в течение 6 мес.

Произв.: CSC (Италия)

Глибамид (Glibamide®)

Глибенкламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глибенкламида 5 мг; в упаковке 30, 100 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет легкой и средней тяжести.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нестабильный или инсулинзависимый сахарный диабет, ювенильный

диабет, прекоматозное и коматозное состояние, кетоацидоз, нарушение функции печени, почек, щитовидной железы, надпочечников.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано (заменяют на инсулин).

Поб. действ.: Гипогликемия, диспептические расстройства, желтуха, редко - нарушения кроветворения (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая или апластическая анемия), аллергические реакции.

Взаим.: Гипогликемический эффект усиливают пролонгированные сульфаниламиды, противотуберкулезные средства, ингибиторы моноаминоксидазы, фенилбутазон, клофибрат, кумариновые антикоагулянты, салицилаты, пробенецид, пропранолол. Несовместим с алкоголем (у некоторых пациентов).

Передоз.: Симптомы: гипогликемия, головная боль, раздражительность, беспокойство, бессонница, повышенная потливость, тремор мышц, снижение работоспособности и внимания. Лечение: если больной в сознании - глюкозу перорально; при потере сознания вводят внутримышечно или подкожно глюкагон или внутривенно глюкозу.

Примен. и доз.: Лечение начинают с 1 таблетки (у пожилых и ослабленных пациентов - с 1/2) в день за завтраком, затем дозу можно увеличивать на 2,5-5 мг в неделю, однако не свыше 15 мг (3 таблетки). Когда доза 15 мг в день в сочетании с соответствующей диетой не обеспечивает полную компенсацию метаболизма, переходят на комбинирование с бигуанидами, а при недостаточном эффекте такой комбинации - к применению инсулина.

Предост.: Следует соблюдать диету, контролировать содержание сахара в крови и суточной моче, функцию печени и почек, состояние сердечно-сосудистой и кроветворной систем. Эффективность препарата снижается у больных с острыми инфекционными заболеваниями, травмами, во время хирургических вмешательств.

Произв.: CTS (Израиль)

Глибенкламид (Glibenclamid)

Глибенкламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глибенкламида 0,005 г; в пластмассовой банке по 50 или 100 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое, повышение секреции инсулина бета-клетками поджелудочной железы.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа).

Противопоказ.: Инсулинозависимый диабет, инсулинонезависимый диабет при отсутствии улучшения под влиянием производных сульфаниламочевина и гуанедина, тяжелые заболевания щитовидной железы.

Поб. действ.: Гипогликемия, расстройство ЖКТ (изжога, отсутствие аппетита, привкус металла во рту, тошнота, рвота, понос), гипотиреоз, аллергические реакции, холестатическая желтуха, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения, мультиформная эритема.

Взаим.: Гипогликемический эффект усиливают хлорамфеникол, флуконазол, сульфаниламиды, обезболивающие и противовоспалительные препараты, производные кумарина, гепарин, гипохолестеринемические средства, ингибиторы МАО, каптоприл, эналаприл, циметидин, ранитидин, доксепин, фенфлурамин, метилдофа, нортриптилин, алкоголь и снотворные средства (барбитураты); ослабляют - антибиотики группы рифамицина, тиазидные диуретики.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая достаточным количеством жидкости, по 0,0025-0,005 г 1 раз в сутки (утром); дозу желательно уточнять каждую неделю, увеличивая ее по 0,0025 г (дозы 0,015 г в сутки не усиливают действие). При приеме свыше 0,01 г желательно разделить суточную дозу на два приема.

Предост.: Необходимо контролировать уровень сахара в крови; не следует применять препарат при вождении транспортных средств.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Глипизид (Glipizid)

Глипизид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глипизид 5 или 10 мг; в упаковке 100 и 500 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое (стимуляция секреции инсулина бета-клетками поджелудочной железы).

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, диабетический кетоацидоз (с комой или без комы), беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Гипогликемия, тошнота, рвота, гастралгия, запоры, холестатическая желтуха, лейкопения, агрануло-

цитоз, тромбоцитопения, панцитопения, анемия (апластическая, гемолитическая), гипонатриемия, головокружение, головная боль, сонливость, повышение непрямого билирубина, креатинина, АСТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы, фотосенсибилизация, кожные аллергические реакции, дисульфирам-подобные алкогольные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды, начальная доза - 5 мг (перед завтраком) 1 раз в день, затем с постепенным увеличением дозы на 2,5-5 мг (с интервалами в несколько дней между этапами увеличения) достигают ежедневной однократной дозы 15 мг в день. Высшая рекомендуемая доза - не более 40 мг в день. При необходимости назначения доз выше 15 мг прием препарата должен быть дробным или перед едой, соответствующей по калорийности. При заболеваниях печени и пожилым рекомендуют снижение начальной дозы до 2,5 мг.

Предост.: С осторожностью назначают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (возможно повышение смертности), печени, почек. Необходим систематический контроль содержания глюкозы в крови и моче.

Произв.: CSC (Италия)

Глитизол (Glitizol™)

Глибенкламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит глибенкламида 5 мг; в упаковке 40 и 100 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое пероральное.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет (при неэффективности диетотерапии).

Противопоказ.: Диабетический кетоацидоз, инсулинзависимый диабет, дисфункция почек, печени и коры надпочечников, хирургические оперативные вмешательства, беременность.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, лейкопения и тромбоцитопения (обратимые), кожные высыпания.

Взаим.: Эффект усиливают дикумарин, ингибиторы МАО, бета-адреноблокаторы, сульфаниламиды, левомецетин, циклофосфамид, салицилаты, снижают - адреналин, пероральные противозачаточные средства, тиазидные диуретики, кортикостероиды.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или сразу после завтрака или вместе с первым основным приемом пищи; в обычной дозе - по 1 таблетке 1 раз в день. Пожилым и ослабленным - по 1/2 таб-

летки в день; после достижения необходимого эффекта - по 1 таблетке в день. Если необходимый уровень снижения сахара не достигнут, дозу подбирают, повышая ее на 1/2 или 1 таблетку в неделю; общая суточная доза - не более 3 таблеток. Перевод больных, принимавших производные сульфонилмочевины, на лечение глитизолом, проводят без перерыва, назначая 1 таблетку в сутки с постепенным увеличением (при необходимости) дозы на 2,5 мг в неделю. Начальная доза при переводе с бигуанидов - 1/2 таблетки.

Предост.: Не рекомендуется назначать детям.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Глиформин (Gliforminum)

Метформин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метформина гидрохлорида 0,25 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противодиабетическое.

Фармакодин.: Усиливает утилизацию глюкозы мышцами, задерживает всасывание углеводов в кишечнике, тормозит выброс глюкозы из печени. Снижает содержание триглицеридов и холестерина в сыворотке крови. Повышает чувствительность тканей организма к инсулину.

Показ.: Сахарный диабет II типа (при неэффективности препаратов сульфонилмочевины и диетотерапии), сахарный диабет I типа (в качестве дополнения к инсулинотерапии).

Противопоказ.: Диабетическая кома и прекоматозные состояния, кетоацидоз, инфекционные заболевания, поражения печени и почек, сердечно-сосудистая и сердечно-легочная недостаточность, острый инфаркт миокарда, беременность, лактация.

Поб. действ.: Металлический привкус во рту, тошнота, в редких случаях рвота и желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, в первые 3 дня назначают в дозе по 0,5 г 3 раза в сутки во время или после еды. В дальнейшем дозу препарата постепенно увеличивают до 1 г 3 раза в сутки. Для поддерживающего лечения обычно применяют в дозе по 0,1-0,2 г в день.

Произв.: Акрихин (Россия)

Глицин® (Glycinum)

Глицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глицина 0,1 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антистрессорное, нормализация обмена веществ, ноотропное.

Показ.: Стрессовые состояния, психоэмоциональное напряжение, повышенная возбудимость, эмоциональная лабильность, неврозы, неврозоподобные состояния, вегето-сосудистая дистония, энцефалопатия, снижение умственной работоспособности, нарушение сна.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Снижает токсичность антиконвульсантов, нейролептиков, антидепрессантов.

Примен. и доз.: Сублингвально, при психоэмоциональных напряжениях, снижении памяти, внимания, умственной работоспособности, детям с задержкой умственного развития, подросткам с девиантными формами поведения - по 100 мг 2-3 раза в день в течение 14-30 дней. Суточная доза - 300 мг, курсовая - 4,2-9 г. При нарушениях сна - по 50-100 мг за 20 мин до сна или непосредственно перед сном. Детям до 3 лет - 50 мг на прием 2-3 раза в день в течение 7-14 дней, в следующие 7-10 дней - по 50 мг 1 раз в день. Суточная доза - 100-400 мг, курсовая - 2-2,6 г.

Произв.: Биотики (Россия)

ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит® (GlucaGen®) 1 mg НуроKit®)

Глюкагон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным сухим веществом для инъекций содержит глюкагона (в виде гидрохлорида) 1 мг; в комплекте с растворителем, запаянным в одноразовый шприц 1 мл.

Фарм. действ.: Гипергликемическое.

Показ.: Гипогликемия у больных сахарным диабетом; гипогликемическая кома.

Противопоказ.: Феохромоцитома, глюкагонома, инсулома.

Поб. действ.: Гипотензия, тошнота, рвота, аллергические реакции, положительные ино- и хронотропный эффекты.

Примен. и доз.: Растворяют 1 мг препарата в 1 мл прилагающегося растворителя непосредственно перед использованием и вводят 1,0 мг (0,5 мг при массе

тела менее 25 кг) п/к, в/м или в/в. Если через 10-15 мин после этого больной не пришел в сознание, вводят в/в глюкозу или повторно ГлюкаГен. После того как пациент придет в сознание, немедленно дать ему углеводы для восстановления запасов гликогена в печени и предотвращения повторной гипогликемии.

Предост.: Препарат позволяет купировать гипогликемию только при наличии в печени гликогена, поэтому он оказывает незначительный эффект или неэффективен у больных после длительной тяжелой физической нагрузки, длительного голодания, а также у больных с надпочечниковой недостаточностью и хронической гипогликемией. Наличие в растворе волокнистых образований или твердых частиц является противопоказанием к его использованию, независимо от срока годности. Если колпачок надет непрочной или нарушена упаковка на наборе, следует его вернуть в аптеку.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Глюкагон (Glucagon)

Глюкагон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для инъекций содержит глюкагона 1 мг; в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Гипергликемическое, расслабление гладких мышц ЖКТ.

Показ.: Гипогликемия, рентгенологическая диагностика ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, феохромоцитомы, инсуломы.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, аллергические реакции (респираторный дистресс, гипотензия, крапивница).

Примен. и доз.: П/к, в/м и в/в: при гипогликемии - 1 мг (детям с массой тела менее 20 кг - 20-30 мкг/кг); в качестве вспомогательного диагностического средства вводят в/м или в/в 0,25-2 мг.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Глюкантим (Glucantime®)

Меглумин антимононат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл раствора для инъекций содержит антимононата N-метилглюкамина 1,5 г (425 мг сурьмы); в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антилейшманиозное.

Фармакокин.: Большая часть препарата выводится почками в течение 24 ч и полностью - через 48 ч.

Показ.: Лейшманиоз (кожный, висцеральный).

Противопоказ.: Туберкулез легких, нарушения функции печени, почечная недостаточность, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Поб. действ.: Лихорадочный синдром, кашель, миалгия, рвота, местные кожные реакции (при лечении кожного лейшманиоза).

Передоз.: Возможно развитие полиневрита, миокардита; нарушение функции печени и почек, усиление проявления анафилактических реакций (т.к. содержит сульфиты).

Примен. и доз.: В/м, по 60 мг/кг/сутки. При этом в первый день вводят четверть дозы, во второй - половину, в третий - три четверти дозы, и, начиная с четвертого дня - полную дозу; полный курс включает 10-15 инъекций (из них 8-12 полной дозой); при необходимости повторный курс проводят через 4-6 нед такими же или более высокими (до 100 мг/кг/сутки) дозами. При каждом лейшманиозе возможно местное применение.

Предост.: Необходим контроль ЭКГ, уровня креатинина и протеинурии.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Глюкобай® (Glucobay®)

Акарбоза*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит акарбозы 50 или 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое, снижение всасывания углеводов, угнетение альфа-глюкозидаз.

Показ.: Сахарный диабет I (комбинированная терапия) и II типа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, хронические заболевания кишечника с выраженными нарушениями пищеварения и всасывания, синдром Ремхельда, крупные грыжи, сужения и язвы кишечника, беременность, лактация, детский возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, повышение активности печеночных трансаминаз.

Взаим.: Потенцирует гипогликемический эффект других противодиабетических средств. Антациды, холестирамин, кишечные адсорбенты, пищеварительные ферменты снижают действие.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, с небольшим количеством жидкости. В начальный период - по 50 мг, затем - по 100-200 мг 3 раза в день. Средняя доза -

0,3 г/сутки. Увеличение дозы рекомендуется производить с интервалом 1-2 нед. Продолжительность лечения не ограничена.

Произв.: Bayer (Германия)

Глюкотрол ХЛ (Glucotrol XL)

Глипизид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая осмотической оболочкой, содержит глипизид 5 или 10 мг.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Фармакокин.: Всасывается достаточно полно. Через 2-3 ч после приема определяется в плазме в значимой концентрации, которая, постепенно возрастая, достигает максимума через 6-12 ч. Прием 1 раз в сутки поддерживает эффективный уровень на протяжении 24 ч. Биодоступность - 90%. В крови на 99% связывается с белками. Стабильные концентрации в плазме достигаются на 5 день применения (у больных старше 65 лет - на 1-2 дня позже). Фармакокинетика глипизиды линейна в диапазоне доз 5-60 мг. Элиминируется путем биотрансформации в печени: лишь менее 10% введенной дозы экскретируется в неизмененном виде с мочой и калом; продукты биотрансформации также выводятся с мочой (80%) и калом (10%).

Фармакодин.: Снижает уровень глюкозы в крови, стимулируя выброс инсулина поджелудочной железой; усиливает инсулинотропный эффект пищи у больных диабетом.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет (с избыточной или нормальной массой тела).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инсулинзависимый сахарный диабет (ювенильный диабет, диабет, сопровождающийся кетоацидозом или прекомой); тяжелая почечная или печеночная недостаточность; стеноз пищеварительного тракта; детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности. Следует с осторожностью назначать кормящим женщинам (возможна гипогликемия у новорожденных).

Поб. действ.: Гипогликемия; тошнота, диарея, дискомфорт в эпигастральной области; холестатическая желтуха, токсический гепатит; лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая или апластическая анемия, панцитопения, зуд, крапивница, макуло-папулезная сыпь.

Взаим.: Эффект усиливают миконазол, фенилбутазон, алкоголь, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), ацетилсалициловая кислота (в больших дозах), снижают - даназол, хлорпромазин (100 мг/сутки), глюкокортикостероиды и тетракозактид (в т.ч. при местном применении), прогестагены, ритодрин, сальбутамол, тербуталин (парентерально).

Примен. и доз.: Внутрь, таблетки проглатывают целиком (не разжевывая и не разламывая на части). Начальная доза - 5 мг в сутки во время завтрака, дозу повышают с интервалом в несколько дней, максимально - до 20 мг в сутки.

Предост.: Не рекомендуется использовать в сочетании с миконазолом. Во время лечения необходимо избегать употребления алкоголя.

Произв.: Pfizer (США)

Глютаминовая кислота (Acidum glutaminicum)

Глутаминовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит глютаминовой кислоты 0,25 г; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция окислительно-восстановительных процессов, дезинтоксикационное.

Показ.: Эпилепсия, психозы, реактивные депрессии, психическое истощение.

Противопоказ.: Лихорадочные состояния, повышенная возбудимость, заболевания печени, почек и ЖКТ, анемия, лейкопения.

Поб. действ.: Повышенная возбудимость, рвота, диарея, анемия, лейкопения.

Примен. и доз.: Внутрь, за 15-30 мин до еды - по 1 г 2-3 раза в день. Детям (2-3 раза в день) до 1 года - по 0,1 г, от 1 года до 3 лет - по 0,15 г, 3-4 лет - по 0,25 г, 5-6 лет - по 0,4 г, 7-9 лет - по 0,5-1 г, 10 лет и старше - по 1 г на прием.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Гонадотропин хорионический (Gonadotropinum chorionicum)

Хорионический гонадотропин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит гонадотропина хорионического 500 и 1000 ЕД, в комплекте с растворителем (рас-

твор натрия хлорида изотонический 0,9%); в ампулах по 1 мл.

Фарм. действ.: Гонадотропное, лютеинизирующее, стимуляция синтеза половых гормонов, овуляции и сперматогенеза.

Показ.: Гипофункция половых желез (у мужчин и женщин), обусловленная нарушениями функции гипоталамуса и гипофиза; межуточно-гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса, синдром Шиена, понгипопитуитаризм, адипозогенитальная дистрофия, гипофизарная карликовость с явлениями инфантилизма, гипогонадотропный гипогонадизм с признаками евнухоидизма); ановуляторные дисфункция яичников и позднее половое развитие, привычный и угрожающий аборт (I триместр беременности); дисфункциональные маточные кровотечения у женщин детородного возраста; крипторхизм у детей (двусторонний и односторонний после оперативного лечения при признаках евнухоидизма); дифференциальная диагностика первичного и вторичного гипогонадизма у мужчин.

Противопоказ.: Воспалительные заболевания и опухоли половых органов.

Поб. действ.: Увеличение размеров яичек, находящихся в паховом канале, гиперстимуляция яичников, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, в дозах 500-3000 ЕД в сутки. Мужчинам - 2-3 раза в неделю, курсами по 4 нед с промежутками 4-6 нед. Женщинам при ановуляторных циклах, начиная с 10-12 дня цикла, - по 3000 ЕД 2-3 раза с интервалом 2-3 дня или по 1500 ЕД 6-7 раз через день. При гипофизарном нанизме - по 500-1000 ЕД 1-2 раза в неделю в течение 1-2 мес повторными курсами. При крипторхизме детям до 10 лет - по 500-1000 ЕД, 10-14 лет - по 1500 ЕД 2 раза в неделю в течение 4-6 нед повторными курсами или непрерывно 4-5 мес.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Гонал-Ф (Gonal-F®)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит 75 или 150 МЕ рекомбинантного человеческого фолликулстимулирующего гормона; в комплекте с растворителем (вода для инъекций) в ампулах.

Фарм. действ.: Фолликулстимулирующее.

Показ.: Бесплодие, обусловленное гипоталамо-гипофизарной дисфункцией, сопровождающейся олигоменореей или аменореей (в сочетании с хорионическим гонадотропином); необходимость суперовуляции (оплодотворение in vitro и другие репродуктивные технологии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, увеличение или киста яичника, маточные кровотечения неизвестной этиологии, карцинома яичника, матки или молочной железы, опухоли гипоталамуса и гипофиза, отсутствие яичника, пороки развития половых органов и опухоли матки (с невозможностью беременности).

Поб. действ.: Возможны (в 1-2% случаях) боль внизу живота, тошнота, рвота и др. симптомы гиперстимуляции яичника (следует отменить препарат); тромбоэмболии; нарушения нормального течения беременности (внематочная, выкидыш, двойни и др.).

Примен. и доз.: П/к или в/м (предварительно растворяя в прилагаемом растворителе). При дисфункции - по 75-150 МЕ ежедневно и затем - по 37,5 МЕ (до 75 МЕ) в течение первых 7 или 14 дней менструального цикла; при отсутствии или чрезмерном клиническом эффекте после 5 нед. лечения использование препарата прекращают; при адекватном эффекте через 24-48 ч после последней инъекции вводят однократную дозу хорионического гонадотропина человека 10000 МЕ. При суперовуляции - по 150-225 МЕ ежедневно со 2-3 дня менструального цикла, продолжают введение Гонала-Ф до получения адекватного эффекта; при необходимости - дозу повышают, но не более 450 МЕ/сутки; в конце курса дополнительно вводят 10000 МЕ хорионического гонадотропина человека; лечение проводят в комбинации с агонистом гонадотропин-рилизинг-гормона и под контролем УЗИ.

Произв.: Serono (Швейцария)

Гоптен (Gopten®)

Трандолаприл*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит трандолаприла 0,5; 1 или 2 мг.

Фарм. действ.: Антигипертензивное (ингибция АПФ).

Клин. фарм.: Выраженный эффект достигается при однократном приеме 2 мг препарата в день. Минимальная эффективная доза - 1 мг в день. В отдельных случаях максимальная эффективность достигалась одномоментным приемом 4 мг в сутки. Однократный прием приво-

дит к снижению АД в течение 48 ч. При отсутствии эффективности рекомендует-ся комбинировать прием с мочегонными препаратами и антагонистами кальция. Препарат не влияет на нормальный цир-кадный ритм АД.

Показ.: Эссенциальная гипертония.

Противопоказ.: Гиперчувствитель-ность, ангионевротический отек (при предшествующем лечении ингибиторами АПФ), стеноз аортального, митрального клапанов, гипертрофическая кардиоми-опатия, сердечная недостаточность, сте-ноз почечных артерий, состояние после трансплантации кожи, первичный гипер-альдостеронизм, цирроз печени с асци-том, клиренс креатинина меньше 30 мл/мин (у пациентов на гемодиализе), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (наблюдалось токсическое действие на плод и материнский организм, проник-новение в молоко матери в эксперимен-те).

Поб. действ.: Резкое снижение АД (осо-бенно у пациентов с нарушением водно-солевого обмена, при лечении диурети-ками): головокружение, нарушение зре-ния, обморок; тахикардия, аритмия, сте-нокардия, инфаркт миокарда, цереб-ральный инсульт; нарушение функции почек (развитие острой почечной недо-статочности, протеинурии); сухой каш-ель, бронхоспазм, бронхит, синусит, ринит, глоссит, сухость во рту; диспеп-тические расстройства, рвота, понос, хо-лестатическая желтуха, гепатит, панкре-атит, кишечная непроходимость; кож-ные аллергические реакции, сопровож-дающиеся миалгией, артралгией, эози-нофилией; псориазные изменения кожи, фотосенсибилизация, алопеция; головные боли, депрессия, нарушения сна, равновесия, парестезии, импотен-ция, потеря вкусовых ощущений; сниже-ние концентрации гемоглобина, гемато-крита, уменьшение числа лейкоцитов или тромбоцитов, анемия (отдельные случаи гемолитической анемии); по-вышение концентрации мочевой кисло-ты, креатинина, калия в сыворотке крови, снижение - натрия и повышение концентрации белка в моче (иногда по-вышение концентрации билирубина и печеночных ферментов).

Взаим.: Поваренная соль и анальгетики (ацетилсалициловая кислота, индомета-цин) снижают гипотензивный эффект препарата. При сочетании с препаратами калия, калийсберегающими диуретика-ми (спиронолактон, амилорид, триамте-рен) возможно повышение concentra-

ции калия в сыворотке, с препаратами лития - повышение концентрации лития в сыворотке, с алкоголем - усиление действия. Совместное назначение со сно-творными препаратами или средствами для наркоза вызывает значительное сни-жение АД. Одновременное применение с аллопуринолом, иммунодепрессантами (цитостатики, системные кортикостерои-ды), прокаинамидом сопровождается развитием лейкопении. Отмечается вза-имодействие с фуросемидом, дигокси-ном, нифедипином, варфарином.

Передоз.: При появлении симптомов выраженной гипотензии в/в вводят хло-рид натрия.

Примен. и доз.: Внутрь, до, во время или после еды. Взрослым - 1 капсула (2 мг) в день, удвоение дозировки через 2-4 нед. У пациентов группы риска начина-ют с 1 мг в сутки. У пациентов с нару-шением функций печени и почек начина-ют с 0,5 мг утром, не превышая суточную дозу в 2 мг. У пациентов на гемодиализе начинают с 0,5 мг утром. Подбор дозы у пациентов со злокачественной гиперто-нией, тяжелой сердечно сосудистой не-достаточностью проводят в условиях стационара.

Предост.: При назначении пациентам с протеинурией более 1 г в сутки, тяжелы-ми электролитными нарушениями, сис-темной красной волчанкой, склеродер-мией, одновременном лечении кортикос-тероидами, цитостатиками, антимабо-литами, аллопуринолом, прокаинами-дом, литием необходим регулярный кон-троль лабораторных показателей. С ос-торожностью применять у пациентов с нарушением функции почек, тяжелой гипертонией, сердечной недостаточнос-тью, старше 65 лет. Не следует прово-дить гемодиализ или гемофильтрацию с использованием высоко проницаемой полиакрилонитрилметаллилсульфатной мембраны из-за риска возникновения анафилактических реакций. При разви-тии ангионевротического отека с вовле-чением гортани, глотки и языка необхо-димо ввести 0,3-0,5 мг эфедрина п/к или в/в медленно 0,1 мг адреналина, затем глюкокортикоиды и антигистамин-ные препараты. Не следует управлять автотранспортными средствами во время лечения.

Произв.: Knoll (Германия)

Гордокс (Gordox)

Апротинин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит 100 000 ЕД ап-

ротинина, инактиватора калликреина (КИЕ); в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Гемостатическое, ингибирование калликреина и других протеиназ.

Показ.: Острый и хронический панкреатит, острый панкреанекроз, профилактика ферментативного аутолиза поджелудочной железы при операциях на ней и рядом расположенных органах; гиперфибринолиз, острый послеоперационный паротит; тяжелые формы различных видов шока; ангионевротический отек; обширные и глубокие повреждения тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с реомакродексом (взаимное усиление сенсибилизирующего эффекта).

Примен. и доз.: В/в капельно (максимальная скорость 5 мл/мин), в начальной дозе 500000 КИЕ, затем каждый час 50000 КИЕ. По мере улучшения состояния постепенно уменьшают суточную дозу до 300000-500000 КИЕ. При гиперфибринолитических коагулопатиях вводят более высокие дозы (1 млн КИЕ или больше). В послеоперационном периоде и профилактически непосредственно перед операцией - 200000 КИЕ. В день операции, а также на первый и второй день после нее каждые 6 ч - 100000 КИЕ.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Гормель С (Hormeel® S)

Сост. и ф.в.: 100 г раствора для приема внутрь содержат *Senecio nemorensis* ssp. *fuchsii* D6, *Acidum nitricum* D4, *Erigeron canadensis* D3, *Moschus moschiferus* D6, *Viburnum opulus* D3, *Pulsatilla pratensis* D4, *Sepia officinalis* D6, *Cyclamen europaeum* D4, *Ignatia* D6 и *Thlaspi bursa pastoris* D6 по 5 г, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D8, *Aquilegia vulgaris* D4, *Cypripedium calceolus* var. *pubescens* D8, *Origanum majorana* D4 и *Nux moschata* D6 по 10 г, этанола около 35 об%; во флаконах по 30 или 100 мл.

Фарм. действ.: Регуляция функций женских половых гормонов, седативное, гемостатическое, метаболическое.

Показ.: Дисменореи, обусловленные эндокринопатиями.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, растворив в 100 мл воды 10 капель, 3 раза в день. Раствор выпивают медленно.

Произв.: Heel (Германия)

Грандаксин (Grandaxin®)

Тофизопам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тофизопам 50 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее.

Фармакодин.: Не развивается миорелаксация.

Показ.: Неврозы, напряженность, вегетативные расстройства, фобии, реактивная депрессия, отсутствие инициативы, слабость, апатия, кардиалгия, делириозное состояние (для снятия возбуждения и вегетативных симптомов), алкогольная абстиненция.

Противопоказ.: Первый триместр беременности.

Поб. действ.: Диспепсия, повышенная возбудимость, раздражительность, аллергические реакции (кожный зуд, экзантема).

Примен. и доз.: Внутрь, по 50-300 мг в сутки (за 1-3 приема).

Произв.: Egis (Венгрия)

Граноцит (Granocyte)

Ленограстим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит ленограстима 13,4; 33,6 или 47 млн. МЕ, в комплекте с растворителем (вода для инъекций); в ампулах 1 и 1,4 мл соответственно.

Фарм. действ.: Стимуляция лейкопоэза.

Фармакокин.: При п/к введении биодоступность составляет 30%, объем распределения - примерно 1 л/кг массы тела. Период полувыведения 3-4 ч, при достижении равновесной концентрации после повторных в/в инфузий $T_{1/2}$ сокращается до 1-1,5 ч, метаболизируется до пептидов. С мочой в неизмененном виде выводится не более 1% от введенной дозы.

Клин. фарм.: Регулирует механизмы пролиферации, дифференциации и биохимической активности клеток крови (только клетки нейтрофильного ряда), увеличивает количество активных нейтрофилов в периферической крови, повышает их способность к фагоцитозу и миграции.

Показ.: Профилактика и лечение нейтропении у следующих групп пациентов: со злокачественными новообразованиями, получающими цитостатическую, миелосупрессивную терапию; при транс-

плантации костного мозга и периферических стволовых клеток. Коррекция нейтропении у пациентов с врожденными и приобретенными аплазиями кроветворения, с ВИЧ инфекцией, для коллекций периферических стволовых клеток.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Незначительные мышечные и костные боли, легко купирующиеся приемом анальгетиков, лейкоцитоз, тромбоцитопения, боль в месте введения. Наличие каких-либо токсических побочных эффектов (при применении в дозах до 40 мкг/кг) не выявлено.

Примен. и доз.: Рекомендуемой дозой является 150 мкг (19,2 млн. МЕ) на 1 кв.м/сутки у всех групп пациентов при различных заболеваниях. Продолжительность лечения может колебаться в значительном диапазоне, в зависимости от основного заболевания и целей, которые преследуются при назначаемой терапии. При проведении химиотерапии граноцит применяют на следующий день после окончания курса лечения и вводят п/к (разводят содержимое 1 флакона прилагаемой водой для инъекций), ежедневно, до достижения стабильно нормального уровня нейтрофилов в периферической крови. При трансплантации костного мозга на следующий день после проведения процедуры вводят в/в в течение 30 мин, ежедневно, до достижения стабильно нормального уровня нейтрофилов в периферической крови. Для в/в инфузии содержимое 1 флакона растворяют сначала в прилагаемой воде для инъекций, затем полученный раствор дополнительно разводят 0,9% раствором натрия хлорида следующим образом: дозу 13,4 млн. МЕ - не более, чем в 50 мл; дозу 33,6 млн. МЕ - не более, чем в 100 мл; дозу препарата 47 млн. МЕ - не более, чем в 140 мл. Содержимое 1 флакона Граноцита (33,6 млн. МЕ) является оптимальной суточной дозой для взрослого больного с поверхностью тела до 1,8 кв.м, 1 флакон Граноцита (13 млн.МЕ) является оптимальной дозой для пациента с поверхностью тела до 0,7 кв.м. Рекомендуемая доза для введения: содержимое 1 флакона в сутки.

Предост.: Нежелательно использование у больных с миелоидными опухолями (острый и хронический миелолейкоз) в связи с недоказанностью безопасности препарата при данных заболеваниях. Следует соблюдать осторожность при назначении больным миелодиспласти-

ческим синдромом. Не рекомендуется больным с почечной или печеночной недостаточностью. При использовании цитостатической терапии первый прием должен быть не ранее, чем через 24 ч после введения последнего противоопухолевого препарата. В период терапии необходим систематический контроль картины периферической крови с обязательным подсчетом лейкоцитов и тромбоцитов. В случае увеличения количества лейкоцитов более $50 \times 10^9/\text{л}$ лечение должно быть приостановлено.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Грипп-Хель (Gripp-Heel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Aconitum D4 120 мг, Bryonia D4, Lachesis D12 по 60 мг, Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D5 по 30 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, иммуностимулирующее, анальгезирующее.

Показ.: Грипп, острые рино-вирусные инфекции и их осложнения (ангина, отит, трахеит, бронхопневмония, плеврит).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки, в острых случаях - по 1 таблетке каждые 15 мин в течение 2 ч (не более). При тяжело протекающем заболевании комбинируют с Энгистол Н и Траумель С.

Произв.: Heel (Германия)

Гриппекс® (Grippex®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит парацетамола 500 мг, псевдоэфедрина гидрохлорида 30 мг и декстрометорфана 15 мг; в упаковке 12, 24 и 30 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противокашлевое.

Фармакокин.: Хорошо всасывается (парацетамол) в верхних отделах кишечника, метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата ацетоминифена, выводится почками (в основном).

Показ.: Грипп, простудные заболевания, насморк, лихорадочные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции почек или печени, детский возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Ощущение сердцебиения, нарушение функции печени (при длительном применении), аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек).

Взаим.: Барбитураты, трициклические антидепрессанты, алкоголь увеличивают токсичность.

Примен. и доз.: Внутрь, одновременно с приемом жидкости. Взрослым по 2 таблетки 4 раза в сутки, детям от 6 до 12 лет - по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью использовать у пациентов с выраженными нарушениями функции печени и почек. Не рекомендуется сочетать с другими препаратами, содержащими парацетамол.

Произв.: Unipharm (США)

Грюнамицин сироп (Grunamycin syrup)

Эритромицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон вместимостью 60 или 100 мл содержит эритромицина этилсукцината в виде гранул для приготовления суспензии 200 мг/5 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Быстро всасывается. Связь с белками плазмы - 60-75%. Терапевтические концентрации в крови достигаются через 10 мин после приема и сохраняются 6-12 ч. Метаболизируется в печени. Экскреция - на 95% через желчевыводящие пути, 5% - через почки. $T_{1/2}$ - 1,7 ч.

Показ.: Инфекции у детей (тонзиллит, ларингит, синусит, средний отит, бронхит, пневмония (вызванные микоплазмой, хламидией); болезнь легионеров, дерматит, рожистое воспаление, фурункулез, конъюнктивит, венерическая лимфогранулема, пситтакоз).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, нарушения функции печени, псевдомембранозный колит, аллергические реакции.

Взаим.: Увеличивает концентрацию в плазме теофиллина и карбамазепина. Может усиливать нефротоксичность циклоспоринов. Замедляет выделение метилпреднизолона и антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь, детям - 30-50 мг/кг в сутки.

Произв.: Grünenthal (Германия)

Грюнамокс (Grunamox)

Амоксициллин*

Сост. и ф.в.: 1 растворимая таблетка содержит амоксициллина тригидрата 1148 или 861 мг, что эквивалентно 1000 или 750 мг амоксициллина; в упаковке 10 и 20 шт.; 1 флакон с порошком для приготовления 100 мл суспензии 250 мг/5 мл - 5,74 г, что соответствует 5 г амоксициллина.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Быстро всасывается. Связь с белками плазмы - 17%. $T_{1/2}$ - 1,15 ч. 50-70% выводится в неизменном виде через почки, 10-20% - печенью.

Клин. фарм.: Действие развивается через 15-30 мин после приема и длится 8 ч.

Показ.: Инфекции ЛОР-органов, дыхательных, моче- (острый и хронический пиелонефрит, цистит) и желчевыводящих (острый и хронический холецистит и холангит) путей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект ослабляется бактериостатическими препаратами. Экскреция замедляется ацетилсалициловой кислотой, индометацином и фенилбутазоном. Усиливает всасывание дигоксина.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 растворимой таблетке 3 раза в сутки; детям (с 1 до 14 лет) - 50 мг/кг (в виде сиропа).

Произв.: Grünenthal (Германия)

Гуарем (Guarem®)

Сост. и ф.в.: 1 пакетик содержит 5 г хьюаровой смолы в форме дозированных микрогранул; в упаковке 30 и 50 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое, гипохолестеринемическое.

Показ.: Сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, ожирение.

Поб. действ.: Диспептические явления.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, с достаточным количеством жидкости, первая неделя - 1/2 пакетика в день, затем - по 1 пакетик 3 раза в день (при диабете и ожирении), 2-5 раз в день (при гиперхолестеринемии).

Произв.: Orion (Финляндия)



Губка гемостатическая коллагеновая (Spongia haemostatica collagenica)

Сост. и ф.в.: Пластины размером 100x100 или 50x50 мм, приготовленные из раствора коллагена, полученного из кожи или сухожилий крупного рогатого скота, в стерильной упаковке. 1 г сухой губки содержит борной кислоты 0,0125 г и фурацилина 0,0075 г.

Фарм. действ.: Гемостатическое, антисептическое, адсорбирующее; стимуляция регенерации тканей.

Показ.: Кровотечения капиллярные (носовые, из синусов твердой мозговой оболочки, при стоматологических вмешательствах), при повреждениях кожных покровов, трофические язвы, пролежни, отит; для заполнения дефектов паренхиматозных органов (например, после резекции печени) и закрытия ложа желчного пузыря (после холецистэктомии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальное кровотечение.

Примен. и доз.: Местно, тампонируют рану, через 3-5 мин губка, пропитавшись кровью, плотно прилегает к кровоточащей поверхности; в случае прекращения кровотечения накладывают второй слой губки. После остановки кровотечения губку фиксируют П-образным швом. Для усиления гемостатического эффекта губку можно смочить раствором тромбина. Губку не удаляют, т.к. она впоследствии полностью рассасывается.

Произв.: Белкозин (Россия)

Гумизоль® (Humisol®)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит хаапсалуской лечебной грязи (в пересчете на сухой остаток вытяжки) 0,0001 г, натрия хлорида 0,009 г и воды для инъекций до 1 мл; в ампулах по 1 или 2 мл, по 10 шт. в коробке из картона.

Фарм. действ.: Активация макрофагов, стимуляция регенерации, противовоспалительное.

Показ.: Хронические радикулиты, плекситы, полиневралгии, заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматические полиартриты, артрозы, плечевые периартриты, спондилоартрозы, спондилиты), заболевания среднего уха (евстахиит, отосклероз, отиты) и придаточных пазух носа, фарингиты, ларингиты и риниты, дерматозы (псориаз, нейродермиты), тромбофлебиты, гинекологичес-

кие заболевания (воспалительные, дисменорея), детский ревматизм в неактивной фазе (артралгия, остаточные явления малой хореи), пародонтоз, вибрационная болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые заболевания с лихорадкой, декомпенсированные пороки сердца, сердечная недостаточность, тяжелая форма атеросклероза, активные формы легочного туберкулеза, органические диффузные заболевания почек и печени, опухоли, тиреотоксикоз, психоневрозы, психозы.

Поб. действ.: Боли, сонливость, потливость, ускорение РОЭ.

Примен. и доз.: Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические дерматозы и тромбофлебиты, заболевания периферической нервной системы - по 1-2 мл в/м 1 раз в сутки в течение 20-30 дней; детский ревматизм - по 1 мл в/м 1 раз в сутки в течение 20-25 дней; пародонтоз: местно - 1-2 мл 1 раз в сутки в переходную складку слизистой полости рта в течение 30 дней; в/м - 1-2 мл в сутки в течение 30 дней; электрофорезом - 15-20 сеансов через день (сила тока 2-8 мА, 4 мл гумизоля для смачивания электродов). Хронические ЛОР-заболевания - в первые 10 дней по 1 мл, затем по 2 мл в сутки, на курс - 30 инъекций. Гинекологические заболевания - 1-2 мл в/м, 20 инъекций через день. Курс лечения можно повторить через 2-6 мес.

Предост.: Поскольку возможна индивидуальная непереносимость, в первые 2 дня назначают меньшую дозу (0,5-1 мл).

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Густель (Husteel®)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для приема внутрь содержат *Arsenum jodatum* D6, *Atropa belladonna* D4 и *Scilla* D4 по 20 мл, *Cuprum aceticum* D6 10 мл, *Causiticum Hahnemanni* D6 30 мл; во флаконах по 30 и 100 мл.

Фарм. действ.: Противокашлевое, спазмолитическое, противовоспалительное.

Показ.: Заболевания верхних дыхательных путей (в составе комплексной терапии).

Противопоказ.: Заболевания щитовидной железы.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, растворив в 100 мл воды 10 капель, 3 раза в день. Раствор выпивают медленно. При присту-

пах кашля - по 10 капель каждые 15 мин в течение не более 2 ч.

Пронзв.: Heel (Германия)

Д.Т.Вакс (D.T.Vax)

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций. В каждой дозе вакцины (0,5 мл) содержится очищенный дифтерийный анатоксин - 1 вакцинная доза, очищенный столбнячный анатоксин - 1 вакцинная доза, гидроокись алюминия (выраженная в Al) - максимум 1,25 мг, тиомерсал (консервант) - максимум 0,05 мг, изотонический раствор хлорида натрия q.s. до 0,5 мл. Одна вакцинная доза дифтерийного анатоксина соответствует по меньшей мере 30 МЕ при измерении протективной активности параллельно со стандартом ВОЗ или с другим стандартом, оттитрованным в соответствии с международным эталоном. Одна вакцинная доза столбнячного анатоксина соответствует по меньшей мере 40 МЕ при измерении протективной активности параллельно со стандартом ВОЗ или с другим стандартом, оттитрованным в соответствии с международным эталоном. Вакцина выпускается: в шприцах или ампулах по 1 дозе; в упаковке 1 и 20 шт.;

в ампулах по 1 дозе; в упаковке 5 или 10 шт.;

во флаконах по 10 или 20 доз; в упаковке 1 или 10 шт.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против дифтерийного и столбнячного токсинов.

Клин. фарм.: Иммунитет развивается после 2-й инъекции и сохраняется не менее 5 лет после первой ревакцинации.

Показ.: Сочетанная профилактика дифтерии и столбняка у детей в возрасте от 2 мес до 8 лет, профилактика дифтерии и столбняка при противопоказаниях для иммунопрофилактики коклюша (вместо коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины).

Противопоказ.: Лихорадка, острые инфекционные заболевания; вторая или третья инъекция отменяется, если на первое введение была выраженная реакция.

Поб. действ.: Местные реакции (болезненность в месте инъекции, проходящая в течение 24-48 ч. В ряде случаев, в течение 1 недели или дольше, могут иметь место уплотнение или подкожный узелок). Общие реакции (незначительное повышение температуры тела, нарушения функции почек (единичные случаи)).

Примен. и доз.: Вакцинопрофилактика проводится по следующей схеме: 1) вакцинация, состоящая из 3 инъекций (по 0,5 мл), с интервалом в 1-2 мес; 2) ревакцинация - 1 инъекция (0,5 мл) через 1 год после последней инъекции первичной вакцинации; 3) последующая ревакцинация - через 5 лет. В соответствии с рекомендациями ВОЗ ВИЧ-инфицированные дети должны быть вакцинированы Д.Т.Вакс в соответствии со стандартной схемой иммунизации вне зависимости от клинической симптоматики. Перед использованием тщательно взболтать до образования гомогенной суспензии. Вакцина вводится п/к или в/м. После вскрытия флакона вакцину использовать в течение этого же дня.

Пронзв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Давериум (Daverium)

Эрголоид мезилат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит альфа-дигидроэргокриптина мезилата 20 мг; в упаковке 20 шт.

1 капсула - 5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Нейропротекторное, антигипоксическое, стимуляция дофаминовых рецепторов ЦНС.

Показ.: Снижение познавательной способности и нарушения поведения при психоорганическом сенильном синдроме, сенильной и сосудистой деменции; головные боли, мигрень; болезнь Паркинсона; гиперпролактинемия; ингибирование лактации.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боль в желудке, диспепсия, запоры, головокружение, головная боль, сонливость, чувство тревоги, астения, гипотония (в т.ч. ортостатическая), тахикардия, лихорадка, кожная сыпь, снижение скорости реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. При сенильном синдроме и деменции - 10 мг 1 раз в день, перед сном (2 нед), затем - по 10 мг 2 раза в день (2 нед); поддерживающая доза - 20 мг 2 раза в день (утром и вечером). При мигрени и головной боли (рекомендуется для длительной терапии, а не для снятия приступа) - по 10 мг 1 раз в день, перед сном (2 нед), затем - по 10 мг 2 раза в день (курс лечения - не более 6 мес). При болезни Паркинсона - по 5 мг 2 раза в день с постепенным увеличением дозы (на 5 мг в день 2 раза в нед) до достижения поддерживающего

уровня - 60-120 мг в день. При гиперпролактинемии - вначале по 5 мг, затем - по 10-20 мг 2 раза в день. Для снижения лактации - по 5 мг 2 раза в день в течение 5-10 дней.

Предост.: С осторожностью назначают больным с психическими расстройствами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ (язвы, кровотечения); работающим с механизмами и транспортными средствами. Терапия должна проводиться под контролем врача. Может устранять стерильность у женщин (требуется адекватная контрацепция).

Произв.: CSC (Италия)

Дайджин (Digene)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит алюминия гидроксида сухого геля 300 мг, магния алюминия салицилата гидрата 50 мг, магния гидроксида 25 мг и полидиметилсилоксана 25 мг; в упаковке 8 шт.

10 мл геля (приблизительно 2 полные чайные ложки) содержат магния гидроксида 185 мг, полидиметилсилоксана 50 мг, натрий карбоксиметилцеллюлозы 100 мг и алюминия гидроксида сухого геля 830 мг; во флаконах по 170 мл.

Фарм. действ.: Антацидное.

Показ.: Повышенная кислотность желудочного сока.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипермагниемия, гипофосфатемия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первом триместре беременности.

Взаим.: Нарушает абсорбцию тетрациклинов, препаратов железа, варфарина, дигоксина.

Передоз.: При возникновении передозировки (в редких случаях) необходимо прекратить прием препарата и скорректировать дефицит жидкости. Специфическая терапия требуется редко.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - таблетки или гель принимают после каждого приема пищи и на ночь перед сном (разжевывая или рассасывая каждую таблетку) - 2-4 таблетки или по 2 полные чайные ложки геля (10 мл); детям - в индивидуальной (рекомендуемой врачом) дозе.

Предост.: У пациентов со сниженной функцией почек может развиваться гипермагниемия. При длительном приеме не исключено возникновение дефицита фосфатов в организме.

Произв.: Knoll (Германия)

Дактанол (Daktanol)

Миконазол*

Сост. и ф.в.: 100 г крема содержат миконазола нитрата 2 г; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное.

Показ.: Поражения кожи и ногтей, вызванные грибами рода *Candida*, *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Malassezia furfur*; смешанные грибковые или грибково-бактериальные инфекции, суперинфекции кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местные кожные реакции.

Примен. и доз.: Местно, слегка втирают в пораженные участки 2 раза в день, утром и вечером, до полного исчезновения симптомов, и далее в течение нескольких дней для предупреждения рецидивов. Курс лечения - 2-6 нед.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Дальфаз® (Dalfaz®)

Альфузозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимым покрытием содержит альфузозина (гидрохлорида) 2,5 мг или 5 мг (ретард), в коробке 56 шт.

Фарм. действ.: Альфа₁-адреноблокирующее.

Фармакодин.: Дальфаз блокирует преимущественно альфа₁-адренорецепторы в зоне предстательной железы (альфа_{1A} подтип рецепторов) и практически не оказывает влияния на альфа₁-адренорецепторы сосудистой стенки. Это приводит к снижению давления в уретре и уменьшает сопротивление току мочи.

Показ.: Функциональные нарушения при доброкачественной гиперплазии простаты (в случае невозможности хирургического вмешательства или прогрессирующего роста аденомы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ортостатическая гипотония в анамнезе.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, боли в желудке, головные боли, головокружение, слабость, сонливость, астения, тахикардия, сухость во рту, ортостатическая гипотония, отеки, покраснение кожи, кожные высыпания, зуд; обострение симптомов стенокардии (у больных с ИБС).

Взаим.: Несовместим с другими альфа₁-адреноблокаторами. Усиливает эффек-

ты антигипертензивных препаратов и общих анестетиков.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке ретард (не разжевывая) утром и вечером (суточная доза 10 мг); начинают курс с приема вечером. Пожилым и пациентам с антигипертензивной терапией - по 1 таблетке ретард вечером (5 мг в день), при необходимости увеличивают дозу - до 10 мг в день (не более).

Предост.: С осторожностью назначать пациентам с гипертонической болезнью, ИБС, почечной недостаточностью.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Данемокс (Danemox)

Амоксициллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит амоксициллина (в виде амоксициллина тригидрата) 250 или 500 мг; в упаковке 10 блистеров по 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, кожи и мягких тканей, мочеполового тракта, гонорея, брюшной тиф, острый средний отит, фарингит, синуситы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. Обычная доза для взрослых - 250-500 мг каждые 8 ч.

Произв.: Sol Pharmaceuticals (Индия)

Данодиол (Danodiol™)

Даназол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит даназола 200 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антигонадотропное, ингибция секреции гипофизарных ФСГ и ЛГ.

Показ.: Эндометриоз и обусловленное им бесплодие; доброкачественные заболевания молочных желез, включая гинекомастию, фиброкистозную мастопатию, гипертрофию молочных желез в пубертатном возрасте; первичная меноррагия, предменструальный синдром, наследственный ангионевротический отек.

Противопоказ.: Беременность, лактация.

Поб. действ.: Аменорея, приливы, усиление потоотделения, изменения размера молочных желез, либидо, вагинит, андрогенные эффекты (угри, повышение сальности кожи, отек, гирсутизм, изменение голоса и др.), расстройства ЖКТ, головная боль, головокружение, депрессия, нарушение сна, тремор, мышечные спазмы, судороги, повышение

функциональных печеночных показателей, кожные высыпания.

Примен. и доз.: Внутрь. При эндометриозе - в обычной начальной дозе по 400 мг в день в 2-4 приема, начиная в первый день менструального цикла; можно назначать до 800 мг/сутки; курс лечения - 6 мес. При первичной меноррагии - по 100-400 мг в 2-4 приема, начиная с первого дня менструального цикла (дозу устанавливают индивидуально). При доброкачественных заболеваниях молочной железы - по 100-400 мг в день в несколько приемов. При раннем половом созревании у детей - по 100-400 мг/сутки (исходя из возраста и реакции).

Предост.: Перед началом терапии больных с аменореей следует исключить беременность (при возникновении беременности в ходе лечения его немедленно прекращают). С осторожностью назначают при нарушениях функции сердца, печени, почек, при мигрени, эпилепсии, диабете.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Данол (Danol®)

Даназол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит даназола 100 или 200 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Андрогенное.

Показ.: Эндометриоз и обусловленное им бесплодие, мастопатия, первичная меноррагия, преждевременное половое созревание у девушек, макромастия, гинекомастия, предменструальный синдром.

Противопоказ.: Порфирия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, повышение внутричерепного давления, головокружение, головная боль, возбуждение, судороги, алоpecia, задержка жидкости в организме, увеличение массы тела, приливы, уменьшение размера груди, нарушение функций печени, себорея, акне, гирсутизм, тошнота, нервозность, боли в спине, судороги, холестатическая желтуха, повышение внутричерепного давления, кожная сыпь.

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов и карбамазепина, может увеличить потребность в инсулине.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 200-800 мг 2-4 раза в день, курс - 6 мес; детям - от 100 до 400 мг.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Даонил (Daonil®)

Глибенкламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глибенкламида 5 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое, восстановление периферической чувствительности к инсулину, снижение продукции глюкозы в печени, увеличение числа рецепторов и их чувствительности к инсулину.

Фармакокин.: Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта (92%). Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2-6 ч. Связывается с белками плазмы на 99%. Объем распределения - 9-10 л. Полупериод выведения - 4-11 ч. Метаболизируется в печени. Экскретируется с желчью и мочой в виде неактивных метаболитов.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет (II тип), в случаях, когда уровень сахара в крови не регулируется адекватной диетой, физическими упражнениями или уменьшением массы тела.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) у детей и подростков, метаболический кетоацидоз, выраженные нарушения функции печени и/или почек.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано (замена на инсулин).

Поб. действ.: Гипогликемия, головная боль, головокружение, слабость, тромбоцитопения, эритроцитопения, лейкопения, аллергические реакции.

Взаим.: Пролонгированные сульфаниламиды, хлорамфеникол, тетрациклиновые и кумариновые производные, циклофосфамид, ингибиторы МАО усиливают гипогликемический эффект.

Передоз.: Симптомы: гипогликемия (головная боль, раздражительность, беспокойство, потливость, бессонница, тремор, снижение работоспособности и внимания). Лечение: если больной в сознании, перорально назначают глюкозу; при потере сознания необходимо ввести в/м или п/к глюкагон или в/в глюкозу.

Примен. и доз.: Доза подбирается индивидуально, в зависимости от возраста, тяжести течения сахарного диабета, уровня гликемии. Назначают внутрь, натощак или через 2 ч после еды. Средняя суточная доза - 2,5-10 мг. Кратность приема - 1-2 раза в сутки. При необходимости суточная доза повышается каждые 5-6 дней на 2,5 мг до достижения компенсации (нормализации уровня

глюкозы в крови). Не рекомендуется увеличение дозы выше 15 мг/сутки.

Предост.: Ошибки приема препарата (пропуск дозы) не должны компенсироваться приемом большей дозы.

Произв.: Hoechst (Германия)

Дардум (Dardum®)

Цефоперазон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефоперазона 1 г (в форме натриевой соли) в комплекте с растворителем (0,9% раствор хлорида натрия); в ампулах по 3 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: $C_{\max}$ после в/м введения - 0,25, 0,5 и 1 г достигается через час и составляет, соответственно, 22, 33 и 65 мкг/мл, после 15 мин инфузии - 1, 2 и 3 г - 153, 258 и 340 мкг/мл; $C_{\max}$ в моче после инфузии 2 г - 2200 мкг/мл, накапливается в терапевтических концентрациях в асцитической, амниотической и перитонеальной жидкостях, ликворе, моче, желчи и стенках желчного пузыря, мокроте, легких, небных миндалинах, слизистой оболочке носовых пазух, миокарде, почках, мочеточнике, простате, яичках, матке, фаллопиевых трубах, костной ткани. Метаболизируется менее 1%. Выводится на 70-80% с желчью, 20-30% - с мочой.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, почек и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов, половых органов, интраабдоминальные инфекции, менингит, септицемия, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночно-почечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Нейтропения, эозинофилия, гипопротромбинемия, анемия, повышение активности печеночных трансаминаз, нарушения функции почек, тошнота, диарея, боль в месте инъекции.

Взаим.: Аминогликозиды увеличивают риск поражения почек.

Примен. и доз.: В/м, 1-2 г (детям - 25-100 мг/кг) каждые 12 ч. В/в медленно (в течение не менее 3-5 мин, концентрация раствора не выше 100 мг/мл) или капельно; максимальная разовая доза - 2 г, для детей - 50 мг/кг.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Дароб (Darob®)

Соталол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит соталола гидрохлорида 80 и 160 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 4 мл раствора для инъекций - 40 мг.

Фарм. действ.: Противоаритмическое.

Показ.: Суправентрикулярные тахикардии (тахикардия из AV-соединения, суправентрикулярная тахикардия, с WPW-синдромом, пароксизм мерцания предсердий), желудочковая тахикардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к сульфонидам), застойная сердечная недостаточность III степени, шок, AV-блокада II и III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, брадикардия, гипокалиемия, гипотензия, удлиненный интервал QT, окклюзирующие поражения периферических артерий, обструктивные заболевания легких, метаболический ацидоз, отек гортани, аллергический ринит.

Бер. и корм. гр.: Допускается только по жизненным показаниям (за 48-72 ч до ожидаемых родов рекомендуется прекратить прием).

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, сонливость, утомляемость, похолодание конечностей; редко - нарушение функции ЖКТ, бронхоспазм, кожные реакции, конъюнктивит, нарушение сна, усиление выраженности сердечной недостаточности, брадикардия, нарушения AV-проводимости, гипотензия; снижение слезоотделения, гипогликемия, галлюцинации, сухость во рту, мышечные судороги, преходящая импотенция, нарушение остроты зрения, конъюнктивит.

Взаим.: Нифедипин, трициклические антидепрессанты, барбитураты, производные фенотиазина, наркотические средства, вазодилататоры, диуретики и другие гипотензивные препараты вызывают значительное снижение, норадреналин и ингибиторы MAO - резкое повышение АД. Наркотические и противовоспалительные средства усиливают кардиодепрессивный эффект. Может усиливать нейромышечную блокаду на фоне тубокурарина. Резерпин, клонидин, альфа-метилдопа, гуанфацин, сердечные гликозиды усиливают выраженность отрицательного хроно- и дромотропного действия. Увеличивает эффект инсулина и пероральных гипогликемических средств (особенно на фоне физической нагрузки).

Передоз.: Симптомы: утомляемость, расширение зрачков, потеря сознания; генерализованные миоклонические судороги, гипотензия, брадикардия (с асистолией), желудочковые тахикардии (атипичные), симптомы кардиогенного и гиповолемического шока. Лечение: удаление препарата из организма (промывание желудка, гемодиализ); введение антидотов (атропин, допамин, изопреналин, адреналин, глюкагон).

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой с небольшим количеством воды - по 160 мг (1 таблетка 160 мг или 2 таблетки по 80 г) 2 раза в день; пациентам с клиренсом креатинина в пределах 10-30 мл/мин дозу уменьшают вдвое; при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин используют 1/4 рекомендуемой дозы. В/в вводят в разовой дозе 20 мг, повторное введение возможно через 20 мин. Максимальная суточная доза - 1,5 мг/кг.

Предост.: Не рекомендуется одновременный прием с антиаритмическими хинидинподобными препаратами. С осторожностью назначают при сахарном диабете, феохромоцитоме, нарушениях функции почек, инфаркте миокарда (в анамнезе), псориазе, в случаях полного голодания. Следует избегать резкого прекращения лечения (возможно развитие "синдрома отмены").

Произв.: Knoll (Германия)

Дартелин (Dartelin®)

Пентоксифиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пентоксифиллина 400 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, антиагрегационное, улучшение микроциркуляции.

Показ.: Нарушения периферического кровообращения: перемежающаяся хромота, облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия, посттромботический синдром, трофические язвы голени, гангрена, обморожения, ишемический инсульт, церебральный атеросклероз, нарушения кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза, отосклероз, нарушения кровообращения в сосудах внутреннего уха.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, кровотечение, кровоизлияние в мозг или сетчатку глаза, гипотония, тяжелая почечная недостаточность, беременность, лактация, возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Диспепсия, рвота, диарея, головная боль, головокружение, гипере-

мия лица, тахикардия, стенокардия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая небольшим количеством жидкости, по 1 таблетке 3 раза в день. После клинического улучшения дозу снижают до 800 мг в сутки (по 1 таблетке 2 раза в день).

Произв.: Lek (Словения)

Дафнеджин (Dafnegin)

Циклопирокс*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит циклопирокса оламина 2 мг; в одноразовых флаконах-спринцевках по 150 мл; в упаковке 5 шт.

1 г крема содержит циклопирокса оламина 10 мг; в тюбиках по 78 г в комплекте с 6 аппликаторами.

1 суппозиторий содержит циклопирокса оламина 50 или 100 мг; в упаковке 6 шт. в комплекте с 6 напальчниками.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра, антибактериальное.

Показ.: Лечение и профилактика кандидоза (генерализованный, рецидивирующий, вульво-вагинальный), грибковые поражения слизистых оболочек.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Зуд, жжение, раздражение.

Примен. и доз.: Наружно, вагинально. Свечи: по 1 в день 3-6 дней. Спринцевание раствором 5 дней. Крем применяется 6-14 дней под контролем врача.

Произв.: CSC (Италия)

Де-Нол® (De-Nol®)

Висмута трикалия дицитрат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит висмута триоксида (в форме коллоидного субцитрата висмута) 120 мг; в упаковке 112 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, гастропротективное, бактерицидное.

Фармакокин.: Практически не всасывается из ЖКТ, незначительное количество поступает в кровь и экскретируется с мочой, при этом концентрация висмута в плазме после окончания лечения быстро снижается. Выводится преимущественно с фекалиями.

Фармакодин.: В кислой среде ЖКТ образует на поверхности язв и эрозий защитную пленку, которая способствует их рубцеванию и предохраняет от воздействия желудочного сока; увеличивает синтез простагландина E₂, стимулиру-

ющего образование слизи; оказывает бактерицидное действие в отношении *Helicobacter pylori*.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; обострение гастродуоденита на фоне язвенной болезни; гастрит, связанный с *Helicobacter pylori*.

Противопоказ.: Выраженное нарушение функции почек.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Редко - тошнота, рвота, частый стул; аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Взаим.: Уменьшает всасывание тетрациклинов. Препараты, содержащие висмут (викалин, викаир, ротер), повышают риск чрезмерного увеличения концентрации висмута в крови.

Передоз.: Симптомы: характерные для почечной недостаточности, проявляющиеся через 10 дней после приема больших доз. Лечение: промывание желудка, активированный уголь, солевые слабительные, показан контроль функции почек, концентрации висмута в крови и моче; затем - симптоматическое лечение. В случае нарушения функции почек, сопровождающегося высоким уровнем висмута в плазме крови, можно ввести комплексообразователи - димеркаптоянтарную и димеркаптопропансульфоновую кислоты. При тяжелой почечной недостаточности - гемодиализ.

Примен. и доз.: Внутрь, таблетку запивают 1-2 глотками воды (но не молоком), по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до завтрака, обеда, ужина и четвертый раз перед сном, в течение 4-6 нед (максимально - до 8 нед), затем необходимо сделать перерыв на 8 нед, в течение которого не следует принимать препараты, содержащие висмут. При наличии у пациента бактерии *Helicobacter pylori* лечение дополняют метронидазолом - по 250 мг 4 раза в сутки и амоксициллином - по 250 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней.

Предост.: За 30 мин до и после приема не следует употреблять напитки, молоко, твердую пищу, антацидные препараты. В связи с возможным развитием энцефалопатии не рекомендуется длительное применение больших доз. Во время лечения надо воздержаться от приема алкоголя. Возможно изменение окраски кала (в черный цвет).

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Дезурик (Desuric®)**Бензбромарон***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бензбромарона 100 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Урикозурическое, гипурикемическое.

Фармакодин.: Ингибирует канальцевую реабсорбцию мочевой кислоты и увеличивает выведение аллантаина и уратов с мочой, а мочевой кислоты - кишечником.

Показ.: Подагра, гиперурикемия.

Противопоказ.: Почечная недостаточность, уrolитиаз, гиперурикемия, подагра, обусловленная заболеваниями крови, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диарея.

Взаим.: Повышает активность антивитаминов К.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки в день.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Декамевит (Decamevitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола ацетата 0,0027 г (6600 МЕ), альфатокоферола ацетата 0,01 г, тиамина бромида 0,0258 г, рибофлавина 0,01 г, пиридоксина гидрохлорида 0,02 г, фолиевой кислоты 0,002 г, рутина или витамина Р из цитрусовых 0,02 г, метионина 0,2 г, цианокобаламина 0,0001 г, аскорбиновой кислоты 0,2 г и никотиамида 0,05 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов.

Показ.: Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах (умственное и физическое истощение, пожилой возраст, реконвалесценция в послеоперационный период, длительная терапия антибиотиками).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1-2 таблетки 1-2 раза в день; курс - 20 дней; перерывы между курсами - 2-3 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Декаминная мазь (Dekamiin)**Деквалиния хлорид***

Сост. и ф.в.: 30 г мази на эмульсионной основе содержат деквалиния хлорида

0,15 или 0,3 г; в алюминиевых тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, противогрибковое (фунгистатическое и фунгицидное).

Показ.: Грибковые заболевания кожи, вызванные дрожжеподобными грибами рода *Candida albicans*, эпидермофития.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Кожные аллергические реакции.

Взаим.: Эффект ослабляют анионные детергенты (мыло).

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженные очаги кожи 1-2 раза в сутки и слегка втирают. Продолжительность лечения индивидуальна и зависит от характера заболевания и эффективности действия. Обычно - 4-8 нед.

Произв.: Таллинский фармацевтический завод (Эстония)

Декапептил (Decapeptyl®)**Трипторелин***

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит трипторелина ацетата 525 или 105 мкг (478,1 или 95,6 мкг трипторелина соответственно); в шприцах одноразового использования по 1 мл; в упаковке 7 и 7 или 28 шт соответственно.

Фарм. действ.: Антигонадотропное, цитостатическое.

Показ.: Эндометриоз, миома матки, программа "экстракорпорального оплодотворения", рак простаты, раннее половое созревание, гипогонадотропная аменорея.

Противопоказ.: Поликистоз яичников, беременность, лактация.

Поб. действ.: Снижение либидо, лабильность настроения, депрессия, приливы, деминерализация костей (без повышения ломкости), локальные аллергические реакции (гиперемия, зуд в месте введения).

Примен. и доз.: П/к, 1 раз в сутки. Первые 7 дней - по 0,5 мг, начиная с 8-го дня - по 0,1 мг (поддерживающая доза).

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Декапептил-депо (Decapeptyl®-depo)**Трипторелин***

Сост. и ф.в.: 1 шприц одноразового применения содержит трипторелина в микрокапсулах из бионеактивного поли-

мера 3,75 мг, в комплекте с суспензией; во флаконах по 2 мл.

Фарм. действ.: Антигонадотропное, цитостатическое.

Показ.: Эндометриоз, миома матки, программа "экстракорпорального оплодотворения", рак простаты, раннее половое созревание.

Противопоказ.: Поликистоз яичников, беременность, лактация.

Поб. действ.: Снижение либидо, лабильность настроения, депрессия, приливы, деминерализация костей (без повышения ломкости), локальная аллергическая реакция (гиперемия, зуд в месте введения).

Примен. и доз.: В/м, каждые 28 дней (для женщин - в течение не более 6 мес). При использовании в программе "экстракорпорального оплодотворения" на цикл стимуляции достаточно одной инъекции.

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Декарис (Decaris)

Левамизол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левамизола гидрохлорида 50 или 150 мг.

Фарм. действ.: Антигельминтное, иммуностимулирующее.

Показ.: Аскаридоз, анкилостомидоз, инфекционные заболевания (рецидивирующий простой герпес, бородавки, часто рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей у детей, рецидивирующие синуситы, затянувшийся вирусный гепатит, при котором более 3 мес определяется HBsAg, хронический активный гепатит В), иммунодефицитные состояния и аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, болезнь Крона, рецидивирующий афтозный стоматит, болезнь Рейтера, системная красная волчанка - для поддержания ремиссии, достигнутой другими средствами), злокачественные опухоли бронхов, толстой кишки, молочных желез (после удаления основной массы опухоли хирургическим, лучевым или химиотерапевтическим путем), лимфогранулематоз и лейкозы (в период ремиссии, в интервалах между курсами химиотерапии).

Противопоказ.: Агранулоцитоз, беременность.

Поб. действ.: Боли в животе, рвота, понос (при однократном приеме очень редко); кожные сыпи, крапивница, симптомы, напоминающие грипп, неврологические расстройства, агранулоцитоз (при длительном приеме).

Примен. и доз.: Внутрь. Антигельминтная терапия: однократно - 150 мг; детям - 2,5 мг/кг массы; в возрасте 1-6 лет - 25-50 мг, 7-14 лет - 50-125 мг; в качестве иммуностимулятора: 150 мг/сутки в течение трех последовательных дней с последующими двухнедельными перерывами или по 150 мг/сутки 1 раз в неделю (при регулярном контроле числа лейкоцитов в крови).

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Дексазон (Dexason)

Дексаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дексаметазона 0,5 мг; в упаковке 10 и 100 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - дексаметазона (в виде натрия фосфата) 4 мг; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Первичная адренокортикальная недостаточность, врожденная гипоплазия надпочечников, тиреоидит; псориазный артрит, брахиалгия, системная красная волчанка, острый ревмокардит; пузырьчатый герпетический дерматит, мультиформная эритема, дерматит (экзофоллиативный, атопический), диффузный склерит, экстрабульбарный миозит, воспаление зрительного нерва; саркоидоз, бериллиоз, синдром Лефлера, диссеминированный туберкулез; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, тромбоцитопения, эритробластопения, врожденная гипопластическая анемия, идиопатическая или аутоиммунная анемия; лимфолейкоз, лимфома и лимфома Ходжкина, плазмоцитома; нефротический синдром с уремией, идиопатический нефрит; язвенный колит, гепатит; туберкулезный менингит с субарханоидальной блокадой, трихиноз с вовлечением ЦНС или миокарда; отек мозга, отек легких, для диагностики адренокортикальной функции.

Противопоказ.: Относительные: системные грибковые инфекции, пептическая язва, психоз, сахарный диабет, офтальмологический простой герпес роговицы, застойная сердечная недостаточность, синдром Иценко-Кушинга, остеопороз, судорожные состояния, беременность.

Поб. действ.: Задержка натрия и воды, потеря калия, алкалоз, гипертензия, миастения, миопатия, остеопороз, переломы, поражения ЖКТ (пептическая язва с возможностью перфораций и кровотечения, панкреатит, язвенный эзофагит),

истончение и ранимость кожи, лицевая эритема, потливость, снижение кожной чувствительности, судороги, головокружение, головная боль, экзофтальм, повышение внутриглазного давления, задняя подкапсулярная катаракта, нарушения менструального цикла, синдром Иценко-Кушинга, снижение толерантности к углеводам, задержка роста.

Примен. и доз.: Таблетки: внутрь, утром, начальная доза - 2-12 мг в день. При достижении терапевтического эффекта дозу постепенно снижают до уровня минимально поддерживающей. Лечение прекращают постепенно. Инъекции: при в/м и в/в введении суточная доза - от 4 до 80 мг в день до достижения удовлетворительного эффекта; затем терапию продолжают с помощью таблеток. Для внутрисуставного применения: для больших суставов - 2-4 мг, для маленьких - 0,8-1 мг. Доза для внутрибрюшинного применения - 2-3 мг.

Предост.: Пациентам с риском развития тромбоза следует принимать препарат одновременно с антикоагулянтами. Пожилым больным с остеопорозом назначают анаболические препараты. Детям рекомендуется терапия с перерывами. Лактирующие женщины на время лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Дексаметазон (Dexametason)

Дексаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дексаметазона 0,5 мг; в упаковке 30, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Ревматическая лихорадка, коллагенозы, системная красная волчанка, узелковый периартериит, ревматоидный артрит, нефротический синдром, пемфигус, бронхиальная астма, агранулоцитоз, тромбоцитопения, острый лейкоз, аденогенитальный синдром, аллергические реакции.

Противопоказ.: Острые и хронические инфекции, острый психоз, язвенная болезнь желудка.

Поб. действ.: Повышение аппетита, лунообразное лицо, гирсутизм, акне, остеопороз, повышение внутриглазного давления, подавление секреции гормонов гипофиза и коры надпочечников.

Примен. и доз.: Внутрь, в суточной дозе до 10-15 мг, поддерживающая доза - 2-4,5 мг. При астматическом статусе и

острых аллергических заболеваниях - 2-3 мг в сутки. При аденогенитальном синдроме - 1-1,5 мг/сутки.

Произв.: Orion (Финляндия)

Дексаметазон (Dexamethasolum)

Дексаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дексаметазона 0,0005 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Надпочечниковая недостаточность, тиреоидит, гипотиреоз, прогрессирующая офтальмопатия, гемобласты, бронхиальная астма, аллергические заболевания, ревматизм, ревматоидный артрит, системные заболевания соединительной ткани, аутоиммунная гемолитическая анемия, апластическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия, болезнь Иценко - Кушинга, психозы, почечная недостаточность, остеопороз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бактериальный эндокардит, сифилис, туберкулез, сахарный диабет, беременность.

Поб. действ.: Артериальная гипертензия, отеки, возбуждение, бессонница, гипокалиемия, алкалоз, аменорея, остеопороз, синдром Иценко-Кушинга, гипергликемия, иммунодефицит.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды (желательно в ранние утренние часы), суточная доза - 2-3 мг, в тяжелых случаях - до 6 мг. После наступления терапевтического эффекта дозу постепенно снижают до 0,5-1 мг/сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Делагил (Delagil)

Хлорохин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит хлорохина дифосфата 250 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антипротозойное, противовоспалительное, иммунодепрессивное.

Показ.: Малярия, амебиаз, ревматоидный артрит, хроническая и подострая форма системной красной волчанки, фотодерматозы.

Противопоказ.: Псориаз, псориатический артрит, неамебные поражения печени, нарушения системы крови, заболевания ЦНС.

Поб. действ.: Дерматит, помутнение роговицы (и другие нарушения зрения),



поседение, психозы, судороги, диспептические расстройства.

Взаим.: Несовместим с фенилбутазоном, препаратами золота, пеницилламином, цитостатиками, левамизолом.

Примен. и доз.: Системная красная волчанка - по 250-500 мг ежедневно. Ревматоидный артрит - 500 мг в течение 7 дней, затем - 250 мг в день. Лечение малярии - начальная доза для взрослых 1000 мг, через 6 ч - 500 мг, на второй и третий день - снова по 2 таблетки; для профилактики малярии - регулярно каждую неделю - по 2 таблетки. При амебиазе - по 750 мг в день в течение недели, затем в течение 10 дней каждый второй день - по 500 мг.

Предост.: Осторожно назначают с цимедином, хинином, метронидазолом, антацидами, ампициллином, ингибиторами МАО, алкоголем, дигоксином. В случае предохранительной прививки орального типа от брюшного тифа лечение препаратом можно начинать только по истечении 3 дней.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Делагил (Delagil®)

Хлорохин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит хлорохина фосфата 50 мг; в ампулах по 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антипротозойное, иммунодепрессивное.

Показ.: Малярия, амебиаз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, фотодерматит.

Противопоказ.: Печеночная недостаточность, псориазический артрит, заболевания органов кроветворения и ЦНС.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гастралгия, головокружение, шум в ушах, психозы, судороги, понижение остроты зрения, ретинопатия, коллапс (при быстром в/в введении), умеренная лейкопения, поседение, уртикарная сыпь, дерматит.

Взаим.: Фенилбутазон, препараты золота, пеницилламин, цитостатики, левамизол увеличивают вероятность аплазии костного мозга и поражения кожи.

Примен. и доз.: В/в капельно, в/м - по 10-20 мл 5% раствора. Для в/в введения используют 50-кратное разведение.

Произв.: Egis (Венгрия)

Делуфен (Delufen®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Sinapis nigra D1 1 мл, Euphorbium D6 10 мл, Pulsatilla D6 10

мл, Luffa D12 10 мл, Mercurius bijodatus D12 10 мл, этиловый спирт 54% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30 и 50 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое, десенсибилизирующее, иммуностимулирующее, репаративное.

Показ.: Ринит вирусной, бактериальной или аллергической этиологии, острый и хронический синусит, евстахиит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза в день: взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года - по 1-3 капли, разведенных в 1 чайной ложке воды или молока; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды. При острых состояниях - принимать каждые 0,5-1 ч: взрослым и подросткам - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли; детям до 1 года - по 1 капле до наступления улучшения (не более 8 раз), затем - 3 раза в день.

Произв.: Bittner (Австрия)

Деманол (Demanolum)

Деанол ацеглумат*

Сост. и ф.в.: 1 чайная ложка раствора содержит деанола ацеглумата 1 г; во флаконах по 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Ноотропное, церебропротективное.

Фармакодин.: Стимулирует процессы тканевого обмена, увеличивает амплитуду транскаллозального потенциала, улучшает организацию основного ритма ЭЭГ, сглаживает межполушарную асимметрию.

Показ.: Астенические и астенодепрессивные расстройства (пограничные состояния, психоорганический синдром, шизофренический дефект, алкоголизм).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чайной ложке 2-3 раза в день, последний прием - не позднее 16-18 ч, максимальная разовая доза - 2 г, максимальная суточная - 10 г. Курс лечения - 1,5-2,5 мес.

Произв.: Марбиофарм (Россия)

Демулен (Demulen®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этилэстрадиола 35 мкг и этинодиола ацетата 1 мг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт.

Фарм. действ.: Контрацептивное, эстроген-гестагенное.

Показ.: Контрацепция.

Противопоказ.: Опухоли молочных желез и репродуктивной системы, ациклические кровянистые выделения из половых путей неясного генеза, тромбоз, флебит, тромбоэмболии, нарушение функции печени и почек, сахарный диабет (тяжелая форма), выраженные нарушения жирового обмена, серповидноклеточная анемия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, нагрубание молочных желез, головная боль, депрессия, отеки, изменение массы тела, нарушение либидо.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки в одно и то же время, начиная с 5 дня менструального цикла, последовательность приема таблеток указана на календарной шкале.

Предост.: Не рекомендуется назначать препарат женщинам старше 40 лет, курящим - старше 35 лет. При пропуске приема таблетки свыше 24 ч, принимают (как можно скорее) следующую таблетку и до конца цикла используют дополнительные методы контрацепции. Препарат следует отменить за 3 мес до плановой операции и в послеоперационный период. Необходимо иметь в виду, что эффективность препарата снижается при упорной рвоте, диарее.

Произв.: Searle (США)

Депакин 300 энтерик (Derakine® 300 enteric)

Вальпроат натрия

Депакин (Derakine®)

Вальпроат натрия

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимой оболочкой содержит вальпроата натрия 300 мг; в упаковке 100 шт.

1 дозировочная ложка сиропа - 200 мг; во флаконах по 100 и 150 мл.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора (4 мл) - 400 мг.

Фарм. действ.: Противозепилептическое.

Показ.: Все формы эпилепсии, расстройства поведения, связанные с эпилепсией, фебрильные судороги и нервные тики у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гепатит, в т.ч. в семейном анамнезе.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, поражение печени, нарушение сознания, алоpecia, гипофибриногенемия, тромбопения, анемия, лейкопения, аменорея, дисменорея, увеличение массы тела.

Взаим.: Усиливает действие барбитуратов, нейролептиков и антидепрессивных средств. Несовместим с салицилатами (у детей).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, взрослым и подросткам - 20-30 мг/кг; детям - 30 мг/кг; до 1 года - в 2 приема, у более старших - в 3 приема. В/в, струйно - 0,4-0,8 г или в/в, капельно - из расчета 0,025 г/кг массы тела в течение 24; 36 или 48 ч. Препарат разводят в 500 мл 0,9% раствора натрия хлорида или в 5-30% растворе глюкозы. При переходе с рпальной формы препарата к парентеральной первую инъекцию проводят через 4-6 ч после последнего приема внутрь из расчета 0,5-1 мг/кг в час.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Депакин хроно (Derakine® chrono)

Депакин хроно 500 (Derakine® Chrono)

Вальпроевая кислота*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит вальпроевой кислоты и вальпроата натрия 300 или 500 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противозепилептическое.

Фармакокин.: Концентрации вальпроевой кислоты в плазме на 25% ниже (чем при введении Депакина), но стабильны - плато между 4-14 ч при отсутствии в течение 24 ч пиков концентрации.

Показ.: Все формы эпилепсии, расстройства поведения, связанные с эпилепсией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гепатит.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, поражение печени, нарушение сознания, алоpecia, гипофибриногенемия, тромбопения, лейкопения, аменорея, дисменорея, увеличение массы тела.

Взаим.: Усиливает действие барбитуратов, нейролептиков и антидепрессивных

средств. Несовместим с салицилатами (у детей).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям с массой тела более 25 кг - в средней суточной дозе 20-30 мг/кг в 1-2 приема.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Деперзолон (Depersolon)

Мазипредон*

Сост. и ф.в.: 1 тубик (10 г) содержит мазипредона 25 мг в смываемой мази.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, десенсибилизирующее.

Показ.: Экзема, дерматит, нейродермит, красный плоский лишай, дискоидная волчанка, обыкновенный псориаз, круговая плешивость, воспаление наружного слухового прохода, опрелость, аллергические дерматиты.

Противопоказ.: Бактериальные, вирусные, грибковые заболевания кожи, кожные проявления сифилиса, опухоли кожи, предраковые заболевания.

Поб. действ.: Системные эффекты, характерные для глюкокортикостероидов (при длительном применении и/или нанесении на большие поверхности кожи).

Примен. и доз.: Накожно, наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день; на ладони и подошвы накладывают окклюзионные повязки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Депо-инсулин С (Depo-insulin S)

Инсулин аминохинурид

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 40 ЕД хроматографически чистого свиного инсулина и 0,167 мг депо-среды аминохинурида дигидрохлорида, во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Сахарный диабет I типа. Сахарный диабет II типа в следующих случаях: резистентность к пероральным гипогликемизирующим препаратам, интеркуррентные заболевания, операции. Диабетическая кома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется. Следует применять человеческий инсулин.

Поб. действ.: Гипогликемия, гипогликемическая прекома и кома, иммунологические перекрестные реакции с инсулином человека, липодистрофия (при дли-

тельном применении), аллергические реакции.

Примен. и доз.: П/к или в/в (в исключительных случаях); разовая доза не должна превышать 40 ЕД. При переходе с инсулина С на Депо-инсулин С доза может быть снижена в 4 раза.

Произв.: Hoechst (Германия)

Депонит 5, 10 (Deponit® 5, 10)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 пластырь (ТДТС) содержит нитроглицерина 16 или 32 мг со скоростью высвобождения 5 мг/24 ч или 10 мг/24 ч соответственно; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антиангинальное.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца, стенокардия (профилактика приступов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые нарушения кровообращения (шок, сосудистый коллапс), выраженная гипотония (систолическое АД 90 мм рт.ст. и ниже). Относительные противопоказания: острый инфаркт миокарда с низким давлением наполнения левого желудочка, аортальный и митральный стеноз, заболевания с повышенным внутричерепным давлением.

Поб. действ.: Головные боли (в начале лечения), ортостатическая гипотензия (при первом применении), тошнота, рвота, гиперемия, дерматит, сопровождающийся зудом и ощущением жжения, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект усиливается другими вазодилататорами, гипотензивными препаратами, бета-блокаторами, антагонистами кальция, дигидроэрготамином, циклическими антидепрессантами, алкоголем. Увеличивает концентрацию дигидроэрготамин в крови и снижает гепарина.

Примен. и доз.: Накожно. Пластырь наклеивается на кожу 1 раз в день.

Предост.: Следует воздерживаться от видов деятельности, связанных с необходимостью повышенного внимания (управление механизмами, вождение автотранспорта и др.) и употребления алкоголя.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Депостат (Depostat®)

Гестонорон капроат*

Сост. и ф.в.: 1 мл масляного раствора для инъекций содержит гестонорона кап-

роата 100 мг, в ампулах по 2 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гестагенное, противоопухолевое.

Показ.: Аденома предстательной железы, прогрессирующая карцинома молочной железы и эндометрия.

Противопоказ.: Герпес в период бывшей беременности, опухоли печени (в т.ч. в анамнезе).

Поб. действ.: Гинекомастия, нарушение потенции, снижение сперматогенеза; кашлевые позывы или кашель, одышка, сосудистые нарушения - во время или сразу после введения.

Примен. и доз.: В/м медленно - по 2 мл (до 4 мл) 1 раз в неделю. Курс лечения - 2-3 мес для мужчин; для женщин - непрерывное применение в течение длительного времени.

Произв.: Schering (Германия)

Депурафлукс (Depuraflux®)

Сост. и ф.в.: 25 г растворимого чая содержат 11,014 г обезвоженного экстракта следующего состава: кора крушины 18 г, плод аниса 5 г, плод тмина 3,7 г, плод кориандра 6 г, плод фенхеля 3,5 г, листья мяты перечной 1,5 г, листья сенны 15 г, трава золототысячника 0,4 г, трава хвоща 24 г; порошок по 37,5; во флаконе вместимостью 150 мл и порошок по 75 г во флаконе вместимостью 300 мл.

Фарм. действ.: Слабительное.

Показ.: Острые и хронические запоры.

Противопоказ.: Кишечная непроходимость.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чашке в день (одна чайная ложка на чашку) вечером или утром (натощак). Чай можно подсластить. Флакон следует немедленно закупоривать.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Дермазин (Dermazin®)

Сульфадиазин*

Сост. и ф.в.: 100 г крема содержат микронизированного сульфадиазина серебра 1 г; в тубах по 50 г и в банках по 250 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Ожоги, пролежни, глубокие раны.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, не назначать новорожденным.

Поб. действ.: Зуд, чувство жжения. При длительном применении на больших поверхностях - системные эффекты, характерные для сульфаниламидов.

Примен. и доз.: На поврежденную поверхность слоем 2-4 мм 2 раза в день; при обширных поражениях накрывают стерильной марлевой повязкой. При повторных аппликациях старый слой крема удаляют водой или антисептическим раствором.

Произв.: Lek (Словения)

Дерматоп (Dermator®)

Предникарбат*

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержит предникарбата 2,5 мг; в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Острая и хроническая экзема, атопическая экзема, нейродермит, псориаз, ожоги I степени.

Противопоказ.: Бактериальные, грибковые и вирусные инфекции кожи (туберкулез, сифилис, ветряная оспа, микозы), периоральный дерматит, кожные реакции вакцинации.

Бер. и корм. гр.: Возможно, но не более 4 нед.

Поб. действ.: Покраснение, жжение на месте аппликации.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженные участки 1-2 раза в день; курс - 2-3 (не более 4) нед. В случае местной бактериальной или микозной инфекции необходимо назначать дополнительное антибактериальное или противогрибковое лечение.

Предост.: Не следует допускать попадания мази в глаза. Не рекомендуется длительное (более 4 нед) лечение, особенно при беременности, и у маленьких детей.

Произв.: Hoechst (Германия)

Дерместрил (Dermestril)

Эстрадиол*

Сост. и ф.в.: 1 пластырь площадью 9, 18 или 36 кв.см содержит эстрадиола 2, 4 или 8 мг соответственно; скорость высвобождения активного вещества - 25, 50 или 100 мкг в день; в упаковке 8 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Физиологическая или постоперационная менопауза (приливы, расстройства сна, урогенитальная атрофия, психическая нестабильность, нарушения настроения); постменопаузный остеопороз (профилактика).

Противопоказ.: Рак молочной железы и др. гормонзависимые опухоли (диагностированные или подозреваемые), эндометриоз, вагинальные кровотечения неизвестной этиологии; тяжелые заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы; тромбоэмболии и тромбофлебиты (в т.ч. в анамнезе), беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Головная боль, болезненность в молочных железах, вагинальные кровотечения, задержка натрия и воды, отеки, рвота, метеоризм, спазм кишечника, эритема и зуд в месте аппликации.

Примен. и доз.: Накожно, накладывают на чистый, здоровый, сухой, обезжиренный участок интактной кожи на бедре, пояснице или животе (места аппликаций чередуют). Лечение начинают с одного Дерместрила 50. Пластырь меняют 2 раза в неделю (по возможности с соблюдением постоянных дней недели: например, понедельник и четверг); при самопроизвольном отклеивании пластыря, необходима замена на новый. Максимальная суточная доза - 100 мкг. Препарат применяют циклично, в течение 3 нед (по 6 применений), с последующим недельным перерывом. В случае гистерэктомии назначают непрерывно.

Предост.: С осторожностью назначают при сердечной недостаточности, дисфункции почек и печени, тяжелой гипертензии, эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, отеках, пожилым и при гипогонадизме. Рекомендуются регулярный контроль за показателями эндокринной системы и гинекологические обследования. Курс терапии должен быть немедленно приостановлен при появлении мигрени, частых головных болей и любых типов расстройств зрения.

Произв.: CSC (Италия)

Дермовейт® (Dermovate®)

Клобетазол*

Сост. и ф.в.: 100 г мази или крема содержат клобетазола пропионата 0,05 г; в тубах по 25 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное.

Показ.: Псориаз (кроме распространенного бляшечного), хроническая экзема, плоский лишай, дискоидная красная волчанка, кожные заболевания, не поддающиеся воздействию других стероидов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; угри розовые и юношеские; периоральный дерматит, инфекции кожи ви-

русные (простой герпес), грибковые (кандидоз), бактериальные (импетиго); перианальный и генитальный зуд; дерматоз у детей младше одного года (включая дерматиты и сыпь при опрелости).

Бер. и корм. гр.: Достаточных данных о безопасности применения во время беременности нет.

Поб. действ.: При длительном применении - атрофические изменения на лице и других участках тела (бородавки, истончение кожи, расширение сосудов), ослабление барьерных функций кожи, редко - возникновение пустулезной формы псориаза.

Передоз.: Проявляется признаками гиперкортицизма (требующими отмены препарата).

Примен. и доз.: Наружно. Накладывают тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день до наступления улучшения (в течение нескольких дней). При стойких поражениях кожи (особенно при гиперкератозе) действие можно усилить путем окклюзии пораженного участка с помощью полиэтиленовой пленки в течение одной ночи. После этого достигнутое улучшение поддерживается простым применением препарата (без окклюзии).

Предост.: При отсутствии улучшения в течение 2-4 нед должны возникнуть сомнения в правильности диагноза. При обострениях необходимы краткие повторные курсы. У пациентов с псориазом может ослабляться барьерная функция кожи, проявиться пустулезный псориаз, развиться толерантность, могут возникать рецидивы. Необходимо избегать длительного и непрерывного использования, особенно у младенцев и детей, т.к. возможно подавление деятельности коры надпочечников. У младенцев пленки могут действовать как окклюзионные повязки и увеличивать абсорбцию кортикостероидов. У детей или на лице препарат применяют в течение 5 дней и без окклюзии. Перед наложением свежей повязки кожу следует очищать, т.к. тепло и влажность, создаваемые герметичными (окклюзионными) повязками, способствуют возникновению бактериальной инфекции. Присоединение бактериальной инфекции требует прекращения использования препарата и назначения антибактериальной терапии. Препарат не должен попадать в глаза (возможно развитие глаукомы). Длительное применение больших количеств (или на больших площадях) может привести к системной абсорбции (гиперкортицизм).

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Дермозолон (Dermosolon)

Сост. и ф.в.: 1 тубик (5 г) содержит преднизолона 25 мг и йодхлороксиин-олина 150 мг в гидрофильной мазевой основе.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое.

Показ.: Экзема, опрелость и другие дерматиты, характеризующиеся аллергическим воспалением, осложненные бактериальной или грибковой инфекцией. Поверхностные ограниченные бактериальные или грибковые инфекции кожи, характеризующиеся аллергическим воспалением, лечение которых другими антибактериальными и антимикотическими средствами оказалось неэффективным.

Противопоказ.: Вирусные инфекции кожи, туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса; повышенная чувствительность к йоду.

Поб. действ.: Системные эффекты, характерные для глюкокортикостероидов (при длительном применении и/или нанесении на большие поверхности кожи); реакции повышенной чувствительности на йод.

Примен. и доз.: Накожно, наносят на кожу тонким слоем 1-3 раза в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Десферал® (Desferal®)

Дефероксамин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекций содержит дефероксамин 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Связывание железа и алюминия с образованием хелатов.

Показ.: Хронический избыток железа в организме: трансфузионный гемосидероз, талассемия, идиопатический гемохроматоз (при невозможности проведения флеботомии), поздняя кожная порфирия; острое отравление железом; хронический избыток алюминия у пациентов с заболеваниями почек, находящихся на гемодиализе (при развитии заболеваний костной системы и/или энцефалопатии); в качестве теста для определения избытка железа или алюминия в организме.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности (особенно в первом триместре) - только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Нарушения зрения и слуха, помутнение хрусталика, желудочно-кишечные нарушения, судороги икроножных мышц, нарушения функции печени или почек, тромбоцитопения, сердечно-сосудистые и неврологические нарушения, аллергические кожные реакции, локальное раздражение в месте введения.

Примен. и доз.: Дозировка и схема применения должны определяться индивидуально в зависимости от показания.

Предост.: Перед началом и в процессе приема должны проводиться офтальмологические и аудиологические исследования (при развитии нарушений - лечение отменяют). При выраженной почечной недостаточности или анурии (у пациентов, не находящихся на диализе), скорость в/в инфузии не должна превышать 15 мг/кг в час. Избыток железа в организме повышает подверженность к инфекциям, вызываемым *Yersinia enterocolitica* и *Yersinia pseudotuberculosis*. При развитии этих инфекций во время лечения препарат следует отменить до их стихания.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Детралекс (Detralex)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит очищенную фракцию флавоноидов (диосмина 450 мг и гесперидина 50 мг); в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ангиопротекторное, вентонизирующее, снижение проницаемости и ломкости капилляров, улучшающее лимфодренаж.

Фармакокин.: $T_{1/2}$ - 11 ч. Метаболизируется с образованием феноловых кислот. Выводится в основном с калом (через почки - 14%).

Показ.: Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения), функциональные нарушения при острых геморроидальных приступах.

Противопоказ.: Лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, нейровегетативные нарушения.

Примен. и доз.: Внутрь, при венозной недостаточности - по 2 таблетки в день во время еды; при остром геморрое - 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней, затем - по 4 таблетки в течение последующих 3 дней.

Произв.: Servier (Франция)

Дефламон (Deflamon)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 флакон со 100 мл раствора для в/в капельных инъекций содержит метронидазола 500 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, противопаразитарное.

Показ.: Анаэробные инфекции, септицемия, бактеремия, абсцессы мозга, гангренозная пневмония, остеомиелит, родильная горячка, абсцессы таза, перитонит, инфицированные послеоперационные раны, послеоперационные инфекции (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания ЦНС, изменение состава крови (дискразия), беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Металлический вкус во рту, обложенность языка, тошнота, рвота и другие диспептические расстройства, сонливость, головокружение, головная боль, атаксия, расстройства координации, судороги, периферическая нейропатия, потемнение мочи, дизурия, цистит, пиурия, периферическая нейропатия, повышенное либидо, лейкопения, грибковая суперинфекция (кандидомикоз), гипертермия, высыпания на коже, зуд и другие аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: В/в капельно по 100 мл (5 мл/мин) каждые 8 ч. Курс лечения 7 дней. Детям до 12 лет - 1,5 мл/кг массы тела (7,5 мг метронидазола/кг массы тела) каждые 8 ч. У пациентов с нарушенной функцией почек и печени дозу следует уменьшить.

Произв.: CSC (Италия)

Диа-Активанад-N (Dia-Aktivanad®-N)

Сост. и ф.в.: 100 мл сока для больных диабетом содержат печеночного экстракта 1,75 г, дрожжевого экстракта 0,02 г и кофеина 0,345 г, экстракта плодов шиповника 1,0 г; во флаконах по 200 и 500 мл. В 15 мл сока содержится 4,7 г сорбита в качестве заменителя сахара с калорийностью около 19 ккал.

Фарм. действ.: Общетонизирующее, восполнение дефицита витаминов группы В, повышение защитных сил организма.

Фармакокин.: Кофеин, входящий в состав препарата, почти полностью всасывается, Стах определяется через 30-40

мин. Быстро проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, поступает в материнское молоко, выводятся (в т.ч. в виде метаболитов) в основном почками.

Фармакодин.: Витамины дрожжевого экстракта регулируют обменные процессы в ЦНС, поддерживают нормальное состояние кожи; печеночный экстракт, благодаря содержащемуся в нем витамину В₁₂, стимулирует кроветворение, тонизирует организм, повышает сопротивляемость к инфекциям. Кофеин возбуждает ЦНС, повышает умственную и физическую работоспособность, расширяет сосуды кожи, почек, сердца (в рекомендуемых дозах без изменения АД).

Показ.: Сниженная сопротивляемость и работоспособность организма, длительное умственное и физическое напряжение, период реконвалесценции у больных сахарным диабетом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности применяют с осторожностью.

Поб. действ.: Бессонница, тахикардия, расстройства ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, перед употреблением встряхнуть, по 15-25 мл (1-1,5 столовые ложки) утром и по 15 мл (1 столовая ложка) в первые часы после полудня.

Предост.: Не рекомендуется принимать препарат натощак при повышенной чувствительности желудка и желчных путей. При склонности пациента к нарушениям засыпания последний прием следует отнести на первые послеполуденные часы. Препарат содержит 11 об.% алкоголя, в связи с этим с осторожностью используют у пациентов с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, повреждениями головного мозга и у детей.

Произв.: Knoll (Германия)

Диабетон (Diabeton®)

Гликлазид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гликлазида 80 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Фармакокин.: Быстро всасывается. С_{тах} - через 2-5 ч. Связь с белками плазмы - 94,2%. Т_{1/2} - 12 ч. Выводится почками (менее 1% в неизменном виде).

Показ.: Сахарный диабет инсулиннезависимый.

Противопоказ.: Юношеский диабет, кетоацидоз, прекоматозные и коматозные

состояния, острые нарушения функции печени и почек, беременность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, гипогликемия, обратимые гематологические нарушения, аллергические реакции.

Взаим.: Эффективность снижают диуретики и барбитураты, увеличивают - нестероидные противовоспалительные препараты, сульфаниламиды, бета-адреноблокаторы.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-4 таблетки в сутки.

Предост.: Следует регулярно определять уровень глюкозы в крови (натошак) и "суточную кривую".

Произв.: Servier (Франция)

Диабрезид (Diabrezide®)

Гликлазид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гликлазида 80 мг.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Фармакокин.: Хорошо всасывается, биодоступность составляет 80%. После однократного приема в дозе 80 мг C_{max} (3-8 мкг/мл) достигается через 2-4 (до 8) ч, снижается до уровня 2 мкг/мл - через 24 ч. На 85-99% связывается белками плазмы и ограниченно распределяется (объем распределения - 13-24 л). Интенсивно метаболизируется в печени (гидроксиглирование, окисление, глюкуронизация) до 7 неактивных метаболитов; 60-80% в основном в виде метаболитов в течение 96 ч выводятся с мочой. $T_{1/2}$ - 8-12 ч (у женщин и пожилых дольше, чем у мужчин).

Фармакодин.: Гипогликемический эффект обусловлен стимуляцией секреции инсулина В-клетками поджелудочной железы и опосредован прямым влиянием на транспорт кальция; улучшает I и II фазы освобождения инсулина, повышает чувствительность печени и периферических тканей к инсулину.

Клин. фарм.: Пик падения уровня глюкозы в крови (135-100 мг/дл) - через 4-5 ч (при дозе 80 мг). Чрезмерная гипогликемия мало вероятна. По некоторым данным, уменьшает агрегацию и адгезию тромбоцитов (снижает уровень бета-тромбоглобулина и улучшает соотношение тромбоксан $A_2/6$ -кето-простогландин- F_1 , стимулирует синтез простаглицлина. Положительно влияет на соотношение липидов плазмы и липопротеинов, уменьшает риск развития микро- и макрососудистых осложнений при сахарном диабете.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, в т.ч. к другим производным сульфонилмочевины, сульфаниламидам, тиазидам; сильные ожоги, травма, инфекция; кетоацидоз, острая и хроническая почечная недостаточность, заболевания печени, инсулинзависимый сахарный диабет, лихорадка, продолжительные тошнота и рвота.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Гипогликемия, головокружение, тошнота, рвота, боль в животе, понос; сердцебиение, гипонатриемия, повышение активности печеночных трансаминаз, кожная сыпь, зуд.

Взаим.: Эффект, в т.ч. побочный (приливы крови к лицу и голове, угнетение ЦНС, судороги, тошнота) усиливают алкоголь, циметидин, ослабляют - ацетазоламид и метазоламид.

Передоз.: Симптомы гипогликемии: холодный пот, тремор, холодная или бледная кожа, тахикардия, чувство голода, беспокойство, нарушение сознания, головокружение и др. В случае умеренной гипогликемии рекомендуется уменьшение дозы препарата.

Примен. и доз.: Внутрь, в начальной суточной дозе 40-80 мг ежедневно, во время завтрака, затем дозу постепенно увеличивают на 40-80 мг в неделю до достижения адекватного уровня глюкозы в крови. Средняя суточная доза - 160-200 мг однократно или в 2 приема по половине дозы в день (с приемом пищи); максимальная суточная доза - 320 мг. Пациентам с заболеваниями печени рекомендуется снижение дозы.

Предост.: Для эффективности лечения необходимо строго придерживаться диеты. Для оптимального контроля сахарного диабета II типа и предотвращения осложнений рекомендуется регулярное измерение уровня глюкозы: натошак (80-120 мг/дл), в ночное время (100-140 мг/дл) и уровня гликозилированного гемоглобина (менее 7%).

Произв.: Lilly (Швейцария)

Диадерм (Diaderm®)

Цинка оксид

Сост. и ф.в.: Цинка оксид, масло печени трески (с высоким содержанием витаминов А и D) на мазевой основе; мазь в тубах.

Фарм. действ.: Дерматопротективное.

Показ.: Опрелость, потница, дерматит, вызванный обветриванием кожи, пролежни.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наружно. Наносят на очищенную и высушенную кожу 4-6 раз в день.

Предост.: Не следует допускать попадания в глаза, на раны.

Произв.: American Drug Company (США)

Диазепам (Diazepam)

Диазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диазепам 5 или 10 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, снотворное, противосудорожное, миорелаксирующее.

Показ.: Неврозы, пограничные состояния с явлениями напряжения, беспокойства, тревоги, спастические состояния, нарушения сна, абстинентный синдром при хроническом алкоголизме, премедикация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая миастения.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первом триместре беременности и при кормлении грудью.

Поб. действ.: Головокружение, сонливость, мышечная слабость; редко - атаксия, парадоксальные реакции (возбуждение, чувство тревоги, нарушения сна, галлюцинации); при длительном применении - развитие лекарственной зависимости, нарушения памяти.

Взаим.: Усиливает депримирующий эффект нейролептиков, антидепрессантов, седативных, снотворных, анальгетиков и анестезирующих средств.

Примен. и доз.: Внутрь, по 5-10 мг 2-3 раза в сутки (до 60 мг в сутки); пожилым, ослабленным больным, пациентам с атеросклерозом - по 2 мг 2 раза в сутки; работающим больным - по 2,5 мг 1-2 раза в сутки или 5 мг вечером. Премедикация - 10-20 мг вечером.

Предост.: Пациентам следует воздерживаться от приема алкоголя. Необходимо иметь в виду, что прием замедляет скорость реакции.

Произв.: Romferchim (Румыния)

Диазепекс (Diazepex®)

Диазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диазепам 2 или 5 мг; в упаковке 20, 50 или 250 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, седативное, снотворное, противосудорожное, миорелаксирующее.

Фармакодин.: Успокаивающий и адаптогенный эффекты обусловлены влиянием на бензодиазепиновые рецепторы лимбической системы; миорелаксирующий и противосудорожный эффекты - торможением спинномозговых рефлексов.

Показ.: Тревога, беспокойство, напряжение, подавленность, депрессия; в качестве компонента комплексного лечения применяется также при судорожном синдроме, артериальной гипертензии, ревматоидном артрите, люмбаго, злокачественных опухолях, климаксе, предменструальном синдроме, дисальгоменорее, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спастичности скелетной мускулатуры, алкоголизме, последствиях травм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, глаукома, миастения.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первый триместр беременности и во время лактации.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, слабость, атаксия, головная боль; редко - нарушения зрения, эйфория, желтуха, сухость во рту, тошнота, запор, затрудненное дыхание, лейкопения, гранулоцитопения, тахикардия, гипотония, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект усиливают производные фенотиазина, барбитураты, ингибиторы МАО, циметидин, алкоголь.

Передоз.: Симптомы: сонливость, торможение рефлексов, возможна кома. Лечение симптоматическое. Специфический антидот - флумазенил.

Примен. и доз.: Внутрь, при состояниях тревоги и беспокойства - по 2-5 мг 2-4 раза в сутки, при спастических состояниях - по 2-10 мг 3-4 раза в сутки. Максимальная суточная доза для амбулаторных больных - 15 мг. Детям до 3 лет - по 1-5 мг, 4-12 лет - по 2-10 мг в сутки обычно за 1-3 приема.

Предост.: С осторожностью назначать при нарушениях функций сердца, дыхания, печени и почек, органических поражениях мозга, пожилым, больным, детям. Во время приема рекомендуется избегать работы, связанной с риском и быстротой реакций.

Произв.: Гриндекс (Латвия)

Диазолин (Diazolinum)**Мебгидролин***

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит диазолина 0,1 г; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Аллергические заболевания.

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания ЖКТ.

Поб. действ.: Раздражение слизистой ЖКТ (диспепсия, изжога, гастралгия, тошнота).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 0,05-0,2 г 1-2 раза в день, детям - по 0,02-0,05 г 1-2 раза в день.

Пронзв.: Акрихин (Россия); Фармак (Украина)

Диане-35 (Diane®-35)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит ципротерона ацетата 2 мг и этинилэстрадиола 0,035 мг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное, антиандрогенное, гестагенное, контрацептивное.

Показ.: Гиперандрогения у женщин: акне (особенно формы, сопровождающиеся себореей, воспалениями и образованием узлов), алоpecia, гирсутизм (легкие формы), контрацепция у женщин, страдающих этими заболеваниями.

Противопоказ.: Беременность, тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, рак молочной железы и эндометрия, нарушения жирового обмена, герпес (в анамнезе), серповидноклеточная анемия, идиопатическая желтуха, зуд или ухудшение течения отосклероза во время предшествующей беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушение функции желудка, нагрубание молочных желез, изменение массы тела, нарушение либидо, депрессивные состояния, плохая переносимость контактных линз, появление на лице пятен коричневого цвета.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно, приблизительно в одно и то же время, с 1-го дня цикла (т.е. с 1-го дня менструации), и далее по стрелке на упаковке, затем делается перерыв 7 дней. Продолжительность лечения - несколько месяцев.

Пронзв.: Schering (Германия)

Дианил (Dianeal)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для перитонеального диализа содержат декстрозы гидрата 1,5 (2,5 или 4,25) г, натрия хлорида 0,538 г, натрия лактата 0,448 г, кальция хлорида 0,0183 г, магния хлорида 0,00508 г; осмолярность 344 (395 или 483) мОсм/л, pH 5,2 (4,0-6,5); в пластиковых контейнерах по 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 или 5000 мл.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное, нормализация водно-электролитного баланса.

Клин. фарм.: Перитонеальный диализ проводится для удаления токсичных веществ и метаболитов, коррекции водно-электролитного баланса. Декстроза диализирующей жидкости создает гиперосмолярный по отношению к плазме раствор и способствует возникновению осмотического градиента и удалению жидкости из плазмы в брюшную полость. Электролиты жидкости нормализуют концентрацию электролитов плазмы за счет осмоса и диффузии через перитонеальную мембрану.

Показ.: Острая и хроническая почечная недостаточность, задержка жидкости в организме, нарушения электролитного баланса, интоксикация лекарственными препаратами, коррекция гиперкалиемии, профилактика гипокалиемии.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (без явной необходимости).

Поб. действ.: Боль в животе, кровотечения, перитонит, кишечная непроходимость, нарушения водно-электролитного баланса, гипо- или гиперволемиа, гиперили гипотензия, синдром нарушения равновесия, мышечные судороги, инфекция вокруг катетера в подкожном туннеле.

Взаим.: Усиливает аритмогенное действие дигиталиса (проявления дигиталисной интоксикации могут маскироваться гиперкалиемией, гипермагниемией и гипокальциемией). Коррекция электролитного баланса диализом может обострять дигиталисную интоксикацию. Совместим с гепарином.

Примен. и доз.: Внутривентриально. Частота сеансов диализа, объем раствора на сеанс, продолжительность пребывания раствора в брюшной полости и длительность диализа определяются индивидуально. В среднем рекомендуется проведение от 3 до 5 сеансов диализа в сутки с использованием от 1500 до 2000 мл на один сеанс.

Предост.: Необходимо тщательно контролировать водный баланс и массу тела

больного (гипер- или дегидратация могут приводить к застойной сердечной недостаточности, снижению объема циркулирующей крови и шоку), периодически оценивать биохимические и гематологические показатели, уровень кальция, магния и бикарбоната. Не следует применять для диализа более 5 л раствора за одну процедуру. Нельзя применять раствор при обнаружении протечек. Необходимо соблюдать условия асептики. Рекомендуется выбирать раствор с наименьшей необходимой осмолярностью для профилактики дегидратации, гиповолемии и сведения к минимуму потерь белка.

Произв.: Baxter (США)

Диарол® (Diarol™)

Лоперамид*

Сост. и ф.в.: 1 каплетта содержит лоперамида гидрохлорида 2 мг; в блистерах по 6 шт.

Фарм. действ.: Протидиареиное (агонист опиатных рецепторов кишечника).

Фармакодин.: Снижает кишечную перистальтику, действуя на нервные окончания и/или интрамуральные ганглии кишечных стенок, стимулирует абсорбцию соли и воды. Не оказывает выраженного анальгезирующего влияния.

Показ.: Диарея (острая и хроническая).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, диарея, сопровождающаяся повышенной температурой (более 38 град.С), наличие слизи или крови в кале, возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Только после консультации с врачом.

Поб. действ.: Запор, тошнота, головокружение, аллергические реакции (требуют отмены препарата).

Взаим.: Атропин и другие холинолитические средства усиливают (взаимно) эффект.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 2 каплетты после первого кишечного движения и по 1 каплетте после каждого последующего, но не более 4 каплетт в день. Детям 9-11 лет (27-43 кг) - по 1 каплетте после первого кишечного движения и по 1/2 каплетты после каждого последующего, но не более 3-х каплетт в день; 6-8 лет (21-26 кг) - по 1 каплетте после первого кишечного движения и по 1/2 каплетты после каждого последующего, но не более 2 каплетт в день. Не применять более 2-х дней.

Предост.: С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени и

больных, принимающих антибиотики. Во время лечения рекомендуется употреблять много жидкости, для профилактики обезвоживания. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Произв.: Four Ventures (США)

Дибазол (Dibazolum)

Бендазол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит бендазола 5 мг; в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Гипотензивное, сосудорасширяющее, спазмолитическое, активация межнейронных контактов в спинном мозге.

Показ.: Спазм артерий сердца, артериальная гипертензия, гипертонический криз, спазм периферических артерий. Спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечная колика). Заболевания нервной системы (остаточные явления полиомиелита, периферический паралич лицевого нерва).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: В/в или в/м, по 2-4 мл 1% или по 4-8 мл 0,5% раствора 2-3 раза в день. Курс - 8-14 дней.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Дибазол (Dibazolum)

Бендазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бендазола 20 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка для детей - 4 мг; в упаковке 10 шт.

1 мл раствора для инъекций - 10 мг.

Фарм. действ.: Гипотензивное, спазмолитическое, сосудорасширяющее, активация межнейронных контактов в спинном мозге.

Показ.: Артериальная гипертензия, спазм артерий (коронароспазм, спазм периферических артерий); спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечная колика); заболевания нервной системы (остаточные явления полиомиелита, периферический паралич лицевого нерва).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь (за 2 ч до еды или через 2 ч после еды) - по 20-50 мг 2-3 раза в день в течение 3-4 нед или более короткими курсами. При лечении заболеваний нервной системы - по 5 мг по одному разу в день или через день от

5 до 10 раз, детям в возрасте до 1 года - по 1 мг, 1-3 лет - 2 мг, 4-8 лет - 3 мг, 9-12 лет - 4 мг, старше 12 лет - 5 мг. Курс при необходимости повторяют через 3-4 нед. В/м - по 2-3 мл 1% раствора 2-3 раза в день. Курс лечения - 8-14 дней.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Акрихин (Россия)

Дивина (Divina®)

Сост. и ф.в.: 11 белых таблеток, содержащих по 2 мг эстрадиола валерата, и 10 голубых таблеток, содержащих по 2 мг эстрадиола валерата и 10 мг медроксипрогестерона ацетата; в упаковке с календарной шкалой.

Фарм. действ.: Эстроген-гестагенное.

Показ.: Женский климакс.

Противопоказ.: Тромбофлебит глубоких вен, тромбоэмболии, патология сосудов головного мозга в анамнезе, опухоли гипофиза, эстроген-зависимые опухоли, рак молочной железы и матки, нарушения функции печени, беременность.

Поб. действ.: Нарушения менструального цикла, нагрубание молочных желез, головные боли, тошнота, ощущение напряжения в ногах.

Примен. и доз.: Внутрь. По 1 таблетке в течение 21 дня (в первые 11 дней белые таблетки, затем - голубые). Следующий курс - через 7 дней.

Произв.: Orion (Финляндия)

Дивитрен (Divitren)

Сост. и ф.в.: 1 белая таблетка содержит эстрадиола валерата 2 мг; 1 голубая таблетка - эстрадиола валерата 2 мг и медроксипрогестерона ацетата 20 мг и 1 желтая таблетка - плацебо; в блистерной упаковке с календарной шкалой по 70 белых, 14 голубых и 7 желтых таблеток.

Фарм. действ.: Эстрогенно-гестагенное.

Показ.: Климактерический синдром; остеопороз в постменопаузе (профилактика).

Противопоказ.: Тромбофлебит глубоких вен, тромбоэмболии, острые и хронические заболевания печени, опухоли матки и молочной железы.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, сердцебиение, нагрубание молочных желез, внециклические маточные кровотечения.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день в течение длительного периода времени, циклами по 91 дню: 70 дней цикла - белые таблетки, с 71-го по 84-й день цикла - голубые таблетки, с 85-го

до 91-й день цикла - желтые таблетки. При необходимости циклы повторяют.

Произв.: Orion (Финляндия)

Дигестал (Digestal)

Дигестал форте (Digestal forte)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит панкреатина 200 мг с протеолитической активностью 300 ЕД ФИП, амилалитической активностью 5000 ЕД ФИП, липолитической активностью 6000 ЕД ФИП, составных частей желчи 25 мг, гемицеллюлазы 50 мг; в упаковке 30 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит панкреатин с протеолитической активностью 600 ЕД ФИП, амилалитической активностью 9000 ЕД ФИП и липолитической активностью 12000 ЕД ФИП, составных частей желчи 25 мг и гемицеллюлазы 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Регуляция пищеварения, восполнение дефицита ферментов поджелудочной железы и компонентов желчи.

Клин. фарм.: Активные компоненты препарата, высвобождающиеся из лекарственной формы в двенадцатиперстной кишке, корректируют расстройства пищеварения, возникшие вследствие недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы.

Показ.: Хронический панкреатит, фиброз поджелудочной железы, состояние после удаления поджелудочной железы, желудка, двенадцатиперстной кишки или желчного пузыря, подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости, муковисцидоз, др. расстройства пищеварительного процесса вследствие ферментной недостаточности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к протеинам свиного происхождения), печеночная недостаточность, гепатит, механическая желтуха, желчнокаменная болезнь.

Поб. действ.: Снижение синтеза собственных желчных кислот.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Дозировка индивидуальна. Средняя доза - 1-2 драже или 1-2 таблетки во время или сразу после еды.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Дигоксин (Digoxin)

Дигоксин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дигоксина 0,25 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Кардиотоническое, антиаритмическое, отрицательное дромо- и хронотропное.

Показ.: Застойная сердечная недостаточность, пароксизмальные суправентрикулярные аритмии (мерцательная аритмия, трепетание предсердий, суправентрикулярная тахикардия).

Противопоказ.: Интоксикация сердечными гликозидами, выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада, нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, острый ревмокардит.

Поб. действ.: Головная боль, слабость, анорексия, рвота, брадикардия, атриовентрикулярная блокада.

Взаим.: Следует избегать совместного назначения с амфотерицином В и производными кальция, с осторожностью - с диуретиками, симпатомиметиками.

Примен. и доз.: Внутрь. При среднебыстрой дигитализации назначают внутрь в 1-й день - 1,5 мг, во 2-й - 0,9 мг, с 3-го по 5-й - по 0,75 мг. При медленной дигитализации в первые 4 дня применяют по 0,75 мг, с 5-го по 7-й день - по 0,5 мг. Поддерживающая доза составляет 0,25-0,5 мг/сутки. Детям до 14-летнего возраста - 0,025-0,075 мг/кг.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Дигоксин (Digoxin)

Дигоксин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дигоксина 0,0625 мг (мите), 0,125 мг (семи) или 0,25 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 0,25 мг; в упаковке 5 или 25 шт.

Фарм. действ.: Кардиотоническое, диуретическое.

Показ.: Сердечная недостаточность, пароксизмальные наджелудочковые аритмии.

Противопоказ.: Абсолютные: гликозидная интоксикация; относительные: АВ-блокада I-II степени, брадикардия, острый инфаркт миокарда, митральный стеноз, WPW-синдром, экстрасистолия, желудочковая тахикардия, гипокалемия, гипомagnesемия, гиперкальциемия, гипотиреоз, легочное сердце, миокардит.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, тампонада сердца, брадикардия, экстрасистолия, бигеминия, нарушения

проводимости, нарушение зрения, слабость.

Примен. и доз.: Внутрь, 3-4 таблетки (по 0,25 мг) в сутки в течение 2-3 дней, затем - по 1-2 таблетки в сутки; в/в, в несколько приемов - 0,75-1,25 мг в течение 24-36 ч (для достижения быстрого эффекта) или 0,5-0,75 мг в сутки в 3 приема в течение 3-5 дней (для медленного эффекта); поддерживающая суточная доза - 0,125-0,25 мг в 1-2 приема.

Произв.: Orion (Финляндия)

Дигоксин (Digoxinum)

Дигоксин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дигоксина 0,25 мг; в упаковке 10 и 50 шт.

Фарм. действ.: Кардиотоническое, антиаритмическое.

Показ.: Хроническая сердечная недостаточность, пароксизмальные наджелудочковые тахикардии.

Противопоказ.: Стенокардия, острый инфаркт миокарда, брадикардия, острый ревмокардит.

Поб. действ.: Атриовентрикулярная блокада, нарушения сердечного ритма, тошнота, рвота, анорексия, брадикардия, экстрасистолия.

Взаим.: Не назначать с амфотерицином В, препаратами кальция. С осторожностью назначать совместно с диуретиками, симпатомиметиками.

Примен. и доз.: Внутрь, в 1-й день - 1,5 мг, во 2-й - 0,9 мг, с 3-го по 5-й - по 0,75 мг. Детям до 14 лет - 0,025-0,075 мг/кг массы тела.

Произв.: Санитас (Литва)

Дигоптон (Digophton®)

Дигитоксин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит гликозида наперстянки в расчете на дигитоксин 0,02 мг; во флаконах-капельницах по 10 мл.

Фарм. действ.: Повышение сократимости и возбудимости цилиарной мышцы глаза, улучшение аккомодации.

Показ.: Астенопия, пресбиопия, латентная гипертензия и усталость глаз (длительное пребывание перед телевизором, шитье, нарушение кровообращения глаз), боль в глазах (при мигрени).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Кератопатия (редко).

Примен. и доз.: В оба глаза по 1 капле 2-3 раза в день в течение 3-6 дней. После закапывания в нижний конъюнктивальный мешок следует закрыть глаза на

короткое время, чтобы препарат хорошо смешался со слезной жидкостью.

Предост.: При применении препарата следует исключить ношение контактных линз.

Произв.: Ankerpharm (Германия)

Диетпласт® гомеопатический пластырь для похудания (DietPlast™ homeopathic plaster)

Сост. и ф.в.: 1 пластырь (размер 32 x 32 мм) содержит экстракта из *Fucus vesiculosus* 5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция липолиза, нормализация обмена веществ.

Клин. фарм.: Стимулирует щитовидную железу (за счет иодина, содержащегося в экстракте Фукуса), активирует метаболизм жиров (за счет отторжения организмом иодно-протеиновых комплексов). Эффект начинается с момента приклеивания к коже и продолжается 16 ч. Существенное снижение массы тела достигается в течение 2 мес.

Показ.: Избыточная масса тела.

Примен. и доз.: Накожно. По 1 пластырю в день в течение 1-2 мес без перерыва. Наклеивают пластырь на чистый сухой и неповрежденный участок кожи бедра, живота или ягодиц, ежедневно меняя на новый. Не следует наносить новый пластырь на прежний участок кожи (возможно местное раздражение). При удалении пластыря, во избежание болезненности, большим пальцем нажимают на центр пластыря и, захватив край большим и указательным пальцами, осторожно отклеивают. Для удаления остатков с кожи можно воспользоваться спиртом или другими растворителями. Для повышения эффективности рекомендуется принимать пищу в одно и то же время, выпивать 1,5 л воды в день, использовать душ, ванну, заниматься спортом; подходит для любой кожи.

Произв.: Four Ventures (США)

Диетрин® (DietRin™)

Сост. и ф.в.: 1 капсула пролонгированного действия содержит фенилпропаноламина гидрохлорида 75 мг и бензокаина 9 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Анорексигенное.

Клин. фарм.: 1 капсула действует в течение дня (до 12 ч). Увеличение дозы не приводит к усилению эффекта. Про-

грамма похудения не должна превышать 3 мес.

Показ.: Коррекция избыточной массы тела.

Противопоказ.: Возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Только под контролем врача.

Поб. действ.: Повышенная нервозность, головокружение, бессонница (требующие отмены препарата).

Взаим.: Несовместим с препаратами, содержащими фенилпропаноламин.

Передоз.: При передозировке необходимо срочно обратиться к врачу.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле, запивая полным стаканом воды, утром (в течение 12 ч не возникает чувства голода). Один курс составляет 3-9 упаковок по 10 капсул в течение 1-3 мес (до появления возможности самостоятельно контролировать аппетит).

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с гипертонической болезнью, стенокардией в анамнезе, диабетом, гипертиреозом.

Произв.: Four Ventures (США)

Диклобене (Diclobene®)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит диклофенака натрия 25 и 50 мг; в упаковке 30 и 50 шт.

1 капсула ретард - 100 мг; в упаковке 30 и 50 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 75 мг; в упаковке 5 шт.

1 суппозиторий ректальный - 25; 50 или 100 мг; в упаковке 6 шт.

1 г геля - 10 мг, в тубах по 40 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, десенсибилизирующее, антиагрегационное.

Показ.: Для системного и наружного применения: суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра), боли в позвоночнике, невралгии, миалгии, ревматическое поражение мягких тканей. Для системного применения: болевой синдром и воспаление после операций и травм, первичная дисменорея, аднексит, проктит, инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, в т.ч. к сульфитам (инъекционная форма); изопропанолу и пропиленгликолю (гель, свечи), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, "аспириновая" астма, нарушения кроветворения неясной этиологии, беременность

(последний триместр), детский возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Тошнота, анорексия, боли и неприятные ощущения в эпигастральной области, метеоризм, запор, диарея, эрозивно-язвенные поражения, кровотечения и перфорации ЖКТ, головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница, раздражительность, усталость, отеки, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нарушения чувствительности, зрения, шум в ушах, судороги, выпадение волос, нарушение функции почек или печени. В месте в/м введения - жжение, образование инфильтрата, абсцесса, некроз жировой ткани. При применении свечей - местное раздражение, появление слизистых выделений с примесью крови, болезненная дефекация, воспаление толстой кишки с кровотечением, обострение язвенного колита. При наружном применении: зуд, покраснение, сыпь, жжение.

Примен. и доз.: Взрослым внутрь назначают по 25-50 мг 2-3 раза в сутки; максимальная суточная доза - 150 мг. Таблетки (капсулы) ретард назначают 1 раз в сутки, ректальные свечи - по 1 свече в сутки, обычно на ночь. Для лечения острых состояний или купирования обострения хронического процесса вводят в/м 75 мг препарата, дальнейшее лечение проводят с применением таблеток или свечей. Для детей старше 6 лет и подростков применяют только таблетки по 25 мг и, при необходимости, раствор для инъекций. Суточная доза - 2 мг/кг массы тела ребенка. Гель наносят в количестве 2-4 г на пораженное место 3-4 раза в сутки; окклюзионную повязку не накладывают.

Произв.: Merckle (Германия)

Диклоберл® 25 (Dicloberl® 25)

Диклофенак*

Диклоберл 50 (Dicloberl®50)

Диклофенак*

Диклоберл 75 (Dicloberl®75)

Диклофенак*

Диклоберл 100 (Dicloberl®100)

Диклофенак*

Диклоберл ретард (Dicloberl®)

Диклофенак*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, устойчивая к действию желудочного сока, содержит диклофенака натрия 25 или 50 мг; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

1 суппозиторий - 50 или 100 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг; в упаковке 1, 3 или 5 шт.

1 капсула ретард - 100 мг; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, угнетение синтеза простагландинов.

Фармакокин.: После перорального применения полностью резорбируется в кишечнике. Максимальная концентрация в плазме достигается через 1-16 ч. При в/м введении максимальная концентрация в плазме достигается через 10-20 мин, при ректальном введении - примерно через 30 мин. При пероральном применении 35-70% поступает в кровь в неизменном виде (после прохождения печени). Связывание с белками плазмы около 99%. Примерно 30% выводится из организма в виде метаболитов с калом. Около 70% метаболизируется в печени и выводится через почки в виде неактивных производных. $T_{1/2}$ примерно 2 ч.

Клин. фарм.: Описаны единичные случаи изменения содержания в крови сахара после приема диклофенака.

Показ.: Артрит (ревматоидный, полиартрит, приступы подагры); анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) и другие ревматические заболевания позвоночника, дегенеративные заболевания суставов и позвоночника (артрозы,

спондилоартрозы), "ревматическое" поражение мягких тканей, болезненные отеки и воспаления после травм или операций. Острый болевой синдром в перечисленных выше случаях (инъекции).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения кроветворения невыясненной этиологии, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, индуцированные порфирии, возраст (до 6 лет), подростковый возраст (капсулы ретард, свечи 100 мг и раствор для инъекций).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первые шесть месяцев беременности, противопоказан в последнем триместре (возможно торможение родовой деятельности, преждевременное закрытие артериального Боталлова протока, повышение склонности к кровотечениям у матери и ребенка, интенсивное образование отеков у матери). Следует избегать применения в период кормления грудью (переходит в молоко матери).

Поб. действ.: НВПС-гастропатия, язва желудка и кишечника, кровавая рвота, кровянистый стул или понос, головные боли, головокружение, возбуждение, раздражительность, слабость, оглушенность, нарушение чувствительности и вкуса, расстройство зрения, шум в ушах, нарушение слуха, памяти, дезориентация, страх, кошмары, дрожь, депрессия, симптоматика асептического менингита, кожная сыпь, зуд, крапивница, алоpecia, экземы, эритемы, пузырьковые высыпания, фотосенсибилизация, мелкопятнистые кожные геморрагии, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайела, нарушение функции почек, почечная недостаточность, протеинурия, гематурия, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, гепатит, анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панкреатит, отеки, сердцебиение, боли в груди, гипертония, гиперергические реакции; местные реакции (для свечей): раздражение, кровянистые отделения слизи, болезненная дефекация.

Взаим.: Повышает уровень дигоксина и лития в плазме крови, токсическое действие циклоспорина на почки, ослабляет эффект диуретиков и гипотензивных средств. Ацетилсалициловая кислота снижает концентрацию диклофенака в сыворотке. При одновременном приеме с калийсберегающими диуретиками увеличивается вероятность гиперкалиемии. Глюкокортикоиды и др. противовоспалительные средства повышают риск кровотечений в ЖКТ.

Передоз.: Симптомы: расстройства ЦНС (головокружение, головные боли, гипервентиляция, помутнение сознания, у детей - миоклонические судороги), расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, боли в области живота, кровотечения), расстройства функций печени и почек. Лечение: симптоматическое.

Примен. и доз.: Взрослым назначают в суточной дозе 50-150 мг. Обычно - по 25-50 мг 1-3 раза в день. Капсулы ретард - 1 раз в сутки в разовой дозе 100 мг. Ректально - по 1 свече (50 мг) 1-3 раза в день или по 1 свече (100 мг) 1 раз в день. Раствор для инъекций вводят в/м однократно и переходят на таблетки или свечи. Максимальная суточная доза - 150 мг. Детям старше 6 лет назначают только таблетки по 25 мг (из расчета 2 мг/кг; подросткам - таблетки (25 мг) 1-2 мг/кг в сутки в 2-3 приема).

Предост.: Раствор для инъекций противопоказан больным бронхиальной астмой, при повышенной чувствительности к сульфитам. С осторожностью назначают пациентам с болевыми ощущениями в области желудка или кишечника, лицам, в анамнезе которых содержатся данные о язвах желудка и кишечника, больным с заболеваниями печени или почек, с повышенным АД и/или сердечной недостаточностью, перенесшим крупные хирургические вмешательства, в пожилом возрасте. При совместном назначении с антикоагулянтами необходим мониторинг гемокоагуляции.

Пр из в.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Дикломелан (Diclomelan®)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака натрия 50 мг; в упаковке 10, 30 или 50 шт.

1 таблетка ретард - 100 мг; в упаковке 30 или 50 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг; в упаковке 5 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгетическое, жаропонижающее.

Показ.: Ревматический и ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, остеохондроз, спондилартроз; боли в позвоночнике, люмбаго, ишиас, невралгии, миалгии, периартрит, тендовагинит, бурсит, ревматическое поражение мягких тканей, острый подагри-

ческий артрит, болевой синдром и воспаление после травм, оперативных и стоматологических вмешательств; первичная альгодисменорея, аднексит; фарингит, тонзиллит, отит; колики (почечная, желчная, кишечная).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения), бронхиальная астма (приступы в анамнезе), крапивница и ринит (связанные с приемом НПВС), нарушения кроветворения, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Головные боли, головокружение, раздражительность, слабость, расстройства сна, нарушения чувствительности, зрения, шум в ушах, судороги, тошнота, анорексия, боли и неприятные ощущения в эпигастральной области, метеоризм, запор, диарея, эрозивно-язвенные поражения слизистой ЖКТ (иногда с кровотечением и перфорацией), неспецифический геморрагический колит, обострение язвенного колита, гематурия, протеинурия, нефротический синдром, острая почечная недостаточность, папиллярный некроз, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз в крови, гепатит, лейкопения, тромбоцитопения, анемия (гемолитическая или апластическая), агранулоцитоз, кожная сыпь, покраснение, зуд, крапивница.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке (50 мг) перед едой, начиная со 100-150 мг в сутки (в 2-3 приема); при длительном применении или нерезко выраженных симптомах - 50-100 мг в день. Таблетки ретард (100 мг) - 1 раз в сутки. В/м, медленно, по 75 мг (3 мл) 1 раз в день. Ректально, по 1 суппозиторию в сутки, перед сном, глубоко вводя в прямую кишку.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Диклонат П (Diclonat P)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка-ретард содержит диклофенака натрия 100 мг; в упаковке 20 шт.

1 суппозиторий ректальный - 50 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгетическое, жаропонижающее.

Показ.: Воспалительные и дегенеративно-ревматические заболевания: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, артрозы, спондилоартрозы (таблетки-ретард, суппозитории), сопровождающиеся выраженным болевым синдромом (раствор для инъекций); внесуставные ревматические заболевания, боли при заболеваниях позвоночника и посттравматические и послеоперационные воспалительные состояния с отеками и болевым синдромом (все лекарственные формы), болевой синдром и воспалительные состояния при первичной дисменорее, аднексите и др., в гинекологии (таблетки ретард, суппозитории), почечная и желчная колики (раствор для инъекций).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, бронхиальная астма, детский возраст (до 6 лет), проктит в стадии обострения (суппозитории), беременность, лактация (р-р д/ин).

Поб. действ.: Боли в эпигастрии, рвота, тошнота, диарея, проявление пептической язвы и обострение язвенной болезни (требуют отмены препарата); местное раздражение слизистой оболочки прямой кишки и обострение геморроя (суппозитории); боль и уплотнение в месте инъекции.

Примен. и доз.: Взрослым - таблетки-ретард: внутрь, перед едой, не разжевывая, запивая жидкостью, по 1 таблетке в сутки; при необходимости - по 300 мг в сутки в течение 2-3 нед. Суппозитории: ректально - по 1 свече перед сном, обычно в сочетании с дневным приемом таблеток или монотерапия при невозможности перорального приема. Раствор для инъекций: в/м - по 3 мл (1 ампула) в сутки, при необходимости - 2 раза в сутки с интервалом в несколько часов. Детям - по 2 мг/кг в сутки.

Предост.: При заболеваниях ЖКТ, болезни Крона, тяжелых нарушениях функции печени, сердца или почек назначают только под контролем врача.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Диклориум (Dicloream)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака натрия 50 мг; в упаковке 30 шт.

1 таблетка ретард - 100 мг; в упаковке 30 шт.

1 мл раствора для инъекций - 25 мг; в ампулах по 3 мл, в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Острые боли при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и спазмах гладкой мускулатуры.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, пептическая язва, тяжелые заболевания ЖКТ, кровотечения или геморрагический диатез, "аспириновая астма", беременность, лактация, детский возраст.

Взаим.: Усиливает негативные эффекты диуретиков и антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Взрослым, как правило, по 1 ампуле в день глубоко в/м в верхний внешний квадрант ягодицы (с чередованием сторон); в тяжелых случаях - 2 инъекции в день. По возможности рекомендуется как можно скорее перейти на прием таблеток.

Предост.: Не рекомендуется комбинировать с диуретиками и антикоагулянтами. С осторожностью назначают больным с заболеваниями почек (гипоперфузией), сердечной недостаточностью, циррозом печени или гепатитом, пожилым.

Произв.: CSC (Италия)

Диклофен (Diclofen)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка-форте содержит диклофенака натрия 50 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка-ретард - 100 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг; в упаковке 5 шт.

1 суппозиторий - 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее.

Показ.: Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов: ревматизм, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, артрозы и спондилоартрозы; подагра, внесуставные формы ревматизма, дисменорея, воспалительный синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, в т.ч. в анамнезе, язвенная болезнь, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Боли в эпигастральной области, отрыжка, рвота, понос, головные боли, легкое головокружение, кожные аллергические реакции; при использовании свечей - ощущение жжения в прямой кишке и тенезмы.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, во время или после еды, взрослым (таблетки) - 100-150 мг (начальная доза) в сутки в 2-3 приема. Поддерживающая доза - 1 таблетка ретард в день. При дисменорее - 50-150 мг в сутки; свечи: начальная суточная доза 100-150 мг (по 1 свече 2-3 раза в день); поддерживающая доза - 100 мг в день (по 1 свече 2 раза в день). При выраженных болях по 1 ампуле 1-2 раза в день в/м.

Предост.: При длительном применении следует регулярно контролировать клеточный состав крови. Лактирующие женщины на время лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Диклофенак (Diclofenac)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака натрия 50 или 100 (ретард) мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг, в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное, десенсибилизирующее (при длительном применении).

Показ.: Суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра, боли в позвоночнике), невралгии, миалгии, травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, первичная дисменорея, аднексит, инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов (вспомогательное средство).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения; "аспириновая" астма; нарушения кроветворения неясной этиологии, беременность, детский возраст (до 6 лет); для инъекционной формы - повышенная чувствительность к сульфитам.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, анорексия, боли и неприятные ощущения в животе, вздутие кишечника, запор или диарея), эрозивно-язвенные поражения, кровотечения и перфорации ЖКТ, головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница, раздражительность, слабость, отеки, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нарушение зрения (расплывчатость, диплопия), шум в ушах, судороги, выпадение волос, нарушение функции почек и печени; в месте в/м введения - жжение, образование ин-

фильтрата, абсцесс, некроз жировой ткани.

Взаим.: Может уменьшать диуретический эффект фуросемида, повышать концентрацию дигоксина в крови, увеличивать токсичность метотрексата и циклоспорина.

Примен. и доз.: Внутрь, по 25-50 мг 2-3 раза в сутки; максимальная суточная доза - 150 мг. Таблетки ретард назначают 1 раз в сутки в разовой дозе 100 мг, при необходимости сочетают с назначением внутрь 50 мг в таблетках обычной продолжительности действия. Для лечения острых состояний или купирования обострения хронического процесса вводят 75 мг в виде однократной в/м инъекции, далее переходят на прием таблеток. Детям старше 6 лет и подросткам назначают только таблетки обычной продолжительности действия по 25 мг и при необходимости инъекционный раствор. Суточная доза - 2 мг/кг массы тела ребенка. Таблетки принимают целиком, не разжевывая, натощак, с небольшим количеством жидкости. Инъекционный раствор вводят глубоко в ягодичную мышцу.

Предост.: Не следует назначать одновременно с метотрексатом и циклоспорином.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Диклофенак ЕС (Diclofenac ЕС®)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимым покрытием содержит диклофенака натрия 25 мг; в упаковке 30 или 1000 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, снижение синтеза простагландинов.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, острый подагрический артрит, острые скелетно-мышечные расстройства (периартрит, тендинит, тендосиновит, бурсит), боли и воспаление после ортопедических операций.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим нестероидным противовоспалительным средствам), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, аллергические реакции на НПВС.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в последнем триместре беременности. В первые 2 триместра и при лактации следует принимать с осторожностью.

Взаим.: При совместном использовании повышает концентрации в сыворотке

крови дигоксина, лития, метотрексата. Ослабляет действие мочегонных и гипотензивных средств, увеличивает уровень калия в крови (при применении с калийсберегающими диуретиками). При одновременном введении с глюкокортикоидами или другими противовоспалительными препаратами возрастает риск желудочно-кишечных кровотечений. Ацетилсалициловая кислота снижает концентрацию в сыворотке крови.

Передоз.: Симптомы: расстройства ЦНС (головокружение, головная боль, гипервентиляция, нарушение сознания; у детей - миоклонические судороги); тошнота, рвота, боли в области живота, кровотечение, нарушение функций печени и почек. Лечение: симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь, 75-150 мг в день в 2 или 3 приема.

Предост.: С осторожностью применять у пациентов со склонностью к кровотечениям, тяжелыми нарушениями функции печени и почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями. При длительном назначении необходимо проводить офтальмологическое обследование.

Произв.: CTS (Израиль)

Диклофенак-Ретард (Diclofenac-Retard)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака 0,1 г; в упаковке по 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Фармакодин.: Подавляет агрегацию тромбоцитов, при длительном применении оказывает десенсибилизирующее действие.

Показ.: Суставной синдром (ревматоидный артрит, артроз, болезнь Бехтерева, остеоартрит, подагра), боли в позвоночнике, невралгия, миалгия, болевой синдром и воспаление после операций и травм, аднексит, проктит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, "аспириновая" астма, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, метеоризм, запор, диарея, головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ. Редко: анемия, лейкопения, нарушения зрения, судороги, нарушение функции печени или почек.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, по 1 таблетке 1 раз в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Дилакор XR (Dilacor XR)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 капсула пролонгированного действия содержит дилтиазема гидрохлорида 120, 180 или 240 мг; во флаконах по 100 шт и в блистерах по 10 шт.

Фарм. действ.: Селективная блокада "медленных" кальциевых каналов, гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое.

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется из ЖКТ; биодоступность составляет около 40%, концентрация в плазме достигает максимума через 4-6 ч. На 70-80% связывается с белками плазмы. $T_{1/2}$ из плазмы составляет около 3-4,5 ч, после достижения равновесной концентрации - 5-10 ч. Интенсивно метаболизируется в печени, только 2-4% выводится с мочой в неизмененной форме. Основной метаболит - дезацетилдилтиазем также обладает коронародилатирующим эффектом (25-50% такового дилтиазема). У пациентов с печеночной недостаточностью увеличивается период полувыведения, а также повышается биодоступность (на 69%).

Клин. фарм.: Действует в течение 24 ч. Снижает периферическое сосудистое сопротивление (за счет расслабления гладких мышц сосудов), расширяет коронарные сосуды, замедляет АВ-проводимость, несколько урежает ЧСС, уменьшает потребность миокарда в кислороде, ослабляет действие ангиотензина II на почки и периферические сосуды. Гипотензивный эффект проявляется как в положении лежа, так и в положении стоя.

Показ.: Гипертоническая болезнь, стенокардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синдром слабости синусового узла и АВ-блокада II-III степени (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма); гипотония (систолическое давление менее 90 мм рт.ст.), острый инфаркт миокарда с застойными явлениями в легких, кардиогенный шок, синусовая брадикардия с ЧСС менее 55 ударов в минуту.

Бер. и корм. гр.: Беременным назначают только в случае, если очевидно преимущество приема над потенциальным риском вреда для плода. Прием препарата и кормление грудью несовместимы (экскретируется в грудное молоко).

Поб. действ.: АВ-блокада, ортостатическая гипотензия, брадикардия, бледность, гиперплазия десен, головная боль, головокружение, утомляемость; редко - тошнота, рвота, транзиторное повышение печеночных трансаминаз.

Взаим.: С бета-адреноблокаторами, антиаритмиками IA класса или дигиталисом - синергизм в удлинении АВ-проводимости, с анестетиками - снижение сократимости миокарда, внутрисердечной проводимости, расширение сосудов. Повышает содержание в крови дигоксина, карбамазепина (приводя в некоторых случаях к токсическому эффекту). Циметидин увеличивает концентрацию дилтиазема в плазме.

Передоз.: Лечение: промывают желудок, назначают рвотные средства и активированный уголь. При брадикардии, АВ-блокаде вводят атропин (от 0,6 до 1 мг), при сердечной недостаточности - допамин или добутамин, диуретики, при гипотонии - вазопрессорные средства (допамин или леватеринола битартрат).

Примен. и доз.: Внутрь, утром натощак, не разжевывая. Дозу подбирают индивидуально. Начальная доза - 180-240 мг 1 раз в день. При необходимости дозу увеличивают до 480 мг/сутки. Пациентам старше 60 лет в отдельных случаях достаточной является доза 120 мг 1 раз в день.

Предост.: С осторожностью используется у пациентов с АВ-блокадой I степени, нарушениями внутрижелудочковой проводимости, артериальной гипотонией, с нарушенной функцией почек или печени.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Дилтиазем гидрохлорид (Diltiazem hydrochloride)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дилтиазема гидрохлорида 60 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое.

Показ.: Стенокардия, артериальная гипертензия, наджелудочковые аритмии (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, декомпенсированная недостаточность сердца, синдром слабости синусового узла, нарушение АВ-проводимости, брадикардия, WPW-синдром, гипотония, тяжелые по-

ражения печени и почек, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, слабость; нарушения функции ЖКТ, гипотония, брадикардия, гиперемия лица, аллергические реакции.

Взаим.: Бета-блокаторы усиливают брадикардию и риск нарушений АВ-проводимости, гипотензивные препараты и диуретики - гипотензивный эффект. H₂-гистаминоблокаторы повышают концентрацию в сыворотке крови. Несовместим с хинидином и сердечными гликозидами.

Примен. и доз.: Внутрь, по 60 мг 2 раза в день (максимальная суточная доза - 360 мг). При пульсе ниже 50 ударов в минуту дозу увеличивать нельзя.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Дилтиазем Ланнахер (Diltiazem Lannacher)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард, покрытая оболочкой, содержит дилтиазема гидрохлорида 90 или 180 мг; в упаковке 20, 30 или 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антигипертензивное сосудорасширяющее, антиаритмическое.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов), артериальная гипертензия, профилактика приступов наджелудочковых аритмий (пароксизмальная тахикардия, мерцание или трепетание предсердий, экстрасистолия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синдром слабости синусового узла, АВ-блокада II-III степени, кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность IIБ-III стадии, выраженная брадикардия, артериальная гипотония, выраженные нарушения функции печени и почек, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Слабость, головокружение, головные боли, синусовая брадикардия, нарушения АВ-проводимости, симптомы сердечной недостаточности, ортостатическая гипотония, тошнота, запоры или диарея, метеоризм, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, покраснение кожи, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, по 180-360 мг в сутки (в 2 приема); для длительной поддерживающей терапии - 90-180 мг 1 раз в сутки, утром.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Дильрен (Dilren®)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 капсула пролонгированного действия содержит дилтиазема гидрохлорида 300 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Синусовая дисфункция и АВ-блокада II и III степени, левожелудочковая недостаточность с явлениями легочного застоя, беременность, лактация.

Поб. действ.: Синусовая брадикардия и АВ-блокада II и III степени (требует отмены препарата), диспептические расстройства, астения, вазомоторные кризы, отеки нижних конечностей, гепатит, сыпь.

Взаим.: Несовместим с дантроленом. Гипотонию и брадикардию усиливают (с высокой вероятностью) бета-блокаторы, амиодарон, сердечные гликозиды, антиаритмики, нитраты. Повышает концентрации теофиллина, карбамазепина, циклоспорина.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле в день (в одно и то же время), до или во время еды.

Предост.: С осторожностью следует комбинировать с альфа- и бета-адреноблокаторами, амиодароном и другими антиаритмиками, сердечными гликозидами, нитратами (необходимо врачебное наблюдение).

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Димебон (Dimebonum)

Димебон

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит димебона дигидрохлорида 10 или 2,5 мг; во флаконе 30 и 100 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антигистаминное (блокада H₁-гистаминовых рецепторов), антисеротониновое (блокада серотониновых рецепторов), м-холиноблокирующее, местноанестезирующее, противозудное, антиэксудативное, седативное.

Показ.: Аллергические заболевания: поллиноз, крапивница, пищевая, косметическая и лекарственная аллергия, отек Квинке, атопический дерматит при аллергии к домашней пыли; аллергические и воспалительные заболевания глаз; ожоговая токсемия; аллергические реакции: отек, зуд; нейродермит, экзема.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Назначается по строгим показаниям.

Поб. действ.: Онемение слизистой оболочки рта, угнетение ЦНС (у некоторых пациентов).

Взаим.: Снотворные средства, транквилизаторы, нейролептики, наркотические анальгетики усиливают депримирующий эффект.

Примен. и доз.: Внутрь (независимо от приема пищи). Взрослым по 10-20 мг, детям по 2,5 мг 2-3 раза в день. Курс лечения 5-12 дней.

Предост.: Не назначать (или освобождать от работы) пациентам, профессия которых требует быстрой двигательной и психической реакции.

Произв.: Органика (Россия)

Димедрол (Dimedrolum)

Дифенгидрамин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит дифенгидрамина 10 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 50 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка для детей - 20 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Антигистаминное, седативное, снотворное, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Аллергические заболевания, аллергодерматозы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бессонница, рвота беременных, синдром Меньера, морская болезнь, лучевая болезнь, паркинсонизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сонливость, сухость во рту, головокружение, тошнота, головная боль, слабость, "онемение" слизистых, снижение скорости реакции.

Примен. и доз.: В/м, по 1-5 мл 1% раствора. Внутрь, по 25-50 мг (детям по 10-30 мг) 1-3 раза в день. Курс 10-15 дней.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия)

Динабак (Dynabac)

Диритромицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диритромицина 250 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Фарингит, тонзиллит, инфекционные заболевания дыхательных путей (бронхит, пневмония), кожи и мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, слабость, головная боль, головокружение, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, 500 мг 1 раз в день.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Диоксидин (Dioxydinum)

Диоксидин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит диоксидина 5 или 10 мг, в ампулах по 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Гнойно-воспалительные процессы различной локализации (гнойный плеврит, эмпиема плевры, абсцесс легкого, перитонит, цистит, раны с наличием глубоких полостей, абсцесс мягких тканей, флегмоны, послеоперационные раны мочевых и желчевыводящих путей, сепсис).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, надпочечниковая недостаточность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, озноб, гиперемия, диспепсия, судорожные сокращения мышц.

Примен. и доз.: Местно, внутривполостно, в/в. На раны накладывают салфетки, смоченные раствором. Глубокие раны тампонируют или проводят орошение 0,5% раствором. В полости раствор вводят через дренажную трубку, катетер или шприц, обычно от 10 до 50 мл 1% раствора. При тяжелых септических состояниях производят в/в капельное введение 0,5% раствора для инъекций, предварительно разведя в 5% растворе глюкозы или в изотоническом растворе натрия хлорида до концентрации 0,1-0,2%. Высшая разовая доза - 300 мг, суточная - 600 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Диоксидина® мазь (Unguentum Dioxydini)

Диоксидин

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит диоксидина 50 мг; в банках по 60 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Гнойные раны, ожоги, трофические раны, гнойничковые заболевания кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженное место 1 раз в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Дипидолор (Dipidolor)

Пиритрамид*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит пиритрамида 15 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее (наркотическое).

Показ.: Интенсивный болевой синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, коматозное состояние, дыхательная недостаточность, черепно-мозговая гипертензия.

Поб. действ.: Угнетение дыхания, сонливость, тошнота, рвота, запор, спазм сфинктеров желчного и панкреатического протоков, мочевого пузыря, физическая и психическая зависимость, зуд, кожные высыпания.

Взаим.: Эффект усиливают нейролептики. Повышает депрессивное влияние на центр дыхания барбитуратов, бензодиазепинов, производных фенотиазина и снотворных. Ингибиторы МАО при совместном назначении вызывают чрезмерную стимуляцию ЦНС и резкое повышение АД.

Примен. и доз.: В/м, п/к в разовой дозе 7,5-15 мг, для детей - 0,05-0,2 мг/кг. В/в медленно при разведении физиологическим раствором - 15-20 мг (10 мг/мин), для детей - 0,05-0,1 мг/кг массы. Введение при необходимости повторяют каждые 6-8 ч.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Дипиридамола (Dipiridamol)

Дипиридамола*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит дипиридамола 75 мг; в упаковке 105 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, антиадгезивное, блокада фосфодиэстеразы, непрямая стимуляция аденозиновых рецепторов.

Показ.: Профилактика и терапия тромбоэмболических осложнений; хроническая коронарная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью при беременности (первый триместр).

Поб. действ.: Головная боль, тахикардия, диспептические расстройства.

Взаим.: Усиливает (взаимно) эффект ацетилсалициловой кислоты. Кофеин (или продукты, его содержащие) увели-

чивает вероятность развития побочных действий.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, за 1 ч до еды, запивая стаканом воды (можно молоком). Для профилактики и терапии тромбоэмболических осложнений назначают по 75 мг 5-6 раз в день, в комбинации с ацетилсалициловой кислотой - 3 раза в день. При хронической коронарной недостаточности - по 75-100 мг 3 раза в день.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Диприван (Diprivan)

Пропофол*

Сост. и ф.в.: 1 мл водной изотонической эмульсии белого цвета для в/в введения содержит пропофола 10 мг; в ампулах по 20 мл.

Фарм. действ.: Общеанестезирующее.

Показ.: Кратковременный вводный наркоз, поддержание наркоза, обеспечение седативной терапии при ИВЛ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст (до 3 лет).

Поб. действ.: Гипотензия, временное апноэ, в редких случаях: эпилептиформные движения (конвульсии, опистотонус), отек легких; головная боль, рвота и тошнота при пробуждении, анафилактические реакции (бронхоспазм, эритема), послеоперационная лихорадка, сексуальное растормаживание.

Примен. и доз.: Вводный наркоз: рекомендуется вводить 40 мг каждые 10 с до появления клинических признаков наркоза, средняя доза - 2-2,5 мг/кг; детям старше 8 лет - 2,5 мг/кг, для детей меньшего возраста дозировки могут быть выше. Поддержание наркоза (постоянная инфузия) - 4-12 мг/кг/ч (взрослые), 9-15 мг/кг/ч (дети). Седативная терапия при ИВЛ - 0,3-0,4 мг/кг/ч (взрослым).

Произв.: Zeneca (Великобритания)

Дипрогент (Diprogenta®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержат бетаметазона дипропионата 0,64 мг (эквивалентно 0,5 мл или 0,05% бетаметазона) и гентамицин сульфат (эквивалентно 1 мг или 0,1% основания гентамицина); в тубах по 15 и 30 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, сосудосуживающее, антибактериальное широкого спектра.

Показ.: Псориаз, контактный и атопический дерматит (детская экзема, аллергический дерматит), нейродермит, крас-

ный плоский лишай, экзема (монетовидная, рук, экзематозный дерматит), интертригинозный дерматит, дисгидроз, себорейный дерматит, эксфолиативный и солнечный дерматиты, зуд заднего прохода и наружных половых органов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано применение больших доз и в течение длительного времени.

Поб. действ.: Жжение, зуд, раздражение и сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, системные побочные эффекты, в т.ч. угнетение коры надпочечников. При использовании окклюзионных повязок: мацерация и атрофия кожи, вторичное инфицирование, потница, стрии. У детей - угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Кушинга, линейная задержка роста, отставание в прибавке массы тела, повышение внутричерепного давления.

Примен. и доз.: Наносят на пораженные участки кожи тонким слоем (не втирая) утром и вечером или 1-2 раза в сутки.

Предост.: Системная абсорбция увеличивается, если лечению подвергаются значительные участки кожи или используются окклюзионные повязки.

Произв.: Schering-Plough (США)

Дипросалик (Diprosalic®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит бетаметазона дипропионата 0,64 мг (эквивалентно 0,5 мг или 0,05% бетаметазона) и салициловой кислоты 30 мг (3%), в тубах по 15 и 30 г; 1 мл лосьона - бетаметазона дипропионата 0,64 мг (эквивалентно 0,5 мг или 0,05% бетаметазона) и салициловой кислоты 20 мг (2%) в водно-спиртовом растворе, рН примерно равен 5,0; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, сосудосуживающее, кератолитическое.

Фармакодин.: Салициловая кислота за счет кератолитического действия очищает участки поражения от чешуек, способствует проникновению бетаметазона в кожу. Она поддерживает кислую среду кожи, предупреждая развитие микробной и грибковой инфекции.

Показ.: Мазь: псориаз, хронический атопический дерматит, нейродермит, красный плоский лишай, экзема (монетовидная, экзема рук, экзематозный дерматит), дисгидроз, себорейный дерма-

тит, ихтиоз и ихтиозные поражения. Лосьон: псориаз и себорейный дерматит волосистой части головы, псориаз и другие заболевания кожи безволосых участков.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

Поб. действ.: Жжение, зуд, раздражение и сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, системные эффекты глюкокортикоидов, в т.ч. угнетение коры надпочечников. При применении окклюзионных повязок: мацерация и атрофия кожи, вторичное инфицирование, стрии, потница. У детей: угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Кушинга, задержка роста, отставание в весе, повышение внутричерепного давления.

Примен. и доз.: Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки 2 раза в сутки (утром и вечером). Лосьон - несколько капель наносят на пораженные участки кожи волосистой части головы утром и вечером, втирая легкими движениями до полного впитывания.

Предост.: Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Не следует применять лосьон для окклюзионных повязок. При возникновении сухости или усиления раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата.

Произв.: Schering-Plough (США)

Дипроспан (Diprospan®)

Бетаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит бетаметазона в форме натрия фосфата 2 мг и бетаметазона в форме дипропионата 5 мг; в ампулах по 1 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Артриты (ревматоидный, псориатический), посттравматический остеоартрит, внесуставной ревматизм (синовит, эпикондилит, тендосиновит, миозит, фиброзит), люмбаго, бронхиальная астма, сезонные или хронические риниты, псориаз, келлоид, гнездная алопеция, контактный и атопический дерматиты, неспецифический язвенный колит, злокачественные новообразования.

Противопоказ.: Туберкулез, остеопороз, психозы, пептические язвы, свежие кишечные анастомозы и дивертикулы, глаукома, диабет, тромбофлебит, почеч-

ная недостаточность, синдром Кушинга, бактериальные, грибковые и вирусные инфекции.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Нарушение пищеварения, полифагия, увеличение массы тела, невротозы, отеки, остеопороз, задержка роста у детей, ухудшение состояния у диабетиков, утяжеление инфекций, кортикоадrenalиновая супрессия.

Примен. и доз.: Общее применение: в/м - по 1-2 мл каждые 2-4 нед. Внутривенно и перивенно - от 0,25 до 2 мл, в зависимости от размера сустава. В/к (в очаг поражения), разовая доза - до 0,2 мл/кв.см (не более 1 мл в неделю). Местная инфильтрация: при бурсите - от 0,25 до 1 мл (при острой форме до 2 мл), при синовиальной кисте и тендосиновите - от 0,25 до 0,5 мл, при тендините - 0,5 мл, при миозите, фиброзите - от 0,5 до 1 мл. В случае необходимости дипроспан можно смешивать в шприце для инъекций с местным обезболивающим препаратом (1% прокаин или 1% лидокаин).

Предост.: В период лечения противопоказана вакцинация и иммунизация. Нельзя вводить в/в.

Произв.: Schering-Plough (США)

Дискус композитум (Discus compositum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл (2,2 г) раствора для инъекций содержит Discus intervertebralis suis D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Funiculus umbilicalis suis D10, Cartilago suis D8, Medulla ossis suis D10, Embryo suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Pulsatilla pratensis D6, Mercurius praecipitatus ruber D10, Sulfur D28, Cimicifuga racemosa D4, Ledum palustre D4, Gnaphalium polycephalum D3, Citrullus colocynthis D4, Secalecornutum D6, Argentum metallicum D10, Zincum metallicum D10, Cuprum aceticum D6, Aesculus hippocastanu D6, Medorrhinum D18, Ranunculus bulbosus D4, Ammonium chloratum D8, China D4, Kalium carbonicum D6, Sepia officinalis D10, Acidum picricum D6, Berberis vulgaris D4, Acidum silicicum D6, Calcium phosphoricum D10, Acidum alpha-liponicum D8, Natrium oxalaceticum D6, Nadidum (Nicotinamidadenin-dinucleotid) D6 и Coenzym A D10 по 22,0 мкл; в упаковке 5 или 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, метаболическое, дезинтоксикационное, обезболивающее, биостимулирующее, регенерационное, спазмолитическое, седативное, психотропное.

Показ.: Остеохондроз позвоночника, подагра, экзостоз, остеомаляция, деформирующий артроз крупных суставов (коксартроз, гонартроз), хронический остеомиелит (в комплексной терапии); миалгии ревматоидного и вертеброгенного генеза; болезни нервной системы с парезами, парестезиями и судорожным синдромом, невриты и невралгии, цефалгия, невротические и психические расстройства, сопровождающиеся нарушением сна.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Повышение слюноотечения (рекомендуется отмена препарата).

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/к по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Произв.: Heel (Германия)

Дисфлатил (Disflatyl®)

Симетикон

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приема внутрь содержит симетикона 40 мг; во флаконах с капельницей по 30 мл.

Фарм. действ.: Пеногасящее (снижение поверхностного натяжения пузырьков газа).

Фармакокин.: Из ЖКТ не всасывается и действует исключительно в просвете кишечника.

Фармакодин.: Является поверхностно-активным веществом, устраняет пузырьки газа, изменяя их поверхностное натяжение; образующийся при этом свободный газ удаляется естественным путем.

Показ.: Избыточное образование и накопление газа в ЖКТ различного генеза: метеоризм (в т.ч. в послеоперационном периоде), аэрофагия, вздутие живота, гастрокардиальный синдром, подготовка больных перед диагностическими исследованиями желудка и кишечника: эндоскопия, радиологические, сонография.

Противопоказ.: Непроходимость кишечника, обструктивные заболевания ЖКТ.

Бер. и корм. гр.: Допустимо.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Не установлено.

Передоз.: Сведений о передозировке нет.

Примен. и доз.: Внутрь, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном. Взрослым - по 25-50 капель, детям 6-15

лет - по 15-20 капель, новорожденным и детям до 6 лет - по 10-15 капель 2-3 раза в день во время еды и после еды. Для подготовки к исследованиям - по 50 капель 3-4 раза в день за 2 дня до исследования, натощак утром в день исследования и непосредственно перед исследованием.

Предост.: Перед употреблением флакон с каплями необходимо хорошо встряхнуть.

Произв.: Solco Basel (Швейцария)

Дитамин® (Ditamin®)

Дигидроэрготамин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит дигидроэрготамин мезилата 1 мг; в упаковке 50 шт.

1 мл раствора для приема внутрь (20 капель) - 2 мг; во флаконах по 30 мл.

1 таблетка ретард - 2,5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Веноконстрикторное, альфа-адреноблокирующее, блокада допаминергических рецепторов симпатических ганглиев.

Показ.: Мигрень, головная боль вазомоторного происхождения, ортостатическая гипотония.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, недостаточность коронарного кровообращения, стенокардия, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, перемежающаяся хромота, сепсис, шок, печеночно-почечная недостаточность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, мышечная слабость, покалывание в мышцах конечностей, миалгия, стенокардия, брадикардия или тахикардия, отеки, зуд, головокружение; редко - ишемия пальцев кисти и стопы (гангрена), спутанность сознания, судороги, гемиплегия.

Примен. и доз.: Внутрь и парентерально. Мигрень - для купирования приступа (как можно раньше) в/м или п/к - по 1-3 ампулы или в/в 1 мл, общая недельная доза - не более 6 мл; для профилактики - 25 капель или 1 таблетка 2-3 раза в день (максимальная доза - до 10 мг/сутки) в течение нескольких недель. Ортостатическая гипотония - 25 капель (1 таблетка) утром и 50 капель или 2 таблетки вечером в течение 2 нед.

Произв.: Lek (Словения)

Дифен (Difen)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимым покрытием содержит диклофе-

нака натрия 50 мг, в блистерной упаковке 10 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Воспалительные и дегенеративные формы ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, остеоартрита, спондилоартрита, болезненные поражения позвоночника, внесуставной ревматизм, острые приступы подагры, послеоперационные и посттравматические болевые состояния, боль после стоматологических вмешательств, болезненные воспалительные гинекологические заболевания.

Противопоказ.: Пептическая язва, гиперчувствительность, "аспириновая" бронхиальная астма, полиноз, возраст (до 1,5 лет).

Поб. действ.: Боли в животе, тошнота, метеоризм, запор, диарея; задержка жидкости в организме, артериальная гипертензия, тахикардия; тромбоцитопения, анемия.

Примен. и доз.: Таблетки: для взрослых начальная доза - 150 мг/сутки (в два или три приема) во время еды. Поддерживающая доза составляет 100 мг/сутки (в несколько приемов). Раствор для инъекций: для экстренного купирования боли - в/м 75 мг, при отсутствии эффекта - повторно через 30 мин. Повторно можно также вводить с интервалами в 12 ч, при этом суммарная суточная доза не должна превышать 150 мг. Переход после первой или второй в/м инъекции на пероральный прием обеспечивает адекватный контроль боли. Обычная доза у детей - 2-3 мг/кг массы тела, детям с массой тела 15-30 кг - 25 мг 2 раза в сутки, с массой более 45 кг - 25 мг 3 раза в сутки или 50 мг 2 раза в сутки.

Произв.: Sol Pharmaceuticals (Индия)

Дифенин (Dipheninum)

Фенитоин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фенитоина 0,117 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, антиаритмическое.

Показ.: Эпилепсия (большие судорожные припадки), сердечные аритмии, синдром Меньера.

Противопоказ.: Печеночно-почечная недостаточность, сердечная недостаточность, кахексия.

Поб. действ.: Возбуждение, головокружение, тремор, атаксия, лихорадка, за-

труднение дыхания, тошнота, рвота, зуд, лимфаденопатия, гиперплазия десен.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, по 1/2-1 таблетке 2-3 раза в день (до 3-4 таблеток в сутки). Детям до 5 лет - 1/4 таблетки 2 раза; 5-8 лет - 1/4 таблетки 3-4 раза, старше 8 лет - 1/2-1 таблетка 2 раза. При аритмиях - 1 таблетка 3 раза в сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Акрихин (Россия)

Дифлюкан (Diflucan®)

Флуконазол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флуконазола 50 мг, в упаковке 7 шт.; 100 или 200 мг, в упаковке 7 и 28 шт.; 150 мг, в упаковке 1 шт.

1 мл раствора для в/в инфузий - 2 мг; во флаконах по 50, 100 и 200 мл.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Криптококкоз, кандидемия, кандидоз (генерализованный, диссеминированный, орофарингеальный, вагинальный, слизистых оболочек, кожи), профилактика рецидивов орофарингеального кандидоза у больных СПИДом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, понос, сыпь, головная боль; изменения показателей функции печени и почек, судороги, лейкопения, тромбоцитопения, алоpecia, эксфолиативные кожные (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролизис) и анафилактические реакции.

Взаим.: Необходимо учитывать возможность изменения эффектов при сочетании с антикоагулянтами, препаратами сульфонилмочевины, гидрохлортиазидом, фенитоином, рифампицином, циклоспорином, теофиллином, терфенадином, зидовудином.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в. Взрослым - при криптококковых инфекциях, кандидемии, диссеминированном кандидозе - 400 мг в первые сутки, затем по 200-400 мг в сутки. При орофарингеальном кандидозе - по 50-100 мг один раз в сутки, для профилактики рецидивов у больных СПИДом - по 150 мг один раз в неделю. При вагинальном кандидозе - однократно внутрь в дозе 150 мг. Для профилактики кандидоза - 50-400 мг один раз в сутки. При инфекциях кожи - 150 мг один раз в неделю или 50 мг один раз в сутки. Детям - кандидоз слизистых обо-

лочек - 3 мг/кг/сутки, генерализованный кандидоз и криптококкоз - 6-12 мг/кг/сутки, профилактика - 3-12 мг/кг/сутки; первые 2 нед жизни - та же доза (в мг/кг), что и у детей более старшего возраста, но с интервалом 72 ч; 2-4 нед - та же доза с интервалом 48 ч.

Произв.: Pfizer (США)

Диффумал® 24 (Diffumal® 24)

Теофиллин

Сост. и ф.в.: 1 делимая таблетка содержит теофиллина 100, 200 или 350 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Бронхорасширяющее, диуретическое, положительное хроно- и инотропное, понижение давления в большом и малом кругах кровообращения.

Фармакокин.: Быстро всасывается, объем распределения 0,5 л/кг. 8% выводится в неизменном виде с мочой, остальная часть метаболизируется до 1-3 диметилмочевой кислоты и метилксантина (выводятся через почки). Терапевтическое действие проявляется при концентрации в крови 10-20 мкг/мл.

Показ.: Бронхиальная астма, бронхообструктивный синдром при хронических заболеваниях легких.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый период инфаркта миокарда, гипотензия.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности - по жизненным показаниям, при лактации противопоказан.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, бессонница, тахикардия, экстрасистолия, альбуминурия, гипергликемия.

Взаим.: Несовместим с другими производными ксантина. Фуросемид потенцирует диуретический эффект. Одновременное назначение с резерпином может провоцировать тахикардию; эритромицин, линкомицин, клиндамицин и циметидин повышают концентрацию в крови, никотин (курение) - снижает.

Передоз.: Необходимо определить количество принятого препарата и интервал времени, прошедший с момента приема, вызвать рвоту, промыть желудок, дать активированный уголь. Следует контролировать деятельность сердца, уровень АД, дыхание, электролитный баланс. При появлении судорог назначают бензодиазепины.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 раз в сутки, утром. Детям с массой тела от 15 до 20 кг - 200-300 мг (не более); от 20 до 25 кг

- 300-400 мг (не более); более 25 кг - 2 таблетки по 200 мг (не более 500 мг/сутки). Взрослым - 2 таблетки по 350 мг (но не более 2,5 таблетки).

Предост.: С осторожностью назначают детям, людям пожилого возраста, гипертоникам, пациентам с гипертиреозом, заболеваниями сердца, печени и почек, при гипоксии, больным с легочным сердцем, застойной недостаточностью кровообращения, пептической язвой. При комбинировании с эфедрином или другими бронходилатирующими симпатомиметиками необходимо тщательное наблюдение. Хронически курящим пациентам требуется, как правило, большая доза теофиллина (уменьшенный Т 1/2).

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Дицинон (Dicynone®)

Этамзилат*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит этамзилата 250 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка - 250 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Гемостатическое, ангиопротекторное, снижение проницаемости капилляров, увеличение количества тромбоцитов.

Показ.: Капиллярные кровотечения, геморрагические диатезы (болезнь Верльгофа, Виллебранда - Юргенса, тромбоцитопатии); заболевания сосудов с геморрагическим синдромом, метро-меноррагии (функциональные, при фибромиоме), диабетические микроангиопатии (геморрагическая ретинопатия, повторные кровоизлияния в сетчатку, гемофтальм), внутренние травматические кровотечения.

Поб. действ.: Изжога (редко), чувство тяжести в подложечной области, головная боль, гиперемия лица, артериальная гипотония, парестезии нижних конечностей.

Примен. и доз.: Профилактика кровотечений при хирургических вмешательствах - 1-2 ампулы в/в или в/м за 1 ч до операции или 2-3 таблетки за 3 ч, 1-2 ампулы в/в во время операции, 2-4 ампулы или 2-8 таблеток в ближайшие сутки после операции. Для купирования кровотечения - в/в или в/м 1-2 ампулы, затем - каждые 4-6 ч по ампуле или по 2 таблетки. Диабетические микроангиопатии - по 1-2 таблетки 3 раза в день или по 1 ампуле в/м 2 раза в день в течение 2-3 мес.

Прозв.: Lek (Словения)

Длянос® (Dlianos®)

Ксилометазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для интраназального применения в виде спрея содержит ксилометазолина гидрохлорида 1 мг; во флаконах по 10 мл.

1 мл каплей для носа для детей - 500 мкг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее, уменьшение отека слизистой носа (альфа-адреномиметическое).

Показ.: Насморк, аллергические риниты (в т.ч. сенная лихорадка), синуситы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, трансфеноидальная гипопизэктомия, хирургические вмешательства с обнажением твердой мозговой оболочки.

Поб. действ.: Жжение в носу или горле, местное раздражение или сухость слизистой носа. Очень редко: тошнота, головная боль, системные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Спрей (0,1%): взрослым и детям старше 6 лет - 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю не более 3-4 раз в сутки. Капли (0,05%): детям от 1 года до 6 лет - 1-2 капли в каждую ноздрю 2 (максимум 3) раза в сутки.

Предост.: Применяют с осторожностью у больных с выраженной реакцией на адренергические средства, гипертензией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы.

Прозв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Добутрекс (Dobutrex)

Добутамин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инфузий содержит добутамина 250 мг (в форме гидрохлорида).

Фарм. действ.: Кардиотоническое.

Фармакодин.: Оказывает прямое инотропное действие; стимулирует адренорецепторы миокарда, увеличивает объем систолического выброса и минутный объем, снижает давление заполнения желудочков и общее системное и легочное сопротивление сосудов.

Показ.: Острая сердечная недостаточность кардиогенного (острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок, последствия операций на сердце, применение препаратов, понижающих сократительную способность миокарда) и некардиогенного (острая сосудистая недостаточность при травмах, операциях, сепсисе, гиповолемии, когда среднее АД выше 70 мм рт. ст., низкий минутный объем серд-

ца при искусственной вентиляции легких) генеза, хроническая застойная сердечная недостаточность, диагностика ишемической болезни сердца (в качестве заменителя физических упражнений).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности и кормлении грудью назначают только по жизненным показаниям (если благоприятное действие для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка).

Поб. действ.: Увеличение частоты сердечных сокращений, повышение АД, желудочковая экстрасистолия, гипотензия, тошнота, головная боль, неспецифическая боль в груди, одышка, гипокалиемия, флебит.

Взаим.: Сочетание с альфа-адреноблокаторами усиливает бета-адреномиметические свойства (тахикардия, расширение сосудов).

Примен. и доз.: В/в капельно со скоростью 2,5-20 мкг/кг/мин (в редких случаях скорость инфузии увеличивают до 40 мкг/кг/мин). Скорость и продолжительность введения устанавливают индивидуально с учетом реакции больного и динамики гемодинамических показателей (частота сердечных сокращений, АД, ритм сердца), а также диуреза, температуры тела и психического статуса.

Предост.: В начале терапии необходимо ЭКГ-наблюдение.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Доксал (Doxal®)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит доксициклина гиклата 100 мг; в упаковке 10 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактериостатическое.

Клин. фарм.: Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, спирохет, лептоспир, риккетсий, микоплазм, возбудителей трахомы, орнитоза, пситтакоза и некоторых простейших. Образует нерастворимые комплексы с кальцием, которые отлагаются в костном скелете, эмали и дентине зубов.

Показ.: Бронхит, пневмония, плеврит, инфекции мочевых путей, гонорея, амёбиаз, лептоспироз, риккетсиоз, орнитоз, пситтакоз, трахома, сифилис, микоплазменная пневмония, угревая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 8 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется во второй половине беременности, т.к. может вызвать изменение окраски зубов, гипоплазию эмали, угнетение роста скелета плода. Во время лактации следует сопоставить соотношение возможного риска и терапевтической пользы.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Взаим.: Всасывание уменьшают антациды (содержащие соли алюминия, кальция и магния), препараты железа, холестирамин, холестипол. Барбитураты, карбамазепин, фенитоин снижают концентрацию в сыворотке. Падает эффективность пенициллина, пероральных контрацептивов (с повышением вероятности кровотечений в цикле).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды. Взрослым, детям весом более 50 кг, пожилым пациентам в первый день - две капсулы, в последующие дни - 1 капсула. В тяжелых случаях суточная доза - 2 капсулы. Детям весом 50 кг и меньше - из расчета 4 мг/кг в сутки в первый день (в один прием или в 2 равных приема с 12 часовым интервалом), в последующие дни - 2 мг/кг. При тяжелом течении - суточная доза 4 мг/кг. При гонококковых уретритах у мужчин назначают 300 мг в один прием или 100 мг 2 раза в день в течение 2-4 дней, у женщин - 100 мг 2 раза в день. При угревой болезни - 50 мг в день на протяжении 6-12 нед. При первичном или вторичном сифилисе - 300 мг в день в несколько приемов в течение 10 дней.

Предост.: При длительном применении необходимо контролировать функции кроветворения, печени и почек. При венерических заболеваниях следует проводить серологическое исследование крови ежемесячно в течение 4 мес. Заболевания, вызванные β -гемолитическим стрептококком группы А, требуют как минимум 10-дневного лечения. При признаках кожной эритемы, в случаях прямого солнечного облучения прием препарата прекращается.

Произв.: CTS (Израиль)

Доксилан (Doxylan®)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит доксициклина гиклата 115,4 мг, что соответствует 100 мг доксициклина основания; в упаковке 5 и 10 шт., или доксициклина моногидрата 208,2 мг, что соответствует 200 мг доксициклина основания; в упаковке 5 и 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции органов дыхания (пневмония, бронхит, эмпиема плевры), ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, отит), ЖКТ (в т.ч. желчных путей); урогенитальные инфекции (пиелонефрит, простатит, эндометрит, гонорея, сифилис, хламидиоз); гнойные инфекции кожи и мягких тканей, остеомиелит, сыпной тиф, бруцеллез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим тетрациклинам), детский возраст (до 8 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано во второй половине беременности.

Поб. действ.: Анорексия, изжога, тошнота, рвота, дисфагия, глоссит, понос, энтероколит, перикардит, ухудшение течения красной волчанки, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нейтропения, эозинофилия, транзиторное повышение содержания в крови печеночных трансаминаз, щелочной фосфатазы, билирубина, остаточного азота, кандидоз (проявляющийся диареей, глосситом, стоматитом, проктитом, вульвовагинитом), фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит, кожная сыпь, крапивница, анафилактические реакции, ангионевротический отек.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям с массой больше 50 кг - в первый день 200 мг в 1-2 приема, затем - 100-200 мг в день. Детям старше 8 лет с массой менее 50 кг - в первый день суточная доза из расчета 4 мг/кг в один прием, затем - 2-4 мг/кг в сутки. Инфекции, вызванные бета-гемолитическим стрептококком группы А, лечат не менее 10 дней. Гонорея: мужчинам - по 200-300 мг в сутки в течение 2-4 дней, или в течение одного дня 2 раза по 300 мг с интервалом 1 ч; женщинам - по 200 мг в сутки 5 дней. Сифилис первичный и вторичный: по 300 мг в сутки в течение не менее 10 дней.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Доксилек® (Doxilek®)

Кальций добезилат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит добезилата кальция 500 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоотечное, ангиопротекторное, антиагрегационное, снижение проницаемости и ломкости капилляров.

Показ.: Диабетическая ретино- и ангиопатия, венозная недостаточность, преварикозный и варикозный синдром.

Противопоказ.: Первый триместр беременности.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1-2 капсулы в сутки. Курс - от 1 нед до нескольких месяцев.

Произв.: Lek (Словения)

Доксиум (Doxium®)

Кальций добезилат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит кальция добезилата 500 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, ангиопротекторное, нормализация сосудистой проницаемости, улучшение микроциркуляции.

Показ.: Сосудистые поражения с повышенной хрупкостью и проницаемостью капилляров (диабетическая ретинопатия, микроангиопатия) и другие нарушения, связанные с различными сердечно-сосудистыми и обменными заболеваниями, венозная недостаточность и ее последствия.

Противопоказ.: Геморрагии, вызванные антикоагулянтами, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные нарушения, головная боль, головокружение, лихорадочные реакции, аллергический дерматоз.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 500 мг 3 раза в день в течение 2-3 нед, затем дозу снижают до 500 мг в день. При ретинопатии и микроангиопатии назначают по 500 мг 3 раза в день. Препарат можно назначать профилактически.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Доксициклин (Doxycycline)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит доксициклина 50 или 100 мг; в упаковке 8 (100 мг) и 28 шт. (50 мг).

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактериостатическое (нарушение внутриклеточного синтеза белка).

Фармакодин.: Спектр действия включает грамположительные (стафилококки, в т.ч. продуцирующие пенициллиназу, стрептококки, клостридии, листерии, палочка сибирской язвы) и грамотрицательные (гонококки, коклюшная палочка, кишечная палочка, гемофильная палочка, энтеробактер, клебсиеллы, сальмонеллы, шигеллы) микроорганизмы, риккетсии, микоплазмы, спирохеты.

Показ.: Инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит), кожи и мягких тканей (фурункулёз, импетиго, воспаление клетчатки, абсцессы, инфицированные раны), дыхательных путей и ЛОР-органов (пневмония, бронхопневмония, бронхит, тонзиллит, фарингит, средний отит, синусит), ЖКТ, гонорея, первичный и вторичный сифилис.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боли в животе, диарея, запор, отек Квинке, фотосенсибилизация, кожные аллергические реакции (сыпь, зуд).

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и пожилым пациентам - 200 мг в первый день лечения (1 раз в сутки или по 100 мг через 12 ч), затем - по 100 мг 1 раз в сутки. В более тяжелых случаях суточную дозу 200 мг назначают на весь период лечения. При первичном и вторичном сифилисе - 300 мг в сутки (в несколько приемов) в течение не менее 10 дней. При гонорейной инфекции женщинам - по 100 мг 2 раза в сутки, мужчинам при уретрите - 100 мг 2 раза в сутки в течение 2-4 дней, либо в виде однократной дозы 300 мг. При сыпном тифе назначают однократно 100 или 200 мг. Детям старше 12 лет с массой тела более 50 кг - дозы, рекомендованные для взрослых. Для детей с массой тела менее 50 кг - суточная доза в первый день лечения - 4 мг/кг (в 1-2 приема); в последующие дни - 2 мг/кг в сутки, однако при тяжелом течении инфекции лечение продолжают в дозе 4 мг/кг в сутки.

Предост.: С целью предупреждения развития гломерулонефрита и ревматизма при стрептококковых инфекциях лечение следует продолжать в течение 10 дней. Применение препарата в период формирования зубов может привести к необратимому изменению их цвета.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Доксициклин (Doksiciklin)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит доксициклина (в форме гиклата) 100 мг; в упаковке 6 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Инфекции мочеполовой системы (в том числе вызванные гонококками и хламидиями), желчевыводящих и дыхательных путей, легких, бронхит, пнев-

мония, острый средний отит, фарингит, синусит, бруцеллез, пситтакоз, риккетсиоз, трахома, сифилис, венерическая лимфогранулема, ингинальная гранулема, мелиоидоз, спру, амебиаз, актиномикоз, ангулярный стоматит, угри (простые и розовые).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, возраст (до 8 лет).

Бер. и корм. гр.: Во время беременности - только по строгим показаниям; в период кормления грудью - не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, эзофагит, эзофагеальные язвы, суперинфекции (в том числе псевдомембранозный колит), гемолитическая анемия, тромбоцитопения, эозинофилия, нейтропения, аллергические реакции.

Взаим.: Алюминийсодержащие антациды, салицилаты, препараты кальция, магния (включая магнийсодержащие слабительные средства), холестирамин, колестипол снижают всасывание. Барбитураты, карбамазепин, фенитоин ускоряют метаболизм в печени (уменьшают концентрацию в сыворотке). Ослабляет действие пенициллина. Повышает вероятность кровотечений в цикле при приеме пероральных контрацептивов.

Примен. и доз.: Внутрь, в первый день - 200 мг, затем - 100 мг в сутки; при тяжелых инфекциях - 200 мг в сутки в 1 или 2 приема в течение 5 дней; при гонорейном уретрите - 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней или сразу 300 мг и через 1 ч еще 300 мг.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Доксициклина гидрохлорид (Doxycyclini hydrochloridum)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит доксициклина гидрохлорида 0,05 или 0,1 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактериостатическое.

Показ.: Бронхит, пневмония (в т.ч. микоплазменная), плеврит, ангина, отит, инфекции моче- и желчевыводящих путей, инфекции кожи и мягких тканей, ЖКТ, иерсиниоз, легинеллез, хламидиоз, бруцеллез, холера, туляремия, риккетсиоз, лептоспироз, гонорея, сепсис, подострый септический эндокардит, инфицированные ожоги и раны, остеомиелит, гинекологические и послеоперационные осложнения вирусной инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (до 8 лет).

Поб. действ.: Диспепсия, раздражение слизистых ЖКТ, суперинфекции (кандидоз), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая большим количеством воды; суточная доза в 1-й день - 0,2 г, затем - 0,1 г, при тяжелой инфекции - 0,2 г в 1-й и последующие дни. Детям старше 8 лет - 4 мг/кг в первый день лечения и 2 мг/кг - в последующие дни, старше 12 лет - взрослые дозы. Длительность лечения - 7-10 дней.

Произв.: Акрихин (Россия)

Доксолем (Doxolem)

Доксорубицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит доксорубицина гидрохлорида 10 или 50 мг, в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Острые лимфобластный и миелобластный лейкозы, опухоль Вильямса, нейробластома, саркома мягких тканей, остеогенная саркома, рак молочной железы, яичников, щитовидной железы, переходноклеточный рак мочевого пузыря, лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, бронхогенный рак, рак желудка.

Противопоказ.: Миелосупрессия (лейкопения, тромбоцитопения), патология сердечно-сосудистой системы, беременность.

Поб. действ.: Снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, воспаление слизистой, изъязвления и некроз толстой кишки, поверхностные эритемы; целлюлит, конъюнктивит, слезотечение, алоpecia, гиперпигментация ногтевых лож и кожных складок, онихолизис, лихорадка, озноб, крапивница, анафилаксия и др. аллергические реакции, флебосклероз, везикуляция и некроз тканей (в месте введения при экстравазации).

Передоз.: При острой передозировке (токсическое поражение слизистых, лейкопения, тромбоцитопения) необходимы срочная госпитализация, антибиотикотерапия, переливание тромбоцитарной и гранулоцитарной массы, лечение мукозита. При хронической (развитие застойной сердечной недостаточности) - диуретики, сердечные гликозиды, периферические вазодилататоры.

Примен. и доз.: В/в, в/а, интравезикулярно (концентрация 2 мг/мл). Дози-

ровка: 60-75 мг/кв.м 1 раз с интервалом 21 день или 20 мг/кв.м в неделю; другая схема введения - по 30 мг/кв.м ежедневно в течение 3 дней с 4-недельным перерывом. При концентрации билирубина в сыворотке крови 1,2-3 мг/100 мл назначают 1/2 обычной дозы, 3 мг/100 мл - 1/4.

Предост.: Следует контролировать клеточный состав крови, функцию почек, печени, сердца.

Произв.: CSC (Италия)

Доксорубицин-Эбеве (Doxorubicin-Ebewe)

Доксорубицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 5 или 25 мл концентрата для приготовления инфузии содержит доксорубицина гидрохлорида 10 и 50 мг соответственно в изотоническом растворе хлорида натрия.

Фарм. действ.: Противоопухолевое (ингибция синтеза ДНК).

Показ.: Рак молочной и щитовидной железы, саркомы мягких тканей, остеогенная саркома, лимфосаркома, острые лейкозы, лимфогранулематоз, рак шейки матки и эндометрия, рак яичка, рак предстательной железы, рак головы и шеи, рак легкого, мочевого пузыря, миеломная болезнь, болезнь Ходжкина и неходжкинская лимфома, нейробластома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени и почек, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, миокардит, инфаркт миокарда, аритмии, цистит (при интравезикальном применении).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Стоматит, тошнота, рвота, алоpecia, сердечная недостаточность, боли в сердце, окрашивание мочи в красный цвет, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, по 75 мг/кв.м каждую 3-ю неделю, не рекомендуется превышать общую дозу 500-550 мг/кв.м.

Предост.: Необходимо контролировать клеточный состав крови, деятельность сердца и печени.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Дона (Dona)

Глюкозамин*

Сост. и ф.в.: Порошок, содержащий глюкозамин сульфат в качестве активного ингредиента, в одноразовых пакетиках по 1500 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита глюкозамина, стимуляция биосинтеза протеогликанов.

Показ.: Первичный и вторичный остеоартриты, остеохондроз, спондилоз, хондромалиция надколенника, лопаточно-плечевой периартрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, фенилкетонурия.

Поб. действ.: Дискомфорт и боли в желудке, метеоризм, диарея, обстипация.

Взаим.: Увеличивает всасывание тетрациклинов, уменьшает - пенициллинов и хлорамфеникола.

Примен. и доз.: Внутрь. Содержимое 1 пакетика растворить в воде, принимать 1 раз в день 6 нед.

Произв.: CSC (Италия)

Доналгин (Donalgin)

Нифлумовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит нифлумовой кислоты 250 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, подагрический артрит; бурсит, тендинит, эпикондилит; травмы опорно-двигательного аппарата; болевые синдромы после хирургических вмешательств; аднексит, параметрит, синусит, фарингит, ларингит, средний отит; тромбоз флебит поверхностных вен.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания почек и печени, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Диспепсия, тошнота, рвота, понос, гастралгия.

Взаим.: Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов, глюкокортикостероидов.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, по 250 мг 3-4 раза в день во время или после еды. Поддерживающая доза - 250-500 мг/сутки. При остром подагрическом артрите начальная доза - 500 мг, затем 2 раза по 250 мг с интервалом в 2 ч.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Донормил (Donormyl®)

Доксиламин*

Сост. и ф.в.: 1 делимая таблетка содержит доксиламина сукцината 15 мг; в

упаковке 30 шт.

1 делимая "шипучая" таблетка - 15 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, седативное, м-холиноблокирующее, блокада H₁-рецепторов гистамина.

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется из кишечника, подвергается биотрансформации в печени, основное количество (около 60%) выводится в неизмененном виде с мочой, частично - ЖКТ.

Фармакодин.: Сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна, не изменяя его фаз.

Показ.: Расстройства сна, бессонница.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома; уретропростатические нарушения, лактация, возраст (до 15 лет).

Поб. действ.: Сухость во рту, запоры, задержка мочи.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1/2-2 таблетки за 15-30 мин до сна, запивая небольшим количеством воды. "Шипучие" таблетки предварительно растворить в 1/2 стакана воды.

Произв.: UPSA (Франция)

Допегит (Dopegyt®)

Метилдопа*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метилдопы 250 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, стимуляция центральных альфа₂-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гепатит, печеночно-почечная недостаточность, феохромоцитома, депрессия.

Поб. действ.: Артралгия, миалгия, лихорадочный синдром, сухость во рту, глоссалгия, рвота, тошнота, запоры, нарушения функции печени, панкреатит, воспаление слюнных желез, слабость, сонливость, головокружение, головная боль, брадикардия, отеки, ортостатическая гипотензия, паркинсонизм, импотенция, снижение либидо, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с леводопой и ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Внутрь, начальная доза - 250 мг/сутки (вечером), через каждые 2 дня - увеличение на 250 мг. Максимальная суточная доза - 2 г. При достижении необходимого эффекта каждые 2 дня снижение дозы на 250 мг, до поддерживающей. Для детей - начальная доза 10 мг/кг в день в 2-3 приема, макси-

мальная суточная доза - 65 мг/кг в сутки.

Произв.: Egis (Венгрия)

Допмин (Dormin®)

Допамин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приготовления инфузий содержит допамина гидрохлорида 40 мг, в ампулах по 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Улучшение кровообращения почек, кишечника, мозга и сердца, альфа-, бета-адрено- и дофаминометическое.

Показ.: Нарушение гемодинамики при шоках и сердечной недостаточности.

Противопоказ.: Аритмии, феохромоцитомы, тиреотоксикоз, аденома предстательной железы, узкоугольная глаукома.

Поб. действ.: Тахикардия, аритмии, загрудинные боли, нарушение дыхания, головная боль, повышение АД, тошнота, беспокойство, тремор.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, циклопропаном и галогенсодержащими наркозными средствами.

Примен. и доз.: В/в, капельно со скоростью 2-5 мкг/кг/мин (необходимое количество - 50-1000 мкг/кг), скорость инфузии увеличивается до получения эффекта.

Произв.: Orion (Финляндия)

Дормикум (Dormicum®)

Мидазолам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит мидазолама 7,5 или 15 мг; в упаковке 10 шт.

1 мл водного раствора для инъекций - 5 мг; в ампулах по 1 и 3 мл; в упаковке 10 и 5 шт соответственно.

Фарм. действ.: Снотворное, анксиолитическое, миорелаксирующее, противосудорожное.

Показ.: Бессонница (нарушение засыпания, раннее пробуждение); возбуждение перед диагностическими и хирургическими процедурами (парентерально).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бессонница при психозах или депрессиях, органические повреждения мозга, легочная недостаточность, миастения, беременность.

Поб. действ.: Сонливость, слабость, амнезия, гипотония, тахикардия, апноэ, психическая зависимость, аллергические реакции (при парентеральном введении).

Примен. и доз.: Внутрь, перед сном - по 7,5-15 мг, таблетки не разжевывают, запивают небольшим количеством воды. В/м - за 30 мин до операции в дозе 0,07-0,1 мг/кг; детям - 0,15-0,2 мг/кг. В/в - за 5-10 мин до операции - 2,5 мг.

Предост.: Во время лечения не следует (запрещается) принимать алкоголь и водить транспортные средства.

Произв.: Egis (Венгрия)

Дормикум (Dormicum®)

Мидазолам*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит мидазолама гидрохлорида 5 мг, в ампулах по 1 и 3 мл; в упаковке 10 и 5 шт. соответственно.

1 таблетка содержит мидазолама малеата 15 мг; в упаковке 10, 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Седативное, снотворное, анксиолитическое, противосудорожное, миорелаксирующее.

Показ.: Нервозность больного перед диагностическими или терапевтическими процедурами, производимыми под местным обезболиванием или неингаляционным (в/в) наркозом. Премедикация перед введением в наркоз (в т.ч. у детей). Введение в наркоз и поддержание наркоза. Атаралгезия (в комбинации с кетаминном). Бессонница (таблетки).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, беременность (первый триместр), лактация. Таблетки, кроме того: тяжелая легочная и/или печеночная недостаточность, синдром апноэ во сне, детский возраст.

Поб. действ.: Повышение АД, изменение частоты пульса и дыхания, угнетение дыхания, апноэ, остановка дыхания и/или сердца, тошнота, рвота, головная боль, икота, ларингоспазм, одышка, галлюцинации, избыточный седативный эффект, сонливость, атаксия, антероградная амнезия, жажда, повышенная активность и агрессивность, непроизвольные движения, боль и тромбофлебит в месте введения, генерализованные аллергические реакции (от кожных до анафилактических), судороги (у недоношенных и новорожденных детей), эйфория (при ректальном применении). После продолжительного в/в применения внезапная отмена препарата может сопровождаться симптомами абстиненции.

Взаим.: Усиливает депримирующий эффект антипсихотиков, снотворных, анксиолитиков, антидепрессантов, наркотических анальгетиков, алкоголя, анестетиков, противосудорожных, седативных

и антигистаминных средств. Подавление монооксигеназной системы печени (циметидин) удлиняет седативное действие (снижение скорости биотрансформации).

Примен. и доз.: Дозу подбирают индивидуально до достижения нужного седативного действия, которое соответствует клинической потребности, физическому состоянию и возрасту больного, а также получаемой им медикаментозной терапии. При расстройствах сна, внутрь - средняя доза 7,5-15 мг. Пожилым и ослабленным больным, больным с нарушением функции печени и/или почек рекомендуют назначать 7,5 мг. Курс лечения - несколько дней, максимально - 2 нед. Режим отмены препарата - индивидуальный. Для премедикации - внутрь 7,5-15 мг за 30-60 мин до начала операции в том случае, если не предпочитают парентеральное введение.

Пронзв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Дрилл боль в горле (Drill maux de gorge®)

Сост. и ф.в.: 1 пастилка (пастилка без сахара или пастилка с розовым медом) содержит хлоргексидина диглюконата 3 мг, тетракаина хлоргидрата 0,2 мг, аскорбиновой кислоты 52,5 мг; в упаковке 24 шт.; в 1 пастилке с розовым медом, кроме того, меда 200 мг.

Фарм. действ.: Антисептическое, местноанестезирующее, повышение неспецифической резистентности организма.

Показ.: Боль в горле, не сопровождающаяся повышением температуры; изъязвления слизистой ротовой полости.

Противопоказ.: Беременность, лактация, гиперчувствительность, возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Кожная сыпь, покраснение и отечность лица и гортани, кратковременное онемение языка, окрашивание языка в коричневый цвет, дисбактериоз.

Примен. и доз.: По 1 пастилке (рассасывать, не разжевывая) 4 раза в день с интервалом не менее 2 ч (детям - 2-3 раза в день с интервалом не менее 4 ч).

Пронзв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Дроперидол (Droperidol)

Дроперидол*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 10 мл раствора для инъекций содержит дроперидола 25 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, седативное, противорвотное.

Показ.: Проведение нейролептанальгезии, подготовка больных к наркозу, хирургическим вмешательствам, инструментальным исследованиям; психомоторное возбуждение в послеоперационном периоде; шок различного происхождения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, экстрапирамидные нарушения, оперативные вмешательства в поздних сроках беременности (например, кесарево сечение), ранний детский возраст (младше 3 лет).

Поб. действ.: Артериальная гипотензия, экстрапирамидные нарушения.

Взаим.: Ослабляет действие бромокриптина; бензодиазепины усиливают действие препарата.

Примен. и доз.: В/м, для премедикации - 2,5-5 мг за 15-45 мин до начала операции, в послеоперационном периоде - по 2,5-5 мг каждые 6 ч. В/в, для хирургической анестезии 15-20 мг однократно, для поддержания - повторное введение 2,5-5 мг. Детям для премедикации в/м - 0,1 мг/кг; для хирургической анестезии - 0,2-0,4 мг/кг или 0,3-0,6 мг/кг в/м.

Пронзв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Дротаверина гидрохлорид (Drotaverini hydrochloridum)

Дротаверин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дротаверина гидрохлорида 0,04 г, в blisterной упаковке по 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, миотропное.

Показ.: Спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (печеночная колика, желче- и мочекаменная болезнь, пилороспазм), спазм церебральных, коронарных и периферических сосудов; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ослабление сокращений матки.

Противопоказ.: Индивидуальная непереносимость, глаукома, аденома предстательной железы, выраженный атеросклероз коронарных артерий.

Поб. действ.: При парентеральном введении - чувство жара, головокружение, сердцебиение, потливость, аллергические дерматиты.

Взаим.: Усиливает действие других спазмолитиков.

Передоз.: В больших дозах нарушает АВ-проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки (0,04-0,08 г) 3 раза в день; детям до 6 лет - 0,01-0,02 г; детям от 6 до 12 лет - 0,02 г 1-2 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью назначают больным с атеросклерозом коронарных артерий.

Произв.: Мосхимфармпрепараты (Россия); ФармаДон (Россия)

Дуовит (Duovit®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая сахарной оболочкой, красного цвета содержит витамина А 5000 МЕ, витамина D₃ 200 МЕ, витамина С 60 мг, витамина РР 13 мг, витамина Е 10 мг, витамина В₅ 5 мг, витамина В₆ 2 мг, витамина В₂ 1,2 мг, витамина В₁ 1 мг, фолиевой кислоты 0,4 мг, витамина В₁₂ 3 мкг.

1 таблетка, покрытая сахарной оболочкой, синего цвета содержит магния 20 мг, кальция 15 мг, фосфора 12 мг, железа 10 мг, цинка 3 мг, меди 1 мг, марганца 1 мг, молибдена 0,1 мг; в упаковке 40 шт. (20 красных и 20 синих).

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ.

Фармакодин.: Витамины группы В (В₁, В₂, В₆), пантотеновая кислота, никотинамид принимают участие в метаболизме углеводов, белков, жиров и работе нервной системы. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D способствует правильной минерализации костной ткани и зубов. Витамин С ускоряет абсорбцию железа, регулирует окислительно-восстановительные процессы. Витамин Е защищает мембраны клеток от поражений (антиоксидант). Кальций и фосфор участвуют в минерализации костной ткани и зубов; ионы кальция стимулируют тонус миокарда, передачу нервных импульсов. Железо и медь необходимы для развития эритроцитов. Магний, марганец, цинк и молибден являются компонентами ферментов, катализирующих многочисленные процессы.

Показ.: Профилактика дефицита витаминов, минералов и микроэлементов: повышенная физическая активность, занятия спортом и физической культурой, недостаточное усвоение пищи (в пожилом возрасте, при курении и приеме алкоголя), нерегулярное и однообразное питание (сухая пища), редуцированные диеты (похудание, диабет), беремен-

ность и кормление грудью, недостаток свежих овощей, фруктов, увеличенные потери минералов (рвота, диарея, обильные менструации, сильное потоотделение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания почек.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Уменьшает абсорбцию солей железа (как и антациды) и тетрациклинов.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. Взрослые и дети старше 10 лет - по 1 красной (витамины) и 1 синей (минералы) таблетке, однократно (после завтрака, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды).

Предост.: Не рекомендуется принимать в чрезмерных дозах (длительная передозировка может привести к гипервитаминозу А и D).

Произв.: KRKA (Словения)

Дуоденохель (Duodenoheel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Anacardium D4, Argentum nitricum D6, Ipecacuanha D4, Jodum D6 по 30 мг; Lachesis D12, Petroleum D6, Robinia pseudoacacia D4 по 60 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, гемостатическое, антацидное, спазмолитическое, обезболивающее.

Показ.: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, гастродуоденит, гастрит с повышенной кислотностью, спазм привратника; заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы.

Противопоказ.: Беременность, лактация. Дети с повышенной чувствительностью к йоду.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день. При заболеваниях желчного пузыря комбинируют с Хепель, поджелудочной железы - со Спасокупрель, желудка - с Гастрikumель.

Предост.: При заболеваниях щитовидной железы не следует принимать без консультации с врачом.

Произв.: Heel (Германия)

Дурацеф (Duracef®)

Цефадроксил*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефадроксила 250 или 500 мг (в виде моногидрата).

1 диспергируемая таблетка - 1 г.

Порошок во флаконах для приготовления 60 мл оральной суспензии. Каждые

5 мл приготовленной суспензии содержат цефадроксил 125 или 250 мг (в форме моногидрата).

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: Быстро всасывается. После однократного приема 500 и 1000 мг эффективные концентрации определяются на протяжении 12 ч. C_{max} в сыворотке составляет 16 и 28 мг/мл. Эффективные концентрации определяются на протяжении 12 ч. Более 90% выделяется в неизмененном виде с мочой в течение 24 ч. Увеличение дозы приводит к пропорциональному увеличению концентрации в моче.

Фармакодин.: Подавляет синтез пептидогликана клеточной стенки. Активен в отношении бета-гемолитических стрептококков, стафилококков (в т.ч. образующих пенициллиназу), *Streptococcus pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella* spp, *H.influenzae*, *Salmonella* spp. и *Shigella* spp.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей, мочеполовой системы; остеомиелит, септический артрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. При беременности следует сопоставлять пользу и возможный риск; в период кормления грудью назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, зуд и монилиаз в половых органах, вагинит, транзиторная нейтропения, увеличение активности трансаминаз в сыворотке, псевдомембранозный колит, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, сосудистый отек).

Примен. и доз.: Внутрь (лучше во время еды). Взрослым при цистите - 1-2 г в день однократно или в 2 приема; другие инфекции мочевых путей - 2 г в день в 2 приема; при инфекциях кожи - 1 г в день однократно или в 2 приема; при фарингитах и тонзиллитах - 1 г в день однократно или в 2 приема в течение 10 дней; инфекции дыхательных путей - по 500 мг 2 раза в день (в легких случаях) и от 1 до 2 г в день в 2 приема (с интервалом 12 ч) - при тяжелых инфекциях. Детям - 25-50 мг/кг в сутки в 2 приема (с интервалом в 12 ч) в течение 10 дней, рекомендуется суспензия для орального приема, которую получают добавлением достаточного количества воды к порошку до уровня линии на флаконе. У больных с нарушенной функцией почек начальная доза - 1000

мг, поддерживающая - 500 мг, кратность приема зависит от величины клиренса креатинина: при значениях его 0-10 мл/мин - каждые 36 ч, 10-25 мл/мин - 24 ч, 25-50 мл/мин - 12 ч. Таблетки непосредственно перед приемом растворяют в 100 мл воды.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с аллергией к пенициллинам, нарушением функции почек, коликами в анамнезе. Растворенный порошок хранится в течение 7 дней при комнатной температуре и 14 дней - в холодильнике.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Железа глюконат 300 (Ferrous gluconate 300)

Железа глюконат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая сахарной оболочкой, содержит железа глюконата 300 мг; в упаковке 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противоанемическое, восполнение дефицита железа.

Показ.: Неосложненные железодефицитные анемии (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. препаратам железа), период проведения гемотрансфузий, гемолитическая анемия, гемохроматоз, гемосидероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (обострение), энтериты, язвенный колит, преклонный возраст.

Бер. и корм. гр.: При беременности допустимо только по строгим показаниям (особенно в I триместре).

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, изжога, боли в эпигастриальной области, диарея (или запоры), "черный" стул, нейтропения, аллергические реакции.

Взаим.: Снижают всасывание железа молоко, антациды, тетрациклины, повышает - аскорбиновая кислота (в пропорции большей или равной 200 мг на 30 мг элементарного железа). Латентный период эффекта удлиняет хлорамфеникол.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды. Взрослым (беременным, начиная со второго триместра) для лечения - по 4-6 таблеток (1,2-1,8 г) в день в 2-3 приема; для профилактики - по 2 таблетки (600 мг) в день. Детям от 6 до 12 лет для лечения - по 1-3 таблетки в день; для профилактики - в меньших дозах.

Предост.: Не следует назначать на срок более 6 мес. С крайней осторожностью применяют при язвенной болезни желудка.

ка и двенадцатиперстной кишки, язвенных колитах, энтеритах. Не рекомендуется детям до 6 лет.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Железа фумарат 200 (Ferrous fumarate 200)

Железа фумарат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит железа фумарата 200 мг, что эквивалентно 65 мг двухвалентного железа; в упаковке 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противоанемическое, восполнение дефицита железа.

Показ.: Железодефицитные анемии (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, анемии, не связанные с дефицитом железа, гемоглобинурия (ночная), гемосидероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (обострение), энтерит, язвенный колит, повторные гемотрансфузии.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в I триместре беременности.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (дискомфорт и боли в эпигастриальной области, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея или запор, черный цвет стула).

Взаим.: Всасывание снижают тетрациклин и антациды (интервалы между приемом должны быть не менее 2-3 ч). Эффект замедляет хлорамфеникол.

Примен. и доз.: Внутрь (можно измельчить или разжевать). Взрослым, в т.ч. пожилым, - по 1 таблетке 3 раза в день; при необходимости - дозу удваивают. Для профилактики анемии во время беременности назначают в комбинации с фолиевой кислотой.

Предост.: Необходимо избегать назначения на период более 6 мес. Не рекомендуется принимать больным с пептической язвой. Следует иметь в виду, что в больших дозах препарат может препятствовать выявлению в стуле скрытой крови (из-за окрашивания стула в черный цвет) и что гваяковый тест (на кровь) может дать ложноположительный результат.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Женьшеня настойка (Tinctura Ginseng)

Сост. и ф.в.: Настойка (1:10) на 70% спирте из корней женьшеня настоящего (*Panax ginseng*) семейства аралиевых (*Araliaceae*); во флаконах по 50 мл. Со-

держит эфирные и жирные масла, пектины и другие углеводы, тритерпеновые гликозиды, сапонины и другие вещества.

Фарм. действ.: Адаптогенное.

Показ.: Гипотония, усталость, переутомление, неврастения.

Примен. и доз.: Внутрь, по 15-25 капель 3 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Задитен® (Zaditen®)

Кетотифен*

Задитен® СРО (Zaditen® SRO)

Кетотифен*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кетотифена (в форме гидрогенфумарата) 1 мг.

1 таблетка ретард, покрытая оболочкой (Задитен СРО) - 2 мг; в упаковке 30 шт..

5 мл сиропа - 1 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Противоастматическое, противоаллергическое.

Показ.: Бронхиальная астма (профилактика приступов при всех формах, включая смешанную), аллергический бронхит, астматические симптомы при сенной лихорадке; другие аллергические заболевания (профилактика и лечение): острая и хроническая крапивница, атопический дерматит, аллергический ринит и конъюнктивит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Кормление грудью должно быть прекращено.

Поб. действ.: Седация, сухость во рту, головокружение; редко - стимуляция ЦНС, увеличение массы тела, цистит, кожные реакции.

Взаим.: Усиливает действие препаратов, угнетающих ЦНС, антигистаминных и алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 таблетке-ретард (2 мг) или по 1 таблетке (1 мг) 2 раза в день; у больных с тенденцией к проявлению седативного эффекта рекомендуется начинать с 1/2 таблетки 2 раза в день. В случае необходимости суточная доза может быть увеличена до 4 мг. Детям от 6 мес до 3 лет - 0,05 мг (1 капля раствора или 0,25 мл сиропа) на 1 кг массы тела 2 раза в сутки; старше 3 лет - 1 мг (5 мл сиропа или 1 таблетка) 2 раза в день или 1 таблетка-ретард (2 мг) вечером.

Предост.: В начале лечения не следует отменять противоастматические симптоматические и профилактические средства, применяемые больным ранее. Необходимо соблюдать осторожность при вождении транспортных средств, работе с машинами и механизмами. У больных, принимающих противодиабетические препараты, рекомендуется контролировать количество тромбоцитов в периферической крови.

Пронзв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Заноцин® (Zanocin®)

Офлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит офлоксацина 100 или 200 мг; в упаковке 10 шт.

100 мл инфузионного раствора - 200 мг офлоксацина; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное, ингибирование бактериальной ДНК (блокада ДНК-гиразы).

Фармакокин.: Быстро всасывается из ЖКТ, биодоступность при пероральном приеме около 98%. После однократного перорального приема 200 и 400 мг средние пиковые концентрации в сыворотке составляют соответственно 2 и 5 мкг/л. Препарат равномерно распределяется и достигает терапевтических концентраций в большинстве тканей и жидкостей организма. Время полувыведения составляет 6 ч и более. Выводится в основном с мочой в неизменном виде.

Показ.: Гинекологические и урологические инфекции, включая вызванные хламидиями, инфекции дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, костей и суставов, брюшной полости, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эпилепсия, возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические явления (анорексия, тошнота, рвота, диарея, боли в животе), миалгия, артралгия, головная боль, головокружение, нарушение сна, обоняния, вкуса, транзиторное повышение концентрации в крови ферментов печени, билирубина, мочевины, креатинина, анемия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, фотосенсибилизация, аллергические реакции (сыпь, отек Квинке).

Взаим.: Эффект снижается антацидами (тормозят всасывание).

Примен. и доз.: Доза подбирается индивидуально. Внутрь, по 200-400 мг 2 раза

в сутки. При неосложненных инфекциях мочевых путей - по 200 мг 2 раза в сутки. Инфузия назначается при тяжелых инфекциях или при невозможности перорального приема - по 200-400 мг в/в (капельно) 2 раза в день. При нарушении функции почек - в первый день 200 мг, затем по 100 мг в день, при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин - в первый день 200 мг, а затем по 100 мг через день.

Предост.: Во время лечения больные не должны подвергаться УФ-облучению. Осторожно назначают при атеросклерозе, нарушениях мозгового кровообращения, нарушениях функции почек.

Пронзв.: Ranbaxy (Индия)

Зантак® (Zantac®)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 мл инъекционного раствора содержит ранитидина (в виде гидрохлорида) 25 мг; в ампулах по 2 мл.

1 таблетка или шипучая таблетка - 150 или 300 мг; в упаковке 20 и 60 или 10 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоязвенное, подавление секреции желудочного сока, снижение кислотопродукции, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Фармакокин.: После в/м введения быстро всасывается. C_{max} в плазме - через 15 мин после введения. Подвергается метаболизму в незначительной степени, экскретируется преимущественно путем секреции через почечные каналы. T_{1/2} - 2-3 ч. При в/в введении 93% выделяется с мочой и 5% - с калом; при пероральном - 60-70% с мочой и 26% - с калом. В первые 24 ч 70% в/в дозы и 35% пероральной выводятся в неизменном виде с мочой. Метаболизм одинаков при пероральном и в/в применениях, причем 6% дозы выводится с мочой в виде N-оксида, 2% - в виде S-оксида, 2% - в виде десметилранитидина и 1-2% - в виде аналога фуроевой кислоты.

Фармакодин.: Уменьшает объем секретируемого желудочного сока и содержание в нем кислоты и пепсина.

Показ.: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, доброкачественные язвы желудка (в т.ч. обусловленные приемом НПВС), профилактика язв двенадцатиперстной кишки при лечении НПВС, послеоперационные язвы, рефлюкс-эзофагит, купирование болевого синдрома при желудочно-пищеводной рефлюксной болезни, синдром Золлин-гера-Эллисона, гиперацидные состояния; профилактика желудочно-кишеч-

ных кровотечений из стрессовых и пептических язв, рецидивов кровотечения у пациентов с кровоточащими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, перед общей анестезией при риске кислотной аспирации (в т.ч. профилактика синдрома Мендельсона, особенно у рожениц); хроническая диспепсия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; острая порфирия (в анамнезе).

Бер. и корм. гр.: Только в случае особой необходимости (проникает через плаценту и выделяется с молоком).

Поб. действ.: Обратимые изменения печеночных проб; гепатит (гепатоцеллюлярный, холестатический, смешанный) с желтухой или без нее, головная боль, головокружение, нарушение аккомодации, депрессия, галлюцинации, брадикардия, АВ-блокада, асистолия, гипотония, обратимые лейкопения и тромбоцитопения, гипоплазия или аплазия костного мозга, набухание и дискомфорт в грудных железах (у мужчин), сыпь на коже, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок, бронхоспазм).

Примен. и доз.: В/м, в/в, внутрь. Взрослым, в/в медленно (в течение не менее 2 мин) - 50 мг (разведенных до объема 20 мл) или в/в прерывисто со скоростью 25 мг/ч (в течение 2 ч), вливания могут быть повторены через 6-8 ч. В/м - 50 мг (2 мл) через каждые 6-8 ч. Пациентам с риском синдрома кислотной аспирации - 50 мг в/м или в/в медленно за 45-60 мин до общей анестезии. Внутрь, взрослым: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и доброкачественная язва желудка (лечение обострения) - 150 мг 2 раза в день или 300 мг на ночь. При язве двенадцатиперстной кишки - 300 мг 2 раза в день. Профилактика рецидивов язв: 150 мг на ночь, для курящих - 300 мг на ночь. Язвы, связанные с приемом НПВС, - 150 мг 2 раза в день или 300 мг на ночь (8-12 нед). Послеоперационные язвы: 150 мг 2 раза в день (4 нед). Рефлюкс-эзофагит: 150 мг 2 раза в день или 300 мг на ночь (8-12 нед), в тяжелых случаях - 150 мг 4 раза в день; профилактика - 150 мг 2 раза в день. Синдром Золлингера-Эллисона: 150 мг 3 раза в день. Хроническая диспепсия: 150 мг 2 раза в день (6 нед). Профилактика синдрома Мендельсона: 150 мг за 2 ч до анестезии (и 150 мг вечером накануне). Роженицам во время родов - 150 мг каждые 6 ч. Детям: лечение пептической язвы - от 2 до 4 мг/кг массы тела 2 раза в день (до 300 мг в сутки).

Предост.: Перед началом лечения необходимо исключить малигнизацию. При тяжелой почечной недостаточности рекомендуется вводить в/м или в/в дозами по 25 мг (внутрь - до 150 мг/сутки). При быстром введении возможна брадикардия.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Зильден (Zilden)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дилтиазема гидрохлорида 60 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Профилактика и лечение острой и хронической коронарной недостаточности, стенокардия, постинфарктные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотензия, острая и хроническая сердечная недостаточность, синдром слабости синусового узла, синоаурикулярная блокада или АВ-блокада II-III степени, брадикардия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Брадикардия, синоаурикулярная блокада, отек нижних конечностей, астения, сонливость, головная боль, бессонница, головокружение, нарушение пищеварения (тошнота, диспепсия, изжога, сухость горла, понос), повышение уровня ферментов печени, зуд, кожная сыпь.

Взаим.: Гипотензивный эффект усиливают прочие (позитивные и негативные) антигипертензивные препараты - бета-блокаторы, антиаритмики, препараты дигиталиса, нитраты.

Передоз.: Лечение симптоматическое: промывание желудка, поддержание сердечной функции, АД и дыхания, коррекция электролитных нарушений.

Примен. и доз.: Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день с едой. Дозу можно увеличить до 4 таблеток в день и делить на 3-4 приема.

Предост.: Осторожно применять больным с АВ-блокадой I степени. Перед хирургической операцией необходимо предупредить анестезиолога о лечении Зильденом.

Произв.: CSC (Италия)

Зинацеф® (Zinacef®)**Цефуроксим***

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефуроксима натрия 250 и 750 мг; в упаковке 5 шт. или 1500 мг; в индивидуальной упаковке.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: $C_{\max}$ после в/м введения - через 30-45 мин. $T_{1/2}$ - 70 мин. Через 24 ч полностью выводится (большая часть - в первые 6 ч) с мочой в неизменном виде: 50% секретируется почечными канальцами, около 50% - фильтруется в клубочках. При воспалении мозговых оболочек проникает через гематоэнцефалический барьер. В костной ткани, синовиальной жидкости и камерной влаге создаются концентрации, превышающие минимальные подавляющие для большинства микроорганизмов.

Показ.: Инфекции: дыхательных путей (острый и хронический бронхит, инфицированные бронхоэктазы, бактериальная пневмония, абсцесс легких, послеоперационные инфекции органов грудной полости); уха, горла, носа; мочевыводящих путей (острый и хронический пиелонефрит, цистит, асимптоматическая бактериурия; мягких тканей (целлюлит, рожа); перитонит, раневые инфекции; инфекции костей и суставов (остеомиелит, артрит); воспалительные инфекции в области таза; гонорея, септицемия, менингит, профилактика хирургических инфекций.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к цефалоспориновым антибиотикам).

Поб. действ.: Уменьшение концентрации гемоглобина, эозинофилия, лейкопения, нейтропения, положительная реакция Кумбса, повышение содержания ферментов печени или билирубина в сыворотке крови; кандидоз, псевдомембранозный колит, аллергия (раздражение кожи, сыпь, прыщи, крапивница, лихорадка); тромбофлебит (при в/в инъекции); боль в месте инъекции (при в/м введении).

Взаим.: Пробенецид пролонгирует выведение и вызывает повышение $C_{\max}$ в сыворотке крови. В сочетании с аминогликозидами наблюдается аддитивный эффект.

Примен. и доз.: В/м, в/в. Взрослые - 750 мг 3 раза в день, при тяжелых инфекциях - до 1,5 г 3 раза в день в/в (максимально - до 3-6 г в сутки). Дети

грудного и более старшего возраста - от 30 до 100 мг/кг массы тела в сутки в 3-4 приема (оптимальная доза - 60 мг/кг/сутки). Новорожденные - от 30 до 100 мг/кг в сутки в 2-3 приема. Гонорея - 1,5 г однократно, в/м (или 2 инъекции по 750 мг в обе ягодицы). Менингит: новорожденные - 100 мг/кг/сутки в/в, при улучшении - 50 мг/кг/сутки в/в; дети грудного возраста и старше - в/в 200-400 мг/кг в сутки в 3-4 приема (снижая до 100 мг/кг в сутки через 3 дня или при клиническом улучшении); взрослые - по 3 г в/в каждые 8 ч. Профилактика: 1,5 г в/в с введением наркоза, далее при абдоминальных, тазовых и ортопедических операциях при необходимости - по 750 мг в/м через 8 и 16 ч; при операциях на сердце, легких, сосудах, пищеводе - по 750 мг в/м 3 раза в день в течение 24-48 ч.

Предост.: Не следует смешивать в одном шприце с аминогликозидными антибиотиками. С осторожностью используют при алергизации к пенициллину в анамнезе, в сочетании с фуросемидом. У больных с нарушением функции почек дозу необходимо корректировать с учетом клиренса креатинина.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Зиндолин 250 (Zindolin 250)**Ципрофлоксацин***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ципрофлоксацина 250 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Генерализованные тяжелые инфекции органов дыхания, уха, горла и носа, мочеполовых органов, кожи и мягких тканей, ЖКТ, органов зрения, гепатобилиарной области, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, органов таза, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. фторхинолонам), беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея); редко - повышение уровня печеночных ферментов в крови, кристаллурия, слабость, головокружение, головная боль, тремор и др. нарушения ЦНС, кожные высыпания и зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Взрослым (включая престаре-

лых) - по 250-750 мг 2 раза в день, в зависимости от тяжести заболевания; у больных с тяжелой почечной недостаточностью дозу уменьшают в 2 раза. Длительность лечения - в зависимости от тяжести инфекции, эффекта, чувствительности возбудителя; при острых инфекциях - обычно 5-10 дней. После исчезновения симптоматики лечение продолжают не менее 3 дней.

Предост.: С осторожностью следует назначать при эпилепсии и заболеваниях ЦНС (в т.ч. в анамнезе). Не рекомендуется одновременный прием с алкоголем (усугубляется негативное влияние на способность управления автомобилем). Во время лечения необходимо обильное питье (но без защелачивания мочи). Лактирующие женщины должны приостановить грудное вскармливание.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Зинерит® (Zineryt®)

Сост. и ф.в.: 1 упаковка порошка для приготовления раствора для наружного применения содержит эритромицина 1200 мг и цинка ацетата 360 мг, в комплекте с растворителем во флаконах по 30 мл (1 мл приготовленного раствора - эритромицина 40 мг и цинка ацетата 12 мг).

Фарм. действ.: Бактериостатическое, уменьшение выработки секрета сальных желез.

Фармакокин.: Эритромицин-цинковый комплекс хорошо проникает в кожу (лучше чем оба активных компонента в отдельности). Цинк связывается с фолликулярным эпителием и не резорбируется в системный кровоток, эритромицин всасывается в незначительных количествах.

Фармакодин.: Активен в отношении микроорганизмов, вызывающих угревую сыпь (*Propionibacteria acne* и *Streptococcus epidermidis*); уменьшает выработку секрета сальных желез.

Показ.: Угревая сыпь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим препаратам, содержащим макролиды или цинк).

Поб. действ.: Местно: ощущение жжения, раздражение, сухость кожных покровов.

Примен. и доз.: Наружно, наклонив флакон вниз, с легким нажимом на аппликатор наносят тонким слоем на весь пораженный участок кожи 2 раза в день: утром (до нанесения макияжа) и вечером (после умывания). Скорость нанесения лосьона регулируется силой нажима

аппликатора на кожу. Разовая доза - 0,5 мл. После высыхания лосьон становится невидимым. Курс лечения - 10-12 нед (иногда улучшение возникает уже через 2 нед).

Предост.: Следует иметь в виду возможность развития перекрестной резистентности к другим макролидам, линкомицину, клиндамицину. Необходимо избегать попадания в глаза, на слизистую оболочку полости рта и носа (возможно раздражение или ожог).

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Зиннат® (Zinnat®)

Цефуроксим*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит цефуроксима (в форме аксетила) 125; 250 или 500 мг.

Гранулы для приготовления оральной суспензии - 125 или 250 мг/5 мл; в многодозовых флаконах или однодозовых саше.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: Быстро гидролизруется в слизистой оболочке кишечника с образованием цефуроксима и всасывается в кровяное русло; оптимальное всасывание - после приема пищи. Пиковые сывороточные уровни наблюдаются через 2-3 ч. $T_{1/2}$ - 1-2 ч. Связь с белками - 50%. Не метаболизируется, выделяется почками. При диализе сывороточные уровни снижаются.

Фармакодин.: Устойчив к действию большинства бета-лактамаз, активен в отношении штаммов, устойчивых к ампициллину и амоксициллину; ингибирует синтез клеточной стенки.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей (острый и хронический бронхит, пневмония); инфекции уха, горла и носа (средний отит, синусит, тонзиллит, фарингит); мочеполовых путей (пиелонефрит, цистит, уретрит); кожи и мягких тканей (фурункулез, импетиго, пиодермия), гонорея (острый гонококковый уретрит и цервицит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим цефалоспорином).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью назначают на ранних этапах беременности и при кормлении грудью.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, понос, раздражение кожи, эозинофильный лейкоцитоз, увеличение печеночных ферментов, положительная реакция Кумбса, псевдомембранозный колит, аллергические реакции.

Передоз.: Завышенные дозы могут привести к церебральным поражениям и судорогам. Лечение - гемо- и перитонеальный диализ.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, взрослым - обычно 250 мг 2 раза в день; инфекции мочевыводящих путей - 125 мг 2 раза в день, пиелонефрит, бронхит - 250 мг 2 раза в день, пневмония - 500 мг 2 раза в день; гонорея - 1 г однократно. Детям: большинство инфекций - 125 мг 2 раза в день, средний отит - 250 мг 2 раза в день, лучше использовать в виде суспензии. Курс лечения - 7 дней.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, имеющим аллергические реакции к пенициллинам. Следует иметь в виду, что суспензия активна лишь 10 дней (при температуре не выше 25 град.С); суспензию, приготовленную из саше, надо использовать сразу.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Зипрекса (Zyprexa®)

Оланзапин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит оланзапина 5 или 10 мг; в блистерных упаковках по 28 шт.

Фарм. действ.: Антипсихотическое.

Фармакокин.: Хорошо всасывается, C_{max} в плазме - через 5-8 ч. Метаболизируется в печени (по конъюгационному и окислительному путям) до неактивных метаболитов. Основной метаболит - 10-N-глюкуронид - не проходит через гематоэнцефалический барьер. Средний $T_{1/2}$ варьирует (в зависимости от возраста и пола) в пределах 29-55 ч.

Фармакодин.: Является лигандом серотониновых (2A/2C, 3, 6), допаминовых (D_4 , D_3 , D_1 , D_2), м-холино- (m_1 - m_5), H_1 -гистамино- и альфа $_1$ -адренорецепторов, избирательно влияет на лимбическую систему.

Клин. фарм.: Облегчает вторичные аффективные симптомы, связанные с шизофренией, и сопутствующие расстройства: эффективно улучшает клиническую картину при продолжительном лечении.

Показ.: Острая форма шизофрении и др. психозы, сопровождающиеся бредом, галлюцинациями, спутанностью мышления, враждебностью, подозрительностью, состоянием аффекта, эмоциональным и социальным аутизмом, слабостью речи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский и юношеский возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, сухость во рту, увеличение аппетита и массы тела, тошнота, запоры, периферические отеки, ортостатическая гипотония, экстрапирамидный синдром, акатизия, дискинезии, аномальные движения лица или языка, дистонии, эозинофилия, увеличение уровня пролактина (гинекомастия, лакторея); печеночных трансаминаз.

Взаим.: Ослабляет эффекты леводопы и антагонистов допамина. Активированный уголь понижает биодоступность на 50-60% при пероральном приеме. Курение и карбамазепин ускоряют метаболизм. Совместим с антацидами, циметидином, имипрамином, варфарином, диазепамом, литием.

Передоз.: Симптомы: тошнота, спутанная речь, сонливость, мидриаз, угнетение дыхания, гипотония, экстрапирамидные расстройства. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое с обязательным использованием активированного угля, обеспечением хорошей вентиляции легких и насыщением кислородом; в случае коллапса - в/в введение норадреналина (но не адреномиметиков с бета-активностью - адреналин, допамин и др.).

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Начальная доза - от 10 мг в сутки, однократно. Затем суточная доза может варьироваться - от 5 до 20 мг в сутки в зависимости от клинического состояния. Увеличение дозы до 15 мг в сутки и более рекомендуется не ранее 4 дней.

Предост.: Рекомендуется назначать с осторожностью при увеличении простаты, узкоугольной глаукоме, паралитической кишечной непроходимости, эпилепсии, болезни Паркинсона, заболеваниях печени и почек, в сочетании с другими средствами, угнетающими ЦНС, в т.ч. с алкоголем. Не рекомендуется применять при управлении механизмами (автотранспортными средствами и др.).

Произв.: Lilly (Швейцария)

Зиртек® (Zyrtec®)

Цетиризин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, делимая или 1 мл (20 капель) раствора для приема внутрь содержат цетиризина гидрохлорида 10 мг; в блистерной упаковке 7, 10 или 20 шт. и во флаконах по 10 и 20 мл соответственно.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Сезонный и хронический аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, хроническая идиопатическая крапивница, отек Квинке, зуд.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Редко - головная боль, головокружение, сонливость, сухость во рту, возбуждение, расстройства ЖКТ, аллергические реакции (кожные, сосудистый отек).

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям 12 лет и старше - по 10 мг (1 таблетка или 20 капель) 1 раз в день, детям в возрасте от 2 до 6 лет - по 5 мг (10 капель) 1 раз в день или по 5 капель утром и вечером, от 6 до 12 лет - по 10 мг (1 таблетка или 20 капель) 1 раз в день или по 1/2 таблетки 2 раза в день (утром и вечером). Больным с почечной недостаточностью рекомендуется уменьшать дозу препарата в 2 раза.

Предост.: Не следует назначать препарат при беременности и лактации. В терапевтических дозах не потенцирует действия алкоголя, не влияет на реакцию при вождении автомобиля, работе на станках; при превышении терапевтической дозы во всех вышеуказанных случаях следует соблюдать осторожность.

Пронзв.: UCB (Бельгия)

Зитазониум (Zitazonium®)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тамоксифена цитрата 10, 20, 30 и 40 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы у женщин в менопаузе, меланома, карцинома предстательной железы с метастазами.

Противопоказ.: Беременность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, тромбофлебит, катаракта, ретинопатия, отеки, депрессия, влагалищные кровотечения, тромбоцитопения, остеопороз, гиперкальциемия, оссалгия, сыпь.

Взаим.: Усиливает гепатотоксичность аллопуринола; увеличивает эффект производных кумарина (гипокоагуляция).

Примен. и доз.: Внутрь, по 10 мг 2-3 раза в день, через неделю - 20 мг 3 раза в день.

Пронзв.: Egis (Венгрия)

Зовиракс® (Zovirax®)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацикловира 200, 400 или 800 мг.

1 мл суспензии оральной - 40 мг.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора - 250 мг.

1 г крема - 50 мг; в тубиках по 2, 5 и 10 г.

1 г мази глазной - 30 мг; в тубиках по 4,5 г.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Фармакодин.: Спектр действия включает вирус простого герпеса 1 и 2 типов, вирус варицеллы-зостер, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус. Тимидинкиназа, кодируемая этими вирусами, превращает ацикловир в ацикловирмонофосфат, который в дальнейшем превращается в трифосфат. Ацикловиртрифосфат оказывает действие на вирусную ДНК-полимеразу и угнетает репликацию ДНК с прерыванием цепи после его внедрения в вирусную ДНК. Обладает низкой токсичностью по отношению к клеткам млекопитающих.

Показ.: Таблетки и суспензия: инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусами простого герпеса и варицелла-зостер; предупреждение рецидивов инфекции, вызванной вирусом простого герпеса (в т.ч. у больных с подавленным иммунитетом). В/в введение: инфекции, вызванные вирусами простого герпеса 1 и 2 типов и варицелла-зостер (в т.ч. у новорожденных), профилактика инфекций, вызванных вирусами простого герпеса 1 и 2 типов, варицелла-зостер (в т.ч. у больных с иммунодефицитами). Крем: инфекции кожи и слизистых, вызванные вирусами простого герпеса (первичный и рецидивирующий герпес половых органов, простой герпес губ). Мазь глазная: кератит, вызванный вирусом простого герпеса.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности необходимо соотнести возможные пользу и потенциальный вред для плода. С осторожностью назначать перорально кормящим женщинам (т.к. проникает в грудное молоко).

Поб. действ.: Таблетки, оральная суспензия - обратимая кожная сыпь, головокружение, психозы, галлюцинации, сонливость; в/в введение - повышение концентрации мочевины и креатинина в

крови, обратимая острая почечная недостаточность; при попадании препарата для в/в использования в подкожную клетчатку развиваются местные воспалительные реакции; крем - временное жжение, эритема, сухость и шелушение кожи; глазная мазь - жжение, точечная кератопатия, блефарит, конъюнктивит.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 200 мг 5 раз в день (5 дней) или по 400 мг 5 раз в день (при подавленном иммунитете или нарушенном всасывании); при рецидивирующей инфекции - по 200 мг 4 раза в день или по 400 мг 2 раза в день. Опоясывающий герпес - по 800 мг 5 раз в день (7 дней). Детям старше 2-х лет с иммунодефицитом для лечения простого герпеса - дозировки взрослых, в возрасте до 2-х лет - дозу уменьшают вдвое. В/в, содержимое флакона растворяют стерильной водой для получения в 1 мл 25 мг, затем разводят, как минимум, до 5 мг/мл (0,5% раствор), вводят капельно, медленно (в течение 1 ч), у новорожденных используют 4 мл исходного объема, и общий объем вводимого раствора доводят до 20 мл. Лечение инфекции: новорожденные - 10 мг/кг 3 раза в сутки с интервалом 8 ч; дети от 3-х мес до 12 лет - 250 мг/кв.м 3 раза в сутки; взрослые - 5 мг/кг 3 раза в сутки. Курс лечения - 5-10 дней; при генерализованных и тяжелых инфекциях: детям - 500 мг/кв.м площади тела 3 раза в день; взрослым - 10 мг/кг 3 раза в сутки не менее 10 дней. Наружно, крем наносят 5 раз в день в течение 5-10 дней. Глазную мазь слоем длиной 10 мм закладывают в нижний конъюнктивальный мешок 5 раз в день в течение не менее 3 дней после выздоровления.

Предост.: У лиц пожилого возраста с почечной недостаточностью дозы подбирают, учитывая клиренс креатинина. Открытый тубик глазной мази используют не более 1 мес.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Зокор (Zocor®)

Симвастатин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит симвастатина 10 или 20 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Гипохолестеринемическое; ограничение синтеза холестерина на начальных стадиях (блокада редуктазы 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзима А), снижение содержания в плазме липопротеинов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов.

Фармакокин.: С высокой избирательностью накапливается в печени. Быстро экстрагируется из крови при первом прохождении через печень, однако с желчью выводится лишь 5%.

Клин. фарм.: Эффект развивается в течение 2 нед и достигает максимума к 4-6 нед. При прекращении терапии содержание холестерина возвращается к исходному уровню.

Показ.: Первичная гиперхолестеринемия, сочетание гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии, ишемическая болезнь сердца.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания печени в активной форме, повышение уровня трансаминаз в плазме крови неясной этиологии, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: При наступлении беременности препарат должен быть отменен, а женщина предупреждена об опасности для плода. Женщинам детородного возраста препарат назначают, если вероятность беременности очень мала. Кормление грудью во время лечения не рекомендуется.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, астения, головокружение, головная боль, миалгия, миопатия, рабдомиолиз, судороги, алоpecia, панкреатит, парестезии, периферическая нейропатия, анемия, гепатит, синдром гиперчувствительности (ангионевротический отек, кожная сыпь, зуд, волчаночноподобный синдром, ревматическая полимиалгия, васкулит, тромбоцитопения, эозинофилия, увеличение СОЭ, артрит, артралгия, крапивница, фотосенсибилизация, лихорадка, приливы, одышка, общее недомогание).

Взаим.: Умеренно увеличивает эффект кумариновых антикоагулянтов. При сочетании с иммунодепрессантами (циклоспорин), производными фиброевой (фибраты) и никотиновой (ниацин) кислот увеличивается риск развития миопатии (возможен рабдомиолиз с вторичной острой почечной недостаточностью). Не следует комбинировать с противогрибковыми препаратами, производными азолов.

Передоз.: Известно лишь о нескольких случаях передозировки (максимальная доза - 450 мг), ни у одного из пациентов не выявлено каких-либо специфических симптомов; последствий не наблюдалось. Применялось симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Внутрь, в начальной дозе 10 мг в день однократно вечером; при легкой или умеренной гиперхолесте-

ринемии начальная доза - 5 мг; при необходимости можно увеличить не ранее, чем через 4 нед; максимальная суточная доза - 40 мг. При ишемической болезни сердца начальная доза - 20 мг однократно вечером; при необходимости ее постепенно увеличивают через каждые 4 нед до 40 мг.

Предост.: Перед лечением рекомендуется провести (и затем периодически повторять) исследование функции печени. Когда уровень трансаминаз начинает превышать в 3 раза норму, препарат отменяют. С осторожностью назначают пациентам, злоупотребляющим алкоголем и/или имеющим в анамнезе заболевания печени. У пациентов, которые получают циклоспорин, терапия симвастатином должна быть временно прекращена; требуется осторожность и тщательное наблюдение за больными, получающими противогрибковые средства из группы производных азола.

Произв.: MSD (США)

Золадекс (Zoladex)

Гозерелин*

Сост. и ф.в.: Депо 3,6 или 10,8 мг гозерелина (в форме ацетата) в биодеградируемой капсуле, помещенной в специальный шприц-аппликатор.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, блокада секреции гипофизом лютеинизирующего гормона, снижение концентраций тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин) в сыворотке крови.

Показ.: Рак предстательной железы, рак молочной железы, эндометриоз, фиброма матки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Снижение потенции, "приливы", головная боль, депрессия, боли в костях, сухость слизистой влагалища, опухание и болезненность молочных желез, аллергические реакции, аменорея (крайне редко).

Примен. и доз.: П/к, 3,6 мг в переднюю брюшную стенку каждые 28 дней (при необходимости делают местное обезболивание).

Предост.: С осторожностью назначают мужчинам, подверженным риску развития непроходимости мочевыводящих путей или сдавливания спинного мозга.

Произв.: Zeneca (Великобритания)

Золофт (Zoloft®)

Сертралин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит сертралина гидрохлорида в количестве, соответствующем 50 или 100 мг сертралина; в упаковке 14 и 28 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное.

Клин. фарм.: Терапевтический эффект может проявиться в течение 7 дней, полный антидепрессивный - через 2-4 нед. Пожилым пациентам назначают в той же дозе, что и более молодым.

Показ.: Депрессии (с манией и без мании в анамнезе), профилактика их рецидивов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, диспепсия, неустойчивый стул, диарея, головокружение, инсомния, сонливость, тремор, повышенная потливость, нарушение сексуальной функции у мужчин (задержка эякуляции).

Взаим.: Следует учитывать возможность конкуренции с другими препаратами за связь с белками плазмы (диазепам, толбутамид, варфарин, циметидин). Совместное применение с литием приводит к увеличению частоты побочных эффектов. Несовместим с серотонинергическими средствами (типа триптофана или фенфлурамина). Не усиливает эффекты алкоголя (на психомоторные функции) у здоровых людей.

Передоз.: Маловероятна (обладает широкими границами безопасности). Известны летальные случаи при передозировке сертралина в комбинации с другими препаратами или алкоголем. Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50 мг в сутки. При отсутствии эффекта дозу можно увеличивать на 50 мг до максимальной суточной (200 мг) в течение нескольких недель.

Предост.: Между отменой препарата и назначением ингибитора МАО и наоборот должно пройти не менее 2 нед. Больным с нарушением функции печени следует назначать в меньшей дозе или с меньшей кратностью. С осторожностью использовать у пациентов с нарушениями функции почек. После начала лечения рекомендуется контролировать уровень лития в плазме.

Произв.: Pfizer (США)

Зоран (Zoran)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ранитидина гидрохлорида 150 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H_2 -гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, системный мастоцитоз и др.), гастро-эзофагальный рефлюкс, профилактика острых стрессовых язв ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, обострение панкреатита, головная боль, головокружение, нарушения сна.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1 таблетке 2 раза в день или 300 мг однократно перед сном: поддерживающая доза - 1 таблетка на ночь. При синдроме Золлингера-Эллисона - до 6 г в сутки.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Зофран® (Zofran®)

Ондансетрон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ондансетрона (в виде дигидрата гидрохлорида) 4 или 8 мг.

1 мл раствора для инъекций - 2 мг; в ампулах по 2 и 4 мл.

Фарм. действ.: Противорвотное (блокада центральных и периферических $5HT_3$ -рецепторов).

Фармакокин.: При пероральном введении биологическая доступность - 60%. t_{max} в плазме - 1,5 ч. Связывание с белками плазмы - 70-76%. Элиминируется, главным образом, путем биотрансформации (менее 5%, выводится почками в неизменном виде). $T_{1/2}$ (для таблеток, инъекций) - 3 ч (у пожилых - до 5 ч).

Показ.: Тошнота и рвота, вызванные цитотоксической химио- и/или радиотерапией, послеоперационная тошнота и рвота (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности (если ожидаемый результат не превышает воз-

можный риск для плода). Грудное вскармливание прекращают.

Поб. действ.: Головная боль, ощущение тепла и прилива крови к лицу, запор, преходящее увеличение аминотрансфераз, нарушения зрения, головокружение (при быстром в/в введении), судорожные припадки, боли в грудной клетке, аритмии, гипотензия, брадикардия, аллергические реакции (вплоть до анафилактических).

Примен. и доз.: При эметогенной химио- или радиотерапии - в/в, медленно - 8 мг до начала лечения или внутрь 8 мг за 1-2 ч до проведения лечения, затем - через 12 ч 8 мг внутрь. Для предупреждения рвоты через 24 ч после окончания лечения - 8 мг 2 раза в сутки (до 5 дней после окончания курса химиотерапии). При высокоэметогенной химиотерапии возможны 3 режима введения: I - однократно 8 мг в виде медленной в/в инъекции непосредственно перед проведением химиотерапии; II - доза 8 мг медленно в/в перед проведением химиотерапии, затем - 2 раза в/в медленно в дозе 8 мг с интервалом 2-4 ч, или в/в капельно в дозе 1 мг/ч в течение 24 ч; III - однократная доза 32 мг, разведенная в 50-100 мл физиологического раствора в/в, вводимая не менее, чем в течение 15 мин непосредственно до начала химиотерапии. Для предотвращения рвоты в последующие дни - 8 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 дней после химиотерапии. Детям - однократная в/в инъекция в дозе 5 мг/кв.м непосредственно перед химиотерапией, затем - 4 мг внутрь через 12 ч. Для профилактики рвоты - 4 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 дней после химиотерапии. Для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты взрослым - внутрь 16 мг за 1 ч до анестезии или 4 мг в/в медленно или в/м во время индукции анестезии. Для купирования рвоты - 4 мг в/м или в/в медленно; детям - 0,1 мг/кг (максимально - до 4 мг) в/в медленно до, во время или после индукции анестезии, для купирования рвоты - 0,1 мг/кг (до 4 мг) в/в медленно.

Предост.: При выраженной печеночной недостаточности не следует превышать суточную дозу - 8 мг. Не рекомендуется вводить в одном шприце с другими препаратами.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Ибуклин (Ibucilin)**Ибуклин юниор (Ibucilin junior)***Общее описание*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ИБУКЛИН содержит ибупрофена 400 мг и парацетамола 325 мг, 1 ароматизированная и диспергируемая таблетка ИБУКЛИН ЮНИОР - 100 и 125 мг активных веществ соответственно; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Слабый и умеренный болевой синдром различного происхождения (головная и зубная боль, невралгия, боль при остеохондрозе позвоночника, артралгия, миалгия, тендовагинит, бурсит, боль при травматическом повреждении мышц, связок, сухожилий); лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях, заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (тонзиллит, фарингит, трахеобронхит, синусит, отит); артриты (ревматоидный артрит, включая ювенильный, анкилозирующий спондилит, подагрический артрит, ревматизм), дисальгоменорея, аднексит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвы ЖКТ, "аспириновая" астма, тяжелая почечно-печеночная недостаточность, заболевания зрительного нерва, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, лактация.

Поб. действ.: Обусловлены ибупрофеном: диспепсия (тошнота, анорексия, рвота, диарея, гастралгия), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, кровотечение из ЖКТ, снижение зрения. Анемия, тромбоцитопения, поражение почек и печени (при передозировке), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, до или через 2-3 ч после еды (при диспепсии, обусловленной приемом препарата, сразу после еды). Ибуклин (взрослым) - по 1 таблетке 4 раза в сутки. Ибуклин Юниор (детям до 12 лет) - по 20 мг на 1 кг массы тела (в пересчете на ибупрофен) в 3-4 приема; 1 таблетку предварительно растворяют в 1 чайной ложке (5 мл) воды.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Ибупрофен (Ibuprofenum)**Ибупрофен***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ибупрофена 200 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, анкилозирующий спондилит, подагра, боли в позвоночнике, невралгии, миалгии, бурсит, радикулит, травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, аднексит, проктит; инфекционно-воспалительные заболевания (вспомогательное средство).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, "аспириновая" астма, нарушения кроветворения, амблиопия, нарушение цветового зрения, выраженные нарушения функции почек и печени, детский возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, анорексия, метеоризм, запор, изжога, диарея, головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница, кожные аллергические реакции, нарушения зрения. Редко - эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. При ревматоидном артрите - по 0,8 г 3 раза в сутки; при остеоартрозе и анкилозирующем спондилите - по 0,4-0,6 г 3-4 раза в сутки, при ювенильном ревматоидном артрите - по 30-40 мг/кг в сутки в несколько приемов. При травмах мягких тканей, растяжениях - 1,6-2,4 г в сутки в несколько приемов. При умеренном болевом синдроме - 1,2 г в сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Акрихин (Россия); Олайнфарм (Латвия)

Ибупрофен (Ibuprofen)**Ибупрофен***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит ибупрофена 0,2 г; в контурной ячейковой упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоревматическое, противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, ингибирование биосинтеза простагландинов, стимуляция образования интерферона.

Показ.: Ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, анкилозирую-

ший спондилит, ревматоидные заболевания, болевой синдром при воспалительных поражениях периферической нервной системы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), язвенный колит, скотома, амблиопия, нарушение цветного зрения, цирроз печени с портальной гипертензией, беременность, лактация.

Поб. действ.: Изжога, тошнота, рвота, метеоризм, потливость, нарушение цветного зрения, скотома, амблиопия, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 0,2 г 3-4 раза в сутки. Для достижения быстрого эффекта - до 0,4 г 3 раза в сутки. Суточная доза - 0,8-1,2 г; при достижении лечебного эффекта дозу уменьшают до 0,6-0,8 г в сутки.

Предост.: При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гастритах, энтеритах, колитах и гепатитах (в т.ч. в анамнезе) необходим постоянный контроль функционального состояния ЖКТ и печени. При нарушениях зрения следует отменить или уменьшить дозу. С осторожностью назначают пациентам пожилого возраста, в комбинации с производными 4-оксикумарина.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Ибупрофен Ланнахер (Ibuprofen Lannacher)

Ибупрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ибупрофена 400 или 600 мг; в упаковке 30 и 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгетическое, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, псориатический артрит; невралгия, миалгия, тендинит, бурсит, радикулит, периартрит, травматические повреждения мягких тканей и опорно-двигательного аппарата; боли (послеоперационная, головная, зубная), дисменорея, простуда, грипп (болевые ощущения и повышение температуры).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в стадии обострения, заболевания зрительного нерва, "аспириновая" бронхиальная астма, выраженные нарушения

функции печени и почек, детский возраст.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, раздражительность, шум в ушах, ухудшение слуха, бессонница, патологическая сонливость; тошнота, изжога, анорексия, рвота, ощущение дискомфорта в эпигастрии, метеоризм, понос, запоры; периферические отеки, токсическая амблиопия, нарушение функции почек с задержкой натрия и воды, аллергические реакции, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды. Остеоартроз, псориатический артрит, спондилит - по 400-600 мг 3-4 раза в сутки. Ревматоидный артрит - до 800 мг 3 раза в день, в сутки - 2400 мг (максимально). Ювенильный ревматоидный артрит - 30-40 мг/кг массы тела в сутки в несколько приемов. Травмы мягких тканей, растяжения - 1600-2400 мг в несколько приемов. Первичная дисменорея - 400-600 мг 3-4 раза в сутки. Умеренный болевой синдром - 1200 мг в сутки за несколько приемов.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Ибусан (Ibusan)

Ибупрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ибупрофена 200 или 400 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, псориатический артрит, невралгия, радикулит, миалгия, тендинит, бурсит, травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, головная боль, зубная боль.

Противопоказ.: Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, нарушение функции печени, почек, заболевания зрительного нерва, "аспириновая" астма, нарушение кроветворения.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, анорексия, рвота, дискомфорт в области эпигастрия, диарея, эрозивно-язвенное поражение ЖКТ, головная боль, нарушение сна, нарушение зрения, асептический менингит, бронхоспастический синдром, гиперемия, жжение, кожная сыпь.

Взаим.: Уменьшает эффект фуросемида.

Примен. и доз.: Внутрь (лучше после еды) - по 400-600 мг 3-4 раза в сутки, максимальная доза - 2400 мг.

Предост.: Необходим контроль за функцией печени, почек, картиной крови.

Пронзв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Ивадал® (Ivadal®)

Золпидем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая), покрытая оболочкой, содержит золпидема гемитартрата 10 мг; в блистерной упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, анксиолитическое, седативное, противосудорожное, миорелаксантное.

Показ.: Бессонница (аномальная, транзиторная, хроническая).

Противопоказ.: Детский возраст (до 15 лет), беременность, лактация.

Поб. действ.: Спутанность сознания, нарушения памяти (антероградная амнезия), нарушения зрительного восприятия, кошмарные сновидения, сонливость, головные боли, головокружение, нарушения походки, возбуждение, бессонница (ночная или после прекращения лечения), боли в животе, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, зуд; при длительном использовании не исключено развитие зависимости.

Взаим.: Усиливает (взаимно) эффект других средств, угнетающих ЦНС, несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, непосредственно перед сном, однократно, доза устанавливается индивидуально. Пациентам до 65 лет - обычно 10 мг (1 таблетка), при необходимости - по 15-20 мг (1,5-2 таблетки); пациентам старше 65 лет - по 5 мг, при необходимости - не более 10 мг. Длительность лечения: аномальная бессонница - 2-5 дней; транзиторная - 2-3 нед; хроническая - определяется только врачом.

Предост.: С осторожностью назначать пациентам с дыхательной или печеночной недостаточностью, миастенией, работающим с техникой и транспортными средствами. Лечение следует прекращать постепенно (во избежание проявлений синдрома отмены).

Пронзв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Изиком (Isicom®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит леводопы 0,25 г и карбидопы 0,025 г.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, дофамин-миметическое.

Фармакодин.: Противопаркинсоническое действие обусловлено превращением в ЦНС леводопы под влиянием дофа-декарбоксилазы в дофамин. Для снижения

побочных эффектов, обусловленных образованием в периферических тканях избытка дофамина, в состав препарата включена карбидопа - ингибитор периферической дофа-декарбоксилазы.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм (за исключением вызванного нейрорептиками).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени, почек, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, психозы, закрытоугольная глаукома, меланома, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, ulcerогенный эффект, ортостатическая гипотония, аритмии, самопроизвольные движения, нарушение сна, ажитация, головокружение, депрессии (редко), лейкопения, тромбоцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозы подбираются строго индивидуально, начальные дозы - 0,15-0,25 г леводопы и 0,015-0,025 г карбидопы (1/2-1 таблетка). Максимальная суточная доза по леводопе - 1-4 г.

Пронзв.: Schwarz Pharma (Германия)

Изо Мак ретард (Iso Mack® retard)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула пролонгированного действия содержит изосорбида динитрата 20, 40 или 60 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее (пролонгированное).

Фармакокин.: Быстро всасывается после перорального приема, превращается в активные метаболиты (изосорбид-2-мононитрат и изосорбид-5-мононитрат), имеющие более длительный период полуэлиминации, что обеспечивает пролонгацию эффекта.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов), нарушения коронарного кровообращения, сердечная недостаточность (вазодилатационная терапия), постинфарктный период.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, острая недостаточность левого желудочка сердца, гипотензия, коллапс, шок, повышенное внутричерепное давление.

Бер. и корм. гр.: Осторожно применять при беременности.

Поб. действ.: Головная боль, беспокойство, жар, гиперемия лица, тахи- или брадикардия, гипотензия, ортостатичес-

кие расстройства, тошнота, рвота, цианоз, нарушения дыхания, атаксия. Через несколько дней после начала лечения побочные эффекты, как правило, не проявляются.

Взаим.: Усиливает эффекты фенотиазинов, алкоголя, антигипертензивных средств, снижает - миотических препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, не размельчая, не разжевывая и запивая большим количеством жидкости, по 20 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) или по 40-60 мг 1 раз в сутки (в одно и то же время).

Предост.: Слишком частое назначение и высокие дозы могут вызывать развитие толерантности; в этом случае рекомендуется отменить препарат на 24-36 ч. С осторожностью назначать для вазодилатационной терапии при сердечной недостаточности (необходимо тщательное наблюдение). Не следует комбинировать с другими нитратами (увеличение частоты нежелательных реакций).

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Изодибут (Isodibutum)

Изодибут

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изодибута 0,5 г; во флаконах оранжевого стекла по 50 шт.

Фарм. действ.: Ингибция альдозоредуктазы.

Показ.: Осложнения сахарного диабета (профилактика и лечение) - ангиопатия, нейропатия, диабетическая катаракта.

Противопоказ.: Тяжелые заболевания печени и почек.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, по 1 таблетке 3-4 раза в день, суточная доза - 4,0 г. Курс лечения - 3 мес.

Произв.: Фармак (Украина)

Изокал (Isocal)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 425 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (в разведении 1,0 ккал/мл) содержит белка 32,5 г, жиров 42 г, углеводов 125,7 г, минеральных веществ (общее количество) 6 г, ретинола 2500 МЕ, эргокальциферола 200 МЕ, токоферола 37 МЕ, фитоменадиона 125 мкг, аскорбиновой кислоты 150 мг, тиамина 1895,7 мкг, рибофлавина 2,13 мг, никотиновой кислоты (ниацина) 25 мг, пантотеновой кислоты 12,5 мг, пиридоксина 2,5 мг, цианокобаламина 7,45 мкг,

фолиевой кислоты 200,2 мкг, биотина 149,1 мкг, холина 250,1 мг, кальция 600,7 мг, фосфора 500,5 мг, магния 200,2 мг, цинка 10 мг, меди 1001 мкг, марганца 2,5 мг, натрия 500,5 мг, йода 74,55 мкг, калия 1250,3 мг, железа 8,9 мг, хлоридов 1001 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Фармакодин.: Оказывает положительное влияние на азотистый баланс, уменьшает потерю массы тела, снижает количество послеоперационных осложнений, стимулирует моторику кишечника, повышает эффективность медикаментозной терапии. Восполняет дефицит белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов, железа, не вызывает диарею. Легко усваивается за счет изотоничности (осмоляльность 270 мОсм/кг воды), отсутствия лактозы, содержания жиров (20%) в виде среднецепочечных триглицеридов, содержания углеводов в виде мальтодекстрина, содержания высококачественного гипоаллергенного белка (65 г изолята белка сои и казеина на 2000 ккал). Обеспечивает суточную потребность в витаминах и минеральных веществах, содержит дополнительные к суточной потребности количества витаминов С, Е и группы В. Количество ионов натрия снижено до 1000 мг на 2000 ккал, что особенно важно в первые дни посттравматического и послеоперационного периодов (сопровождаются задержкой натрия).

Показ.: Белково-энергетическая недостаточность (коррекция, профилактика) у взрослых и детей старше 3-х лет при состояниях, когда естественное питание невозможно или недостаточно: при травмах (ожоговой, черепно-мозговой, сочетанной) - в периоде интенсивной терапии и при дальнейшем лечении; при оперативных вмешательствах на органах ЖКТ (резекции желудка, участков тонкой или толстой кишки, операции на пищеводе, операции, заканчивающейся наложением гастро- или еюностом) - в послеоперационном периоде; при осложнениях послеоперационного периода - свищи ЖКТ, перитонит, медиастинит, несостоятельность швов анастомозов; при онкологических заболеваниях, сопровождающихся недостаточностью питания, особенно при проведении химио- и лучевой терапии; при острых и хронических радиационных поражениях; при острых экзогенных отравлениях, в пе-

риоде интенсивной терапии и при дальнейшем лечении.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (дл 3 лет).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Сухое вещество растворяют в различных объемах (в зависимости от требуемой концентрации смеси) кипяченной и охлажденной до 40 град.С воды. Для получения 1 л смеси калорийностью 1 ккал/мл необходимо 213 г сухого вещества добавить к 845 мл воды. Возможно приготовление смеси калорийностью 0,5 ккал/мл, 1,5 ккал/мл, 2 ккал/мл. Применение смеси рекомендуется начинать с низких концентраций и небольших объемов и/или медленной скорости введения. Режим кормления устанавливается индивидуально с учетом возраста и состояния пациента. Возможно введение смеси через зонд в постоянном капельном режиме питания со скоростью 1-2 мл/мин и в прерывистом капельном режиме (перерыв между введениями определенных порций смеси составляет около 1,5 ч). В связи с низкой вязкостью смеси возможно гравитационное и помповое ее введение, а также использование метода порционного (внутрижелудочное и внутрикишечное) введения смеси при помощи шприца.

Предост.: У больных с почечной и печеночной недостаточностью может быть использован в ограниченном объеме. При проведении зондового питания следует тщательно следить за балансом воды и по показаниям дополнительно вводить воду. Разведенную смесь препарата необходимо использовать в течение 4-6 ч, оставшуюся приготовленную смесь следует хранить в холодильнике (не более 24 ч).

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Изокет (Isoket®)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит изосорбида динитрата 20, 40, 60 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

1 капсула ретард - 120 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

1 ампула с раствором для инфузий содержит 10 мг изосорбида динитрата в 10 мл изотонического стерильного раствора хлорида натрия; в упаковке 10 шт. 1 г крема содержит изосорбида динитрата 100 мг; в пластмассовых флаконах по 50 г.

12,7 г (15 мл) аэрозоля содержат изосорбида динитрата 375 мг; при одном

нажатии на распылитель высвобождается 1,25 мг изосорбида динитрата (1 доза).

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное.

Фармакодин.: Эффект обусловлен снижением потребности миокарда в кислороде за счет уменьшения преднагрузки (расширение периферических вен и уменьшение притока крови к правому предсердию) и постнагрузки (уменьшение периферического сосудистого сопротивления), а также прямым коронаролитическим действием; снижает давление в малом круге кровообращения.

Показ.: Нестабильная и вазоспастическая стенокардия, острый инфаркт миокарда, острая левожелудочковая недостаточность.

Противопоказ.: Острая циркуляторная недостаточность (шок, сосудистый коллапс), выраженная гипотензия (систолическое АД ниже 95 мм рт.ст.), кардиогенный шок (при одновременном использовании препаратов с положительным инотропным действием и внутриартериальной баллонной контрпульсацией).

Поб. действ.: Головная боль, сонливость, гиперемия, ортостатическая гипотензия, тахикардия, коллапс на фоне брадикардии (единичные случаи).

Взаим.: Эффект усиливается другими вазодилататорами (антагонисты кальция, дигидроэрготамин), циклическими антидепрессантами, алкоголем.

Примен. и доз.: Дозы подбираются индивидуально в соответствии с клиническими и гемодинамическими показателями. В/в - раствор для инфузий: начальная доза 1-2 мг/ч, далее постепенно повышается. Максимальная суточная - 8-10 мг/ч. Больным с сердечной недостаточностью - до 50 мг/ч. Продолжительность лечения - до 3 дней и более. Внутрь, после еды, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости, - таблетки: рекомендуемая схема - изокет-ретард 20 мг по 1 таблетке 2-3 раза в день, изокет-ретард 40 мг - по 1 таблетке 2 раза в день, изокет-ретард 60 мг - по 1 таблетке 1-2 раза в день; капсулы ретард 120 мг - по 1 капсуле 1 раз в день. Накожно - 1 г крема, 2 дозы наносятся на поверхность кожи груди, предплечий, живота. Минимальная площадь - 20x20 см (2 ладони). После использования крема следует вымыть руки, т.к. попадание крема на слизистые вызывает сильное ощущение холода; окрашивает ткани в желтый цвет. Аэрозоль: разовая доза с лечебной целью 1-3

впрыскивания с 30-секундными интервалами, при проведении вмешательств 1-2 инъекций.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Изолипан (Isolipan®)

Дексфенфлурамин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит дексфенфлурамина 15 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Анорексигенное, серотонинстимулирующее (увеличение освобождения и торможение обратного захвата серотонина).

Фармакокин.: Полностью абсорбируется. Стах - через 4 ч, равновесная концентрация (0,04 мг/мл) - через 4 дня. Связь с белками плазмы - 36%. $T_{1/2}$ - 18 ч. Метаболизируется с образованием активного метаболита (норфенфлурамин). Cl - 45 л/ч. Выводится почками.

Клин. фарм.: В отличие от амфетаминных анорексигенных препаратов не вызывает повышения АД, не обладает психостимулирующим действием - к нему не развивается зависимость.

Показ.: Ожирение (в т.ч. резистентное к лечению другими препаратами).

Противопоказ.: Глаукома, депрессия и психогенная анорексия (даже в анамнезе), фармакомания, алкоголизм.

Бер. и корм. гр.: Следует избегать приема препарата в течение первых трех месяцев беременности.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, запор, диарея, учащенное мочеиспускание, головокружение, головная боль, астения, нарушения настроения, раздражительность, реактивная депрессия, сонливость или бессонница.

Взаим.: Несовместим с анорексигенными средствами центрального действия и ингибиторами МАО. Потенцирует эффект седативных и гипотензивных препаратов, гипотензивное действие трициклических антидепрессантов и гипогликемический эффект сульфаниламидов.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле (предпочтительно во время еды) утром и вечером в течение 3 мес.

Предост.: Осторожно назначать больным с нарушениями сердечного ритма, печеночной и почечной недостаточностью.

Произв.: Servier (Франция)

Изолонг (Isolong®)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула с микрогранулами пролонгированного действия содержит

изосорбида динитрата 20 или 40 мг; в упаковке 20, 60 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее, снижение потребности миокарда в кислороде и гемодинамической нагрузки на сердце.

Показ.: Стенокардия (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая форма анемии.

Бер. и корм. гр.: При назначении препарата беременным и кормящим матерям следует сопоставить риск и терапевтическую пользу.

Поб. действ.: Тахикардия, ортостатическая гипотензия, обморок, непроизвольное мочеиспускание, коллапс, головная боль, головокружение, беспокойство, диспептические явления, покраснение кожи.

Передоз.: Симптомы: быстрое падение артериального давления, обморок, головная боль, головокружение, сердцебиение, зрительные расстройства, покраснение и перспирация кожи, тошнота и рвота (возможно с коликами или кровавым поносом), метгемоглобинемия с цианозом и аноксией, гиперпноэ, диспноэ, брадикардия, блокада, повышение внутричерепного давления, паралич, кома. Возможна смерть вследствие циркуляторного коллапса. Лечение: провести промывание желудка. Больной должен находиться в тепле. Пассивные движения конечностей могут способствовать венозному оттоку. При необходимости следует дать кислород. В случае возникновения метгемоглобинемии назначить метиленовый синий (1% раствор) внутривенно 1-2 мг/кг. Адреналин и родственные ему соединения противопоказаны.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле с 12-часовым интервалом (утром и вечером). В тяжелых случаях - по 1 капсуле каждые 8 ч.

Предост.: С осторожностью применяют при кровоизлиянии в мозг, черепно-мозговой травме, ортостатической гипотензии, гипертиреозе. При длительном применении может развиваться толерантность. Отмена препарата на неделю и затем повторное использование может восстановить его эффективность.

Произв.: CTS (Израиль)

Изомонат (Isomonat®)

Изосорбида мононитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изосорбида-5-мононитрата 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, венодилатирующее, артериодилатирующее, уменьшение пред- и постнагрузки на сердце, уменьшение давления в легочной артерии.

Фармакокин.: Быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Биодоступность - около 100%. Биотрансформация: денитрируется (с образованием изосорбида) или глюкоронируется. Выводится практически полностью почками. $T_{1/2}$ - 5 ч.

Клин. фарм.: Действие наступает примерно через 20 мин, максимальное - через 1 ч.

Показ.: Стенокардия, недостаточность кровообращения, подострый период инфаркта миокарда, легочная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная гипотония, шок, острый инфаркт миокарда с низким давлением в легочной артерии, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (только по серьезным показаниям).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, не разжевывая, с достаточным количеством жидкости, в индивидуальной дозе. В первые два дня - по 1/2 таблетки 2 раза в день, начиная с 3-4-го дня - по 1 таблетке 2 раза в день, при необходимости увеличивая дозу до 3-4 таблеток в день.

Предост.: С осторожностью назначают при повышенном внутричерепном давлении.

Произв.: Boehringer Mannheim (Германия)

Изониазид (Isoniazidum)

Изониазид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изониазида 0,1 или 0,3 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противотуберкулезное, бактериостатическое.

Показ.: Туберкулез всех форм и локализаций у взрослых и детей (обязательно в комбинации с другими противотуберкулезными препаратами); профилактика туберкулеза.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; эпилепсия, склонность к судорогам, легочно-сердечная недостаточность III степени, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, бронхиальная астма, заболевания нервной системы, гипотиреоз, псориаз, почечная недостаточность, гепатит, цирроз печени, флебиты, беременность.

Бер. и корм. гр.: При беременности доза не должна превышать 10 мг/кг.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, раздражительность, эйфория, нарушение сна, парестезии, полиневрит, психозы, эпилептиформные припадки, сердцебиение, боли за грудиной, артериальная гипертензия, токсический гепатит, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Для лечения препарат назначают внутрь, после еды - по 0,6-0,9 г/сутки; детям по 5-15 мг/кг в сутки. Суточную и курсовую дозу устанавливают для каждого больного индивидуально. С целью профилактики - 5-10 мг/кг (на 2 приема) в сутки в течение 2 мес.

Предост.: Для уменьшения побочных эффектов одновременно назначают пиридоксин (внутрь или в/м) или глутаминовую кислоту (внутрь).

Произв.: Акрихин (Россия); Санитас (Литва)

Изоптин (Isoptin®)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл инъекционного раствора содержит верапамила гидрохлорида 5 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 40 и 80 мг.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антиаритмическое, гипотензивное.

Показ.: Коронарная недостаточность, стенокардия, инфаркт миокарда, тахикардии, экстрасистолия, артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Кардиогенный шок, осложненный острый инфаркт миокарда, нарушения проводимости, синдром слабости синусового узла.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Нарушения ритма и проводимости миокарда, сердечная недостаточность, гипотензия, отеки, миалгия, артралгия, аллергические реакции и др.

Взаим.: Несовместим с бета-адреноблокаторами. Усиливает гипотензию при совместном назначении с другими гипотензивными средствами.

Примен. и доз.: Внутрь и в/в. Внутрь - по 40-80 мг 3-4 раза в день после еды. Поддерживающая доза может применяться длительный период. В/в, медленно - 2-4 мл 0,25% раствора 2-3 раза в день.

Произв.: Knoll (Германия)

Изоптин SR 240 (Isoptin® SR 240)

Верапамил*

Изоптин CP (Isoptin® SR)

Верапамил*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит верапамила гидрохлорида 240 мг; в упаковке 20 или 100 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 120 мг.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, вазодилатирующее, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Фармакокин.: Быстро и полностью (90-92%) всасывается в тонком кишечнике. Почти весь метаболизируется. Период полувыведения после однократного приема составляет от 3 до 7 ч (при многократном - увеличивается в 2 раза). Выводится в основном почками (кишечником - около 16%). Проходит плацентарный барьер, содержится в грудном молоке (однако концентрация мала).

Показ.: Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, мерцательная тахикардия (пароксизмальная наджелудочковая тахикардия).

Противопоказ.: Кардиогенный шок, острый осложненный инфаркт миокарда (с явлениями брадикардии, гипотонии, левожелудочковой недостаточности), АВ-блокада II-III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью (особенно в первый триместр).

Поб. действ.: Синусовая брадикардия, синоатриальная блокада, асистолия, АВ-блокада, брадикардия, гипотония; сердечная недостаточность, головокружение, головная боль, слабость, заторможенность, раздражительность, парестезии, тошнота, запоры, отеки, артралгия, миалгия, приливы; аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффекты бета-адреноблокаторов, ингаляционных анестетиков, антиаритмиков, миорелаксантов. Потенцирует гипотензивный эффект других антигипертензивных средств, нейротоксическое действие карбамазепина и препаратов лития. Не сочетать с в/в введением бета-адреноблокаторов. Уровень в плазме снижают рифампицин,

фенитоин и фенобарбитал. Повышает циметидин.

Передоз.: Симптомы: гипотония, шок, потеря сознания, АВ-блокада I и II степени, полная АВ-блокада, атриовентрикулярный ритм при выпадении функции синусового узла, асистолия, синусовая брадикардия, синоатриальная блокада. Лечение: промывание желудка, индуцирование рвоты, отсасывание содержимого желудка и кишечника под эндоскопическим контролем, очистительные клизмы. В качестве специфического антидота - в/в 10-20 мл 10% раствора глюконата кальция, при необходимости повторяют или проводят дополнительную капельную инфузию (5 ммоль/ч).

Примен. и доз.: Внутрь (не разжевывая) после еды, запивая небольшим количеством жидкости, 240-360 мг (дозу подбирают индивидуально). При длительной терапии суточная доза не должна превышать 480 мг. Обычно назначают утром по 240 или 120 мг (если желательно медленное снижение АД). Возможен дополнительный прием 120-240 мг вечером. Повышать дозу следует не ранее, чем через 2 нед терапии.

Предост.: Лучше воздержаться от вождения транспортных средств (торможение реакции).

Произв.: Knoll (Германия)

Изофан Инсулин ЧМ (Isofan Insulin HM)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит человеческого инсулина (биосинтетического происхождения) 40 МЕ; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 1-2 ч после введения, достигает максимума к 6-12 ч и продолжается 18-24 ч.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет: при аллергии на др. виды инсулина, для интенсифицированной инсулиновой терапии (безыгольные инъекторы, стандартные и ПЕН шприцы и др.), для аппаратов с особым назначением (искусственная поджелудочная железа и др.); пациентам с выраженными сосудистыми осложнениями диабета; инсулиннезависимый диабет (комбинированная терапия с пероральными сахароснижающими препаратами, временная инсулинотерапия).

Противопоказ.: Гипогликемические состояния, кома.

Поб. действ.: Гипогликемия (чувство голода, переутомления, тремор); аллергические реакции, липодистрофия.

Примен. и доз.: П/к, в/м. Дозировка определяется лечащим врачом. Содержимое флакона перед употреблением хорошо взбалтывают и вводят сразу после наполнения шприца. Дозировка определяется лечащим врачом.

Предост.: Не следует вводить в одно и то же место. При одновременном приеме с быстродействующим раствором инсулина человека в шприц набирают сначала Инутрал ХМ. С осторожностью используют при почечной недостаточности, на фоне инфекций, при гипопитуитаризме, беременности, у лиц старше 65 лет.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Илетин II Ленте (Iletin II Lente)

Инсулин цинк суспензия составная*

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций содержит инсулина 40 или 100 ЕД/мл; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 1-3 ч, достигает максимума через 6-12 ч и продолжается 18-26 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Поб. действ.: Гипогликемия, аллергические реакции, липодистрофия (в месте введения).

Примен. и доз.: П/к. Доза устанавливается индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Илетин II НПХ (Iletin II NPH)

Инсулин изофан*

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций содержит инсулина 100 или 400 ЕД/мл; во флаконе по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 3-6 ч, достигает максимума через 14-20 ч и продолжается 24-36 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия.

Примен. и доз.: П/к (или в/м). Дозы и количество инъекций устанавливают индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Илетин II Регуляр (Iletin II Regular)

Инсулин нейтрал для инъекций*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит инсулина 40 или 100 ЕД; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Начало действия - через 30 мин после введения, максимум - 2-4 ч, длительность - 6-8 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: П/к, 1-2 раза в сутки, в/в - дозы подбираются индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Илозон (Ilozone®)

Эритромицин*

Сост. и ф.в.: 5 мл суспензии для приема внутрь содержат эритромицина эстолата 125 или 250 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей, инфекции, вызванные *Listeria monocytogenes*, первичный сифилис, дифтерия (как дополнение к антитоксину), коклюш, эритразма, кишечный амёбиаз, хламидиоз (конъюнктивит новорожденных, пневмония у детей и мочеполовые инфекции у беременных, вызванные *Chlamydia trachomatis*). Профилактика бактериального эндокардита у больных с врожденными пороками сердца при проведении стоматологических или хирургических (на верхних дыхательных путях) процедур (при повышенной чувствительности к пенициллину).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно только в случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, нарушения функции печени, холестатический гепатит, желтуха, поражения слуха, аритмия, суперинфекция, аллергические реакции.

Взаим.: Повышает уровень теофиллина, дигоксина в сыворотке крови. Усиливает действие пероральных антикоагулянтов, эрготамина, дигидроэрготамина. Уменьшает клиренс триазолама и мидазолама. Повышает концентрацию в сыворотке крови карбамазепина, циклоспорина, гексобарбитала, фенитоина, альфента-

нила, дизопирамида, ловастатина и бромкриптина.

Примен. и доз.: Внутрь, 250 мг каждые 6 ч (до 4 г и более в сутки), детям - по 30-50 мг/кг в несколько приемов. При стрептококковых инфекциях - по 20-50 мг/кг в день в несколько приемов. Курс при лечении инфекций, вызванных стрептококками группы А, - не менее 10 дней. При первичном сифилисе - 20 г дробными дозами в течение 10 дней. При амебной дизентерии взрослым - по 250 мг 4 раза в день, детям - 30-50 мг/кг в сутки в течение 10-14 дней; при коклюше - 40-50 мг/кг в сутки в течение 5-14 дней. При конъюнктивите новорожденных - 50 мг/кг в день суспензии в 4 приема в течение не менее 2 нед. При детской пневмонии - 50 мг/кг в сутки суспензии в 4 приема в течение не менее 3 нед. При мочеполовых инфекциях во время беременности - 500 мг 4 раза в день в течение не менее 7 дней. Для профилактики бактериального эндокардита - 1 г (20 мг/кг для детей) за 1 ч до процедуры, повторно - 500 мг (10 мг/кг для детей) через 6 ч после процедуры.

Предост.: Не рекомендуется одновременное назначение с астемизолом, терфенадином, линкомицином или клиндамицином.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Имигран® (Imigran®)

Суматриптан*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит суматриптана 50 или 100 мг (в виде сукцината).

1 мл инъекционного раствора - 12 мг; в шприцах предварительного заполнения по 0,5 мл (также и в комплекте с аутоинжектором).

Фарм. действ.: Противомигренозное.

Фармакодин.: Взаимодействует с 5-гидрокситриптаминавыми рецепторами 1 типа, расположенными в гладкой мускулатуре стенок черепных кровеносных сосудов и избирательно суживает сосуды в системе сонных артерий, снижает болевой синдром при мигрени, обусловленный расширением внемозговых сосудов.

Клин. фарм.: Эффект наступает через 10-15 мин после п/к инъекции и через 30 мин после перорального приема.

Показ.: Купирование приступов мигрени (с аурой или без нее) и мигрени Хортона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: При беременности следует принимать в случае, если ожи-

даемая польза для матери превышает возможный риск для плода; с осторожностью назначать кормящим женщинам.

Поб. действ.: Ощущение покалывания, тепла, тяжести, давления или сжимания в любой части тела, внезапное покраснение, головокружение, слабость, сонливость, повышение АД, тошнота, рвота, изменение функциональных печеночных проб, боль в месте инъекции.

Передоз.: В случае передозировки следует наблюдать больного в течение 10 ч, проводя симптоматическую терапию.

Примен. и доз.: Внутрь, п/к. Взрослые: мигрень - инъекция 6 мг, при необходимости (не менее, чем через 1 ч) еще 6 мг (максимальная доза - 12 мг в течение 24 ч), или по 100 мг (1 таблетка - проглатывают целиком, запивая водой), не более 3 таблеток за любой 24-часовой период (с интервалом между каждой дозой не менее 1 ч). Мигрень Хортона - п/к 6 мг при каждом приступе. Максимальная доза за 24 ч равна двум дозам по 6 мг.

Предост.: Не следует применять в профилактических целях. С осторожностью назначают при ишемической болезни сердца, нарушениях функции печени и почек, тяжелой форме гипертонической болезни и стенокардии Принцметала, вариантной стенокардии. Первые 2-3 назначения проводить под наблюдением врача, т.к. возможен спазм коронарных артерий.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Имифос (Imiphosum)

Имифос

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит имифоса 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Эритремия.

Противопоказ.: Анемия, лейкопения, тромбоцитопения, кахексия.

Поб. действ.: Лейкопения, тромбоцитопения.

Примен. и доз.: В/м и в/в (в 10-20 мл изотонического раствора натрия хлорида) - по 50 мг через день; курсовая доза - 500-650 мг.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Иммунал (Immunal®)

Сост. и ф.в.: 100 мл 20% раствора этанола содержат 80 мл сока цветущей эхинацеи пурпурной; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, лейкопоэтическое, повышение фагоцитарной активности, противовирусное, жаропонижающее.

Показ.: Повышение неспецифического иммунитета при повторяющихся простудах, профилактика простудных заболеваний и гриппа, предупреждение иммунодефицита при длительной терапии антибиотиками.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагенозы, возраст (до 1 года).

Примен. и доз.: Внутрь, растворив в небольшом количестве жидкости, по 20 капель (перед употреблением флакон необходимо несколько раз хорошо встряхнуть) 3 раза в день; в острой стадии заболевания начальная доза - 40 капель, затем - по 20 капель через 1-2 ч в течение 2 дней, далее - обычные дозы (20 капель 3 раза в день); детям до 6 лет - 5-10, от 6 до 12 лет - 10-15 капель 3 раза в день. Продолжительность курса - не менее 1 и не более 8 нед.

Произв.: Lek (Словения)

Иммуноглобулин (Immunoglobulin)

Иммуноглобулин

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит иммуноглобулина 1 или 3 г в комплекте с растворителем во флаконах по 16,5; 33; 100 и 200 мл соответственно и одноразовой системой для в/в капельного введения.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее.

Показ.: Гипогаммаглобулинемия, аутоиммунные заболевания, вирусные инфекции и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Тахикардия, тошнота, чувство подавленности, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с живыми вирусными вакцинами; фармацевтически несовместим (нельзя смешивать) с другими лекарственными средствами.

Примен. и доз.: В/в. При заместительной терапии - 0,1-0,3 г/кг каждые 3-4

нед; при аутоиммунных заболеваниях - 0,4 г/кг в сутки 2-5 дней; при инфекциях в неонатальном и перинатальном периоде - 0,5-1,0 г в сутки в течение 6 дней подряд.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Иммуноглобулин человека нормальный (Immunoglobulin humanum normale)

Сост. и ф.в.: 1 ампула содержит 1,5 мл раствора для инъекций; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее.

Показ.: Гипо- и агаммаглобулинемия, сниженная резистентность организма; профилактика гепатита А, кори, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита.

Противопоказ.: Тяжелые аллергические реакции на введение препаратов крови в анамнезе.

Поб. действ.: Анафилактический шок, гиперемия в месте введения.

Примен. и доз.: Препарат вводят только в/м в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы или в наружную поверхность бедра. Доза и кратность введения зависят от показаний к применению.

Предост.: Лицам, страдающим иммунопатологическими системными заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, нефрит и др.), препарат следует вводить на фоне соответствующей терапии. При беременности и кормлении грудью применяют только по назначению врача. Интервал между назначением препарата и прививками против кори и эпидемического паротита должен быть не менее 2-3 мес.

Произв.: Биомед им. И.И.Мечникова (Россия)

Имовакс Д.Т.Адюльт (Imovax D.T.Adult)

Сост. и ф.в.: 1 доза вакцины - 0,5 мл суспензии для инъекций - содержит 1 дозу для ревакцинации очищенного дифтерийного анатоксина и 1 дозу для ревакцинации очищенного столбнячного анатоксина. 1 доза дифтерийного анатоксина (представляет собой дозу, сниженную по сравнению с вакцинальной) соответствует 2 флоккулирующим единицам. 1 доза столбнячного анатоксина соответствует не менее 40 МЕ (при измерении протективной активности вакци-

ны в сравнении с международным стандартом ВОЗ или с другими стандартами, соответствующими международному эталону). Сорбент - гидроокись алюминия (в пересчете на алюминий - максимум 1,25 мг), консервант - тиомерсал (максимум - 0,05 мг). Суспензия для инъекций во флаконах по 10 или 20 доз.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против дифтерийного и столбнячного токсинов.

Фармакодин.: Иммунитет против дифтерии и столбняка усиливается через несколько дней после ревакцинации и сохраняется не менее 5 лет.

Клин. фарм.: Сниженное содержание дифтерийного анатоксина в вакцине позволяет избежать выраженных местных и общих реакций, иногда наблюдаемых у лиц, сенсibilизированных к дифтерийному токсину после одной или нескольких предшествующих вакцинаций.

Показ.: Вакцинация и ревакцинация для профилактики дифтерии и столбняка у подростков и взрослых (особенно, имеющих противопоказания к введению вакцин Д.Т.Вакс, Тетракок).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к составным компонентам вакцины, острые инфекционные заболевания, выраженная реакция на предыдущее введение вакцины.

Поб. действ.: Местные реакции (болезненность (редко), уплотнение и покраснение в месте инъекции). Общие реакции (незначительное повышение температуры тела в течение 24-48 ч после инъекции).

Примен. и доз.: П/к или в/м. Вакцинация: 3 инъекции по 1 дозе - 0,5 мл - с интервалом в 1 мес и ревакцинацией через 1 год. Последующие ревакцинации: 1 инъекция по 1 дозе - 0,5 мл - через каждые 5-10 лет. Перед использованием тщательно взболтать до получения однородной суспензии.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Имовакс Полио (Imovax Polio)

Сост. и ф.в.: Раствор для инъекций. 1 доза (0,5 мл) содержит инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита 1-го типа - 1 вакцинную дозу, инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита 2-го типа - 1 вакцинную дозу, инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита 3-го типа - 1 вакцинную дозу, 2-феноксиэтанола максимум 0,005 мл, формальде-

гида максимум 0,1 мг. Выпускается в шприцах или ампулах по 1 дозе; в упаковке 1, 10 и 20 шт. Одна доза инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита типов 1, 2 и 3 соответствует количеству антигена, удовлетворяющему нормам и требованиям теста антигенной активности, описанным во французской и европейской фармакопеях.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против полиовирусов.

Клин. фарм.: Иммунитет приобретается после 3-й инъекции вакцины, усиливается при последующих введениях препарата и сохраняется в течение минимум 5 лет после первой ревакцинации. Имовакс Полио вызывает выработку значительного количества вируснейтрализующих антител, начиная со 2-й инъекции, независимо от общего состояния вакцинируемых (иммунодефицит, кишечная патология, дистрофия). После введения 3-х доз вакцины сероконверсия наблюдается у 95-100% привитых.

Показ.: Профилактика полиомиелита, в том числе у лиц с противопоказаниями к применению "живой полиовакцины".

Противопоказ.: Аллергия к стрептомицину.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Вакцина Имовакс Полио может быть использована в комбинации с другими инъекционными формами вакцин: для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, инфекций, вызываемых *Haemophilus influenzae* типа b, и гепатита В.

Примен. и доз.: Вакцина вводится п/к или в/м. Первичная вакцинация - 3 инъекции с интервалом в 1 мес. Ревакцинация - через 1 год после завершения курса первичной вакцинации, затем - каждые 5-10 лет.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Имован (Imovane®)

Зопиклон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит зопиклона 7,5 мг; в упаковке 5 и 20 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, седативное.

Фармакокин.: $T_{1/2}$ - 5,5-6 ч, длительный прием не сопровождается кумуляцией (в т.ч. метаболитов).

Клин. фарм.: Обладая высокой степенью сродства к местам связывания на рецепторном комплексе ГАМК в ЦНС, быстро вызывает сон с нормальным фа-

зовым его составом; утром отсутствуют сонливость и разбитость. Нарушения функции почек не требуют снижения дозы. Резкое прекращение приема не вызывает эффектов отмены.

Показ.: Бессонница: затрудненное засыпание, ночные пробуждения, раннее пробуждение, вторичные нарушения сна при психических расстройствах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, декомпенсированная дыхательная недостаточность, возраст (до 15 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Ощущение горького и металлического вкуса во рту, тошнота, раздражительность, подавленное настроение, спутанность сознания, аллергические реакции (крапивница, сыпь), при пробуждении - сонливость, головокружение, нарушение координации (редко).

Взаим.: Снижает концентрацию триамина. Усиливает эффект алкоголя и других средств, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, перед сном - по 1 таблетке в течение не более 4 нед. У больных, страдающих тяжелой и стойкой бессонницей, доза может быть увеличена до 2 таблеток. Лечение лиц пожилого возраста следует начинать с более низкой дозы - 0,5 таблетки. В зависимости от эффективности и переносимости доза в дальнейшем может быть увеличена. У больных с выраженными нарушениями функции печени рекомендуемая доза составляет 0,5 таблетки.

Предост.: На следующий день после приема следует с осторожностью управлять автомобилем и работать с механизмами. Длительное применение, как и других снотворных, не рекомендуется. Необходимо избегать одновременного приема с алкоголем и средствами, угнетающими ЦНС.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Имогам Раж (Imogam Rabies)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит человеческого иммуноглобулина для профилактики бешенства со специфической активностью превышающей или эквивалентной 150 МЕ, тиомерсала не более 0,1 мг, глицина и натрия хлорида - q.s. (для обеспечения изотоничности, pH и стабильности), воды для инъекций q.s. до 1 мл; в ампулах по 2 или 10 мл.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее (формирование пассивного иммунитета

к вирусу бешенства, обеспечиваемого введением специфических антител).

Клин. фарм.: По сравнению с гетероспецифической пассивной иммунотерапией применение препарата с серопротективной целью имеет следующие преимущества: отсутствие риска сенсибилизации (гомологичные антитела), хорошая переносимость (в абсолютном большинстве случаев), большая длительность присутствия антител в организме и возможность достижения более высокой эффективности при использовании меньших терапевтических доз. Введение препарата непосредственно после инфицирования обеспечивает создание пассивного иммунитета к вирусу бешенства, увеличивает продолжительность инкубационного периода и этим способствует эффективности вакцинации при проведении комплексной иммунопрофилактики бешенства.

Показ.: Лечебно-профилактическая и профилактическая иммунизация при бешенстве или подозрении на него: рекомендуется немедленно начинать иммунизацию (особенно у детей младшего возраста), при любых повреждениях кожных покровов - укусах (незначительных, значительных, множественных), любых ранах и глубоких царапинах на лице, голове, шее, кистях рук, стопах, на туловище, нанесенных животными (большими бешенством, с подозрением на бешенство, находящимися под ветеринарным наблюдением и вне его, дикими).

Противопоказ.: Отсутствуют (сто процентная летальность при заболевании бешенством перекрывает любые противопоказания).

Бер. и корм. гр.: Допускается.

Поб. действ.: Возможна локальная болезненность. Реже - незначительные системные реакции с повышением температуры тела.

Взаим.: Совместим с антирабическими вакцинами и используется в комплексе с ними. Иммуноглобулин (пассивная иммунизация) может применяться вне зависимости от времени, прошедшего с момента инфицирования, вплоть до 8-го дня после первой инъекции антирабической вакцины - активная иммунизация (инкубационный период бешенства составляет в среднем 1 мес, хотя иногда его длительность 3-4 дня). Особенно рекомендуется назначение инактивированной антирабической вакцины, приготовленной на культуре диплоидных клеток человека (производство фирмы Пастер Мерье Коннот) - имеет высокую иммуногенность и индуцирует активный про-

тивовирусный иммунитет (дополнительно к введенным пациенту специфическим антителам). Одновременно с антирабической можно проводить противостолбнячную серопротекцию и назначать антибиотики (в связи с риском суперинфекции).

Примен. и доз.: Половина используемой дозы должна быть введена в/м, другая половина - инфильтрирована вокруг мест полученных ранений. У детей и взрослых применяют в дозе 20 МЕ на 1 кг массы в виде однократной инъекции. Рекомендуется как можно более раннее введение препарата, не позднее 48 ч после предполагаемого инфицирования. Препарат должен быть согрет до комнатной температуры. Одновременно начинают проводить вакцинопрофилактику. При этом место введения вакцины должно быть максимально удалено от места введения иммуноглобулина. Если иммуноглобулин не был введен одновременно с вакциной, он должен быть применен в течение последующих 8 дней.

Предост.: При гиперчувствительности к препаратам крови (в анамнезе) следует применять антигистаминные средства (при этом необходимо тщательное наблюдение за пациентом). Перед использованием аттенуированных живых вирусных вакцин следует соблюдать интервал не менее 6 нед (предпочтительнее трехмесячный) после введения иммуноглобулина. В/в введение иммуноглобулина противопоказано (из-за риска развития шока), поэтому при инъекции необходимо удостовериться, что игла не проникла в кровеносный сосуд. При укусе рана должна быть тщательно и осторожно промыта сначала с использованием мыла или раствора гипохлорита натрия, затем чистой водой. Для дезинфекции рекомендуется использовать растворы четвертичного аммония, поскольку данные соединения характеризуются высокой нейтрализующей активностью в отношении вирусов бешенства. Немедленное ушивание раны противопоказано. При необходимости можно применять простое соединение ее краев.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Показ.: Острая и хроническая диарея, илеостома (для уменьшения количества и объема и повышения плотности стула).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая дизентерия, острый язвенный колит или псевдомембранозный колит, вызванный приемом антибиотиков широкого спектра действия, запор, метеоризм, кишечная непроходимость, детский возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Возможно, если ожидаемый положительный эффект оправдывает потенциальный риск. Не рекомендуется во время лактации.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, рвота, боли и дискомфорт в животе, метеоризм, запор, кишечная непроходимость, утомляемость, сонливость, головкружения, аллергические реакции (кожные).

Передоз.: Симптомы: угнетение ЦНС (ступор, нарушения координации, сонливость, миоз, гипертонус мышц, угнетение дыхания), кишечная непроходимость. Лечение: налоксон, необходимо врачебное наблюдение в течение не менее 48 ч.

Примен. и доз.: Внутрь; в начальной дозе - 2 капсулы для взрослых и 1 капсула для детей, далее: при острой диарее - по 1 капсуле после каждого жидкого стула; при хронической диарее дозу корректируют до сокращения числа актов дефекации (оформленным стулом) до 1-2 раз в сутки (поддерживающая суточная доза обычно - 1-6 капсул). Максимальная суточная доза (при диарее) у взрослых - 8 капсул, у детей - 3 капсулы на 20 кг массы тела.

Предост.: При диарее в первую очередь необходимо корректировать водно-электролитные нарушения при помощи соответствующей заместительной терапии. Если при острой диарее в течение 48 ч не отмечается клинического улучшения, следует прекратить лечение и обратиться к врачу. Пациенты с нарушениями функции печени нуждаются в тщательном наблюдении для выявления возможных нарушений со стороны ЦНС.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Имодиум® (Imodium®)

Лоперамид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит лоперамида гидрохлорида 2 мг; в упаковке 6 или 20 шт.

Фарм. действ.: Антидиарейное, снижающее моторику ЖКТ.

Имодиум (Imodium)

Лоперамид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 2 мг лоперамида гидрохлорида; в упаковке 20 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 0,2 мг; во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Антидиарейное, понижение тонуса и моторики гладкой мускулатуры кишечника.

Показ.: Острая и хроническая диарея, илеостома.

Противопоказ.: Острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, острая дизентерия, ранний детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Сухость во рту, боль в животе, метеоризм, тошнота, рвота, запор, слабость, сонливость, головокружение, головная боль, аллергические реакции.

Примен. и доз.: При острой диарее начальная доза взрослым - 2 капсулы, детям старше 5 лет - 1 капсула, детям от 2 до 5 лет - раствор для приема внутрь 5 мл/10 кг; в дальнейшем взрослым и детям старше 5 лет - по 1 капсуле после каждого акта дефекации в случае жидкого стула, детям от 2 до 5 лет - раствор для приема внутрь 5 мл/10 кг 2-3 раза в день. При хронической диарее начальная доза та же; суточная доза устанавливается так, чтобы число актов дефекации сократилось до 1-2 в день. Максимальная суточная доза: взрослым - 8 капсул, детям старше 5 лет - 3 капсулы на 20 кг массы тела.

Предост.: Следует прекратить прием, если в течение 48 ч от начала лечения не наблюдается клинического улучшения.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Имуран® (Imuran®)

Азатиоприн*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит азатиоприна 50 мг.

Фарм. действ.: Иммуносупрессивное.

Показ.: Трансплантация органов, тяжелый ревматоидный артрит, системная красная волчанка, дерматомиозит, хронический активный гепатит, пемфигус вульгарис, узелковый периартериит, гемолитическая анемия, хроническая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к 6-меркаптопурину).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гематологические изменения, алопеция, повышение восприимчивости к инфекциям, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает нейромышечную блокаду деполяризующих миорелаксантов и снижает - недеполяризующих. Эффект потенцируют аллопуринол, оксипуринол, тиопуринол.

Примен. и доз.: Внутрь. Трансплантация органов (взрослые и дети) - ударная доза до 5 мг/кг в день, поддерживающая - 1-4 мг/кг в день. Другие состояния - до 3 мг/кг в день.

Предост.: На фоне алло-, окси-, тиопуринола дозу следует уменьшить в 4 раза. В первые 8 нед терапии необходим еженедельный полный анализ крови. С осторожностью назначают при почечной и печеночной недостаточности.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Инвираза (Invirase)

Саквинавир*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит саквинавира 200 мг; в упаковке 270 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное (селективная ингибиция ВИЧ-протеиназы).

Фармакокин.: Степень всасывания возрастает при приеме после еды, как и C_{max} (с 3 до 35,5 нг/мл) и время ее достижения (с 2,4 до 3,8 ч). Абсолютная биодоступность (в присутствии пищи) - 4%. Распределяется по тканям, имеет высокую степень (98%) связывания с белками. Подвергается печеночному метаболизму. Более 96% препарата, введенного в/в, появляется в кале в течение 48 ч, 4% выводится через почки. Среднее пребывание препарата в организме - 7 ч, скорость системного клиренса - 80 л/ч. Кумуляция при многократном приеме - умеренная.

Фармакодин.: Действует непосредственно на фермент - мишень вируса (не нуждается в метаболической активации), активен в наномолярных концентрациях; не возникает перекрестной резистентности с ингибиторами обратной транскриптазы.

Показ.: СПИД (на выраженной стадии ВИЧ-инфекции) с числом CD4-клеток не более 300/куб.мм (в комбинации с зальцитабином или зидовудином, или монотерапия при непереносимости аналогов нуклеозидов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 13 лет).

Бер. и корм. гр.: С большой осторожностью применяют при беременности. Кормление грудью во время лечения необходимо прекратить.

Поб. действ.: Головные боли, головокружение, периферическая нейропатия, онемение конечностей, боли в костях и мышцах, миалгия, сыпь, зуд, изъязвление слизистой оболочки полости рта, фарингит, тошнота, дискомфорт и боли

в животе, диарея, астения; гемолитическая анемия, синдром Стивенса-Джонсона, судорожные припадки, повышение уровня трансаминаз, желтуха, тромбоз, флебит.

Взаим.: Усиливает (взаимно) эффект ингибиторов обратной транскриптазы (зидовудина, зальцитабина, диданозина). Кетоконазол увеличивает, а рифампицин и др. индукторы печеночных ферментов (рифабутин, фенитоин, карбамазепин) снижают плазменные концентрации. Повышает уровень в плазме блокаторов кальциевых каналов, в т.ч. нифедипина, клиндамицина, терфенадина.

Примен. и доз.: Внутрь, не позже, чем через 2 ч после еды, монотерапия - по 600 мг 3 раза в сутки (1800 мг в сутки), при комбинированной терапии - одновременно (во время каждого приема) принимают по 0,75 мг зальцитабина или 200 мг зидовудина (общая суточная доза зальцитабина - 2,25 мг, зидовудина - 600 мг).

Предост.: С осторожностью использовать пациентам с поражением печени и почек.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Инворил® (Invoril®)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата USP 5 или 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, сосудорасширяющее, ингибция АПФ.

Фармакокин.: При приеме внутрь быстро и эффективно абсорбируется. Максимальная концентрация в плазме достигается за 1-2 ч. Гидролизуется до биоактивной формы - эналаприлата.

Показ.: Гипертоническая болезнь любой формы и стадии; сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к другим ингибиторам АПФ), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гипотензия, слабость, головная боль, нарушение вкуса, кашель, протеинурия, гиперкалиемия, нейтропения, ангионевротический отек, кожная сыпь.

Взаим.: Совместим с другими гипотензивными препаратами (аддитивный эффект). При применении с калийсберегающими диуретиками возможно развитие гиперкалиемии.

Примен. и доз.: Внутрь. Для лечения гипертензии начальная доза у взрослых - 5 мг по утрам с последующим удвоением дозы каждые 1-2 нед до дозы, не превышающей 40 мг в сутки однократно утром в зависимости от эффекта. При хронической сердечной недостаточности начальная доза - 2,5 мг с повышением через недельные интервалы до максимальной суточной дозы 5-10 мг однократно или разделенной на два приема.

Предост.: При лечении салуретиками препарат назначают после коррекции водно-электролитных сдвигов спустя несколько дней после их отмены. С осторожностью применяют у больных с ИБС, тяжелой сердечной недостаточностью, заболеваниями сосудов мозга и почек.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Ингалипт (Inhalypum)

Сост. и ф.в.: 1 баллон (30 г) содержит норсульфазола натрия и стрептоцида растворимого по 0,75 г, тимола, эвкалиптового масла и масла мяты перечной по 0,015 г, спирта этилового 1,8 г.

Фарм. действ.: Антимикробное, противовоспалительное.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозные и язвенные стоматиты).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Ингаляционно, распыляют взвесь в полость рта в течение 1-2 с. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Индап (Indap)

Индапамид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит индапамида гемигидрата 2,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, антигипертензивное.

Показ.: Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к сульфаниламидам), острые нарушения мозгового кровообращения, выраженные нарушения функции почек, печени, декомпенсированный сахарный диабет, подагра, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, чувство дискомфорта и боли в эпигастрии, слабость, утомляемость, гипонатриемия, гипокалиемия, гипомагниемия, гипохлоремический алкалоз; гиперурикемия, обострение подагры; аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Взаим.: Несовместим с препаратами лития и калийвыводящими диуретиками. Сердечные гликозиды и кортикостероиды увеличивают риск возникновения гипокалиемии.

Примен. и доз.: Внутрь, не раскусывая и запивая водой - по 2,5 мг (1 капсула) 1 раз в сутки (утром), при слабой выраженности антигипертензивного эффекта после 2 нед лечения дозу увеличивают до 5-7,5 мг в сутки; максимальная суточная доза - 10 мг в два приема в первой половине дня.

Произв.: Pro.Med.CS Praha (Чехия)

Индапамид (Indapamide)

Индапамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит индапамида 2,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, вазодилатирующее, гипотензивное.

Показ.: Артериальная гипертония (легкого и среднетяжелого течения).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим сульфонидами), острое нарушение мозгового кровообращения, гиперальдостеронизм, выраженные нарушения функции печени и почек.

Поб. действ.: Головная боль, утомляемость, судороги, понос, учащенное мочеиспускание, ортостатическая гипотония (редко), кожная сыпь.

Взаим.: Увеличивает токсичность лития, эффект антигипертензивных средств. Может уменьшить артериальный ответ на норадреналин. Диуретики, похожие на индапамид, уменьшают выделение кальция.

Передоз.: Характеризуется тошнотой, рвотой, слабостью, гипотонией, депрессией дыхания. Лечение симптоматическое (специфических антидотов нет): стимуляция рвоты, промывание желудка, регуляция водно-электролитного баланса.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 2,5 мг (при невыраженном гипотензивном эффекте - 5 мг) однократно, утром.

Предост.: Необходимо регулярно определять содержание электролитов в крови. При гиперурикемии и подагре обязателен контроль уровня мочевой кислоты. С осторожностью назначают

при тяжелых нарушениях функции почек и печени. Следует иметь в виду, что возможно проявление латентного диабета.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Индапсан (Indapsan)

Индапамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит индапамида 2,5 мг.

Фарм. действ.: Диуретическое (натрий-, хлор-, калийуретическое), гипотензивное.

Фармакодин.: Понижает тонус гладкой мускулатуры сосудов, уменьшает общее периферическое сопротивление, снижает реабсорбцию ионов (и воды) в петле Генле и проксимальном извитом канальце нефрона.

Клин. фарм.: Гипотензивный эффект развивается к концу первой недели и достигает максимума через 3 мес систематического приема.

Показ.: Артериальная гипертония.

Противопоказ.: Острое нарушение мозгового кровообращения; выраженные нарушения функции почек, печени, тяжелые формы сахарного диабета и подагры.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, чувство дискомфорта и боли в эпигастрии, слабость, утомляемость, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд); редко - ортостатическая гипотония.

Взаим.: Несовместим с препаратами лития, лидофлазином.

Примен. и доз.: Внутрь, утром - по 2,5 мг 1 раз в сутки (таблетки не разжевывают). После 2 нед лечения (при недостаточной выраженности гипотензивного эффекта) дозу увеличивают до 5-7,5 мг/сутки. Максимальная суточная доза - 10 мг в 2 приема (в первой половине дня).

Предост.: С осторожностью назначать пациентам с аллергическими реакциями на производные сульфонамидов в анамнезе.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Индерал (Inderal)

Пропранолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пропранолола хлорида 40 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, противоглаукомное, бета-адреноблокирующее.

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия, послеинфарктный период, аритмии, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, мигрень (профилактика), эссенциальный тремор, состояния беспокойства, феохромоцитомы (только с альфа-адреноблокаторами), тиреотоксикоз, тиреотоксический криз, глаукома, профилактика кровотечений из верхних отделов ЖКТ при портальной гипертензии и варикозном расширении вен пищевода.

Противопоказ.: АВ-блокада II-III степени, кардиогенный шок, бронхоспазм в анамнезе, брадикардия (ЧСС менее 55 ударов/мин), метаболический ацидоз при сахарном диабете, облитерирующие заболевания сосудов.

Поб. действ.: Похолодание конечностей, тошнота, понос, бессонница, слабость.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. При артериальной гипертензии - в начальной дозе 80 мг 2 раза в сутки (можно постепенно увеличивать дозу на 40 мг); обычная суточная доза 160-320 мг; максимальная - 640 мг. При стенокардии, беспокойстве, мигрени, треморе, в постинфарктном периоде - 40 мг 2-3 раза в сутки; обычная доза - 120-240 мг (при стенокардии) и 80-160 мг (при беспокойстве, мигрени, треморе); после инфаркта (между 5 и 21 днем постинфарктного периода по 40 мг 4 раза в сутки или по 80 мг 2 раза в сутки, 2-3 дня. При глаукоме и портальной гипертензии - в минимальной суточной дозе 80 мг, максимальной - 320 мг. При аритмии, кардиомиопатии, гипертиреозе - по 10-40 мг 3-4 раза в сутки; при феохромоцитоме - перед операцией по 60 мг в сутки, 3 дня, в неоперабельных случаях - 30 мг в сутки. Детям - дозу устанавливают в зависимости от массы тела и заболевания.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Индовис ЕС (Indovis ЕС®)

Индометацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимым покрытием содержит индометацина 25 мг; в упаковке 30, 50, 100 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит в стадии обострения, дегенеративные поражения тазобедренного сустава, острый

подагрический артрит, острое воспаление костно-мышечной ткани (бурсит, тендинит, синовит, теносиновит, боли в пояснице), боли при первичной дисменорее.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к аспирину), заболевания желудочно-кишечного тракта (в т.ч. в анамнезе), возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Отсутствие аппетита, желудочный дискомфорт, боли в подложечной области, тошнота, рвота, диарея, изъязвления, перфорация и кровотечение из пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, гепатит, желтуха, сонливость, головокружение, угнетение деятельности костного мозга, анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения, аллергические реакции.

Взаим.: Побочные эффекты усиливаются (взаимно) аспирином или другими салицилатами. При совместном назначении с антикоагулянтами возрастает риск развития изъязвления желудка и кровотечений из желудочно-кишечного тракта.

Передоз.: Симптомы: тошнота, рвота, интенсивная головная боль, головокружение, дезориентация, сонливость, онемение, парестезии и судороги. Лечение: очистить желудок, вызвать рвоту (сиропом ипекакуаны), промывание желудка в случае отсутствия рвоты, затем назначить 25-50 мг активированного угля. Может потребоваться назначение антацидных препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Предост.: С осторожностью у пациентов с нарушением свертывания крови и функции почек. На время лечения следует воздержаться от употребления алкоголя.

Произв.: CTS (Израиль)

Индометацин (Indometacin)

Индометацин*

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит индометацина 50 или 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Воспалительные заболевания суставов, мышц и мягких тканей: полиартрит, артрит, артроз, остеоартрит, спондилоартроз, коксартроз, бурсит,

тендинит, тендовагинит, синовит, подагра, боли при травмах и опухолях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, почечная, сердечная или печеночная недостаточность, гипертония, нарушения кроветворения, проктит, беременность (последний триместр), лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, желудочно-кишечные кровотечения, гепатит, головные боли, страх, спутанность сознания, психозы, галлюцинации, периферические нейропатии, поражение почек, отеки, гипертония, гиперкалиемия, алопеция, дегенерация сетчатки, помутнение роговицы, агранулоцитоз, апластическая анемия, снижение слуха, аллергические реакции.

Взаим.: При совместном назначении повышает эффект норэфедрина, токсичность метотрексата, содержание лития и дигоксина, задерживает выведение пенициллина, уменьшает действие диуретиков и гипотензивных средств. В комбинации с калийсберегающими диуретиками может вызвать гиперкалиемию. Увеличивает вероятность желудочно-кишечных кровотечений и язв при назначении стероидов и НПВС. Ацетилсалициловая кислота понижает содержание индометацина в плазме, пробенецид замедляет, а фуросемид ускоряет выведение.

Примен. и доз.: Ректально. По 1 суппозиторию (50 мг) 1-3 раза в день или по 1 суппозиторию (100 мг) на ночь, при приступе подагры - 200 мг в сутки.

Пр о и з в .: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Индометацин (Indometacin)

Индометацин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит индометацина 25 мг; в упаковке 30 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, противоревматическое, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит; внесуставной ревматизм (бурсит, тендинит, синовит, плечелопаточный периаартрит и др.); острый подагрический артрит; воспаление и отек после интервенций при переломах и вывихах, после удаления зубов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, пептическая язва (активная

форма или в анамнезе), рецидивирующие заболевания ЖКТ, нарушения функции печени и почек, переломы костей, беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет); для суппозиториев - геморрой, проктит.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, спутанность сознания, фотофобия, депрессии, психозы, галлюцинации, ухудшение течения эпилепсии и паркинсонизма, диспептические расстройства, кишечные кровотечения, язвенные поражения ЖКТ, токсическое повреждение почек, гематурия, нарушение зрения (помутнение роговицы, изменения в желтом пятне сетчатки), вторичная анемия (гемолиз), лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, аллергические реакции (сыпь, кожный зуд, ангионевротический отек, острый приступ астмы); раздражение ректальной слизистой оболочки, тенезмы, понос (для суппозиториев).

Взаим.: Снижает эффекты бета-адреноблокаторов, антигипертензивных средств, тиазидных диуретиков, фуросемида, усиливает - антиагрегантов и антикоагулянтов. При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками повышает риск гиперкалиемии, уменьшает абсорбцию ацетилсалициловой кислоты. Концентрацию в плазме повышает пробенецид.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, с молоком или антацидом. В начале лечения - по 1 капсуле 2-3 раза в день (действие может проявиться через 4-6 дней); при необходимости дозу увеличивают на 1 капсулу еженедельно, но, как правило, до 4 капсул в сутки; если при этой дозе соответствующий эффект не достигается в течение 4-6 нед, то терапию прерывают. При остром приступе подагрического артрита - по 1-2 капсулы 3-4 раза в день, при других острых заболеваниях опорно-двигательного аппарата - по 2 капсулы 2-3 раза в день. Ректально, по 1 суппозиторию перед сном или по 1 суппозиторию перед сном и 1 - утром. Возможно комбинированное применение - 1 суппозиторий перед сном и по 1-2 капсулы 1-2 раза в день.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Индометацин-Акри® (Indometacinum-Akri)

Индометацин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит индометацина 0,025 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра); боли в позвоночнике, невралгии, миалгии, ревматизм; травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата; как вспомогательное средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, "аспириновая" астма, нарушения кроветворения, выраженные нарушения функции почек и печени, беременность, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Тошнота, анорексия, метеоризм, запор, изжога, диарея, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница, кожно-аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 25 мг 2-3 раза в сутки. При отсутствии клинического эффекта дозу увеличивают до 50 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг.

Произв.: Акрихин (Россия)

Индотард (Indotard®)

Индометацин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула с микрогранулами пролонгированного действия содержит индометацина 75 мг; в упаковке 10, 50 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит (в стадии обострения), дегенеративные поражения тазобедренного сустава, острые мышечно-скелетные расстройства (бурсит, тендинит, синовит, тендосиновит, боли в пояснице), боли при первичной дисменорее.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к аспирину), поражения ЖКТ (в т.ч. в анамнезе), беременность, кормление грудью, возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, изъязвление, перфорация и кровотечение из ЖКТ; токсический гепатит, желтуха; сонливость, головокружение, угнетение деятельности костного мозга, анемия, агранулоцитоз, лейкопения,

тромбоцитопеническая пурпура, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает (взаимно) побочные эффекты аспирина или других салицилатов. Риск развития изъязвлений и кровотечений из ЖКТ повышают антикоагулянты. Несовместим с алкоголем.

Передоз.: Симптомы: тошнота, рвота, интенсивная головная боль, головокружение, дезориентация, сонливость, онемения, парестезии, судороги. Лечение: очистить желудок, используя сироп ипекакуаны или промывание. Назначить 25-50 мг активированного угля. Полезны антациды.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды с небольшим количеством пищи или с антацидными средствами. При умеренном (до тяжелого) ревматоидном артрите (включая обострение хронического), анкилозирующем спондилите и остеоартрите тазобедренного сустава максимальная начальная доза - 75 мг в день. При острых мышечно-скелетных расстройствах - по 1 капсуле 2 раза в день в течение 10-14 дней.

Предост.: С осторожностью использовать при нарушении свертывания крови и функции почек. Следует иметь в виду, что увеличение суточной дозы свыше 150-200 мг повышает риск возникновения побочных эффектов без соответствующего улучшения клинического результата.

Произв.: CTS (Израиль)

Инозие-Ф (Inosie-F®)

Инозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит инозина 200 мг; в упаковке 1000 шт.

Фарм. действ.: Антигипоксическое, антиаритмическое, анаболическое.

Показ.: Врожденные и приобретенные пороки сердца, ИБС (коронарная недостаточность), нарушения сердечного ритма, интоксикация сердечными гликозидами, миокардит, гепатит (острый, хронический, сывороточный), жировая дистрофия печени, отравление лекарственными веществами, алкоголизм; лучевая лейкопения (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, подагра (в т.ч. предрасположенность), заболевания почек.

Поб. действ.: Гиперемия и зуд кожи, тахикардия.

Примен. и доз.: Внутрь, в средней суточной дозе (взрослым с массой тела 75-80 кг) по 1200-1800 мг. При необходимости - в зависимости от характера

заболевания, возраста и массы тела - дозу можно увеличивать.

Произв.: Iskra (Япония)

Инсомния (Insomnia)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Chamomilla 3X, 9X, 12X, 30X, Humulus lupulus 3X, Passiflora incarnata 3X, Avena sativa 4X, Coffee cruda 6X, Kali Phosphoricum 6X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Бессонница, нарушения сна.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача до начала приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения, взрослым - по 2 таблетки за 1 ч до сна и затем еще 2 таблетки непосредственно перед сном, в течение 10 дней. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослого.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности препарата не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема, ограничить употребление кофе, чая, шоколада. Если нарушения сна не исчезают после 10 дней, рекомендуется консультация врача.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Инстенон (Instenon®)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит гексобендина 10 мг, оксиэтилтеофиллина 100 мг и этиамбана 50 мг; в упаковке 30 шт.

1 драже - 20, 60 и 50 мг действующих веществ соответственно; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Улучшение мозгового и коронарного кровообращения, аналептическое, диуретическое, коррекция метаболизма миокарда и мозга.

Показ.: Стойкая церебральная гипертензия, цереброваскулярная недостаточность, стеноз и облитерация мозговых артерий; состояние растерянности и дезориентации, изменение интеллекта при атеросклерозе; снижение памяти в старости; инсульт: острый, ишемический, геморрагический (после прекращения кровоизлияния), постапоплексическое состояние.

Противопоказ.: Черепно-мозговая гипертензия, эпилепсия, острый геморрагический инсульт, стеноз сонных артерий.

Поб. действ.: Головная боль, гиперемия, гипотония.

Примен. и доз.: Внутрь по 2 драже 3 раза в сутки, через 2-3 нед 1 драже 3 раза в сутки в течение 2-3 мес. В/в медленно (2 мл в течение 3 мин) или капельно, растворив 2 мл раствора в 250 мл 5% глюкозы, кратность введения 1-2 раза в сутки. В/м по 1-2 ампулы в сутки в течение 2-4 нед, сочетают с оральным приемом.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Инсулин Ленте СПП (Insulin Lente SPP)

Инсулин цинк суспензия составная*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина (полностью очищенного из поджелудочной железы свиней) 40 МЕ и цинка 0,08 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 1 ч после введения, достигает максимума к 3-12 ч и продолжается 18-20 ч.

Показ.: Сахарный диабет (особенно у детей, беременных женщин, пациентов с аллергиями, липодистрофиями, инсулинорезистентностью).

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Гипогликемия (чувство голода, переутомления, тремор), аллергические реакции (от кожной сыпи до анафилактического шока), липодистрофия.

Взаим.: Альфа-адреноблокаторы, бета-адреностимуляторы, окситетрациклины, строфантин, салицилаты вызывают усиление эндогенной секреции инсулина. Оральные контрацептивы, глюкокортикоиды снижают инсулиновую эффективность. Алкоголь, бета-адреноблокаторы, тиазиды могут вызвать гипогликемию.

Примен. и доз.: П/к, дозировка определяется лечащим врачом; флакон следует хорошо встряхнуть и вводить сразу после наполнения шприца.

Предост.: Не рекомендуется повторное введение в одно и то же место. При появлении симптомов гипогликемии необходимо принять сахар. С осторожностью применяют при почечной и печеночной недостаточности, болезни Аддисона, тиреоидных расстройствах, операциях, инфекциях, гипопитуитаризме, беременности, у лиц старше 65 лет.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Инсулин максирапид "ВО-С" (Insulin maxirapid "WO-S")

Инсулин нейтрал для инъекций*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 10 мл раствора для инъекций содержит инсулина 400 ЕД.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 15-30 мин, достигает максимума через 2,5-5 ч и продолжается 7-8 ч.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Поб. действ.: Гипогликемия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: П/к, в/в или в/м, в индивидуальной дозе.

Произв.: Российский инсулин (Россия)

Инсулин С (Insulin S)

Инсулин нейтрал для инъекций*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 40 ЕД хроматографически чистого свиного инсулина, во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Сахарный диабет I типа; сахарный диабет II типа при резистентности к пероральным гипогликемизирующим препаратам, интеркуррентных заболеваниях, операциях; диабетическая кома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется. Следует применять человеческий инсулин.

Поб. действ.: Гипогликемия, гипогликемическая прекома и кома, иммунологические перекрестные реакции с инсулином человека, липодистрофия (при длительном применении), аллергические реакции.

Взаим.: Совместим с комб-инсулином С и депо-инсулином С.

Примен. и доз.: П/к, в/м и в/в, за 15 мин до еды. Доза у взрослых составляет от 8 до 24 ЕД; у детей - 24 ЕД. При пониженной чувствительности к инсулину - большие дозы. Разовая доза - не более 40 ЕД. При замене препарата на человеческий инсулин требуется уменьшение дозы.

Произв.: Hoechst (Германия)

Инсулин-семилонг СМК (Insulinum-semilong SMK)

Инсулин цинк суспензия (аморфный)*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии содержит 40 ЕД инсулина свиного высокоочищенного МК (монокомпонентного), а также натрий уксуснокислый, нипагин (1,0-1,3 мг), воду для инъекций; во флаконах по 5 и 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Действие начинается и достигает максимума через 1-2 ч. Продолжительность эффекта - 10-16 ч.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет, другие заболевания, требующие инсулинотерапии у детей и взрослых.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, коматозные и прекоматозные состояния, гипогликемия.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия, гипогликемия.

Взаим.: Нежелательно сочетание с глюкокортикоидами, диуретическими средствами, алкоголем.

Передоз.: Проявляется гипогликемией, в тяжелых случаях - гипогликемической комой.

Примен. и доз.: П/к или в/м 1-2 раза в сутки; дозы и число инъекций устанавливаются индивидуально в зависимости от общего состояния пациента, тяжести и особенностей течения заболевания, а также от уровня суточной глюкозурии и гликемического профиля. Обычно суточная доза составляет 0,5-1 ЕД/кг массы тела.

Предост.: В случае появления симптомов гипогликемии немедленно принять сахар. Запрещено внутривенное введение суспензии.

Произв.: Эндокринный препарат (Литва)

Инсуман Базал (Insuman Basal)

Инсулин человеческий*

Инсуман Базал 100 для Оптипена (Insuman Basal 100 for Optipen)

Инсулин человеческий*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций Инсумана Базал содержит изофан

протамин инсулина 40 или 100 ЕД, во флаконах по 10 или 5 мл соответственно; в упаковке 5 шт.

1 картридж для шприц ручки Optipen (Инсуман Базал 100 для Оптипена) содержит 3 мл суспензии изофан протамин инсулина с активностью 100 ЕД/мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Действующее вещество - изофан протамин инсулин - идентичен по структуре инсулину человека. Эффект развивается через 1 ч после введения, достигая максимума через 3-4 ч, и продолжается 11-20 ч (в зависимости от дозы и индивидуальных особенностей пациента).

Показ.: Сахарный диабет I типа у больных, ранее не получавших инсулин, беременных; в случае непереносимости других инсулинсодержащих препаратов; лабильная форма диабета на фоне высокого титра антител к инсулину, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы. Сахарный диабет II типа при резистентности к оральным сахароснижающим средствам, во время проведения хирургических операций, при присоединении сопутствующих заболеваний, при неэффективности диетотерапии в период беременности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Поб. действ.: Связанные с влиянием на углеводный обмен: гипогликемия (бледность, потливость, ощущение сердцебиения, расстройства сна, тремор); неврологические нарушения (редко); гипогликемическая прекома и кома. Местные реакции: липодистрофия в местах введения (при длительном применении). Аллергические реакции (наблюдаются чаще у больных, имеющих в анамнезе аллергические реакции на инсулины животного происхождения).

Взаим.: Эффект усиливают альфа-адреноблокаторы, амфетамин, анаболические стероиды, неселективные бета-адреноблокаторы, клофибрат, циклофосфамид, фенфлурамин, флуоксетин, гуанетидин, ифосфамид, ингибиторы МАО, метилдопа, тетрациклины, тритоксиллин, трифосфамид, ослабляют хлорпротиксен, пероральные контрацептивы, глюкокортикостероиды, диазоксид, гепарин, изониазид, карбонат лития, никотиновая кислота, фенолфталейн, производные фенотиазина, фенитоин, салуретики, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты. У пациентов, одновременно получающих клонидин, резерпин и салицилаты, может наблю-

даться как ослабление, так и возрастание действия. Снижает переносимость алкоголя. Бета-адреноблокаторы, клонидин, гуанетидин, резерпин могут маскировать симптомы гипогликемии. Фармацевтически совместим (можно смешивать в любых пропорциях) с препаратами инсулина, идентичными человеческому, в т.ч. содержащими протамин в качестве депообразующего вещества.

Передоз.: Проявляется гипогликемией различной степени выраженности. Лечение: глюкоза внутрь (если больной в сознании). В случае потери сознания вводят в/в глюкозу или глюкагон в/м или п/к.

Примен. и доз.: П/к, за 45-60 мин до приема пищи. Места инъекций каждый раз меняют. Доза устанавливается индивидуально: взрослым, впервые получающим препарат, начинают с дозы 8-24 ЕД один раз в сутки (больным с высокой чувствительностью к инсулину может оказаться достаточным 8 ЕД/сутки, с пониженной - более 24 ЕД/сутки). Максимальная разовая доза - 40 ЕД (превышение этой дозы допускается лишь в исключительных случаях).

Предост.: Абсолютно недопустимо в/в введение. При замене инсулинов животного происхождения на Инсуман Базал может потребоваться снижение дозы.

Произв.: Hoechst (Германия)

Инсуман Комб 15/85
(Insuman Comb 15/85)

Инсулин человеческий*

Инсуман Комб 25/75
(Insuman Comb 25/75)

Инсулин человеческий*

Инсуман Комб 25/75
для Оптипена (Insuman
Comb 25/75 for
Optipen)

Инсулин человеческий*

Инсуман Комб 50/50
(Insuman Comb 50/50)

Инсулин человеческий*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций Инсумана Комб 15/85, 25/85 и 50/50 содержит 100 ЕД инсулина, в т.ч., соответственно, 15, 25 и 50 ЕД нейтрального раствора инсулина и 85, 75 и 50 ЕД изофан протамин инсулина, или

40 ЕД инсулина, в т.ч. соответственно, 6, 10 и 20 ЕД нейтрального раствора инсулина и 34, 30 и 20 ЕД Изофан протамин инсулина, во флаконах по 5 (100 ЕД/мл) или 10 мл (40 ЕД/мл); в упаковке 5 шт.

1 картридж для шприц ручек Optipen (Инсуман Комб 25/75 для Оптипена) содержит 3 мл суспензии для инъекций с активностью инсулина 100 ЕД/мл, в том числе 25 ЕД/мл нейтрального раствора инсулина и 75 ЕД/мл изофан протамин инсулина; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Содержит инсулин, идентичный человеческому. Различные препараты отличаются процентным соотношением нейтрального инсулина и изофан протамин инсулина, что обуславливает различия в их фармакодинамике. Инсуман Комб 15/85 характеризуется быстрым началом (через 30-45 мин) и средней продолжительностью (11-20 ч) действия, Инсуман Комб 25/75, соответственно, 30 мин и 12-18 ч, Инсуман Комб 50/50 - 30 мин (с максимумом эффекта через 1-1,5 ч) и 10-16 ч соответственно. Продолжительность действия зависит от дозы и от индивидуальных особенностей пациента.

Показ.: Сахарный диабет I типа у больных, ранее не получавших инсулин, беременных, в случае непереносимости других инсулинсодержащих препаратов; лабильная форма диабета, связанная с наличием высокого титра антител к инсулину (кроме Инсумана Комб 50/50); при трансплантации островковых клеток поджелудочной железы. Сахарный диабет II типа при резистентности к оральным сахароснижающим средствам, во время проведения хирургических операций, при присоединении сопутствующих заболеваний, при неэффективности диетотерапии в период беременности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Поб. действ.: Связанные с влиянием на углеводный обмен: гипогликемия (бледность, потливость, ощущение сердцебиения, расстройства сна, тремор), гипогликемическая прекома и кома; неврологические нарушения (редко); местные реакции: липодистрофия в месте введения (при длительном применении); аллергические реакции (наблюдаются чаще у больных, имеющих в анамнезе аллергические реакции на инсулины животного происхождения).

Взаим.: Эффект усиливают альфа-адреноблокаторы, амфетамин, анаболические стероиды, неселективные бета-адре-

ноблокаторы, клофибрат, циклофосфамид, фенфлурамин, флуоксетин, гуанетидин, ифосфамид, ингибиторы МАО, метилдопа, тетрациклины, тритоксиллин, трифосфамид, ослабляют хлорпротиксен, пероральные контрацептивы, глюкокортикостероиды, diaзоксид, гепарин, изониазид, карбонат лития, никотиновая кислота, фенолфталейн, производные фенотиазина, фенитоин, салуретики, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты. У пациентов, одновременно получающих клонидин, резерпин и салицилаты, может наблюдаться как ослабление, так и возрастание действия. Снижает переносимость алкоголя. Бета-адреноблокаторы, клонидин, гуанетидин, резерпин могут маскировать симптомы гипогликемии. Фармацевтически совместим (можно смешивать в любых пропорциях) с препаратами инсулина, идентичными человеческому, в т.ч. содержащими протамин в качестве депообразующего вещества.

Передоз.: Проявляется гипогликемией различной степени выраженности. Лечение: глюкоза внутрь (если больной в сознании). В случае потери сознания вводят в/в глюкозу или глюкагон в/м или п/к.

Примен. и доз.: П/к, место инъекции каждый раз меняют. Доза устанавливается индивидуально: взрослым, впервые получающим препарат, назначают с дозы 8-24 ЕД один раз в сутки. У больных с высокой чувствительностью к инсулину может оказаться достаточной доза менее 8 ЕД/сутки, с пониженной - более 24 ЕД/сутки. Максимальная разовая доза - 40 ЕД (превышение этой дозы допускается лишь в исключительных случаях). Инсуман Комб 15/85 и Инсуман Комб 25/75 обычно вводят за 30-45 мин до приема пищи, Инсуман Комб 50/50 - за 20-30 мин. При инсулинзависимом сахарном диабете обычно назначают Инсуман Комб 15/85 и Инсуман Комб 25/75.

Предост.: В/в введение препарата абсолютно недопустимо. Как правило, следует снизить дозу при замене инсулина животного происхождения на Инсуман Комб.

Произв.: Hoechst (Германия)

Инсуман Рапид (Insuman Rapid)

Инсулин человеческий*

Инсуман Рапид для Оптипена (Insuman Rapid for Optipen)

Инсулин человеческий*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций Инсумана Рапид содержит нейтрального инсулина 40 или 100 ЕД, во флаконах по 10 или 5 мл соответственно; в упаковке 5 шт.

1 картридж для шприц-ручки Optipen (Инсуман Рапид для Оптипена) содержит 3 мл нейтрального раствора инсулина с активностью 100 ЕД/мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Активное вещество инсулин (структура идентична инсулину человека), получаемый в результате ферментации свиного инсулина. Обеспечивает быстрое и выраженное гипогликемическое действие, усиливает усвоение глюкозы тканями, липогенез, гликогеногенез, синтез белка, снижает скорость продукции глюкозы печенью. Начало действия через 30 мин, максимум - 1-2 ч, продолжительность - 5-8 ч (в зависимости от дозы и чувствительности больного).

Показ.: Сахарный диабет I типа у больных, ранее не получавших инсулин, беременных, в случае непереносимости других инсулинсодержащих препаратов. Сахарный диабет II типа при резистентности к оральным сахароснижающим средствам, во время хирургических операций, при присоединении сопутствующих заболеваний, при неэффективности диетотерапии в период беременности. Диабетическая кома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Поб. действ.: Связанные с влиянием на углеводный обмен: гипогликемия (бледность, потливость, ощущение сердцебиения, расстройства сна, тремор), гипогликемическая прекома и кома, неврологические нарушения (редко). Местные реакции: липодистрофия в месте введения (при длительном применении). Аллергические реакции (наблюдаются чаще у больных, имеющих в анамнезе аллергические реакции на инсулины животного происхождения).

Взаим.: Эффект усиливают альфа-адреноблокаторы, амфетамин, анаболические стероиды, неселективные бета-адреноблокаторы, клофибрат, циклофосфамид, фенфлурамин, флуоксетин, гуанетидин, ифосфамид, ингибиторы МАО, метилдопа, тетрациклины, тритоксиллин, трифосфамид, ослабляют хлорпрогексен, пероральные контрацептивы, глюкокортикостероиды, diaзоксид, гепарин, изониазид, карбонат лития, никотиновая кислота, фенолфталейн, производные фенотиазина, фенитоин, салуретики, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты. У пациентов, одновременно получающих клонидин, резерпин и салицилаты, может наблюдаться как ослабление, так и возрастание действия. Снижает переносимость алкоголя. Бета-адреноблокаторы, клонидин, гуанетидин, резерпин могут маскировать симптомы гипогликемии. Фармацевтически совместим (можно смешивать в любых пропорциях) с препаратами инсулина, идентичными человеческому, в т.ч. содержащими протамин в качестве депообразующего вещества.

Передоз.: Проявляется гипогликемией различной степени выраженности. Лечение: глюкоза внутрь (если больной в сознании). В случае потери сознания вводят в/в глюкозу или глюкагон в/м или п/к.

Примен. и доз.: П/к, за 15-20 мин до еды. Места инъекций каждый раз меняют. В исключительных случаях допускается в/м введение. Дозу препарата устанавливают индивидуально; взрослым, впервые получающим препарат, обычно назначают 8-24 ЕД один раз в сутки (для больных с высокой чувствительностью к инсулину может оказаться достаточной доза менее 8 ЕД/сутки, с пониженной - более 24 ЕД/сутки). Максимальная разовая доза - 40 ЕД (превышение этой дозы допускается лишь в исключительных случаях). При диабетической коме или ацидозе вводят в/в струйно или капельно.

Предост.: С осторожностью проводят подбор режима дозирования пациентам с имевшимися ранее нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу и с тяжелыми формами ИБС. Потребность в инсулине может меняться: при переходе на другой вид инсулина (при замене инсулинов животного происхождения на Инсуман Рапид дозу, как правило, снижают), при изменении режима питания, диареи, рвоте, изменении привычного объема физических нагрузок, заболеваниях почек, печени, гипо-

физа, щитовидной железы, смене места инъекции. Больной должен быть информирован о симптомах гипогликемического состояния, о первых признаках диабетической комы и о необходимости информировать врача о всех изменениях своего состояния.

Произв.: Hoechst (Германия)

Интал (Intal®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула с порошком для ингаляций содержит кромогликата натрия 20 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, стабилизация мембран тучных клеток.

Показ.: Бронхиальная астма, аллергический ринит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения ритма сердца, беременность, лактация.

Поб. действ.: Кашель, охриплость голоса, сухость в горле, неприятный привкус во рту; редко - отек гортани, затруднение глотания, бронхоспазм, миозит, дизурия, тошнота, головная боль, ринит, крапивница, слезотечение; крайне редко - периаартериит, перикардит, периферический неврит, легочная инфильтрация с эозинофилией, полимиозит, миалгия, дерматит, фотодерматит, вертиго, анемия, анафилаксия.

Примен. и доз.: Ингаляционно, по 1 капсуле 4 раза в день (до 8 капсул в сутки) в течение нескольких недель; отмена производится постепенно, в течение нескольких дней.

Произв.: Lek (Словения)

Интал (Intal®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула с порошком для ингаляций содержит кромогликата натрия 20 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ингибирование высвобождения медиаторов аллергической реакции из сенсibilизированных клеток, предупреждение развития ранней и поздней стадий астматической реакции в ответ на иммунологические и другие стимулы в легких.

Фармакокин.: После ингаляции 5-15% введенной дозы абсорбируется из дыхательных путей в системный кровоток. Остальная часть выводится с током выдыхаемого воздуха или оседает на стенках ротоглотки, затем проглатывается и выводится из организма через пищеварительный тракт. Из пищеварительного тракта в системный кровоток всасывается

ся 1%. Обратимо связывается с белками плазмы (около 65%), не подвергается метаболизму. Выводится в неизменном виде приблизительно в равных количествах с мочой и желчью.

Показ.: Бронхиальная астма (включая астму физического усилия) у детей и взрослых (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Симптомы раздражения верхних дыхательных путей, кашель, явления бронхоспазма (возможно со снижением показателей функции внешнего дыхания; в подобных случаях прием препарата прекращают).

Взаим.: Несовместим с бромгексином и амброксолом (в виде ингаляций).

Передоз.: При передозировке - симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Ингаляция содержимого каждой капсулы осуществляется при помощи спинхалера, активируемого дыхательным усилием пациента на вдохе. Интал неэффективен при проглатывании капсул. Действие препарата развивается при его непосредственном введении в дыхательные пути. Взрослым (включая лиц пожилого возраста) и детям назначают по 1 капсуле 4 раза в сутки: 1 капсулу на ночь, 1 - утром и 2 в промежутке с интервалом в 3-6 ч. Необходимость увеличить дозировку до 6-8 капсул в день может возникнуть в случаях более тяжелого течения заболевания, а также в периоды усиленного антигенного воздействия. Дополнительный прием препарата может быть произведен непосредственно перед физической нагрузкой (для профилактики астмы физического усилия) или перед предполагаемым контактом с другими триггерными факторами. При достижении стойкого терапевтического эффекта возможен переход на минимальную поддерживающую дозу, обеспечивающую достаточный контроль за заболеванием. При сопутствующей терапии бронходилататорами их необходимо принимать перед ингаляцией интала. У пациентов, получающих терапию кортикостероидами, добавление интала может позволить уменьшить поддерживающую дозу или полностью отказаться от приема кортикостероидов.

Предост.: Пациент должен быть проинструктирован относительно необходимости регулярного приема интала в отличие от приема лекарственных средств, эпизодически используемых для умень-

шения бронхоспазма. Отмену препарата проводят постепенно (в течение недели). Во время снижения дозы возможно возобновление симптомов заболевания.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Интал (Intal®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит кромогликата натрия 1 или 5 мг, в баллончиках 200 и 112 доз соответственно.

1 мл раствора для ингаляций содержит кромогликата натрия 10 мг; в ампулах по 2 мл, в упаковке 48 шт.

Фарм. действ.: Ингибирование высвобождения медиаторов аллергической реакции из сенсibilизированных клеток, предупреждение развития ранней и поздней стадий астматической реакции в ответ на иммунологические и другие стимулы в легких.

Фармакокин.: После ингаляции дозированного аэрозоля примерно 10% дозы абсорбируется из дыхательных путей в системный кровоток. После ингаляции раствора из дыхательных путей абсорбируется 8% дозы, остальная часть удаляется из легких с током выдыхаемого воздуха или оседает на стенках ротоглотки, затем проглатывается и выводится через пищеварительный тракт. Из ЖКТ в системный кровоток всасывается 1% введенной дозы. Обратимо связывается с белками плазмы (около 65%), не метаболизируется. Выводится из организма в неизмененном виде с мочой и желчью приблизительно в равных количествах.

Показ.: Бронхиальная астма (включая астму физического усилия) у детей и взрослых (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Симптомы раздражения верхних дыхательных путей, кашель, явления бронхоспазма (возможно со снижением показателей функции внешнего дыхания; в подобных случаях прием препарата прекращают).

Взаим.: Несовместим с бромгексином и амброксолом (в виде ингаляций).

Передоз.: При передозировке - симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Дозированный аэрозоль для ингаляций: взрослым (включая лиц пожилого возраста) и детям - начальная доза 2 ингаляции 4 раза в сутки. При достижении оптимального терапев-

тического эффекта возможен переход на поддерживающую дозу, подбираемую индивидуально. Доза препарата может быть увеличена до 2 ингаляций 6-8 раз в сутки в случаях более тяжелого течения заболевания, а также в периоды усиленного антигенного воздействия. Дополнительный прием препарата может производиться непосредственно перед физической нагрузкой (для профилактики астмы физического усилия). Раствор для ингаляций: раствор следует ингалировать при помощи компрессорного, ультразвукового или пьезоэлектрического ингалятора через лицевую маску или мундштук. Взрослые (включая лиц пожилого возраста) и дети: по 1 ампуле 4 раза в сутки при помощи ингалятора. В более тяжелых случаях кратность приема может быть увеличена до 5-6 раз в день.

Предост.: Пациент должен быть проинструктирован относительно необходимости регулярного приема интала в отличие от приема лекарственных средств, эпизодически используемых для уменьшения бронхоспазма.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Интал плюс (Intal® plus)

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит кромогликата натрия 1 мг и сальбутамола сульфата 120,5 мкг; в баллончике 200 доз.

Фарм. действ.: Бронхорасширяющее (сальбутамол), подавление дегрануляции тучных клеток и выделения из них гистамина и других биологически активных веществ (кромогликат натрия).

Фармакокин.: После ингаляции примерно 10% от введенной в организм дозы абсорбируется из дыхательных путей в системный кровоток. Остальная часть выводится из легких с током выдыхаемого воздуха или оседает на стенках ротоглотки, затем проглатывается и выводится из организма через пищеварительный тракт. Из пищеварительного тракта в системный кровоток всасывается 1% от введенной дозы. Кромогликат натрия обратимо связывается с белками плазмы (около 65%), не подвергается метаболическому распаду. Выводится из организма в неизмененном виде с мочой и желчью приблизительно в равных соотношениях. Значительная часть дозы сальбутамола, введенной ингаляционно, также проглатывается. Сальбутамол хорошо всасывается из пищеварительного

тракта, достигая пиковой концентрации в плазме через 3 ч от момента введения. В значительной степени подвергается метаболизму при первичном прохождении через печеночный барьер; 50% выделяется с мочой в виде неактивного сульфатного конъюгата. Остальная часть выводится в неизмененном виде. Скорость абсорбции из легких значительно медленнее; пиковая концентрация в плазме достигается через 3-5 ч от момента введения.

Показ.: Бронхиальная астма (при необходимости сочетанной терапии стабилизаторами мембран тучных клеток и бета₂-адреностимуляторами).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Першение в горле, кашель, бронхоспазм, головная боль, транзиторные мышечные судороги, аллергические реакции (при возникновении прием прекращают и более не возобновляют) в виде ангионевротического отека, крапивницы, гипотензии, коллапса.

Взаим.: Не следует комбинировать с неселективными бета-адреноблокаторами.

Передоз.: Симптомы: при чрезмерной стимуляции бета₂-адренорецепторов может отмечаться тремор кистей рук, тахикардия, головная боль, головокружение, тошнота, рвота. Лечение: кардиоселективные бета-блокаторы (следует назначать с осторожностью больным бронхиальной астмой).

Примен. и доз.: Взрослые (в том числе пожилые) и дети - 2 ингаляции 4 раза в сутки. В более тяжелых случаях или при интенсивном контакте с аллергеном возможно увеличение дозы до 6-8 ингаляций в сутки.

Предост.: Возможным следствием лечения бета₂-адреностимуляторами может явиться развитие выраженной гипокалиемии. Особую осторожность в этой связи следует соблюдать при тяжелом течении бронхиальной астмы, поскольку гипокалиемический эффект бета₂-адреностимуляторов может быть потенцирован сопутствующей терапией производными ксантина, кортикостероидами, диуретиками, а также наличием гипоксии. В подобных ситуациях необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови. Для купирования приступов удушья пациентам необходимо дополнительно использовать препараты с быстрым бронходилатирующим эффектом. В случае уменьшения эффективности

бронходилататора при купировании приступов пациентам не следует самостоятельно увеличивать дозу (необходимо обратиться к врачу). Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с тиреотоксикозом.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Интетрикс (Intetrix®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит талихинола (метил-5-оксин) 50 мг, тилброхинола (метил-5 бром-7 оксина) 50 мг и N-додecil сульфат-метил-5 оксина 200 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное (антибактериальное, противогрибковое, амeboцидное).

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Интраглобин (Intraglobin®)

Иммуноглобулин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для в/в введения содержит протеина плазмы человека 50 мг (при этом иммуноглобулина больше или равно 95%) и прочие компоненты: моногидрат глюкозы (27,5 мг), иммуноглобулин А (меньше или равно 2,5 мг), хлорид натрия, вода для инъекций; в ампулах по 10 и 20 мл и во флаконах по 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее.

Показ.: Врожденные иммунодефицитные состояния (врожденный полный или частичный иммунодефицит, вариационный иммунодефицит, тяжелые комбинированные иммунодефициты, синдром Вискотта-Алдриха); идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (особенно острые формы у детей); приобретенный иммунодефицит (хроническая лимфоцитарная лейкемия, СПИД у детей, трансплантация костного мозга и другие виды трансплантации); синдром Кавасаки (в качестве дополнения к терапии ацетилсалициловой кислотой); профилактика и терапия инфекционных заболеваний.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, в частности, недостаточность иммуноглобулина класса А при наличии у пациента антител против иммуноглобулина А.

Бер. и корм. гр.: В контролируемых клинических исследованиях риск применения препарата во время беременности и в период кормления грудью не изучался, поэтому назначать его в этих случаях

следует с осторожностью. Иммуноглобулины переходят в материнское молоко и могут способствовать передаче антител новорожденным.

Поб. действ.: Головная боль, озноб, повышение температуры, тошнота, рвота, ломота в суставах, боль в спине, понижение кровяного давления, в единичных случаях (при высоких дозировках) - признаки асептического менингита, усугубление почечной недостаточности с повышением сывороточного креатинина (прежде всего у пациентов с нарушением функции почек), анафилактический шок.

Взаим.: Может изменять эффективность живых вакцин против кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы при применении на протяжении от 6 нед до 3 мес. Нельзя смешивать с другими препаратами (только с изотоническим раствором натрия хлорида), так как изменение концентрации электролита или значения pH может вызвать выпадение или денатурацию протеина.

Примен. и доз.: Дозы и режим введения устанавливаются в зависимости от заболевания и возраста пациента. Если не прописано иначе, то при заместительной терапии при вторичном и первичном иммунодефиците назначают по 2-8 мл (100-400 мг)/кг с интервалом в 1 мес, если не достигается достаточный уровень IgG или происходит быстрое его снижение, то дозу увеличивают до 16 мл (800 мг)/кг или вводят чаще. При трансплантации - до и после операции 10 мл (500 мг)/кг в неделю; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура - 8 мл/кг в течение 5 дней подряд или 20 мл (1 г)/кг 2 дня подряд. Синдром Кавасаки - 20 мл (1 г)/кг 2 дня подряд или 8 мл (400 мг/кг) в течение 5 дней подряд в сочетании с ацетилсалициловой кислотой. Начальная скорость в/в введения составляет 30 капель/мин, через 10 мин скорость постепенно увеличивают до 40 капель/мин (максимально). Раствор перед введением должен быть подогрет до температуры тела.

Предост.: Необходимо строго соблюдать скорость введения препарата, т.к. от нее могут зависеть некоторые тяжелые побочные явления. Пациент в течение всего периода инфузии и 20 мин после переливания должен находиться под врачебным контролем.

Пронзв.: Biotest (Германия)

Интрон-А (Intron-A®)

Интерферон альфа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит высокоочищенного рекомбинатного интерферона альфа-2в 3; 5; 10 или 30 млн. МЕ.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее.

Показ.: Множественная миелома, саркома Капоши, СПИД, злокачественная меланома, волосатоклеточный лейкоз, ларингопапилломатоз, хронические гепатиты С и В, остроконечные кондиломы, базальноклеточная карцинома, хронический миелолейкоз, поверхностный рак мочевого пузыря.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности только в случае, если польза для матери явно превышает потенциальную угрозу для плода; противопоказано при лактации.

Поб. действ.: Лихорадка, слабость, анорексия, диарея, тошнота, миалгия, головная боль, тромбоцитопения, гранулоцитопения; редко - рвота, артралгия, лабильность АД, тахикардия, спутанность сознания, головокружение, атаксия, парестезии, депрессия, повышенная нервная возбудимость, сонливость или бессонница, зуд, фурункулез, судороги икроножных мышц, запор, носовое кровотечение, дегидратация, нарушение гемокоагуляции, кашель, нарушение зрения, приступообразное ощущение жара, алопеция, стоматит, герпетические высыпания, пузырьковый лишай, крапивница.

Примен. и доз.: В/в, в/м, п/к, внутритканно или внутрипузырно. Множественная миелома: п/к - 3 раза в неделю (через день), начиная с дозы 2 млн. МЕ/кв.м, еженедельно увеличивая до максимально переносимой (5-10 млн. МЕ/кв.м). Саркома Капоши: в/в капельно (30 мин) - по 50 млн. МЕ/кв.м 5 дней подряд, с перерывом не менее 9 дней (режим поддерживается неограничено). Злокачественная меланома: рекомендуемая доза - п/к 3 раза в неделю (через день) по 10 млн. МЕ/кв.м. Среднее время восприимчивости 1-2 мес. Волосатоклеточный лейкоз: п/к 3 раза в неделю (через день) по 2 млн. МЕ/кв.м. Среднее время восприимчивости - 1-2 мес. Ларингопапилломатоз: п/к 3 раза в неделю (через день) по 3 млн. МЕ 6 и более месяцев. Хронический гепатит С: п/к или в/м 3 раза в неделю (через

день) по 3 млн. МЕ/кв.м. Оптимальная доза и длительность лечения определяются в процессе исследования. Хронический гепатит В: рекомендуемая доза - п/к 3 раза в неделю в течение 4-6 мес по 2,5-5 млн. МЕ/кв.м. Остроконечные кондиломы: введение изотонического раствора в основание кондилом 3 раза в неделю (через день) в течение 3 нед. Перед введением участок или участки кондилом следует обработать спиртовым раствором. Одновременно можно лечить не более 5 поражений. Максимальная общая доза не должна превышать 15 млн. МЕ в неделю. Обширные участки поражения могут лечиться путем многократных инъекций до 5 млн. МЕ в день или путем последовательных инъекций в различные участки поражения. Улучшение обычно наступает через 4-8 нед. Базально-клеточная карцинома: введение изотонического раствора в основание или внутрь опухоли. Перед введением участок поражения обрабатывают спиртовым тампоном. Для мест поражения с очагом менее 2 см вводят 0,15 мл (1,5 млн. МЕ) свежеприготовленного раствора в зону поражения 3 раза в неделю (через день) в течение 3 нед. Общая доза должна составлять 13 млн. МЕ. Язвенные поражения величиной 2-10 кв.см должны лечиться 3 раза в неделю (через день) в течение 3 нед по 0,5 млн. МЕ/кв.см (минимальная начальная доза - не менее 1,5 млн.МЕ). Одновременно производится лечение одного поражения. Хронический миелолейкоз: рекомендуемая доза - п/к 4-5 млн. МЕ/кв.м ежедневно или 3 раза в неделю (через день). Поверхностный рак мочевого пузыря: рекомендуется введение - 100 млн. МЕ внутривузырно 1 раз в неделю в течение 12 нед и затем 1 раз в месяц в течение максимального периода в 1 год.

Предост.: С осторожностью назначать детям (опыт применения ограничен).

Произв.: Schering-Plough (США)

Инутрал Инсулин ЧМ (Inutral Insulin HM)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит человеческого инсулина (биосинтетического происхождения) 40 МЕ; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается спустя 30 мин после введения, достигает максимума к 2-4 ч и продолжается 6-8 ч.

Показ.: Инсулинзависимый диабет: нововывявленный, у детей и беременных женщин, у пациентов с аллергическими реакциями на другие инсулины, у лиц с выраженными сосудистыми осложнениями; интенсифицированная инсулиновая терапия (инсулиновые помпы, безыгольные инъекторы и др.), для аппаратов с особым назначением (искусственная поджелудочная железа и др.); инсулиннезависимый диабет (комбинированная терапия с пероральными сахароснижающими препаратами, временная инсулинотерапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемические состояния, кома.

Поб. действ.: Гипогликемия (чувство голода, переутомления, тремор), аллергические реакции, липодистрофия.

Взаим.: Усиливают эффект тетрациклины, ЭДТА (в/в), изониазид, ингибиторы МАО, фенилбутазон и его производные, фенотиазины, препараты дикумарола, анаболические стероиды, альфа-адреноблокаторы, салицилаты, сульфаниламиды, ослабляют - кортикостероиды и адреномиметики. Алкоголь, бета-адреноблокаторы могут вызвать гипогликемию.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/в. Дозировка определяется индивидуально.

Предост.: При появлении симптомов гипогликемии необходимо принять сахар. С осторожностью используют при почечной недостаточности, инфекции, гипопитуитаризме, беременности, у лиц старше 65 лет.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Инутрал СПП (Inutral SPP)

Инсулин нейтрал для инъекций*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит полностью очищенного инсулина (из поджелудочной железы свиней) 40 МЕ; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект проявляется через 15-30 мин после инъекции, достигает пика через 2,5-5 ч, продолжается 7-8 ч.

Показ.: Сахарный диабет, диабетический кетоацидоз, диабетическая кома, диагностический инсулиновый тест.

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Гипогликемия, аллергические реакции (от кожной сыпи до анафилактического шока); эритема, зуд и липодистрофия в месте введения.

Примен. и доз.: П/к, в/м или в/в, избегая повторного введения в одни и те же места; доза подбирается индивидуально.

Предост.: Дозу необходимо корректировать при инфекциях, операциях, беременности, тиреоидных расстройствах, болезни Аддисона, гипопитуитаризме, почечной и печеночной недостаточности, у пациентов старше 65 лет.

Пронзв.: ICN Galenika (Югославия)

Инфезол® 40 (Infesol®-40)

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для парентерального питания содержит L-аланина 4 г, глицина 7 г, L-аргинина 4,55 г, L-аспарагиновой кислоты 2 г, L-глутаминовой кислоты 5 г, L-гистидина 1,35 г, L-изолейцина 2,10 г, L-лизина гидрохлорида - 2,5 г (что соответствует 2 г L-лизина), L-метионина 1,75 г, L-лейцина 2,75 г, L-фенилаланина 3,15 г, L-треонина 1,60 г, L-триптофана 0,5 г, L-валина 2,25 г, ксилита 50 г, натрия дисульфита максимум 0,02 г (что соответствует 12,5 мг SO₂), натрия ацетата 3,4 г, калия хлорида 1,86 г, магния хлорида 0,51 г и натрия гидроксида 0,6 г; во флаконах по 100 мл, в упаковке 20 шт. и по 500 мл, в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита аминокислот, углеводов и электролитов.

Показ.: Парентеральное питание при дефиците белка, в том числе у новорожденных и недоношенных детей, восполнение объема жидкости после операций, кровотечений, ожогов.

Противопоказ.: Острая почечная недостаточность, тяжелые поражения печени, нарушения аминокислотного обмена, интоксикация метанолом, гипергидратация; острая черепно - мозговая травма; осторожно назначают при сердечной недостаточности, ацидозе, гиперкалиемии.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, озноб, флебиты, аллергические реакции.

Взаим.: Раствор нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.

Примен. и доз.: В/в капельно за сутки 0,6-1 г аминокислот (до 25 мл/кг). Детям - 1,5-2,5 г аминокислот (до 60 мл/кг). При катаболических состояниях - 1,3-2 г аминокислот (до 50 мл/кг) в сутки.

Пронзв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Инфлубене (Influbene®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит парацетамола 500 мг, этилэфрина гидрохлорида 5 мг, бутетамата дигидрогенцитрата 20 мг, хлорфенамина гидрогенмалеата 2 мг и натрия цикламата 0,018 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, спазмолитическое, бронхорасширяющее, противокашлевое, М-холинолитическое, противоаллергическое (блокада гистаминовых H₁-рецепторов).

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания верхних отделов дыхательных путей (грипп, ОРЗ и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени или почек, тиреотоксикоз, феохромоцитомы, закрытоугольная глаукома, аденома предстательной железы с нарушениями мочеотделения, беременность, лактация.

Поб. действ.: Утомляемость, сухость во рту, затруднение мочеиспускания, нарушение аккомодации, повышение внутриглазного давления, тахикардия, ощущение сердцебиения, аритмии, боли в эпигастрии, тошнота, рвота, изменения картины периферической крови, лихорадка, гипогликемия, выраженные нарушения функции почек, аллергические реакции.

Взаим.: Не совместим с хлорамфениколом, алкоголем. Барбитураты, противоэpileптические препараты, рифампицин повышают гепатотоксичность. Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов, салицилатов, гуанетидина, эфедрина, кодеина.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям подросткового возраста назначают по 1 таблетке 1-4 раза в сутки с небольшим количеством воды. Максимальная разовая доза - 1 таблетка, суточная - 4 таблетки. Интервал между приемами препарата - 4-6 ч.

Пронзв.: Merckle (Германия)

Инфлюцид (Influcid®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для рассасывания или 100 г спиртового (45 об.%) раствора (для приема внутрь) содержат Aconitum D3 25 мг (10 г), Gelsemium D3 25 мг (10 г), Ipecacuanha D3 25 мг (10 г), Phosphorus D5 25 мг (10 г), Bryonia D2 25 мг (10 г) и Eupatorium perfoliatum D1 25 мг (10 г); таблетки в упаковке 60 шт.; раствор во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Предупреждение и устранение симптомов лихорадочных простудных заболеваний, стимуляция защитных сил организма.

Показ.: Простудные заболевания, грипп (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь (таблетки рассасывая, капли подержать перед проглатыванием некоторое время во рту) за полчаса до или после еды. При острых заболеваниях по 1 таблетке или по 10 капель каждый час (не более 12 раз в день), не более 1-2 дней до наступления улучшения, затем по 1-2 таблетки или по 10-20 капель 3 раза в день (до полного выздоровления); детям до 12 лет при острых заболеваниях по 1 таблетке каждые 2 ч (не более 8 раз в день), для последующего лечения по 1 таблетке 3 раза в день (до полного выздоровления). Для профилактики - по 1-2 таблетки или по 10-20 капель 3 раза в день; детям до 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в день.

Предост.: В случае первичного ухудшения следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Ипертрофан 40 (Ipertrofan 40)

Мепартрицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимым покрытием содержит мепартрицина 40 мг (150000 МЕ); в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Снижение уровня холестерина, эстрогенов, андрогенов в просвете ацинуса предстательной железы, необратимое связывание стерольных фракций кишечника, противогрибковое, противопаразитарное.

Показ.: Функциональные нарушения при доброкачественной гиперплазии простаты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Гастралгия, тошнота, рвота, диарея.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, по 1 таблетке в день в течение 1 мес.

Произв.: CSC (Италия)

Ирикар (Iricar®)

Сост. и ф.в.: 10 г мази содержат матричной настойки *Cardiospermum halicababum* 1 г, а также ланолин, спиртовую мазь на основе ланолина (состоит из спиртов на основе ланолина, белого ва-

зелина, цетилстеаринового спирта), густой парафин и очищенную воду; в тубах по 50 и 200 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, уменьшение лихенификации и шелушения.

Показ.: Воспалительные заболевания кожи с зудом, экзема, нейродермит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к ингредиентам мазевой основы.

Поб. действ.: В редких случаях - кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наносить на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день (можно использовать длительно).

Предост.: В случае первичного ухудшения следует прекратить применение препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Ируксол (Iruxol®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит клостридиопептидазы А 0,6 ЕД, хлорамфеникола 10 мг, сопутствующие ферменты в липофильной безводной мазевой основе; в тубиках по 30 г.

Фарм. действ.: Раноочищающее, ранозаживляющее, антибактериальное.

Показ.: Варикозные язвы, пролежни, ожоги II и III степени, обморожение, длительно незаживающие послеоперационные раны, предстоящая трансплантация кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания крови (панмиелопатия, гемолитическая желтуха) в анамнезе.

Поб. действ.: Ощущение жжения и боли в месте нанесения, нарушения гемопоеза, аллергические реакции.

Взаим.: Не рекомендуется комбинировать с другими препаратами для местного применения.

Примен. и доз.: Наносят на раневую поверхность 1-2 раза в сутки слоем толщиной 2 мм; сухие и плотные струпья предварительно размягчают, наложив влажную повязку, отторгнутую некротизированную ткань удалять при смене повязки.

Предост.: Для уменьшения раздражения на края раны следует наносить цинковую пасту (или какой-либо аналогичный препарат).

Произв.: Knoll (Германия)

Ируксол (Iruhol)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит клостридиопептидазы А 0,6 МЕ и хлорамфеникола 10 мг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Ранозаживляющее, раноччищающее, антибактериальное.

Клин. фарм.: Лечебный эффект наступает в первые 6 дней.

Показ.: Изъязвления и некрозы при варикозных язвах, пролежнях, ожогах II и III степени, гангрене конечностей, в т.ч. диабетической, отморожениях; длительно незаживающие раны (послеоперационные, лучевые, травматические повреждения мягких тканей), подготовка кожи перед трансплантацией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания крови в анамнезе.

Поб. действ.: Раздражение, жжение и боль в месте аппликации, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, наносят 1 раз в сутки на увлажненную раневую поверхность, размягченные некротизированные ткани удаляют. Во избежание возможного раздражения по краям раны можно нанести цинковую пасту.

Предост.: При назначении следует избегать любых других местных средств (за исключением физиологического раствора) из-за возможной инактивации протеолитического фермента препарата.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Йода спиртовой раствор (Solutio Iodi spirituosae)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора содержит йода 5 г, йодида калия 2 г, этанола 95% 40 г, воды дистиллированной 53 г; в ампулах по 1 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, раздражающее.

Показ.: Инфекции кожи и слизистых оболочек, миозит, невралгия, атеросклероз, сифилис (третичный).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Йодизм (при длительном применении).

Примен. и доз.: Накожно, в виде примочек; внутрь, после еды, с молоком по 1-12 капель 1-2 раза в день курсами по 30 дней 2-3 раза в год (при атеросклерозе) или по 5-50 капель 2-3 раза в день (при сифилисе).

Произв.: Борисовский ЗМП (Беларусь)

Йодамид 300 и 380 (Iodamidum 300 et 380)**Йодамид***

Сост. и ф.в.: Йодамид 300 - 65% раствор N-метилглюкаминовой соли йодамида, в ампулах по 20 мл; в упаковке 5 шт.

Йодамид 380 - 80% раствор смеси натриевой и N-метилглюкаминовой солей йодамида, в ампулах по 20 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Рентгеноконтрастное.

Показ.: Ангиография, вазография, аортография, ангиокардиография, урография, реноангиография.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, тяжелые поражения почек, печени, миокарда, гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации, шок, коллапс, активные формы туберкулеза, миеломная болезнь, гиперпротромбинемия.

Поб. действ.: Ощущение жара, головкружение, тошнота, рвота, тахикардия, цианоз, аритмии, фибрилляция желудочков, остановка сердца.

Примен. и доз.: В/в, в/а, внутривенно. Способ введения, дозы и скорость введения зависят от вида исследования.

Предост.: Необходимо определять чувствительность к йоду.

Произв.: Фармак (Украина)

Йокс (Jox)

Сост. и ф.в.: 45 мл аэрозоля для орошения содержат повидон-йодина 3,825 г, аллантаина 0,045 г и пропиленгликоля 13,5 г.

100 мл раствора - 8,5 г, 0,1 г и 30 г действующих веществ соответственно.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное.

Фармакодин.: Поливинил-пирролидон-йод выделяет при контакте с кожей или слизистыми оболочками йод, обладающий цитотоксическим эффектом.

Показ.: Ангины (катаральная, фолликулярная, лакунарная; вызванная стрептококками, при одновременном лечении антибиотиками); тонзиллит (острый и хронический); воспаление гортани, языка, афты; первые симптомы гриппа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к йоду), гипертиреозидизм, сердечная недостаточность, детский возраст (до 8 лет).

Поб. действ.: Аллергические реакции; редко - чувство жжения в месте аппликации.

Передоз.: При приеме большого количества препарата (если пациент находится в сознании) рекомендуется использовать активированный уголь, затем вызвать рвоту (при помощи теплой соленой воды или раздражения глотки).

Примен. и доз.: Ингаляционно, наружно. Аэрозоль - орошение проводят при помощи трубочки аппликатора, вставленной на 2-3 см в полость рта; задержав дыхание, 2 раза нажимают на колпачок: одно орошение - направо и второе - налево, 2-4 раза в день (при необходимости через каждые 4 ч). Аппликатор перед применением и после него промывают горячей водой. Раствор перед употреблением разбавляют водой в соотношении 1:20 - 1:40 (т.е. 2,5-5 мл или 1/2 чайной ложки в 100 мл воды) и ополаскивают полость рта или горло 2-4 раза в день.

Предост.: Препарат не предназначен для приема внутрь (нельзя вдыхать или проглатывать). У детей аэрозоль применяют, если они способны задержать дыхание при впрыскивании. При отсутствии эффекта в течение 3 суток необходимо проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется одновременное использование других средств для местного применения в полости рта (перекись водорода, антисептики). Следует иметь в виду, что препарат содержит 18,5% спирта.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

К-Дур (K-Dur®)

Калия хлорид

Сост. и ф.в.: 1 таблетка-ретард содержит калия хлорида 1,5 г, что соответствует содержанию калия 20 мэкв; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Донирование калия, коррекция водно-электролитного равновесия.

Фармакодин.: Участвует в проведении нервного импульса, поддержании внутриклеточного осмотического давления, уменьшает возбудимость и проводимость миокарда, угнетает автоматизм (в высоких дозах).

Показ.: Гипокалиемия, аритмии (в т.ч. при интоксикации сердечными гликозидами), пароксизмальная миоплегия.

Противопоказ.: Гиперкалиемия, полная блокада сердца, нарушение выделительной функции почек, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Необходимо оценить пользу для матери и потенциальный

риск для плода. В период лактации не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, гиперкалиемия, аритмия, ощущение онемения или покалывания в кистях рук, ступнях, губах, одышка, затрудненное дыхание, спутанность сознания, тревога, слабость, ощущение тяжести и слабости в ногах.

Примен. и доз.: Внутрь, суточная доза составляет 50-100 мэкв калия, высшая разовая доза - 20 мэкв калия.

Предост.: Не рекомендуется комбинировать с калийсберегающими диуретиками. С осторожностью применяют при нарушениях АВ-проводимости, заболеваниях ЖКТ, хронических заболеваниях почек. В период лечения необходим контроль уровня калия в крови и КЩР.

Произв.: Schering-Plough (США)

Каверил (Caveril)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая сахарной оболочкой, содержит верапамила гидрохлорида 40 или 80 мг; в упаковке 50 и 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антиаритмическое, гипотензивное, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Стенокардия (стабильная и нестабильная, вазоспастическая), наджелудочковые тахикардии, мерцание предсердий, артериальная гипертензия (слабой и средней выраженности).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синусовая брадикардия, прогрессирующая АВ-блокада, желудочковая тахикардия, мерцание или трепетание предсердий на фоне WPW-синдрома, артериальная гипотония, кардиогенный шок.

Бер. и корм. гр.: При беременности допустимо только по жизненным показаниям. Лактирующие женщины должны приостановить грудное вскармливание.

Поб. действ.: Запор, тошнота, гипотензия, брадикардия, предсердно-желудочковая блокада, ухудшение сердечной недостаточности, преходящая асистолия, головокружение, головная боль, покраснение лица, утомляемость, нарушение функции печени с увеличением трансаминаз и щелочной фосфатазы в крови; отеки голеностопного сустава, гинекомастия, гиперплазия десен, эритема, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при стенокардии - по 120 мг 3 раза в день; при стенокардии напряжения (некоторым больным) - по 80 мг 3 раза в день. При наджелудочковой тахикардии

взрослым - по 40-120 мг 3 раза в день (в зависимости от тяжести состояния); детям старше 2 лет - по 40-120 мг 2-3 раза в день (с учетом возраста и эффективности лечения). При артериальной гипертензии взрослым - по 80-160 мг 3 раза в день; в дальнейшем возможна комбинация с др. гипотензивными средствами, особенно диуретиками. При нарушении функции печени и сердечной проводимости следует снижать дозу.

Предост.: С осторожностью следует использовать при синдроме слабости синусового узла, тяжелой сердечной недостаточности, при нарушении функции печени и почек, у пожилых, в сочетании с бета-адреноблокаторами и дигоксином. Внезапная отмена препарата может вызвать увеличение продолжительности и частоты загрудинных болей.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Кавинтон (Cavinton®)

Винпоцетин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 5 мг винпоцетина; в упаковке 50 шт.

1 ампула (по 2 мл) - 10 мг винпоцетина; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Улучшение кровоснабжения головного мозга (в том числе при церебральной ишемии).

Показ.: Острая и хроническая недостаточность мозгового кровообращения (транзиторная ишемия, прогрессирующий инсульт, состояния после инсульта, мультиинфарктная деменция, атеросклероз церебральных артерий, посттравматическая и гипертензивная энцефалопатия); психические и неврологические расстройства у больных с цереброваскулярной недостаточностью (нарушения памяти, головокружение, головная боль, афазия, апраксия, двигательные расстройства); сосудистые заболевания глаз (в связи с атеросклерозом, ангиоспазмом сосудистой оболочки и сетчатки, дегенеративные заболевания сосудистой оболочки, сетчатки или желтого пятна, артериальные и венозные тромбозы или эмболии, вторичная глаукома); снижение слуха (сосудистого, токсического или возрастного генеза), болезнь Меньера, кохлеовестибулярный неврит, шум в ушах, головокружения (лабиринтного происхождения); вазовегетативные проявления климактерического синдрома.

Противопоказ.: Выраженная ишемическая болезнь сердца и тяжелые формы аритмии (для парентерального применения).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Преходящее снижение артериального давления, тахикардия.

Взаим.: Несовместим в одном шприце с гепарином.

Примен. и доз.: Внутрь и парентерально. Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в сутки, поддерживающая доза - по 1 таблетке в течение длительного времени (месяцы, годы). В виде инфузии (обычно в острой стадии заболеваний): содержимое 2 ампул разводят в 500-1000 мл инфузионного раствора. При хорошей переносимости дозу препарата в течение 3-4 дней повышают до 1 мг/кг, лечение продолжают в течение 10-14 дней, постепенно снижая дозу перед отменой препарата. После улучшения клинической картины переходят на прием препарата внутрь.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Калгель® (Calgel®)

Сост. и ф.в.: Водорастворимый, не содержащий сахара, зубной гель содержит 0,33% лидокаина гидрохлорида и 0,1% цетилпиридиния хлорида.

Фарм. действ.: Анестезирующее, антисептическое.

Показ.: Болевой синдром при прорезывании зубов у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции на лидокаин (требующие отмены препарата).

Примен. и доз.: Местно, детям в возрасте 3 мес и старше - небольшое количество геля (около 7,5 мм) наносят на кончик чистого пальца и осторожно втирают в воспаленный участок десны ребенка, при необходимости возможно повторное нанесение с интервалом не менее 20 мин, но не чаще 6 раз в день.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Календулы настойка (Tinctura Calendulae)

Сост. и ф.в.: Спиртовая (на 70% спирте) настойка (1:10) цветов и цветочных корзинок ноготков; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное, желчегонное.

Показ.: Инфицированные раны, ожоги; ангина, инфекции полости рта и верхних дыхательных путей, хронический холецистит.

Примен. и доз.: Наружно, в виде полосканий (1 чайная ложка на стакан воды) и внутрь (как желчегонное средство) - по 10-20 капель на прием.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Калий-нормин (Kalium-normin)

Калия хлорид

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит калия хлорида 1000 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восстановление водно-электролитного равновесия, донация калия.

Показ.: Гипокалиемия (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Уремическая (олигоанурическая) стадия острой и хронической почечной недостаточности, нарушения абсорбционной функции ЖКТ.

Поб. действ.: Гиперкалиемия, рвота, понос, стул с кровью.

Взаим.: Калийсберегающие диуретики, ингибиторы холинэстеразы ускоряют развитие и увеличивают уровень гипергликемии.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1-6 таблеток в сутки.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Калинор (Kalinor®)

Сост. и ф.в.: 1 шипучая таблетка содержит моногидрата цитрата калия 2,17 г, кислого карбоната калия 2,0 г и лимонной кислоты 2,057 г; в упаковке 15 и 30 шт.

Готовый к употреблению раствор содержит 40,0 ммоль ионов калия и не менее 13,3 ммоль цитрат-ионов.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита калия.

Фармакодин.: Участвует в нервно-мышечной передаче, восстанавливает физиологическое равновесие при недостаточности калия.

Показ.: Гипокалиемия (менее 3,2 ммоль/л) при метаболическом ацидозе и терапии препаратами наперстянки; профилактика гипокалиемии при кетоацидозе; гипокалиемические нервно-мышечные нарушения или сердечные аритмии.

Противопоказ.: Гиперкалиемия при обезвоживании, пониженной выделительной функции почек, болезни Аддисона, синдроме Гампсторпа.

Поб. действ.: Тошнота, отрыжка, изжога, рвота, метеоризм, боли в животе, понос; редко - аллергические реакции с кожным зудом или отеком лица.

Взаим.: Ослабляет действие сердечных гликозидов. Антагонисты альдостерона, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, противовоспалительные препараты уменьшают выведение калия почками.

Передоз.: Симптомы гиперкалиемии (особенно в случаях ацидоза или почечной недостаточности): брадикардия, АВ-блокада, фибрилляция желудочков, остановка сердца в диастоле (на ЭКГ при высоких концентрациях калия - расширение комплекса QRS), гипотония, парестезии, восходящий паралич, спутанность сознания. Концентрация калия в плазме свыше 8 ммоль является летальной. Лечение: парентеральное введение 10% раствора глюконата кальция, глюкозы с инсулином, ионообменных веществ (перорально или в клизмах), может потребоваться гемодиализ.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, растворив 1 таблетку в стакане воды (100-200 мл), при необходимости добавив фруктовый сок, выпить маленькими глотками за 10-15 мин, по 1-3 таблетки в день (разовая доза не должна быть выше 1 таблетки (40 ммоль калия), в течение нескольких дней или недель.

Предост.: Необходимо учитывать, что 1 таблетка содержит 1,42 г сахараина.

Произв.: Knoll (Германия)

Калипсол (Calypsol)

Кетамин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит кетамина 500 мг (в форме гидрохлорида); в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Наркозное, снотворное.

Показ.: Обезболивание кратковременных операций и диагностических вмешательств, вводный наркоз.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия, эклампсия.

Поб. действ.: Повышение АД, тахикардия, слюнотечение, тошнота, угнетение дыхательного центра, при пробуждении - галлюцинации, психомоторное возбуждение, психозы.

Взаим.: Усиливает эффект ингаляционных наркозных средств, миорелаксирующий эффект тубокурарина, не изменяет - панкурония и сукцинилхолина.

Примен. и доз.: В/в от 1 до 4,5 мг/кг, у детей 0,5-4,5 мг/кг, средняя доза для анестезии продолжительностью 5-10 мин - 2 мг/кг. В/м, доза от 6,5 до 13 мг/кг вызывает анестезию приблизительно на 12-25 мин, для детей - 2-5 мг/кг.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Калия глутаминат (Kalium glutaminicum)

Глутаминовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 0,5 г калиевой соли глутаминовой кислоты (калия 22%, глутаминовой кислоты 78%); в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита калия, нормализация калиевого, белкового, энергетического, водно-электролитного обмена и кислотно-основного баланса, улучшение функционального состояния печени.

Показ.: Гипокалиемии различного генеза, нарушения сердечного ритма, лечение и профилактика интоксикации сердечными гликозидами; атеросклеротический кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца, церебральный атеросклероз в пожилом и старческом возрасте, острые и хронические гепатиты.

Противопоказ.: Гиперкалиемия, нарушение выделительной функции почек.

Поб. действ.: Тошнота, неприятный вкус во рту.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды по 1-2 таблетки 3 раза в день в течение 3-4 нед.

Пронзв.: Дарница (Украина)

Калия оротат (Kalii orotas)

Оротовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит калия оротата 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анаболическое, стимуляция репаративных процессов, диуретическое.

Показ.: Токсические заболевания печени (в т.ч. при бактериальной и лекарственной интоксикации), анемия, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, аритмии, хроническое физическое перенапряжение.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические дерматозы.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды - по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день. Курс - 20-40 дней.

Пронзв.: Акрихин (Россия)

Калия оротат (Kaaliumorotaat)

Оротовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит калия оротата 0,5 г; в контурной ячейковой упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анаболическое, нестероидное.

Показ.: Заболевания печени (в т.ч. интоксикационные), дистрофия миокарда, экстрасистолия и мерцательная аритмия, гипотрофия у детей (алиментарная и алиментарно-инфекционная); тяжелая и постоянная физическая нагрузка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, цирроз печени с асцитом.

Поб. действ.: Диспепсия, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды или через 4 ч после еды. Взрослым - по 0,5-1,5 г (в исключительных случаях до 3 г) в сутки в 2-3 приема, курс лечения - 20-40 дней; при необходимости лечение следует продолжить через 1 мес. Детям при гипотрофии и анемии - 0,01-0,02 г в сутки в 2-3 приема в течение 3-5 нед.

Пронзв.: Таллинский фармацевтический завод (Эстония)

Калия-магния-аспарагинат (Potassium-magnesium asparaginate)

Калия и магния аспарагинат

Сост. и ф.в.: 1 л инфузионного раствора содержит DL-аспарагиновой кислоты 15,16 г, калия гидроксида 3,9 г, магния оксида 1,116 г и ксилита 16,7 г; во флаконах по 500 мл. Калорийность 110 ккал/л (461,4 кДж/л), общее содержание азота 1,56 г/л.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита калия, магния.

Показ.: Сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, интоксикация гликозидами, нарушения сердечного ритма; гипокалиемия (вызванная салуретиками, слабительными средствами, стероидными гормонами, хронической рвотой или затяжным поносом).

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции почек, гиперкалиемия, гипермагниемия, АВ-блокада, тяжелая миастения, непереносимость фруктозы и сорбита, дефицит фруктозо-1,6-дифосфатазы, отравление метиловым спиртом.

Поб. действ.: Симптомы гиперкалиемии и гипермагниемии (при повышенной скорости вливания).

Примен. и доз.: В/в, 1-2 вливания в сутки по 500 мл (скорость 20-25 капель в минуту). В течение недели до проведения хирургических вмешательств на сердце и в течение недели после таковых вливают ежедневно по 500 мл.

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Калпол® (Calpol®)

Парацетамол*

Калпол® 6 плюс (Calpol® 6 plus)

Парацетамол*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 5 мл суспензии для приема внутрь для детей содержат парацетамола 120 мг.

5 мл суспензии Калпола 6 плюс - 250 мг.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Слабый или умеренный болевой синдром (головная боль, мигрень, невралгия, зубная боль, боль при прорезывании зубов, фарингит, ревматические боли), грипп, простуда, сопровождающиеся повышенной температурой, лихорадочные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (младше 3 мес).

Поб. действ.: Редко: кожные высыпания, аллергические реакции; при высоких дозах - тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия, агранулоцитоз, нарушение функции почек, папиллярный некроз, печеночный некроз (при передозировке).

Взаим.: Гепатотоксичность (при передозировке) усиливается алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, рекомендуемая доза суспензии для детей может приниматься повторно до 4 раз в день с интервалами в 4 ч и более. Детям до 12 лет - от 6 до 12 лет - 10-20 мл; от 1 до 5 лет - 5-10 мл; 3 мес-1 год - 2,5-5 мл. Калпол суспензия 6 плюс - взрослым и детям 12 лет - от 500 мг до 1 г в сутки за 4 приема; 6-12 лет - 5-10 мл; 1-5 лет - 2,5-5 мл; 3 мес-1 год - используют суспензию для детей.

Предост.: Не следует превышать рекомендуемую дозу. С осторожностью назначают при нарушениях функции печени или почек, больным, принимавшим барбитураты, трициклические антидепрессанты, алкоголь.

Прозв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Калько (Calco)

Кальцитонин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула для ректального применения содержит синтетического лососевого кальцитонина (без животных белков) 100 или 200 МЕ.

1 флакон с раствором для инъекций - 50 или 100 МЕ.

1 доза аэрозоля для назального применения - 50 или 100 МЕ; в баллонах с распылителем.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита кальцитонина, гипокальциемическое, ингибирование костной резорбции, противовоспалительное (противоэкссудативное), анальгезирующее.

Фармакокин.: Очень быстро абсорбируется, метаболизируется в почках и интенсивно выводится через мочевыводящие пути (через 4 ч после введения концентрация в крови практически не определяется).

Показ.: Болезнь Педжета, остеопороз (в т.ч. постменопаузальный), гиперкальциемия при злокачественных новообразованиях (рак молочной железы, легких, почек и др.); гиперпаратиреоз; интоксикация витамином D, синдром Саддека, обусловленный посттравматическим остеопорозом, рефлекторная дистрофия и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гиперемия лица, гипертермия, местные или генерализованные аллергические реакции (требующие отмены препарата и соответствующей терапии); при инъекционном способе введения: реакции в месте инъекции; для аэрозольной формы: ринит, ринорея, чихание, ощущение сухости в носу, гиперемия, эпистаз.

Примен. и доз.: Парентерально, при болезни Педжета, остеопорозе, синдроме Саддека - п/к или в/м по 100 МЕ ежедневно или через день; после улучшения состояния - по 50 МЕ в день; при гиперкальциемии (в тяжелых или неотложных случаях) - в/в медленно струйно или капельно в течение 6 ч (предварительно развести в 500 мл физиологического раствора) по 5-10 МЕ на 1 кг массы тела в 2-4 приема. Ректально, при болезни Педжета - 1 капсула 2 раза (100 МЕ) или 1 капсула (200 МЕ) 1 раз в день; при постменопаузальном остеопорозе - 100 МЕ 1 раз в день или 200 МЕ через день. Интраназально, суточная доза - 100 МЕ: или по 50 МЕ в каждую

ноздрю, или 100 МЕ - в одну; при необходимости - до 200 МЕ в день: по 100 МЕ в каждую ноздрию, разделенные на утренний и вечерний прием. Длительность курса лечения - несколько месяцев. При возобновлении нарушений (через 1-2 мес) рекомендуется повторный курс.

Предост.: Перед началом лечения (Калько в виде инъекционного раствора) рекомендуется провести кожный или внутрикожный тест у больных, предрасположенных к аллергии. За больными с хроническим ринитом или перенесшими операцию на носовых пазухах при приеме аэрозольной формы необходим постоянный контроль (в связи с возможностью повышенной абсорбции препарата). Во время длительного лечения лежащих больных следует ежемесячно проводить биохимический анализ крови и исследование функции печени. Детям назначают не более нескольких недель под строгим контролем врача. При длительном лечении возможно появление антител к кальцитонину (имеют очень низкий титр и не снижают эффективности лечения). Открытый аэрозольный баллон следует использовать в течение 1 мес.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Кальцевита (Cal-C-Vita®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит витамина С 1000 мг, кальция 250 мг, витамина D₃ 7,5 мкг, витамина В₆ 15 мг, натрия 227 мг, углеводов 440 мг (соответствует 7,6 кДж); в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов С, D₃, В₆ и кальция, повышение неспецифической резистентности организма.

Показ.: Повышенная потребность в веществах, формирующих ткани, в период роста, во время болезни и в период выздоровления, в пожилом возрасте, при физическом и умственном напряжении, в периоды наибольшего распространения простудных заболеваний; для повышения иммунитета во время инфекций; при быстром наступлении физической усталости; для стимуляции заживления ран и переломов; профилактика гиповитаминоза С, D₃, В₆ и кальция; остеопороз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз D, гиперкальциемия, почечнокаменная или мочекаменная болезнь, почечная недостаточность.

Поб. действ.: Не проявляются при соблюдении рекомендаций по дозированию. При длительной передозировке могут наблюдаться гипервитаминоз D или гиперкальциемия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день (таблетку растворяют в стакане воды).

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Кальцекс (Calceх)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 0,5 г комплексной соли гексаметилентетрамина (не менее 48%) и кальция хлорида (не менее 18%); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное, антигистаминное.

Фармакодин.: Антисептический эффект обусловлен формальдегидом (образуется в кислой среде из гексаметилентетрамина), противовоспалительный, антигистаминный, кровоостанавливающий, понижение проницаемости сосудов - хлоридом кальция.

Показ.: Острые респираторные инфекции: грипп, ОРЗ и др.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Диспептические расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки.

Произв.: Татхимфармпрепараты (Россия)

Кальций-Сандоз форте (Calcium-Sandoz® forte)

Кальция лактат-глюконат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит кальция лактата/глюконата 2,94 г и кальция карбоната 0,3 г, (что эквивалентно 500 мг или 12,5 ммоль ионизированного кальция).

100 мл сиропа - кальция глюконата 28,75 г и кальция лактобионата 5,9 г; во флаконах по 210 мл.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита кальция в организме.

Показ.: Остеопороз, профилактика пре- и постменопаузальной деминерализации костей, рахит и остеопороз (в качестве дополнения к основной терапии), латентная тетания, состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в кальции: беременность и лактация, период интенсивного роста у детей, аллергические состояния (поддерживающая терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиперкальциемия, выраженная гиперкальциурия, тяжелая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (метеоризм, диарея).

Взаим.: Тиазидные диуретики увеличивают вероятность гиперкальциемии.

Примен. и доз.: Внутрь, предварительно растворив таблетки в стакане воды, по 1-2 таблетки (500-1000 мг) в день, в тяжелых случаях возможно увеличение дозы до 4 таблеток (2000 мг) в сутки. Для лечения маленьких детей предназначен сироп.

Предост.: Следует регулярно контролировать уровень мочевой экскреции кальция с мочой.

Пронзв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Кальципарин (Calciparine®)

Гепарин кальция

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 0,5 мл раствора для инъекций содержит гепарината кальция 12500 МЕ; в упаковке 10 шт.

1 предварительно заполненный шприц с разовой дозой 0,2 мл - 5000 МЕ; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное прямое.

Показ.: Тромбозы, тромбоэмболии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кровотечения или склонность к кровотечениям (тромбопения, гипофибриногенемия, гемофилия, нарушение сосудистой проницаемости), язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острый бактериальный эндокардит, кровоизлияния в мозг, послеоперационный период при операциях на головном и спинном мозге.

Поб. действ.: Геморрагические явления, увеличение уровня трансаминаз, гиперэозинофилия, тромбоцитопения, остеопороз (при длительном лечении), аллергические реакции в месте введения: гематомы, образование узелков, кожный некроз.

Взаим.: Несовместим с НПВС, тиклопидином, салициловой кислотой и другими салицилатами (парентерально).

Передоз.: Проявляется гипокоагуляцией, нейтрализуется медленным в/в введением протамина.

Примен. и доз.: П/к; при тромбоэмболиях: 1 день 0,1 мл (2500 МЕ на 10 кг) - стандартная пробная доза; через 5-7 ч контроль времени свертывания по Now-

ell (оно должно увеличиваться в 2-3 раза по сравнению с контролем); через 12 ч - вторая инъекция в прежней дозе или скорректированной по данным контроля; в последующие дни - каждые 12 ч в дозе, выбранной для второй инъекции. Контроль через 5-7 ч после инъекции каждые 3-4 дня. Детям - 0,2-0,3 мл. Профилактическое использование: стандартная схема - 5000 МЕ (0,2 мл) 2-3 раза в день или 7500 МЕ (0,3 мл) 2 раза в день в зависимости от массы тела и степени риска; профилактика в хирургии: стандартная схема - по 5000 МЕ (0,2 мл) за 2 ч до операции, затем каждые 12 ч не менее 10 дней.

Предост.: Осторожно назначать при почечной или печеночной недостаточности, гипертонии, язвах ЖКТ в анамнезе, сосудистой хориоретинопатии, а также в сочетании с nepřямыми антикоагулянтами, глюкокортикоидами, декстраном.

Пронзв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Кальцитрин (Calcitrium)

Кальцитонин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит кальцитонин (свиной) 10 или 15 ЕД.

Фарм. действ.: Регуляция обмена кальция в организме, уменьшение резорбции костной ткани, снижение содержания кальция и фосфата в крови, антагонизм с паратиреоидным гормоном.

Показ.: Системные заболевания, характеризующиеся усиленной перестройкой скелета (болезнь Педжета, несовершенный остеогенез, спонтанное рассасывание костей, асептический некроз головок бедренных костей у взрослых, остеопороз (климактерический, стероидный, паратиреоидный и др.), фиброзная дисплазия, замедленное сращение переломов, травматический и лучевой полиомиелит, зональная патологическая перестройка костей у спортсменов, пародонтоз).

Противопоказ.: Гипокальциемия, беременность, период лактации.

Бер. и корм. гр.: При беременности и кормлении грудью препарат не применяют.

Поб. действ.: Приливы крови к лицу, повышение артериального давления, тошнота, рвота, аллергические реакции в месте инъекции.

Передоз.: Проявляется признаками гипокальциемии (парестезии, подергивания мышц). В этих случаях следует парентерально ввести глюконат кальция.

Примен. и доз.: Кальцитрин, растворенный в воде для инъекций, вводят в/м или п/к ежедневно 1 раз в день, делая перерыв каждый 7-й день, или через день в течение 2-3 мес. Спортсменам с патологической зональной перестройкой костей, больным с замедленным сращением переломов, а также при длительном применении глюкокортикоидов вводят по 1 ЕД в день; при системных поражениях скелета средней тяжести, при травматическом и лучевом остеомиелите по 2-3 ЕД; при тяжелых системных и очаговых поражениях скелета по 5 ЕД в день. Повторный курс - не ранее, чем через 2 мес. При лечении кальцитрином рекомендуется назначать внутрь препараты кальция (глицерофосфат или глюконат кальция по 4-6 г в день).

Предост.: Больных с низким содержанием кальция в крови (ниже 10 мг%) или с выраженной кожной реакцией на кальцитрин (эритема, припухлость) кальцитрином не лечат. При повышении артериального давления, приливах крови к лицу следует сделать перерыв на 2-3 дня, а при повторных реакциях отменить препарат.

Произв.: Эндокринный препарат (Литва)

Кальция глицерофосфат (Calcii glycerophosphas)

Кальция глицерофосфат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глицерофосфата кальция 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Общеукрепляющее.

Показ.: Переутомление, дистрофия, рахит.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,2-0,5 г, детям - по 0,05-0,2 г на прием (часто в сочетании с препаратами железа, мышьяка, с малыми дозами стрихнина) 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Кальция глюконат (Calcii gluconas)

Кальция глюконат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит кальция глюконата 1 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Регулирующее обмен кальция и фосфора, противовоспалительное, противоаллергическое, гемостатическое.

Показ.: Гипофункция щитовидной железы, гипокальциемия, аллергические заболевания, кровотечения, повышенная проницаемость сосудов, гепатит (паренхиматозный, токсический), нефрит, эклампсия, отравление солями магния и щавелевой кислотой.

Противопоказ.: Склонность к тромбообразованию, атеросклероз, гиперкальциемия.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, брадикардия.

Примен. и доз.: В/м, в/в (медленно в течение 2-3 мин). Взрослым - 5-10 мл ежедневно или 1 раз в 2-3 дня, детям (не рекомендуется в/м введение) - 1,5 мл каждые 2-3 дня; раствор перед введением согревают до температуры тела.

Произв.: Кальцекс (Латвия)

Кальция глюконат (Calcii gluconas)

Кальция глюконат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кальция глюконата 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение относительного (или абсолютного) дефицита ионов кальция, противовоспалительное, противоаллергическое, гемостатическое.

Показ.: Недостаточность паращитовидных желез, гипокальциемия, аллергические заболевания, кровотечения, повышенная проницаемость сосудов, отравление солями магния, щавелевой и фтористой кислоты.

Противопоказ.: Гиперкальциемия, гиперкоагуляция, атеросклероз.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, брадикардия.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой - по 1-3 г 2-3 раза в день; детям - от 0,5 г до 2-3 г 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Кальция добезилат (Calcii dobesilas)

Кальций добезилат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кальция добезилата 250 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, ангиопротекторное.

Показ.: Диабетические ангиопатии, гломерулосклероз, атеросклероз сосудов нижних конечностей, тромбофлебит поверхностных вен, нарушение гемодинамики артериовенозного происхождения.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1 таблетке 3 раза в день. Курс - от 3 нед (при флебопатиях) до 6-8 мес.

Пронзв.: Олайнфарм (Латвия)

Кальция пантотенат (Calcii pantothenas)

Кальция пантотенат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кальция пантотената 0,1 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция образования кортикостероидов, активация метаболических процессов в тканях, оптимизация энергетического обеспечения сократительной функции миокарда, улучшение течения процессов регенерации.

Клин. фарм.: Является составной частью кофермента А, играющего важную роль в процессах ацетилирования и окисления; кроме того участвует в углеводном и жировом обмене и синтезе ацетилхолина; содержится в значительных количествах в коре надпочечников.

Показ.: Полиневрит, невралгия, бронхит, бронхиальная астма, атония кишечника, экзема, трофические язвы, ожоги, аллергические реакции, токсикозы беременных, недостаточность кровообращения, абстинентный синдром (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: При приеме внутрь - тошнота, рвота, изжога, при в/м введении - болезненность и в единичных случаях - инфильтраты в месте введения.

Взаим.: Повышает эффективность сердечных гликозидов, уменьшает токсическое действие аминогликозидов и препаратов мышьяка.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,1-0,2 г 2-4 раза в день, детям от 1 года до 3 лет - по 0,005-0,1 г на прием, от 3 до 14 лет - 0,1-0,2 г на прием 2 раза в день. При послеоперационной атонии кишечника - по 0,25 г каждые 6 ч. Курс - 3-4 мес.

Пронзв.: ICN Октябрь (Россия)

Кальция фолинат (Calcium folinate)

Кальция фолинат*

Кальциумфолинат-Эбеве (Calciumfolinat-Ebewe)

Кальция фолинат*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит кальция фолината 15 или 100 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл раствора для инъекций - 3 мг в ампулах по 1 мл; в упаковке 10 шт. или 10 мг в ампулах по 3 и 10 мл; в упаковке 5 шт. и во флаконах по 20 и 30 мл; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита фолиевой кислоты, уменьшение токсичности и нейтрализация действия антагонистов фолиевой кислоты.

Показ.: Абсолютный или относительный дефицит фолиевой кислоты (в т.ч. при лечении метотрексатом и 5-фторурацилом).

Противопоказ.: Витамин В₁₂-дефицитные анемии, в том числе пернициозная.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, в/в (струйно или капельно) - 6-12 мг/кв.м поверхности тела в первые 2-4 ч (не позднее чем через 24 ч) после инфузии метотрексата, затем повторно с интервалом в 3-6 ч в течение 72 ч, после чего переходят на пероральный прием (в тех же дозах). Местно, на изъязвленную поверхность слизистой полости рта (следует избегать проглатывания раствора).

Пронзв.: Ebewe (Австрия)

Камфорный спирт (Spiritus Camphoratus)

Камфора

Сост. и ф.в.: 100 мл водно-спиртового раствора содержат камфоры 2 г, спирта 90% 70 мл, воды до 100 мл; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, раздражающее.

Показ.: Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматизм, артриты), профилактика пролежней.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наружно, в виде растираний.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Канамицин сульфат (Kanamycini sulfas)

Канамицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит канамицина сульфата 0,5 или 1 г; в комплекте с водой для инъекций в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противотуберкулезное.

Показ.: Туберкулез, пневмония, абсцесс легких, пиелонефрит, пиелит, послеоперационные инфекции (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, неврит слухового нерва, беременность.

Поб. действ.: Неврит слухового нерва, поражение почек (микрогематурия, альбуминурия), аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м. Туберкулез - по 1 г 1 раз в сутки. Нетуберкулезные инфекции: разовая доза для взрослых - 0,5 г, суточная - 1-1,5 г (по 0,5 г 2-3 раза в день в течение 5-7 дней). Детям - 15-20 мг/кг/сутки, но не более 50-75 мг.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Кандибене (Candibene®)

Клотримазол*

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит клотримазола 10 мг; в тубах по 30 г.

1 мл раствора для наружного применения - 10 мг; во флаконах по 40 мл.

1 таблетка вагинальная - 100 или 200 мг; в упаковке 6 и 3 шт. соответственно в комплекте с аппликатором.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра, фунгицидное, антимикробное.

Показ.: Микозы кожи, кожных складок, стоп, онихомикозы; отрубевидный лишай, эритразма, поверхностные кандидозы, микозы, осложненные вторичной пиодермией; кандидозный вульвовагинит, трихомониаз; генитальные суперинфекции, санация родовых путей перед родами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местные (покраснение, ощущение жжения, зуд) и аллергические (экзантема) реакции.

Примен. и доз.: Наружное применение крема или раствора: для лечения дерматомикоза препарат наносят тонким слоем на очищенные и сухие пораженные участки кожи 2-3 раза в день, в течение не менее 4 нед; при грибковых заболева-

ниях кожи ног лечение рекомендуется продолжать в течение 2 нед после купирования симптомов заболевания; для лечения онихомикозов предпочтительнее раствор препарата. Генитальные инфекции: таблетку вводят глубоко во влагалище с помощью аппликатора. Лечение проводят курсами: по 1 вагинальной таблетке (100 мг) ежедневно вечером в течение 6 дней или по 200 мг (1 таблетка) 3 дня; при необходимости в последующие 6-12 дней по 1 вагинальной таблетке утром и вечером. Для санации родовых путей - 200 мг однократно.

Предост.: Вагинальные таблетки не рекомендуется применять во время менструации; их введение беременным должно проводиться без аппликатора. Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо лечение полового партнера.

Произв.: Merckle (Германия)

Канестен (Canesten®)

Клотримазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка вагинальная содержит клотримазола 100 мг; в упаковке 6 шт. 1 мл раствора или 1 г крема - 10 мг; раствор во флаконах по 20 и 50 мл, крем в тубах по 20, 35 и 50 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра.

Показ.: Наружное применение: дерматомикозы, кандидозный вульвит, кандидозный баланит (только крем); вагинальные формы: вагинальные суперинфекции, кандидозный вульвит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Кожные реакции (жжение, покалывание, покраснение), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, втирать или смазывать кисточкой пораженные участки кожи 2-3 раза в день в течение 1-4 нед, разовая доза (на площадь поверхности размером с ладонь) составляет 5 мм крема или несколько капель раствора. Лечение продолжается 2 нед после исчезновения субъективных симптомов. Вагинально - по 1 таблетке на ночь или по 1 аппликатору вагинального крема в течение 6 дней. При кандидозном вульвите или баланите крем рекомендуется применять 2-3 раза в день в течение 1-2 нед.

Произв.: Bayer (Германия)

Канефрон (Canephron®)

Сост. и ф.в.: 100 г капель содержат 29 г водно-спиртового экстракта (экстра-

гент 59% этанол) из *Herba Centaurii* (золототысячник) 0,6 г, *Fructus Cynosbati sine Semine* (кожура плодов шиповника) 1 г, *Radix Levistici* (любисток) 0,6 г, *Folia Rosmarini* (розмарин) 0,6 г; во флаконах по 100 мл (содержит 19 об.% спирта).

1 драже содержит порошок лекарственных растений *Herba Centaurii* (золототысячник) 18 мг, *Fructus Cynosbati sine Semine* (кожура плодов шиповника) 30 мг, *Radix Levistici* (любисток) 18 мг, *Folia Rosmarini* (розмарин) 18 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, противовоспалительное, спазмолитическое.

Показ.: Хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит), гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, нефроуролитиаз.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Возможно, но только при строгом соблюдении дозировок.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 драже или по 50 капель 3 раза в сутки; грудным детям - по 10 капель 3 раза в день; детям в возрасте от 1 года до 5 лет - по 15 капель 3 раза в день; детям школьного возраста - по 25 капель или 1 драже 3 раза в день.

Произв.: Bionorica (Германия)

Капли Береш Плюс (Beres Drops Plus®)

Сост. и ф.в.: 1 мл капель для приема внутрь содержит железа 2 мг, цинка 1,1 мг, натрия 0,64 мг, магния 0,40 мг, марганца 0,31 мг, калия 0,28 мг, меди 0,25 мг, молибдена 0,19 мг, ванадия 0,12 мг, никеля 0,11 мг, бора 0,10 мг, фтора 0,09 мг, хлора 0,03 мг, кобальта 0,025 мг, глицерина 6 мг, этилендиаминтетрауксусной кислоты 2,4 мг, глицина 2,3 мг, L(+) - виннокаменной кислоты 1,6 мг, янтарной кислоты 0,50 мг, L(+) - аскорбиновой кислоты 0,3 мг; во флаконах по 30 и 100 мл.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее, тонизирующее, восполнение относительного дефицита микро- и макроэлементов.

Показ.: Профилактика и лечение нарушений обмена минеральных веществ (микро- и макроэлементы) при неполноценном или несбалансированном питании (в том числе на фоне специальных диет, хронического алкоголизма, сахарного диабета, беременности, кормления грудью), значительных физических на-

грузках; повышенная утомляемость, общая слабость, вялость, бессонница, отсутствие аппетита, пониженная сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, боли при хронических дегенеративных заболеваниях костей и суставов, головные боли, климакс; пред- и послеоперационный периоды, период реконвалесценции; во время антибиотикотерапии, химиотерапии и лучевой терапии (в качестве вспомогательного средства для снижения побочных эффектов).

Противопоказ.: Заболевания, сопровождающиеся повышенным накоплением железа, болезнь Вильсона-Коновалова.

Бер. и корм. гр.: Возможно (одно из показаний).

Поб. действ.: Не выявлены (при рекомендованном режиме дозирования).

Взаим.: Совместим с любыми другими лекарственными препаратами (при 30 мин интервале между приемом).

Передоз.: Возможна лишь при приеме исключительно высоких доз (на несколько порядков превышающих рекомендованную).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 1 года - по 1 капле на 2 кг массы тела в день за 2 приема. При заболеваниях, указанных в показаниях, - по 1 капле на 1 кг массы тела за 3 приема. Препарат рекомендуется принимать во время еды с большим количеством жидкости и с 50-100 мг витамина С (каждый раз).

Предост.: Следует избегать сочетаний с другими препаратами, содержащими железо или микроэлементы.

Произв.: Béres Co. (Венгрия)

Капли Бронховерн (Tropfen Bronchowern®)

Амброксол*

Сост. и ф.в.: 1 мл (около 15 капель) содержит амброксола гидрохлорида 7,5 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, секретомоторное (повышение активности мерцательного эпителия), муколитическое.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью всасывается, обладает эффектом "первого прохождения через печень", поскольку 1/3 адсорбированного препарата метаболизируется. C_{max} - через 1-3 ч, выводится почками. Связь с белками плазмы - 80-90%; $T_{1/2}$ - 7-12 ч, полупериод существования в плазме суммы амброксола и его метаболитов - 22 ч. Выводится на 90% почками в виде мета-

болитов (дибромантраниловая кислота, глюкуроныды), и менее 10% - в неизменном виде. При тяжелых заболеваниях печени клиренс снижается на 20-40%, при тяжелых поражениях почек $T_{1/2}$ метаболитов увеличивается. Проникает через плаценту, переходит в материнское молоко и ликвор.

Фармакодин.: Увеличивает синтез и секрецию сурфактанта, повышает проницаемость сосудо-бронхиального барьера.

Клин. фарм.: Эффект проявляется через 30 мин после приема и сохраняется в течение 6-12 ч (в зависимости от дозы).

Показ.: Заболевания дыхательных путей с патологическими изменениями количества и вязкости мокроты (острый и хронический бронхит, астмоидный бронхит), бронхиальная астма (с нарушением элиминации мокроты), бронхоэктазия, воспаления ЛОР-органов (ларингит, синусит, сухой ринит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Используется только после тщательного взвешивания пользы и риска.

Поб. действ.: Тошнота, боли в животе, сухость во рту и носоглотке (при длительном применении), одышка, повышение температуры, озноб, слюнотечение, ринорея, запор, затрудненное мочеиспускание, аллергические реакции на коже и слизистых (покраснение, зуд, сыпь, отек); редко - анафилактический шок.

Взаим.: Усиливает проникновение амоксициллина, цефуроксима, эритромицина, доксициклина в бронхиальный секрет.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, капли, отмерив мензуркой, растворяют в жидкости (воде, чае, соке), для лучшего секретолитического действия рекомендуется обильное питье. Детям от 2 до 5 лет - по 1 мл 3 раза в день, от 6 до 12 лет - по 2 мл 2-3 раза в день, детям старше 12 лет и взрослым - по 4 мл 3 раза в день (в первые 2-3 дня), затем - по 4 мл 2 раза в день.

Предост.: С осторожностью применяют при нарушенной моторике бронхов и большом количестве секрета (злокачественный реснитчатый синдром), в сочетании с противокашлевыми средствами (может возникнуть застой мокроты), при почечной недостаточности и тяжелых заболеваниях печени (снижают дозу и увеличивают интервалы между приемом). У детей младше 2 лет препарат

можно применять только под контролем врача.

Произв.: Pharma Wernigerode (Германия)

Капозид (Capozid®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 25 мг и гидрохлортиазида 25 мг или каптоприла 50 мг и гидрохлортиазида 25 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное.

Клин. фарм.: Перед лечением необходимо скомпенсировать дефицит солей и/или жидкости (сократить или отменить прием диуретиков).

Показ.: Гипертоническая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к каптоприлу, мочегонным препаратам тиазидного типа, сульфонамидам, склонность к гидратации тканей (ангионевротический отек, в т.ч. в результате проводившегося ранее лечения ингибиторами АПФ), нарушения функции почек (креатинин сыворотки более 1,8 мг/100 мл или креатининовый клиренс менее 30 мл/мин), острые воспалительные процессы в почках, стеноз почечных артерий (двусторонний или односторонний в случае наличия одной почки), состояние после пересадки почки, стеноз аортального или митрального клапана, нарушения, влияющие на сердечный выброс (например, кардиомиопатия гипертрофического типа), тяжелые нарушения функции печени (предкоматозное состояние, печеночная кома), первичное повышение концентрации альдостерона в крови, гипокалиемия, гипонатриемия при гиповолемии, гиперкальциемия, подагра.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Гипотония, ортостатические явления (головокружение, ощущение слабости, нарушение зрения, обморок), сухость во рту, жажда, чувство усталости, подавленность, сонливость, слабость; нарушение функции почек, протенинурия, сухие хрипы, бронхит, синусит, ринит, бронхоспазм, ангионевротический отек (гортани, глотки, языка), тошнота, чувство дискомфорта в области желудка, рвота, понос, запоры, потеря аппетита, экзантема, крапивница, головные боли, депрессия, нарушение сна, импотенция, судороги, нарушение чувства равновесия, головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, изменение или исчезновение чувства вкуса, уменьшение концентрации гемоглобина, снижение гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов;

анемия, нейтропения, эозинофилия, агранулоцитоз, панцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. Начинают с 1/2 таблетки, увеличивая дозу до 1 таблетки 1 раз в день (поддерживающая доза).

Предост.: Лечение проводится под регулярным врачебным контролем. У больных с сердечной недостаточностью, тяжелой формой гипертензии, гипертензией почечного происхождения, ограниченной функцией почек может развиваться избыточное падение АД. Может влиять на реакционную способность участников уличного движения и пациентов, работающих на машинах и механизмах (особенно на ранних этапах лечения, при смене препаратов, взаимодействии с алкоголем).

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Капотен (Capoten®)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 12,5, 25 или 50 мг; в упаковке 28 или 56 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, кардио- и нефропротективное, блокада АПФ, подавление образования ангиотензина II.

Фармакодин.: Угнетение ренин-ангиотензин-альдостероновой системы приводит к снижению концентраций ангиотензина II и альдостерона в сыворотке крови.

Клин. фарм.: При легкой и умеренной гипертензии является препаратом первого ряда, при тяжелой - назначается при неэффективности или невозможности стандартного лечения. В терапии застойной сердечной недостаточности возможна комбинация с диуретиками и при необходимости - с сердечными гликозидами. После инфаркта миокарда показан для больных в стабильном состоянии при наличии нарушений деятельности левого желудочка для повышения эффективности лечения (выживаемость, задержка развития симптомов сердечной недостаточности, количество госпитализаций по поводу сердечной недостаточности, случаи повторного инфаркта миокарда, необходимость оперативной коронарной реваскуляризации). Предотвращает прогрессирование заболевания почек, снижает необходимость диализа или пересадки почки и уменьшает летальность при лечении диабетической нефропатии на фоне инсулин-зависимого диабета.

Показ.: Гипертензия, застойная сердечная недостаточность, постинфарктный

период, диабетическая нефропатия при инсулинзависимом диабете.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим ингибиторам АПФ), стеноз устья аорты.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тахикардия, гипотония, извращение вкуса, анемия, тромбоцитопения, панцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, кашель, почечная недостаточность, протеинурия, ангионевротический отек, макулезно-папулезные высыпания.

Примен. и доз.: Внутрь, при гипертензии - по 25 мг 2 раза в день; при тяжелой гипертензии - по 50 мг 3 раза в день. При застойной сердечной недостаточности и инфаркте миокарда - по 6,25-12,5 мг 3 раза в день, поддерживающая суточная доза - 25 мг 2-3 раза в день. Диабетическая нефропатия - по 25 мг 3-4 раза в день.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Капотен (Capoten®)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 25 или 50 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, блокада АПФ, подавление образования ангиотензина II.

Фармакокин.: Быстро всасывается. Максимальная концентрация в крови достигается через 1 ч. 25-30% связывается с белками плазмы, 75% выводится почками.

Показ.: Гипертензия, застойная сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, стеноз почечных артерий, состояние после трансплантации почки, выраженные нарушения функции почек, стеноз устья аорты, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Назначают по строгим показаниям.

Поб. действ.: В редких случаях возможны боли в эпигастрии, протеинурия, отеки, нейтропения, зуд, гиперемия.

Взаим.: Совместим с тиазидными диуретиками, замедляет выведение лития, эффект ослабляют нестероидные противовоспалительные препараты. При назначении калийсберегающих диуретиков повышается вероятность гиперкалиемии.

Передоз.: Проявляется выраженной гипотензивной реакцией. Для нормализации артериального давления в/в вводят физиологический раствор. Каптоприл удаляется с помощью гемодиализа.

Примен. и доз.: Дозы должны подбираться врачом. Внутрь, за час до еды по 25-50 мг 2-3 раза в сутки (но не более 450 мг в сутки), для детей начальная доза 0,15-0,3 мг/кг (но не более 6 мг/кг в сутки).

Предост.: У больных, ранее страдавших заболеванием почек или принимающих капотен в дозах, превышающих 150 мг в сутки, перед началом курса лечения и ежемесячно на протяжении первых девяти месяцев терапии следует проводить определение белка в моче. Все больные, принимающие капотен, должны быть предупреждены о необходимости сообщать о любых признаках инфекции (ангина, лихорадка). В случае инфекции немедленно следует произвести подсчет лейкоцитов. Если инфекция возникла в ходе первых трех месяцев лечения, прием капотена следует прекратить до получения результатов анализа крови. Поскольку капотен уменьшает выработку альдостерона, может наблюдаться повышение калия сыворотки (особенно у больных с почечной недостаточностью). У больных, страдающих сильной ренин-зависимой гипертонией, либо сильной сердечной недостаточностью и находящихся на активной терапии диуретиками, в пределах одного часа после приема первой дозы капотена наблюдается выраженная гипотензивная реакция. У больных, страдающих заболеваниями почек, после снижения АД за счет приема капотена в сочетании с диуретиками, может увеличиться содержание азота мочевины крови и креатинина сыворотки. В этом случае может потребоваться уменьшение дозы капотена, прекращение приема диуретиков или же и то и другое. Капотен должен применяться с исключительной осторожностью для лечения больных со стенозом аорты (уменьшение коронарной перфузии из-за снижения АД).

Произв.: Zorka (Югославия)

Капотен (Capoten)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 25 мг; в упаковке 28; 40 и 56 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, вазодилатирующее, понижение давления в легочных капиллярах, ингибирование АТФ.

Показ.: Артериальная гипертензия, стойкая сердечная недостаточность, постинфарктные состояния, диабетическая нефропатия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотония, недостаточность функции почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тахикардия, гипотония, сердцебиение, извращение вкуса, анемия, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, ангионевротический отек, кашель, бронхоспазм, нарушения функции печени и почек, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды; при гипертонии - 25 мг 2 раза в день или 50 мг однократно, при сердечной недостаточности начальная доза - 25 мг/сутки в 2-3 приема. Максимальная суточная доза - 150 мг.

Произв.: Акрихин (Россия)

Капсикам® (Capsicam®)

Сост. и ф.в.: 1 туба с 50 г мази содержит бензилникотината 1 г, ванилилноамида 0,1 г, камфоры рацемической 1,5 г и скипидара живичного 1,5 г, а также бромнопол (0,05 г), димексид (2,5 г), твин-80 (1 г), эмульгатор N 1 (8,5 г) и воду очищенную (до 50 г).

Фарм. действ.: Раздражающее, отвлекающее, противовоспалительное.

Показ.: Радикулит, остеохондроз, артриты, невралгия, миозиты, разогревающий массаж у спортсменов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Накожно, втирают в кожу 1-3 г мази 2-3 раза в день, расход мази на курс - 50 - 100 г.

Произв.: Таллинский фармацевтический завод (Эстония)

Каптопрес (Captopres)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 0,05 г и гидрохлоротиазида 0,025 г; в упаковке 30 и 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное.

Показ.: Все формы артериальной гипертензии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения функции почек, гломерулонефрит, двусторонний стеноз почечных артерий, состояния после трансплантации почек, системные заболевания соединительной ткани, тяжелые нарушения функции печени (прекома, кома), гипокалиемия, гипонатриемия, гиповолемия, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Кожные высыпания, зуд, фотосенсибилизация, сухость во рту, тошнота, сухой кашель, нарушения

функции печени с вторичным холеста-
зом и панкреатитом, нарушения со сто-
роны ЦНС, протеинурия (у больных,
имеющих в анамнезе заболевания
почек).

Примен. и доз.: Внутрь. Начальная доза
составляет 0,025 г 1 раз в сутки. При
недостаточном гипотензивном эффекте
дозу увеличивают до 0,050 г. Курс лече-
ния 20-30 дней.

Произв.: Дарница (Украина)

Карбактин (Carbactinum)

Активированный уголь

Сост. и ф.в.: Порошок угля активиро-
ванного; в бутылках по 100 или 200 г и
в пакетах по 5 или 10 г.

Фарм. действ.: Адсорбирующее.

Показ.: Острые отравления, заболева-
ния с токсическим синдромом: пищевые
токсикоинфекции, дизентерия, сальмо-
неллез, ожоговая болезнь в стадии ток-
семии и септикотоксемии, хроническая
почечная недостаточность, хронический
гепатит, вирусный гепатит, цирроз пече-
ни, атопический дерматит, бронхиаль-
ная астма.

Противопоказ.: Гиперчувствитель-
ность.

Поб. действ.: Диспепсия, запор.

Взаим.: Снижает всасывание других ле-
карственных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1-2 ч до или
после еды и приема других лекарств.
Разовая доза для взрослых - 5-8 г, для
детей - 1-4 г из расчета 0,1-0,2 г/кг
массы тела больного 3 раза в день. Курс
- 5-14 дней. Отмеренную дозу перед
приемом размешивают в 1/4 - 3/4 ста-
кана воды.

Произв.: Медисорб (Россия)

Карбамазепин-Акри® (Carbamazepin-Akri)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кар-
бамазепина 0,2 г; в упаковке 20, 50 и 100
шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное,
противоэпилептическое, антидепресс-
сивное.

Показ.: Эпилепсия (большие и малые
припадки). Эссенциальная невралгия
тройничного нерва.

Противопоказ.: Гиперчувствительность
(в т.ч. к трициклическим антидепрессан-
там), заболевания костного мозга, пред-
сердно-желудочковая блокада, тяжелые
нарушения функции печени, почек,
сердца, гематологические заболевания.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным
показаниям.

Поб. действ.: Потеря аппетита, тошно-
та, рвота, головная боль, сонливость,
атаксия, нарушение аккомодации. Воз-
можны лейкопения, тромбоцитопения,
агранулоцитоз, гепатит, аллергические
реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами
МАО.

Передоз.: Помутнение сознания, атак-
сия, гиперкинезы, угнетение дыхания,
кома.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при
эпилепсии лечение начинают с дозы 0,2
г 1-2 раза в сутки, затем дозу увеличи-
вают до 0,8-1,2 г в сутки; при невралгии
тройничного нерва - по 0,2-0,4 г в сутки
в 2-3 приема, через 2-3 дня дозу увели-
чивают на 0,1-0,2 г в сутки. Детям от 4
до 12 мес - в дозе 0,1-0,2 г в сутки, 2-3
лет - 0,2-0,3 г; 4-7 лет - 0,3-0,5 г; 8-14
лет - 0,5-1 г; 15-18 лет - 0,8-1,2 г. Ука-
занные дозы делят на 2 приема.

Предост.: Особой осторожности требует
назначение препарата водителям транс-
портных средств и лицам, работающим
с механизмами.

Произв.: Акрихин (Россия)

Карбапин (Carbapin)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кар-
бамазепина 200 мг; в упаковке 50 мг.

Фарм. действ.: Противосудорожное,
анальгезирующее.

Показ.: Эпилепсия (большие и малые
припадки, смешанные формы, фокаль-
ная), эссенциальная невралгия тройнич-
ного нерва при рассеянном склерозе,
эссенциальная глоссофарингеальная не-
вралгия; синдром абстиненции, несахар-
ный диабет, диабетическая нейропатия,
сопровождающаяся болями.

Противопоказ.: Гиперчувствитель-
ность, заболевания костного мозга, пред-
сердно-желудочковая блокада, гемато-
логические заболевания; тяжелые нару-
шения функции печени, почек, сердеч-
ной деятельности; нарушение обмена на-
трия; глаукома; простатит.

Поб. действ.: Потеря аппетита, тошно-
та, рвота, головная боль, сонливость,
атаксия, нарушение аккомодации, лей-
копения, тромбоцитопения, агранулоци-
тоз, гепатит, отеки, лимфаденопатия,
интерстициальный нефрит, галакторея,
гипо- или гипертония, гинекомастия, ал-
лергические реакции (кожная сыпь, дер-
матит).

Примен. и доз.: Дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от клинической картины заболевания. Взрослым при эпилепсии - начальная доза 200 мг (для пожилых доза составляет 100 мг) 1-2 раза в сутки. Затем дозу постепенно увеличивают до оптимальной суточной дозы - 800-1200 мг. При невралгии тройничного нерва начальная суточная доза - 200-400 мг, которую делят на 2-3 приема, через 2-3 дня дозу увеличивают на 100-200 мг в сутки, применяют в течение 7-10 дней, затем после улучшения состояния дозу постепенно снижают до поддерживающей, которую применяют длительно. Детям в возрасте 4-12 мес назначают по 100-200 мг в сутки, 2-3 лет - 200-300 мг в сутки, 4-7 лет - 300-500 мг, 8-14 лет - 500-1000 мг, 15-18 лет - 800-1200 мг в сутки. Суточные дозы делят на 2 приема.

Предост.: Не следует комбинировать с ингибиторами МАО, фуразолидоном. С осторожностью назначают при беременности и лактации.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Карбасан (Carbasan)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит карбамазепина 200 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, анальгезирующее.

Показ.: Эпилепсия (большие припадки, смешанные формы эпилепсии, фокальная эпилепсия, малые припадки), эссенциальная невралгия тройничного нерва, невралгия тройничного нерва при рассеянном склерозе, эссенциальная глоссофарингеальная невралгия, несахарный диабет, абстинентный синдром при алкоголизме.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, предсердно-желудочковая блокада, нарушение функции печени, почек, сердца, обмена натрия, гематологические заболевания, глаукома, простатит.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Потеря аппетита, тошнота, головная боль, сонливость, атаксия, нарушение аккомодации, гепатит, интерстициальный нефрит, гипо- или гипертония, галакторея, гинекомастия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, дерматит, отеки, лимфаденопатия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, фуразолидоном.

Примен. и доз.: Внутрь, по 200 мг 1-2 раза в сутки. Оптимальная доза - 800-1200 мг в сутки. Детям 4-12 мес - по

100-200 мг/сутки, 2-3 лет - по 200-300 мг/сутки, 4-7 лет - по 300-500 мг/сутки, 8-14 лет - по 500-1000 мг/сутки, 15-18 лет - по 800-1200 мг/сутки.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Карбасан ретард (Carbasan retard)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит карбамазепина 400 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, анальгезирующее.

Показ.: Эпилепсия (большие припадки, смешанные формы эпилепсии, фокальная эпилепсия, малые припадки), эссенциальная невралгия тройничного нерва, невралгия тройничного нерва при рассеянном склерозе, эссенциальная глоссофарингеальная невралгия, несахарный диабет, абстинентный синдром при алкоголизме.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, предсердно-желудочковая блокада, нарушения сердечной деятельности, функции печени, почек, обмена натрия, гематологические заболевания, глаукома, простатит.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Потеря аппетита, тошнота, головная боль, сонливость, атаксия, гепатит, интерстициальный нефрит, гипо- или гипертония, гинекомастия, галакторея, нарушение аккомодации, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, дерматит, отеки, лимфаденопатия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, фуразолидоном.

Примен. и доз.: Внутрь, по 200 мг 1-2 раза в сутки. Оптимальная доза - 800-1200 мг в сутки. Детям 4-12 мес препарат назначают по 100-200 мг/сутки, 2-3 лет - по 200-300 мг/сутки, 4-7 лет - по 300-500 мг/сутки, 8-14 лет - по 500-1000 мг/сутки, 15-18 лет - по 800-1200 мг/сутки.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Карбоплатин-Эбеве (Carboplatin-Ebewe)

Карбоплатин*

Сост. и ф.в.: 1 мл концентрата для приготовления инфузий содержит карбоплатина 10 мг, во флаконах по 5, 15 или 45 мл; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Рак яичника, шейки матки, мочевого пузыря, легкого (мелкоклеточный и немелкоклеточный); метастатическая карцинома молочной железы; злокачественные опухоли головы и шеи, яичка (моно- и комбинированная терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим препаратам, содержащим платину), тяжелая миелосупрессия, выраженная почечная недостаточность, кровотечения, опухоли, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тромбоцитопения, лейкопения, анемия; тошнота, рвота, диарея, изменение вкуса; повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови, уменьшение концентрации магния, калия, кальция; понижение остроты слуха; нарушение функции печени; периферические нейропатии; аллергические реакции (кожная сыпь, зуд); гипертермия, озноб; алопеция.

Примен. и доз.: Только в/в инфузионно (концентрат разводят в 5% растворе глюкозы или 0,9% растворе натрия хлорида до конечной концентрации 0,5 мг/мл), обычно по 400 мг/кв.м поверхности тела в течение 15-60 мин однократно; следующую дозу вводят не ранее, чем через 4 нед. При опухолях яичка и раке молочной железы - по 1200-2100 мг/кв.м в течение 1-24 ч. В случае предшествующего лечения препаратами с миелосупрессивным действием или лучевой терапии и у больных с тяжелым общим состоянием рекомендуют начальную дозу - 300-320 мг/кв.м. Дозу следует корректировать у больных старше 65 лет и с нарушением функции почек.

Предост.: Необходимо регулярно контролировать функцию почек, определять содержание форменных элементов крови, осуществлять неврологическое обследование. Не рекомендуется комбинировать с миелосупрессивными, нефро- и нейротоксичными препаратами.

Пронзв.: Ebewe (Австрия)

Карбоцистеин (Karbocistein)

Карбоцистеин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит карбоцистеина 375 мг; в упаковке 32 шт.

5 мл сиропа - 125 или 250 мг; во флаконах по 200 мл.

Фарм. действ.: Муколитическое, отхаркивающее.

Фармакодин.: Изменяет биохимические и физические свойства слизи, увеличивая синтез сиаломуцинов, снижает сли-

зеообразование. Сиаломуцины легко связываются с водой, уменьшая вязкость слизи и облегчая отхаркивание мокроты. Регулирует состояние слизи во всех структурах, содержащих мукопротеины (дыхательный, ЖКТ, мочеполовой тракт, внутреннее ухо).

Показ.: Заболевания органов дыхания, сопровождающиеся выделением большого количества вязкой мокроты (острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония); воспалительные заболевания среднего уха и синусов; подготовка пациента к бронхоскопии и/или бронхографии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, активная пептическая язва, острый гломерулонефрит, острый цистит.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, желудочно-кишечные кровотечения, головная боль, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - 2 капсулы (по 375 мг) или 3 чайных ложки сиропа (250 мг/5 мл) 3 раза в день. Детям - до 5 лет по 1/2 чайной ложки сиропа (125 мг/5 мл) 4 раза в день, от 5 до 12 лет: 1 чайную ложку (сироп 250 мг/5 мл), 2 чайные ложки (сироп 125 мг/5 мл) 3 раза в день. После получения ожидаемого терапевтического эффекта дозу можно снизить вдвое.

Предост.: С осторожностью назначают в период беременности, при пептической язве в анамнезе. Лактирующие женщины на время лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Пронзв.: ICN Galenika (Югославия)

Кардикет (Cardiket®)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит изосорбида динитрата 20, 40, 60 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

1 капсула ретард - 120 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное.

Фармакодин.: Антиангинальный эффект обусловлен снижением потребности миокарда в кислороде за счет уменьшения преднагрузки (расширение периферических вен и уменьшение притока крови к правому предсердию) и постнагрузки (уменьшение периферического сосудистого сопротивления), а также прямым коронаролитическим действием; снижает давление в малом круге кровообращения.

Показ.: Нестабильная и вазоспастическая стенокардия, острый инфаркт мио-

карда, острая левожелудочковая недостаточность.

Противопоказ.: Острая циркуляторная недостаточность (шок, сосудистый коллапс), выраженная гипотензия (систолическое АД ниже 95 мм рт.ст.), кардиогенный шок (при одновременном использовании препаратов с положительным инотропным действием и внутриаортальной баллонной контрпульсацией).

Поб. действ.: Головная боль, сонливость, гиперемия, ортостатическая гипотензия, тахикардия, коллапс на фоне брадикардии (в единичных случаях).

Взаим.: Эффект усиливается при сочетании с другими вазодилататорами (антагонисты кальция, дигидроэрготамин), циклическими антидепрессантами, алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости. Дозы подбираются индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. Рекомендуемая схема - таблетки: кардикет-ретард 20 мг - по 1 таблетке 2-3 раза в день, кардикет-ретард 40 мг - по 1 таблетке 2 раза в день, кардикет-ретард 60 мг - по 1 таблетке 1-2 раза в день; капсулы ретард 120 мг - по 1 капсуле 1 раз в день.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Кардикс® (Cardix®)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула ретард содержит изосорбида динитрата 20 или 40 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, вазодилатирующее.

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется при приеме внутрь, после всасывания из ЖКТ подвергается интенсивному метаболизму вследствие эффекта "первого прохождения". Активный метаболит изосорбида динитрата - изосорбид-5-мононитрат. Микрогранулы обеспечивают пролонгированное высвобождение активного вещества, в результате чего достигается равномерная концентрация препарата в плазме.

Фармакодин.: Уменьшает конечно-диастолический объем левого желудочка и снижает систолическое напряжение его стенок, регулирует пред- и постнагрузку на сердце, периферическое сосудистое сопротивление, потребность миокарда в кислороде. Вызывает коронародилатацию, уменьшает давление в малом круге кровообращения, повышает толерантность к физическим нагрузкам.

Показ.: Профилактика приступов стенокардии; постинфарктный период, хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии); легочная гипертензия (некоторые формы).

Противопоказ.: Острый инфаркт миокарда (со снижением систолического АД), кардиогенный шок, выраженная артериальная гипотония.

Бер. и корм. гр.: Возможно только по абсолютным показаниям.

Поб. действ.: Редко - тошнота, рвота, головная боль, головокружение, гиперемия (лицо), гипотония, пароксизмальная тахикардия; иногда - усиление приступов стенокардии (парадоксальная реакция).

Взаим.: Гипотензию усиливают антагонисты кальция, трициклические антидепрессанты, этанолсодержащие препараты, гипотензивные средства.

Примен. и доз.: Внутрь, для профилактики приступов стенокардии, капсулы Кардикс - по 20 мг 2 раза в сутки (максимально - до 80-120 мг в сутки); при хронической сердечной недостаточности - капсулы Кардикс - по 20 мг 3-4 раза в сутки. Обычно вторая доза принимается не позднее, чем через 6 ч после первой.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, склонным к развитию ортостатической гипотонии. Для предотвращения развития толерантности рекомендуется принимать через неравномерные промежутки времени. Во время лечения следует избегать употребления алкоголя. Необходимо иметь в виду возможное снижение психических и двигательных реакций.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Кардикс® Моно (Cardix® Mono)

Изосорбида мононитрат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула ретард содержит изосорбида мононитрата 20, 40 или 60 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, вазодилатирующее.

Фармакокин.: Изосорбид-5-мононитрат представляет собой основной активный метаболит изосорбида динитрата. Хорошо абсорбируется при приеме внутрь, после всасывания из ЖКТ не подвергается интенсивному метаболизму вследствие эффекта "первого прохождения" (в отличие от изосорбида динитрата). Микрогранулы обеспечивают пролонгированное высвобождение активного веще-

ства, что способствует поддержанию терапевтических концентраций в плазме крови в течение 12 ч при приеме капсул по 20 мг, в течение 16 ч - при приеме капсул по 40 мг и в течение 20 ч - при приеме капсул по 60 мг.

Фармакодин.: Уменьшает конечно-диастолический объем левого желудочка и снижает систолическое напряжение его стенок, регулирует пред- и постнагрузку на сердце, периферическое сосудистое сопротивление, потребность миокарда в кислороде. Вызывает коронародилатацию, уменьшает давление в малом круге кровообращения, повышает толерантность к физическим нагрузкам.

Показ.: Профилактика приступов стенокардии; постинфарктный период, хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Острый инфаркт миокарда (со снижением систолического АД), кардиогенный шок, выраженная артериальная гипотония.

Бер. и корм. гр.: Возможно только по абсолютным показаниям.

Поб. действ.: Редко - тошнота, рвота, головная боль, головокружение, гиперемия (лицо), гипотония, пароксизмальная тахикардия.

Взаим.: Гипотензию усиливают антагонисты кальция, трициклические антидепрессанты, этанолсодержащие препараты, гипотензивные средства.

Примен. и доз.: Внутрь, в начальной дозе - 20 мг 2 раза в сутки, поддерживающая доза - 40-120 мг 1 раз в сутки. Обычно вторая доза принимается не позднее чем через 6 ч после первой.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, склонным к развитию ортостатической гипотонии. Для предотвращения развития толерантности рекомендуется принимать через неравномерные промежутки времени. Во время лечения следует избегать употребления алкоголя. Необходимо иметь в виду возможное снижение психических и двигательных реакций.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Кардил (Cardil)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дилтиазема гидрохлорида 60 или 120 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, гипотензивное, антиаритмическое, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Стенокардия, гипертоническая болезнь, суправентрикулярные аритмии.

Противопоказ.: Синдром слабости синусового узла, АВ-блокада II-III степени, гипотония, брадикардия, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, беременность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, слабость, АВ-блокада, отеки лодыжек.

Взаим.: Несовместим с бета-адреноблокаторами, усиливает эффект гипотензивных препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,5-2 таблетки 3 раза в день (табл. 60 мг) или 1-2 раза в день (табл. 120 мг). При суправентрикулярных аритмиях - 240-360 мг/сутки в 2 приема.

Произв.: Orion (Финляндия)

Кардиоксан (Cardioxan)

Декстразоксан*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит дексразоксана 500 мг (в форме гидрохлорида).

Фарм. действ.: Кардиопротекторное, образование хелатных соединений с железом и медью, снижение образования комплекса доксорубицин - железо и свободных радикалов кислорода.

Показ.: Профилактика кардиотоксичности антрациклинов.

Противопоказ.: Беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Примен. и доз.: Лечение начинают одновременно с введением первой дозы антрациклина. В/в. Взрослым: 20 мг кардиоксана на 1 мг/кв.м используемого антрациклина; суммарная доза кардиоксана не должна превышать 1000 мг/кв.м и рекомендуется для обычной схемы терапии доксорубицином по 50 мг/кв.м с интервалом в 21 день. Приготовленный раствор использовать не позднее, чем через 6 ч после приготовления. Педиатрия: 10-15 мг кардиоксана на 1 мг/кв.м.

Предост.: Нельзя вводить без предварительного разведения. Необходимо постоянно контролировать гематологические показатели, функции печени.

Произв.: CSC (Италия)

Кардиплант (Cardiplant®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула форте содержит 80 мг сухого экстракта из листьев и цветков боярышника, соответственно 15 мг олигомера процианидина; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Кардиотоническое.

Фармакодин.: Усиливает сокращения сердечной мышцы, снижает нагрузку на сердце, увеличивает коронарное кровоснабжение и улучшает снабжение сердца кислородом. Повышает работоспособность сердца и сопротивляемость организма.

Показ.: Сердечная недостаточность, умеренно выраженные нарушения работы сердца (быстрая утомляемость, одышка, сердцебиение) при нормальных и средних нагрузках на организм.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 капсулы (не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости) 3 раза в день (утром, днем и вечером) независимо от приема пищи. Минимальная длительность лечения - 6 нед.

Предост.: При отсутствии эффекта через 6 нед, появлении отеков ног, болей в области сердца, распространяющихся на руки, область шеи, желудка или при затруднении дыхания, необходима срочная консультация врача.

Произв.: Dr. Willmar Schwabe (Германия)

Кардура (Cardura®)

Доксазозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 1, 2, 4 и 8 мг доксазозина; в упаковке 28 и 30 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, нормализация кровотока в предстательной железе.

Показ.: Обструкция мочевыводящих путей и симптомы, обусловленные доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. и к другим хиназолинам), детский возраст.

Поб. действ.: Ортостатические реакции, обморок, головокружение, головная боль, недомогание, слабость, сонливость, тошнота, отеки, астения, ринит, недержание мочи.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 1 мг в сутки; доза может быть постепенно увеличена до 2-4 мг в сутки. Максимальная доза - 8 мг. Дозу повышают с интервалом в 1-2 нед.

Предост.: Может ослаблять концентрацию внимания (нарушать способность управлять автомобилем и механизмами).

Произв.: Pfizer (США)

Каталин® (Catalin)

Пиреноксин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления глазных капель содержит пиреноксина (натрия) 0,75 мкг в комплекте с 15 мл растворителя (изотонический буферный раствор); во флаконе-капельнице.

Фарм. действ.: Антикатарактное, мембраностабилизирующее.

Клин. фарм.: Конкурентно ингибирует действие хиноновых веществ (образующихся в результате нарушения метаболизма аминокислот) и предотвращает коагуляцию (денатурацию) белка хрусталика; кроме того, блокируя альдоредуктазу, нормализует обмен глюкозы в хрусталике и препятствует отложению сорбита.

Показ.: Старческая и диабетическая катаракта (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Редко - кератит (поверхностный), блефарит, зуд, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Конъюнктивально (предварительно 1 таблетку растворяют в 15 мл растворителя) - по 1-2 капли 5 раз в сутки.

Предост.: Флакон с приготовленным раствором (после растворения таблетки) следует хранить не более месяца в прохладном, защищенном от света месте.

Произв.: Iskra (Япония)

Катопил (Katopil)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 25 или 50 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибирование АПФ.

Клин. фарм.: Быстро всасывается из ЖКТ (около 75%), пик концентрации в крови - через 0,5-1 ч после приема. Прием пищи на 30-40% снижает абсорбцию препарата. Около 30% циркулирующего препарата связывается с протеинами плазмы. Быстро метаболизируется, выводится почками и с калом.

Показ.: Артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная), хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Протеинурия, нейтропения, агранулоцитоз, желудочно-кишечные расстройства, кожные высыпания, бронхоспазм; гиперкалиемия.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - суточная доза 15-25 мг 2-3 раза в день; начальная доза - 75 мг, при отсутствии эффекта через 2 нед дозу увеличивают на 50 мг и пересматривают ее каждые 2 нед. Максимальная суточная доза - 450 мг. Детям - начальная суточная доза 0,3 мг/кг в 3 приема, при необходимости дозу увеличивают каждые 7 дней до 0,6; 1,2 или 2 мг/кг (не более 6 мг/кг/сутки). При злокачественной гипертензии дозу можно увеличивать каждые 24 ч, не превышая максимальную суточную дозу.

Предост.: Назначается с осторожностью пациентам во время операции и общей анестезии, при острых инфекциях, иммуносупрессии, нарушении функции почек. Не рекомендуется комбинировать с индометацином и др. ингибиторами простагландинов. При беременности применяют только при особой необходимости. Следует регулярно делать анализы крови и мочи.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Каффетин (Caffetin®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пропифеназона 210 мг, парацетамола 250 мг, кофеина 50 мг и кодеина фосфата 10 мг; в упаковке 10 и 500 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное.

Фармакокин.: Парацетамол всасывается быстро, $C_{\max}$ достигается через 30-60 мин после приема; метаболизируется в печени; выделяется с мочой в виде сульфатов и глюкуронидов, $T_{1/2}$ составляет 2 ч. Пропифеназон имеет идентичную фармакокинетику ($C_{\max}$ в плазме достигается через 30 мин, $T_{1/2}$ составляет 1-1,5 ч); в сочетании с парацетамолом увеличивает время его выведения на 40%, что позволяет уменьшить кратность приемов препарата в течение суток. Для кодеина $C_{\max}$ достигается за 1-2 ч, обезболивающий эффект наблюдается через 30-60 мин; метаболизируется в печени, $T_{1/2}$ - 3 ч. Кофеин всасывается быстро и на 100%, легко проникает во все ткани и мозг ($C_{\max}$ достигается через 15-45 мин), метаболизируется в печени, $T_{1/2}$ - около 3 ч; доказано, что кофеин улучшает абсорбцию остальных компонентов препарата.

Показ.: Головная, зубная боль, мигрень, невралгия, ишиалгия, миалгия, дисменорея, простуда, грипп, послеоперационные и посттравматические состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и/или почек, нарушения кроветворения, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, повышенная возбудимость, нарушения сна, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Поб. действ.: Со стороны системы кроветворения: лейкопения, у предрасположенных пациентов - агранулоцитоз. Со стороны ЖКТ и печени: тошнота, боли в эпигастрии; при длительном применении в высоких дозах - нарушения функции печени. Со стороны ЦНС: повышенная возбудимость (особенно у детей). Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке.

Взаим.: Не рекомендуется одновременный прием с алкоголем, гипнотическими и анксиолитическими средствами в виду усиления депрессивного действия кодеина на ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 таблетке 3-4 раза в день после еды; при сильных болях - по 2 таблетки 3-4 раза в день. Детям от 2 до 5 лет - по 1/3 таблетки, от 5 до 10 лет - по 1/2 таблетки, старше 10 лет - по 1 таблетке 3 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают препарат в периоды беременности, лактации; пациентам пожилого возраста, больным с глаукомой.

Произв.: Alkaloid (Македония); ICN Лексредства (Россия)

Квадевит (Quadevitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола ацетата 0,00086 г (2500 МЕ), тиамина бромид 0,0032 г, рибофлавина 0,0025 г, пиридоксина гидрохлорида 0,002 г, цианокобаламина 0,00001 г, аскорбиновой кислоты 0,075 г, альфа-токоферола ацетата 0,003 г, никотинамида 0,02 г, рутина 0,01 г, фолиевой кислоты 0,0001 г, кальция пантотената 0,005 г, глютаминовой кислоты 0,05 г, метионина 0,05 г, фитина 0,03 г, калия хлорида 0,02 г и меди сульфата 0,00156 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ликвидация абсолютного или относительного дефицита витаминов и меди.

Показ.: Поливитаминная недостаточность, атеросклероз, сердечно-сосудистая недостаточность, нарушения функции печени.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1 таблетке 3 раза в день; курс - 3 нед. Повторные курсы - через 3 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Квамател (Quamatel)

Фамотидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фамотидина 20 или 40 мг; в упаковке 28 и 14 шт. соответственно.

1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора - 20 мг, в комплекте с растворителем; в ампулах по 5 мл, в упаковке 5 комплектов.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение продукции соляной кислоты и пепсина, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, другие заболевания, характеризующиеся гиперсекрецией желудочного сока, профилактика аспирации желудочного содержимого при проведении общей анестезии, кровотечения из верхних отделов ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Лихорадка, головная боль, слабость, утомляемость, преходящие психические расстройства, миалгия, артралгия, бронхоспазм, аритмия, алоpecia, сухость кожи, шум в ушах, сухость во рту, нарушения вкуса, анорексия, тошнота, диарея, запоры, метеоризм. Болезненность и раздражение в месте введения, аллергические реакции. Очень редко: холестатическая желтуха, повышение уровня печеночных трансаминаз, агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения.

Взаим.: Уменьшает всасывание кетоконазола.

Примен. и доз.: Внутрь, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 40 мг перед сном или по 20 мг 2 раза в день (утром и вечером) в течение 4-8 нед; поддерживающая доза - 20 мг на ночь. При рефлюкс-эзофагите и синдроме Золлингера-Эллисона начальная доза - по 20 мг каждые 6 ч. При желудочном кровотечении или невозможности приема внутрь - в/в струйно, медленно (порошок для инъекций разводят в 5-10 мл 0,9% натрия хлорида) или капельно (порошок для инъекций разводят в 100 мл раствора глюкозы для инфузий), по 20 мг каждые 12 ч. Для

предупреждения аспирации желудочного содержимого перед проведением общей анестезии - 20 мг в/в струйно, не менее, чем за 2 ч перед операцией.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Квестран (Questran®)

Колестирамин*

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с порошком для приема внутрь содержит холестирамина 4 г.

Фарм. действ.: Гипохолестеринемическое.

Фармакодин.: Холестирамин адсорбирует желчные кислоты, образуя нерастворимые комплексы, выделяющиеся из организма с фекалиями.

Клин. фарм.: У больных с частичной обструкцией желчевыводящих путей снижение содержания желчных кислот в сыворотке уменьшает их отложение в дермальной ткани и снижает зуд. Терапевтический эффект проявляется в течение первого месяца. Для поддержания полученных результатов необходимо продолжение лечения. Длительное применение может нарушать пищеварение (всасывание жиров, витаминов А, D, К, К₁), провоцировать кровоточивость (гипопротромбинемия) и снижать содержание фолиевой кислоты в сыворотке и эритроцитах.

Показ.: Первичная гиперхолестеринемия (повышение значения ЛПНП), профилактика атеросклероза и его осложнений (в т.ч. при коронарной болезни сердца, инфаркте миокарда), зуд при частичной непроходимости желчных путей; в качестве дополнительной меры у больных, находящихся на специальной диете, предназначенной для снижения повышенных концентраций холестерина в сыворотке.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, полная обструкция желчных путей, фенилкетонурия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано во время беременности и при подозрении на беременность. С осторожностью во время лактации.

Поб. действ.: Запор, боли и дискомфорт в области живота, повышенное газообразование в кишечнике, тошнота, рвота, понос, изжога, анорексия, диспепсия, панкреатит, стеаторея, раздражение кожи, кожные высыпания, повышение либидо. При продолжительном лечении: гиперхлоремический ацидоз, эхимоз, геморроидальные кровотечения, кровотечения из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

надцатиперстной кишки, снижение протромбинового времени.

Взаим.: Снижает всасывание фенилбутазона, варфарина, хлортиазида, тетрациклина, пенициллина G, фенобарбитала, препаратов, влияющих на щитовидную железу (тироксина), дигиталиса. Рекомендуются применять эти препараты за 1 ч до или через 4-6 ч после приема квестрана.

Передоз.: Основная вероятная опасность - непроходимость ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой. Содержимое 1 пакета высыпают в стакан, добавляют воду, сливки или фруктовый сок в количестве 60-80 мл, перемешивают ложечкой, выжидают 10 мин, чтобы порошок адсорбировал достаточное количество жидкости и суспензия была однородная. Взрослым - от 1 до 6 пакетов в день; детям дозировку подбирают индивидуально.

Предост.: Необходим периодический контроль уровня триглицеридов и холестерина. Во время лечения следует употреблять повышенное количество жидкости.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Квинакс (Quinax®)

Сост. и ф.в.: 1 мл стерильного офтальмологического раствора содержит дигидроазапентацена полисульфоната натрия 1,5 мг; во флаконах по 15 мл с дозатором Дроп-Тейнер.

Фарм. действ.: Предотвращение окисления сульфгидрильных групп хрусталика.

Показ.: Катаракта (старческая, травматическая, врожденная, вторичная).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: По 2 капли 3-5 раз в сутки.

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Кейтен (Keiten®)

Цефпиром*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефпирома 0,25, 0,5, 1 или 2 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции верхних и нижних отделов мочевыделительной системы, кожи и мягких тканей, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры, септицемия, бактериемия, инфекции у больных

с нейтропенией и ослабленным иммунитетом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, лейкопения, нейтропения, преходящее увеличение концентрации мочевины и креатинина в плазме крови, болезненность и флебит в месте введения, кожная сыпь, зуд, лекарственная лихорадка и другие аллергические реакции.

Взаим.: Совместим с физиологическим раствором, раствором Рингера, 5 и 10% раствором глюкозы, 5% раствором фруктозы, с 6% раствором глюкозы, смешанным с 0,9% раствором натрия хлорида.

Примен. и доз.: Дозировки и способ введения подбирают индивидуально в зависимости от тяжести инфекции, ее локализации и от состояния функций почек. Взрослым при инфекции мочевыделительной системы, кожи или мягких тканей через каждые 12 ч - по 1 г, при инфекциях органов дыхания - 1-2 г, при септицемии, бактериемии и в случае инфекций у пациентов с нейтропенией - 2 г. Пациентам с нарушением функции почек дозировку подбирают в зависимости от значения клиренса креатинина; первоначальная дозировка - 1-2 г, затем при клиренсе креатинина от 5 до 20 мл/мин назначают по 0,5-1 г/сут однократно, при клиренсе креатинина от 20 до 50 мл/мин - по 0,5-1 г 2 раза в сутки. Пациентам, находящимся на гемодиализе, препарат назначают в суточной дозе 0,5 г, кроме того после каждой процедуры вводят дополнительно 0,25 г.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Кенакорт (Kenacort)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триамцинолона 4 мг.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Ревматоидный артрит, ревматизм (острая форма), аллергические нарушения, бронхиальная астма, ангионевротический отек, нефротический синдром, эмфизема и фиброз легких (при одновременной антибиотикотерапии); хронический лейкоз, острый лимфолейкоз, коллагенозы (системная красная волчанка и др.), острый бурсит, миозит, фиброзит и другие острые заболевания соединительной ткани, увеит, синдром мальабсорбции, дерматозы, псориаз (острые проявления), крапивница.

Противопоказ.: Тромбофлебит, склонность к психозам, острый психоз, острый гломерулонефрит, хронический нефрит, метастазирующая карцинома, остеопороз, дивертикулиты, недавно выполненные анастомозы кишечника, язва желудка в анамнезе и в активной форме, туберкулез (латентные формы или перенесенный ранее), местная или системная вирусные инфекции, системные грибковые заболевания, активные инфекции, не поддающиеся антибиотикотерапии.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (особенно в первом триместре), кроме случаев, оправданных тяжестью заболевания. У новорожденных, родившихся от матерей, получавших лечение кортикостероидами, может развиваться гипoadrenaлизм.

Поб. действ.: Кушингоидный синдром (лунообразное лицо, бычий горб и др.), мышечная слабость, кровоподтеки, пурпура, исчерченность кожи, остеопороз, спонтанные переломы костей, повышенное потоотделение, приливы к лицу, тромбоэмболия, некротизирующие ангииты, острый панкреатит, эзофагит, активация или обострение язвы желудка, гирсутизм, угри, головокружение, головные боли, повышение внутриглазного давления, тяжелые психические нарушения, повышение внутричерепного давления, отек соска зрительного нерва, задние субкапсулярные катаракты.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым суточная доза - 4-24 мг в несколько приемов. После достижения удовлетворительного эффекта дозу снижают постепенно на 2-4 мг каждые 2-3 дня до достижения оптимальной поддерживающей дозы, назначаемой 1 раз в день или через день.

Предост.: С осторожностью назначают больным диабетом (повышается потребность в инсулине), с гипотиреозом или циррозом печени (возможно усиление действия), детям (контроль роста и развития) и женщинам (возможны нарушения менструального цикла). При продолжительном лечении необходимо обеспечить достаточное поступление белка в организм. Следует контролировать баланс электролитов в сыворотке. Высокие дозы рекомендуются снижать постепенно, сокращая количество принимаемых таблеток на протяжении 1-3 нед. Снижают реакцию на вакцинацию.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Кеналог (Kenalog®)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит триамцинолона ацетонида 10 или 40 мг и бензилового спирта 9,9 мг в изотоническом растворе хлористого натрия, в ампулах по 1 мл; в упаковке 5 шт. и во флаконах по 5 мл.

1 г мази или крема содержит триамцинолона ацетонида 1 мг; в тубах по 15 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, противозудное (местное).

Показ.: Сенная лихорадка, бронхиальная астма, хронический спастический бронхит, пемфигоид, псориаз, дерматит (герпетический, атопический, эксфолиативный, контактный немикробной этиологии, экзематозный). Внутрисуставно: хронические воспалительные заболевания суставов, экссудативный артрит, подагра, ложная подагра, артрозы, водянка суставов, блокада плечевого сустава, хронические воспаления внутреннего слоя суставной капсулы; инъекции под пораженную область: изолированные псориатические бляшки, плоские узелковые поражения, выпадение волос в форме круга, хроническая красная волчанка, келоиды.

Противопоказ.: Для системного применения - гиперчувствительность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, костная атрофия, психические заболевания (в т.ч. в анамнезе), вирусные заболевания (герпетическая пузырьчатка, опоясывающий лишай), ветряная оспа, амебные и грибковые инфекции, полиомиелит детского возраста (кроме бульбарно-энцефалитной формы), глаукома, возраст - от 12 до 16 лет (в/м введение). Для местного применения - ветряная оспа, состояния после иммунизации, кожные поражения туберкулезного или сифилитического характера, грибковые заболевания, поражения кожи бактериальной природы, воспаление кожи вокруг рта; не вводить внутрисуставно при наличии поблизости инфекции.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: При п/к введении - обратимая атрофия ткани; при внутрисуставных инъекциях - некроз костной ткани, ощущение жара. При местном использовании - истончение кожи, угри, волдыри, усиление роста волос, изменение пигментации. При системном - лунообразное лицо, синдром Кушинга, мышечная слабость и атрофия, атрофия костной ткани, сахарный диабет, нарушение

менструации, импотенция, усиление роста волос, кровотечения из кожи и слизистых, угри, выделение калия, атрофия надпочечников, васкулиты, синдром отмены, ulcerогенное действие, подавление иммунитета, головные боли, усиление потоотделения, глаукома, тромбоз.

Примен. и доз.: В/м. Взрослым для системного лечения - 1 мл (40 мг) медленно, глубоко, внутриягодично, до 80 мг (повторное введение через 4 нед). Для внутриочагового применения (бурсит) взрослым и детям старше 12 лет - от 10 до 40 мг. Промежуток между инъекциями - не менее 2 нед. При инъекции под область кожных поражений 1 мл разбавляют местным анестетиком и вводят 1 мг препарата на 1 кв.см (не более 30 мг в сутки у взрослых и 10 мг - у детей). Повторная инъекция - через 2 нед. Мазь - наносят на пораженные участки кожи 1-3 раза в сутки (возможно под окклюзионную повязку), от 5-10 до 25 дней с постепенной отменой. Крем - при острых воспалительных заболеваниях кожи в стадии мокнутия с последующим применением мази, курс - не более 4 нед.

Предост.: Соблюдать осторожность при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки (в анамнезе), дивертикулитах, свежих анастомозах кишечника, тенденции к тромбозам, эмболиям, карциномах с тенденцией к метастазированию, острым гломерулонефрите, хроническом нефрите. В/в и п/к не вводить.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Кестин (Kestine®)

Эбастин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит эбастина 10 мг; в блистерной упаковке по 15 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, H₁-гистаминоблокирующее.

Фармакокин.: Быстро всасывается и почти полностью метаболизируется в печени и кишечнике, превращаясь в активный метаболит каребастин. Прием препарата вместе с жирной пищей повышает всасывание и образование каребастина на 50% (что, однако, не изменяет клинического эффекта). После однократного назначения в дозе 10 мг C_{max} (80-100 нг/мл) определяется через 2,6-4 ч. При ежедневном приеме 10 мг равновесная концентрация (130-160 нг/мл) достигается через 3-5 дней. Связь с белками плазмы (в т.ч. активного метаболита) - более 95%. Не проникает через ГЭБ,

T_{1/2} каребастина - 15-19 ч, 66% препарата выводится с мочой в виде метаболитов. У пациентов с почечной недостаточностью T_{1/2} каребастина возрастает до 23-26 ч, с печеночной недостаточностью - до 27 ч. С увеличением возраста (вплоть до преклонного) фармакокинетика существенно не изменяется.

Фармакодин.: Блокирует на длительный период периферические H₁-гистаминовые рецепторы, не вызывая антихолинергических и седативного эффектов.

Клин. фарм.: После приема внутрь выраженное антигистаминное действие начинается через 1 ч и длится в течение 48 ч. После 5-дневного курса лечения антигистаминная активность сохраняется в течение 72 ч за счет действия активных метаболитов. Не изменяет показатели ЭКГ, включая QT-интервал в дозах до 80 мг; не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами (отсутствие седации).

Показ.: Аллергический ринит и конъюнктивит (сезонный и/или круглогодичный), идиопатическая хроническая крапивница.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: В период беременности и лактации не рекомендуется принимать, поскольку безопасность препарата в этих условиях не изучена.

Поб. действ.: Головная боль, сонливость, сухость во рту, симптомы аллергии. Редко: боли в животе, диспепсия, тошнота, астения, бессонница, риниты, носовые кровотечения, синуситы.

Взаим.: Совместим с теофиллином, непрямыми антикоагулянтами, циметидином, диазепамом и алкоголем. Увеличивает вероятность удлинения интервала QT при сочетанном назначении с кетоконазолом и эритромицином.

Передоз.: Специального антидота не существует. В случае передозировки рекомендуется промывание желудка, наблюдение за жизненно важными функциями организма, симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. Взрослым при аллергическом рините назначают по 10-20 мг (в зависимости от выраженности симптомов) 1 раз в сутки. При идиопатической хронической крапивнице - 10 мг 1 раз в сутки. Безопасность и эффективность у детей младше 12 лет не исследована.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с почечной или печеночной недостаточностью; с удлинением интервала QT, гипокалиемией. Не рекоменду-

ется комбинировать с эритромицином, кетоконазолом.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Кеталар (Ketalar)

Кетамин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит кетамин 10 или 50 мг (в форме гидрохлорида); в ампулах по 5 и 2 мл соответственно; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Наркозное (неингаляционное), анальгезирующее.

Показ.: Вводный и базисный наркоз при кратковременных хирургических вмешательствах, болезненные инструментальные и диагностические манипуляции, транспортировка больных, обработка ожоговой поверхности.

Противопоказ.: Нарушение мозгового кровообращения, гипертония, стенокардия, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, эклампсия, эпилепсия у детей.

Поб. действ.: Повышение АД, тахикардия, гиперсаливация, одышка, угнетение дыхания, психомоторное возбуждение и галлюцинации в период выхода из наркоза, болезненность и гиперемия по ходу вены в месте введения препарата.

Взаим.: Фармацевтически несовместим с барбитуратами.

Примен. и доз.: Начальная доза для получения наркозного эффекта составляет 0,7-2 мг/кг (вводится в вену медленно - в течение 60 с). При повторном введении применяют 1/2-1/3 первоначальной дозы или в/в капельно, со скоростью 20-60 капель в минуту 0,1% раствора кетамин в физиологическом растворе или растворе глюкозы. Ослабленным больным, пожилым и больным в шоковом состоянии вводят в дозе 0,5 мг/кг. Общая вводимая доза взрослым составляет 2-6 мг/кг в час. При в/м введении доза составляет 6,5-13 мг/кг массы тела. У детей целесообразно применять кетамин в/м при кратковременных операциях, не требующих релаксации (с сохранением спонтанного дыхания).

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Кетанест (Ketanest)

Кетамин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит кетамин гидрохлорида 10 мг, в ампулах по 5 мл или 50 мг, в ампулах по 2 и 10 мл; в упаковке 10 и 5

шт. соответственно и во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Наркозное, анальгезирующее.

Клин. фарм.: После в/в и в/м введения эффект развивается через 30-60 с и 2-4 мин (до 6-8 мин) соответственно и продолжается 5-10 мин (до 15 мин) или 12-25 мин (до 30-40 мин).

Показ.: Вводный и базисный наркоз; обезболивание при кратковременных хирургических вмешательствах, болезненных инструментальных и диагностических манипуляциях, в т.ч. обработка ожоговой поверхности, транспортировка больных и др.).

Противопоказ.: Нарушения мозгового кровообращения; артериальная гипертензия, стенокардия, сердечно-сосудистая недостаточность в стадии декомпенсации; преэклампсия и эклампсия, эпилепсия в детском возрасте.

Поб. действ.: Учащение пульса, повышение АД; нарушения ритма (редко - угнетение) дыхания; психомоторное возбуждение и галлюцинации при выходе из наркоза, гиперсаливация; болезненность и гиперемия по ходу вен.

Взаим.: Фармацевтически несовместим с барбитуратами (нельзя вводить в одном шприце).

Передоз.: Остановка дыхания. Лечение: ИВЛ.

Примен. и доз.: Парентерально, дозу устанавливают индивидуально. В/в струйно, медленно (не менее 60 с) - в начальной дозе - по 0,7-2 мг/кг массы тела (операцию можно начинать не ранее, чем через 30 с); в/м - в начальной дозе 4-8 мг/кг или 3-5 мг/кг - при введении в несколько мест (операцию начинают через несколько мин); для продления действия введение повторяют в/в или в/м в половинной или полной дозе. В/в капельно - со скоростью 80-100 капель/мин.

Предост.: С осторожностью назначают при повышенном внутричерепном и спинномозговом давлении, заболеваниях почек.

Произв.: Parke-Davis/Gödecke (Германия)

Кетанов® (Ketanov®)

Кеторолак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кеторолака трометамин 10 мг; в упаковке 100 шт.

1 ампула с 1 мл инъекционного раствора - 30 мг; в упаковке 10 шт.



Одноразовый шприц с раствором 1 мл - 30 мг.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное, антиагрегационное, ингибирование синтеза простагландинов.

Фармакокин.: После орального и в/м введения быстро и полностью всасывается. Пиковые концентрации в плазме достигаются через 30-40 мин после орального и через 45-50 мин после в/м введения. Подвергается пресистемному метаболизму, связывается с белками плазмы на 99%. Более 90% дозы экскретируется с мочой (60% в неизмененном виде), остальная часть - с фекалиями. Полупериод выведения составляет 4-6 ч.

Фармакодин.: Подавляет агрегацию тромбоцитов и удлиняет время кровотечения.

Показ.: Болевой синдром в послеоперационном периоде, острые скелетно-мышечные болевые состояния (растяжение, вывих, перелом, травма мягких тканей, миалгия, ишиалгия, обострение остеоартроза); зубная, послеродовая, онкологическая боли; при почечной и желчной коликах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, "аспириновая" астма, синдром носовых полипов, пептические язвы в стадии обострения, геморрагический диатез.

Бер. и корм. гр.: Назначают в случаях крайней необходимости.

Поб. действ.: Сухость во рту, диспептические расстройства, стоматит, ulcerogenное действие, сонливость, беспокойство, головная боль, головокружение, дисфония, шум в ушах, астения, потливость, отеки, нарушение функции печени, увеличение массы тела, сыпь, зуд.

Взаим.: Совместим с морфином. Снижает связывание с белками плазмы варфарина. На фоне салицилатов понижается сорбция белками и в 2 раза увеличивается содержание свободной формы.

Примен. и доз.: Внутрь и в/м. Разовые дозы при в/м введении - 10-30 мг, при оральном - 5-20 мг; максимальная суточная доза - 90 мг. Внутрь - по 1-2 таблетки 1-4 раза в день. Больным с массой тела менее 50 кг или старше 65 лет с почечной дисфункцией рекомендуется не более 60 мг в сутки.

Предост.: Инъекционный раствор показан только для кратковременного использования. При длительном применении необходимо учитывать риск возникновения язвы желудка и желудочно-кишечных кровотечений. С осторожностью следует назначать больным с наруше-

ниями функции печени и почек, хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией, с эрозивно-язвенными поражениями и кровотечениями из ЖКТ в анамнезе. Не рекомендуется применять детям. Необходимо тщательное наблюдение за пациентами с расстройствами гемокоагуляции и получающими препараты, влияющие на гемостаз.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Кетонал (Ketonal®)

Кетопрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит кетопрофена 150 мг; в упаковке 20 шт.

1 капсула - 50 мг; в упаковке 25 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 12 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 100 мг; в упаковке 10 и 50 шт.

1 г крема - 50 мг; в тубах по 30 г

1 таблетка форте - 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, блокада циклооксигеназы и липоксигеназы.

Фармакокин.: Быстро и достаточно полно всасывается из ЖКТ (биодоступность превышает 90%), на 99% связывается с белками плазмы крови. Максимальная концентрация в плазме достигается через 1-2 ч после приема внутрь, через 4 ч при ректальном назначении, через 15-30 мин при парентеральном введении и через 5-8 ч после нанесения на кожу. Равновесная концентрация в плазме достигается через 24 ч после начала регулярного приема. При приеме таблеток ретард минимальная эффективная концентрация регистрируется через 45-60 мин. Уровень кетопрофена в синовиальной жидкости ниже, чем в крови, но в пределах терапевтического сохраняется на протяжении большего времени (6-8 ч). Метаболизируется в печени путем глюкуронидирования, выводится (главным образом) почками и кишечником (1%). Период полувыведения составляет от 1,6 до 1,9 ч, не кумулируется. В значимом количестве не проникает через гематоэнцефалический барьер.

Фармакодин.: Обладает антибрадикининовой активностью, стабилизирует лизосомальные мембраны и задерживает освобождение из них ферментов (гидроксилаза, глюкоронидаза), способствующих разрушению тканей при хроническом воспалении. Тормозит активность нейтрофилов, снижая выделение цито-

кинов (интерлейкин 1, некротический опухолевый фактор альфа), играющих решающую роль в воспалительном повреждении тканей и иммунных процессах при ревматоидном артрите. Болеутоляющий эффект складывается из периферического компонента (блокада синтеза простагландинов и лейкотриенов) и центрального (повышение порогов болевого восприятия).

Клин. фарм.: Режим дозирования не меняется у пожилых пациентов при отсутствии выраженной патологии со стороны элиминирующих органов. При нарушении функции почек или печени необходимо изменение режима дозирования и тщательное наблюдение.

Показ.: Ревматоидный артрит, неспецифические спондилартриты (анкилозирующие и псориатические спондилиты, реактивные артриты), подагрические артриты, псевдоподагра, остеоартрозы, внесуставный ревматизм (тендиниты, бурситы, плечевые капсулиты), болевой синдром (послеоперационные, посттравматические боли, боли при метастазах в кости), почечная колика, альгодисменорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к кетопрофену и салицилатам, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности и лактации.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, рвота, абдоминальные боли, диарея, метеоризм, запоры, анорексия); стоматит, головная боль, головокружение, сонливость, физическое недомогание, шум в ушах, зрительные расстройства, нарушения функции почек и печени, гиперемия, аллергические реакции.

Взаим.: Одновременное назначение диуретиков и нестероидных противовоспалительных препаратов повышает риск развития почечной недостаточности. При одновременном приеме непрямых антикоагулянтов и солей лития необходим врачебный контроль. Отсутствует клинически значимое взаимодействие с гипертензивными средствами и дигоксинном.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м, в/в, ректально, трансдермально. Капсулы и таблетки (во время еды) - 1 капсула утром, 1 - днем и 2 капсулы вечером (или 1-2 свечи в сутки); или по 1 капсуле утром и днем и 1 свечу вечером; или 3 таблетки форте в день; или 2 таблетки ретард в день (с интервалом 12 ч). Суммарная суточная доза - от 100 до 300 мг. В/м, по 1 ампуле 1-2 раза в день. Ин-

фузии проводятся только в стационаре, не более 300 мг в течение 0,5-1 ч (до 48 ч): 100-200 мг препарата растворяют в 100 мл физиологического раствора и вводят в течение 0,5-1 ч с 8-часовым интервалом, или растворяют в 500 мл раствора для инфузий (раствор Рингера, раствор глюкозы, физиологический раствор) и вводят в течение 8 ч с 8-часовым интервалом. Комбинированное применение с центральными анальгетиками: смешивают в одном флаконе 10-20 мг морфина и 100-200 мг кетопрофена, растворяют в 500 мл физиологического раствора или раствора Рингера и вводят каждые 8 ч. Крем наносят 3-4 раза в день.

Предост.: С осторожностью следует назначать пациентам с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе, почечной или печеночной недостаточностью, а также получающим непрямые антикоагулянты. Лечение кетоналом может маскировать признаки инфекционных заболеваний.

Произв.: Lek (Словения)

Кеторол (Ketorol)

Кеторолак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кеторолака трометамин 10 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 30 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее.

Показ.: Выраженный болевой синдром различной этиологии и локализации: травмы, ожоги, зубная боль, невралгия, радикулит, послеоперационный период, онкологические заболевания и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая пептическая язва, "аспириновая астма", беременность, детский возраст (до 16 лет).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, сонливость, беспокойство, отеки, боли в месте инъекции.

Взаим.: Несовместим с другими НПВС.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-3 таблетки 4-6 раз в день, максимальная суточная доза - 120 мг; в/м - по 10-30 мг до 6 раз в сутки (не более 5 дней).

Предост.: С осторожностью назначают при нарушении функции печени, почек, костного мозга, эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ в анамнезе, застойной сердечной недостаточности.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Кефадим (Kefadim)

Цефтазидим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефтазидима 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции ЦНС, интраабдоминальные (включая перитонит), нижних дыхательных и мочеполовых путей, в т.ч. гинекологические, кожи, костей и суставов; бактериальная септицемия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно только в случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Боли в животе, тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, парестезии, эозинофилия, повышение активности печеночных ферментов, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, лимфоцитоз, кандидоз, аллергические реакции (зуд, сыпь, лихорадка), флебит и воспаление в месте инъекции.

Взаим.: Увеличивает нефротоксичность аминогликозидов и сильных диуретиков (фуросемид).

Примен. и доз.: В/в или в/м - 500 мг-1 г каждые 8 или 12 ч; при инфекции мочевых путей - обычная рекомендуемая доза - 1 г в/м или в/в каждые 8-12 ч, при пневмонии, инфекциях кожи, менингите, гинекологических и интраабдоминальных инфекциях - 2 г каждые 8 ч. Новорожденным (до 4 нед) - в/в - 30 мг/кг каждые 12 ч, младенцам и детям (от 1 мес до 12 лет) также в/в - 30-50 мг/кг каждые 8 ч. Максимальная суточная доза - до 6 г. У пациентов с нарушением функции почек режим дозирования корректируют с учетом клиренса креатинина. Пациентам, которым проводят диализ, назначают 1 г до и после процедуры.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Кефзол (Kefzol)

Цефазолин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефазолина натрия 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антимикробное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных, мочеполовых и желчевыводящих путей, кожи, костей и суставов, сепсис, эндокардит; периоперационная профилакти-

ка (вагинальная гистерэктомия, холецистэктомия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность; противопоказан недоношенным и новорожденным (до 1 мес) детям.

Бер. и корм. гр.: В период беременности и кормления грудью назначают только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Интерстициальный нефрит, повышение уровня мочевины и печеночных ферментов в крови, холестатическая желтуха, вагинит, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, анорексия, диарея, кандидозный стоматит, кандидоз половых органов, псевдомембранозный колит, аллергические реакции (лихорадка, сыпь, зуд, эозинофилия, анафилаксия), боль и флебит в месте инъекции.

Взаим.: Уменьшение концентрации в крови вызывает пробенецид (понижает почечную секрецию).

Примен. и доз.: В/м и в/в струйно или капельно. Взрослым при легкой форме инфекции - 250-500 мг каждые 8 ч, при пневмококковой пневмонии - 500 мг каждые 12 ч, при острой неосложненной инфекции мочеполовых путей - 1 г через 12 ч, при среднетяжелых и тяжелых инфекциях - 500 мг-1,5 г каждые 8-6 ч. Для профилактики послеоперационной инфекции - 1 г за 30-60 мин до операции, 500 мг-1 г во время операции. Средняя суточная доза для детей составляет 25-50 мг/кг (в 3-4 приема); при тяжелом течении - до 100 мг/кг. У пациентов с нарушением функции почек режим дозирования зависит от значений клиренса креатинина.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Ким бальзам жидкий (Kim balsam liquid)

Сост. и ф.в.: 1 флакон жидкого бальзама содержит эвкалиптола 35 г, ментола 39 г, метилсалицилата 4,3 г и камфоры 1,7 г в 100 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, раздражающее, противозудное.

Показ.: Ринит, простудные заболевания, невралгия, боли в суставах и мышцах, головная боль, ушибы, растяжения, тошнота, укачивание в машине, укусы насекомых.

Противопоказ.: Детский возраст (до 5 лет).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно (втирание с массажем) или ингаляционно 2-3 раза в день.

Предост.: Необходимо избегать попадания препарата в глаза, на раны и слизистые оболочки.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Кинедрил (Kinedryl®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит моксастина теоклата 25 мг и кофеина 30 мг; в упаковке 4 и 10 шт.

Фарм. действ.: Противорвотное.

Показ.: Тошнота и рвота при вестибулярных нарушениях; кинетозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Сухость во рту, диспептические расстройства, заторможенность, сонливость, слабость, артериальная гипотензия, тахикардия, нарушение аккомодации, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффективность спазмолитиков, симпатолитиков, уменьшает - не прямых антикоагулянтов, пероральных противодиабетических средств, производных гидантоина, кортикостероидов и противозачаточных средств. Взаимное потенцирование со снотворными и седативными средствами, алкоголем. Ингибиторы МАО и ацетилхолинэстеразы повышают, а барбитураты и производные пиразолона снижают действие. Снотворные и седативные свойства усиливаются нейролептиками и анксиолитиками.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке за 1 ч до и по 1/2-1 таблетке каждые 2-3 ч во время полета или поездки. Для купирования тошноты и рвоты принимают сразу 2 таблетки, затем по 1/2-2 таблетки через короткие промежутки времени до наступления облегчения. Детям до 6 лет - 1/4, до 15 лет - 1/4-1/2 таблетки.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Кинидин дурулес® (Kinidin Durules®)

Хинидин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит хинидина бисульфата 250 мг (эквивалентно 200 мг хинидина сульфата); в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое.

Фармакодин.: Подавляет ток ионов натрия через "быстрые" натриевые каналы кардиомиоцитов, снижает скорость деполяризации (О фаза), увеличивает продолжительность потенциала действия и эффективного рефрактерного периода; снижает возбудимость миокарда, автоматизм и проводимость в предсердиях,

пучке Гиса, сократительную активность миокарда, оказывает ваголитическое действие, вызывает вазодилатацию.

Показ.: Профилактика рецидивов фибрилляции предсердий; пароксизмальная наджелудочковая и желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; блокада II степени или полная АВ-блокада при отсутствии пейсмейкера; дигиталисная интоксикация, тромбоцитопения (в т.ч. в анамнезе).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, головокружение, головная боль, диплопия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, артериальная гипотензия, брадикардия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, фотосенсибилизация, лихорадка, крапивница, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2-5 таблеток утром и вечером; поддерживающая доза (после купирования мерцательной аритмии) - 3 таблетки утром и вечером. Таблетки проглатывают целиком, не разжевывая, запивая жидкостью (начинают с пробной дозы).

Предост.: С осторожностью используют при замедлении АВ-проводимости, брадикардии, декомпенсированной сердечной недостаточности, кардиогенном шоке, артериальной гипотонии, гипокалиемии, стенозе пищевода, в сочетании с противоаритмическими препаратами I и II класса.

Произв.: Astra (Швеция)

Клариназе (Clarinate®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит лоратадина 5 мг и псевдоэфедрина сульфата 120 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, блокада H₁-гистаминовых рецепторов, сосудосуживающее.

Показ.: Аллергический и вазомоторный ринит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, гипертиреоз, закрытоугольная глаукома, задержка мочи, возраст до 12 лет.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головокружение, возбуждение, шум в ушах, гипотензия, тахикардия, тошнота, повышение аппетита.

Взаим.: Ингибиторы МАО и симпатомиметики усиливают сосудосуживающий эффект (возможно развитие гипертензии вплоть до гипертонического криза).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Предост.: Не следует резко отменять лечение. Внезапное прекращение приема может вызвать депрессию.

Произв.: Schering-Plough (США)

Кларитин (Claritine®)

Лоратадин*

Сост. и ф.в.: 5 мл сиропа содержат лоратадина 5 мг; во флаконах по 120 мл. 1 таблетка - 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Фармакокин.: T_{1/2} - 24 ч. Не проникает через ГЭБ.

Клин. фарм.: Начало действия препарата - через 30 мин. Продолжительность - 24 ч. Не вызывает привыкания, не влияет на ЦНС.

Показ.: Сезонный и круглогодичный аллергический ринит, конъюнктивит, острая крапивница, отек Квинке, псевдоаллергические реакции, вызванные гистаминолибераторами, аллергические реакции на укусы насекомых, зудящие дерматозы (контактные, аллергодерматиты, хронические экземы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности - только по жизненным показаниям. Противопоказано при лактации.

Поб. действ.: В редких случаях - рвота, сухость во рту.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке или по 2 чайных ложки сиропа 1 раз в сутки. Детям от 2 до 12 лет при массе тела менее 30 кг - 1/2 таблетки или 1 чайная ложка сиропа, при весе более 30 кг - 1 таблетка или 2 чайные ложки сиропа 1 раз в сутки.

Произв.: Schering-Plough (США)

Клафоран (Claforan®)

Цефотаксим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефотаксима (в форме натриевой соли) 1 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Тяжелые инфекции дыхательных путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов, половых органов; гонорея, септицемия, бактериемия, абдоминальные инфекции (включая перитонит), менингит (за исключением листериозного) и другие инфекции ЦНС, профилактика инфекций после хирургичес-

ких операций на ЖКТ, урологических и акушерско-гинекологических операций.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 2,5 лет) - в/м введение.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Диспептические явления, изменение функциональных проб печени, обратимая энцефалопатия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, эозинофилия, гемолитическая анемия, дисбактериоз, псевдомембранозный колит, боль в месте введения, аллергические реакции (кожные сыпи, лихорадка, анафилактический шок).

Примен. и доз.: Растворяют в воде для инъекций (на 0,5-1 г порошка 10 мл воды, на 2 г - 10-15 мл). Для в/в инъекций или инфузий в качестве растворителя используют физиологический раствор или 5% раствор декстрозы (на 1-2 г препарата - 50-100 мл). Для в/м введения - 1% лидокаин (на 0,5 г - 2 мл, на 1 г - 3 мл, на 2 г - 5 мл). Взрослым при неосложненной острой гонорее разовая дозировка 0,5-1 г вводится в/м однократно; при неосложненных инфекциях, а также при инфекциях мочевыводящих путей в/м или в/в - 1 г каждые 12 ч; при инфекциях средней тяжести - в/м или в/в по 1-2 г каждые 12 ч; при очень тяжелых инфекциях (например менингите) - в/в 2 г каждые 6-8 ч. Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально, при лечении свыше 10 дней необходим контроль числа форменных элементов крови. С целью профилактики развития инфекций перед хирургической операцией во время вводного наркоза однократно вводят 1 г, при необходимости введение повторяют через 6-12 ч. При выполнении кесарева сечения в момент наложения зажимов на пупочную вену в/в вводят 1 г, затем через 6 и 12 ч после первой дозы вводят по 1 г. В случае почечной недостаточности (при клиренсе креатинина 10 мл/мин и менее) суточную дозировку уменьшают вдвое. У недоношенных детей и детей грудного возраста до 1 нед - дозу 50-100 мг/кг (разделенную на 2 равные дозы) вводят в/в; у детей возраста 1-4 нед суточная доза 75-150 мг/кг разделяется на 3 равные дозы и вводится в/в; у детей с массой тела до 50 кг суточная дозировка составляет 50-100 мг/кг и разделяется на 3-4 в/м или в/в введения; при тяжелых инфекциях, в том числе менингите, дозу увеличивают до 100-200 мг/кг/сут; детям с мас-

сой тела 50 кг и более препарат назначают как у взрослых.

Прозв.: Roussel Uclaf (Франция)

Клексан (Clexane®)

Эноксапарин натрий*

Сост. и ф.в.: 1 мл водного раствора для подкожных инъекций содержит эноксапарина 100 мг; в готовых к употреблению шприцах по 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 мл; в упаковке по 2 шт. 1 мг эноксапарина соответствует 100 анти-Ха-ЕД по Международному стандарту (LMWH-низкомолекулярных гепаринов).

Фарм. действ.: Антитромботическое, ингибирование тромбокиназы (в незначительной степени), инактивация тромбина.

Фармакокин.: При п/к введении быстро и практически полностью всасывается. Пик активности в плазме крови после введения 40 мг достигается через 3 ч, C_{max} - 1,6 мкг/мл. $T_{1/2}$ - около 4 ч. У пациентов с почечной недостаточностью и у пожилых лиц $T_{1/2}$ более продолжителен - 6-7 ч, но коррекции дозирования не требуется. Анти-Ха-активность сохраняется в крови в течение 24 ч после однократной инъекции.

Показ.: Профилактика тромбоэмболий (особенно в ортопедической практике и общей хирургии); лечение тромбоза глубоких вен; профилактика коагуляции в системе экстракорпорального кровообращения при проведении гемодиализа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к гепарину и его низкомолекулярным аналогам, состояние с высоким риском развития неконтролируемых кровотечений, в т.ч. острая пептическая язва, раны, нарушения мозгового кровообращения.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Иммуно-аллергическая тромбоцитопения (редко), развивающаяся на 5-21 день лечения; в начале лечения может наблюдаться умеренная транзиторная асимптоматическая тромбоцитопения. При спинальной/эпидуральной анестезии - внутриспинальная гематома (редко), приводящая к временному или постоянному параличу; вероятность развития этого осложнения может увеличиваться при использовании постоянного послеоперационного эпидурального катетера. Возможно асимптоматическое и обратимое увеличение числа тромбоцитов и повышение уровня ферментов печени. В месте инъекции - боль и умеренное покраснение, гематомы, изредка возникают плотные воспа-

лительные узлы, рассасывающиеся через несколько дней (не требуют прекращения лечения). Исключительно редко - некрозы в месте введения (в этом случае лечение следует прекратить). Изредка - кожные или системные аллергические реакции. Кровотечения при соблюдении рекомендуемых дозировок чрезвычайно редки.

Взаим.: Несовместим с препаратами, влияющими на гемостаз (если только они не назначаются по серьезным показаниям): ацетилсалициловая кислота, др. нестероидные противовоспалительные препараты (включая кеторолак), декстран-40, тиклопидин, системные глюкокортикостероиды, тромболитики и антикоагулянты.

Передоз.: Лечение: медленно в/в вводят протамин: 1 мг протамина нейтрализует антикоагуляционную активность, вызываемую 1 мг препарата.

Примен. и доз.: П/к, в положении лежа в передне- или заднелатеральную области брюшной стенки на уровне пояса. При инъекции иглу вертикально вводят на всю длину в толщу кожи, зажатой в складку, складку кожи не расправляют до окончания инъекции. После инъекции место введения препарата нельзя растирать. Профилактика венозных тромбозов: пациентам с умеренным риском развития тромбоэмболий назначают по 20 мг (0,2 мл) 1 раз в день. Если риск возникновения тромбоэмболий высок, дозу увеличивают - до 40 мг 1 раз в день. При хирургических операциях препарат вводят за 2 ч до общехирургической или онкологической и за 12 ч до ортопедической операции, а затем - 1 раз в день в течение 7-10 дней. Длительность лечения может быть увеличена до тех пор, пока существует риск возникновения венозной тромбоэмболии. Лечение тромбозов глубоких вен - по 1 мг/кг каждые 12 ч в течение 10 дней. При этом начинают лечение пероральными антикоагулянтами, а введение эноксапарина продолжается до тех пор, пока не будет достигнут эффект от них (Международный коэффициент нормализации от 2 до 3). Профилактика коагуляции в системе экстракорпоральной циркуляции при проведении гемодиализа: Клексан вводится в артериальную линию в начале гемодиализа в дозе 1 мг/кг при 4-часовой процедуре. Для больных с высоким риском кровотечения доза уменьшается до 0,5 мг/кг при одинарном доступе. При отложении фибриновых колец, например, при более длительной процеду-

ре можно ввести дополнительно 0,5-1,0 мг/кг.

Предост.: Не вводить в/м. Низкомолекулярные гепарины не являются взаимозаменяемыми. У больных, имеющих в анамнезе тромбоцитопении, индуцированные гепарином, эноксапарин может использоваться только в исключительных случаях, после консультации со специалистом в этой области. Перед и во время лечения необходимо контролировать количество тромбоцитов. При снижении их показателя на 30-50% от исходной величины следует немедленно прекратить введение эноксапарина и назначить другое лечение. Клексан, так же как любой другой антикоагулянт, должен назначаться с осторожностью в случаях потенциального риска развития кровотечений: при гипокоагуляции, пептических язвах в анамнезе, рецидивирующих ишемических инсультах, неконтролируемой тяжелой артериальной гипертензии, диабетической ретинопатии, повторных неврологических или офтальмологических операциях. С осторожностью назначают больным с тяжелыми заболеваниями печени. Если нельзя избежать комбинирования со средствами, изменяющими гемостаз, необходим тщательный клинический и лабораторный контроль. Нельзя смешивать с другими препаратами.

Произв.: Rhône-Poulenc Roger (Франция-США)

Клиацил (Clicil®)

Феноксиметилпенициллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит феноксиметилпенициллина 1200000 МЕ; в упаковке 20 шт.

1 г порошка для приготовления сиропа - 150000 МЕ; во флаконах вместимостью 150 мл в комплекте с мерной ложкой.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Всасывается 25% принятой дозы, на 80% связывается с белками сыворотки крови. Наивысший уровень достигается в почках, менее высокий - в печени, коже и тонком кишечнике. Выводится преимущественно с мочой. У новорожденных, детей грудного возраста и у пациентов с нарушенной функцией почек экскреция препарата значительно замедляется.

Показ.: Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей (в том числе легкие формы рожи и скарлатины), верхних и нижних дыхательных путей, среднего уха, полости рта, тонзиллит, профилак-

тика рецидивов ревматизма и бактериального эндокардита и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции ЖКТ, сопровождающиеся рвотой и/или диареей.

Бер. и корм. гр.: При беременности используется только по абсолютным показаниям. В период кормления грудью препарат применяют с осторожностью.

Поб. действ.: Черный налет на языке, проходящее изменение цвета зубов, сухость во рту, нарушение вкуса, диспептические расстройства, нейропатия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения, иммунопатологические и аллергические реакции.

Взаим.: Снижает активность оральных контрацептивов. Несовместим с бактериостатиками (тетрациклины, хлорамфеникол и др.). Аминогликозидные антибиотики (неомицин) уменьшают всасывание, пробеницид замедляет выведение почками, нестероидные противовоспалительные средства и сульфинпиразин удлиняют циркуляцию в крови.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, за 1 ч до еды - по 1 таблетке 3 раза в сутки (3600000 МЕ/сутки). Грудным детям - по 1/2 мерной ложки сиропа, дошкольного возраста - по 1 мерной ложке, школьного - по 2 мерные ложки 3 раза в сутки. Лечение продолжают еще 3 дня после нормализации температуры. При стрептококковой инфекции, в том числе при тонзиллите, принимают, как минимум, 10 дней (во избежание рецидива). Для профилактики рецидивов ревматизма взрослым назначают по 200000 МЕ 2 раза в сутки. Для профилактики бактериального эндокардита (при проведении стоматологических процедур или хирургических операций на верхних дыхательных путях взрослым, страдающим врожденными или приобретенными пороками сердца, назначают 3200000 МЕ за 0,5-1 ч до соответствующей процедуры, затем - 800000 МЕ каждые 6 ч (всего 8 доз). Пациентам с нарушением функции почек интервал между приемами препарата увеличивают до 12 ч.

Произв.: Hoechst (Германия)

Кливарин (Clivarin®)

Ревипарин натрия*

Сост. и ф.в.: Заполненный одноразовый шприц содержит 0,25 мл ревипарина натрия, соответствующего в единицах анти-Ха-активности 10,4 мг (1750 МЕ) Первого международного стандарта для низкомолекулярного гепарина (что соот-

ветствует 11-16 мг фрагмента гепарина); в упаковке 5 или 10 шприцев.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное прямое, влияние на большинство фаз свертывания крови, ингибция Ха-фактора.

Фармакокин.: При п/к введении $T_{1/2}$ 3-4 ч, что значительно выше, чем нефракционированного гепарина.

Клин. фарм.: Обладая способностью блокировать Ха-фактор, действует на начальный этап свертывания и дает выраженный и длительный антитромбогенный эффект. При этом возможность возникновения кровоточивости незначительна.

Показ.: Первичная профилактика тромбозов глубоких вен во время и после хирургических операций; профилактика венозных тромбозов при беременности, инфаркте миокарда, ишемическом инсульте.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (к ревиварину натрия и/или к гепарину), хирургические операции на ЦНС, люмбальные пункции, спинальная или перидуральная анестезия, заболевания, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью (геморрагические диатезы, недостаточность факторов свертывания крови), тяжелые заболевания печени, почек или поджелудочной железы, тромбоцитопения, заболевания, позволяющие предполагать сосудистые нарушения (язва желудка и/или кишечника), гипертония (диастолическое давление выше 105 мм.рт.ст.), геморрагический апоплексический инсульт, аневризмы артерий головного мозга, ретинопатии, кровоизлияния в стекловидное тело; подострый эндокардит; угрожающий аборт, злокачественное новообразование со склонностью к кровотечениям; мочекаменная болезнь, хронический алкоголизм.

Бер. и корм. гр.: Не проникает через плаценту (можно вводить во время беременности), но в незначительных количествах попадает в материнское молоко. Нельзя исключить повышения риска выкидыша. Во время родов роженицам, получавшим кливарин, эпидуральная анестезия абсолютно противопоказана. При диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови с коагулопатией потребления, возникающем при преждевременной отслойке плаценты, показана неотложная терапия гепарином и синтетическими антифибринолитиками.

Поб. действ.: Кровоточивость, тромбоцитопения (в том числе на фоне коагулопатии потребления с тромбозами и тромбоэмболией, с некрозами кожи на

месте подкожных инъекций), петехии, пурпура и мелена, повышение активности сывороточных трансаминаз, лактатдегидрогеназы, липазы, гиперкалиемия, гипоальдостеронизм, приапизм, вазоспазм, местные тканевые реакции (уплотнение, покраснение, депигментация и мелкие гематомы), аллергические реакции (тошнота, головная боль, повышение температуры тела, боли в конечностях, крапивница, зуд, одышка, бронхоспазм, гипотония).

Взаим.: Гипокоагуляцию усиливают производные кумарина, дипиридамола, декстран, цефалоспориновые антибиотики, пенициллин, нестероидные противовоспалительные препараты (ацетилсалициловая кислота, фенилбутазон, индометацин, сульфинпиразон и др.). Нитроглицерин (в/в) может ослаблять эффект. Пропранолол, а возможно, и другие лекарственные вещества вытесняются из комплекса с белками плазмы и действуют сильнее.

Передоз.: Проявляется значительным снижением свертываемости крови. Необходимо медленное в/в введение протамина (нейтрализует анти-IIa-активность полностью, а анти-Ха-активность - частично) из расчета: 1 мг протамина на 100 анти-Ха-единиц кливарина.

Примен. и доз.: П/к (нельзя вводить в/м): одноразовый шприц готов к применению сразу после снятия с иглы защитного колпачка. П/к инъекцию следует производить в складку кожи на животе (между пупком и подвздошной остью таза) или на передней поверхности бедра. Иглу направляют вертикально в образованную складку кожи и извлекают ее тоже в вертикальном направлении. Для первичной профилактики тромбозов и тромбоэмболий при хирургических вмешательствах первая инъекция - за 2 ч до операции, а затем - как и в остальных случаях. Длительность лечения зависит от характера заболевания, риска возникновения тромбоза и продолжается до 7 суток. Обязателен контроль числа тромбоцитов перед началом инъекций, а также, по меньшей мере, после первых и четвертых суток лечения и далее дважды в неделю.

Предост.: Необходим тщательный врачебный контроль при лечении пожилых пациентов, особенно женщин, при одновременном применении медикаментов, повышающих уровень калия в сыворотке крови. Клинический опыт лечения детей отсутствует. Следует избегать в/м инъекций ввиду опасности развития гематом. Не рекомендуется набирать дру-

гие лекарственные вещества в шприц с низкомолекулярным гепарином (образуются соли и осадок с органическими основаниями).

Произв.: Knoll (Германия)

Климадинон (Klimadynon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 20 мг сухого экстракта корневища цимицифуги; в упаковке 60 шт.

100 г раствора для приема внутрь содержат 12 г жидкого экстракта корневища цимицифуги (соответствует 2,4 г сухого вещества растения), а также масло мяты; во флаконах по 50 мл (содержит 36 об.% спирта).

Фарм. действ.: Эстрогенное, антиклимактерическое.

Показ.: Климакс (приливы, потливость, головокружение, головная боль, повышенная возбудимость, лабильность настроения, нарушение сна, сердцебиение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, гастралгия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 30 капель 2 раза в день (утром и вечером) в неразбавленном виде или на сахаре; таблетки - по 1 шт 2 раза в день, не раскусывая, с небольшим количеством жидкости. Препарат принимают длительно (обычно терапевтический эффект проявляется через 2 нед), при отсутствии медицинского наблюдения не рекомендуется использовать его свыше 6 мес.

Произв.: Bionorica (Германия)

Климакт-Хель (Klimakt-Heel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Sanguinaria D3, Sepia D4, Sulfur D4, Ignatia D4, Cedron D4 по 30 мг, Stannum D12 60 мг, Lachesis D12 90 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, обезболивающее, седативное, антипсихотическое, спазмолитическое, эстрагеноподобное.

Показ.: Нервно-гормональные расстройства в климактерическом периоде (функциональная недостаточность яичников, неврозы, сосудистая дистония и др.).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Эффект усиливают Энгистол Н и Траумель С.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Heel (Германия)

Климактоплан (Klimaktoplan®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для рассасывания содержит Cimicifuga D2 25 мг, Sepia D2 25 мг, Lachesis D5 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sanguinaria D2 25 мг; в упаковке 100 и 500 шт.

Фарм. действ.: Устранение симптомов климакса у женщин.

Клин. фарм.: Наилучший эффект наблюдается в пре-, пери- и постменопаузном периоде.

Показ.: Климактерический период, осложненный соответствующей симптоматикой: приливы жара, усиленное потоотделение, сердцебиения, головокружение, мигрень, зуд, внутреннее беспокойство, расстройства сна, депрессия, вазомоторные нарушения.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь за полчаса до или через час после еды, по 1-2 таблетки, не глотая (держат во рту до полного рассасывания) 3 раза в день (можно использовать длительно).

Предост.: В случае первичного ухудшения следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Климен (Climen®)

Сост. и ф.в.: 1 драже белого цвета содержит эстрадиола валерата 2 мг и 1 драже розового цвета - эстрадиола валерата 2 мг и ципротерона ацетата 1 мг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт. (11 драже белого цвета + 10 драже розового цвета).

Фарм. действ.: Эстрогенное, гестагенное, антиандрогенное.

Показ.: Климактерические расстройства (заместительная терапия): психо-вегетативные расстройства, атрофия кожи, сухость слизистых мочевого тракта, явления андрогенизации; профилактика постменопаузного остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний; эстрогенная недостаточность (овариоэктомия по поводу незлокачественных новообразований, нарушения менструального цикла (первичная и вторичная аменорея и др.).

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч.в

анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, рак молочной железы или эндометрия, нарушения жирового обмена, герпес (в анамнезе), серповидно-клеточная анемия, идиопатическая желтуха, зуд и отосклероз с ухудшением в ходе имевшей место беременности.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушение функции желудка, нагрубание молочных желез, изменение массы тела и либидо, депрессивные состояния.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно, приблизительно в одно и то же время, начиная с 5-го дня цикла, и далее по стрелке на упаковке, затем - перерыв 7 дней.

Произв.: Schering (Германия)

Климицин (Klimicin®)

Клиндамицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит клиндамицина гидрохлорида 150 мг; в упаковке 16 или 100 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - клиндамицина фосфата 300 мг; в упаковке 10 шт.

1 флакон с 4 мл раствора для инъекций - 600 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Хорошо всасывается после орального применения (90%), одновременный прием пищи не влияет на всасывание. Легко проникает в физиологические жидкости и ткани (включая костную). C_{max} в крови достигается через 45 мин, $T_{1/2}$ составляет 2,4 ч. Метаболизируется в печени, большая часть метаболитов выводится с мочой, меньшая часть - кишечником.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, урогенитальной зоны, кожи и мягких тканей (инфицированные раны, абсцессы), брюшной полости; острый и хронический остеомиелит, септицемия (прежде всего анаэробная), аспирационная пневмония и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 1 мес).

Бер. и корм. гр.: Безопасность применения препарата во время беременности не доказана.

Поб. действ.: Диспепсия (абдоминальные боли, тошнота, рвота, диарея), дисбактериоз (псевдомембранозный колит), нарушения функции печени, лейкопения, нейтропения, гипербилирубинемия, боль и тромбоз в месте инъекции; при быстром введении - сердечно-сосу-

дистая недостаточность, артериальная гипотония.

Взаим.: Несовместим с эритромицином, ампициллином, дифенилгидантоином, барбитуратами, аминофиллином, глюконатом кальция и сульфатом магния. Не рекомендуется одновременное применение с растворами, содержащими комплекс витаминов группы В. Усиливает эффект нейромышечных блокаторов. Одновременное назначение с антидиарейными препаратами увеличивает риск развития псевдомембранозных колитов.

Примен. и доз.: Внутрь, 150-450 мг каждые 6 ч; детям - 8-25 мг/кг в сутки (в 3-4 приема). Парентерально (в/м или в/в) - 300 мг 2 раза в день, при тяжелых инфекциях - до 1,2-4,8 г в сутки (в 2-4 введения); детям - 10-40 мг/кг в сутки (в 3-4 введения).

Произв.: Lek (Словения)

Климонорм (Klimonorm®)

Сост. и ф.в.: 1 драже желтого цвета содержит эстрадиола валерата 2 мг, 1 драже коричневого цвета - эстрадиола валерата 2 мг и левоноргестрела 0,15 мг; в упаковке с календарной шкалой по 21 шт. (9 желтых и 12 коричневых драже).

Фарм. действ.: Антиклиматическое (эстроген-гестагенное).

Показ.: Менопауза (нормальная, преждевременная, хирургически обусловленная); климактерический синдром (психические и вегетативные симптомы) в пери- и постменопаузе; соматотрофические симптомы в постменопаузе, профилактика постменопаузного остеопороза.

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции и опухоли печени, тромбоэмболические процессы, гормонозависимые опухоли матки и молочных желез, сахарный диабет (тяжелая форма); идиопатическая желтуха, зуд, герпес, ухудшение отосклероза при предшествующей беременности, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, диспептические расстройства, задержка натрия, отеки, болезненность молочных желез, изменение либидо, зуд; нерегулярные, интенсивные, длительные менструальные кровотечения (через 3-6 циклов приема).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды.

Предост.: С осторожностью назначают при сахарном диабете, гипертонической болезни, варикозе, флебите, эпилепсии, малой хорее, перемежающейся порфирии, миоме, эндометриозе, мастопатии, длительной иммобилизации. Требуется отмена препарата при сильных болях в

ногах (возможный тромбоз глубоких вен), колющих болях при дыхании или кашле неясного генеза, болях и чувстве стеснения в грудной клетке, мигреноподобных болях, внезапных нарушениях чувствительности, зрения и слуха, параличе, повышенном кровяном давлении, желтухе, гепатите, холестазае, генерализованном зуде, учащенных эпилептических приступах.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Клиндамицин (Clindamycin)

Клиндамицин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 4 мл раствора для инъекций содержит клиндамицина фосфата 600 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое.

Фармакокин.: Хорошо проникает в различные ткани и биологические жидкости: миндалины, мышцы, кости, бронхи, легкие, плевру, желчные протоки, аппендикс, фаллопиевы трубы, простату, синовиальную жидкость, слюну, мокроту, трофические язвы, раны.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей (фарингит, тонзиллит, дифтерия, синусит, отит, пневмония, бронхит, скарлатина, абсцесс легкого), кожи и мягких тканей, костей и суставов (остеомиелит, септический артрит), в стоматологии, урогенитальные (хламидиоз, эндометрит, вагинальные инфекции, тубовариальные воспаления) и абдоминальные инфекции (перитонит, абсцесс), отит, септицемия, эндокардит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Диспептические расстройства; при быстром внутривенном введении возможны коллапс, остановка сердца; аллергические реакции: крапивница, эритема.

Взаим.: Несовместим с ампициллином, фенитоином, барбитуратами, аминофиллином, сульфатом магния, глюконатом кальция; пролонгирует действие панкурониума.

Примен. и доз.: В/м, 150-450 мг каждые 6 ч; грудным детям - 15 мг/кг в сутки в 4 приема, детям старше 1 мес - 8-16 (до 30) мг/кг в 4 приема. В/в, медленно (до 60 мин) в концентрации не выше 10 мг/мл.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Клиндамицин (Clindamycin)

Клиндамицин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит клиндамицина 300 мг; в упаковке 10 шт.

1 капсула - 150 мг; в упаковке 16 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, кожи, костей и мягких тканей, полости рта, костей, органов малого таза, перитонит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность.

Поб. действ.: Диспептические явления, эзофагит, желтуха, нарушение функции печени и почек, нейтропения, эозинофилия, тромбоцитопения, гипотония, тромбофлебит, псевдомембранозный колит, аллергические реакции, местно: раздражение, болезненность, инфильтраты и абсцессы.

Взаим.: Несовместим (в растворе) с ампициллином, витаминами группы В, барбитуратами, аминофиллином, глюконатом кальция, сульфатом магния, эритромицином. Усиливает эффект миорелаксантов.

Примен. и доз.: В/м, в/в (капельно - в дозе 600-900 мг со скоростью не более 30 мг/мин) новорожденным - 15-20 мг/кг в день в 3-4 приема; детям старше 1 мес - 20-40 мг/кг в день. Перорально - 150-450 мг через каждые 6-8 ч; детям старше 1 мес - 2-5 мг/кг.

Произв.: Nemoform (Югославия)

Клиогест® (Kliogest®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эстрадиола (в виде полугидрата) 2 мг и норэтистерона ацетата 1 мг; в упаковке в виде календарного диска 28 шт.

Фарм. действ.: Эстроген-прогестагенное.

Показ.: Эстрогенная недостаточность в климактерическом периоде (для устранения менструальноподобных кровотечений в постменопаузе), облегчение менопаузальных симптомов, профилактика остеопороза в менопаузе.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли (карцинома молочной железы или эндометрия), острые или хронические заболевания печени (в т.ч. в анамнезе) с положительными печеночными функциональными тестами, тромбозы глубоких вен, тромбоэмболии, нарушения мозгового кровообращения (в т.ч. в анамне-

зе), маточные кровотечения неясной этиологии, гемоглобинопатии, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Нерегулярные менструальноподобные выделения и болезненность молочных желез в первые месяцы лечения; тошнота, головная боль, отечность, алоpecia, кожные аллергические реакции, нарушения зрения, тромбозы и тромбоэмболия, повышение АД, нарушение функции печени.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки, ежедневно без перерывов.

Предост.: Назначают с осторожностью при гипертонии, эпилепсии, мигрени, сахарном диабете, бронхиальной астме, сердечной недостаточности (больные должны находиться под наблюдением врача). Применять следует только у тех женщин, у которых последний менструальный цикл был не менее года назад. При длительном лечении рекомендуется не реже 1 раза в год проводить профилактические осмотры. Эстрогены следует назначать курсом длительностью не более 1 года, если не проводится регулярное гинекологическое обследование и обследование молочных желез. Перед началом лечения необходимо собрать семейный медицинский анамнез и провести тщательное медицинское обследование, включающее измерение АД, исследование молочных желез и брюшной полости, гинекологическое обследование. Препарат не является контрацептивом и не предохраняет от беременности. Лечение должно быть немедленно прекращено при тромбозе глубоких вен, тромбоэмболических нарушениях, при появлении желтухи, усилении мигренозных болей, внезапном нарушении зрения, значительном повышении АД, а также за 4-6 нед до плановой хирургической операции.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Клион (Klion)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 флакон со 100 мл раствора для инфузий содержит метронидазола 500 мг; в упаковке 1 или 10 шт.

Фарм. действ.: Противопроtoзойное.

Показ.: Инфекции (лечение и профилактика), вызываемые анаэробными бактериями, бактероидами, фузобактериями, клостридиями, анаэробными кокками.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к другим производным

нитроимидазола), беременность, лактация.

Поб. действ.: Неприятный вкус во рту, обложенность языка, тошнота, диспепсия, головокружение, головная боль, сонливость, дискоординация движений, атаксия, периферическая нейропатия, лейкопения, потемнение цвета мочи, аллергические кожные реакции.

Взаим.: Усиливает эффект варфарина и других не прямых антикоагулянтов, несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Лечение: взрослым и детям старше 12 лет - 500 мг в/в капельно (5 мл/мин) каждые 8 ч; детям до 12 лет - 7,5 мг/кг; курс лечения - 7 дней. Профилактика: взрослым и детям старше 12 лет - 500 мг в/в капельно (5 мл/мин) непосредственно до, во время операции или после нее и затем каждые 8 ч; детям до 12 лет - 7,5 мг/кг.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Клион-Д (Klion-D)

Сост. и ф.в.: 1 вагинальная таблетка содержит метронидазола 100 мг и миконазола 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противопроtoзойное, антибактериальное, противогрибковое.

Показ.: Влагалищные инфекции: трихомоноз, кандидоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Жжение, зуд, раздражение слизистой оболочки влагалища; тошнота, боли в животе; головная боль, головокружение; кожные аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект не прямых антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Интравагинально по 1 таблетке (предварительно смочив водой) вечером перед сном в течение 10 дней. При трихомонозе - одновременно назначают метронидазол внутрь.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Кломид (Clomide)

Кломифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кломифена цитрата 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиэстрогенное.

Показ.: Стимуляция овуляции у женщин с ановуляторным циклом. Ановуляторные расстройства цикла центрального, гипоталамического происхождения, вторичная аменорея, постконтрацептивная аменорея, олигоменорея, галакторея (опухолевого происхождения), олигоспермия.

Противопоказ.: Выраженная печеночно-почечная недостаточность, маточные кровотечения неясной этиологии, киста яичника, опухоль или недостаточность функции гипофиза, кровотечения, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, тошнота, приливы, расстройства зрения, кистозное увеличение яичников.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50 мг 1 раз в день перед сном, начиная с 5-го дня менструального цикла в течение 5 дней; при отсутствии эффекта в следующем цикле дозу увеличивают до 100 мг (или удлиняют курс до 10 дней); мужчинам (под контролем спермограммы) - по 50 мг 1-2 раза в день в течение 3-4 мес.

Произв.: Marion Merrell Dow (США)

Кломинал (Klominall)

Кломипрамин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит кломипрамина 25 мг; в упаковке 30 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 25 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное.

Показ.: Депрессии (в т.ч. психомоторная заторможенность и тревожные состояния); депрессивные расстройства настроения (в т.ч. у детей), навязчиво-компульсивный синдром, фобии, панические состояния, каталепсия при нарколепсии, хронические боли, ночное недержание мочи (в возрасте старше 5 лет при исключении органической причины расстройства).

Поб. действ.: Сухость во рту, головокружение, нарушение аккомодации, мелкий тремор, ортостатическая гипотония, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 14 лет - при депрессиях, навязчиво-компульсивном синдроме, фобиях (лечение и профилактика) в начальной дозе - 1 драже 2-3 раза в сутки первые 2-3 дня, затем каждый день в течение первой недели дозировку постепенно увеличивают до 4-6 (не более) драже в сутки; поддерживающая доза составляет 2-4 драже в сутки, при каталепсии (нарколепсии) - 1-3 драже в сутки. Больным старческого возраста - начиная с 1/2 драже в сутки, повышая дозировку на 1-2 драже в течение примерно 10 дней до оптимальной, которую соблюдают до конца лечения. Детям от 5 до 7 лет - по 1 драже в сутки, от 8 до 14 лет - по 1-2 драже в сутки. Парентерально: в/м введение начинают с 25-50 мг (1-2 ампулы) в сутки, повышая до 150

мг (6 ампул) в сутки (максимально); после улучшения состояния, снижая число инъекций, постепенно переходят на пероральное применение. В/в капельно в течение 1,5-3 ч - по 50-75 мг (2-3 ампулы) в 250-500 мл изотонического раствора хлорида натрия или глюкозы 1 раз в сутки, через 3-5 дней переходят на пероральное лечение (1 ампулу заменяют приемом 2 драже).

Произв.: Pliva (Хорватия)

Клонотрил (Clonotril™)

Клоназепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит клоназепама 0,5 или 2 мг; в упаковке 30 и 20 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, противосудорожное, миорелаксирующее.

Показ.: Эпилепсия (все формы), в т.ч. у новорожденных (типичные и атипичные малые припадки, генерализованные первичные и вторичные тонико-клонические припадки), эпилептический статус (все клинические формы), фокальные припадки (с простой и комплексной симптоматикой), различные формы миоклонуса и атаксий.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая легочная недостаточность, угнетение дыхания, беременность.

Поб. действ.: Сонливость, утомляемость, парадоксальная агрессивность, раздражительность, изменения психики, снижение мышечного тонуса, нарушение координации, гиперсаливация (у новорожденных), нарушения крови и функции печени с повышением уровня сывороточных трансаминаз и щелочной фосфатазы.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с небольших доз и постепенно увеличивая до оптимальной для данного больного дозы. В 3-4 приема в день: взрослым - 4-8 мг, детям до 1 года - по 0,5-1 мг, 1-5 лет - по 1-3 мг, 5-12 лет - по 3-6 мг.

Предост.: Во избежание учащения припадков отмену (переход на др. противоэпилептическое средство) проводят постепенно. Следует предупреждать больных об опасности управления машинами, механизмами и др., об изменении в поведении. Во время лечения не допустимо употребление алкоголя. С осторожностью назначают при респираторных заболеваниях, нарушениях функции почек и печени, пожилым, ослабленным пациентам. Лактирующие женщины должны прекратить грудное вскармливание.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Клостилбегит (Clostilbegyt®)

Кломифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кломифена цитрата 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антиэстрогенное.

Показ.: Ановуляторное бесплодие, вторичная аменорея, олигоменорея, постконтрацептивная аменорея, галакторея, синдром Штейна-Левенталя, синдром Хиари-Фроммеля, олигоспермия.

Противопоказ.: Заболевания печени, печеночная недостаточность, киста яичников, новообразование или гипофункция гипофиза, метроррагия, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, тошнота, слабость, снижение скорости реакций, повышенная возбудимость, бессонница, депрессия, увеличение массы тела, приливы, расстройства зрения, кистозное увеличение яичников, дисменорея, многоплодная беременность, алопеция, увеличение диуреза, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, при регулярных менструациях лечение начинают на 5-й день цикла. Первый курс - по 50 мг в сутки в течение 5 дней, овуляция обычно наступает между 11 и 15 днем цикла. При отсутствии овуляции проводится второй курс - по 100 мг/сутки в течение 5 дней, при необходимости - третий. В случае отсутствия эффекта после 3-месячного перерыва проводится еще один 3-месячный курс. Максимальная доза в одном курсе - не более 750 мг. При постконтрацептивной аменорее - по 50 мг в сутки в течение 5 дней. При олигоспермии - по 50 мг в сутки в течение 6 нед.

Произв.: Egis (Венгрия)

Клофелин (Clophelinum)

Клонидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит клонидина гидрохлорида 0,075 или 0,15 мг; во флаконах оранжевого стекла по 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, вазодилатирующее, стимуляция центральных пресинаптических альфа-адренорецепторов.

Показ.: Гипертоническая болезнь (все формы), гипертонические кризы.

Противопоказ.: Кардиогенный шок, артериальная гипотензия, АВ-блокада, выраженная депрессия.

Поб. действ.: Сухость во рту, запор, слабость, сонливость.

Взаим.: Гипотензивные свойства ослабляют антидепрессанты. Усиливает седативный эффект нейролептиков.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 0,075 мг 2-3 раза в день. При необходимости разовую дозу увеличивают через 1-2 дня на 0,0375 мг - до 0,15-0,3 мг 3-4 раза в день.

Произв.: Фармак (Украина)

Кнавон (Knavon®)

Кетопрофен*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит кетопрофена 50 мг; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее, противоревматическое.

Показ.: Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, остеоартроз, обострение подагры, внесуставные ревматические заболевания (бурсит, капсулит, синовит, тендинит, тендосиновит), травмы, дисальгоменорея, мигрень.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язва желудка, нарушение функции почек (клиренс креатинина ниже 60 мл/мин), гепатит, беременность, лактация.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (раздражение слизистой, тошнота, диспепсия, изжога, чувство тяжести в животе, гастралгия, диарея), кровотечения, ulcerация и перфорация ЖКТ, головная боль, головокружение, тинит, бессонница, депрессия, психотические реакции, задержка соли и воды, нарушение зрения и слуха, гемолиз, анемия, гиперкоагуляция, агранулоцитоз, тромбоцитопения, раздражение слизистой мочевыводящих путей, менометроррагия, гематурия, интерстициальный нефрит, почечная недостаточность, дисфункция печени, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь (с антацидами, молоком или пищей), в индивидуально подобранной дозе - обычно по 1 капсуле 3-4 раза в день (максимальная суточная доза - 300 мг).

Произв.: Belupo (Хорватия)

Ко-ренитек (Co-renitec®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 20 мг и гидрохлоротиазида 12,5 мг; в упаковке 26 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, блокада АПФ, диуретическое.

Клин. фарм.: Гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 ч.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к др. ингибиторам АПФ и производным сульфаниламида), анурия, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется назначать при беременности, особенно во II-III триместре (из-за риска возникновения дефектов развития или гибели плода). При наступлении беременности прием должен быть прекращен. Возможно использование препарата у беременных по жизненным показаниям, однако необходимо информировать пациентку о последствиях и проводить периодическое ультразвуковое обследование (для оценки интраамниотического пространства). Противопоказан при лактации (при жизненной необходимости использования следует прекратить кормление грудью).

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, бессонница или сонливость, судороги, парестезии, нервозность, шум в ушах, утомляемость, астения; ортостатическая гипотония, обмороки, тахикардия, сердцебиение, боли в груди; тошнота, рвота, сухость во рту, кашель, диспепсия, метеоризм, боли в животе, диарея или запор, кашель, затруднение дыхания; почечная и печеночная недостаточность, панкреатит; понижение либидо, импотенция; подагра, артралгия, фотосенсибилизация, ангионевротический отек лица, губ, языка, гортани, кожные аллергические реакции (сыпь, зуд и др.).

Взаим.: Совместим (аддитивный эффект) с др. гипотензивными средствами. При одновременном использовании калиевых добавок, калийсберегающих диуретиков и калийсодержащих солей возможна гиперкалиемия (особенно при почечной недостаточности). Увеличивает вероятность литиевой интоксикации.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день; при необходимости - по 2 таблетки 1 раз в день. При почечной недостаточности (с клиренсом креатинина менее 30-80 мл/мин) используют после предварительного подбора доз каждого компонента, рекомендуемая доза эналаприла - 5-10 мг. В случае использования Ко-ренитека после терапии диуретиками рекомендован интервал в 2-3 дня.

Предост.: Во избежание симптоматической гипотонии необходим предварительный (до лечения) и периодический (во время лечения) контроль за показателя-

ми водно-электролитного баланса, особенно у больных с сопутствующими цереброваскулярными заболеваниями и ИБС. При повышении содержания мочевины и креатинина в крови прием должен быть прекращен. С осторожностью назначают пациентам с печеночной недостаточностью, во время больших хирургических операций, в т.ч. с использованием анестетиков и др. средств, снижающих АД.

Произв.: MSD (США)

Коаксил (Coaxil)

Тианептин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тианептина 12,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, анксиолитическое, уменьшение тоски, улучшение настроения, купирование двигательной заторможенности, повышение общего тонуса, нормализация настроения (в том числе при алкогольной абстиненции).

Фармакокин.: Быстро и полностью всасывается, равномерно распределяется. Связь с белками плазмы крови - 94%. Метаболизируется в печени путем бета-окисления и N - деметилирования. $T_{1/2}$ - 2,5 ч, у пожилых и больных с почечной недостаточностью - 3,5 ч. Выводится почками (8% в неизмененном виде).

Клин. фарм.: Занимает промежуточное положение между седативными и стимулирующими антидепрессантами. Антидепрессивное и анксиолитическое действие способствует исчезновению соматических жалоб, обусловленных тревогой и изменениями настроения. Мало влияет на сердечно-сосудистую систему, сон, скорость реакции, парасимпатическую нервную систему, не вызывает пристрастия.

Показ.: Депрессивные состояния невротической и реактивной природы, тревожно-депрессивные состояния с соматическими жалобами (особенно связанные с ЖКТ), алкоголизм (период абстиненции).

Противопоказ.: Возраст (до 15 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сухость во рту, анорексия, гастралгия, тошнота, рвота, запор, метеоризм, головокружение, головная боль, бессонница, сонливость, снижение скорости реакции, кошмары, астения; обморок, тремор, тахикардия, экстрасистолия, стенокардия, чувство жара, затруднение дыхания, спазм гортани, мышечные боли, боли в пояснице.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО (одновременный прием может привести к развитию коллапса, внезапному повышению АД, гипертермии, судорогам и смерти).

Передоз.: Следует промыть желудок и контролировать работу сердца, легких, почек (с соответствующим лечением развивающихся явлений, вплоть до искусственной вентиляции легких и т.д.).

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой - по 1 таблетке 3 раза в день (лицам старше 70 лет и пациентам с почечной недостаточностью - 2 раза).

Предост.: В начале лечения требуется постоянный контроль за больным (возможность суицидальных попыток). При планировании операций под общей анестезией следует за 24-48 ч отменить препарат. Заканчивают лечение постепенным (в течение 7-14 дней) снижением суточной дозы.

Произв.: Servier (Франция)

Когитум (Cogitum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл водного раствора содержит калиевой соли N-ацетиламиносукцината 0,25 г, левулозы 1 г, метил-п-гидроксibenзоата 0,015 г и бананового аромата 0,007 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Общестимулирующее.

Показ.: Функциональные астенические состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, принимают содержимое 2-3 ампул в сутки в неразведенном виде или с небольшим количеством воды. Возможно изменение режима дозирования в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Произв.: Marion Merrell Dow (США)

Коделак® (Codelacum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кодеина 0,008 г, травы термопсиса в порошке 0,02 г, натрия гидрокарбоната 0,2 г, корня солодки в порошке 0,2 г; в контурной ячейковой упаковке по 10 шт.

Фарм. действ.: Противокашлевое, отхаркивающее.

Фармакодин.: Снижает возбудимость кашлевого центра (кодеин), повышает секрецию бронхиальных желез (термопсис) и снижает вязкость мокроты за счет защелачивания (гидрокарбонат натрия); обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием (корень солодки).

Показ.: Кашель различной этиологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 2 лет).

Взаим.: Усиливает (кодеин) эффект анальгетиков, снотворных и седативных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Произв.: Томский химфармзавод (Россия)

Козаар (Cozaar®)

Лозартан*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лозартана калия 50 мг.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антагонист рецепторов ангиотензина II (тип AT1).

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Назначение во II-III триместре беременности может вызвать дефекты развития или смерть плода. При возникновении беременности немедленно прекратить прием. Во время лактации следует отменить препарат или, если это невозможно, прекратить кормление.

Поб. действ.: Головокружение, гипотония (дозозависимая), гиперкалиемия.

Взаим.: Совместим с другими антигипертензивными средствами. Не отмечено клинически значимых проявлений взаимодействия с гидрохлортиазидом, дигоксином, варфарином, циметидином, фенобарбиталом. Увеличивает риск развития чрезмерной гипотензии у пациентов с дегидратацией (при лечении большими дозами диуретиков).

Передоз.: Наиболее вероятные проявления - гипотензия и тахикардия (возможна вагусная брадикардия). Ни козаар, ни его активный метаболит не устраняются гемодиализом.

Примен. и доз.: Внутрь, вне зависимости от приема пищи - по 1 таблетке 1 раз в день. Максимальный гипотензивный эффект достигается через 3-6 нед. В отдельных случаях для достижения большего эффекта дозу увеличивают до 100 мг 1 раз в день. У пациентов с дегидратацией начальная доза может составлять 25 мг 1 раз в день.

Предост.: Концентрация козаара в плазме значительно увеличивается при циррозе печени. Пациентам с заболеваниями печени в анамнезе необходимо назначать меньшие дозы.

Произв.: MSD (США)

Колфарит® (Colfarit®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 500 мг микрокапсулированной ацетилсалициловой кислоты; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное.

Показ.: Тромбофлебиты поверхностных вен, профилактика тромбозов, эмболий, инфаркта миокарда (вторичная).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аспириновая астма, геморрагический диатез, гемофилия, гипопротромбинемия, авитаминоз К, нарушения функции почек, беременность, детский возраст (до 1 года).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, желудочное кровотечение, нарушение функций печени и почек, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов и пероральных гипогликемических средств, НПВС, побочное действие метотрексата, снижает эффективность противоподагрических препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая водой, по 1-2 таблетки в течение 1-3 нед. В острой фазе тромбофлебита - по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Для профилактики - по 1 таблетке 1-3 раза.

Произв.: Bayer (Германия)

Комб-инсулин С (Comb-insulin S)

Инсулин аминохинурид

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 40 ЕД хроматографически чистого свиного инсулина и 0,111 мг депо-среды аминохинурида дигидрохлорида, во флаконах по 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Сахарный диабет I типа. Сахарный диабет II типа при резистентности к пероральным гипогликемизирующим препаратам, интеркуррентных заболеваниях, до и после оперативных вмешательств. Диабетическая кома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипогликемия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется. Следует применять человеческий инсулин.

Поб. действ.: Гипогликемия, гипогликемическая прекома и кома, иммунологические перекрестные реакции с инсулином человека, липодистрофия (при длительном применении), аллергические реакции.

Примен. и доз.: П/к (в исключительных случаях в/м). Место укола меняют при каждой инъекции. При переходе с инсулина-С на комб-инсулин-С суточная доза снижается в 4 раза.

Произв.: Hoechst (Германия)

Комбутек-2 (Combuteum-2)

Сост. и ф.в.: Стерилизованные пластины размером 240x140, 140x120 или 70x60 мм, содержащие коллаген, получаемый из ахилловых сухожилий или обрезков шкур крупного рогатого скота, глутаровый альдегид, хинозол и борную кислоту; в стерильной упаковке.

Фарм. действ.: Ранозаживляющее, дерматопротективное, антисептическое.

Показ.: Ожоги II-III степени, послеожоговые трофические язвы и раны, пролежни, подготовка ран к аутодермопластике и закрытие донорских участков после нее.

Противопоказ.: Обильная экссудация ран, высокая бактериальная обсемененность, наличие некротических участков.

Примен. и доз.: Наружно; пластины накладывают пористой поверхностью на поврежденный участок, предварительно двукратно обработанный антисептическими растворами (края пластины должны на 0,5-1 см перекрывать края раны) и закрепляют 1-2 слоями марли (без ваты). Рану контролируют ежедневно (при скудном отделяемом - 1 раз, при обильном - 2 раза). При ожогах III степени повязку повторяют через 6-8 ч. Промокшие и не прилипшие к ране участки пластины удаляют только на участке промокания и после туалета раны антисептиками заменяют новыми. Прилипшие участки комбутака-2 оставляют на ране до полной эпителизации. Аутодермопластику производят на участках, где под пластиной имеются сочные розовые грануляции, а раны, образовавшиеся после взятия кожного трансплантата, покрывают пластиной комбутака-2, края которой на 0,5-1 см должны перекрывать края раны. Пластины оставляют на донорском участке до самоотторжения при полной эпителизации раны. При посттравматических ранах комбутек-2 применяют после очищения раны от некротизированных тка-

ней при начинающемся росте здоровых грануляций и в период эпителизации небольших ран. При трофических язвах и пролежнях комбукт-2 используют после очищения раневой поверхности от некротических тканей и достижения низкой бактериальной обсемененности.

Произв.: Белкозин (Россия)

Компламин (Complamin)

Ксантинола никотинат*

Сост. и ф.в.: 1 драже ретард содержит ксантинола никотината 500 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 300 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для инфузий - 1500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антиагрегационное, антиатеросклеротическое.

Клин. фарм.: Расширяет периферические сосуды, улучшает микроциркуляцию, оксигенацию и питание тканей, снижает периферическое сопротивление сосудов. Активирует процесс фибринолиза, уменьшает вязкость крови, снижает агрегацию тромбоцитов, усиливает мозговое кровообращение. При длительном применении - антиатеросклеротическое действие.

Показ.: Болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит и атеросклероз сосудов конечностей, болезнь Бюргера, диабетическая ангиопатия, сосудистые тромбозы и эмболии, трофические язвы голени, труднозаживающие раны, пролежни, нарушения мозгового кровообращения, атеросклероз коронарных сосудов, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, внутриутробная и послеродовая асфиксия плода.

Противопоказ.: Кровотечение, острый инфаркт миокарда, выраженная сердечная недостаточность, язвенная болезнь в стадии обострения.

Поб. действ.: Снижение АД, преходящее ощущение тепла, покраснение кожных покровов, слабость, головокружение, тошнота, диарея, анорексия, гастралгия, изменение толерантности к глюкозе, повышение в сыворотке крови уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы, мочевой кислоты.

Примен. и доз.: Внутрь, драже ретард назначают по 0,5-1 г 2-3 раза в день после еды. В/м вводят в дозе 0,3-0,6 г 1-3 раза в сутки. В/в струйно вводят медленно в положении лежа в дозе 0,3-0,8 г 1-3 раза в сутки. В/в капельно - в дозе 0,15-0,9 г препарата, разведенного

в 250-500 мл физиологического раствора со скоростью 30-40 капель в минуту.

Предост.: С осторожностью назначают больным с лабильным АД, при беременности (особенно в I триместре); при одновременном использовании гипотензивных препаратов.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Компливит (Complivitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола ацетата 0,001135 г (3300 МЕ), альфа-токоферола ацетата 0,01 г, тиамин хлорида 0,001 г или тиамина бромид 0,00129 г, рибофлавина мононуклеотида 0,00127 г, пиридоксина гидрохлорида 0,005 г, аскорбиновой кислоты 0,05 г, никотинамида 0,0075 г, фолиевой кислоты 0,0001 г, рутина 0,025 г, кальция пантотената 0,005 г, цианокобаламина 0,0000125 г, липоевой кислоты 0,002 г, железа сернокислого 0,02489 г, сульфата меди 0,002946 г, кальция фосфата 0,217 г, кобальта сернокислого 0,000477 г, марганца сернокислого 0,01096 г, цинка сернокислого 0,008795 г, магния фосфорнокислого двузамещенного 0,1176 г; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ в организме.

Фармакодин.: Оказывает положительное влияние на содержание гемоглобина крови и другие показатели крови, нарушение которых связано с дефицитом минеральных веществ и витаминов, нормализует (при длительном приеме) нарушенный липидный обмен (гиперлипидемию, преимущественно атерогенного типа) и толерантность к углеводам, увеличивает переносимость физических нагрузок (в т.ч. длительных).

Показ.: Гиповитаминоз, гиперлипидемия, снижение толерантности к углеводам, атеросклероз (ранние проявления), перенесенные тяжелые заболевания, ослабленная общая сопротивляемость организма (весенне-зимний период).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1 таблетке 2 раза в день в течение 3-4 нед. Повторный курс проводится через 3-5 мес, при этом доза (в зависимости от достигнутых результатов) может быть снижена до 1 таблетки в сутки, а перерыв увеличен до 8-10 мес.

Произв.: УфаВита (Россия)

Кондилин® (Condyline®)**Подофиллотоксин**

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для наружного применения содержит подофиллотоксина 5 мг; во флаконах по 3,5 мл.

Фарм. действ.: Цитостатическое, некротизирующее (местное).

Фармакокин.: Аппликация 0,01-0,05 мл (0,5% раствора) приводит к появлению незначительных количеств подофиллотоксина в сыворотке через 30-60 мин. При применении 0,1 мл (кондиломы площадью более 4 см.кв.) через 1-2 ч в сыворотке определяется 5 нг/мл, через 4 ч - 3 нг/мл. При применении 0,15 мл через 12 ч в сыворотке определяется менее 1 нг/мл. $T_{1/2}$ - от 1 до 4,5 ч.

Показ.: Наружные остроконечные кондиломы.

Противопоказ.: Детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Местные (в начале лечения) - покраснение, боль, изъязвление эпителиального покрова кондиломы, отек и баланопостит (при больших бородавках в препуциальной области).

Передоз.: При нанесении избыточных количеств их удаляют (мылом с водой). Случайный пероральный прием требует промывания желудка и контроля за периферической картиной крови, состоянием печени, электролитным и газовым балансом.

Примен. и доз.: Наружно. Пластиковый аппликатор смачивают в препарате так, чтобы отверстие петли заполнилось жидкостью. С помощью петли раствор наносят на кондилому, процедуру повторяют, смачивая все остальные кондиломы, но не более 50 раз. Наносят 2 раза в день в течение 3 дней, далее делается 4-дневный перерыв. Курс - не более 5 нед.

Предост.: Следует использовать совершенно сухой аппликатор. Необходимо избегать попадания препарата на здоровую кожу и слизистые, окружающие кондилому, особенно в области крайней плоти. Рекомендуются использовать для защиты кожи и слизистой вокруг кондиломы защитные мази, нейтральные кремы, вазелин, цинковую мазь, которые наносят перед аппликацией. Применение на больших площадях может привести к реакциям, связанным с резорбтивным действием.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Консупрен (Consupren)**Циклоспорин***

Сост. и ф.в.: 1 мл концентрата для приготовления раствора для приема внутрь содержит циклоспорина 100 мг; во флаконах по 50 мл с дозирующей мензуркой.

Фарм. действ.: Иммунодепрессивное, торможение реакций клеточного и гуморального иммунитета, зависящих от Т-лимфоцитов.

Фармакокин.: После приема внутрь C_{max} в крови достигается через 1-4 ч. Биодоступность - 30%. Распределяется, главным образом, вне сосудистого русла, проникает в грудное молоко. 90% препарата связывается с липопротеинами и протеинами плазмы. Метаболизируется в печени и внепеченочными ферментными системами (окисление монооксигеназами, конъюгации с глюкуроновой и серной кислотами). Выводится из организма в основном с желчью.

Фармакодин.: Избирательно действует на Т-лимфоциты; предупреждает активирование лимфоцитов, ингибируя выделение лимфокинов.

Показ.: Длительное иммуносупрессивное лечение после трансплантации почек; ревматоидный артрит (с высокой степенью активности, резистентны к средствам базисной терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые инфекционные заболевания, злокачественные новообразования; для случаев, не связанных с трансплантацией почек, - нарушения функции почек и неконтролируемая артериальная гипертензия.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности используется только по строгим показаниям. Противопоказан в период лактации.

Поб. действ.: Ощущение тяжести в эпигастрии, потеря аппетита, тошнота, нарушение функции печени, почек, повышение АД, отек десен, чрезмерное оволосение, гиперкалиемия, гиперурикемия.

Взаим.: Усиливает действие хинидина, теофиллина, вальпроата натрия (и их производных), ослабляет - примидона. Аминогликозиды, амфотерицин В, триметоприм, ко-тримоксазол, ципрофлоксацин, некоторые цефалоспорины, мелфалан, НПВС повышают нефротоксичность. Фенитоин, карбамазепин, барбитураты, производные бензодиазепина, фенотиазина и бутирофенона, аминоглутетимид, эстрогено-гестагенные пре-

параты, прогестерон, рифампицин, изониазид, метамизол натрий - понижают, оральные контрацептивы, флуконазол, производные имидазола, глюкокортикоиды, макролиды, верапамил, никардипин - повышают концентрацию циклоспорина в крови.

Примен. и доз.: Внутрь, количество препарата, отмеренное мензуркой, добавляют в воду, фруктовый сок (кроме сока цитрусовых) или молоко в соотношении 1:20. Ввиду индивидуальных различий абсорбции препарата из ЖКТ рекомендуются только начальные дозы. Создаваемые концентрации должны колебаться в терапевтическом диапазоне. Трансплантация почек - начальная доза - 5-6 мг/кг в сутки в 2 приема (через 12 ч). Первый прием - за 4 ч до операции, второй - после восстановления перистальтики после операции. Мониторинг уровня циклоспорина в крови является обязательным. Его определяют 2 раза в неделю (первые 2 нед после трансплантации почек), затем 1 раз в неделю (третья-шестая неделя), позже - 1 раз в 2-3 мес (забор крови следует проводить через 2-4 часа после приема консупрена). При монотерапии или в комбинации с преднизолоном уровень концентрации колеблется от 500 до 800 нг/мл, при тройной комбинации (с добавлением азатиоприна) - от 300 до 600 нг/мл. Ревматоидный артрит - начальная доза 3,5 мг/кг/сутки в 2 приема (через 12 ч), затем поддерживать уровень циклоспорина в крови в пределах 250-800 нг/мл (поддерживающая доза - не более 5 мг/кг/сутки).

Предост.: Необходимо контролировать функции почек и печени (концентрация креатинина в сыворотке не должна превышать 30% от первоначальной). Не рекомендуется сочетать с препаратами типа левастатина, мелфалана, вводить пациенту живые вакцины против паротита, кори, краснухи, полиомиелита. Для разбавления препарата не допускается применение пластмассовой посуды. Используют только сухие мензурки (мытьё водой, спиртом и другими жидкостями исключается).

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Контемнол (Contemamol®)

Лития карбонат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка пролонгированного действия содержит лития карбоната 500 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антипсихотическое, седативное.

Фармакокин.: Хорошо всасывается в ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме через 9 ч. Выводится почками.

Клин. фарм.: Профилактическая активность проявляется в продолжении 6 мес при поддержании концентрации лития в плазме в пределах 0,6-1 ммоль/л. В начале лечения может быть депрессивное или маниакальное состояние.

Показ.: Профилактика маниакальной фазы маниакально-депрессивного психоза и циклических проявлений агрессивности у психопатов, квартальные запои, некоторые виды лекарственной зависимости, сексуальные отклонения, мигрень, синдром Меньера.

Противопоказ.: Тяжелые заболевания почек и сердечно-сосудистой системы; нарушения водно-электролитного баланса (одновременное лечение диуретиками, бессолевая диета, дефицит натрия, поносы, рвота).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Сухость во рту, диспептические расстройства, тремор, сонливость, уменьшение концентрационной способности почек, полиурия, нарушения сердечного ритма, кроветворения и функций щитовидной железы, пиодермия, алоpecia.

Взаим.: При сочетании с нейролептиками и тимолептиками возможно увеличение массы тела. Одновременное употребление диуретиков приводит к гипонатриемии. Индометацин, ибупрофен и диклофенак замедляют экскрецию лития. Противовоспалительные и слабительные средства увеличивают потерю жидкостей и снижают переносимость лития. Несовместим с алкоголем.

Передоз.: Характеризуется затруднением артикуляции, гиперрефлексией, эпилептическими судорогами, синкопированным дыханием, олигурией, коллапсом, комой.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, не раскусывая, запивая водой или молоком, как правило, 1 г в день однократно (лучше утром) или 1-2 г в день с разделением на две дозы (утром и вечером). Значения уровня лития в крови следует поддерживать в пределах 0,6-1 ммоль/л (у детей - 0,5-1 ммоль/л). При дозах 1 г в день можно ожидать стабилизацию уровня после 10-14 дней приема.

Предост.: Необходимо регулярно контролировать уровень лития в крови (не менее 1 раза в месяц). Кроме того, следует немедленно определять литий при

проявлениях интоксикации, рецидиве заболевания, изменениях солевого обмена.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Координакс® (Coordinax®)

Цизаприд*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит цизаприда 5 или 10 мг; в упаковке 30 и 100 или 20 и 50 шт. соответственно.

1 мл суспензий для приема внутрь - 1 мг; во флаконах по 100 и 200 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция тонуса и моторики ЖКТ.

Показ.: Парез желудка спонтанный или обусловленный диабетической нейропатией, психогенной анорексией, ваготомией, частичной гастроэктомией; диспептические явления, желудочно-пищеводный рефлюкс, рефлюкс-эзофагит, синдром срыгивания у новорожденных; дисфункциональная псевдонепроходимость кишечника; хронический идиопатический запор.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, грудной возраст (недоношенные, дети до 3 мес).

Бер. и корм. гр.: При беременности применение возможно в тех случаях, когда предполагаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск для плода. Не рекомендуется применение в III триместре беременности и в период лактации.

Поб. действ.: Кратковременные абдоминальные спазмы, диспептические расстройства, головная боль, головокружение, учащенное мочеиспускание, гинекомастия и галакторея (обратимые), экстрапирамидные расстройства, нарушения функции печени.

Взаим.: Несовместим с кетоконазолом, итраконазолом, миконазолом, флуконазолом, эритромицином, тролеандомицином, кларитромицином, йозамицином. Усиливает эффекты бензодиазепинов, антикоагулянтов, H₂-гистаминоблокаторов, парацетамола, алкоголя. Уменьшает всасывание лекарственных веществ в ЖКТ (ускорение моторики).

Передоз.: Симптомы: абдоминальные спазмы, учащение дефекации, у детей младше 1 года признаки угнетения ЦНС. Лечение: активированный уголь перорально.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 15-40 мг в сутки в 2-4 приема; детям с массой тела до 25 кг - в виде суспензии по 0,2 мг/кг массы тела 3-4 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушениях сердечного ритма (удлинение интервала QT на ЭКГ) и электролитного баланса (магниевого и калиевого). Для больных с почечной и печеночной недостаточностью рекомендуется уменьшить дозу в два раза.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Копаксон-Тева, Кополимер-1 (Copaxone-Teva, Copolymer-1)

Глатирамер ацетат

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит кополимера-1 20 мг, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) в ампулах по 1 мл; в упаковке 28 комплектов.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее.

Фармакодин.: Конкурирует с белком миелином, а также олигодендроцитарным гликопротеином миелина и протеолипидным белком за связывание с молекулами главного комплекса тканевой совместимости класса 2 на поверхности клеток, несущих антигены.

Показ.: Рассеянный склероз ремиттирующего течения (для уменьшения частоты обострений и замедления развития инвалидизирующих осложнений).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к манниту).

Поб. действ.: Покраснение, отек, зуд, проявления вазодилатации, тяжесть в груди, сердцебиение, беспокойство, одышка, тошнота, болезненность в месте введения (симптомы проходят в течение 30 мин).

Примен. и доз.: П/к, 20 мг 1 раз в день (предпочтительно в одно и то же время суток). Лиофилизированный порошок во флаконе разводят медленным добавлением через прокол в резиновой пробке 1 мл воды для инъекций из прилагаемой ампулы с последующим осторожным поворачиванием флакона до полного растворения твердых частиц без удаления иглы (полученный раствор предназначен только для одной инъекции). После приготовления раствор вводят п/к, используя новую иглу. Лечение длительное.

Произв.: Teva (Израиль)

Копривит (Coprivit®)

Сост. и ф.в.: Биологически активная пищевая добавка. 1 капсула содержит масла семян крапивы 60 мг, масла семян тыквы 50 мг и концентрата натуральных токоферолов из масла проросшей пшеницы 24 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Общетонизирующее.

Клиң. фарм.: Активные вещества семян тыквы укрепляют мускулатуру мочевого пузыря и снижают тонус сфинктера мочевого пузыря. Слизистые вещества увеличивают скольжение внутренних стенок мочевых и семенных протоков. Масло семян крапивы, содержащее фитостеролы, способствует образованию половых гормонов, обладает общетонизирующим действием на организм. Натуральные токоферолы оказывают стимулирующий эффект при нарушениях эрекции и слабой потенции.

Показ.: Нарушение мочеиспускания (затрудненное, неполное, частое) и половой функции (слабая потенция, нарушение эрекции) вследствие аденомы и воспалительных заболеваний предстательной железы, после операций на предстательной железе и др.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 2 капсулы 3 раза в день в течение 3-4 недель, затем - по 2 капсулы в день в течение 2 недель, далее по 1 капсуле в день.

Произв.: Diet Pharma (Германия)

Корандил (Corandil™)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит эналаприла малеата 10 и 20 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибирование АПФ.

Показ.: Эссенциальная артериальная (все степени) и реноваскулярная гипертония, сердечная недостаточность застойного типа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек от ингибиторов АПФ в анамнезе, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, утомляемость, диарея, тошнота, нарушения вкуса, сыпь, кашель, ангионевротический отек, лейкопения, протеинурия; артериальная гипотензия, как правило, развивается у больных со сниженным ОЦК на фоне терапии диуретиками или диализа. На начальных стадиях лечения риск развития побоч-

ных эффектов снижается, если начинать лечение с минимальных доз и назначать препарат перед сном.

Примен. и доз.: Внутрь, дозу подбирают индивидуально; при гипертонии - по 10-20 мг 1 раз в день; при тяжелых формах - до 40 мг/сутки; дозу можно делить на 2 приема (при отсутствии достаточного контроля за больными); больным с почечной недостаточностью и на фоне диуретиков - в начальной дозе по 2,5 мг в день (за 2-3 дня до начала лечения диуретики по возможности отменяют). При сердечной недостаточности (в качестве дополнения к основной терапии) - в начальной дозе по 2,5 мг в день (рекомендуется лечение под наблюдением врача и под контролем АД).

Предост.: Следует с чрезвычайной осторожностью назначать препарат при нарушении функции почек, при заболеваниях почечных сосудов (или подозрении на них), коллагенозах (системная красная волчанка, склеродермия). Рекомендуется регулярный контроль наличия белка в моче, уровня лейкоцитов.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Корапейс (Korapeis)

Дизопирамид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит дизопирамида (в виде фосфата) 150 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, мембраностабилизирующее, блокада натриевых каналов.

Показ.: Желудочковые тахикардии, профилактика желудочковых экстрасистол, наджелудочковые экстрасистолы, трепетание предсердий, пароксизмальная предсердная и желудочковая тахикардия, профилактика аритмий при диагностических исследованиях, аритмии при WPW-синдроме, аритмии на фоне сердечных гликозидов, поддержание желудочкового ритма после электроимпульсной терапии.

Противопоказ.: Выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, АВ-блокада II-III степени.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, рвота, запоры, нарушения мочеиспускания и аккомодации, ощущение усталости, экзема.

Примен. и доз.: Внутрь, в начальной дозе - 200-300 мг в сутки, средняя поддерживающая доза - 400-600 мг в сутки (по 1 капсуле каждые 6-8 ч), максимальная суточная доза - 800-1200 мг.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Корвалдин® (Corvaldinum®)

Сост. и ф.в.: 100 мл жидкости содержат этилового эфира альфа-бромизовалериановой кислоты 2,0 г, фенобарбитала 1,8 г, масла мятного 0,14 г, масла хмеля 0,02 г, спирта ректифицированного 62 мл, воды очищенной до 100 мл; во флаконах-капельницах оранжевого стекла по 25 мл.

Фарм. действ.: Седативное, спазмолитическое.

Показ.: Стенокардические и псевдостенокардические состояния, тахикардия, неврозы с повышенной раздражительностью, бессонница, вазомоторные расстройства, спазмы кишечника.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Редко - сонливость.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, 15-30 капель с водой 3 раза в день. В случае необходимости дозу увеличивают до 40-50 капель.

Произв.: Фармак (Украина)

Корвалол® (Corvalolum®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат этилового эфира альфа-бромизовалериановой кислоты 2,0 г, фенобарбитала 1,826 г, масла мятного 0,14 г, натра едкого 0,315 г, водно-спиртовой смеси (спирта 58 мл, воды очищенной 42 мл) до 100 мл; во флаконах-капельницах оранжевого стекла по 25 мл.

Фарм. действ.: Седативное, спазмолитическое.

Показ.: Стенокардия, тахикардия, неврозы с повышенной раздражительностью, бессонница, ранние стадии гипертонической болезни, спазмы кишечника.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Редко - головокружение, сонливость.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, 15-30 капель с водой 3 раза в день. В случае необходимости дозу увеличивают до 40-50 капель.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Фармак (Украина)

Корватон (Corvaton®)

Молсидомин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка форте содержит молсидомин 4 мг.

1 таблетка ретард - 8 мг; в упаковке по 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, венодилатирующее, антиагрегационное.

Показ.: Стабильная и нестабильная стенокардия, в том числе при наличии левожелудочковой недостаточности, стенокардия в острой фазе инфаркта миокарда после стабилизации кровообращения, стенокардия при неэффективности, непереносимости других препаратов и в пожилом возрасте.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая недостаточность кровообращения (шок, периферический сосудистый коллапс, сниженное центральное венозное давление, тяжелая гипотония - систолическое давление ниже 100 мм рт.ст.), острый приступ стенокардии.

Бер. и корм. гр.: Противопоказан в I триместре беременности.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, артериальная гипотония, коллапс, шок, тошнота, заторможенность, аллергические реакции.

Взаим.: Вазодилататоры, блокаторы медленных кальциевых каналов и алкоголь усиливают гипотензивный, аспирин - антиагрегантный эффекты.

Примен. и доз.: Корватон форте: по 1 таблетке 2-4 раза в сутки; может быть показана более низкая дозировка (в зависимости от индивидуальной реакции или степени тяжести состояния). Корватон ретард: 1-2 таблетки 1-2 раза в сутки; в отдельных случаях может потребоваться дозировка, составляющая 1 таблетку 3 раза в сутки. Эффект препарата не зависит от приема пищи.

Предост.: При остром инфаркте не следует назначать без постоянного мониторингового контроля параметров кровообращения. Может нарушать способность вождения автомобиля, управления механизмами безопасного перехода улицы.

Произв.: Hoechst (Германия)

Корвитол® (Corvitol®)

Метопролол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метопролола тартрата 50 или 100 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое (селективная блокада бета₁-адренорецепторов).

Фармакокин.: Резорбируется более 95%. Связывается с белками до 20%, подвергается пресистемному метаболизму в печени, биодоступность - 50%. Экскретируется почками в виде неактивных метаболитов. Экскреция в активном виде не превышает 3%. T_{1/2} - 3-4 ч.

Фармакодин.: Обладает отрицательными дромо-, хроно-, батмо- и инотропными эффектами, уменьшает потребность

миокарда в кислороде, понижает активность ренина плазмы. Липофильность и низкая степень связывания с белками обеспечивают метопрололу значительное распределение в организме и пенетрацию в ЦНС.

Клин. фарм.: Беременность может увеличивать клиренс препарата. Слабо проникает в грудное молоко. Почечная недостаточность не приводит к накоплению метопролола. При циррозах значительно повышается биодоступность (до 84%), увеличивается $T_{1/2}$ (до 7-12 ч) и снижается клиренс препарата.

Показ.: Артериальная гипертензия I и II степени (в качестве монотерапии), стенокардия напряжения (лечение и профилактика), острый инфаркт миокарда и постинфарктный период (лечение), мигрень (профилактика), тахикардия, идиопатическая дилатационная кардиомиопатия.

Противопоказ.: Синдром синусового узла, предрасположенность к бронхоспазмам (бронхиальная астма, бронхиальная гиперреакция), лабильная форма сахарного диабета.

Поб. действ.: В начале лечения возможны незначительная слабость, головокружение, головная боль. Со стороны сердечно-сосудистой системы: выраженная брадикардия, гипотония, АВ-блокада, сердечная недостаточность. Со стороны ЦНС (редко): депрессия, сонливость, расстройства зрения.

Взаим.: Совместное применение с нитроглицерином или антагонистами кальция типа нифедипина может привести к резкой гипотонии. Усиливает эффект инсулина и пероральных гипогликемических препаратов (могут быть замаскированы или ослаблены симптомы гипогликемии и тахикардии). При совместном приеме с алкоголем возможно взаимное усиление угнетающего действия.

Примен. и доз.: Внутрь, суточная доза - 100-200 мг, принимать 1 или 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 400 мг. При недостаточной эффективности монотерапии можно комбинировать с др. классами антигипертензивных, антиангинальных или антиаритмических препаратов.

Предост.: С осторожностью (в меньших начальных дозах) назначают больным с нарушениями периферического кровообращения (болезнь Рейно, облитерирующие заболевания периферических сосудов), на фоне общей анестезии (возможно суммирование действия метопролола

и наркотических средств, направленного на ослабление сердечной мышцы.

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Коргард (Corgard®)

Надолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит надолла 40 или 80 мг; в упаковке 14 и 28 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, противоаритмическое, неселективная блокада бета-адренорецепторов.

Фармакодин.: Обеспечивает защиту от избыточной симпатической активности, снижает потребность миокарда в кислороде при любом уровне нагрузок. Профилактическое действие при мигрени, вероятно, обусловлено предотвращением вазоконстрикции в системе внутренней сонной артерии и избыточной адренергической вазодилатации в системе наружной сонной артерии.

Клин. фарм.: Уменьшает число и тяжесть приступов стенокардии, блокируя эффект катехоламиновой стимуляции. Снижает летальность за счет профилактики повторных инфарктов и эпизодов внезапной смерти у больных, переживших первый инфаркт миокарда.

Показ.: Стенокардия, гипертензия, аритмия, мигрень (профилактика), тиреотоксикоз (снятие симптомов гипертиреозидизма и подготовка к хирургической операции).

Противопоказ.: Бронхиальная астма, синусовая брадикардия, АВ-блокада II-III степени, кардиогенный шок, застойная сердечная недостаточность.

Поб. действ.: Брадикардия, гипотензия, парестезии, сухость во рту, нарушения со стороны ЖКТ, бессонница.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 раз в день. Стенокардия, аритмия, мигрень - от 40 до 160 мг в день. Тиреотоксикоз - 160 мг в день. Гипертензия - от 80 до 240 мг в день.

Предост.: С осторожностью применять у больных с псориазом.

Прозв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Кордарон (Cordaron®)

Амиодарон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 3 мл раствора для инъекций содержит амиодарона гидрохлорида 150 мг.

1 делимая таблетка - 200 мг.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, антиангинальное, альфа- и бета-адрено-блокирующее.

Фармакокин.: Пероральная биодоступность - 30-80%, после одноразового приема максимальные концентрации в плазме достигаются через 3-7 ч. Период полувыведения - 20-100 дней. В первые дни лечения кумулирует почти во всех тканях (особенно в жировых), элиминация начинается через несколько дней, устойчивые концентрации в плазме создаются в течение одного - нескольких месяцев. Выводится с калом через печеночный круг и с мочой. После отмены препарата выведение продолжается в течение нескольких месяцев.

Фармакодин.: Удлиняет третью фазу потенциала действия миокарда, снижает калиевые токи, уменьшает синусовый автоматизм, замедляет АВ- и предсердную проводимость, увеличивает рефрактерный период, уменьшает возбудимость миокарда, не изменяет внутрижелудочковую проводимость, не обладает отрицательным инотропным эффектом. Снижает периферическое сопротивление, понижает потребность миокарда в кислороде, увеличивает коронарный выброс, снижает давление в аорте.

Показ.: Тяжелые аритмии при неэффективности или невозможности другой терапии: предсердная и желудочковая экстрасистолия, синдром WPW, нарушения предсердного ритма (трепетание и мерцание), желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочка; аритмии на фоне коронарной или сердечной недостаточности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к йоду), синусовая брадикардия, АВ-блокада, синдром синусовой недостаточности, выраженные нарушения проводимости, дисфункция щитовидной железы.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Фотосенсибилизация, микроотслоения сетчатки, неврит зрительного нерва, гипер- (требуется отмена препарата) или гипотиреозидизм, фиброз легких, пневмонит, плеврит, бронхолит, пневмония, периферические невропатии и/или миопатии, экстрапирамидный тремор, атаксия; внутричерепная гипертензия, кошмарные сновидения; брадикардия, синусовая остановка сердца, нарушение проводимости, тошнота, рвота, алоpecia, нарушения функции печени, эпидидимит, анемия, аллергические реакции. Противопоказано совместное использование с препаратами, вызывающими пароксизмальную желу-

дочковую тахикардию (такие как бепридил, препараты типа хинидина, соталол, винкамин, султоприд, эритромицин (в/в), пентамидин (парентерально).

Взаим.: Не рекомендуется сочетать с бета-блокаторами, верапамилом, дилтиаземом, стимулирующими слабительными. С осторожностью комбинировать с препаратами, вызывающими гипокалиемию (диуретики, кортикостероиды, амфотерицин В для в/в введения). Усиливает эффект пероральных антикоагулянтов. Отмечается синергизм действия с препаратами наперстянки.

Примен. и доз.: В/в, ударная доза - 5 мг/кг в 5% дистиллированном водном растворе в течение минимум 15 мин 2-3 раза в день; поддерживающая терапия - 10-20 мг/кг/день в 250 мл 5% дистиллированного водного раствора. Внутрь, от 100 до 400 мг/сутки (до 600 мг/сутки) в течение 8-10 дней; рекомендуется перерыв - 2 дня в неделю. Под контролем ЭКГ, на короткий период - от 4 до 5 таблеток в день.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Кордафлекс (Cordaflex®)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит нифедипина 10 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, вазодилатирующее, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, нестабильность гемодинамики первые 8 дней после инфаркта миокарда, беременность (первый триместр).

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, гиперемия, тахикардия, сердцебиение, гипотония, отек лодыжек, понос, тремор, парестезии, гинекомастия, гипергликемия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10-20 мг 3-4 раза в день.

Произв.: Egis (Венгрия)

Кордипин (Cordipin®)**Нифедипин*****Кордипин-ретард (Cordipin®-retard)****Нифедипин*****Кордипин XL (Cordipin® XL)****Нифедипин****Общее описание*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит нифедипина 10 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка ретард - 20 мг; в упаковке 30 шт.

1 таблетка ультраретард - 40 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, сосудорасширяющее; уменьшение постнагрузки и потребности миокарда в кислороде; блокада "медленных" кальциевых каналов.

Фармакокин.: Из таблеток по 10 мг высвобождается быстро, начало всасывания - через 5-10 мин, наибольшая концентрация достигается в течение 30-60 мин; из таблеток ретард - высвобождается очень медленно и достигает наибольшей концентрации через несколько часов, действие длится от 10 до 12 ч; из таблеток ультраретард - высвобождается еще более медленно, действие длится в течение 24 ч.

Фармакодин.: Тормозит поступление кальция в клетки миокарда, гладкой мускулатуры коронарных артерий и периферических сосудов, оказывает коронародилатирующее действие, улучшает постстенотическую циркуляцию; снижает работу сердца.

Показ.: Гипертонический криз; все формы артериальной гипертонии и стенокардии (особенно вазоспастической и хронической).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, выраженный стеноз аорты, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, покраснение лица, отеки лодыжек; редко - ортостатическая гипотензия, головокружение, слабость, чувство усталости, тахикардия, гиперплазия десен, изжога, сыпь на коже; тромбоцитопения, увеличение времени кровотечения.

Взаим.: Совместим с гипотензивными препаратами, бета-блокаторами, диуретиками, нитроглицерином и изосорби-

дом динитратом. Повышает концентрацию в сыворотке дигоксина, карбамазепина, фенитоина, теофиллина. Циметидин увеличивает уровень в крови.

Передоз.: Симптомы: гипотензия, шок, брадикардия, сердечная недостаточность, судороги, метаболический ацидоз. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия (добавление жидкости, норадреналина, хлорида кальция).

Примен. и доз.: Внутрь, при гипертоническом кризе - разжевать 1 таблетку (10 мг) и подержать ее во рту, прием повторить через 1 ч. Лечение гипертонии и стенокардии - по 1 таблетке ретард (20 мг) 2 раза в день - до 2 таблеток 2 раза в день (при стенокардии Prinzmetal - до 80-120 мг в день); или по 1-2 таблетки ультраретард (40-80 мг) 1 раз в день.

Предост.: С осторожностью (под наблюдением врача) применяют при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, нестабильной стенокардии, сахарном диабете, печеночной недостаточности, легочной гипертонии, в пожилом возрасте, а также в постинфарктном периоде (короткодействующие таблетки). При одновременном применении бета-блокаторов в начале лечения возможно появление гипотензии и застойной сердечной недостаточности. У пациентов с острой коронарной недостаточностью (из-за рефлексной тахикардии) может ухудшиться течение ишемической болезни и участиться приступы стенокардии.

Произв.: KRKA (Словения)

Корнам (Kornam®)**Теразозин***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит теразозина в форме моногидрохлорида дигидрата 2 или 5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, альфа₁-адренолитическое.

Фармакокин.: Быстро и полно всасывается в ЖКТ при приеме внутрь. Максимальная концентрация в плазме достигается через 1 ч. Метаболизируется в печени; большая часть выводится с желчью. Период полужизни - 12 ч.

Фармакодин.: Максимальный антигипертензивный эффект проявляется через 3 ч и сохраняется 24 ч. Мочеиспускание улучшается через 2-4 нед терапии. Препарат улучшает липидный профиль плазмы, снижает гипертрофию левого желудочка.

Клин. фарм.: У пациентов с нормальным давлением не вызывает клинически значимого снижения АД.

Показ.: Доброкачественная гипертрофия предстательной железы, затруднение мочеиспускания, артериальная гипертензия (слабая и умеренная степень), сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первый триместр беременности.

Поб. действ.: Ортостатическая гипотония, синкопе, астения, сонливость, заложенность носа, периферические отеки, тошнота, сердцебиение, нарушение зрения (редко).

Взаим.: Антигипертензивные препараты потенцируют эффект.

Передоз.: Симптомы: гипотония. Лечение: принять лежащее положение головой вниз; симптоматическое лечение; диализ не эффективен.

Примен. и доз.: Внутрь. Гипертензия - начинают с 1 мг, в лежащем положении, постепенно увеличивают дозу до стабилизации АД; обычно - 1-10 мг однократно (до 20 мг в сутки). Доброкачественная гипертрофия предстательной железы - начинают с 1 мг в сутки перед сном, увеличивая до 2-10 мг; рекомендуемая доза - 10 мг в сутки в течение 4-6 нед.

Предост.: Следует начинать терапию только в лежащем положении с наименьших доз и под контролем врача. Не рекомендуется деятельность, требующая концентрации внимания (вождение автомобиля и т.п.) в течение 12 ч после первого введения, после увеличения дозы или перерыва в лечении.

Произв.: Lek (Словения)

Кортиазем (Cortiazem®)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит дилтиазема гидрохлорида 90 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, антагонизм с кальцием.

Показ.: Стенокардия, наджелудочковые аритмии, артериальная гипертония.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная брадикардия, синдром слабости синусового узла, кардиогенный шок, АВ-блокада II-III степени, гипотония, сердечная недостаточность, острая и хроническая (IIБ-III степени), выраженные нарушения функции печени и почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, утомляемость, покраснение лица, диспептические расстройства, нарушение сна, нервозность, отеки ног,

брадикардия, АВ-блокада, гипотония, сердечная недостаточность, гиперплазия десен.

Примен. и доз.: Внутрь, по 90-180 мг 2 раза в сутки; максимальная суточная доза - 360 мг.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Космеген (Cosmegen®)

Дактиномицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит дактиномицина 0,5 мг и маннитола 20,0 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Опухоль Вильмса, карцинома яичек и матки, саркома Юинга, рабдомиосаркома, гроздевидная саркома.

Противопоказ.: Ветряная оспа, опоясывающий лишай, детский возраст (до 1 года), беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, вялость, слабость, лихорадка, мышечные боли, диспептические явления, желудочно-кишечные язвы, токсический гепатит, асцит, нарушения кроветворения (апластическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения и др.), гипокальциемия, алоpecia, поражения кожи, тяжелое повреждение (разъедание) мягких тканей (при излиянии препарата при в/в введении).

Взаим.: Несовместим с препаратами, угнетающими костный мозг.

Примен. и доз.: В/в, по 500 мкг (0,5 мг) в дспь (детям - 15 мкг/кг) в течение 5 дней; повторный курс - не ранее, чем через 3 нед (при условии исчезновения всех признаков токсических эффектов).

Предост.: Необходимо ежедневное определение уровней тромбоцитов и лейкоцитов.

Произв.: MSD (США)

Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)

Кофеин

Сост. и ф.в.: Раствор для инъекций 10% и 20%; в ампулах по 1 и 2 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция дыхательного и сосудодвигательного центров, психостимулирующее.

Показ.: Угнетение функций ЦНС, сердечно-сосудистая недостаточность, отравления наркотическими средствами.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия, атеросклероз, органические за-

болевания сердечно-сосудистой системы, глаукома, старческий возраст.

Поб. действ.: Нарушения сна.

Примен. и доз.: П/к. Взрослым - по 1 мл 10 или 20% раствора 2-3 раза в день, детям (в зависимости от возраста) - по 0,25-1 мл 10% раствора 2-3 раза в день. Высшая разовая доза взрослым - 0,4 г, суточная - 1 г.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)

Кофеин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для детей содержит кофеин-бензоата натрия 0,075 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Психостимулирующее, кардиотоническое.

Показ.: Угнетение функций центральной нервной системы, сердечно-сосудистая недостаточность, спазм сосудов головного мозга, повышение психической и физической работоспособности, энурез у детей, отравления наркотическими средствами.

Противопоказ.: Гипертония, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, бессонница, повышенная возбудимость, глаукома.

Поб. действ.: Синдром отмены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,025-0,1 г 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Кошачий Коготь (Cat's Claw®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 20 мг экстракта порошка натуральной коры перуанской тропической лианы Ункария Томентоза; во флаконах 100 шт.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее, тонизирующее, противовирусное, противовоспалительное, улучшение обменных процессов.

Фармакодин.: Стимулирует иммунную систему (неспецифически), снижает уровень эстрагенов (в условиях повышенной эстрагенной активности), обладает противовоспалительными и антитоксическими свойствами. Политропность действия объясняется наличием в экстракте многочисленных биологически активных веществ (алкалоидов, стероидов, гликозидов, полисахаридов, органических кислот, флаваноидов, дубильных веществ, тритерпена, катехина).

Показ.: Новообразования, артриты, артрозы, вирусные инфекции, диабет, бронхиальная астма, хронический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, пиелонефрит, цистит, простатит, импотенция.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Не выявлены.

Передоз.: Не описана.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды, по 1 капсуле 3 раза в день. Высшие дозы: разовая - 2 капсулы (40 мг), суточная - 6 капсул (120 мг).

Произв.: Quimica (Перу)

Коэнзим композитум (Coenzyme compositum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл (2,2 г) раствора для инъекций содержит Coenzymum A D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Acidum cis-aconiticum D8, Acidum citricum D8, Acidum fumaricum D8, Acidum alpha-ketoglutaricum D8, Acidum DL-malicum D8, Acidum succinicum D8, Barium oxalsuccinicum D10, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Cysteinum D6, Pulsatilla pratensis D6, Hepar sulfuris D10, Sulfur D10, Adenosinum triphosphoricum D10, Nadidum D8, Manganum phosphoricum D6, Magnesium oroticum D6, Cerium oxalicum D8, Acidum alpha-liponicum D6 и Beta vulgaris conditiva D4 по 22 мкл; в упаковке 5 или 100 шт.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное, метаболическое, антиоксидантное.

Фармакодин.: Участвует в обмене веществ в качестве коэнзима. Активизирует и регулирует тканевое дыхание и окислительно-восстановительные процессы в организме (цикл Кребса).

Показ.: Интоксикации и др. состояния, сопровождающиеся нарушением окислительно-восстановительных процессов в организме; атеросклеротические изменения центрального и периферического кровообращения и нарушение трофики тканей; эндокринные расстройства, гиповитаминозы, физическое и психическое истощение. Состояния реконвалесценции после тяжелых инфекций, сопровождающихся выраженным лихорадочным периодом, преждевременное старение. Хронические вяло текущие заболевания суставов и позвоночника, органов дыхания, мочеполовой системы, ЖКТ.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/к, по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Произв.: Heel (Германия)

Кралонин (Cralonin®)

Сост. и ф.в.: 100 мл 45% спиртового раствора содержат Crataegus 70 мл, Spigelia anthelmia D2, Kalium carbonicum D3 по 1 мл; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, обезболивающее, седативное, антипсихотическое, спазмолитическое, эстрагеноподобное.

Фармакодин.: Способствует снабжению мышцы сердца кровью и кислородом, регулирует кровяное давление.

Показ.: Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь, инфекционно-токсические миокардиты, стенокардия, гипертоническая болезнь, пред- и постинфарктные состояния), "сенильное сердце", функциональные расстройства сердечной деятельности (вегето-сосудистые дистонии, остеохондроз позвоночника, физическое и психическое перенапряжение).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, обычно по 10 капель 3 раза в день, при острых состояниях - по 10 капель каждые 15 мин (но не более 2 ч).

Предост.: Длительный прием (несколько месяцев) должен осуществляться под контролем врача.

Произв.: Heel (Германия)

Креданил (Credanil™)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит леводопы 250 мг и карбидопы 25 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, дофаминергическое, ингибирование ДОФА-декарбоксилазы.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм (ригидность мышц, брадикинезия, тремор, дисфагия и др.).

Противопоказ.: Закротоугольная глаукома, злокачественная меланома (в т.ч. в анамнезе и при подозрении на нее).

Поб. действ.: Неестественные и непроизвольные движения лица, языка, губ, челюсти, конечностей, тела; генерализованные, хорееподобные и дистонические двигательные расстройства (при длительном применении), мышечные подергивания, блефароспазм (при передозировке), аритмия, гипотензия, брадикар-

дия, анорексия, рвота, головокружение, сонливость, вялость, депрессия или возбуждение, бессонница, тревога, эйфория и др. психические расстройства, нарушения функции печени, почек; обесцвечивание мочи и др. биологических жидкостей; аутоиммунная гемолитическая анемия.

Примен. и доз.: Внутрь, дозу подбирают индивидуально (особенно престарелым и при комбинации с др. препаратами). Креданил 250/25 назначают больным, требующим для лечения более 1,5 г леводопы в день - по 1 таблетке 3-4 раза в день; суточную дозу постепенно увеличивают каждые 1-2 дня (с учетом переносимости препарата и необходимости для оптимального эффекта).

Предост.: С осторожностью следует назначать при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, психических нарушениях, открытоугольной глаукоме, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в подростковом (до 18 лет) возрасте (безопасность не установлена). Не рекомендуется при экстрапирамидных расстройствах, вызванных лекарствами, беременности, лактации. Во время лечения необходим регулярный контроль функций печени, почек, сердечно-сосудистой системы, крови. Прием надо прекращать постепенно.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Креон (Kreon)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 300 мг панкреатина из свиной поджелудочной железы, что соответствует 9000 ЕД амилазы, 8000 ЕД липазы и 450 ЕД протеазы; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютной или относительной недостаточности экзокреции поджелудочной железы.

Показ.: Нарушение пищеварения при хроническом панкреатите, холецистите, циррозе печени; заместительная терапия после резекции желудка и операций на поджелудочной железе; муковисцидоз (для компенсации недостаточности функции поджелудочной железы).

Противопоказ.: Острый панкреатит.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, с небольшим количеством жидкости, по 1-2 капсулы 3-4 раза в день. В тяжелых случаях - по 6-12 капсул в день.

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Криксиван (Crixivan®)

Индинавир

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит индинавира сульфата 200 или 400 мг.

Фарм. действ.: Противовирусное (селективное антиретровирусное против ВИЧ-1), специфическая ингибция протеаз.

Показ.: Лечение ВИЧ-1 инфекции (у взрослых).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности назначение возможно, если потенциальный положительный эффект оправдывает возможный риск для плода. При применении криксивана кормление грудью должно быть прекращено.

Поб. действ.: Астения, утомляемость, бессонница, сухость во рту, извращение вкуса, боль в животе, изжога, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, головокружение, головная боль, лимфаденопатия, понижение чувствительности и сухость кожи, зуд, высыпания, нефролитиаз, повышение АЛТ, АСТ, непрямого билирубина и щелочной фосфатазы в сыворотке крови и белка в моче.

Взаим.: Совместим с зидовудином, ламивудином, ко-тримоксазолом, флуконазолом, изониазидом, кларитромицином, пероральными контрацептивами. Не рекомендуется назначать в комбинации с рифампином (может понизить концентрацию индинавира в плазме), терфенадином, астемизолом и цизапридом (из-за подавления их метаболизма и возникновения сердечных аритмий).

Примен. и доз.: Внутрь, по 800 мг (2 капсулы по 400 мг) каждые 8 ч (2,4 г в день). Следует принимать за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи (для оптимальной абсорбции), с водой или др. жидкостями (снятое молоко, сок, кофе, чай). Назначают в качестве монотерапии или в комбинации с др. антиретровирусными средствами в рекомендуемой выше дозе; в сочетании с рифабутином дозу снижают в 2 раза; в комбинации с кетоназолом и больным с печеночной недостаточностью (вследствие цирроза) и нефролитиазом - по 600 мг каждые 8 ч. В сочетании с диданозином следует принимать с интервалом не менее 1 ч, на пустой желудок.

Предост.: Рекомендуется выпивать не менее 1,5 л жидкости в течение 24 ч (для обеспечения адекватной гидратации). Необходим контроль за появлением при-

знаков и симптомов нефролитиаза (боль в боку, гематурия).

Произв.: MSD (США)

Кромоген ингалятор (Cromogen inhalator)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит динатрия кромогликата 5 мг; во флаконе 112 доз.

Фарм. действ.: Противоаллергическое.

Фармакодин.: Стабилизирует мембраны сенсibilизированных тучных клеток, предотвращает их дегрануляцию и выделение медиаторов аллергии, воспаления, других биологически активных веществ. Предупреждает приступы бронхиальной астмы (не купирует бронхоспазм!), некоторые другие проявления аллергических реакций немедленного типа.

Клин. фарм.: Наиболее эффективен у больных относительно молодого возраста, у которых не развились хронические необратимые изменения в легких.

Показ.: Бронхиальная астма (атопическая форма, астматическая триада, астма физических усилий); хронический бронхит с бронхоспастическим синдромом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 5 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Возможно раздражение полости рта, глотки, верхних дыхательных путей.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Начальная доза для взрослых пожилых больных и детей старше 5 лет - 2 ингаляции 4 раза в день. В дальнейшем возможен переход на поддерживающую терапию - 1 ингаляция 4 раза в сутки. В тяжелых случаях, в период обострения - 2 ингаляции 6-8 раз в сутки.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Кромоген легкое дыхание (Cromogen easy breath)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит кромогликата натрия 5 мг; во флаконе-ингаляторе с оптимизатором 112 доз.

Фарм. действ.: Противоаллергическое (блокада дегрануляции тучных клеток), бронхолитическое.

Показ.: Бронхиальная астма (в т.ч. атопическая, физических нагрузок, холодовая и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Обычные дозы для взрослых и детей - 2 ингаляции 4 раза в сутки; поддерживающая доза - 1 ингаляция 4 раза в сутки. В тяжелых случаях или в период действия антигенов доза может быть увеличена до 2-х ингаляций 6-8 раз в сутки. Перед физическими нагрузками может применяться дополнительная доза.

Пронзв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Кромоглин (Cromoglin®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 доза (0,14 мл) аэрозоля для интраназального применения содержит кромогликата динатрия 2,8 мг; во флаконах по 15 мл.

1 доза (0,05 мл) аэрозоля для ингаляций - 1 мг; во флаконах по 10 и 20 мл.

1 ампула с 2 мл раствора для ингаляций - 20 мг; в упаковке 2 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, торможение дегрануляции тучных клеток.

Показ.: Аллергический ринит (профилактика и лечение), профилактика приступов бронхиальной астмы (в т.ч. вызванной стрессом), профилактическое применение при хроническом бронхите с бронхоспастическим компонентом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский (до 5 лет) возраст (для дозированного интраназального аэрозоля).

Бер. и корм. гр.: Допустимо только по строгим показаниям. Рекомендуются тщательный врачебный контроль.

Поб. действ.: Раздражение слизистой оболочки носа (для интраназального аэрозоля), кашель, легкая сухость в горле, бронхоспастические явления.

Примен. и доз.: Взрослым и детям старше 6 лет обычно назначают по 1 впрыскиванию (2,8 мг) аэрозоля назального 4-6 раз в сутки в каждый носовой ход. Курс лечения начинают до контакта пациента с известным аллергеном (например, пылью растений, домашней пылью и т.д.) и проводят регулярно в течение всего периода воздействия аллергена на организм. Во время введения препарата рекомендуют легко дышать через нос. Перед первым использованием удаляют защитную крышку, производят несколько нажатий до появления

равномерной аэрозольной дозы. После каждого употребления защитную крышку устанавливают на место. Дозированный аэрозоль для ингаляций взрослым и детям старше 5 лет назначают по 2 дозы (2 мг) 4 раза в сутки. При необходимости частоту применения увеличивают до 8 раз в сутки по 2 дозы. Курс лечения - 4 нед. Отмену препарата следует проводить постепенно, в течение недели. Раствор для ингаляций назначают взрослым и детям старше 2 лет - по 1 дозе 4 раза в сутки. При необходимости частоту применения можно увеличить до 8 раз в сутки. Курс лечения - не менее 4 нед. Отмену препарата следует проводить в течение недели.

Пронзв.: Merckle (Германия)

Кромолин (Cromolyn®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула с порошком для ингаляций содержит кромогликата динатрия 20 мг; в упаковке 50 или 100 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, торможение дегрануляции тучных клеток.

Показ.: Бронхиальная астма, аллергический ринит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Раздражение слизистой и спазм бронхов.

Примен. и доз.: Ингаляционно, с помощью соответствующего ингалятора - по 1 капсуле 2-4 раза (до 8) в день.

Пронзв.: Orion (Финляндия)

Ксантинола никотинат (Xantinioli nicotinas)

Ксантинола никотинат*

Сост. и ф.в.: 15% раствор для инъекций; в ампулах по 2 и 10 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее (периферическое).

Показ.: Облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, артериальные тромбозы, диабетическая ангиопатия, ретинопатия, дерматиты, синдром Меньера, острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен, трофические язвы нижних конечностей.

Противопоказ.: Острое кровотечение, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность II и III стадии, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность.

Поб. действ.: Головокружения, жар, покалывание и покраснение кожи верх-

них частей тела (особенно в области головы и шеи).

Взаим.: Несовместим с алкоголем и кофе.

Примен. и доз.: В/м или в/в (очень медленно) - по 2 мл 15% раствора 1-3 раза в сутки. В тяжелых случаях - капельно 10 мл 15% раствора глюкозы в течение 3-4 ч.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Ксантинола никотинат (Xantinoli nicotinas)

Ксантинола никотинат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ксантинола никотината 0,15 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, антиагрегационное.

Фармакодин.: Расширяет периферические сосуды, снижает общее периферическое сопротивление сосудов, улучшает коллатеральное кровообращение, усиливает сердечные сокращения, окислительное фосфорилирование и синтез АТФ.

Показ.: Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, болезнь Рейно, острые артериальные тромбозы, диабетическая ангиопатия, ретинопатия, острый тромбоз поверхностных и глубоких вен, посттромбофлебитический синдром, трофические язвы нижних конечностей, пролежни, мигрень, синдром Меньера, дерматозы, связанные с расстройством трофики сосудистого характера, для улучшения мозгового кровообращения.

Противопоказ.: Сердечная недостаточность II-III стадии.

Поб. действ.: Головокружение, ощущение жара, покалывание и покраснение кожи верхней части тела, особенно головы и шеи (симптомы обычно исчезают через 10-20 мин); "никотиноподобный" синдром (гиперестезия слизистой оболочки носа, рта и обострение обонятельной и вкусовой чувствительности).

Взаим.: Несовместим со строфантином; усиливает эффект гипотензивных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, начиная с 0,15 г 3 раза в день; при необходимости - до 0,3-0,6 г 3 раза в день. По мере улучшения состояния больного дозу снижают до 0,15 г 2-3 раза в день. Курс лечения - не менее 2 мес.

Предост.: С осторожностью комбинируют с антигипертензивными препаратами.

Произв.: Акрихин (Россия); Олайн-фарм (Латвия)

Ксилокаин (Xylocaine®)

Лидокаин*

Ксилокаин адреналин (Xylocaine® adrenaline)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит лидокаина гидрохлорида 10 или 20 мг; ксилокаин с адреналином - лидокаина гидрохлорида 5, 10 или 20 мг и адреналина 5 мкг или лидокаина гидрохлорида 20 мг и адреналина 12,5 мкг, в ампулах или в многодозовых флаконах по 20 или 50 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Местная или региональная анестезия (инфильтрационное введение, блокада периферических нервных стволов и сплетений, каудальная блокада), анестезия в стоматологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Онемение языка, чувство легкости в голове, головокружение, ухудшение зрения, остановка дыхания; при случайном внутрисосудистом введении: блокада проводимости, снижение сердечного выброса, гипотония, брадикардия, желудочковая фибрилляция, остановка сердца.

Взаим.: Токсичность усиливается токаином. Галотан, бутирофенон увеличивают риск развития сердечной аритмии (для лекарственных форм с адреналином).

Примен. и доз.: Вводится медленно, с частыми аспирациями; основная доза вводится медленно - 25-30 мг/мин. Перед эпидуральной анестезией проводят тест-дозу с 3-5 мл ксилокаина с адреналином, аспирация проводится повторно перед введением основной дозы. Инфильтрация (кожные покровы) - 0,5-1% объемом 1-60 мл, общей дозой - 1-300 мг. Для блокад используются 1-2% растворы в объеме 3-40 мл в зависимости от проводимой процедуры.

Предост.: С осторожностью используют при проведении эпидуральной анестезии у больных с нарушенной сердечно-сосудистой функцией.

Произв.: Astra (Швеция)

Курантил (Curantyl®)

Дипиридамола*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит дипиридамола 25 или 75 мг; в упаковке 100 и 40 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Коронарорасширяющее, антиагрегационное.

Показ.: Хроническая сердечная недостаточность, профилактика и лечение инфаркта миокарда; старческое сердце; профилактика гипертрофии сердца, профилактика тромбозов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, выраженная гипотония, коллапс, аритмии, тяжелые нарушения функции почек, склонность к кровотечениям.

Бер. и корм. гр.: Только при строжайших показаниях (особенно во II и III триместрах).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головные боли, головокружения, чувство огушенности, слабость, гипотония, шок, переходящая тахикардия, изменения в проводящей системе сердца, внезапное покраснение лица и шеи, аллергические кожные реакции.

Взаим.: Усиливает эффект пероральных непрямыа антикоагулянтов. Производные ксантина (например, кофеин) ослабляют антитромботическое действие, антибиотики (пенициллин, цефалоспорины, хлорамфинекол, тетрациклин) - повышают.

Примен. и доз.: Внутрь (натощак или за 1 ч до еды) - обычно по 1-2 драже (25 мг), в тяжелых случаях - 3 драже 3 раза в день; драже 75 мг: в тяжелых случаях в качестве начальной дозировки 1 драже 3 раза в день, после улучшения состояния дозу снижают. В качестве вспомогательного средства для профилактики тромбозов совместно с пероральными противосвертывающими средствами или с ацетилсалициловой кислотой по 1 драже (по 75 мг) 3-6 раз в день.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Курантил N 25 (Curantyl® N 25)

Дипиридамола*

Курантил N 75 (Curantyl® N 75)

Дипиридамола*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит дипиридамола 25 или 75 мг; в упаковке 120 или 40, 60 и 100 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Коронарорасширяющее, антиагрегационное.

Фармакокин.: Быстро всасывается в желудке (большая часть) и тонком кишечнике (незначительное количество). Почти полностью связывается с белками крови. C_{max} - в течение 1 ч после приема. $T_{1/2}$ - 20-30 мин. Накапливается в первую очередь в сердце и эритроцитах. Метаболизируется печенью путем связывания с глюкуроновой кислотой, выводится с желчью в виде моноглюкуронида.

Фармакодин.: Понижает сопротивление коронарных артерий на уровне мелких ветвей и артериол; увеличивает число коллатералей и коллатеральный кровоток, концентрацию аденозина в миокарде и синтез в нем АТФ, улучшает сократимость миокарда, уменьшает общее периферическое сопротивление, снижает АД, тормозит агрегацию тромбоцитов (улучшает микроциркуляцию, предупреждает артериальный тромбоз), нормализует венозный отток на фоне уменьшения сопротивления мозговых сосудов, корректирует плацентарный кровоток, при угрозе преэклампсии предупреждает дистрофические изменения в плаценте, устраняет гипоксию тканей плода путем накопления гликогена.

Показ.: Стабильная стенокардия напряжения с локальным стенозированием одной из ветвей венечных артерий, профилактика инфаркта миокарда, инсульт (острый период); лечение дисциркуляторной энцефалопатии (стадии компенсации и субкомпенсации); для уменьшения головокружения, улучшения памяти, внимания, мышления; артериальные и венозные тромбозы, тромбоэмболия ветвей легочной артерии (профилактика); профилактика преэклампсии, тромбоцитопенической пурпуры, плацентарной недостаточности.

Противопоказ.: Острый инфаркт миокарда, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, декомпенсированная сердечная недостаточность, гипотония (тяжелые формы), аритмии, тяжелые нарушения функции почек, склонность к кровотечениям, гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Крайне редко при использовании доз выше 200 мг/сутки возможны тошнота, шум в голове, головокружение, головная боль, переходящая гиперемия лица; боль в области сердца, тахикардия или брадикардия; болезненность в области печени, кожный зуд; диспепсия (тошнота, желудочно-кишечные расстройства); кожные аллергические реакции.

Взаим.: Ослабляют эффект производные ксантина (например, кофеин), усиливают - пероральные непрямые антикоагулянты, антибиотики групп пенициллина, цефалоспорины (бета-лактамы антибиотики), тетрациклина, хлорамфеникол.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак за 1 ч до приема пищи, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Дозы устанавливаются в зависимости от тяжести заболевания и реакции больного. Средние дозы составляют: Курантил N 25 - по 3 таблетки 3 раза в день, Курантил N 75 - по 1 таблетке 3 раза в день. При дисциркуляторной энцефалопатии и атеросклерозе артерий суточную дозу увеличивают до 450 мг. Возможно комбинированное лечение с др. антитромботическими препаратами.

Предост.: При лечении следует избегать употребления натуральных кофе и чая (ввиду ослабления эффекта).

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Куросурф (Curosurf)

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для интратрахеального введения содержит 80 мг фосфолипидной фракции, выделенной из легких свиньи (полярные липиды, в частности, 70% фосфатидилхолина и около 1% специфических низкомолекулярных гидрофобных протеинов); в однодозовых флаконах по 1,5 или 3 мл; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита легочного сурфактанта (снижение поверхностного натяжения в легких).

Клин. фарм.: У недоношенных новорожденных (после лечения) восстанавливается уровень оксигенации.

Показ.: Респираторный дистресс-синдром у новорожденных с массой тела более 700 г.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Интратрахеально (в нижнюю трахею), монодоза - 2,5 мл/кг с последующей ручной вентиляцией легких мешком в течение 1-2 мин. Для селективного распределения в каждом из легких по 1,25 мл/кг массы тела 2 раза с интервалом в 1 мин, при этом ребенок повернут на бок для лучшего распределения сурфактанта в соответствующем легком; после каждого введения проводят ручную вентиляцию в течение 1 мин; рекомендуемая доза составляет 200 мг/кг массы, при необходимости возможно дополнительное введение 1-2

полудоз (100 мг/кг) с интервалом не менее 12 ч. Максимальная общая доза препарата - 300-400 мг/кг.

Предост.: Применение возможно только в клинических условиях (необходимы ИВЛ и мониторинг).

Произв.: CSC (Италия)

Кутерид (Kuterid®)

Бетаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержит 0,64 мг бетаметазона дипропионата, что эквивалентно 0,5 мг бетаметазона; в тубах по 15, 30 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Фармакодин.: Имеет сильный вазоконстрикторный эффект; системные проявления незначительны из-за ограниченного всасывания через кожный покров. В форме крема образует защитную пленку на коже, что способствует пролонгированию эффекта.

Показ.: Контактная экзема (острая, подострая, хроническая), дерматиты (простой, солнечный, токсический, гипостатический, интертриго, себорейный, медикаментозный, фотодерматит), ягодичный дерматит, эритродермия (некоторые формы), псориаз, красный плоский лишай, пруриго, хроническая эритема, гнездовая алопеция, укусы насекомых.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез кожи, ветряная оспа, кожные реакции после вакцинации.

Поб. действ.: Зуд, угревые высыпания, фолликулиты, гипертрихоз, гипопигментация, атрофия кожи, стрии, потница.

Примен. и доз.: Наружно. Наносить на пораженные участки кожи 2 раза в сутки, осторожно втирая.

Предост.: Применение окклюзионных повязок и длительное применение увеличивают степень проявления побочных эффектов.

Произв.: Lek (Словения)

Кутерид Г (Kuterid G®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержит бетаметазона дипропионата 0,64 мг и гентамицина в форме сульфата 1000 МЕ; в тубах по 15, 30 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, противоаллергическое, антибактериальное (широкого спектра).

Показ.: Пиодерматиты (простой дерматит, атопический дерматит, себорейный,

интертриго, гипостатический), гнойные аллергические дерматопатии (экземы, конституционный нейродермит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, кожные реакции после вакцинации.

Поб. действ.: Зуд, потница, угревые высыпания, фолликулиты, гипертрихоз, стрии, атрофия кожи.

Примен. и доз.: Наружно. На пораженные участки кожи наносить 2 раза в сутки, осторожно втирая.

Предост.: При нанесении на большие поверхности кожи (или в больших количествах) возможно проявление системных эффектов кортикостероидов. Осторожно назначать детям и использовать окклюзионные повязки. При грибковых и вторичных бактериальных инфекциях требуется проведение сопутствующей терапии. Следует избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку.

Произв.: Lek (Словения)

Кутивейт® (Cutivate®)

Флутиказон*

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержит флутиказона пропионата 50 или 500 мкг соответственно; в тубах по 30 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Экзема (атопическая, дискоидная, у детей); узловатая чесуха; псориаз (исключая распространенный бляшечный); нейродерматозы (в т.ч. простой лишай, красный плоский лишай, себорейный дерматит); дискоидная красная волчанка; красная потница; генерализованная эритродермия (в качестве дополнительного средства к системной терапии); укусы насекомых, аллергические контактные реакции, зуд.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угри розовые и обыкновенные, периоральный дерматит, первичные вирусные, грибковые и бактериальные инфекции кожи, зуд аногенитальной области; детский возраст (до 1 года)

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью и только, если предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода и младенца.

Поб. действ.: Аллергический контактный дерматит, местные аллергические реакции: жжение и зуд (требуют отмены препарата), вторичные инфекции. При длительном применении в высоких дозах: локальные атрофические измене-

ния кожи (истончение, стрии, расширение поверхностных сосудов, гипертрихоз, гипопигментация), системная абсорбция с признаками гиперкортицизма, угнетение функции коры надпочечников, рецидивы, толерантность.

Примен. и доз.: Накожно, наносят тонким слоем на пораженное место 2 раза в день.

Предост.: При нанесении препарата на кожу век следует избегать попадания в глаза (возможны местное раздражение, повышение внутриглазного давления). Во время лечения необходимо контролировать состояние больных псориазом, т.к. возможно развитие толерантности, рецидивов, переход заболевания в генерализованную пустулезную форму. При лечении вторично инфицированных поражений рекомендуется применять соответствующие антибактериальные средства; при появлении признаков распространения инфекции следует отменить препарат и назначить системную соответствующую терапию. Перед наложением новой повязки кожу следует тщательно обрабатывать.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Лазикс (Lasix®)

Фуросемид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг.

1 ампула с 2 мл инъекционного раствора - 20 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отечный синдром различного генеза (сердечный, печеночный, почечный после второго месяца беременности, интоксикационный), отек легких и мозга, артериальная гипертензия, форсированный диурез, почечная недостаточность.

Противопоказ.: Повышенная чувствительность к сульфонидам и фуросемиду, острый гломерулонефрит, почечная недостаточность с анурией, печеночная кома, нарушение водно-солевого баланса и КЩР (гипокалиемия, гипонатриемия).

Бер. и корм. гр.: При беременности следует использовать по строгим показаниям и только в течение короткого времени. Противопоказан при лактации.

Поб. действ.: Гипотония, аритмия, сухость во рту, тошнота, рвота, диарея, панкреатит, гиповолемия, дегидратация, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, метаболический алкалоз, гипокальциемия, гиперурикемия, дерматит,

нарушение слуха, зрения, парестезия, головокружение, мышечная слабость, задержка мочи у больных с аденомой простаты, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, снижение толерантности к глюкозе, острый панкреатит, аллергические реакции (высыпания, лихорадка, васкулиты, интерстициальные нефриты), у недоношенных детей - нефрокальциноз.

Взаим.: Повышает риск развития интоксикации сердечными гликозидами, нефро- и ототоксическое действие аминогликозидов, цефалоспоринов, цисплатина, при сочетании с глюкокортикоидами - риск гипокалиемии, усиливает действие курареподобных средств, ускоряет резорбцию ионов лития в почечных канальцах. НПВС уменьшают диуретический эффект.

Примен. и доз.: Внутрь, назначается обычно натошак; в/в вводится не менее чем в течение 1-2 мин. При тяжелом отеком синдроме начальная доза для взрослых - 20-80 мг при приеме внутрь или 20-40 мг в/в; в случае упорных отеков - такая же или увеличивающаяся на 20-40 мг (на 20 мг для парентерального введения) доза может назначаться повторно не ранее, чем через 6-8 ч (2 ч для парентерального введения) вплоть до получения диуретического эффекта, такая индивидуально подобранная дозировка может применяться 1 или 2 раза в сутки. Наибольшая эффективность достигается при приеме препарата 2-4 дня в неделю. Для детей начальная дозировка - 2 мг/кг массы тела (при парентеральном введении 1 мг/кг), при неудовлетворительном эффекте может быть увеличена на 1-2 мг/кг (при парентеральном введении 1 мг/кг), но не раньше, чем через 6-8 ч (для парентерального введения этот срок - не менее 2 ч). При артериальной гипертонии начальная дозировка для взрослых - 80 мг в сутки в 2 приема. При отеке легких Лазикс вводится в/в в дозе 40 мг, при необходимости через 20 мин возможно введение препарата в дозе от 20 до 40 мг.

Предост.: Возможно снижение скорости реакции (осторожности при участии в дорожном движении и обслуживании механизмов).

Произв.: Hoechst (Германия)

Лазилактон (Lasilactone®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит фуросемида 20 мг и спиронолактона 50 или 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое (калийсберегающее), гипотензивное.

Показ.: Отечный синдром (сердечный, цирротический, нефротический); профилактика гипокалиемии при лечении салуретиками, первичный гиперальдостеронизм, артериальная гипертензия при гиперальдостеронизме.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность с явлениями комы, нарушение функции почек, гиперкалиемия, выраженная гипокалиемия, требующая коррекции, гипонатриемия и/или гиповолемия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, утомляемость, сонливость, снижение слуха, нечеткость зрения, атаксия, анорексия, диспептические расстройства, гастрит, язва желудка, панкреатит, артериальная гипотония, мышечные спазмы, гирсутизм, подагра, изменение картины крови, гиперурикемия, гиперглицеридемия, глюкозурия, аллергические реакции.

Взаим.: При совместном применении с препаратами калия, калийсберегающими диуретиками, ингибиторами АПФ повышается риск развития гиперкалиемии. Спиронолактон увеличивает период полувыведения дигоксина, ослабляет эффект карбеноксолона, снижает вазопрессорный эффект норадреналина. Нестероидные противовоспалительные препараты снижают эффект спиронолактона и фуросемида. Фуросемид ослабляет действие гипогликемизирующих средств, прессорных аминов, усиливает действие салицилатов, теофиллина, лития и курареподобных миорелаксантов, нефро- и ототоксичность аминогликозидов.

Передоз.: Симптомы: дегидратация, уменьшение объема циркулирующей крови, снижение АД, электролитный дисбаланс, гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз. Лечение симптоматическое: коррекция гиповолемии и дефицита электролитов. Гемодиализ не ускоряет выведение фуросемида.

Примен. и доз.: При отеком синдроме назначают в дозе 100-200 (реже 300) мг/сутки в 2-3 приема, обычно в комбинации с петлевым или/и тиазидным диуретиком. Назначают ежедневно в течение 2-3 нед. При необходимости курс повторяют через каждые 10-14 дней.

Предост.: При приеме препарата возможно снижение концентрации внимания, поэтому он должен с осторожностью использоваться водителями автомашин, лицами, управляющими механиз-

мами, а также занимающимися видами деятельности, требующими повышенного внимания. При нарушении функции почек требуется постоянный контроль уровня калия в крови.

Произв.: Hoechst (Германия)

Лайкан (Leikan®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 50 мг стандартизированного сухого экстракта из корневища кава-кава (11-20:1) соответственно 35 мг кавалактона; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Седативное.

Фармакодин.: Обладает седативным эффектом, сопровождающимся повышением альфа-активности и снижением бета-активности головного мозга. Не обладает снотворным действием.

Показ.: Нервозность, страх, беспокойство, напряжение.

Противопоказ.: Эндогенные депрессивные состояния, беременность, лактация.

Поб. действ.: Нарушения функции ЖКТ (незначительные), расстройства зрения (мигриаз, нарушение координации движения глаз), кожные реакции (покраснение, зуд). При длительном применении может возникнуть пожелтение кожи и ногтей, что требует прекращения лечения.

Взаим.: Усиливает эффект алкоголя, барбитуратов и средств, действующих на ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле 3 раза в день независимо от приема пищи. Глотать не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Без консультации врача принимать не более 3 мес.

Произв.: Dr. Willmar Schwabe (Германия)

Лакрисин (Lacrisin)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит гидроксипропилметилцеллюлозы 6 мг, борной кислоты 8,25 мг и натрия тетрабората 2 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция эпителизации роговицы, кератопротективное.

Фармакодин.: Защищает роговицу от внешних воздействий при пониженной секреции слезной жидкости, увеличивает продолжительность действия глазных капель и защищает роговицу от их раздражающего действия.

Клин. фарм.: Субъективное и объективное улучшение состояния (эпителизация, уменьшение гиперемии, очагов поражения) обычно наступает в течение 3-5

дней, выраженное улучшение или полное излечение - в течение 2-3 нед.

Показ.: Эрозии и трофические изменения роговицы, микродефекты роговичного эпителия, буллезные дистрофические изменения роговицы, кератопатия, апалический синдром, эктропион, деформация век, лагофтальм; состояния после пластических операций на веках, термических ожогов роговицы и конъюнктивы, кератопластики, кератэктомии; заместительная терапия при пониженной секреции слезной жидкости; синдром "сухих глаз", ксероз, кератоз (комбинированная терапия); пролонгирование действия или уменьшение раздражающего эффекта других глазных капель.

Противопоказ.: Острая фаза химического ожога глаз (до момента полного удаления химического вещества и некротизированных тканей).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Конъюнктивально. По 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 2-3 раза в сутки (при необходимости можно вводить по 1-2 капли каждый час).

Предост.: Не следует одновременно применять глазные капли, содержащие соли металлов.

Произв.: Norton Healthcare / Galena (Великобритания)

Лаксатин (Laxatin)

Бисакодил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, содержит бисакодила 5 мг; во флаконах по 100 шт.

Фарм. действ.: Слабительное, усиление моторики толстого (главным образом) кишечника.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 8-12 ч.

Показ.: Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в т.ч. у пожилых пациентов, запоры после операций, родов); геморрой, проктит, анальные трещины (для регулирования стула), диагностические и терапевтические вмешательства на толстой кишке (для опорожнения кишечника).

Противопоказ.: Кишечная непроходимость, острые желудочно-кишечные заболевания, перитонит, кровотечения из ЖКТ, ущемленная грыжа, маточные кровотечения, спастический запор, острый проктит, острый геморрой, цистит.

Поб. действ.: Коликообразные боли в области живота, диарея (может привести

к потерям жидкости и электролитов, мышечной слабости, судорогам, артериальной гипотонии).

Примен. и доз.: Внутрь, таблетку проглатывают целиком, не разжевывая и не размельчая, взрослым и детям старше 12 лет - по 2-3 таблетки 1 раз в день; детям от 6 до 12 лет - по 1 таблетке в день.

Предост.: С осторожностью назначают беременным и кормящим женщинам. Не следует применять препарат в течение более чем 1 нед. Если стул не появился после приема, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом. Нельзя комбинировать с молоком, антиоксидантами (интервал должен быть не менее часа). Использование препарата у детей младше 6 лет возможно только после консультации с врачом.

Произв.: Four Ventures (США)

Лаксигал (Laxugal)

Натрия пикосульфат*

Сост. и ф.в.: 1 мл (18 капель) раствора для приема внутрь содержит натрия пикосульфата 7,5 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Слабительное.

Фармакодин.: Под действием кишечных микроорганизмов путем гидролиза образуется активная форма препарата, раздражающая рецепторы слизистой оболочки, в результате чего усиливается перистальтика нижнего отдела ЖКТ. Эффект развивается через 6-12 часов.

Показ.: Острые функциональные запоры (например, при изменении местопребывания); вторичные запоры (на фоне других заболеваний), регуляция и облегчение стула у пациентов с патологией прямой кишки (трещины слизистой оболочки прямой кишки, болезненные геморроидальные узлы и др.), подготовка к рентгенологическому или эндоскопическому исследованиям ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к веществам триарилметанолового ряда и парабенам); кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, перитонит, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости; боли в животе, тошнота, рвота неясного генеза; состояние после операций на ЖКТ, выраженная дегидратация организма, детский возраст (до 4 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано во время лактации (следует прекратить грудное вскармливание). При беременности используется только по назначению врача.

Поб. действ.: Боли в животе, диарея, позывы к рвоте; при длительном применении - чрезмерная потеря жидкости и электролитов.

Взаим.: Антибиотики широкого спектра действия уменьшают эффект. Диуретики и глюкокортикостероиды повышают вероятность возникновения нарушений водно-электролитного баланса (возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам).

Передоз.: Симптомы: приступообразные боли в животе, частый жидкий стул.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям старше 10 лет - в разовой дозе 12-24 капель; детям от 4 до 10 лет - в разовой дозе 6-12 капель. Препарат рекомендуется применять перед сном.

Предост.: Увеличение продолжительности применения более 10 дней возможно только по рекомендации врача.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Лактулоза сироп (Lactulose sirup)

Лактулоза*

Сост. и ф.в.: 100 мл 50% раствора содержат лактулозы 47,5-52,5% (66,7 г), галактозы не более 16%, лактозы не более 12%, фруктозы не более 1% и эпилактозы не более 8%; во флаконах по 200 мл.

Фарм. действ.: Понижение рН кишечного содержимого, активация перистальтики, ускорение выведения токсинов.

Показ.: Лечение и профилактика синдромов эндогенного перепроизводства аммиака, хроническая печеночная энцефалопатия (профилактика прекомы и комы, лечение ранней нервно-психической симптоматики у пациентов с циррозом), синдром сокращения популяции бактерий флоры кишечника, вызванный колиформными видами (сальмонеллы, шигеллы), синдром гнилостной диспепсии у детей раннего возраста.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, галактоземия.

Поб. действ.: Диарея (требует прекращения лечения), вздутие кишечника, метеоризм, потеря электролитов.

Примен. и доз.: Внутрь, 1-3 столовые ложки в день для взрослых; детям - 1-3 чайные ложки в день, грудным - 1 чайная ложка в день. При хронической гепатозенцефалопатии: 90-190 мл в день в 2-3 приема.

Произв.: CSC (Италия)

Ламизил (Lamisil®)

Тербинафин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тербинафина в форме гидрохлорида 125 или 250 мг; в упаковке 14 или 28 шт.

1 г крема - 10 мг; в тубах по 15 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Грибковые поражения кожи, ногтей и волос.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Таблетки: диспептические расстройства, нарушения вкуса, расстройства функции печени и желчевыводящих путей, нейтропения, аллергические кожные реакции. Крем: гиперемия, зуд и ощущение жжения в месте нанесения.

Взаим.: Индукция (рифампицин) микросомальных ферментов печени ускоряет элиминацию, блокада (циметидин) - замедляет.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - 250 мг 1 раз в день; детям старше 2 лет с массой тела до 20 кг - по 62,5 мг 1 раз в день, с массой тела от 20 до 40 кг - 125 мг 1 раз в день, с массой тела более 40 кг - 250 мг 1 раз в день. Наружно, крем наносят тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают. Длительность лечения определяется показаниями и тяжестью заболевания.

Предост.: Рекомендуется соблюдать осторожность при назначении пациентам с нарушениями функции печени и/или почек. Крем предназначен только для наружного применения; следует избегать попадания в глаза.

Пронзв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Ламиктал® (Lamictal®)

Ламотриджин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ламотриджина 25; 50 или 100 мг.

1 таблетка для растворения или разжевывания - 5, 25 или 100 мг.

Фарм. действ.: Противосудорожное.

Фармакокин.: Имеет линейный профиль. C_{max} в плазме достигается через 2,5 ч. $T_{1/2}$ - 29 ч. 55% связывается с белками плазмы. Интенсивно метаболизируется (N-глюкуронируется). Выделяется в основном почками.

Фармакодин.: Вызывает вольтаж-зависимый блок натриевых каналов, пресинаптических мембран нейронов в фазе

медленной инактивации и блокирует избыточный выброс глутамата (ключевой фактор эпилептического статуса).

Показ.: Парциальные и генерализованные тонико-клонические судорожные припадки (при неэффективности других противоэпилептических препаратов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная печеночная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Используется во время беременности, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, диплопия, пелена перед глазами, сонливость, слабость, диспептические явления, тремор, раздражительность, агрессивность, возбуждение, спутанность сознания, преходящее изменение лабораторных показателей, кожная сыпь, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некроз.

Взаим.: Ускоряют метаболизм фенитоина, карбамазепина, фенобарбитала, замедляет - вальпроат натрия.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет, не принимающим вальпроат натрия - по 50 мг 1 раз в сутки в течение первых 2-х нед, 50 мг дважды в день - вторые 2 нед, затем - до 100-200 мг дважды в день (поддерживающая доза); принимающие вальпроат натрия - 25 мг через день в течение первых двух недель, 25 мг 1 раз в день - вторые две недели, поддерживающая доза - 100-200 мг в сутки в один или 2 приема. Детям от 2 до 12 лет, не принимающим вальпроат натрия - первые 2 нед из расчета 2 мг/кг, разделенные на 2 приема; вторые 2 недели - 5 мг/кг в два приема, поддерживающая доза - 5-15 мг/кг в 2 приема; принимающим вальпроат натрия - первые 2 недели 0,2 мг/кг один раз в день (если общая дневная доза менее 5 мг, назначают по 5 мг через день в течение первых двух недель), вторые 2 недели - 0,5 мг/кг 1 раз в день, поддерживающая доза - 1-5 мг/кг в один или 2 приема.

Предост.: С осторожностью применяют при почечной недостаточности, в пожилом возрасте. Прекращать прием следует постепенно.

Пронзв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Ланатозид Ц (Lanatozid C)

Ланатозид Ц*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит ланатозид С 0,25 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Кардиотоническое, антиаритмическое, положительное инотропное, отрицательное дромо- и хронотропное.

Фармакодин.: Увеличивает сократимость миокарда и сердечный выброс, снижает венозное давление, повышает диурез, уменьшает отеки, одышку (у больных с хронической сердечной недостаточностью).

Показ.: Хроническая сердечная недостаточность, хроническое легочное сердце, тахисистолическая мерцательная аритмия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная брадикардия, АВ-блокада, инфаркт миокарда, стенокардия, экстрасистолия, пароксизмальная желудочковая тахикардия.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, диарея, замедление АВ-проводимости, сонливость, спутанность сознания, делирий, снижение остроты зрения; редко - тромбоцитопения, кожная сыпь.

Взаим.: Препараты кальция, катехоламины, диуретики повышают риск гликозидной интоксикации. Хинидин, верапамил, нифедипин, спиронолактон увеличивают концентрацию в плазме. Антациды снижают всасывание.

Примен. и доз.: Внутрь, для проведения насыщающей терапии - 6-8 мг в сутки в 3-4 приема; для поддерживающей терапии - до 1 мг в сутки (разделенного на 2 приема).

Произв.: Romferchim (Румыния)

Ланвис® (Lanvis®)

Тиогуанин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиогуанина 40 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Острый миелобластный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз, хронический миелолейкоз.

Противопоказ.: Недостаточность гипоксантин-гуанин-фосфорибозил трансферазы (образует активный метаболит).

Бер. и корм. гр.: Возможно, но только по абсолютным показаниям.

Поб. действ.: Супрессия костного мозга (лейкопения, тромбоцитопения, аплазия костного мозга); желудочно-кишечные

расстройства; перфорация кишечника, нарушения функции печени (обратимые желтуха, веноокклюзионная болезнь), стоматит, интестинальный некроз.

Взаим.: В сочетании с бусульфаном вызывает развитие узловой регенеративной гиперплазии, портальной гипертензии, варикозное расширение вен пищевода.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым (индукция ремиссии) - 100-200 мг/кв.м в день (в 1 или 2 приема) в течение 5-20 дней, детям - доза корректируется по площади поверхности тела, поддерживающая доза - от 60 до 200 мг/кв.м, курсами или непрерывно.

Предост.: С осторожностью назначать при нарушенной функции печени и почек. Необходим ежедневный анализ крови (при снижении числа лейкоцитов и тромбоцитов ниже допустимого уровня лечение прекращается) и контроль уровня мочевой кислоты в крови и моче.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Ласпал® (Laspal®)

Ацетилсалицилат лизина

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с порошком для приема внутрь (с мандариновым ароматизатором) для детей содержит ацетилсалициловой кислоты 100 мг (в форме ацетилсалицилата лизина - 180 мг) и для взрослых - 250, 500 или 1000 мг (в форме ацетилсалицилат лизина - 450, 900 и 1800 мг соответственно); в коробке 20 шт.

1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора (только для взрослых) - 500 или 1000 мг (в форме ацетилсалицилат лизина - 900 и 1800 мг соответственно); в коробке 20 флаконов.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное, антиагрегационное.

Показ.: Лихорадочные состояния, болевой синдром (включая ревматические боли); гиперагрегация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (к салицилатам), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания, сопровождающиеся геморрагическим синдромом, беременность (последний триместр).

Поб. действ.: Шум в ушах, снижение слуха, головные боли; диспептические расстройства и язвенные поражения ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический синдром; анафилаксия, сыпь, бронхоспазм и др. аллергические реакции.

Примен. и доз.: Дозы приведены в пересчете на ацетилсалициловую кислоту. Внутрь, взрослым - по 500-1000 мг (1-2 пакетика) 2-3 раза в день (максимальная суточная доза - 6 г); детям - по 25-50 мг/кг массы тела в день в 4-6 приемов (максимальная суточная доза: в возрасте до 30 мес - 80 мг/кг/день, от 30 мес до 15 лет - 100 мг/кг/день); содержимое пакетика растворяют в небольшом количестве воды (можно подслащенной), молока или сока. В/в (струйно или капельно) и в/м (глубоко), взрослым - по 500-1000 мг (1-2 флакона) 1-2 раза в день (максимальная суточная доза - 4 г); детям в возрасте до 6 лет - по 10-25 мг/кг массы тела в день, от 6 до 10 лет - по 250-500 мг в день, старше 11 лет - по 500-1000 мг в день. В качестве антиагрегантного средства детям и новорожденным - по 1 таблетке (100 или 250 мг) 1 раз в день в течение длительного промежутка времени.

Предост.: С осторожностью назначают при гастродуоденальных язвенных заболеваниях в анамнезе, почечной недостаточности, астме, подагре, меноррагии, наличии внутриматочного контрацептива.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Левамизол-Эбеве (Levamisol-Ebewe)

Левамизол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит левамизола гидрохлорида 50 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, противоглистное.

Показ.: Аденокарцинома толстой кишки (в фазе с поражением региональных лимфоузлов); злокачественные опухоли после хирургической резекции (в комбинации с 5-фторурацилом); гельминтозы (разной этиологии); иммуносупрессия (при различных заболеваниях).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Аллергические реакции: агранулоцитоз, гриппоподобный синдром (лихорадка, озноб, тошнота, слабость), кожная сыпь, зуд, алоpecia, ревматоидный артрит; диарея, тошнота, металлический привкус, стоматит, гепатотоксичность, лейкопения, тромбоцитопения, кровоточивость, петехии, нервозность, тревога, головная боль, головокружение, депрессия, ночные кошмары, усталость, бессонница, атаксия, тремор, парестезии, дискинезии, нарушение зре-

ния, спутанность сознания, артралгии, миалгии.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, с небольшим количеством воды. Схему лечения определяют индивидуально. После удаления опухоли - по 50 мг 3 раза в день ежедневно, в течение 3 дней подряд каждые 2 нед. Лечение начинают на 7-30 день после резекции и продолжают в течение 1 года (монотерапия или в комбинации с 5-фторурацилом).

Предост.: С осторожностью следует назначать больным с депрессией костного мозга, инфекциями, цереброваскулярными нарушениями, тяжелой почечной и печеночной недостаточностью, аутоиммунной патологией. Перед началом лечения необходимо провести исследование периферической крови. Во время лечения следует избегать употребления алкоголя.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Левовинизоль (Laevovinisolum)

Сост. и ф.в.: 1 баллон (60 мл) содержит левомицетина 0,136 г, винилина 13,5 г, линетола 13,4 г, спирта этилового 95% 2,9 г, цитраля 0,1 г и пропеллента до 60 г.

Фарм. действ.: Антимикробное, стимуляция регенерации.

Показ.: Поверхностные ожоги, ограниченные глубокие ожоги, пролежни, трофические язвы, инфицированные раны.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Жжение в местах аппликации.

Примен. и доз.: Накожно, распыляют с расстояния 20-30 см в течение 1-3 с 2-3 раза в неделю; при тяжелых поражениях препарат можно применять ежедневно.

Предост.: При распылении следует избегать попадания препарата в глаза.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Левомеколь мазь (Unguentum Laevomecoli)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат левомицетина 0,75 г и метилурацила 4 г; в банках по 100 г и 1000 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антибактериальное.

Показ.: Гнойные раны, инфицированные смешанной флорой, включая стафилококки, синегнойные и кишечные палочки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.
Примен. и доз.: Накожно, пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. перевязки производят ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. Возможно введение в гнойные полости через катетер с помощью шприца (с предварительным подогреванием до 35-36 град.С).

Произв.: Акрихин (Россия)

Левомецетин (Laevomycetinum)

Хлорамфеникол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левомицетина 0,25 или 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное широкого спектра, бактериостатическое.

Показ.: Брюшной тиф, паратиф, генерализованный сальмонеллез, бруцеллез, туляремия, иерсиниоз, менингит, риккетсиоз, хламидиоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угнетение кроветворения, псориаз, экзема, грибковые заболевания кожи, беременность, период новорожденности.

Поб. действ.: Диспептические явления, раздражение слизистой оболочки рта и зева, лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, уменьшение количества гемоглобина, аплатическая анемия, психомоторные расстройства, нарушение сознания, зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты слуха и зрения, аллергические реакции, кардиоваскулярный коллапс (грей-синдром) у детей до 1 года.

Взаим.: Несовместим с цитостатиками, сульфаниламидами, производными пиразолона, дифенином, неодикумарином, бутамином, барбитуратами.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды, по 0,25-0,5 г 3-4 раза в сутки; высшая суточная доза - 4 г. Разовая доза для детей до 3 лет - 0,01-0,015 г/кг; от 3 до 8 лет - 0,15-0,2 г, старше 8 лет - 0,2-0,3 г 3-4 раза в сутки. Курс - до 14 дней.

Предост.: Необходим строгий контроль за состоянием крови и функцией почек.

Произв.: ICN Полифарм (Россия); Акрихин (Россия)

Левулоза (Levulose)

Фруктоза

Сост. и ф.в.: 1000 мл раствора для инфузий содержат фруктозы - 50 или 100 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Гепатопротективное, гидратирующее, осмотическое, ускорение метаболизма этанола.

Показ.: Экстрацеллюлярная дегидратация; поражения печени; повышенное внутричерепное давление, глаукома; питательные инфузии: в до- и послеоперационном периоде, при кахексии; острое алкогольное опьянение.

Противопоказ.: Непереносимость фруктозы, отравление метанолом, лактатацидоз, неконтролируемый сахарный диабет, декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия.

Поб. действ.: Тромбофлебит (при быстром введении); при передозировке - прилив крови к лицу, потливость, боли в эпигастрии.

Примен. и доз.: В/в, взрослым - с максимальной скоростью 100 капель/мин, т.е. 300 мл/ч для 5% раствора или 40 капель/мин, т.е. 150 мл/ч для 10% раствора - до 2000 мл в сутки; детям - 0,25 г фруктозы/кг массы тела, т.е. около 4,5 мл/кг/ч.

Предост.: Следует иметь в виду возможный лактатацидоз.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Легалон (Legalon®)

Силимарин

Легалон-35 (Legalon®-35)

Силимарин

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 драже (Легалон 70 и Легалон 35) содержит силимарина 70 или 35 мг с минимум соответственно 30 или 15 мг силибинина в 90 или 45 мг плодового экстракта (*Cardui mariae*); в упаковке 40 или 100 и 80 шт.

1 капсула (Легалон 140) - 140 мг с минимум 60 мг силибинина в 180 мг плодового экстракта (*Cardui mariae*); в упаковке 20 или 100 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, стимуляция регенерации гепатоцитов, улучшение функции печени, антиоксидантное и антифибринолитическое.

Показ.: Токсические поражения печени; хронические воспалительные заболевания печени, цирроз печени (поддерживающая терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диарея (редко).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости (капсула). Для начального лечения и в тяжелых случаях - по 1 капсуле или по 2 драже 3 раза в день; поддерживающая доза - 1 капсула 2 раза в день или 1 драже 3 раза в день.

Произв.: Madaus (Германия)

Ледоксина (Ledoxina)

Циклофосфамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 50 мг циклофосфамида; в упаковке 50 шт.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора - 100, 200, 500 или 1000 мг; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Фармакокин.: Активируется в печени при участии цитохрома P₄₅₀ с образованием метаболитов, обладающих алкилирующим действием.

Показ.: Лейкемия, лимфогранулематоз, лимфосаркома, лимфома Беркита, неходжкинская лимфома, карцинома молочных желез, шейки матки, легких, яичников, нейробластома, эмбриональная рабдомиосаркома, саркома Юинга, гранулематоз Вегенера, трансплантация, ревматоидный артрит, невротический синдром у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелое угнетение функции костного мозга, беременность, лактация.

Поб. действ.: Расстройства ЖКТ (тошнота, рвота), алопеция, геморрагический цистит, супрессия миелоцитов (лейкопения).

Примен. и доз.: Внутрь, в/в 40-60 мг/кг. Раствор готовится из расчета 5 мл растворителя на каждые 100 мг циклофосфамида.

Предост.: Требуется регулярное наблюдение гематологического профиля, проведение анализов мочи на наличие эритроцитов; рекомендуется употреблять больше жидкости (профилактика цистита).

Произв.: CSC (Италия)

Лейкеран® (Leukeran®)

Хлорамбуцил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит хлорамбуцила 2 или 5 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, хронический лимфоцитарный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, аденокарцинома яичников и рак молочной железы (запущенные случаи).

Противопоказ.: Не назначается больным, недавно получавшим лучевую или другую химиотерапию.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано (особенно в первом триместре беременности).

Поб. действ.: Миелосупрессия, гастроинтестинальные нарушения, нарушения функции печени, желтуха, кожная сыпь, лихорадка, периферическая нейропатия, пневмония, асептический цистит, судорожные припадки (у детей с нефротоксическим синдромом), аменорея, азоспермия; редко - синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некроз, легочный фиброз (при длительном применении), острый лейкоз (после лечения).

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям: лимфогранулематоз - 0,2 мг/кг в день (в течение 4-8 нед); неходжкинская лимфома - 0,1-0,2 мг/кг в день (4-8 нед); хронический лимфолейкоз - 0,15 мг/кг в день (до падения уровня лейкоцитов до 10000/мл), затем возможно возобновить лечение через 4 нед в дозе 0,1 мг/кг в день; макроглобулинемия Вальденстрема - 6-12 мг в день (до появления лейкопении), затем 2-8 мг в день. Запущенная карцинома яичников - 0,2 мг/кг в день (4-6 нед), поддерживающая доза - 0,2 мг/кг в день (2-4 нед) с перерывами в 2-6 нед между курсами. Запущенный рак молочной железы - 0,2 мг/кг в день (6 нед) или в сочетании с Метотрексатом, 5-Фторурацилом и Преднизолоном в дозе 5-7,5 мг/кв.м в день.

Предост.: Назначается под контролем анализа крови, функции почек и печени. При гипоплазии костного мозга суточная доза не должна превышать 0,1 мг/кг.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Лейковорин АДС (Leucovorin ADC)

Кальция фолинат*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит кальция фолината 50, 100 или 200 мг.

Фарм. действ.: Устранение дефицита фолиевой кислоты.

Показ.: Интоксикации метотрексатом и другими антагонистами фолиевой кислоты, мегалобластная анемия (на фоне дефицита фолиевой кислоты).

Противопоказ.: В₁₂-дефицитные мегалобластные анемии.

Бер. и корм. гр.: Назначают только в случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Уменьшает противосудорожную активность фенобарбитала, фенитоина и примидона, усиливает токсичность фторурацила.

Передоз.: Передозировка может значительно уменьшать или даже блокировать эффект препаратов-антагонистов фолиевой кислоты.

Примен. и доз.: В/м, в/в (скорость не более 160 мг/мин) или внутрь, через каждые 6 ч по 15 мг (10 мг/кв.м), пока уровень метотрексата в сыворотке не станет ниже 10-8 М; при мегалобластной анемии - 1 мг лейковорина ежедневно. Дозы свыше 25 мг следует назначать в/в.

Предост.: При назначении больших доз препарат растворяют в стерильной воде для инъекций, этот раствор хранению не подлежит.

Произв.: American Drug Company (США)

Лейкоген (Leucogenum)

Лейкоген

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лейкогена 0,02 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Лейкопоэтическое.

Показ.: Лейкопения при химио- и лучевой терапии опухолей.

Противопоказ.: Лимфогранулематоз, гемобластозы.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 мг 3-4 раза в день. Суточная доза для детей до 6 мес - 10 мг, 0,5-1 года - 20 мг, до 7 лет - 40 мг, свыше 7 лет - 60 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Лейкомакс (Leucomax®)

Молграмостим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит молграмостина 50, 150, 300, 400 и 700 или 1500 мкг.

Фарм. действ.: Лейкопоэтическое.

Показ.: Лейкопения (результат противоопухолевой терапии), миелодиспластические синдромы, апластическая анемия, инфекции (включая ВИЧ), после

трансплантации костного мозга (для ускорения восстановления миелопоэза), цитомегаловирусный ретинит у больных СПИДом (дополнение к ганцикловиру).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миелоидные лейкозы.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, стоматит, судороги, миалгии, астения, головные боли, головокружение, парезы, спутанность сознания, повышение внутричерепного давления, нарушения мозгового кровообращения, артериальная гипотония, обмороки, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, отек легких, повышенная капиллярная проницаемость, периферические отеки, экссудативный перикардит, экссудативный плеврит, одышка, бронхоспазм, лихорадка, боли в костях, неспецифические боли в области грудной клетки, повышенное потоотделение, снижение числа тромбоцитов, гемоглобина и уровня альбумина сыворотки крови, сыпь, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок, болезненность в месте введения.

Примен. и доз.: В/в или п/к - от 1 до 10 мкг/кг в день. Максимальная суточная доза - 10 мкг/кг. Раствор готовят непосредственно перед введением путем растворения порошка в бактериостатической или стерильной воде.

Предост.: Следует постоянно контролировать кровь (лейкоциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, гематокрит, концентрация альбумина). Лечение прекращают, если развиваются выраженные реакции гиперчувствительности (анафилактический шок, ангионевротический отек, бронхоспазм), экссудативный плеврит, экссудативный перикардит. С осторожностью назначают больным с заболеваниями легких или с аутоиммунной патологией в анамнезе.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Лекадол® (Lekadol®)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит парацетамола 500 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Жаропонижающее, обезболивающее.

Показ.: Болевой и лихорадочный синдромы (головная, зубная боль, дисальгоменорея, грипп, простудные заболевания).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая печеночно-почечная не-



достаточность, беременность, лактация, возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, запивая водой, 1-2 таблетки (до 8) в сутки с интервалом между приемом 4-6 ч; детям (до 12 лет) - 1/2-1 таблетка до 4 раз в сутки в течение не более 5 дней.

Пронзв.: Lek (Словения)

Лековит (Lekovit®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит витамина В₁ (тиамина мононитрата) 2 мг, витамина В₂ (рибофлавина натрий фосфата) 2,5 мг, витамина В₆ (пиридоксина хлорида) 4 мг, витамина В₁₂ (цианокобаламина) 2 мкг, никотинамида 20 мг, пантотената кальция 8 мг, витамина С (аскорбиновой кислоты) 100 мг, витамина Е (токоферола ацетата) 2,5 мг, биотина 30 мкг, витамина А (ретинола ацетата) 3000 МЕ, натрия гидрокарбоната 1,2 г; в упаковке 10 шт.

1 жевательная таблетка - витамина С (аскорбиновой кислоты) 9 мг, витамина В₁ (тиамина мононитрата) 0,2 мг, витамина В₂ (рибофлавина натрий фосфата) 0,24 мг, витамина В₆ (пиридоксина хлорида) 0,28 мг, никотинамида 2,6 мг.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов, повышение устойчивости к инфекциям.

Показ.: Витаминная недостаточность, повышенная потребность в витаминах (периоды роста, реконвалесценции, беременность, лактация, высокие физические и психические нагрузки), нарушения всасывания и метаболизма витаминов, в частности, при сахарном диабете, алкоголизме и в пожилом возрасте; общее плохое самочувствие, утомляемость, бессонница, потеря аппетита.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1-2 раза в день. Таблетку растворяют в 1/2 стакана (100 мл) воды.

Пронзв.: Lek (Словения)

Лековит С-Са (Lekovit® С-Са)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина С 500 мг и кальция карбоната 600 мг (240 мг ионизированного кальция); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витамина С и кальция, стабилизация клеточных мембран и снижение сосудистой проницаемости (ионы кальция), стимуляция окислительно-восстановительных реакций и повышение устойчи-

вости к инфекциям (аскорбиновая кислота).

Показ.: Гиповитаминоз С, цинга, повышенная потребность в витамине С (период реконвалесценции при гриппе и инфекциях верхних дыхательных путей, физическое и психическое напряжение, период интенсивного роста у детей, беременность, лактация), незаживающие раны и несрастающиеся переломы (дополнительное лечение).

Противопоказ.: Гиперкальциемия, нефролитиаз.

Поб. действ.: Головная боль, утомляемость, нарушение пищеварения, жажда и полиурия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки в сутки. Таблетку растворяют в 1/2 стакана (100 мл) воды.

Пронзв.: Lek (Словения)

Леконил (Lekonyl®)

Оксиметазолин*

Леконил П (Lekonyl® Р)

Оксиметазолин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит оксиметазолина гидрохлорида 0,5 мг (Леконил) или 0,25 мг (Леконил П); во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Вазоконстрикторное, альфа-адреномиметическое.

Показ.: Насморк (простудный, аллергический), синусит, евстахиит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, атрофический ринит, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, беременность, возраст (до 1 года).

Поб. действ.: Сухость и жжение в носоглотке, чихание. Редко - тошнота, головокружение, головная боль, нервозность, бессонница, сердцебиение, артериальная гипертензия.

Примен. и доз.: Интраназально, 1-2 капли 0,05% (Леконил), детям до 7 лет - 0,025% (Леконил П) раствора в каждую ноздрю 2-3 раза в день в течение 3 дней.

Пронзв.: Lek (Словения)

Лекоптин® (Lekoptin®)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит верапамила гидрохлорида 40, 80 или 120 мг; в упаковке 30 и 500, 50 или 20 шт. соот-

ветственно.

1 таблетка ретард - 240 мг.

1 ампула с 2 мл инъекционного раствора - 5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Суправентрикулярная тахикардия; пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (кроме синдрома WPW), синусовая тахикардия, мерцательная тахикардия, трепетание предсердий, предсердная экстрасистолия, вазоспастическая стенокардия, стенокардия напряжения, артериальная гипертензия, гипертонический криз, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, недавно перенесенный осложненный инфаркт миокарда (с явлениями брадикардии, гипотонии, левожелудочковой недостаточности), АВ-блокада, синдром слабости синусового узла, синдром Морганьи - Эдемса - Стокса, дигиталисная интоксикация, синдром WPW.

Поб. действ.: Тошнота, констипация, головокружение, головная боль, брадикардия, гиперемия кожных покровов лица и шеи, гипотония, атриовентрикулярная диссоциация, первый триместр беременности.

Взаим.: Усиливает эффекты гипотензивных препаратов и диуретиков; действие лекоптина повышают бета-блокаторы, противоаритмические и ингаляционные анестетические средства.

Примен. и доз.: В/в (медленно), 5-10 мг, поддерживающая доза - 5-10 мг/ч (100 мг/сутки); дети: новорожденные - 0,75-1 мг, до 1 года - 0,75-2 мг, 1-5 лет - 2-3 мг, 6-14 лет - 2,5-5 мг; при гипертоническом кризе суточная доза - 1,5 мг/кг (скорость введения не более 0,05-0,1 мг/кг/ч). Внутрь, за 30 мин до еды с небольшим количеством воды - 240-480 мг/сутки (в 3 приема); грудным и маленьким детям - 20 мг 2-3 раза в день, детям более старшего возраста или взрослым - 40 мг 2-3 раза в день.

Произв.: Lek (Словения)

Лекролин (Lecrolin®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит натрия кромогликата 20 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, стабилизация мембран тучных клеток.

Показ.: Острые и хронические весенние сеннозы, аллергические кератоконъюнктивиты, конъюнктивиты, кератиты.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: По 1-2 капли в оба глаза 4 раза в сутки.

Произв.: Santen (Финляндия)

Лексилиум (Lexilium®)

Бромазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромазепам 1,5; 3 или 6 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, анксиолитическое, снотворное, миорелаксантное, противосудорожное.

Фармакокин.: Быстро и полностью всасывается из ЖКТ. C_{max} в плазме достигается через 1-4 ч после приема. $T_{1/2}$ - 20-28 ч.

Показ.: Эмоциональные расстройства, состояния психического напряжения, тревоги, неуверенности, страха; нервность, бессонница; функциональные неврозы сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, ретикуло-эндотелиальной системы, сопровождающиеся ложной стенокардией, головной болью, дерматозами, астмой, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсией, неспецифическим язвенным колитом; психоневрозы, психогенные реакции, обусловленные острым и хроническим алкоголизмом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, глаукома, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, головная боль, рвота, слабость, раздражение; тошнота, привыкание, зависимость. Передозировка проявляется выраженным седативным эффектом, спутанностью сознания.

Взаим.: Усиливается седативное действие нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов, снотворных.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым, амбулаторно - по 1,5-3 мг 3 раза в день. При тяжелых формах заболеваний в условиях стационара - по 6-12 мг не более 2 раз в день. Пожилым дозу уменьшают вдвое. Курс лечения - 3-6 нед. Отмену препарата производить постепенно.

Предост.: Воздержаться от употребления алкоголя.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Лендацин® (Lendacin®)**Цефтриаксон***

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефтриаксона в виде натриевой соли 250 или 1000 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, широкого спектра.

Фармакокин.: Хорошо и быстро всасывается после в/м и в/в введения и проникает в ткани и биожидкости, включая спинномозговую (в частности, при воспалении мозговой оболочки). Период полуэлиминации - 8 ч. В течение 24 ч после приема терапевтической дозы - концентрация в организме выше минимальной ингибирующей для большинства возбудителей инфекций. От 30 до 60% выводится в активном виде почками, остальное - печенью (с желчью).

Фармакодин.: Оказывает бактерицидное действие на множество грамотрицательных и грамположительных бактерий. Высокочувствительными видами являются: *Proteus mirabilis*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter*, индол-положительный *Proteus*, *Streptococcus viridans*, *Streptococcus pneumoniae*. Умеренно чувствительными штаммами являются: *Serratia marcescens*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Bacteroides fragilis*, *Clostridium* spp., *Chlamydia trachomatis*. Слабочувствительными штаммами являются: *Pseudomonas* spp. (кроме *P. aeruginosa*), *Streptococcus faecalis*, *Mycoplasma hominis* и патогенные грибки. Устойчив к действию большинства бета-лактамаз и поэтому действует на штаммы с приобретенной толерантностью к другим цефалоспорином.

Клин. фарм.: После исчезновения симптомов инфекции больного лечат минимум еще три дня. Вопреки обычному принципу химиотерапии, у больных с нарушенной функцией почек (но нормальной функцией печени) дозы цефтриаксона можно не снижать.

Показ.: Инфекции мочеполовой и дыхательной систем, костей, суставов, кожи, ран и мягких тканей, ЛОР-органов, стоматологические, брюшные инфекции, сепсис, бактериальный менингит, гонорея, мягкий шанкр, для профилактики

инфекции при хирургических вмешательствах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Показано в случаях, когда ожидаемый эффект превышает возможное негативное влияние на плод.

Поб. действ.: Нарушения пищеварения: понос, рвота, стоматит, псевдомембранозный колит, тромбоцитоз, эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, кожные реакции (экзантема, аллергический дерматит, крапивница), инфильтраты, флебит (в месте инъекции).

Взаим.: Действует синергически с аминогликозидами, что является важным при лечении тяжелых инфекций, вызываемых *Pseudomonas aeruginosa*.

Примен. и доз.: В/м (250 мг препарата растворяют в 2 мл, а 1000 мг - в 3,5 мл 1% раствора лидокаина), глубоко в ягодичную мышцу, в/в (250 мг препарата растворяют в 5 мл, а 1000 мг - в 10 мл воды для инъекций) медленно, от 2 до 4 мин. В/в инфузия - минимум 30 мин (2000 мг препарата растворяют в 40 мл инфузионного раствора, не содержащего кальция: 0,45 или 0,9% хлорид натрия, 2,5; 5 или 10% глюкоза, 5% леулоза, 6% декстран в глюкозе). Взрослым и детям старше 12 лет - 1-2 г (до 50 мг/кг) 1-2 раза в сутки (не более 4 г); детям до 12 лет - не более 50-75 мг/кг в сутки в 2 приема (не более 2 г в сутки). При смертельно опасных инфекциях - максимальная суточная доза 4 г в виде в/в инфузии в течение 30 мин каждые 12 ч. Рекомендуются дозы не должны превышать 50 мг/кг веса тела.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с тяжелой недостаточностью почек и печени (необходим контроль концентрации в плазме), новорожденным с гипербилирубинемией и недоношенным детям, больным с аллергией (в анамнезе) к пенициллинам (возможна перекрестная аллергизация). При длительном лечении следует периодически проверять клеточный состав периферической крови.

Пронзв.: Lek (Словения)

Лескол (Lescol®)**Флувастатин***

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флувастатина (в форме натриевой соли) 20 или 40 мг.

Фарм. действ.: Гипохолестеринемическое.

Показ.: Первичная гиперхолестеринемия (при неэффективности диетотерапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, активный патологический процесс в печени, повышение концентрации в крови печеночных трансаминаз неясного генеза, детородный возраст у женщин, не применяющих адекватных методов контрацепции.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, боли в животе, диспептические явления, метеоризм, повышение активности печеночных трансаминаз, головная боль.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20-40 мг 1 раз в сутки вечером. При очень высоких уровнях холестерина доза может быть увеличена до 40 мг 2 раза в день.

Предост.: До начала и в процессе лечения следует назначить стандартную диету, способствующую снижению уровня холестерина. Необходима осторожность при назначении пациентам с диффузными миалгиями, повышением или снижением тонуса мышц неизвестного генеза, выраженным повышением концентрации креатинфосфокиназы в крови, тяжелой почечной недостаточностью, с анамнестическими сведениями о заболеваниях печени, злоупотреблении алкоголем.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Леспенефрил® (Lespenephryl®)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для приема внутрь содержат спиртовой настойки растения Леспедеза Капитата 15 мл, эссенции аниса 0,25 мл и спирта 70% до 100 мл; во флаконах по 120 мл.

Фарм. действ.: Диуретическое; противоазотемическое.

Фармакодин.: Увеличивает почечную фильтрацию.

Показ.: Хроническая почечная недостаточность (для симптоматической терапии).

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, по 1 чайной ложке на 0,5-1 стакан воды 4 раза в день, в более тяжелых случаях - до 6 чайных ложек в день.

Предост.: Не следует назначать совместно со средствами антиалкогольного действия (из-за присутствия в обычной дозе - 1 чайная ложка 4 раза в день - чистого алкоголя в количестве 2,9-11,6 г), с психотропными препаратами. Не рекомендуется принимать водителям транспорт-

ных средств (из-за наличия алкоголя) во время работы.

Произв.: UCB (Бельгия)

Леузея (Leuzea)

Сост. и ф.в.: Спиртовой жидкий экстракт левзеи сафлоровидной (*Leuzea carthamoides*) во флаконах из темного стекла по 50 мл.

Фарм. действ.: Общетонизирующее, адаптогенное.

Показ.: Неврозы, беспокойство, слабость, чрезмерные физические и психические нагрузки, снижение потенции, период реконвалесценции.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия, аритмии, инфекции, психозы, дебильность.

Поб. действ.: Диспепсия.

Примен. и доз.: По 15-30 капель 3-4 раза в день.

Предост.: Следует иметь в виду, что препарат содержит алкоголь.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Либексин (Libexin®)

Преноксдиазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит преноксдиазина 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противокашлевое (периферического действия), спазмолитическое, противовоспалительное, местноанестезирующее.

Показ.: Инфекции верхних дыхательных путей, острые и хронические бронхиты, бронхопневмония, бронхиальная астма, эмфизема; бронхоскопия и бронхография (в сочетании с атропином).

Противопоказ.: Обильная бронхиальная секреция.

Поб. действ.: Онемение и сухость слизистой оболочки полости рта и горла, тошнота, диарея, аллергические реакции (кожная сыпь, ангионевротический отек).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1-2 таблетки 2-4 раза в день; детям в зависимости от возраста и массы тела - по 1/4-1/2 таблетки 3-4 раза в день. Таблетки проглатывают, не разжевывая (во избежание онемения слизистой оболочки полости рта).

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Лидаприм (Lidaprim®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфаметрола 400 мг и триметоприма 80 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

1 таблетка для детей - 100 и 20 мг соответственно; в упаковке 20 и 100 шт.

5 мл суспензии для приема внутрь - 200 и 40 мг соответственно; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антимикробное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: C_{max} в крови отмечается через 2-3 ч после приема внутрь и сохраняется в течение 7 ч. Элиминация происходит в основном через почки, частично - с желчью. Хорошая растворимость сульфаниламидных компонентов препарата полностью исключает опасность кристаллурии (как при использовании высоких доз, так и при длительном приеме).

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, мочеполовые инфекции (включая гонорею), инфекции ЖКТ и желчевыводящих путей, кожи и мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции печени, почек, гематопоз, беременность, лактация, детский возраст (до 6 нед).

Поб. действ.: Нарушение аппетита, сухость во рту, тошнота, рвота, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 2 таблетки 2 раза в день утром и вечером после еды (не менее 5 дней); при тяжелых инфекциях дозу увеличить вдвое, при гонорее - 8 таблеток однократно в течение 2 дней. Детям - суспензия 2 раза в день (от 6 нед до 5 мес - по 2,5 мл; от 6 мес до 5 лет - по 5 мл; от 6 до 12 лет - по 10 мл) или таблетки для детей - 2 раза в день (от 2 до 5 лет - по 2 таблетки; от 6 до 12 лет - по 4 таблетки).

Предост.: С осторожностью назначают с гипогликемическими средствами и непрямыми антикоагулянтами.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Лидокаин (Lidocaine)

Лидокаин*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит лидокаина 4,8 мг; во флаконах по 65 г, содержащих 3,8 г препарата.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Анестезия слизистых и кожных покровов в стоматологической, отоларингологической, гинекологической, дерматологической практике, при эндоскопических исследованиях; преждевременная эякуляция.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Чувство жжения на месте аппликации.

Примен. и доз.: Местно, для достижения обезболивания достаточно 1-3 экспозиций; в гинекологической практике в отдельных случаях - до 15-20 экспозиций. Максимально допускается 40 экспозиций. Детям старше 2 лет - 1-2 экспозиции.

Произв.: Egis (Венгрия)

Лидокаин (Lidocaine)

Лидокаин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит лидокаина гидрохлорида 200 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, местноанестезирующее.

Показ.: Желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия при остром инфаркте миокарда, коронарном склерозе, органических заболеваниях сердца; хроническая ишемическая болезнь сердца.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, АВ-блокада, брадикардия, кардиогенный шок, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, сонливость, беспокойство, эйфория, звон в ушах, расстройства речи, зрения, тремор, судороги, дезориентация, гипотония, брадикардия, нарушение проводимости.

Примен. и доз.: В/м до 4 мг/кг, обычно 200-300 мг - при остром инфаркте миокарда, при желудочковой экстрасистолии - 100-200 мг каждые 4 ч.

Произв.: Egis (Венгрия)

Лидокаин (Lidocaine)

Лидокаин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит лидокаина гидрохлорида 20 мг; в ампулах по 2 и 10 мл; в упаковке 100 и 10 шт соответственно.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее, антиаритмическое.

Показ.: Желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия в острой фазе инфаркта миокарда, во время и после наркоза, при передозировке сердечных гликозидов; проводниковая анестезия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, АВ-блокада II-III степени, брадикардия, кардиогенный шок, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, сонливость, беспокойство, эйфория, звон в ушах, расстройства речи, зрения, тремор, судороги, дезори-

ентация, гипотония, брадикардия, нарушение проводимости.

Примен. и доз.: В/м, по 2-4 мг/кг массы тела каждые 4-6 ч. В/в струйно - 1-2 мг/кг (не более 100 мг), инъекции можно повторять каждые 3-5 мин (суммарная доза - 300 мг); в/в капельно на изотоническом растворе или растворе Рингера - 20-55 мкг/кг/мин (не более 2 мг/мин) в течение 24-36 ч. Для местной анестезии - 5-10 мл раствора.

Произв.: Egis (Венгрия)

Лидокаина гидрохлорид (Lidocaini hydrochloridum)

Лидокаин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит лидокаина гидрохлорида: 10 мг в ампулах по 10 мл.

20 мг в ампулах по 2 и 10 мл.

100 мг в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее, антиаритмическое.

Показ.: Все виды местной анестезии (инфильтрационной, проводниковой и поверхностной), экстрасистолия, желудочковая тахикардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, слабость синусового узла у больных пожилого возраста, брадикардия, расстройство функции печени.

Поб. действ.: При быстром введении эйфория, головокружение, судорожные подергивания, нарушение внешнего дыхания, коллапс.

Примен. и доз.: Парентерально и местно. В инфильтрационной анестезии применяют 0,125%, 0,25%, 0,5%, максимальная доза - до 2000 мг. Остальные виды анестезии - 1-2% раствор. Максимальная доза - до 400 мг. Для терминальной анестезии слизистой при бронхоскопии распыляют 10% раствор (не более 200 мг - 2 мл). В качестве антиаритмического средства - в/в, 80-120 мг в течение 3-4 мин, далее - капельно, 2 мг/мин (всего 250-500 мг). Затем - через каждые 3 ч по 200-400 мг в/м. Максимальная доза - 2000 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия)

Лизавир (Lisavyr®)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацикловира 200, 400 или 800 мг; в упаковке 25 шт.

1 г крема - 50 мг; в тубах по 3 и 10 г.

Фарм. действ.: Противовирусное (селективно ингибирует вирусы группы герпеса).

Показ.: Герпетические инфекции кожи и слизистых оболочек, первичный и рецидивирующий герпес половых органов, опоясывающий лишай, профилактика герпеса у больных с иммунодефицитом, ветряная оспа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. Для профилактики - 200-400 мг каждые 6 ч (для профилактики больным с нарушением всасывания в ЖКТ, с иммунодефицитом, для лечения рецидивирующего простого герпеса) или по 200 мг с интервалом в 4 ч на протяжении 5 дней. Для лечения опоясывающего лишая и ветряной оспы - 800 мг 5 раз в день через 4 ч (лечение продолжается 3 дня после исчезновения признаков заболевания); детям до 2 лет - 1/2 дозы взрослых. Накожно (крем) на пораженную кожу 5 раз в день с интервалом 4 ч (не допускать попадания в глаза, слизистую рта и влагалища).

Произв.: Lisapharma (Италия)

Лизоплак (Lysoplac®)

Сост. и ф.в.: 100 мл жидкого геля содержат хлоргексидина диглюконата 10 мг, натрия цитрата 1000 мг, натрия бората 500 мг и диметикона 100 мг; во флаконах по 250 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, удаление зубного налета, профилактика образования зубного камня, придание блеска зубам.

Показ.: Кислотный налет на зубах, образование зубного камня (профилактика).

Примен. и доз.: Полоскать рот (перед чисткой зубов) 10 мл (половина дозирующего колпачка) в течение 30 с.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Ликацин (Likacin®)

Амикацин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с раствором для инъекций содержит амикацина 100 или 500 мг (в форме сульфата).

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: $T_{1/2}$ - около 3 ч, терапевтическая концентрация сохраняется в

плазме до 10-12 ч, выводится почками (90% в неизмененном виде).

Показ.: Бактериemia и септицемия (включая сепсис новорожденных), инфекции мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, дыхательных путей, костей и суставов, интраабдоминальные и послеоперационные инфекции, менингит, инфицированные ожоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Нарушения слуха, деятельности почек, ЦНС.

Взаим.: "Петлевые" диуретики усиливают ототоксичность.

Примен. и доз.: В/м, в/в, в/в капельно - 10-15 мг/кг в сутки в 2-3 приема (высшая доза - 1,5 г/сутки, на курс - 15 г); новорожденным и недоношенным детям - ударная доза 10 мг/кг в сутки, затем - по 7,5 мг/кг в два приема.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Ликопид® (Licopid®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит N-ацетилглюкозаминил-1-4-N-ацетилмурамоил-аланил-D-изоглутамина 1 или 10 мг; в блистерной упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Иммунокорригирующее, противовоспалительное.

Фармакодин.: Стимулирует функциональную активность макрофагов. Активация клеток фагоцитарной системы приводит к стимуляции синтеза цитокинов, которые усиливают образование антител, повышают цитотоксическую активность макрофагов, естественных киллеров и Т-лимфоцитов.

Показ.: Острые и хронические гнойно-воспалительные процессы любой локализации (травмы, ранения, трофические язвы и длительно незаживающие раны любого происхождения), хронические заболевания дыхательных путей (ларингит, трахеит, бронхит, пневмония), поражения шейки матки вирусом папилломы человека, туберкулез и псориаз (все формы), стромальные формы герпеса.

Противопоказ.: Нет.

Примен. и доз.: Внутрь, герпетический кератит - 10 мг 2 раза в день натощак 3 дня подряд с трехдневным перерывом в сочетании с основным лечением (мазь Зовиракс 3-4 раза в день или др. противовирусные препараты) в течение 6 дней. Для профилактики гнойных послеоперационных осложнений - сублингвально 1 мг в сутки в течение 10 дней, послеоперационные гнойные ос-

ложнения средней тяжести - сублингвально 2 мг 2-3 раза в сутки в течение 10 дней, тяжелые послеоперационные гнойные осложнения - внутрь 10 мг в сутки в течение 10-20 дней; трофические язвы (малой площади раны) - сублингвально 2 мг 1 или 2 раза в сутки в течение 10 дней, язвы (большая площадь раны) - внутрь 10 мг в сутки в течение 10 дней; при необходимости курс повторить через 1 мес. Хронические заболевания дыхательных путей в стадии обострения - сублингвально, утром натощак, 1-2 мг 1 раз в день в течение 10 дней в комплексе с антибактериальной и симптоматической терапией; при ремиссии хронического процесса с целью профилактики обострения - внутрь 10 мг 1 раз в день в течение 10 дней. Поражения шейки матки вирусом папилломы человека до 25-30% и легком койлоцитозе рекомендуется мономмунотерапия - внутрь, утром, натощак тремя недельными курсами по 10 мг в день с двухнедельными интервалами между курсами (всего 20 таблеток по 10 мг), при площади поражения шейки матки вирусом папилломы человека более 30% и умеренном или выраженном койлоцитозе и диспазии - комплексная терапия: сочетание лазердеструкции с иммунотерапией - внутрь, утром, натощак на 8 день после хирургического лечения по 10 мг в день в течение 10 дней (всего 10 таблеток по 10 мг), при наличии бактериальных вагинозов - 10 мг в день в течение 10-20 дней (всего 10-20 таблеток по 10 мг). Псориаз - внутрь, утром и вечером, 10 мг 2 раза в день в течение 10 дней и далее через день 5 раз (всего на курс 3 упаковки по 10 таблеток); при тяжелых и запущенных формах псориаза - по той же схеме, но 1 раз в день в течение 20 дней (всего 4 упаковки по 10 таблеток). Туберкулез - внутрь, утром, натощак тремя циклами: по 6-7 дней с интервалами в 2 нед по 10 мг ежедневно.

Произв.: Пептек (Россия)

Ликреаза (Licrease®)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 капсула с гастрорезистентными микрогранулами диаметром 1,5 мм содержит вытяжки из поджелудочной железы 370 мг (протеолитическая активность 660 ЕЕФ, липолитическая активность 12000 ЕЕФ, амилалитическая активность 14000 ЕЕФ) и гидроксипропилцеллюлозы 22,2 мг; в упаковке 24 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Фармакокин.: Капсулы распадаются в желудке, высвобождая стабильные микрогранулы, не подвергающиеся распаду в среде желудка с рН ниже 5,5. Энзиматическая активность проявляется при рН выше или равном 5,5 и длится 1 ч; при рН=6 - не менее 45 мин; при рН=6,8 (в дуоденальной среде) - не менее 25 мин; при рН=8,1 - не менее 15 мин. Сохраняет активность в условиях кислой рН от 1 до 5.

Показ.: Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, хронический панкреатит, муковисцидоз, диспепсия, старческие состояния поджелудочной железы, после оперативного вмешательства на органах пищеварения.

Примен. и доз.: Внутрь, в начале еды; прием капсул распределяется равномерно в течение дня. Новорожденным - по 1-2 капсулы в день (не более 4 капсул), можно предварительно раскрыть капсулы и развести молоком. Детям младше 5 лет - по 2-4 капсулы в день, от 5 до 10 лет - по 4-6 капсул в день, старше 10 лет - по 6-8 капсул в день. Взрослым при недостаточности функции поджелудочной железы и муковисцидозе - 6-9 капсул в день (рекомендуется раскрыть капсулы перед приемом).

Предост.: Во время терапии дозу увеличивать постепенно (из-за высокой концентрации липазы) для исключения субокклюзии (при передозировке). Гранулы не жевать.

Произв.: Laboratoires Laphal (Франция)

Лимонтар® (Limontar)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит янтарной кислоты 0,2 г и лимонной кислоты моногидрата 0,05 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиалкогольное; стимуляция секреции желудочного сока, повышение аппетита, регуляция тканевого обмена, усиление окислительно-восстановительных процессов.

Показ.: Профилактика опьянения, алкогольное опьянение легкой и средней тяжести, запойные состояния у больных хроническим алкоголизмом, абстиненция, астеновегетативные расстройства (общая слабость, снижение работоспособности, аппетита), исследование секреторной и кислотообразующей функции желудка.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия, глаукома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ишемическая болезнь сердца, шизофрения.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Гастралгия (проходящая самостоятельно через 3-5 мин), артериальная гипертензия.

Взаим.: Снижает действие барбитуратов, транквилизаторов.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, растворив в воде, соке. Для профилактики алкогольной интоксикации - по 0,25 г за 20-60 мин до приема алкоголя; в период алкогольной интоксикации - по 0,25 г 2-4 раза с интервалом 1-2,5 ч; в период запоя - по 0,25 г 3-4 раза в сутки в течение 4-10 дней; при алкогольном абстинентном синдроме - по 0,25 г 3-4 раза в сутки в течение 4-10 дней как самостоятельно, так и в комплексе с традиционными лекарственными средствами; при нарушении аппетита - по 0,25 г 1-3 раза перед едой в течение 3-5 дней. При появлении чувства тяжести в эпигастральной области - после еды.

Произв.: Биотики (Россия)

Лимфомиозот (Lymphomyosot®)

Сост. и ф.в.: 100 г 35% спиртового раствора содержат Myosotis arvensis D3, Veronica D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus silvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hiemale D4, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxin D12, Aranea diadema D6 по 5 г, Geranium robertianum D4, Nasturtium aquaticum D4, Ferrum jodatum D12 по 10 г; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное, противоаллергическое, дренажное, противозкссудативное.

Показ.: Хронические воспалительные гипертрофические процессы, в т.ч. с признаками аллергизации организма (увеличение лимфатических узлов, экссудативный диатез, аденоиды, тонзиллит), отечный синдром (сердечный, лимфатический, почечный); расстройства дезинтоксикационной функции печени, нарушения водно-солевого обмена, связанные с задержкой жидкости в организме (после операций, травм и различных заболеваний внутренних органов), онкопроцессы.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, обычно по 10 капель 3 раза в день. При опухоловой патологии комбинируют с Хепель, Псо-ринохель, Галиум-Хель, Траумель С, Энгистол Н.

Предост.: При заболеваниях щитовидной железы не следует принимать без консультации с врачом.

Произв.: Heel (Германия)

Линекс (Linex®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула (1 г) содержит минимально $1,2 \times 10^7$ живых молочнокислых лиофилизированных бактерий *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Streptococcus faecium*; в упаковке 16 шт.

Фарм. действ.: Антидиарейное, восстановление нормальной микрофлоры кишечника.

Фармакодин.: Молочнокислые бактерии, входящие в состав препарата, продуцируют молочную и в меньшей степени уксусную и пропиленовую кислоты. Создаваемая в кишечнике кислая среда является неблагоприятной для развития патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Молочнокислые бактерии участвуют в резорбции моносахаридов, стабилизируют мембраны клеток кишечного эпителия и регулируют всасывание электролитов и синтез витаминов В₁, В₂, В₆, В₁₂, К, Е, РР, биотина.

Показ.: Диарея различного генеза во всех возрастных группах (в т.ч. у грудных младенцев), дисбактериоз, суперинфекции, возникающие во время лечения антибиотиками широкого спектра и химиотерапевтическими средствами, метеоризм, острые и хронические гастроэнтероколиты и колиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Устойчив к антибиотикам и химиотерапевтическим средствам.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 капсулы 3 раза в день, запивая небольшим количеством жидкости; грудным и детям до 2 лет - содержимое 1 капсулы 3 раза в сутки; детям 2-12 лет - содержимое 1-2 капсул 3 раза в сутки (капсулу вскрывают и смешивают содержимое с небольшим количеством жидкости - чай, сок, подслащенная вода).

Произв.: Lek (Словения)

Линкомицина гидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum)

Линкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит линкомицина гидрохлорида моногидрата 0,25 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Сепсис, остеомиелит, бактериальный эндокардит, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры, раневая инфекция, гнойный менингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гастралгия, диарея, колит псевдомембранозный, аллергические реакции (крапивница, дерматиты).

Примен. и доз.: Внутрь, за 1-2 ч до еды, по 0,5 г через 8-12 ч; детям - по 30-60 мг/кг/сут.

Произв.: Акрихин (Россия)

Линкомициновая мазь (Unguentum Lincomycini)

Линкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит 2% линкомицина; в банках по 60 г или в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое.

Показ.: Гнойно-воспалительные заболевания кожи, вызванные грамположительной микрофлорой, стрептококками, стафилококками, анаэробами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженное место 2-3 раза в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Лиотон® 1000 (Lioton® 1000)

Гепарин натрия*

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат гепарина натрия 100000 ЕД; в тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное (прямое), противовоспалительное, противоотечное, антипролиферативное.

Фармакокин.: С_{max} в крови достигается через 8 ч после аппликации и возвращается к нормальному уровню через 12-24 ч. Выводится, в основном, с мочой.

Клин. фарм.: Применение Лиотона 1000 не вызывает нарушения параметров свертываемости крови.

Показ.: Варикозный синдром и его осложнения: флеботромбоз, тромбоз флебит, поверхностный перифлебит, варикозная язва; послеоперационный варикозный флебит; осложнения после хирургического удаления подкожной вены ноги; травмы, в т.ч. мышечно-сухожильных и капсуло-суставных тканей; ушибы, инфильтраты, локальные отеки; подкожные гематомы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Может удлинять протромбиновое время при одновременном пероральном применении антикоагулянтов.

Передоз.: Антагонистом является протамин сульфат.

Примен. и доз.: Накожно, 3-10 см геля втирают в кожу пораженного участка 1-3 раза в день.

Предост.: Не следует применять при кровотечениях, наносить на открытые раны и слизистые оболочки, при наличии гнойных процессов. С большой осторожностью используют при геморрагических процессах.

Пр о и з в .: Berlin-Chemie / Menarini Group (Германия / Италия)

Липамид (Lipamidum)

Тиоктовая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амида тиоктовой (липоевой) кислоты 0,025 г.

Фарм. действ.: Гипохолестеринемическое, гепатопротекторное.

Показ.: Коронарный атеросклероз (I-III степени), кардиосклероз, ревматические клапанные пороки сердца (с недостаточностью кровообращения IIА и IIБ степени), заболевания печени: болезнь Боткина среднетяжелого течения, хронический гепатит, цирроз печени (без выраженных явлений печеночной недостаточности); диабетический полиневрит.

Поб. действ.: Изжога, тошнота.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 0,025-0,05 г 3 раза в день (0,075-0,15 г/сутки) в течение 3-4 нед.

Против.: Марбиофарм (Россия)

Липанор (Liponor®)

Ципрофибрат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ципрофибрата 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, гипофибри-

ногенемическое, фибринолитическое, снижение содержания триглицеридов, торможение биосинтеза холестерина, усиление его распада и повышение выделения с желчью, восстановление плазменного липопротеинового профиля: уменьшение количества липопротеидов очень низкой и низкой плотности (ЛПОНП и ЛПНП) и увеличение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).

Фармакокин.: Максимальная концентрация в плазме достигается через 2 ч; прочно связывается с белками плазмы; $T_{1/2}$ в плазме - около 17 ч. Выводится как глюкуронид и в неизменном виде.

Клин. фарм.: При длительном применении вызывает регрессию сухожильных ксантом. Возможно значимое повышение активности сывороточных трансаминаз.

Показ.: Эндогенные гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии у взрослых (изолированные или ассоциированные), не коррегируемые диетой и/или при наличии факторов риска.

Противопоказ.: Печеночная или почечная недостаточность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, слабость, кожные высыпания, увеличение (без клинических проявлений) сывороточных трансаминаз, креатинина и/или лактатдегидрогеназы, развитие (обострение) желчнокаменной болезни.

Взаим.: Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов (антивитаминов К). Несовместим с гепатотоксическими средствами (малеат перексиллита, ингибиторы МАО и др.); можно сочетать с производными никотиновой кислоты и гипохолестеринемическими препаратами из группы смол.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки в день; при гипоальбуминемии или почечной недостаточности дозу подбирают индивидуально.

Предост.: Если после применения препарата в течение 3-6 мес не достигнуто удовлетворительное снижение концентрации сывороточных липидов, должны быть назначены дополнительные или другие терапевтические средства. Необходимо систематическое определение трансаминаз каждые 2-3 мес в течение первого года терапии. Если концентрация сывороточной глутамат-пируват трансаминазы превышает 100 мг, лечение рекомендуется прекратить. При совместном применении с антивитаминами К (непрямыми антикоагулянтами) дозу последних следует уменьшить на 1/3,

при этом обязателен контроль уровня протромбина в плазме.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Липоевая кислота (Acidum lipoicum)

Тиоктовая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит липоевой (тиоктовой) кислоты 12 или 25 мг.

Фарм. действ.: Липотропное, гепатопротекторное.

Показ.: Заболевания печени, атеросклероз, диабетический полиневрит, интоксикации.

Противопоказ.: Язвенная болезнь, гиперацидный гастрит, склонность к аллергическим реакциям.

Поб. действ.: Диспептические явления, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 25 - 50 мг 2-3 раза в день. Курс лечения - 20-30 дней.

Произв.: Марбиофарм (Россия)

Липомал (Lipomal®)

Пробукол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пробукола 250 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, антисклеротическое.

Фармакодин.: Снижает уровень общего холестерина в плазме (главным образом, за счет ЛПНП), угнетает всасывание пищевого холестерина и синтез холестерина на ранних стадиях. Практически не влияет на уровень триглицеридов, ЛПОНП, в меньшей степени уменьшает содержание ЛПВП. Усиливает экскрецию желчных кислот, не повышая при этом риск образования желчных камней.

Показ.: Гиперхолестеринемия, гиперлипемия IIА и IIБ типов, гиперлипопротеинемия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, гастралгия, метеоризм.

Примен. и доз.: Внутрь, по 500 мг 2 раза в сутки во время завтрака и ужина в течение 3-4 мес, после чего делают перерыв на 2-3 нед.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Липостабил (Lipostabil®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула форте содержит "эссенциальных" фосфолипидов 300 мг

и этофиллина 50 мг; в упаковке 50 шт.

5 мл раствора для инъекций - "эссенциальных" фосфолипидов 250 мг, пиридоксина гидрохлорида 2 мг, никотиновой кислоты 1 мг и аденозин-5-монофосфата 1 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гиполипидемическое, антиатеросклеротическое.

Клин. фарм.: "Эссенциальные" фосфолипиды (диглицеридные эфиры холинфосфорной кислоты природного происхождения с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот, в основном линолевой - 70% и олеиновой) нормализуют содержание липопротеинов, снижают повышенный уровень липидов в крови, мобилизуют холестерин и способствуют его выведению из стенок артерий, уменьшают атеросклеротические поражения сосудов, улучшают реологические свойства крови.

Показ.: Гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, атеросклероз, нарушения коронарного, церебрального и периферического кровообращения, стенокардия, состояние после инфаркта миокарда и инсульта, диабетическая ангиопатия, профилактика тромбоэмболии перед оперативным вмешательством, профилактика и лечение жировой эмболии (раствор).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Фармацевтически несовместим с растворами электролитов.

Примен. и доз.: В/в медленно. Для разведения используют только растворы сахаров (глюкоза, левоулеза) или собственную кровь больного. В начале лечения вводят по 10-20 мл ежедневно в течение 2-4 нед. Дополнительно перед едой 3 раза в день принимают по 2 капсулы препарата. Поддерживающая терапия - по 2 капсулы 3 раза в день в течение 12 нед. При жировой эмболии - 40 мл в течение 3-4 дней (профилактика) или 80 мл в сутки дробными дозами по 20-40 мл (лечение).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Липостат (Lipostat®)

Правастатин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит правастатина натрия 10 или 20 мг; в упаковке 14 или 28 шт.

Фарм. действ.: Гиполипидемическое, подавление синтеза холестерина, конкурентное ингибирование CoA-редуктазы.

Фармакокин.: Быстро всасывается, среднее всасывание составляет 34%, аб-

солютная биодоступность 17%. Гиполипидемические эффекты аналогичны при приеме вместе с пищей или за 1 ч до еды. Концентрации препарата в плазме крови прямо пропорциональны введенной дозе. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-1,5 ч. В стационарном состоянии значение площади под кривой (AUC), $C_{\max}$ и $C_{\min}$ не обнаруживают признаков накопления после однократного или двукратного приема препарата в течение дня. В кровотоке 50% препарата связано с белками. Время полувыведения из плазмы составляет 1,5-2 ч. Около 20% пероральной дозы выделяется с мочой и 70% - с фекалиями.

Фармакодин.: Обладает тканевой селективностью, эффект проявляется в печени, в подвздошной кишке.

Клин. фарм.: Максимальный эффект развивается в течение 4 нед; снижается общий холестерин, холестерин, связанный с ЛПНП и ЛПОНП, аполипопротеид В, триглицериды, увеличивается содержание холестерина, связанного с ЛПВП, и аполипопротеид А.

Показ.: Профилактика ишемической болезни сердца на фоне гиперхолестеринемии для снижения риска инфаркта миокарда, необходимости операций по реваскуляризации миокарда, сердечно-сосудистой смертности; гиперхолестеринемия (в т.ч. при неэффективности диетотерапии) и в сочетании с гипертриглицеридемией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, обострение заболеваний печени, недиагностированные персистирующие повышения показателей функциональных тестов печени; возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано. Если беременность наступает в период применения препарата, прием следует прекратить.

Поб. действ.: Миалгия, миопатия, рабдомиолиз, повышение креатинфосфокиназы, сыпь на коже.

Взаим.: Гипогликемические эффекты усиливаются смолой, связывающей желчные кислоты, фибраты, циклоспорин, эритромицин, неоцин повышают риск миопатии. Холестирамин при совместном применении уменьшает площадь под кривой на 40-50%.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи, 10-20 мг 1 раз в день. При исходном общем холестерине более 300 мг/дл - 40 мг в день.

Предост.: С осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени в анамнезе, при злоупотреблении алкого-

лем. При возникновении мышечных болей, болезненности или слабости (что может быть следствием ингибции СоА-редуктаз) необходимо немедленно обратиться к врачу. Прием следует прекратить при значительном увеличении содержания креатинфосфокиназы и подозрении на миопатию.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Лития карбонат (Lithii carbonas)

Лития карбонат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лития карбоната 0,3 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, седативное.

Показ.: Маниакальные состояния различного генеза, фазнопротекающие психозы.

Противопоказ.: Почечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, нарушения внутрисердечной проводимости, беременность.

Поб. действ.: Тремор, сонливость, слабость, диспепсия, диарея, жажда, аритмия.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 0,6-0,9 г в день в 3-4 приема, затем доводят суточную дозу до 1,5-2,1 г. Высшая суточная доза - 2,4 г. Профилактическая доза - 0,6-1,2 г/сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Локоид® (Locoid®)

Гидрокортизон*

Локоид Крело® (Locoid Crelo®)

Гидрокортизон*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 г крема, мази или липокрема содержит гидрокортизона 17-бута-тата 1 мг; в тубах по 30 г.

1 мл лосьона - 1 мг; во флаконах по 30 мл.

1 мл эмульсии для наружного применения - 1 мг; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное (местное), противозудное, противоотечное.

Фармакокин.: После нанесения на кожу накапливается в эпидермисе. Абсорбированная часть метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и затем в печени. Метаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона бу-

тирата выделяются с мочой или через желчь с фекалиями.

Показ.: Экзема, дерматиты (поверхностные неинфицированные), псориаз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, розовые и вульгарные угри, околоушная дерматит, а также дерматиты осложненные бактериальной (импетиго), вирусной (простой герпес), грибковой (кандидоз или дерматофитоз) инфекциями; перианальный и генитальный зуд.

Бер. и корм. гр.: В период лактации назначают с осторожностью. В период беременности может отмечаться воздействие на плод (при нанесении на большие поверхности).

Примен. и доз.: Наружно, небольшое количество массирующими движениями наносится на пораженную кожу 1-3 раза в сутки; в случае резистентности (при локализации плотных псориатических бляшек на локтевых областях, коленях) - под окклюзионные повязки. При мокнущих заболеваниях и поражениях волосистой части кожи используют лосьон и эмульсию. Недельная доза не должна превышать 30-60 г.

Предост.: При длительном применении на больших поверхностях поврежденной кожи, при использовании окклюзионных повязок возрастает риск возникновения местных и системных побочных эффектов, поэтому рекомендуется наблюдать (у детей) за весом, контролировать уровень кортизола в плазме. При аппликациях у детей на область лица или под окклюзионные повязки - курс лечения сокращают.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Локрен® (Lokren®)

Бетаксолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая), покрытая оболочкой, содержит бетаксолола гидрохлорида 20 мг; в коробке 28 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Застойная сердечная недостаточность, выраженная АВ-блокада, брадикардия (менее 45-50 ударов в мин), бронхиальная астма (относительное); лактация.

Поб. действ.: Астения (в начале лечения), парестезия конечностей, синдром Рейно, брадикардия, АВ-блокада, гипотония, сердечная недостаточность, астматический статус, проявление кожных

заболеваний (псориазоподобных), синдром отмены.

Взаим.: Следует избегать сочетания с антиаритмическими препаратами (амиодароном, дилтиаземом, верапамилем, хинидиновыми) из-за риска нарушения автоматизма, проводимости и сократимости сердца. Локрен может уменьшить компенсаторные сердечно-сосудистые реакции в ответ на применение летучих галагеновых анестетиков; маскировать симптомы гипогликемии (тахикардию) у больных сахарным диабетом, принимающих инсулин или другие сахароснижающие препараты. НПВС и стероиды, обволакивающие и антацидные средства ослабляют гипотензивное действие. Трициклические антидепрессанты (имипрамин) усиливают степень снижения АД и могут вызывать ортостатическую гипотонию при одновременном лечении Локреном. Сочетанное применение Локрена и дигидропиридиновых антагонистов кальция у больных латентной сердечной недостаточностью усиливает риск гипотонии и декомпенсации сердечной деятельности.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 мг 1 раз в день.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с сердечной, почечной и печеночной недостаточностью, хронической обструктивной бронхопатией, АВ-блокадой I-II степени, синдромом Рейно, феохромоцитомой и сахарным диабетом. Отменять лечение необходимо постепенно.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Ломилан® (Lomilan®)

Лоратадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лоратадина 10 мг; в упаковке 20 шт.

10 мл суспензии для приема внутрь - 10 мг; во флаконе 120 мл.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, противозудное, противоэкссудативное; блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Фармакокин.: После орального приема быстро всасывается. Выводится в виде метаболитов почками и кишечником.

Фармакодин.: Эффект проявляется через полчаса после приема и сохраняется на протяжении 24 ч. Ингибирует высвобождение гистамина и лейкотриена C₄ из тучных клеток. Не обладает тропностью к H₁-рецепторам ЦНС, не проявляет антихолинергических свойств.

Клин. фарм.: Отсутствует влияние на психомоторные функции, психические и умственные способности.

Показ.: Профилактика и лечение сезонного и хронического аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, хронической крапивницы, отек Квинке, симптомы гистаминэргий, вызванные применением гистаминолибераторов (псевдоаллергические синдромы), аллергические реакции на укусы насекомых, комплексное лечение зудящих дерматозов (контактные алергодерматиты, хронические экземы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: В период беременности и лактации применение допустимо на период не более 3 мес и лишь в том случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превосходит возможное негативное действие на плод.

Поб. действ.: Утомляемость, головокружение, головная боль, седативный эффект, сухость во рту, повышение аппетита, тошнота, кашель, сердцебиение.

Взаим.: Изменяет (взаимно) эффект циметидина (назначать с осторожностью), алкоголь и транквилизаторы не потенцируют эффект.

Передоз.: При передозировке необходимо удалить препарат из ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет (масса тела более 30 кг) - 10 мг один раз в день, т.е. 1 таблетка или 2 дозировочные ложки (10 мл). Детям от 2 до 12 лет (масса тела менее 30 кг) - 5 мг однократно в сутки, т.е. 1 дозировочная ложка (5 мл) или 1/2 таблетки.

Произв.: Lek (Словения)

Ломузол (Lomusol®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для интраназального применения содержит кромогликата натрия 2,6 мг; во флаконах с дозирующим устройством по 26 мл 2% раствора.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, ингибция дегрануляции тучных клеток, возникающей при контакте со специфическими антигенами, снижение высвобождения гистамина и других медиаторов воспаления.

Фармакокин.: После эндоназального введения всасывается в системный кровоток около 7%, после орального - около 1%. Связь с белками плазмы 65%. Выводится в неизмененном виде с желчью и мочой приблизительно в равных количествах.

Показ.: Сезонный и круглогодичный аллергический ринит (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Раздражение слизистой оболочки полости носа (в начале лечения), свистящее дыхание, чувство стеснения в груди.

Передоз.: При передозировке требуется наблюдение врача и, при необходимости, симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Взрослым (включая лиц пожилого возраста) и детям - по 1 дозе спрея в каждую ноздрю 4-6 раз в сутки. По мере ослабления проявлений аллергического ринита прием сопутствующих антигистаминных препаратов может быть сокращен или отменен.

Предост.: Пациент должен быть проинструктирован относительно необходимости регулярного приема ломузала.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Лонгацеф (Longacerph)

Цефтриаксон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для инъекций содержит цефтриаксона (в виде динатриевой соли) 250 или 1000 мг; в упаковке 10 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное, широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Тяжелые инфекции мочевого тракта, нижних дыхательных путей (в т.ч. пневмония), кожи и мягких тканей, костей, суставов; инфекции, вызванные гонококками, абдоминальные инфекции, бактериемия, септицемия, бактериальный менингит, профилактика и лечение инфекций, возникающих при хирургических вмешательствах и у лиц с ослабленным иммунитетом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспорином).

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, сыпь, зуд.

Примен. и доз.: В/м, в/в и в виде инфузии. Взрослым и детям старше 12 лет - 1-2 г 1 раз в сутки, в тяжелых случаях - до 4 г (по 2 г каждые 12 ч в виде в/в инфузии, в течение минимум 30 мин). Грудным и маленьким детям - суточная доза 50-75 мг/кг в 2 приема (через 12 ч), максимальная суточная доза - 2 г. При менингите ударная доза - 100 мг/кг, а затем 80 мг/кг 1 раз в сутки, или ударную дозу 75 мг/кг и по 50 мг/кг каждые 12 ч. Длительность

терапии зависит от тяжести инфекций. Рекомендуются применять минимум 3 дня после нормализации температуры. Для в/м введения растворяют 250 мг лонгацефа в 2 мл или 1 г в 3,5 мл 1% раствора лидокаин-хлорида. Для в/в введения растворяют 250 мг лонгацефа в 5 мл или 1 г в 10 мл воды для инъекций и вводят медленно в течение 2-4 мин. Для в/в инфузии растворить 2 г в 40 мл одного из следующих инфузионных растворов 0,9% хлорида натрия, 0,45% хлорида натрия и 2,5% глюкозы; 5 или 10% глюкозы, 5% леулезы, 6% декстрана в глюкозе.

Предост.: Следует корректировать дозу препарата у недоношенных детей, при тяжелой почечной недостаточности. При тяжелой недостаточности почек и печени следует следить за концентрацией лонгацефа в плазме.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Лоперамид (Loperamide)

Лоперамид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит лоперамида гидрохлорида 2 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противодиарейное.

Фармакодин.: Понижает тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника (вероятно, вследствие связывания с его опиатными рецепторами), повышает тонус анального сфинктера.

Клин. фарм.: Действие развивается быстро и продолжается 4-6 ч. В терапевтических дозах мало влияет на ЦНС (плохо проникает через ГЭБ).

Показ.: Диарея (острая и хроническая) различного генеза (аллергическая, неврогенная; лекарственная, при изменении режима питания, при нарушении абсорбции и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, острый язвенный колит (на фоне применения антибиотиков широкого спектра действия), детский возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказан в первом триместре беременности и при лактации (грудное вскармливание прекращают).

Поб. действ.: Боли в животе, тошнота, рвота, запоры, метеоризм, сухость во рту, головокружение, сонливость, чувство усталости, кожные аллергические реакции (сыпь).

Передоз.: Симптомы: запор, кишечная непроходимость, сонливость, нарушение координации движений, атаксия. Лечение: вводят налоксон.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при острой диарее - первоначально 4 мг, затем - 2 мг после каждого акта дефекации в случае жидкого стула; суточная доза не должна превышать 16 мг. При хронической диарее - те же дозы, после нормализации стула переходят на поддерживающие дозы, которые подбирают индивидуально. Детям - 1/4 доз взрослых (по рекомендации врача возможно изменение дозы).

Предост.: С осторожностью назначают при нарушениях функции печени. Если эффекта после 2-х суток лечения не проявляется, необходимо уточнить диагноз и исключить инфекционный генез диареи. Возникновение запоров или вздутия живота - повод для отмены препарата.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Лорам (Loram®)

Лоразепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лоразепама 1 или 2,5 мг; в упаковке 30 и 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, снижение психического напряжения, стабилизация вегетативной нервной системы, седативное.

Показ.: Психоневрозы (невроз тревоги, невроз принуждения, фобии), психическое напряжение с чувством страха, тревоги, опасности и несостоятельности; поведенческие расстройства, тревога при депрессии и шизофрении; страх и психосоматические нарушения при сердечно-сосудистых, респираторных, желудочно-кишечных и др. органических заболеваниях, бессонница.

Противопоказ.: Миастения.

Бер. и корм. гр.: Под строгим медицинским наблюдением.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, утомляемость, сухость во рту, мышечная слабость, атаксия, зрительные расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь. Для амбулаторных пациентов - 1-3 мг в сутки, для психиатрических - 3-7,5 мг в сутки. При бессоннице - 1 мг на ночь.

Предост.: Требуется особое внимание и подбор доз для пациентов старшего возраста, с пониженной массой тела, с церебральным склерозом, сердечной недостаточностью, гипотензией. Во время лечения не следует употреблять спиртные напитки. После приема препарата в течение 4 ч не рекомендуется управлять автомобилем или приборами, требующими напряженного внимания. После дли-

тельной терапии следует избегать резкого прекращения лечения (требуется постепенное снижение дозы по схеме).

Произв.: Lek (Словения)

Лосек (Losec®)

Омепразол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит омепразола 10 или 20 мг; в упаковке 7, 14 и 28 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение кислотопродукции, ингибция "протонового насоса".

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пептическая язва, вызванная *Helicobacter pylori*, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, злокачественные процессы.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Нарушение зрения, периферические отеки, усиление потоотделения, лихорадка, артралгия, мышечная слабость, миалгия, головокружение, головная боль, возбуждение, сонливость, бессонница, депрессия, галлюцинации (у предрасположенных пациентов), сухость во рту, нарушение вкуса, абдоминальные боли, диарея, запор, стоматит, повышение активности печеночных ферментов, бронхоспазм, лейкопения, тромбоцитопения, мультиформная эритема, кожная сыпь, крапивница, зуд.

Взаим.: Замедляет выведение диазепамы, варфарина, фенитоина. Повышает концентрацию кларитромицина в плазме крови.

Примен. и доз.: Внутрь, при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 20 мг 1 раз в сутки утром натощак. Капсулы проглатывают целиком, запивая небольшим количеством жидкости. При отсутствии эффекта через 4 нед назначают по 40 мг 1 раз в сутки, что позволяет достичь заживления в течение 4 нед. Для профилактики рецидивов язвенной болезни желудка - по 10 мг 1 раз в сутки (до 20-40 мг в сутки), а с плохой заживляемостью - по 20 мг в сутки. При отсутствии заживления через 4 нед назначают по 40 мг в сутки в течение 8 нед. При пептической язве - по 40 мг в сутки в комбинации с амоксициллином (1,5-3 г в 2 приема); при рефлюкс-эзофагите - по 20 мг в сутки (4-5 нед) до 40 мг в сутки (8 нед), при синдроме Золлингера-Эллисона - по 60 мг в сутки в 1 прием, до 80-120 мг в сутки в 2 приема.

Произв.: Astra (Швеция)

Лотридерм (Lotriderm®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит клотримазола 10 мг и бетаметазона дипропионата 0,64 мг (эквивалентно 0,5 мг бетаметазона); в тубах по 15 и 30 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра, противовоспалительное, противозудное и сосудосуживающее.

Показ.: Эпидермофития стоп, паховый дерматомикоз, дерматомикоз гладкой кожи, кандидоз, обусловленный *Candida albicans*.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно только по строгим показаниям, если польза для женщины, оправдывает потенциальный риск для плода и младенца.

Поб. действ.: Парестезия, макуло-папулезная сыпь, жжение, зуд, раздражение и сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный и аллергический контактный дерматиты, атрофические изменения кожи, мацерация, стрии, потница, покраснение кожи, ощущение покалывания, крапивница, раздражение кожи, отечность, вторичная инфекция. У детей: угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синдром Кушинга, повышение внутричерепного давления.

Примен. и доз.: Необходимое количество крема втирающими движениями наносят на пораженную область и окружающую кожу 2 раза в день (утром и вечером). При паховом дерматомикозе, микроспории гладкой кожи и кандидозе длительность курса 2 нед, при эпидермофитии стоп - 4 нед. Применение крема больше 4 нед не рекомендуется.

Предост.: Крем не следует наносить под окклюзионную повязку. При наличии бактериальной инфекции лотридерм назначают вместе с антибактериальной терапией. Не применять в офтальмологии.

Произв.: Schering-Plough (США)

Лотримин (Lotrimin®)

Клотримазол*

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит клотримазола 10 мг; в тубах по 15 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur*).

Показ.: Эпидермофития стоп, дерматомикоз (паховый и гладкой кожи), кандидоз (монилиаз), обусловленный *Can-*

didia albicans, отрубевидный лишай, вызванный *Malassezia furfur*.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: В первом триместре беременности - только в случае крайней необходимости. С осторожностью применять у кормящих матерей.

Поб. действ.: Везикуляция, шелушение, отечность, зуд, жжение, покраснение, покалывание и общее раздражение кожи, крапивница.

Примен. и доз.: Необходимое количество крема втирающими движениями наносят на пораженную область и окружающую кожу 2 раза в день (утром и вечером). Зуд обычно исчезает в течение первой недели. При кандидозном вульвите или баланите длительность курса 1-2 нед, дерматомикозах - 3-4 нед, эритразме и отрубевидном лишае - 3 нед.

Предост.: Отсутствие клинического улучшения через 4 нед от начала лечения может служить поводом для проведения микробиологического исследования с целью уточнения диагноза и возможной роли других возбудителей. В случае развития раздражения или повышения чувствительности лечение следует прекратить и назначить соответствующую терапию. Не предназначен для применения в офтальмологической практике.

Произв.: Schering-Plough (США)

Лофеналак (Lofenalac)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии, в банках по 454 г; в коробке 6 шт.

Содержание фенилаланина в сухой смеси Лофеналак составляет около 0,08% (не более 0,1% и не менее 0,06%).

1 л готовой смеси содержит белка 22 г, жиров 26 г, углеводов 88 г, линолевой кислоты 13530 мг, витамина А 2114 МЕ, витамина D 423 МЕ, витамина Е 21 МЕ, витамина К 106 мкг, витамина В₁ 529 мкг, витамина В₂ 634 мкг, витамина В₆ 423 мкг, витамина В₁₂ 2 мкг, ниацина 8456 мкг, фолиевой кислоты 106 мкг, биотина 53 мкг, пантотеновой кислоты 3171 мкг, витамина С 55 мг, холина 90 мг, инозитола 32 мг, кальция 634 мг, фосфора 476 мг, магния 74 мг, железа 13 мг, цинка 5 мг, меди 634 мкг, марганца 211 мкг, натрия 317 мг, калия 687 мг, йода 48 мкг, селена 19 мкг, хлоридов 476 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма больных с фенилкетонурией и другими врожденными аномалиями обмена фенилаланина питательными веществами, ви-

таминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Показ.: Гиперфенилаланинемия, включая фенилкетонурию (у грудных и более старших детей).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Добавляют 1 мерную ложку сухой смеси (9,6 г) на каждые 60 мл прокипяченной и охлажденной до 40 град.С воды в бутылочке (всегда следует добавлять сухую смесь к воде), закрывают бутылочку крышкой и сильно взбалтывают. Для приготовления примерно 1 л питания добавляют 1 чашку (139 г) сухой смеси к 860 мл воды, хорошо перемешивают венчиком или миксером и разливают по бутылочкам. Употребляют сразу же для кормления или хранят в холодильнике не более 24 ч (неиспользованную после кормления смесь выбрасывают). Дозировка устанавливается врачом индивидуально в зависимости от возраста, уровня фенилаланина в крови и диеты. 1 упаковка сухого вещества (454 г) достаточна для приготовления 3 л смеси (нормальное разведение 68 ккал/100 мл).

Предост.: Применяют под наблюдением врача, осуществляя коррекцию диеты на основе регулярных анализов крови. Для обеспечения поступления в организм ребенка достаточного количества фенилаланина для поддержания роста используются другие продукты питания. Следует избегать избыточного ограничения поступления фенилаланина в организм (симптомы дефицита фенилаланина - сонливость, рвота, повышение температуры). Не рекомендуется для кормления здоровых детей.

Произв.: Mead Johnson Nutritional (США)

Лоцерил (Loceryl®)

Аморолфин*

Сост. и ф.в.: 1 мл лака для ногтей содержит аморолфина 50 мг; во флаконах по 2,5 или 5 мл с набором для обработки ногтей, включающим тампоны, пропитанные 70% изопропиловым спиртом для очистки ногтей (30 или 60 шт.), пилки для ногтей (15 или 30 шт.) и лопаточки для нанесения лака (5 или 10 шт.).

Фарм. действ.: Противогрибковое, фунгицидное, фунгистатическое.

Фармакодин.: Повреждает клеточную мембрану грибов, в основном, за счет нарушения синтеза стерина. Снижает содержание эргостерина, вызывает на-

копление аномальных неплоскостных стереоизомеров стероидов.

Показ.: Онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (дети раннего возраста и новорожденные).

Поб. действ.: Чувство жжения на местах аппликации.

Примен. и доз.: Наружно. Лак наносят на пораженные ногти пальцев кистей или стоп 1 или 2 раза в неделю. Перед нанесением с помощью прилагаемой (одноразовой) пилки удаляют пораженные участки, затем поверхность очищают с помощью готовых тампонов (смоченных спиртом), перед повторным нанесением лака процедуру повторяют. Лечение продолжают непрерывно, пока не вырастет новый ноготь и пораженные участки не будут вылечены: 6 мес (ногти пальцев кисти) или 9-12 мес (ногти пальцев стоп).

Предост.: Во время лечения не рекомендуется пользоваться косметическим лаком для ногтей и искусственными ногтями. При работе с органическими растворителями следует одевать непроницаемые перчатки.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Лупоцет (Lupocet®)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 5 мл сиропа содержат парацетамола 120 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Боли (головная, зубная, при травмах), лихорадка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени, вирусный гепатит, нарушение функции почек.

Поб. действ.: Агранулоцитоз, асимптоматическая тромбоцитопения, анемия, гепатит, почечные колики, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, зуд).

Взаим.: Токсичность усиливают индукторы монооксигеназной системы печени (барбитураты, противосудорожные средства), алкоголь. Метоклопрамид может увеличить резорбцию.

Примен. и доз.: Внутрь, детям до 2 лет и грудным - по 1/2-1 мерной ложке сиропа (1 ложка содержит 120 мг парацетамола) 1-4 раза в сутки, до 7 лет - по 1-2 ложки 1-3 раза в сутки, до 14 лет -

по 1-2 ложки 1-4 раза в сутки (максимальная суточная доза - 2 г).

Произв.: Belupo (Хорватия)

Людиомил® (Ludiomil®)

Мапротилин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл раствора для инъекций содержит мапротилина метансульфоната 25 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит мапротилина гидрохлорида 10 мг, в упаковке 50 шт.; 25 или 50 мг, в упаковке 30 шт. или 75 мг, в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное.

Показ.: Депрессии, депрессивные нарушения настроения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим трициклическим антидепрессантам); эпилепсия или сниженный порог судорожной активности, острый инфаркт миокарда, нарушения сердечной проводимости, закрытоугольная глаукома, выраженные нарушения функции печени или почек, задержка мочи, острое отравление алкоголем, наркотическими или психотропными средствами, беременность, лактация.

Поб. действ.: Антихолинергические реакции (сонливость, утомляемость, головная боль, сухость во рту), синусовая тахикардия, ортостатическая гипотензия, тошнота, увеличение массы тела, аллергические кожные реакции. Редко: неадекватная реакция на внешние стимулы, галлюцинации, судороги, сердечные аритмии, нарушения сердечной проводимости, аллергический альвеолит, гепатит, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Зависит от состояния пациента. Обычно - 75-150 мг в сутки. Максимальная суточная доза - 150 мг.

Предост.: С осторожностью применяют в случае риска суицидальных действий, при ортостатической гипотензии, шизофрении, циклических аффективных расстройствах, при повышенном внутриглазном давлении, хроническом запоре или задержке мочи в анамнезе, при электросудорожной терапии, при совместном комбинировании с антигипертензивными, симпатомиметическими, противосудорожными, антихолинергическими, депримирующими средствами, антикоагулянтами, антидиабетическими препаратами, алкоголем. Требуется осторожность при внезапной отмене или снижении дозы, использовании водителем автотранспортных средств. При дли-

тельном лечении следует регулярно исследовать функцию почек и печени, количественный состав крови.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Лютрелеф (Lutrelaf®)

Гонадорелин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10,8 или 13,2 мг сухого вещества содержит гонадорелина ацетата гидрата 0,8 или 3,2 мг (что соответствует 0,73 или 2,91 мг гонадорелина); в комплекте с растворителем в ампулах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гонадотропное, стимуляция гипофизарной физиологической (пульсирующей) секреции гонадотропинов.

Показ.: Гипоталамическая аменорея, недостаточность функции желтого тела яичника (малые сроки беременности), гипогонадотропный гипогонадизм, олигоастеноспермия, азооспермия, задержка полового развития.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции, покраснение и зуд в месте введения препарата.

Примен. и доз.: В/в или п/к (при помощи аппарата Zyklomatminipump). Доза подбирается индивидуально в зависимости от степени нарушений (можно использовать одну из двух форм - 0,8 или 3,2 мг с различными интервалами между введениями). Стандартные дозы для женщин - 5 мкг в/в или 20 мкг п/к каждые 90 мин, для мужчин - 5 мкг п/к каждые 120 мин.

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Маалокс (Maalox®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гидроокиси алюминия 400 мг и гидроокиси магния 400 мг; в упаковке 40 шт.

100 мл суспензии - гидроокиси алюминия 3,49 г и гидроокиси магния 3,99 г, во флаконах по 250 мл.

15 мл суспензии (1 пакет) - гидроокиси алюминия 523,5 мг и гидроокиси магния 598,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, обволакивающее.

Клин. фарм.: Обладает высокой нейтрализующей способностью (антацидная активность 1 таблетки составляет 18,5, а 15 мл суспензии - 1 пакет - 40,5 мэкв соляной кислоты) и гастропротективным эф-

фектом, не дает запоров. Длительность действия - несколько часов.

Показ.: Острый гастрит, хронический гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией в фазе обострения, грыжа пищеводного отверстия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пептическая язва, рефлюкс-эзофагит, изжога, желудочный дискомфорт после погрешностей в диете, приема лекарств и злоупотребления алкоголем, кофе и никотином.

Противопоказ.: Тяжелая почечная недостаточность.

Поб. действ.: При длительном применении высоких доз возможно истощение запасов фосфора в организме (гидроокись алюминия).

Взаим.: Снижает абсорбцию индометацина, салицилатов, тетрациклинов, бета-блокаторов, H₂-гистаминоблокаторов, аминазина, дифлунизала, изониазида, фенитоина, фосфорсодержащих препаратов, сердечных гликозидов, антихолинергических средств (железосодержащих препаратов).

Примен. и доз.: Внутрь, через 1-1,5 ч после еды или при возникновении болей по 1-2 таблетки (разжевать или держать во рту до полного рассасывания) или по 15 мл суспензии (1 пакет или 1 столовая ложка). Перед употреблением суспензию гомогенизируют, встряхивая флакон или тщательно разминая пакет между пальцами. Содержимое пакета выдавить в ложку или в рот.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Магне Б6 (Magne B6®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит магния лактата 500 мг (в том числе магния 48 мг) и пиридоксина гидрохлорида 125 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для инъекций - 250 и 62,5 мг активных веществ соответственно; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка магния и витамина B₆.

Показ.: Дефицит магния в организме, ассоциированная кальциевая недостаточность, спазмофилия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность.

Поб. действ.: Диарея, боли в животе, парестезия, периферическая нейропатия.

Взаим.: Фосфаты и соли кальция ингибируют адсорбцию магния в кишечнике; ослабляет эффект леводопы (витамин

В6). При совместном назначении тетрациклинов необходим 3-х часовой перерыв между их приемом.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 таблетки, запивая стаканом воды, или 1 ампуле 2-3 раза в день.

Предост.: При ассоциированной кальциевой недостаточности до начала кальцийтерапии рекомендуется насыщение организма магнием.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Магневист (Magnevist®)

Гадопентеновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для в/в введения содержит двухкислой димеглюминовой соли гадопентеновой кислоты 469,01 мг и меглюминовой соли N,N,N,N-3-пентауксусной кислоты 1,02 мг, во флаконах по 20 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Диагностическое.

Показ.: Магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга, всего тела.

Противопоказ.: Неизвестны.

Поб. действ.: Легкое чувство тепла, болевые ощущения, тошнота, рвота, аллергические реакции на коже и слизистых.

Примен. и доз.: В/в, в дозе от 0,1 до 0,2 мл/кг массы тела. Обычно объем препарата, вводимого пациентам с массой тела около 70 кг, не превышает 14 мл.

Произв.: Schering (Германия)

Магния сульфат (Magnesii sulfas)

Магния сульфат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл раствора для инъекций содержит магния сульфата 1 г.

Фарм. действ.: Седативное, гипотензивное, спазмолитическое, противосудорожное, желчегонное, слабительное.

Показ.: Артериальная гипертензия, эклампсия, судорожный синдром (включая эпилептический статус), обезболивание родов, интоксикация солями тяжелых металлов.

Поб. действ.: Угнетение дыхания.

Примен. и доз.: В/м, в/в, по 5-20 мл 20% раствора ежедневно на протяжении 15-20 дней.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Мадопар (Madopar)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит леводопы 100 мг и бенсеразида (в виде хлорида) 25 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое.

Фармакодин.: Повышает содержание дофамина в ЦНС (леводопа) и ингибирует периферическую декарбоксилазу (бенсеразид), снижает гипокинезию, ригидность, тремор.

Показ.: Болезнь Паркинсона, симптоматический паркинсонизм (за исключением медикаментозного).

Противопоказ.: Заболевания эндокринной системы, почек, печени, сердца, психозы, беременность, возраст (до 25 лет).

Поб. действ.: Психические нарушения: бессонница, ощущение беспокойства, депрессия, хореоподобные и атетозные движения. В редких случаях - лейкопения, тромбопения.

Примен. и доз.: Дозу подбирают индивидуально.

Предост.: В начале лечения не следует резко прерывать прием других антипаркинсонических препаратов. Не рекомендуется сочетать с ингибиторами МАО. При длительном применении необходимо контролировать картину крови, функцию почек и печени.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Мадопар (Madopar®)

Мадопар ГСС (Madopar® HBS)

Мадопар быстродействующие таблетки (диспергируемые) (Madopar® dispersible)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит леводопы 100 или 200 мг и бенсеразида гидрохлорида 25 или 50 мг соответственно; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, повышение содержания дофамина в ЦНС, ингибирование периферической ДОФА-декарбоксилазы.

Показ.: Все формы паркинсонизма (кроме медикаментозной).

Противопоказ.: Тяжелые декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, печени, почек; психозы, тяжелые психоневрозы, закрытоугольная глаукома, беременность, лактация, детский возраст (до 25 лет).

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, сердечно-сосудистые нарушения

(аритмии, ортостатическая гипотензия), психические расстройства (бессонница, ажитация, депрессия), самопроизвольные движения (хореического или атетозного типа), повышение активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы, гемолитическая анемия, умеренная лейкопения и тромбоцитопения.

Взаим.: Усиливает эффект симпатомиметических средств, ослабляет (взаимно) - нейролептиков и витамина В₆. Совместим с др. противопаркинсоническими средствами, несовместим с ингибиторами МАО (кроме селегилина), с наркотическими средствами - циклопропан, галотан (прием препарата должен быть прекращен за 12-48 ч до наркоза).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды (или с достаточным количеством жидкости). Лечение начинают с приема по 50 мг леводопы + 12,5 мг бенсеразида 3-4 раза в день. Суточную дозу увеличивают на 1 разовую дозу каждую неделю до достижения оптимальной. Оптимальный эффект достигается, как правило, при суточной дозе 400-800 мг леводопы + 100-200 мг бенсеразида, принимаемой в 3 и более приемов. Поддерживающая доза - 1 капсула мадопара 125 мг 4-6 раз в день. Суточную дозу увеличивают на 1 разовую дозу каждую неделю до достижения оптимальной.

Пронзв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Мажептил (Majeptil®)

Тиопроперазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиопроперазина мезилата 10 мг; в упаковке 20 и 1000 шт.

1 мл раствора для инъекций - тиопроперазина 10 мг; в упаковке 10 и 50 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, противорвотное.

Показ.: Шизофрения (особенно гебешфреническая и непрерывно протекающая кататоническая формы), хронические галлюцинаторные психозы, маниакальный синдром, приступы полиморфного бреда.

Противопоказ.: Токсический агранулоцитоз в анамнезе, закрытоугольная глаукома, аденома простаты, паркинсонизм.

Бер. и корм. гр.: У беременных следует избегать длительного применения препарата и, если возможно, снизить дозировку в конце беременности. После родов необходимо наблюдение за неврологической симптоматикой и пищеварительной системой новорожденных.

Поб. действ.: Сочетание акинезии или гиперкинезии с повышенным или нормальным мышечным тонусом; поздняя дискинезия, апатия, тревожные реакции, колебания настроения, тошнота, рвота, диарея, олигурия, нарушения сердечного ритма, бледность, приливы крови, слезо- и слюнотечение, потливость, головокружение, сухость во рту, запор, парез аккомодации, задержка мочи, импотенция, фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, гиперпролактинемия, увеличение массы тела, холестатическая желтуха, фотосенсибилизация, агранулоцитоз (крайне редко).

Примен. и доз.: Внутрь. Начальная доза - 5 мг/сутки с последующим увеличением на 5 мг каждые 2-3 дня; при необходимости суточная доза может достигать 30-40 мг. Доза для в/м введения не должна превышать 50% от оральной дозы.

Предост.: При появлении гипертермии следует немедленно прекратить лечение. Водителям транспорта и лицам, работающим с механизмами, необходимо иметь в виду, что препарат может вызывать сонливость (особенно в начале лечения). Тщательное наблюдение необходимо при лечении эпилепсии (снижается судорожный порог). Осторожность требуется при лечении пожилых больных (ввиду их повышенной чувствительности), при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний, почечной и печеночной недостаточности. Следует избегать сочетания с приемом алкоголя, леводопы и гуанетидина. Осторожность требуется при совместном приеме с гипотензивными средствами, морфином, антигистаминными препаратами, барбитуратами, транквилизаторами, атропином.

Пронзв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Мазепин (Mazepin)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит карбамазепина 200 мг; в упаковке 500 или 100 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, седативное, анальгетическое.

Фармакодин.: Ингибирует нейромышечную передачу; обладает антиаритмическими и антидиуретическими свойствами.

Показ.: Эпилепсия (большие, фокальные, смешанные припадки), невралгия тройничного нерва.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к трициклическим антидепрессан-

там), угнетение функции костного мозга, АВ-блокада.

Поб. действ.: Головокружение, спутанность сознания, расстройство координации движения, галлюцинации, гипотензия, аритмия, тошнота, рвота, лихорадка, лимфаденопатия.

Примен. и доз.: Внутрь, при эпилепсии взрослым - 200-400 мг в день в 2 приема, увеличивая дозу до 800 мг-1,2 г в сутки; детям - 15-25 мг/кг в день в 2 приема. При невралгии тройничного нерва взрослым - 200-400 мг в 2-3 приема в день (до 600-800 мг в день), после достижения терапевтического эффекта дозу уменьшают до поддерживающей.

Предост.: Не следует использовать при атипичных или генерализованных малых эпилептических припадках. С осторожностью назначают при глаукоме, нарушениях функции печени, почек и сердца.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Макмирор (Macmiror)

Нифурател*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит нифуратела 200 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противопротозойное, противогрибковое.

Показ.: Вульвовагинальные инфекции и бели, вызванные бактериями, трихомонадами, грибами, инфекции мочевыделительного тракта; кишечный амебиаз и лямблиоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Примен. и доз.: Вагинальные инфекции: внутрь, взрослым (оба партнера) - по 1 драже после еды 3 раза в день в течение недели, детям - из расчета 100 мг/10 кг массы тела ежедневно в течение 10 дней (дневную дозу делят на 2 приема). Инфекции мочевыделительного тракта - 3-6 драже в день, курс лечения - 1-2 нед; детям - по 100-200 мг на 10 кг массы тела ежедневно в 2 приема. При кишечном амебиазе взрослым - по 2 драже 2-3 раза в день, детям - из расчета 10 мг на 1 кг массы тела 3 раза в день. Курс лечения - 10 дней. Кишечный лямблиоз - 2 драже 2-3 раза в день в течение 7 дней; детям - по 15 мг на 1 кг массы тела 2 раза в день.

Произв.: CSC (Италия)

Макмирор комплекс 500 (Macmiror complex 500)

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит нифуратела 500 мг и нистатина 200000 ЕД; в упаковке 8 шт.

100 г крема содержат нифуратела 10 г и нистатина 4 млн.ЕД; в тубиках по 30 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противопротозойное, противогрибковое.

Показ.: Вульвовагинальные инфекции и бели, вызванные бактериями, трихомонадами, грибами рода *Candida*.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Примен. и доз.: При вагинальных инфекциях (перед сном в течение 10 дней): во влагалище - 1 свеча или 2-3 г крема; детям - 1-2 г крема.

Произв.: CSC (Италия)

Макропен (Macropen®)

Мидекамицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мидекамицина 400 мг; в упаковке 16 или 100 шт.

1 флакон вместимостью 115 мл - порошок для приготовления оральной суспензии с содержанием мидекамицина ацетата 175 мг/5 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое.

Фармакокин.: После приема внутрь мидекамицин и мидекамицин ацетат быстро и хорошо всасываются из ЖКТ. C_{max} - через 1-2 ч, причем в тканях концентрация больше, чем в сыворотке. Выделяются в виде метаболитов в основном с желчью и мочой (небольшая часть).

Фармакодин.: Ингибирует синтез протеинов в бактериальной клетке, действует на внутриклеточные возбудители (микоплазму, легионеллы, хламидии, уреаплазму уреалитикум), на некоторые грамположительные бактерии (стрептококки, стафилококки, *Corynebacterium diphtheriae*, *Listeria monocitogenes*, *Erysipelothrix*, *Clostridium* spp.) и грамотрицательные (*Neisseria* spp., *Moraxella catarrhalis*, *Bordetella pertussis*, *Helicobacter* spp., *Campylobacter* spp., *Haemophilus influenzae*, *Bacteroides* spp.).

Показ.: Инфекции (в т.ч. у больных с аллергией к пенициллину) дыхательных путей, мочеполовых органов, кожи и мягких тканей, энтериты (вызываемые

Samplylobacter), дифтерия и коклюш (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Беременные могут принимать препарат, если польза, приносимая им, превышает риск от его применения. Кормящие матери в период приема препарата должны прервать кормление.

Поб. действ.: Редко - анорексия, рвота, диарея, слабость, кожные аллергические реакции.

Взаим.: Снижает выведение циклоспорина и варфарина, печеночный метаболизм карбамазепина и алкалоидов спорыньи.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой. Взрослым - по 400 мг 3 раза в сутки (максимальная суточная доза - 1600 мг). Детям - суточная доза от 30 до 50 мг/кг, разделенная на 2 приема, при тяжелых инфекциях - на 3 приема; детям до 30 кг (10 лет) - по 400 мг 3 раза в день или по 22,5 мл суспензии 2 раза в день, до 20 кг (6 лет) - по 15 мл 2 раза в день, до 15 кг (4 года) - по 10 мл 2 раза в день, до 10 кг (1-2 года) - 7,5 мл 2 раза в день, до 5 кг (2 мес) - 3,75 мл 2 раза в день. Лечение продолжается 7-10 дней, при хламидийных инфекциях - 14 дней. Суспензию готовят добавлением во флакон 100 мл дистиллированной воды.

Предост.: При длительном лечении рекомендуется осуществлять контроль за состоянием печени (если до лечения ее функции были нарушены). Перед приемом суспензию необходимо взболтать и использовать в течение не более 14 дней (при условии хранения в холодильнике).

Пронзв.: KRKA (Словения)

Максаквин (Maxaquin)

Ломефлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ломефлоксацина гидрохлорида 400 мг; в блистерной упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью (95-98%) всасывается при приеме натощак. Примерно 65-80% дозы выделяется с мочой в неизмененном виде.

Фармакодин.: Угнетает активность ДНК-гиразы бактерий. Действует на аэробные грамположительные и грамотрицательные бактерии, протей, псевдомонады, клебсиеллы, микобактерии туберкулеза (как вне-, так и внутриклеточ-

но расположенные), хламидии, стафилококки, *Providencia* spp., *Serratia* spp., *Citrobacter*, *Enterobacter* spp. Устойчивы к нему *Streptococcus* spp, *Pseudomonas* *cepacia*, *Ureaplasma* *urealyticum* и анаэробные бактерии.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевых путей, кожи и мягких тканей, ЖКТ, туберкулез легких, гонорея, хламидиоз. Профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей до и в раннем послеоперационном периоде, холера (тяжелая форма).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (период роста и формирования скелета).

Поб. действ.: Боль в эпигастральной области, диарея, головная боль, головокружение, фотосенсибилизация.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке (400 мг) 1 раз в сутки или по назначению врача. Для профилактики дисбактериоза одновременно с максаквином назначают внутрь нистатин или леворин.

Предост.: С осторожностью назначают при выраженном церебральном атеросклерозе, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС. Нарушение выделительной функции почек требует уменьшения дозы препарата (в зависимости от значений клиренса креатинина). Не следует принимать антациды в течение 4 ч до и 2 ч после приема (снижается биодоступность). В период лечения необходимо избегать длительного воздействия солнечного света и использования ультрафиолетового освещения.

Пронзв.: Searle (США)

Максидекс (Maxidex®)

Дексаметазон*

Сост. и ф.в.: Капли глазные 0,1% по 5 мл; во флаконе-капельнице с дозатором Дроп-Тейнер.

Мазь глазная 0,1% по 3,5 г; в тубике.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое (глюкокортикоидное).

Показ.: Негнойный и аллергический конъюнктивит, кератит, кератоконъюнктивит, ирит, иридоциклит, блефароконъюнктивит, блефарит, эписклерит, склерит, состояния после травм и глазных операций.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый гнойный конъюнктивит, вирусные и грибковые заболевания глаз, трахома, глаукома.

Поб. действ.: Повышение внутриглазного давления, перфорация роговицы (при истончении).

Примен. и доз.: По 1-2 капли 2-5 раз в сутки.

Предост.: Осторожно назначают при герпетическом кератите (возможна перфорация).

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Максипим (Maxipime®)

Цефепим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для инъекций содержит цефепима 500 мг, 1 или 2 г (в форме гидрохлорида).

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: После однократного введения терапевтические концентрации определяются в моче, желчи, перитонеальной жидкости, бронхиальном секрете, мокроте, простате, аппендиксе и желчном пузыре. $T_{1/2}$ - в среднем 2 ч (не кумулирует), однако у больных с тяжелыми нарушениями функции почек $T_{1/2}$ увеличивается до 13-19 ч. Средний общий клиренс - 120 мл/мин. Выделяется почками, главным образом, путем гломерулярной фильтрации. В моче обнаруживается примерно 85% введенной дозы в виде неизмененного вещества. Связывание с плазменными белками не зависит от концентрации препарата в сыворотке крови и составляет менее 19%.

Фармакодин.: Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. штаммов, резистентных к аминогликозидам или цефалоспорином третьего поколения, высоко устойчив к бета-лактамазам большинства микроорганизмов.

Показ.: Инфекции нижних дыхательных путей (пневмония, бронхит), мочевыводящих путей (пиелонефрит), кожи и мягких тканей, интраабдоминальные (включая перитонит и инфекции желчных путей), гинекологические, септицемия, инфекции на фоне иммунодефицита (при фебрильной нейтропении).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим бета-лактамам антибиотикам, L-аргинину), детский возраст (до 13 лет).

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Во время беременности применять следует под контролем врача, в период лактации - с осторожностью (хотя и в низ-

ких концентрациях, но присутствует в женском молоке).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, запор, боли в животе, диспепсия, головная боль, головокружение, бессонница, парестезии, беспокойство, спутанность сознания, боли в груди, тахикардия, кашель, боль в горле, одышка, астения, потливость, вагинит, периферические отеки, боли в спине, повышение уровней АСТ, АЛТ, общего билирубина, анемия, эозинофилия, увеличение протромбинового времени, псевдомембранозный колит и другие суперинфекции; редко - судороги, лейкопения, нейтропения, местные реакции - флебит, воспаление; аллергические реакции (сыпь, зуд, подъем температуры, анафилаксия).

Взаим.: Фармацевтически несовместим с метронидазолом, ванкомицином, гентамицином, тобрамицином и нетилмицином сульфатом.

Примен. и доз.: В/в медленно (в течение 3-5 мин), в/м глубоко (в большую мышечную массу). Взрослым и детям (старше 13 лет) при инфекциях мочевыводящего тракта (легкой и средней тяжести) - по 500 мг - 1 г, при других инфекциях - по 1 г, при тяжелых инфекциях - по 2 г каждые 12 ч; при очень тяжелых и угрожающих жизни инфекциях - по 2 г в/в каждые 8 ч; курс лечения - 7-10 дней и более. Больным с клиренсом креатинина 11-30 мл/мин - по 1 г каждые 12 ч или по 500 мг-1 г каждые 24 ч, менее 10 мл/мин - по 250-500 мг или 1 г каждые 24 ч.

Предост.: С осторожностью применяют у пациентов с любыми формами аллергии на лекарственные препараты.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Макситрол (Maxitrol®)

Сост. и ф.в.: Стерильная офтальмологическая суспензия или стерильная глазная мазь содержат дексаметазона 0,1%, полимиксина В сульфата в количестве, эквивалентном 6000 ед/мл, и неомицина сульфата в количестве, эквивалентном 3,5 мг/мл неомицина; во флаконах по 5 мл с дозатором Дроп-Тейнер и в тубиках по 3,5 г соответственно.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антибактериальное.

Показ.: Воспалительные и инфекционные заболевания глаз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулез, грибковые и вирусные инфекции, натуральная оспа.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: По 1-2 капли; при легких инфекциях - 4-6 раз в сутки; при тяжелых инфекциях - каждый час (можно уменьшить количество приемов по мере ослабления симптомов). Мазь - по 1-1,5 см столбика мази в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в сутки, или в сочетании с глазными каплями - 1 раз в сутки на ночь.

Предост.: Осторожно назначать пациентам с глаукомой и катарактой.

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Мамомит (Mamomit)

Аминоглутетимид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аминокглутетимида 250 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, ингибирование синтеза стероидов в надпочечниках и превращения андрогенов в эстрогены.

Показ.: Рак молочной железы с метастазами (в период постменопаузы или после овариэктомии); метастазирующий рак предстательной железы (паллиативное лечение); синдром Иценко-Кушинга, обусловленный опухолью коры надпочечников (аденома или карцинома), гиперплазией коры надпочечников, синдромом эктопического АКТГ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, порфирия, беременность.

Поб. действ.: Сонливость, летаргия, желудочно-кишечные расстройства, угнетение кроветворения, гипотиреозидизм; надпочечниковая недостаточность; аллергические реакции (сыпь).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды. Лечение начинают с малых, постепенно наращиваемых доз. При раке молочной или предстательной железы начинают с дозы 125 мг 2 раза в сутки и каждую неделю увеличивают на 250 мг до максимальной дозы - 1000 мг в сутки. При синдроме Иценко-Кушинга дозу подбирают индивидуально.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушениях функции печени и почек. В процессе лечения необходим контроль за АД, функцией щитовидной железы и картиной крови.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Мандол (Mandol)

Цефамандол*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления

инъекционного раствора содержит цефамандол нафата 500 мг, 1 или 2 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра.

Показ.: Инфекции нижних дыхательных путей (в т.ч. пневмония), мочевыводящего тракта, кожи, костей и суставов, перитонит, септицемия, периоперационная профилактика инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; ранний детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, холестатическая желтуха, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, повышение в сыворотке крови азота, мочевины, креатинина, печеночных трансаминаз, аллергические реакции (анафилаксия, сыпь, крапивница, эозинофилия, лихорадка); боль и тромбофлебит в месте введения.

Взаим.: Отмечались случаи нефротоксичности при совместном назначении с аминогликозидами. Пробеницид замедляет выведение. При сочетании с алкоголем ингибирует ацетальдегидрогеназу (экспериментальные данные).

Примен. и доз.: В/м или в/в (для последнего каждый грамм растворяют в 10 мл растворителя). Взрослым - 500 мг-2 г каждые 4-8 ч. При кожных инфекциях и пневмонии без осложнений - 500 мг каждые 6 ч; при инфекциях мочевыводящих путей без осложнений - 500 мг каждые 8 ч, при тяжелых инфекциях мочевыводящих путей - 1 г каждые 8 ч. Детям - 50-150 мг/кг в сутки с интервалами между введениями 4-8 ч. Для профилактики послеоперационной инфекции (за 30-60 мин до операции) - 1-2 г (взрослым) или 50-100 мг/кг (детям после 3-х мес). После операции - те же дозы в течение 1-2 дней. Пациентам с нарушенной функцией почек режим дозирования устанавливают с учетом значений клиренса креатинина (доза снижается).

Произв.: Lilly (Швейцария)

Манинил® (Maninil®)

Глибенкламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глибенкламида 1,75 или 3,5 мг; в упаковке 120 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Фармакокин.: Нарастание концентрации в плазме происходит более плавно, вследствие этого снижение уровня глюкозы - более мягко, что уменьшает риск возникновения гипогликемических состояний. Быстро и практически полнос-

тью резорбируется. Связывание с белками плазмы превышает 95%. $T_{1/2}$ - 2-10 ч. Быстро выводится из организма. Кумуляция отсутствует. Полностью метаболизируется в печени, выводится из организма через почки (50%) и желчевыводящие пути (50%).

Фармакодин.: Обладает панкреатическим и экстрапанкреатическим эффектом. Панкреатическое (собственно бетацитотропное) действие основывается на стимулировании сохраненных "В" клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, продуцирующих инсулин. Кроме того, происходит снижение порога раздражимости "В" клеток, что улучшает их способность реагировать на физиологическое раздражение глюкозой. Экстрапанкреатический эффект основан на повышении чувствительности рецепторов инсулина периферической ткани к инсулину (предполагают, что на уровне пострецепторов действие инсулина потенцируется); происходит также замедление расщепления рецепторов.

Клин. фарм.: При применении микроенизированных форм Манинила потребность суточных доз глибенкламида может быть снижена на 30%. Исследования биоэквивалентности микроенизированных форм Манинила показали адекватное соотношение дозы глибенкламида и усвояемости углеводов, что позволяет проводить хорошо контролируемую терапию.

Показ.: Сахарный диабет II типа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Связана с передозировкой и погрешностями в диете (низкое содержание углеводов), нарушениями функции печени и почек, алкоголем и взаимодействием лекарственных средств. Возможны диспептические расстройства. Крайне редко - гиперергические реакции (сыпь, повышение температуры тела, боли в суставах, протеинурия).

Взаим.: Эффект усиливают ингибиторы АПФ, анаболические стероиды, бета-адреноблокаторы, бигуаниды, циметидин, производные кумарина, флюоксетин, ингибиторы МАО, миконазол, ПАСК, пентоксифиллин, фосфамиды, резерпин, салицилаты, сульфонамиды, тетрациклины. Ослабляют - ацетазоламид, барбитураты, хлорпромазин, диазоксид, глюкокортикоиды, глюкагон, гестагены, эстрогены, никотинаты, салуретики, гормоны щитовидной железы, симпатомиметические средства. Алкоголь может как усиливать, так и ослаблять эффект.

Передоз.: Проявляется симптомами гипогликемии.

Примен. и доз.: Внутрь, в индивидуальной дозе. Начальная доза - 0,5-1 таблетка Манинила 1,75 или 0,5 таблетки Манинила 3,5. Начинать с однократного приема за 30 мин до завтрака. При отсутствии эффекта рекомендуется медленное повышение дозы. Максимальная суточная доза Манинила 1,75 - 6 таблеток, Манинила 3,5 - 3 таблетки. Максимальную суточную дозу делят на 3 приема, принимают за 30 мин до еды.

Предост.: Под действием бета-блокаторов, клонидина и резерпина предупреждающие вегетативные симптомы гипогликемии могут быть замаскированы.

Пр о и з в .: Berlin-Chemie / Menarini Group (Германия / Италия)

Манинил® 5 (Maninil® 5)

Глибенкламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит глибенкламида 5 мг; в упаковке 120 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Сахарный диабет II типа (при неэффективности диетотерапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сахарный диабет I типа, нестабильные формы сахарного диабета, декомпенсация обмена веществ (кетоз, прекома и диабетическая кома), почечная и печеночная недостаточность, инфекционные заболевания, оперативные вмешательства.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, гипогликемия, нарушения аккомодации, тромбоцитопения, гранулоцитопения, эритроцитопения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия, холестатическая желтуха, гепатит, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Передоз.: Симптомы: чувство сильного голода, повышенное потоотделение, сердцебиение, ощущение дрожи в теле, беспокойство, головные боли, расстройства сна, раздражительность, депрессия, расстройства речи и зрения. Лечение: принять сахар или богатую сахаром пищу; при тяжелой форме с потерей сознания в/в вводят раствор глюкозы и 1-2 мл глюкагона в/м или п/к.

Примен. и доз.: Внутрь, утром перед едой, не разжевывая и запивая водой, в индивидуальной дозе, постепенно ее увеличивая. Начальная доза - 2,5 мг (1/2 таблетки), максимальная суточная доза

- 15 мг (3 таблетки). Суточные дозы до 10 мг применяют, как правило, утром; при более высоких суточных дозах - 10 мг утром, оставшуюся дозу - вечером.

Предост.: Во время лечения не рекомендуется заниматься видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстрой реакции.

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Маркаин (Marcaine®)

Бупивакаин*

Маркаин адреналин (Marcaine® adrenaline)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит бупивакаина гидрохлорида 2,5 или 5 мг, или бупивакаина гидрохлорида 2,5 или 5 мг и адреналина 5 мкг, во флаконах по 20 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Длительная инфильтрационная анестезия, проводниковая анестезия, блокада и постоперационная анальгезия; анальгезия в акушерстве.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к анестетикам амидного типа); эпидуральная анестезия у больных с гипотонией, кардиогенным или гиповолемическим шоком.

Поб. действ.: Парестезия, слабость, обездвиживание нижних конечностей, потеря контроля над сфинктерами, аллергические реакции (до анафилактического шока); при передозировке или случайном внутрисосудистом введении - снижение сердечного выброса, блокада проводимости возбуждения, брадикардия, желудочковые аритмии, тахикардия, фибрилляция с остановкой сердца.

Примен. и доз.: Инъекционно, доза зависит от характера предстоящего вмешательства.

Предост.: Нельзя применять для в/в региональной анестезии; при проведении ретробульбарной анестезии возможна остановка дыхания. С осторожностью используют при нарушении функции печени или у пациентов, получающих противоаритмическую терапию.

Прозв.: Astra (Швеция)

Мастодинон (Mastodyn®)

Сост. и ф.в.: 100 г раствора содержат спиртовой вытяжки из *Agnus castus*

(прутняк) D1 20 г, *Caulophyllum thalictroides* (стеблелист василистниковидный) D4 10 г, *Cyclamen* (фиалка альпийская) D4 10 г, *Ignatia* (грудошник горький) D6 10 г, *Iris* (касатик разноцветный) D2 20 г, *Lilium tigrinum* (лилия тигровая) D3 10 г; во флаконах по 50 мл (содержит 53 об.% этанола).

Фарм. действ.: Прогестагенное, снижение секреции пролактина, стимуляция дофаминовых рецепторов.

Показ.: Гиперпролактинемия, гипотония желтого тела (дисменорея, бесплодие), предменструальный синдром (психическая лабильность, запор, отеки, головная боль, масталгия), фиброзно-кистозная мастопатия.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Диспепсия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 30 капель 2 раза в день (утром и вечером) на протяжении не менее 3 мес, без перерыва в период менструации. Улучшение наступает, как правило, через 6 нед.

Прозв.: Bionogica (Германия)

Матерна (Materna)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола 5000 МЕ, токоферола 30 МЕ, колекальциферола 400 МЕ, аскорбиновой кислоты 100 мг, тиамина 3 мг, рибофлавина 3,4 мг, пантотеновой кислоты 10 мг, пиридоксина 10 мг, цианокобаламина 12 мкг, фолиевой кислоты 1 мг, никотиамида 20 мг, биотина 30 мкг, йода 150 мкг, железа 60 мг, кальция 250 мг, магния 25 мг, меди 2 мг, марганца 5 мг, цинка 25 мг, хрома 25 мкг, молибдена 25 мкг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ.

Фармакодин.: Снижает тошноту и рвоту при токсикозе беременности (комплекс витаминов группы В), уменьшает процент врожденных уродств у детей (фолиевая кислота), участвует в формировании скелета и регенерации тканей (цинк и медь), улучшает абсорбцию железа (соотношение кальция и магния), уменьшает деминерализацию организма матери в течение всего III триместра беременности (кальций), восполняет повышенные потребности матери и ребенка в витаминах и минеральных веществах в период лактации.

Показ.: Профилактика железодефицитной анемии у беременных, дефицита кальция в организме матери в III триместре беременности, дефицита витаминов и минеральных веществ в период лактации, обеспечение организма будущей ма-

тери (в период перед запланированной беременностью) необходимыми витаминами и минералами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с пернициозной анемией.

Произв.: Wyeth-Lederle (США)

Мебикар (Mebicarum)

Мебикар

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мебекара 0,3 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее.

Показ.: Неврозы и неврозоподобные состояния (раздражительность, эмоциональная лабильность, тревога, страх); умеренно выраженные тревожно-параноидные состояния при шизофрении, инволюционных и сосудистых психозах; хронический вербальный галлюциноз органического генеза; неврозоподобные состояния у больных алкоголизмом в период ремиссии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, гипотония, гипотермия, кожный зуд, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает действие средств, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 0,3-0,9 г 2-3 раза в день. Суточная доза - 0,9-3 г. Длительность лечения при неврозах и неврозоподобных состояниях - от 2-3 нед до 2 мес, при психических заболеваниях - до 6 мес.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Мевакор (Mevacor®)

Ловастатин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ловастатина 10, 20 или 40 мг.

Фарм. действ.: Гипохолестеринемическое.

Фармакокин.: После абсорбции в ЖКТ, быстро гидролизуется до гидроксикислоты (являющейся конкурентным ингибитором 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А редуктазы, катализирующей начальную, лимитирующую стадию биосинтеза холестерина).

Фармакодин.: Снижает содержание общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП и триглицеридов; повышает содержание ЛВП в сыворотке крови.

Клин. фарм.: Эффект проявляется через 2 нед, достигает максимума в течение 4-6 нед (после начала лечения) и сохраняется во время лечения. Высокоэффективен при первичной гетерозиготной семейной и несемейной формах гиперхолестеринемии, при смешанной гиперлипидемии.

Показ.: Гиперхолестеринемия (первичная, в сочетании с гипертриглицеридемией); коронарный атеросклероз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания печени в активной фазе, постоянное необъяснимое повышение содержания сывороточных трансаминаз.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано. Женщинам детородного возраста должен назначаться только в тех случаях, когда возможность беременности очень мала. В случае наступления беременности во время лечения препарат сразу же следует отменить (и предупредить о возможных последствиях для плода).

Поб. действ.: Метеоризм, тошнота, рвота, диспепсия, диарея (или запор), боли в животе, сухость во рту, расстройства вкуса, отсутствие аппетита, гепатит, желтуха; головокружение, головные боли, нарушение сна, психические нарушения, беспокойство, парестезии, судороги, миалгии, миопатия (требующая отмены препарата), аллергические реакции (анафилактоидные, ангиоотек, ревматическая полимиалгия, тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, артралгия, астения, фотосенсибилизация, приливы, озноб, сыпь, крапивница и др.).

Взаим.: Иммунодепрессанты (циклоспорин) и никотиновая кислота увеличивают вероятность миопатии и рабдомиолиза. При одновременном применении с непрямые антикоагулянтами (производные кумарина) возможно более значимое нарастание протромбинового времени.

Примен. и доз.: Внутрь, при гиперхолестеринемии - обычная начальная доза составляет 20 мг (при легкой форме - 10 мг) 1 раз в день, с вечерним приемом пищи; при необходимости дозу увеличивают, но постепенно, с интервалом в 4 нед; максимальная доза - 80 мг в 1 или 2 приема (с завтраком и ужином). При атеросклерозе - в дозах 20-80 мг в один или несколько приемов ежедневно. У больных с тяжелой почечной недостаточностью (при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин) и сопутствующей терапией иммунодепрессантами максимальная рекомендуемая доза - 20 мг в день.

Предост.: До и во время лечения назначается диета, снижающая содержание холестерина. Рекомендуются прекратить прием при тяжелых острых инфекционных заболеваниях, гипотонии, при травмах, тяжелых метаболических, электролитных и эндокринных нарушениях, неуправляемых судорогах, а также в случае предстоящей сложной хирургической операции (при этом повышается склонность к развитию почечной недостаточности вследствие рабдомиолиза). Необходимо определение трансаминаз до и периодически во время лечения. Следует соблюдать осторожность при совместном назначении с иммунодепрессантами, препаратами никотиновой кислоты, антикоагулянтами.

Произв.: MSD (США)

Мега Вите (Mega Vite)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ретинола 5000 МЕ, альфа-токоферола 30 мг, аскорбиновой кислоты 60 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, тиамина 1,5 мг, рибофлавина 1,7 мг, никотинамида 20 мг, пиридоксина гидрохлорида 2 мг, цианокобаламина 6 мкг, витамина D 400 МЕ, биотина 30 мкг, пантотеновой кислоты 10 мг, витамина K1 25 мкг, кальция (фосфат) 162 мг, фосфора (фосфат кальция) 125 мг, йода (йодид калия) 150 мкг, железа (фумарат) 18 мг, магния (оксид) 100 мг, меди (оксид) 2 мг, цинка (оксид) 15 мг, марганца (сульфат) 2,5 мг, калия (хлорид) 40 мг, хлорида (хлорид калия) 36,3 мг, хрома (хлорид) 25 мкг, молибдена (молибдат натрия) 25 мкг, селена (селенат натрия) 25 мкг, никеля (сульфат) 5 мкг, олова (хлорид) 10 мкг, кремния (метасиликат натрия) 10 мкг, ванадия (метаванадат натрия) 10 мкг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минералов, стимуляция окислительно-восстановительных процессов, интенсификация белкового, жирового и углеводного обмена; стабилизация сердечной деятельности и минеральной структуры костей (кальций, магний, фосфор), повышение образования гемоглобина (медь, железо), поддержание нормального объема жидкости (калий, хлориды), стимуляция синтеза половых гормонов (цинк), улучшение структуры и функции покровных тканей и костной системы (олово, кремний, ванадий).

Показ.: Профилактика и лечение нарушений витаминного и минерального обмена при неполноценном или несбалансированном питании, больших физических и/или психо-эмоциональных на-

грузках, систематических занятиях спортом, беременности, кормлении грудью; для повышения адаптационной способности и резистентности организма к инфекциям и радиации.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз.

Поб. действ.: Не наблюдались при соблюдении дозировки (1 таблетка в день).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день.

Произв.: U.S. Quality Drug (США)

Мегациллин орал (Megacillin® oral)

Феноксиметилпенициллин*

Сост. и ф.в.: 1 растворимая таблетка содержит феноксиметилпенициллина (в форме калиевой соли) 600000 или 1000000 МЕ; в упаковке 10 и 20 шт.

1 флакон содержит гранулы для приготовления 100-мл суспензии 300000 МЕ/5 мл в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: Абсорбция - 50-60%, связь с белками крови - 60%, экскреция - на 25% в неизмененном виде и 35% в виде неактивной кислоты. Терапевтическая концентрация достигается в плазме крови через 10 мин после приема, C_{max} - через 0,5-0,75 ч, сохраняется на терапевтическом уровне 8 ч. $T_{1/2}$ - 0,5 ч.

Показ.: Инфекции ЛОР-органов (тонзиллит, фарингит, ларингит, средний отит), дыхательных путей, кожи (эризи-пелас, эризипелонд и мигрирующая эритема), скарлатина, рецидивы ревматизма (профилактика), профилактика эндокардита при хирургических вмешательствах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, желудочно-кишечные расстройства, сопровождаемые рвотой и диареей.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции.

Взаим.: Экскреция замедляется ацетилсалициловой кислотой, индометацином и фенилбутазоном. Эффект снижается бактериостатическими препаратами.

Примен. и доз.: Внутрь, по 3 таблетки в сутки; детям (до 14 лет) - 50-60 тыс. МЕ/кг массы в сутки.

Произв.: Grünenthal (Германия)

Мегейс (Megace®)

Мегестрол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мегестрола ацетата 40 или 160 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, гестагенное.

Показ.: Паллиативное лечение поздних стадий рака молочной железы и эндометрия.

Противопоказ.: Первые 4 мес беременности.

Поб. действ.: Прибавка в весе, тромбоз, флебит, тромбоэмболия легочной артерии, тошнота, рвота, отеки, выраженные маточные кровотечения, одышка, гиперемия в месте опухоли, гипергликемия, алопеция, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, однократно или в несколько приемов, при раке молочной железы - по 160 мг в сутки; при раке эндометрия - по 40-320 мг в сутки. Курс - не менее 2 мес (для установления эффективности терапии).

Предост.: Осторожно применять при тромбозе в анамнезе. Препарат не следует назначать вместо хирургического, химиотерапевтического или лучевого лечения рака, а также использовать в диагностике беременности.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Медазол (Medazol®)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метронидазола 250 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка вагинальная - 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противопротозойное.

Показ.: Анаэробные инфекции (органов малого таза, бронхолегочной системы, интраабдоминальные, ЦНС, кожи, опорно-двигательного аппарата), септицемия, эндокардит, язвенный гингивит, трихомониаз, амебиаз, лямблиоз.

Противопоказ.: Дискразия крови, заболевания ЦНС в активной форме, беременность (первый триместр), лактация.

Поб. действ.: Гиперемия, расстройства ЖКТ (потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, диарея), головокружение, депрессия, нарушение сна, нарушение координации (атаксия), дизурия, ощущение давления в тазовой области, темноокрашенная моча, обратимая нейтропения, симптомы панкреатита, аллергические реакции (крапивница, зуд).

Взаим.: Несовместим с алкоголем и карбонатом лития.

Примен. и доз.: При анаэробных инфекциях - по 7,5 мг/кг (максимально 1 г) 4 раза в сутки в течение 7 дней (и более). При трихомониазе (одновременно обоим половым партнерам) - 2 г однократно или 1 г утром и вечером

(после еды) в течение 1 суток или по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 7 дней. Детям - по 5 мг/кг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Женщинам - также интравагинально по 1 таблетке каждый вечер в течение 10 суток. При амебиазе взрослым (при кишечной форме и абсцессе печени) назначают по 500-750 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 5-10 дней. Детям при кишечной форме - по 50 мг/кг в сутки за 3-4 приема в течение 5-10 дней; при абсцессе печени детям младше 12 лет - по 250 мг 3 раза в сутки в течение 5-10 дней. При лямблиозе - по 250 мг 3 раза в сутки в течение 7-10 дней или по 2 г в 1 прием в течение 3 дней; детям до 12 лет - по 5 мг/кг 3 раза в сутки в течение 5-7 дней.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Медетопект (Medetopekt®)

Пектин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка массой 550 мг содержит 85% пектиносодержащих компонентов: натуральный низкоэтерифицированный яблочный пектин (Е 440а); специальный яблочный экстракт, содержащий балластные (растворимые и нерастворимые) вещества; яблочные пищевые волокна, содержащие яблочный пектин и нерастворимые балластные вещества; порошок из измельченных сухих цельных яблок; витамин С. Суммарное содержание пектина - 200 мг.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное (связывание и выведение ионов тяжелых металлов).

Фармакодин.: Связывание и выделение с пектином ионов тяжелых металлов и их радионуклидов.

Показ.: Интоксикация солями тяжелых металлов (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Детский возраст (до 6 лет).

Взаим.: Может снижать всасывание других препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, запивая 150-200 мл воды или растворяя таблетки во фруктовом соке, безалкогольных напитках. Для постоянного приема в районах, загрязненных тяжелыми металлами и их радионуклидами, - по 3-5 таблеток 3 раза в день, соблюдая трехдневный интервал через каждые 7 дней в течение года (12 доз по 225 таблеток - для одного года). В профилактических целях - 7 дней по 3-4 таблетки в день, затем 7 дней - от 4 до 10 таблеток 3 раза в день и 7 дней - по 10 таблеток 3 раза в день. Такой курс по-

вторяется 3-4 раза в год (6-8 доз по 225 таблеток для одного года). Детям с массой тела от 20 до 35 кг - дозы уменьшаются вдвое.

Предост.: Для профилактики метеоризма при переходе на пищевые рационы с балластными компонентами необходимо использовать сниженные дозы до момента, пока ЖКТ не приспособится к новому питанию.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Медихронал (Medichronalum)

Сост. и ф.в.: Гранулы глюкозы 17,5 г и глицина 7,0 г с формиатом - 3,5 г в двух отдельных пакетах, которые вкладываются в общую упаковку.

Фарм. действ.: Специфическое связывание уксусного альдегида, усиление синтеза катехоламинов, стимуляция лимбикортикулярного комплекса, повышение функциональной активности коры головного мозга.

Показ.: Купирование острых алкогольных и абстинентных состояний, устранение физической зависимости при хроническом алкоголизме.

Противопоказ.: Тяжелые формы сахарного диабета.

Поб. действ.: Кожный зуд.

Примен. и доз.: Внутрь после еды (растворив содержимое обеих частей упаковки в 1/2-3/4 стакана теплой воды).

Произв.: Дарница (Украина)

Мезакол (Mesacol)

Месалазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит месалазина 400 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антимикробное.

Показ.: Неспецифический язвенный колит, болезнь Крона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, болезни крови, тяжелые нарушения функции печени, детский возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Во время беременности назначать только если ожидаемый эффект оправдывает возможный риск для плода. Следует проявлять осторожность при назначении препарата кормящим материям, так как 5-аминосалициловая кислота обнаруживается в грудном молоке.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, изжога, рвота, боль в животе, потеря аппетита, диарея, стоматит, головная боль, головокружение, бессонница, деп-

рессия, утомляемость, парестезии, тремор, шум в ушах, перикардит, АВ-блокада, гипотония, стенокардия, сердцебиение, тахикардия, одышка, гипер- или гипотония, алоpecia, аллергические реакции, изменение показателей мочи и крови.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая большим количеством воды, при обострении - по 1,2-2,4 г/сутки за 3 приема. Для профилактики - по 0,4 г 3 раза в день.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Мезапам (Mezepamum)

Медазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит медазепам гидрохлорида 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, миорелаксирующее.

Показ.: Неврозы, невротические симптомы при алкоголизме.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночно-почечная недостаточность, миастения, беременность.

Поб. действ.: Сонливость, вялость, нарушения координации движений, психическая зависимость, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10-20 мг 2-3 раза в день (суточная доза - 60-70 мг) не более 2 мес.

Произв.: Тюменский химфармзавод (Россия)

Мезим форте® (Mezym® forte)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит панкреатина (из поджелудочной железы свиней), с минимальной активностью липазы 3500 ЕД (по Европейской фармакопее), амилазы - 4200 ЕД и протеаз - 250 ЕД; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита ферментов поджелудочной железы.

Показ.: Недостаточность пищеварения при нарушениях экзокринной функции поджелудочной железы: муковисцидоз, хронический панкреатит, диспепсии, синдром Ремгельда, метеоризм; нарушения усвоения пищи (состояния после резекции желудка и тонкого кишечника, ускоренное прохождение пищи через кишечник, погрешности в диете и др.), дегазация кишечника перед диагностическими исследованиями; нарушения в системе печень-желчный пузырь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. непереносимость свинины), острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, не разжевывая, с большим количеством жидкости, по 1-2 таблетки; при необходимости, во время еды еще 1-4 таблетки. Не рекомендуется превышать суточную дозу ферментов, составляющую 15000-20000 ЕД липазы/кг массы тела, особенно у больных с муковисцидозом.

Пр о и з в.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Мезим форте® 10000 (Mezym® forte 10000)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 капсула с мини-таблетками (устойчивыми к воздействию желудочного сока) содержит панкреатина из поджелудочных желез свиней, с минимальной активностью липазы 10000 ЕД (по Европейской Фармакопее), амилазы - 9000 ЕД и протеаз 500 ЕД; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита ферментов поджелудочной железы, нормализация пищеварения.

Фармакодин.: Активность препарата зависит от наличия в нем липазы и трипсина. Под действием липазы расщепляются жиры и образуются жирные кислоты, трипсин и другие протеолитические ферменты расщепляют белки. Трипсин, кроме того, снижает стимулированную секрецию поджелудочной железы и обуславливает обезболивающее действие панкреатина. Эффективность определяется количеством содержащихся в мезиме ферментов и скоростью, с которой они высвобождаются из таблеток. Оболочки таблеток защищают чувствительные к желудочному соку ферменты (амилаза) и растворяются только в щелочной среде тонкого кишечника.

Показ.: Недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы, сопровождающиеся нарушением пищеварения: муковисцидоз, хронический панкреатит; метеоризм, симптомокомплекс Ремгеля, состояния после резекции желудка и кишечника, ускоренное прохождение пищи через кишечник (нервозность, кишечные инфекции), хронические нарушения в системе печень - желчный пузырь, диспепсии; погрешности в диете (прием жирной, непривычной, трудноперевариваемой пищи); де-

газация кишечника перед диагностическими исследованиями.

Противопоказ.: Острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, аллергия к свиному мясу.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Аллергические реакции немедленного типа, преимущественно в области кишечника, с симптомами кишечной непроходимости, чаще у больных с муковисцидозом (особенно у детей).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, не разжевывая, по 2-4 капсулы. Доза устанавливается индивидуально, в зависимости от степени тяжести расстройства пищеварения. Увеличение дозы проводят под контролем, в соответствии с улучшением симптомов (стеаторея, боли в животе и др.). Не рекомендуется превышать суточную дозу ферментов, составляющую 15000-20000 ЕД липазы/кг массы тела, особенно у больных с муковисцидозом.

Предост.: При нарушениях пищеварения на фоне нормальной функции поджелудочной железы длительное применение препарата может снижать всасывание железа. Во избежание этого одновременно следует назначать препараты железа.

Пр о и з в.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Мексавит (Mexavit®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит парацетамола 500 мг и аскорбиновой кислоты 200 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, снижение проницаемости сосудов, стимуляция иммунной системы, обмена веществ, регенерации синтеза стероидов и коллагена.

Показ.: Лихорадка, болевой синдром слабой и средней интенсивности различного генеза (головная боль, невралгия, миалгия, артралгия, дисменорея и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженное нарушение функции почек или печени, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм.

Поб. действ.: Раздражение слизистой ЖКТ, лихорадка, нарушения функции печени (при длительном применении), тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия, агранулоцитоз, нефротоксическое действие, бронхоспазм, аллергические реакции (экзантема, ангионевротический отек).

Примен. и доз.: Внутрь, перед применением таблетку препарата растворяют в 1/2-1 стакане кипяченой воды. Взрослым и детям подросткового возраста (с массой тела более 50 кг) в разовой дозе - 1 таблетка. Максимально - 4 таблетки в сутки. Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1/2 таблетки на прием, максимальная суточная доза - 2 таблетки. Препарат можно назначать из расчета 10-15 мг/кг массы тела до 4 раз в сутки. Курс лечения - не более 10 дней.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при нарушениях функций почек и печени, бронхиальной астме, повышенной чувствительности к НПВС. Лечение в период беременности и лактации, а также детей до 6 лет необходимо проводить под тщательным врачебным контролем.

Произв.: Merckle (Германия)

Мелатонекс (Melatonex)

Сост. и ф.в.: 1 делимая таблетка содержит пиридоксина гидрохлорида 10 мг и мелатонина 3 мг.

Фарм. действ.: Нормализация физиологического сна, антиоксидантное.

Клин. фарм.: Ингредиенты, входящие в состав препарата, обеспечивают длительное и постепенное высвобождение активного компонента (мелатонина) с момента засыпания до утреннего пробуждения (соответствующее естественному процессу сна).

Показ.: Нарушения сна.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке за 30 мин до сна, проглатывая целиком и запивая достаточным количеством воды. При необходимости снижения дозы таблетку делят на 2 или 4 части (следует учитывать, что нарушение целостности ускоряет высвобождение активного компонента).

Предост.: Рекомендуется обязательная консультация врача в случае применения препарата при беременности, лактации, сопутствующей лекарственной терапии, при аутоиммунных и эндокринных расстройствах, эпилепсии. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами.

Произв.: CSC (Италия)

Мелипрамин (Melipramin®)

Имипрамин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит имипримина гидрохлорида 25 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 25 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, седативное, м-холинолитическое.

Показ.: Эндогенные депрессии (периодическая, депрессивная фаза маниакально-депрессивного психоза); инволюционная депрессия; ночное недержание мочи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночно-почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тахикардия, застойная сердечная недостаточность, ранний постинфарктный период, склонность к судорогам, шизофрения, эпилепсия, глаукома, аденома предстательной железы, атония мочевого пузыря, беременность, возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, ортостатическая гипотония, потливость, слабость, сердцебиение, сухость во рту, паралич аккомодации, бессонница, галакторея, запоры, задержка мочи, парестезии, эпилептические припадки, беспокойство, галлюцинации, аритмии, тремор, гинекомастия, снижение либидо, импотенция, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с алкоголем, ингибиторами МАО (усиление психостимулирующего эффекта), снижает эффективность фенитоина и альфа-адреноблокаторов. Холинолитики, фенотиазины и бензодиазепины повышают седативные и центральные холинолитические свойства.

Примен. и доз.: Внутрь, в течение 10-14 дней дозу постепенно повышают до 150-250 мг в сутки, затем постепенно снижают до поддерживающей - 50-150 мг. При неглубоких депрессиях суточная доза составляет 75-150 мг, поддерживающая - 25-50 мг в сутки. Детям (за 1 ч до сна) от 3 до 6 лет - 5 мг; от 7 до 12 лет - 25 мг. В/м, по 25 мг 3 раза в день в сочетании с оральным приемом 25 мг, ежедневно дозу можно увеличивать на 25 мг. Через 7 дней начинают снижение дозы до поддерживающей (по 25 мг в сутки) и орально назначают 50 мг. С 13-го дня - только оральное назначение - 350 мг в сутки за 3 приема.

Произв.: Egis (Венгрия)

Мемоплант (Memoplant®)

Гинкго Билоба

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит сухого экстракта из листьев гинкго-билоба (35-67:1) 40 мг, из которых 9,6 мг составляют гинкго-

флавоногликозиды (кверцетинкампферол, изораментин) и 2,4 мг терпенлактоны (гинкголид, билобалид); в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антитромботическое.

Фармакодин.: Регулирует тонус сосудов, улучшает кровообращение, препятствует образованию тромбов, усиливает снабжение мозга кислородом и глюкозой, обладает противоотечным эффектом, повышает устойчивость мозга к гипоксии.

Показ.: Нарушения деятельности мозга, вызванные деменцией дегенеративной или сосудистой природы, проявляющиеся головокружением, головными болями, шумом в ушах, ослаблением концентрации внимания и памяти, снижением интеллектуальных способностей, нарушением артериального периферического кровообращения, перемежающейся хромотой.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Легкие расстройства функции ЖКТ, головные боли, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 3 раза в день, одновременно с приемом пищи (не разжевывая, с небольшим количеством жидкости). Средняя продолжительность курса лечения - 3 мес.

Произв.: Dr. Willmar Schwabe (Германия)

Меновазин (Menovasinum)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора на 70% этиловом спирте содержат ментола 2,5 г, новокаина 1 г и анестезина 1 г; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Невралгия, миалгия, артралгия, зудящий дерматоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Головокружение, общая слабость, понижение артериального давления.

Примен. и доз.: Наружно, в болезненные участки кожи втирают 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Меногон (Menogon®)

Менотропин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит человеческого менопаузального гонадотропи-

на в количестве, соответствующем 75 МЕ фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и 75 МЕ лютеинизирующего гормона (ЛГ); в комплекте с растворителем в упаковке 5 и 10 шт.

Фарм. действ.: Гонадотропное, стимуляция созревания фолликулов, сперматогенеза, синтеза и активации тестостерона.

Показ.: Бесплодие женское и мужское, обусловленное вторичной недостаточностью гонад; для стимуляции суперовуляции в программе "экстракорпорального оплодотворения" в комбинации с Хорагоном.

Противопоказ.: Для женщин - беременность, кисты или увеличение яичников, синдром поликистозных яичников, маточные кровотечения неясной этиологии, эстрогензависимые опухоли матки, яичников, молочных желез. Для мужчин - карцинома простаты.

Поб. действ.: Диспептические явления, гиперстимуляция яичников, многоплодная беременность, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м. Бесплодие у женщин - доза для стимуляции роста фолликулов у нормо- и гипогонадотропных женщин подбирается индивидуально и зависит от реакции яичников; обычно начинают с дозы 75-150 МЕ ФСГ и 75-150 МЕ ЛГ (1-2 ампулы) в день; овуляторная доза Хорагона (5000-10000 МЕ) вводится через 1-2 дня после последней инъекции Меногона. Бесплодие у мужчин - по 1000-3000 МЕ Хорагона 3 раза в неделю (до нормализации уровня тестостерона в крови) и Меногон - 3 раза в неделю по 75-150 МЕ ФСГ + 75-150 МЕ ЛГ (1-2 ампулы) в течение нескольких месяцев.

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Менорест (Menorest)

Эстрадиол*

Сост. и ф.в.: Трансдермальный пластырь с номинальным высвобождением эстрадиола 25, 50, 75 или 100 мкг/сутки; в упаковке 1 шт., в коробке 24 трансдермальных пластыря.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Фармакокин.: Терапевтическую концентрацию в крови эстрадиола (40-100 пг/мл) наложение пластыря создает через 2 ч и поддерживает в течение 3-4 дней. Соотношение эстрон/эстрадиол составляет приблизительно 1.

Клин. фарм.: Устраняя дефицит эстрогенов, препарат ослабляет проявления

климакса, препятствует резорбции кальция из костной ткани при системном постменопаузальном остеопорозе и уменьшает частоту переломов костей. Преимущество трансдермальной формы заключается в отсутствии эффекта "первого прохождения" через печень.

Показ.: Физиологическая или преждевременная (например, после удаления яичников) менопауза, сопровождающаяся симптомами климакса: вазомоторные нарушения ("приливы", ночные поты), урогенитальные расстройства (диспареуния, атрофические вульвовагиниты и/или уретриты и тригониты), психические нарушения (астения, нарушения сна, депрессия); постменопаузальный системный остеопороз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, рак молочной железы или эндометрия, миома матки, эндометриоз, эстрогензависимые опухоли, маточные кровотечения невыясненной этиологии, тяжелые поражения печени, диффузные заболевания соединительной ткани, опухоли гипофиза, отосклероз, тромбофлебиты и тромбозы, беременность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендовано.

Поб. действ.: Головная боль, покраснение кожи и зуд в месте аппликации, увеличение и чувство напряжения в молочных железах, маточные кровотечения (признак передозировки эстрадиола), тошнота, рвота, метеоризм, холестатическая желтуха, головокружение, изменение массы тела, либидо, характера вагинальных выделений, увеличение размеров лейомиомы матки, гиперплазия эндометрия, кандидоз влагалища.

Примен. и доз.: Накладывают на чистый участок интактной кожи на ягодице, животе, спине или бедре (места аппликаций чередуют). При климаксе у женщин терапию начинают с применения пластыря-50, накладывая его на 3-4 дня. В дальнейшем проводят коррекцию дозы. Для поддерживающей терапии используют минимальную эффективную дозу. Профилактику или лечение постменопаузального системного остеопороза начинают как можно раньше (не позже чем через 1 год после наступления менопаузы) с применением пластыря-50 в течение каждых 3-4 дней. В дальнейшем ежемесячно, оценивая выраженность остеопороза, проводят коррекцию дозы, используя пластыри с разным содержанием эстрадиола. Препарат используют непрерывно или циклически (в течение 23-28 дней в месяц с 7-2 дневными перерывами). У больных с интактной маткой его, как правило, ком-

бинируют (последние 2 нед месяца) с прогестероном. После завершения такого курса может возникнуть маточное кровотечение.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным с бронхиальной астмой, мигренью, эпилепсией, тяжелой артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения, ишемической болезнью сердца, нарушениями функции печени и/или почек, при наличии в анамнезе тромбоза, эмболии. В процессе лечения необходим систематический контроль за функцией печени и АД; у больных сахарным диабетом - за уровнем глюкозы крови; при длительном лечении (не реже одного раза в год) проводят тщательное гинекологическое обследование. Необходима осторожность при одновременном применении с барбитуратами, психотропными и противосудорожными препаратами, рифампицином и алкоголем.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Ментоклар (Mentoklar®)

Сост. и ф.в.: 50 мл капель для ингаляции содержат смеси эфирных масел эвкалипта, мяты перечной, чабреца, кедра, скипидара 4,52 г и ментола 1,0 г; во флаконах по 50 мл.

1 г геля содержит смеси эфирных масел эвкалипта и скипидара, перечной мяты, чабреца и кедра 6%, камфоры 3% и ментола 2% в гидрофильной основе; в тубах по 50 мг.

Карманный ингалятор содержит смеси эфирных масел эвкалипта, мяты перечной, чабреца 0,6 г, ментола 0,2 г, камфоры 0,3 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное, спазмолитическое, отвлекающее.

Показ.: Насморк, кашель, ларингит, трахеит, бронхит (ингаляции); артралгия, миалгия (гель).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхиальная астма, коклюш.

Примен. и доз.: Наружно - гель втирают в кожу груди и спины (при насморке наносят на слизистую носа, при мышечных и суставных болях - на пораженные области). Карманный ингалятор - отвинчивают колпачок, вставляют в ноздрю ингалятор и глубоко вдыхают 1-2 раза. Капли для ингаляций (2,5-5 мл, т.е. 1/2-1 чайную ложку) помещают в ингаляционный сосуд с 0,5 л горячей воды (65 град.С), накрывают специальным

приспособлением и вдыхают пары (2-3 раза в день) через нос или рот в течение 5-10 мин.

Предост.: Не рекомендуется назначение грудным и маленьким детям.

Произв.: Lek (Словения)

Мерказолил (Mercazolilum)

Тиамазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мерказолила 0,005 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антитиреоидное.

Фармакодин.: Блокирует пероксидазу, участвующую в синтезе (процесс йодирования) тиреоидных гормонов щитовидной железы.

Показ.: Гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксический криз, подготовка к тиреоидэктомии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гранулоцитопения (в т.ч. в анамнезе), беременность, кормление грудью.

Поб. действ.: Аллергические реакции. Редко - лихорадка, изменения чувства вкуса, нарушения в системе кроветворения.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, при легких и средних формах - по 0,005 г 3-4 раза в сутки, при тяжелой форме - по 0,01 г 3-4 раза в сутки. После наступления ремиссии назначают по 2,5-10 мг в сутки. Детям - по 0,3-0,5 мг на 1 кг массы тела.

Произв.: Акрихин (Россия)

Меркаптопурин (Mercaptopurinum)

Меркаптопурин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит меркаптопурина 0,05 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Острый лейкоз, хронический миелолейкоз (обострение).

Противопоказ.: Нарушения функции печени и почек.

Поб. действ.: Анорексия, диспепсия, рвота, диарея, лейкопения, тромбоцитопения, геморрагии.

Примен. и доз.: Внутрь, из расчета 2-2,5 мг/кг/сутки однократно или в 2-3 приема в течение 4 нед. При отсутствии улучшения дозу можно повысить до 5 мг/кг (не более). При первых признаках выраженной лейкопении прием рекомендуется прервать на 2-3 дня. Если за это время лейкопения не усугубляется, лечение возобновляют.

Произв.: Акрихин (Россия)

Мерлит (Merlit®)

Лоразепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лоразепама 1, 2 и 2,5 мг; в упаковке 20, 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, снотворное, миорелаксантное.

Фармакокин.: Биодоступность при приеме внутрь более 90%, связывание с белками плазмы - около 80%; период полувыведения - около 14 ч. Метаболизируется в печени, выводится главным образом почками в виде метаболитов.

Показ.: Невротические расстройства, сопровождающиеся состоянием тревоги, напряжения, страха, беспокойства, психореактивные состояния, депрессии, эмоциональные реактивные расстройства, нарушения сна (особенно в фазе засыпания). Эндогенные психозы (маниакальные и кататонические состояния, состояния тревоги и возбуждения при шизофрении), алкогольный делирит, премедикация в анестезиологической практике, эпилепсия (в сочетании с основными противосудорожными препаратами) и эпилептический статус, симптоматические судорожные состояния, психосоматические расстройства, головная боль.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, закрытоугольная глаукома, острая интоксикация (алкогольная, психотропными препаратами).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью (особенно в первый триместр беременности).

Поб. действ.: Сухость во рту, дисфагия, тошнота, рвота, диарея, запор, нарушение аппетита, нарушения функции печени (редко); атаксия, утомляемость, мышечная слабость, кожные реакции, изменение состава крови.

Взаим.: Усиливает действие алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 мг 1-3 раза в день. При выраженном состоянии страха и возбуждения можно увеличить ежедневную дозу до 4-6 мг.

Предост.: При лечении не следует выполнять работу, требующую повышенного внимания, быстроты реакций. Рекомендуется начинать лечение в конце рабочей недели. Отменять препарат следует постепенно.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Меронем (Meronem)

Меропенем*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления

инфузионного раствора содержит меропенема 500 или 1000 мг.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора для в/м введения - 500 мг; в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции нижних дыхательных путей и легких, мочеполовой системы, брюшной полости, гинекологические, кожи; менингит, септицемия, начальная монотерапия при подозрении на бактериальную инфекцию у больных с ослабленным иммунитетом и больных с нейтропенией; полимикробные инфекции (монотерапия и в комбинации с другими антимикробными агентами).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфекции, вызванные метициллин-резистентным стафилококком, беременность, лактация, детский возраст (до 3 мес).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, парестезии, тромбоцитопения, эозинофилия, нейтропения, нарушение функции печени, оральный и вагинальный кандидоз, воспаление и тромбофлебит в месте введения, сыпь, зуд, крапивница.

Примен. и доз.: В/в, в виде болюсной инъекции в течение не менее 5 мин или в/в инфузии в течение 15-30 мин. Обычно назначают по 500 мг-1 г каждые 8 ч, при менингите - 2 г каждые 8 ч; детям от 3 мес до 12 лет - 10-12 мг/кг каждые 8 ч, у детей с массой тела более 50 кг следует использовать дозировки взрослых, при менингите - 40 мг/кг каждые 8 ч. В/м доза подбирается индивидуально.

Произв.: Zeneca (Великобритания)

Метадоксил (Metadoxil)

Метадоксин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метадоксина 500 мг; в упаковке 30 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 300 мг; в упаковке 10 шт.

1 монодозный флакон с 15 мл раствора для приема внутрь - 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное, цитопротективное, стимуляция окисления и ускорение элиминации этанола.

Показ.: Острый и хронический алкоголизм, алкогольная гепатопатия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Периферическая нейропатия.

Взаим.: Взаимное ослабление эффекта с леводопой (усиление декарбоксилирования). Несовместим с солями железа, растворами щелочей и окислителей.

Примен. и доз.: В/м и в/в - по 1-2 ампулы или внутрь - по 2 таблетки. Раствор оральный - по 1 монодозному флакону 2 раза в день.

Предост.: Осторожно назначать при болезни Паркинсона. Ампулы содержат метабисульфит натрия, который может вызывать аллергические реакции, приступ астмы.

Произв.: CSC (Италия)

Метамол (Metamol®)

Метоклопрамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метоклопрамида гидрохлорида 10 мг; в упаковке 30, 100 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противорвотное.

Показ.: Тошнота, рвота, диспептические расстройства (боли в области желудка, кишечника, изжога, метеоризм, отрыжка), гастроэзофагеальный рефлюкс, гастрит, дуоденит, желчнокаменная болезнь; рентгенодиагностика заболеваний ЖКТ (до процедуры).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, феохромоцитома, желудочно-кишечные кровотечения, механическая кишечная непроходимость, прободение желудка или кишечника, эпилепсия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Беспокойство, сонливость, слабость, апатия, возбуждение, сухость во рту, запор или диарея, раздражительность; метгемоглобинемия, боли в области шеи, паркинсонизм, крапивница.

Взаим.: Ослабляет действие холиноблокаторов, потенцирует экстрапирамидный эффект нейролептиков; уменьшает абсорбцию циметидина, дигоксина, увеличивает - препаратов лития, парацетамола, ацетилсалициловой кислоты, алкоголя. Изменяет действие трициклических антидепрессантов, ингибиторов моноаминоксидазы и симпатомиметиков.

Передоз.: Проявляется в гиперсомнии, дезориентации и экстрапирамидальных расстройствах. Как правило, симптоматика исчезает самопроизвольно в течение 24 ч. Лечение (если необходимо): холиноблокаторы, противопаркинсонические и антигистаминные препараты.

Примен. и доз.: Внутрь, за полчаса до или через час после еды - по 1 таблетке 3-4 раза в день (подросткам 15-20 лет - по 1/2-1 таблетке 2-3 раза в день).

Максимальная суточная доза не более 0,5 мг/кг.

Произв.: CTS (Израиль)

Метацин (Methacinum)

Метоциния йодид*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл инъекционного раствора содержит метоциния йодида 1 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 2 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, блокада м-холинорецепторов.

Показ.: Спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, почечная и печеночная колика); гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез.

Противопоказ.: Глаукома, гипертрофия предстательной железы.

Поб. действ.: Сухость во рту, запор, затруднение мочеиспускания.

Примен. и доз.: В/м, в/в, п/к, по 0,5-2 мл 0,1% раствора, суточная доза - 6 мг. Внутрь, по 2-4 мг 2-3 раза в день, высшая разовая доза - 5 мг; суточная - 15 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Метилурацил (Methyluracilum)

Метилурацил

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метилурацила 0,5 г; в упаковке 10 или 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, стимуляция лейкопоэза, ускорение регенерации, анаболическое, антикатаболическое.

Показ.: Лейкопения (алиментарно-токсическая алейкия, лучевая или токсическая цитопения), вяло заживающие раны, ожоги, переломы костей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвы ЖКТ, гастрит, колит, проктит, панкреатит, гепатит, энтероколит, проктосигмоидит, цистит, кольпит, пневмония, послеоперационный период (профилактика образования спаек).

Противопоказ.: Лейкемические формы лейкоза или гемобластоза.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - по 0,5 г 4 раза в день (при необходимости до 6 раз в сутки); детям от 3 до 8 лет - по 0,25 г, старше 8 лет - по 0,25 г 3 раза в день. Курс при заболеваниях ЖКТ - 30-40 дней; в других случаях может быть менее продолжительным.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Акрихин (Россия); Фармак (Украина)

Метилурациловая мазь (Unguentum Methyluracili)

Метилурацил

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат 10 г метилурацила; в тубах по 25 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, стимуляция эпителизации.

Показ.: Лучевые поражения кожи (профилактика, лечение, в т.ч. буллезного дерматита), ожоги, раны, язвы; радиоэпителиит, поздние лучевые поражения влажных мест.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно. Наносят на поврежденные участки 5-20 г ежедневно в течение 15-30 дней, при поражениях влажных мест используется рыхлая тампонада.

Произв.: Акрихин (Россия)

Метилэргобревин (Methylergobrevin)

Метилэргометрин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит метилэргометрина малеата 0,1 или 0,2 мг; в упаковке 50 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 0,25 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Повышение тонуса миометрии.

Показ.: Второй период родов, атонические маточные кровотечения, субинволюция матки, лохиометра.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая гипертония, окклюзионные заболевания сосудов, сепсис, беременность, первый период родов.

Поб. действ.: Абдоминальные боли, тошнота, рвота, повышенное потоотделение, головокружение, головная боль, повышение АД, брадикардия или тахикардия, спазм периферических сосудов, снижение секреции молока, анафилактический шок, аллергические реакции (кожная сыпь).

Взаим.: Усиливает сосудосуживающие и вазопрессорные эффекты симпатометиков и эрготамина. Эффективно комбинируется с окситоцином.

Примен. и доз.: При активном ведении второго периода родов вводят в/в 0,5-1 мл после появления передней части плеча плода. Для родов в условиях общего обезболивания рекомендуется вве-

дение 1 мл метилэргометрина. При ато-
ническом маточном кровотечении - 1 мл
в/м или 0,5-1 мл в/в. При необходи-
мости инъекции повторяют с интервалом
в 2 ч. При терапии субинволюции, лохи-
ометры применяют 0,125-0,25 мг перо-
рально или 0,5-1 мл п/к или в/м до 3
раз в день. При кесаревом сечении вво-
дят после извлечения плода в/в - по
0,05-0,1 мг или в/м по 0,2 мг. При
абортах назначают после расширения ка-
нала шейки матки в/в - 0,1-0,2 мг. При
спонтанных абортах показано в/в вве-
дение - 0,05-0,1 мг.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Метионин (Methioninum)

Метионин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая обо-
лочкой, содержит метионина 0,25 г; в
упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Компенсация дефицита
метионина, гепатопротекторное.

Показ.: Заболевания печени (цирроз,
алкогольная гепатопатия, токсический
гепатит); дистрофия, белковая недоста-
точность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1/2-1 ч до
еды - по 0,5-1,5 г 3-4 раза в день; для
детей до 1 года - 0,1 г, до 2 лет - 0,2 г,
от 3 до 4 лет - 0,25 г, от 5 до 6 лет - 0,3
г, от 7 лет и старше - 0,5 г. Курс - 10-30
дней или по 10 дней с 10-дневными
перерывами.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Метипред (Metypred)

Метилпреднизолон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ме-
тилпреднизолона 4 или 16 мг, в упаковке
30 или 100 шт.

1 флакон с порошком для пригото-
вления инъекционного раствора - метил-
преднизолона натрий сукцинат 250 мг в
комплекте с 4 мл растворителя в ампуле.

1 мл суспензии депо для инъекций -
метилпреднизолона ацетата 40 мг; во
флаконах по 2 мл, в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалитель-
ное, иммунодепрессивное.

Показ.: Коллагенозы, аллергические ре-
акции (включая бронхиальную астму,
анафилактический шок), неспецифичес-
кий язвенный колит, заболевания почек,
печени, кожи, требующие лечения глю-
кокортикоидами; лейкопения, лимфома,
миелома, рак легкого (в комбинации с
цитостатиками); тошнота и рвота на
фоне цитостатической терапии.

Противопоказ.: Туберкулез, острые и
хронические бактериальные и вирусные
инфекции без соответствующей антибио-
тико- и химиотерапии.

Поб. действ.: Синдром Иценко-Кушин-
га, атрофия надпочечников, повышен-
ная восприимчивость к инфекциям, ос-
теопороз, обострение язвы желудка, из-
менение баланса углеводов, повышение
внутриглазного давления, психические
расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь по утрам, жела-
тельно через день. В начале лечения доза
- 16-96 мг в день. При поддерживающем
лечении 4-12 мг в день. Суспензия для
инъекций: в/м - 40-120 мг (1-3 мл сус-
пензии) в течение 1-4 нед. Внутрисустав-
но: в синовиальную сумку, в сухожиль-
ное влагалище - 4-80 мг, а при лечении
кожных заболеваний - в область пораже-
ний - 20-60 мг (0,5-1,5 мл). Можно
также вводить с помощью ректальных
клизм. Дозы в клизмах - 40-120 мг (1-3
мл) 3-7 раз в неделю. В/в (медленно
или капельно) или в/м - доза определя-
ется тяжестью состояния. При шоке и
после пересадки органов - до 30 мг/кг
в/в. Для купирования тошноты и рвоты
при приеме цитостатиков - 250 мг за 20
мин до приема и 250 мг через 6 ч после
приема этих препаратов, при необходи-
мости дозу повторяют каждые 6 ч. Детям
дозу уменьшают (но не менее 25 мг в
день).

Произв.: Orion (Финляндия)

Метотрексат (Methotrexate)

Метотрексат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мето-
трексата 2,5 мг, в упаковке 20 и 100 шт.

1 флакон с лиофилизированным порош-
ком для приготовления инъекционного
раствора - 5, 20, 50, 500 или 1000 мг в
комплекте с растворителем; в упаковке
1 и 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, ци-
тостатическое, антагонизм с фолиевой
кислотой.

Фармакокин.: После приема внутрь бы-
стро всасывается, достигая C_{max} в сыво-
ротке крови в течение 1 ч. При однократ-
ном приеме (30 мг/кв.м) время полуаб-
сорбции составляет около 0,75 ч, полу-
распределения - около 3,5 ч и полувыве-
дения - около 27 ч. Связь с белками
плазмы крови - 50-60%. Хорошо прони-
кает во все ткани, выводится в неизме-
ненном виде почками на 60-90% за 24 ч.

Показ.: Трофобластическая болезнь,
рак кожи, рак шейки матки и вульвы,

рак легкого, саркомы костей и мягких тканей, злокачественные опухоли яичка и яичников, злокачественные лимфомы, острые лейкозы. Хорионэпителиома, рак молочной железы, мелкоклеточный рак легкого, рак верхних дыхательных путей, рак верхних отделов ЖКТ, острый лимфобластный лейкоз, лимфосаркома, остеосаркома.

Противопоказ.: Почечная недостаточность, печеночная недостаточность, лейкопения, тромбоцитопения, беременность, лактация.

Поб. действ.: Угнетение гемопоэза; мукозиты; тошнота, рвота, диарея, язвенное поражение слизистой ЖКТ; дерматит, алоpecia, нарушения функции почек, печени, аменорея, азооспермия; аллергические реакции (частота и степень выраженности зависят от дозы, длительности лечения и состояния пациентов).

Взаим.: Концентрацию в крови повышают нестероидные противовоспалительные средства. Комбинация с препаратами антифолиевого действия усиливает риск аплазии костного мозга.

Передоз.: Не позднее 4-6 ч вводят внутримышечно фолиат кальция в дозе, составляющей около 1/3 дозы метотрексата.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м, в/в или в/а. Дозы зависят от показаний, схемы лечения и могут нуждаться в коррекции в зависимости от клинического ответа и переносимости.

Предост.: Необходим тщательный контроль периферической картины крови, содержания креатинина в сыворотке. Высокие дозы следует назначать в сочетании с фолиевой кислотой и обеспечивать обильный щелочной диурез.

Произв.: Rhône-Poulenc Roger (Франция-США)

Метотрексат (Methotrexate™)

Метотрексат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метотрексата 2,5 мг; в упаковке 20, 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитотоксическое, иммунодепрессивное.

Показ.: Острые лейкозы, неходжкинская лимфома, саркома мягких и костной тканей, рак молочной железы, легких, головы и шеи, мочевого пузыря, шейки матки, яичников, карцинома яичек, тяжелый псориаз.

Противопоказ.: Выраженная анемия, лейкопения, тромбоцитопения, тяжелая печеночная и сердечная недостаточность, беременность.

Поб. действ.: Лейкопения, тромбоцитопения, мегалобластная анемия, угнетение функции костного мозга, изъязвление слизистой оболочки полости рта и ЖКТ, стоматиты, диарея, поражения печени и почек, остеопороз, повреждение кожи и ногтей, интерстициальные пневмонии, гипергликемия и др. нарушения обмена веществ, изменения оогенеза и сперматогенеза.

Примен. и доз.: Внутрь. При злокачественных новообразованиях - в разовой дозе не выше 30 мг/кв.м поверхности тела в течение 5 последовательных дней (не более), повторными курсами, рекомендуемый интервал между курсами - 2 нед; дозу при комбинации с др. химиотерапевтическими средствами, радиотерапией и хирургическим лечением снижают. При псориазе - по 10-25 мг 1 раз в неделю (коррекцию дозы проводят на основании клинического и токсических эффектов).

Предост.: Для восстановления нормальной функции костного мозга и ЖКТ следует назначать фолиевую кислоту и обеспечивать обильный щелочной диурез (бикарбонат натрия). Необходимо контролировать содержание препарата в крови, моче. С осторожностью назначают при нарушении функции печени, почек, при алкоголизме. Лактирующие женщины должны прекратить грудное вскармливание.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Метотрексат натрия АДС (Methotrexate Sodium ADC)

Метотрексат*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит метотрексата натрия 25 мг; во флаконах по 2, 4, 8 и 10 мл.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое, иммунодепрессивное.

Фармакокин.: При оральном приеме частично метаболизируется с образованием активной полиглутаминовой формы (в печени и в стенке кишечника). Связь с белками плазмы около 50%. $T_{1/2}$ (при назначении менее 30 мг/кв.м) - 3-10 ч. Основной путь выведения - почечная экскреция, до 10% выводится с желчью. Проникает в грудное молоко.

Показ.: Хорионэпителиома, пузырьный занос, острый лимфолейкоз, миелоид-

ный лейкоз, лимфомы неходжкинского типа, рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи в области головы и шеи, прогрессирующий грибовидный микоз, рак легких (плоскоклеточный и мелкоклеточный типы); псориаз (тяжелые и торпидные формы, резистентные к другим видам терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, иммунодефицит, гипоплазия костного мозга, лейкоцитопения, тромбоцитопения, выраженная анемия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется. Следует избегать наступления беременности, если один из партнеров принимал метотрексат (для мужчин - 3 мес, для женщин - не менее одного овуляторного цикла).

Поб. действ.: Гингивит, фарингит, стоматит, анорексия, диспептические расстройства, энтерит, язвы и кровотечения в ЖКТ, головная боль, головокружение, нарушение зрения, афазия, гемипарез, судороги, интерстициальный пневмонит, обострение легочных инфекций, пигментные пятна, алоpecia, геморрагии, фурункулез, нефропатия, азотемия, цистит, гематурия, нарушения овогенеза и сперматогенеза, преходящая олигоспермия, дисменорея, бесплодие, выкидыш, аномалии развития плода, снижение сопротивляемости к инфекциям, повышение активности печеночных трансаминаз, цирроз печени, цитопения, анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, фотосенсибилизация, рецидивы радиационного дерматита и фотоэритемы, аллергические реакции.

Взаим.: Токсичность и терапевтический эффект снижают препараты фолиевой кислоты, усиливают (вытесняя из связи с альбуминами) салицилаты, фенилбутазон, дифенин, сульфаниламиды, пробеницид (снижая почечную экскрецию), ко-тримоксазол. Антибиотики, плохо всасывающиеся в ЖКТ, уменьшают абсорбцию метотрексата.

Передоз.: Для устранения явлений передозировки используется лейковорин. По мере того, как увеличивается интервал времени между передозировкой метотрексата и введением лейковорина, эффективность последнего уменьшается.

Примен. и доз.: Парентерально, перорально. Дозы и длительность курса индивидуальны (зависят от формы и тяжести заболевания).

Предост.: Лекарственные формы и/или растворители, содержащие консерванты, не должны использоваться

для субдурального введения, а также для введения больших доз. Необходимо регулярно контролировать состояние периферической крови, активность печеночных трансаминаз, функцию почек, периодически проводить рентгеноскопию органов грудной клетки. Особая осторожность требуется при лечении больных с признаками деменции. Больным с псориазом или ревматоидным артритом, получающим длительное лечение, после приема суммарной дозы 1,5 г рекомендуется проводить пункционную биопсию печени.

Произв.: American Drug Company (США)

Метотрексат-Эбеве (Methotrexate-Ebewe)

Метотрексат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метотрексата 2,5; 5 или 10 мг; в упаковке 50 шт.

1 мл раствора для инъекций - 10 мг; в ампулах и флаконах по 1 или 5 мл, в упаковке 1 шт.

1 мл концентрата для приготовления инфузий - 100 мг; в ампулах и флаконах по 5, 10 или 50 мл; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Цитостатическое, противоопухолевое.

Показ.: Острый лимфолейкоз, лимфогранулематоз, рак головы и шеи (плоскоклеточный), легкого, молочной железы; опухоли яичка и яичников; хорионэпителиома, саркомы мягких тканей, остеосаркома, саркома Юинга; ретинобластома; трофобластическая болезнь (моно- и комбинированная терапия). Рефрактерные к лечению псориаза, аутоиммунные заболевания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения функции печени и почек; гипоплазия костного мозга, лейкопения, тромбоцитопения, анемия; инфекционные заболевания; язвы полости рта и ЖКТ, послеоперационные состояния, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, затрудненное глотание, гингивит, стоматит, изъязвления слизистых ЖКТ, геморрагии и др. нарушения со стороны пищеварительной системы; миелосупрессия; гепатотоксичность; расстройства мочеполовой системы (включая нарушения мочеиспускания, электролитного баланса детородной функции); нарушения со стороны кожи (эритема, алоpecia, акне и др.), ЦНС (головная боль, судороги и др.), метаболические нарушения, иммуносупрессия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь (перед едой, не разжевывая, запивая водой), в/м, в/в (болюс, инфузия), в/а, интратекально (субарахноидально). Дозы подбирают индивидуально, в зависимости от заболевания, общего состояния и картины крови больного. Дозы выше 100 мг/кв.м поверхности тела вводят только в/в капельно (раствор или концентрат предварительно разводят 5% раствором глюкозы до уровня 10 мг (500-1000 мл) и под защитой кальция фолината. Интратекально - 0,2-0,5 мг/кг (8-12 мг/кв.м) каждые 2-3 дня; после исчезновения (или уменьшения) симптомов интервал между введениями увеличивается до недели, затем - до месяца; профилактически - каждые 6-8 нед. При псориазе, псориатическом артрите, аутоиммунных заболеваниях - 10-25 мг внутрь еженедельно (возможно также в/в или в/м введение в той же дозе); начальная доза - 2,5-5 мг, затем дозу увеличивают до 7,5-25 мг/неделю (не более 30 мг/неделю).

Предост.: Необходимо контролировать слизистую полости рта, функции печени и почек, периферическую кровь.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Метранизол (Metranizole)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метронидазола 250 или 500 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, антипротозойное.

Фармакокин.: Хорошо всасывается. В концентрациях равных плазменным определяется в спинномозговой жидкости, слюне, грудном молоке; бактерицидный уровень обнаруживается в содержимом абсцессов печени. $T_{1/2}$ - 8 ч. 60-80% выводится через почки, 6-15% - с фекалиями.

Показ.: Острый и хронический трихомониаз, амебиаз и другие бактериальные инфекции, вызванные анаэробными микроорганизмами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не назначают в первый триместр беременности. Во втором и третьем триместрах используют неоднородную схему лечения.

Поб. действ.: "Металлический" вкус во рту, диспептические расстройства, глоссит, стоматит, головная боль, головокружение, нарушение координации движений, атаксия, повышенная раздражи-

тельность, депрессия, слабость, бессонница, судорожные приступы и периферическая нейропатия, уплощение зубца Т на ЭКГ, заложенность носа, сухость слизистых оболочек, гиперемия, лихорадка, дизурия, полиурия, цистит,держание мочи, нейтропения, кандидоз, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов, токсичность лития, психотические реакции на фоне дисульфирама у алкоголиков; биотрансформация ускоряется фенитоином, фенобарбиталом, замедляется - циметидином.

Передоз.: Сопровождается тошнотой, рвотой, головной болью, атаксией. Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь. Трихомониаз - 2 г/сутки (однократно) или 250 мг 3 раза в день в течение 7 дней. Амебиаз - 750 мг (детям - 35-50 мг/кг) 3 раза в день в течение 5-10 дней. Анаэробная инфекция - 7,5 мг/кг каждые 6 ч (не более 4 г/сутки) в течение 7-10 дней.

Предост.: Следует исключить употребление алкоголя.

Произв.: American Drug Company (США)

Метродин ВЧ (Metrodin® HP)

Урофоллитропин*

Метродин (Metrodin®)

Урофоллитропин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 ампула с сухим веществом для приготовления инъекций содержит урофоллитропина 75 или 150 МЕ в комплекте с растворителем в ампулах по 1 мл; в упаковке 1 и 10 шт.

Фарм. действ.: ФСГ-подобное, стимуляция роста и созревания фолликулов, увеличение уровней эстрогенов, активация пролиферации эндометрия.

Показ.: Бесплодие (в том числе неясной этиологии): стимуляция одного доминирующего фолликула у пациенток с нарушением гипоталамо-гипофизарных взаимоотношений (включая таковых с синдромом поликистозных яичников), стимуляция роста множественных фолликулов при проведении вспомогательных методов репродукции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к менотропинам; персистирующее увеличение яичников или возникновение кист яичников (не обусловленное синдромом поликистоза); аномалии развития половых органов (несовместимые с беремен-

ностью), мнома матки, гинекологические кровотечения невыясненной этиологии, рак яичников, матки или молочной железы, первичная недостаточность яичников.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Возможны в 3-5% случаев: диспептические расстройства, боли в эпигастральной области и нижних отделах живота, метеоризм, лихорадка, артралгии, боль в молочных железах и в месте инъекции, умеренное увеличение и образование кист яичников. Синдром гиперстимуляции яичников: ранние признаки - выраженные боли внизу живота, тошнота, рвота, увеличение массы тела, поздние (могут привести к летальному исходу) - гиповолемия, дисбаланс электролитов, асцит, гемоперитонеум, плевральный выпот, гидроторакс, тромбоэмболия.

Взаим.: Кломифен-цитрат может увеличить реакцию фолликула. Использование ГнРГ агонистов требует, как правило, увеличения дозы метродина. Не следует смешивать с другими препаратами в одном шприце.

Примен. и доз.: Вводят п/к и в/м (первый способ введения возможен только для препарата с высокой степенью очистки). Раствор для инъекций готовят непосредственно перед использованием с помощью прилагаемого растворителя (1 мл раствора хлорида натрия для инъекции). В 1 мл растворителя может быть растворено до 5 ампул, содержащих активное вещество. Приготовленный раствор препарата используют немедленно. При бесплодии, обусловленном гипоталамо-гипофизарными нарушениями, с целью роста одного доминирующего фолликула дозу препарата устанавливают индивидуально. Оптимальную дозу и длительность лечения определяют на основании наблюдений за реакцией яичников на введение препарата, контролируемой с помощью ультразвукового исследования яичников, определения уровня эстрогенов в крови и моче, а также клинического наблюдения. О созревании фолликула судят по увеличению содержания эстрогенов в крови и/или моче. Прием препарата продолжают до достижения адекватного уровня эстрогенов, учитывая следующие показатели: если общая экскреция эстрогенов с мочой составляет менее 180 нмоль/сутки (150 мкг/сутки) или если уровень 17-бета-эстрадиола в плазме составляет менее 1100 пмоль/л (300 пг/мл/фолликул), созревание фолликула считают неадекватным. С другой стороны, если общая

экскреция эстрогенов с мочой равна или превышает 510 нмоль/сутки (140 мкг/сутки) или уровень 17-бета-эстрадиола плазмы равен или выше 3000 пмоль/л (800 пг/мл), то существует повышенная степень риска возникновения синдрома гиперстимуляции яичников. Однако, синдром гиперстимуляции яичников может возникнуть и при наличии спонтанного высвобождения яйцеклетки из стимулированных фолликулов, и для разрыва фолликула может потребоваться инъекция Профази. Оптимальным временем для введения Профази является день, в который наблюдается пиковый уровень общей экскреции с мочой, или день, следующий за тем, в который наблюдались пиковые концентрации 17-бета-эстрадиола в плазме. Оптимальные условия для зачатия достигаются в случаях, когда пациентка имеет половое сношение в день введения Профази или в последующие 2-3 дня. Используют две различные схемы введения Метродина. Первая схема - ежедневное введение препарата. Лечение начинают с ежедневной инъекции 75 МЕ в первые семь дней цикла у менструирующих женщин и продолжают до достижения адекватной стимуляции яичников. Созревание фолликула обычно достигается в течение 7-12 дней лечения. При отсутствии адекватной реакции яичников доза препарата может быть постепенно увеличена, но обычно не более 150 МЕ в сутки (при тщательном медицинском наблюдении возможно превышение этой дозы). Вторая схема - введение препарата через день. Препарат вводится в одинаковых количествах через день. Начальная суточная доза составляет 225-375 МЕ на введение в течение недели. Если адекватная реакция стимуляции не достигается, доза может быть постепенно увеличена. После проведения лечения по любой из схем и наличии адекватного, но не чрезмерного ответа яичников (по данным клинических и биохимических исследований) через 24-48 ч после введения последней дозы Метродина производится однократная инъекция 10000 МЕ Профази. При наличии овуляции и отсутствии наступления беременности введение Метродина может быть повторено по одной из приведенных схем в течение, по крайней мере, еще 2 циклов. При проведении вспомогательных методов для наступления зачатия могут использоваться различные режимы введения, так как целью является стимуляция созревания множества фолликулов.

Произв.: Serono (Швейцария)

Метронидазол (Metronidazolum)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метронидазола 0,25 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противопрозоное (вагинальная трихомонада, интенсивные лямблии, *Entamoeba histolytica*).

Фармакокин.: Легко всасывается в кровь из пищеварительного тракта и быстро выводится из организма.

Клин. фарм.: Препарат выбора при заболеваниях, вызываемых простейшими.

Показ.: Трихомониаз (трихомонадное воспаление влагалища и мочеполовых путей, хронический осложненный многоочаговый трихомоноз), лямблиоз (все формы), амебиаз (кишечный острый и хронический, печеночный, бессимптомный).

Противопоказ.: Первая половина беременности.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, рвота, запоры, сонливость, бессонница, головные боли, отеки, лейкопения, кожный зуд, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, дозы и длительность курса зависят от показаний. После окончания лечения следует провести контрольные исследования (каждые 3-4 нед). В случае необходимости курс лечения следует повторить.

Произв.: Томский химфармзавод (Россия)

Метуракол (Meturacolum)

Сост. и ф.в.: Губка в форме стерильных пластин размером 90x90 мм в герметичных пакетах; 1 г сухой губки содержит 0,05 г метилурацила и сухого коллагена или массы коллагеновой до 1 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, ранозаживляющее, адсорбирующее.

Показ.: Вялогранулирующие раны и язвы различного генеза, поверхностные ожоги кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, наличие в ране избыточных грануляций.

Поб. действ.: Боли в области раны вследствие ее стягивания при высыхании губки (в этих случаях губку, не снимая, следует смочить раствором фурацилина или 0,25% раствором новокаина), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, после обработки раны растворами антисептиков и уда-

ления остатков некротической ткани губку плотно накладывают, захватывая 1-1,5 см за пределами раны, и фиксируют повязкой. При наличии гнойного отделяемого рекомендуется сочетать с растворами антисептика (например, диоксидина), смачивая ими губку. Частота перевязок зависит от глубины и площади раневой поверхности, интенсивности экссудации и наличия некротических масс. Повязку рекомендуется менять 1 раз в 2-3 дня, т.к. за этот срок губка полностью лизируется. Если губка не рассосалась и нет показаний для перевязки (боль, жжение в области раны, скопление гнойного экссудата, аллергические реакции), ее не снимают до полного заживления или заполнения раны грануляционной тканью на всю глубину.

Произв.: Белкозин (Россия)

Мефенаминовая кислота (Acidum mefenaminicum)

Мефенамовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мефенаминовой кислоты 0,5 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное.

Показ.: Болевой (головная боль, невралгии, артралгии, миозиты) и лихорадочный синдромы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 0,5 г 3-4 раза в день; детям от 5 до 10 лет - по 0,25 г, старше 10 лет - по 0,3 г.

Произв.: Ирбитский химфармзавод (Россия)

Мефоксин (Mefoxin®)

Цефокситин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефокситина натрия 1 или 2 г; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочеполовых путей, костей, суставов, кожи и мягких тканей, инфекции брюшной полости и полости таза, гинекологические инфекции, эндокардит, перитонит,

септицемия, гонорея, профилактика хирургической инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гипотония, диспептические расстройства, нарушение функции печени и почек, угнетение костного мозга, лейкопения, анемия, псевдомембранозный колит, боль и уплотнение в месте введения, тромбофлебит, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, струйно, медленно (3-5 мин) или капельно и в/м глубоко в мышцу. Суточная доза для взрослых - 3-12 г в 3-4 приема. Новорожденным, детям грудного возраста - по 20-40 мг/кг массы тела каждые 6-12 ч. Для в/в введения 1-2 г растворить в 10 мл стерильной воды для инъекций, для в/м - 1 г растворить в 2 мл стерильной воды для инъекций или 0,5-1% раствора лидокаина.

Предост.: С осторожностью применяют у больных с аллергическими реакциями любых видов, заболеваниями ЖКТ (особенно колитом) в анамнезе и нарушении выделительной функции почек.

Произв.: MSD (США)

Миакальцик (Miacalcic®)

Кальцитонин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций и вливаний содержит синтетического кальцитонина лосося 50 или 100 МЕ; в ампулах по 1 мл.

1 доза аэрозоля для интраназального применения - 50, 100 или 200 МЕ; в упаковке 14 доз.

Фарм. действ.: Регуляция минерального обмена и метаболизма костной ткани.

Показ.: Остеопороз, боли в костях, связанные с остеоллизом и/или остеопенией, болезнь Педжета (деформирующий остит), гиперкальциемия и гиперкальциемический криз, нейродистрофические заболевания, острый панкреатит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: При парентеральном введении: тошнота, рвота, головокружение, приливы к лицу, сопровождающиеся ощущением жара, полиурия, озноб, аллергические реакции - местные или генерализованные, включая анафилактический шок (тахикардия, артериальная гипотензия, коллапс).

Примен. и доз.: В/в (струйно или капельно), в/м, п/к; интраназально. Дозу препарата и способ введения уста-

навливают индивидуально, с учетом показаний и тяжести состояния пациента. Растворы для в/в введения готовят на физиологическом растворе.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при вождении транспортных средств или работе с механизмами. Детям можно назначать только на короткие периоды. При использовании назального аэрозоля (хронический ринит) необходимо тщательное наблюдение.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Миансан (Miansan®)

Миансерин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит миансерина 30 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, анксиолитическое, снотворное, седативное.

Фармакокин.: Быстро всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3-4 ч. С белками плазмы связывается 96%. $T_{1/2}$ - 24-32 ч. 70% дозы выводятся (частично в виде метаболитов) почками и кишечником (8-28%).

Показ.: Депрессии реактивная, эндогенная, вызванные соматическими заболеваниями, инволюционная меланхолия.

Противопоказ.: Маниакальный синдром, нарушение функции печени, острый период инфаркта миокарда, беременность, лактация, возраст до 18 лет.

Бер. и корм. гр.: Назначать с осторожностью (если потенциальные преимущества превышают потенциальный риск).

Поб. действ.: Сонливость, гипомания, гипотония, нарушение функции печени, отеки, гинекомастия, гранулоцитопения, агранулоцитоз, конвульсии.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, алкоголем. Усиливает эффект гипотензивных средств и ослабляет - антиконвульсантов.

Примен. и доз.: Внутрь (не разжевывать), перед сном, начиная с 60 до 90 мг в сутки. Оптимальная доза - 60 мг.

Предост.: В период лечения рекомендуется тщательное наблюдение за больными с печеночной, почечной и сердечной недостаточностью, контроль содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом. Во время лечения нельзя управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, которые требуют повышенного внимания и скорости реакций. При появлении признаков инфекции, стоматита, ангины необходимо сделать анализ крови.

Произв.: Zorka (Югославия)

Мивакрон® (Mivacron®)**Мивакурия хлорид***

Сост. и ф.в.: 1 мл инъекционного раствора содержит мивакуриума хлорида 2 мг; в ампулах по 5, 10 и 25 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Недеполяризующий миорелаксант.

Показ.: Расслабление скелетной мускулатуры (во время общего наркоза для облегчения интубации трахеи и искусственной вентиляции легких).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гомозиготность по гену атипичной холинэстеразы.

Бер. и корм. гр.: Не следует использовать при беременности, если ожидаемая польза для матери не превосходит возможный риск для плода.

Поб. действ.: Приливы, преходящая гипотония, тахикардия, бронхоспазм (чаще при быстром введении), эритема, крапивница.

Взаим.: Усиливают и/или удлиняют нейромышечную блокаду энфлюран, изофлюран, галотан, аминогликозиды, полимиксины, тетрациклины, линкомицин, клиндамицин, пропранолол, антагонисты кальция, лидокаин, прокаинамид, хинидин, фуросемид и другие тиазидовые диуретики, маннитол, ацетазоламид, соли магния, кетамин, соли лития, триметафан, панкурониум, гексаметоний; ослабляют - антихолинэстеразные и прочие средства, снижающие холинэстеразную активность, бамбутерол.

Передоз.: Симптомы: длительный паралич мышц. Лечение: искусственная вентиляция легких на фоне седации, при появлении спонтанного дыхания вводят антихолинэстеразные препараты с атропином, при необходимости - вазопресорные средства.

Примен. и доз.: В/в. Взрослым: интубация трахеи после введения 0,2 мг/кг в течение 30 с возможна через 2-2,5 мин, после 0,25 мг/кг в 2 приема (0,15 мг/кг, через 30 с - еще 0,1 мг/кг) - через 1,5-2 мин. Введение в виде болюса: 0,07-0,25 мг/кг. При введении в дозах 0,07; 0,15; 0,20; 0,25 мг/кг длительность эффективной нейромышечной блокады составляет 13, 16, 20 и 23 мин соответственно, в дозах до 0,15 мг/кг вводят 5-15 с, в более высоких - 30 с; введение 0,1 мг/кг в виде болюса продлевает эффект на 15 мин. Инфузия - 8-10 мкг/кг/мин. Детям в возрасте от 7 мес до 12 лет: в виде болюса - 0,1-0,2 мг/кг в течение 5-15 с; интубация трахеи - в течение 2

мин после введения 0,2 мг/кг. Дети от 2 до 6 мес: в виде болюса вводят 0,1-0,15 мг/кг в течение 5-15 с; интубацию трахеи проводят в течение 1,4 мин после введения 0,15 мг/кг. Скорость инфузии на фоне галотанового наркоза - 11 мкг/кг/мин (в возрасте от 7 до 23 мес), 13-14 мкг/кг/мин (2-12 лет).

Предост.: Используют только при возможности интубации трахеи и ИВЛ. При сердечно-сосудистых заболеваниях, повышенной чувствительности к гистамину, гиповолемии начальную дозу необходимо вводить в течение 60 с. У пациентов с терминальной стадией почечной или печеночной недостаточности, при миастении и кахексии дозировку подбирают индивидуально (увеличенная длительность нейромышечной блокады). Не следует комбинировать с деполяризующими миорелаксантами и смешивать в одном шприце с высоко щелочными растворами (барбитуратами).

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Мигренол® (Migrenol™)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетаминофена (парацетамола) 500 мг и кофеина 65 мг; в блистере по 8 шт., в упаковке 1 блистер.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Боль (головная, зубная, при синуситах, кашле, артрите, миозите, менструальном дискомфорте), насморк, простуда, лихорадочные состояния.

Бер. и корм. гр.: Под контролем врача.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 2 таблетки каждые 6 ч, но не более 8 таблеток в течение 24 ч. Детям до 12 лет - после консультации с врачом.

Предост.: Не следует применять препарат более 10 дней для снятия боли и более 3 дней при лихорадке. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Произв.: Four Ventures (США)

Мигренол® ПМ (Migrenol™ PM)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетаминофена 500 мг и дифенгидрамина 38 мг; в блистере по 8 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, антигистаминное.

Показ.: Боль (головная, зубная, боли при синуситах, кашле миозитах, артритах, менструальном дискомфорте), боли, сопровождающиеся бессонницей.

Противопоказ.: Возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Под контролем врача.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 таблетки каждые 6 ч (не более 8 таблеток в сутки); при бессоннице, обусловленной болью, - по 2 таблетки перед сном. Длительность приема - не более 10 дней.

Предост.: Детям до 12 лет назначается только после консультации с врачом. С осторожностью применяют у пациентов с астмой, глаукомой, эмфиземой, хроническими легочными нарушениями, одышкой, затрудненным мочеиспусканием при увеличении простаты. Нельзя сочетать с алкоголем. При одновременном приеме успокаивающих средств необходима консультация врача.

Произв.: Four Ventures (США)

Мидантан (Midantanum)

Амантадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амантадина гидрохлорида 100 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, н-холинолитическое.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм различной этиологии (ригидные и акинетические формы).

Противопоказ.: Печеночно-почечная недостаточность, эпилепсия, психические заболевания, тиреотоксикоз, беременность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Возбуждение, раздражительность, бессонница, головокружение, анорексия, судороги.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, начиная с 50-100 мг 2 раза, затем - 3-4 раза в день. Суточная доза - 200-400 мг. Курс - 2-4 мес.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Мидокалм (Mydocalm)

Толперизон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит толперизона гидрохлорида 100 мг; в упаковке 5 шт.

1 драже - 50 или 150 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Миорелаксирующее, вазодилатирующее.

Показ.: Гипертонус поперечнополосатой мускулатуры (рассеянный склероз, миелопатии, энцефаломиелит, мышечный спазм, мышечные контрактуры), облитерирующие сосудистые заболевания (облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, облитерирующий тромбан-

гит, синдром Рейно, диабетическая ангиопатия).

Противопоказ.: Тяжелая миастения, ранний детский возраст (до 3 лет).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, абдоминальный дискомфорт, диспноэ, сонливость, мышечная слабость, артериальная гипотензия, зуд, кожные высыпания, анафилактический шок.

Примен. и доз.: Внутрь по 150-450 мг/сутки (за 3 приема). В/м по 100 мг 2 раза в день, в/в медленно 100 мг 1 раз в день. Детям: в возрасте 3 мес-6 лет - 5 мг/кг в день, 7-14 лет - 2-4 мг/кг в день (в 3 приема).

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Мидрум (Mydrum®)

Тропикамид*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит тропикамида 5 мг; во флаконах-капельницах по 10 мл.

Фарм. действ.: Мидриатическое, м-холинолитическое.

Показ.: Диагностика в офтальмологии (исследование глазного дна, определение рефракции с помощью скиаскопии), воспалительные процессы и спайки глаза.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, глаукома (особенно закрытоугольная форма).

Поб. действ.: Нарушение аккомодации, фотофобия, повышение внутриглазного давления, приступ глаукомы, системные эффекты (беспокойство, возбуждения, сухость во рту, дизурия, гипертермия), аллергические реакции.

Взаим.: Эффект усиливают симпатомиметики, ослабляют - м-холиномиметики. Вероятность системного побочного действия повышают трициклические антидепрессанты, фенотиазины, амантадин, хинидин, антигистаминные препараты и другие лекарственные средства с м-холинолитическими свойствами.

Передоз.: Возникновение системных побочных эффектов.

Примен. и доз.: Для диагностических исследований - в глаз 1-3 капли в течение 10 мин (офтальмоскопию можно проводить через 10 мин); при недостаточном расширении зрачка закапывают по очереди с фоледрином или фенилэфрином; для скиаскопии закапывают 6 раз через 5-10 мин, через 1 ч развивается аккомодационный парез (что необходимо для определения рефракции). В терапевтических целях закапывают до 6 раз в день.

Произв.: Ankerpharm (Германия)

Миелосан (Myelosanum)**Бусульфан***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бусульфана 2 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Хронический лейкемический миелолейкоз.

Противопоказ.: Острый и подострый лейкоз, тромбоцитопения.

Поб. действ.: Сосудистая дистония, аменорея, пигментация кожи, снижение половой функции у мужчин.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 мг 1-3 раза в день. При обострении хронического миелолейкоза с умеренной спленомегалией и числом лейкоцитов до 200000 в 1 мкл крови - 4-6 мг в сутки в 1-3 приема. При резко выраженной спленомегалии и большом числе лейкоцитов - до 8-10 мг (в 2-3 приема). При уменьшении количества лейкоцитов до 40000-50000 суточная доза не должна превышать 4 мг. Курс - 3-5 нед. Высшие дозы: разовая - 6 мг, суточная - 10 мг.

Пронзв.: ICN Октябрь (Россия)

Микозолон (Mycosolon)

Сост. и ф.в.: 1 тубик (15 г) содержит 20 мг миконазола и 2,5 мг мазипредона в мазевой основе.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное.

Показ.: Грибковые поражения кожи и ногтей, сопровождающиеся выраженным воспалением и зудом; микозы, сочетающиеся с суперинфекцией, вызванной грамположительными бактериями.

Противопоказ.: Туберкулез кожи, герпес, натуральная и ветряная оспа.

Поб. действ.: Не отмечено.

Примен. и доз.: Наносят на пораженные участки кожи или ногтей 1-2 раза в день. При необходимости применяют окклюзионную повязку. Курс лечения - 2-5 нед.

Пронзв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Микоспор® (Mycospor®)**Бифоназол*****Микоспор® крем в наборе для лечения ногтей (Mycospor®)****Бифоназол****Общее описание*

Сост. и ф.в.: 1 г крема и 1 мл раствора для наружного применения содержат бифоназола 10 мг; крем в тубах по 15, 20 или 35 г, раствор во флаконах по 15, 20 или 35 мл.

Набор для лечения ногтей включает 1% крем (1 г содержит бифоназола 10 мг и мочевины 400 мг) в дозаторе по 10 г в комплекте с 15 полосками водонепроницаемого лейкопластыря и 1 шабером (скребком-пилочкой для ногтей).

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра.

Фармакокин.: При местном применении 0,6-0,8% активного вещества абсорбируется здоровой и 2-4% воспаленной кожей. $T_{1/2}$ в коже - 19-32 ч; через 10-30 мин после применения поглощается грибковыми клетками.

Показ.: Дерматомикозы (поверхностные кандидозы, дерматофития, разноцветный лишай; эритразма и др.). Микоспор крем для лечения ногтей - грибковые заболевания ногтей (онихомикозы), удаление ногтей, пораженных микозом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность и лактация.

Поб. действ.: Местные кожные реакции (покраснение, жжение, раздражение, покалывание), аллергические реакции; при лечении грибковых заболеваний ногтей - реакции по краям или на ложе ногтя (раздражение, краснота, мацерация, шелушение, контактный дерматит).

Примен. и доз.: Накожно. Крем (на ночь) наносят тонким слоем на инфицированные участки кожи и втирают. Разовая доза из расчета на площадь поверхности размером с ладонь составляет: для крема - столбик длиной 5 мм, для раствора - 3 капли. Кратность применения - 1 раз в сутки на ночь. Продолжительность лечения - 2-4 нед. При грибковых заболеваниях ногтей - тонкий слой крема (из набора для лечения ногтей) наносят на пораженный ноготь, затем закрывают пластырем и повязкой на 24 ч. После удаления пластыря для замены повязки ногти держать в теплой воде около 1 мин, размягченная инфицированная часть ногтя удаляется шабе-

ром. В конце процедуры на высушенные ногти вновь наносят крем и закрывают пластырем. Длительность лечения до полного удаления ногтя - 7-14 дней. После удаления ногтя лечение продолжают в течение 4 нед. Возможен повторный курс.

Произв.: Bayer (Германия)

Микрогинон (Microgynon®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит левоноргестрела 0,15 мг и этинилэстрадиола 0,03 мг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт.

Фарм. действ.: Эстроген-гестагенное, контрацептивное.

Показ.: Предупреждение нежелательной беременности.

Противопоказ.: Беременность, тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч.в анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, рак молочной железы или эндометрия, нарушения жирового обмена, серповидноклеточная анемия; герпес (в анамнезе), идиопатическая желтуха или зуд во время бывшей беременности, отосклероз с ухудшением в ходе имевшей место беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушения функции желудка, нагрубание молочных желез, изменение массы тела и либидо, депрессивные состояния, появление на лице пятен коричневого цвета; плохая переносимость контактных линз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно, приблизительно в одно и то же время, с 1-го дня цикла, и далее по стрелке на упаковке.

Произв.: Schering (Германия)

Микрозер (Microser)

Бетагистин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бетагистина дигидрохлорида 8 мг; в упаковке 50 шт.

100 мл раствора для приема внутрь в виде капель - 1,25 г; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Гистаминоподобное, улучшение органной микроциркуляции, восстановление кровотока в микроциркуляторном русле.

Фармакокин.: Быстро всасывается и достигает пика концентрации в крови к третьему часу. Большая часть дозы экскретируется с мочой в виде метаболита

(2-пиридилуксусная кислота); элиминируется практически полностью через 24 ч.

Показ.: Патологические состояния, вызванные нарушением микроциркуляции в лабиринте: головокружения, синдром Меньера и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, пептическая язва в активной фазе, феохромоцитомы, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Беременным женщинам следует назначать препарат только в случаях реальной необходимости и только под непосредственным медицинским контролем.

Поб. действ.: Тошнота, головная боль, проявления идиосинкразии.

Взаим.: Эффект ослабляется антигистаминными препаратами.

Передоз.: В случае передозировки рекомендуется промывание желудка и проведение соответствующих общемедицинских мероприятий. Специфического антидота не существует.

Примен. и доз.: Таблетки: 2-4 таблетки в день, желательно во время еды. Капли: 16 капель, разведенных в воде, 2-4 раза в день, желательно во время еды.

Предост.: Не следует комбинировать с антигистаминными средствами.

Произв.: CSC (Италия)

Микрофоллин форте (Microfollin forte)

Этинилэстрадиол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этинилэстрадиола 0,05 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Аменорея, олигоменорея, дисменорея, меноррагии, метроррагии, прекращение лактации, обыкновенные угри, рак предстательной железы, климактерический синдром.

Противопоказ.: Эстрогензависимые злокачественные новообразования эндометрия и шейки матки, рак молочной железы (в том числе у мужчин), тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии, нарушение мозгового кровообращения, нарушения функции печени.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, нарушение кальциевого обмена, отеки, гипоплазия костного мозга.

Примен. и доз.: Внутрь. При аменорее и олигоменорее 0,02-0,1 мг/сутки в течение 20 дней, после чего в/м вводят 5 мг прогестерона в течение 5 дней. При дисменорее - 0,01-0,03 мг, начиная с 4-5-го дня менструального цикла, в течение 20 дней каждые 2-3 мес. Для оста-

новки лактации в течение первых 3 дней после родов - 3 раза по 0,02 мг/сутки, затем на протяжении последующих 3 дней по 0,01 мг/сутки. Обыкновенные угри: 0,03-0,06 мг/сутки, детям - 0,01-0,03 мг/сутки. При раке предстательной железы - по 0,05-0,1 мг 3 раза в день, постепенно понижая дозу до 0,05 мг/сутки. При климактерических расстройствах - по 0,05 мг/сутки. Подросткам при обыкновенных угрях в период полового созревания 0,01-0,03 мг/сутки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Микстард® 10 НМ Пенфилл® (Mixtard® 10 НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического инсулина человеческого 100 МЕ (растворимый инсулин 10% и изофан-инсулин суспензия 90%); в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования с инсулиновой шприц-ручкой НовоПен и НовоПен II и иглами НовоФайн и в картриджах Пенфилл 3 мл для использования в шприц-ручках НовоПен 3.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается быстро (через 30 мин после п/к введения), достигая максимума к 2-8 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Микстард® 20 НМ Пенфилл® (Mixtard® 20 НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического инсулина человеческого 100 МЕ (растворимый инсулин 20% и изофан-инсулин суспензия 80%); в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования с инсулиновой шприц-ручкой НовоПен и НовоПен II и иглами НовоФайн и в картриджах Пенфилл 3 мл для использования в шприц-ручках НовоПен 3.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается быстро (через 30 мин после п/к введения), достигая максимума к 2-8 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Микстард® 30 НМ Пенфилл® (Mixtard® 30 НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического инсулина человеческого 100 МЕ (растворимый инсулин 30% и изофан-инсулин суспензия 70%); в картриджах Пенфилл 3 мл для использования с инсулиновой шприц-ручкой НовоПен 3 и иглами НовоФайн и в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования в шприц-ручках НовоПен или НовоПен II.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 30 мин после п/к введения, достигая максимума к 2-8 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа (при резистентности к производным сульфонилмочевины, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в постоперационном периоде, при беременности).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Аллергические реакции; покраснение и липодистрофия в местах инъекции.

Взаим.: Ингибиторы МАО, бета-адреноблокаторы, алкоголь усиливают эффект, пероральные контрацептивы, кортикостероиды, тиреоидные гормоны, диуретики - снижают.

Передоз.: Симптомы: гипогликемия (холодный пот, сердцебиение, тремор, чувство голода, возбуждение), кома (потеря сознания, напряжение тканей глазного яблока, судороги по типу Джексона, вплоть до конвульсий, рефлекс Бабинского). Лечение: внутрь сахар, сахаросодержащие продукты или раствор глюкозы (если больной в сознании). При тяжелой гипогликемии с потерей сознания - п/к, в/м или в/в глюкагон, или в/в глюкозу.

Примен. и доз.: П/к, картридж Пенфилл - исключительно для индивидуального пользования. После инъекции в течение минимум 6 секунд игла должна оставаться под кожей для полного введения дозы. Дозу и режим введения препарата определяет лечащий врач в индивидуальном порядке. При переводе больного с высокоочищенного на человеческий инсулин того же типа, доза должна оставаться неизменной. При переводе с говяжьего или смешанного инсулина доза обычно снижается на 10%, за ис-

ключением тех случаев, когда суммарная дневная доза не превышает 0,6 ЕД/кг массы тела. При превышении этой дозы она должна быть разделена на две и более инъекции. Пациенты, получающие 100 ЕД и более в сутки, при замене инсулина должны быть госпитализированы. При смене инсулина должен проводиться тщательный контроль за сахаром крови.

Предост.: Перевод на человеческий инсулин необходимо проводить под контролем уровня глюкозы в крови. Способность к управлению автомобилем после перевода больных на человеческий инсулин может временно снизиться. Запрещено использовать препарат с истекшим сроком годности, а также если на поверхности картриджа Пенфилл имеются какие-либо повреждения.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Микстард® 40 НМ Пенфилл® (Mixtard® 40 НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического инсулина человеческого 100 МЕ (растворимый инсулин 40% и изофан-инсулин суспензия 60%), в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования с инсулиновой шприц-ручкой НовоПен и НовоПен II и иглами НовоФайн и в картриджах Пенфилл 3 мл для использования в шприц-ручках НовоПен 3.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается быстро (через 30 мин после п/к введения), достигая максимума к 2-8 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Микстард® 50 НМ Пенфилл® (Mixtard® 50 НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического инсулина человеческого 100 МЕ (растворимый инсулин 50% и изофан-инсулин суспензия 50%); в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования с инсулиновой шприц-ручкой НовоПен и НовоПен II и иглами НовоФайн и в картриджах Пенфилл 3 мл для использования в шприц-ручках НовоПен 3.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается быстро (через 30 мин после п/к введения), достигая максимума к 2-8 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Милдронат (Mildronat®)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл раствора для инъекций содержит милдроната 500 мг; в упаковке 10 шт.

1 капсула - 250 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Кардиопротективное, антиангинальное, антигипоксическое, актопротекторное.

Фармакокин.: При приеме внутрь хорошо всасывается. C_{max} через 1-2 ч. $T_{1/2}$ - 3-6 ч.

Фармакодин.: Снижает биосинтез карнитина (является структурным аналогом гамма-бутиробетаина - предшественника карнитина) и транспорт длинноцепочных ацилов через клеточные мембраны, препятствуя накоплению активированных форм неокисленных жирных кислот. При ишемии предупреждает нарушение транспорта АТФ и активирует гликолиз. Из-за снижения биосинтеза карнитина повышается биосинтез гамма-бутиробетаина, обладающего вазодилатирующим действием. При остром инфаркте миокарда замедляет некроз ткани, укорачивает реабилитационный период. При сердечной недостаточности улучшает сократимость миокарда, увеличивает переносимость физических нагрузок. Повышает физическую работоспособность, снижает психическое и физическое перенапряжение. Стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Устраняет синдром абстиненции при хроническом алкоголизме.

Показ.: Стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, кардиалгия на фоне дистрофии миокарда, острые и хронические нарушения мозгового кровообращения, снижение работоспособности, физическое перенапряжение.

Противопоказ.: Органические поражения ЦНС.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспепсия, возбуждение, тахикардия, гипотония, кожный зуд.

Взаим.: Усиливает действие нитроглицерина, нифедипина, бета-адреноблокаторов и других антигипертензивных средств и коронародилататоров, сердечных гликозидов.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в и в/м. Стабильная стенокардия - внутрь по 250 мг 3 раза в день в течение 3-4 дней, далее 2 раза в неделю в течение 1-1,5 мес. Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда - в/в струйно по 500-1000 мг 1 раз в день, далее как при стабильной стенокардии. Кардиалгия - внутрь по 250 мг 2 раза в день. Острые нарушения мозгового кровообращения - в/в по 500 мг 1 раз в день, хронические нарушения - в/м по 500 мг 1 раз в день или внутрь по 250 мг 1-3 раза в день. Для повышения работоспособности - внутрь 250 мг 4 раза в день в течение 10-14 дней. Спортсменам - по 500-1000 мг внутрь 2 раза перед тренировкой (в первой половине дня); курс - перед соревнованиями в течение 14-21 дня, в период соревнований - 10-14 дней.

Предост.: Соблюдать осторожность при назначении в комбинации с гипотензивными средствами и коронародилататорами.

Произв.: Гриндекс (Латвия)

Милеран® (Myleran®)

Бусульфан*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бусульфана 2 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Фармакодин.: Обладает канцерогенностью, тератогенностью и эмбриотоксичностью.

Показ.: Хронический миелолейкоз (хроническая стадия), истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, миелофиброз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, радиотерапия (в т.ч. и вскоре после ее проведения).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Миелосупрессия (тромбоцитопения), гиперпигментация кожи, уртикарная сыпь, мультиформная эритема, алопеция, "аллопуриноловая сыпь", сухость кожи (до полного агидроза), сухость слизистой полости рта, хейлоз, нарушения функции печени, изменение хрусталика, катаракта, гинекомастия, миастения гравис, геморрагический цистит, при длительном лечении - диффузный пневмофиброз, синдром, напоминающий надпочечниковую недостаточность; при высоких дозах - гипербилирубинемия, желтуха, фиброз с атрофией и некрозом кожи. У женщин может развиваться супрессия яичников, аменорея, у мужчин - азооспермия, атрофия яичек, стерильность.

Взаим.: Тиогуанин увеличивает вероятность развития узловой регенеративной гиперплазии печени, портальной гипертензии, варикозного расширения вен пищевода.

Примен. и доз.: Внутрь (таблетки не разделять), однократно, из расчета 0,06 мг/кг в день (максимальная суточная доза 4 мг). Поддерживающая терапия - 0,5-2 мг в день, возможно снижение дозы, но количество лейкоцитов должно находиться на уровне $10-15 \times 10^9/\text{л}$. При миелофиброзе и эссенциальной тромбоцитемии - 2-4 мг в день (под контролем тромбоцитов - не ниже $500 \times 10^9/\text{л}$ или лейкоцитов не ниже $5 \times 10^9/\text{л}$). Истинная полицитемия - 4-6 мг в день в течение 4-6 нед.

Предост.: Лечение проводят под контролем показателей периферической крови, функции почек и дыхательной функции.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Милурит (Milurit®)

Аллопуринол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аллопуринола 100 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противоподагрическое, гипоурикемическое, ингибция ксантиноксидазы.

Показ.: Подагра, гиперурикемия (при истинной полицитемии, миелоидной метаплазии, гематологических заболеваниях, цитостатической и лучевой терапии), мочекислый нефроуролитиаз (профилактика).

Противопоказ.: Печеночно-почечная недостаточность, идиопатический гемохроматоз.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, боли в животе, гиперемия, лихорадка, лейкопения или лейкоцитоз, повышение активности печеночных трансаминаз и щелочной фосфатазы, катаракта, беременность, лактация, детский возраст.

Взаим.: Усиливает токсичность метотрексата и азатиоприна (замедляет их биотрансформацию), антикоагулянтный эффект кумаринов, влияние цитостатиков на костный мозг.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 100-600 мг в сутки, максимальная суточная доза - 800 мг. Дозы увеличивают постепенно (100 мг в сутки), начиная с 100-200 мг в сутки. Детям до 6 лет - 5 мг/кг в сутки, до 10 лет - 10 мг/кг за 3-4 приема. Во время лечения необходи-

мо поддерживать диурез на уровне не менее 2 л в сутки.

Произв.: Egis (Венгрия)

Минизистон (Minisiston®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит левоноргестрела 125 мкг и этинилэстрадиола 30 мкг; в упаковке 21 шт.

Фарм. действ.: Эстроген-гестагенная контрацепция.

Показ.: Контрацепция, функциональные расстройства менструального цикла, дисменорея.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли молочных желез или матки, выраженные нарушения функции и опухоли печени, тяжелые нарушения жирового обмена, тяжелый сахарный диабет, тромбоэмболические заболевания (в т.ч. в анамнезе), тромбозы артерий и вен, артериальная гипертензия (тяжелая форма), серповидно-клеточная анемия, синдромы Дубина-Джонсона или Ротора; идиопатическая желтуха, зуд, герпес и ухудшение отосклероза во время предшествующей беременности, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, депрессия, тошнота, диарея, болезненность молочных желез; при длительном приеме - появление коричневых пятен на коже, ухудшение переносимости контактных линз, повышается риск развития тромбоэмболий.

Примен. и доз.: Внутрь, для контрацепции - по 1 драже в сутки в течение 21 дня (интервал между очередными дозами не должен превышать 36 ч), затем - 7-дневный перерыв. Лечение функциональных расстройств - дозу подбирают индивидуально.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с варикозным расширением вен, флебитом, отосклерозом, рассеянным склерозом, эпилепсией, эндометриозом, заболеваниями печени, болезнью Сиденхама. Не рекомендуется принимать женщинам, имеющим большие нагрузки на голосовые связки; женщинам старше 30 лет следует воздержаться от курения. Прием следует прекратить при мигреноподобных головных болях, острых нарушениях зрения, при наступлении беременности, остром тромбозе, застое желчи или желтухе, значительном повышении артериального давления, продолжительном постельном режиме.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Минифаж (Minifage)

Фенфлурамин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула ретард содержит фенфлурамина гидрохлорида 60 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Анорексигенное, серотонинстимулирующее.

Фармакокин.: Полностью всасывается в ЖКТ, $T_{1/2}$ - 24 ч.

Показ.: Ожирение.

Противопоказ.: Глаукома, психическая анорексия, депрессивные состояния, фармакомания, алкоголизм.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (особенно в первом триместре беременности).

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, астения, раздражительность, бессонница, сонливость, кошмары, депрессия, сухость во рту, тошнота, диарея, частое мочеиспускание.

Взаим.: Несовместим с нейролептиками, антидепрессантами; потенцирует гипогликемическое действие сульфаниламидов.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле в сутки; через 3-4 нед - до 2-х капсул в один прием; курс - от 6 нед до 3 мес.

Произв.: Servier (Франция)

Миоластан (Myolastan®)

Тетразепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тетразепама 50 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Миорелаксантное, противосудорожное, седативное, анксиолитическое.

Показ.: Конtrakтуры при дегенеративных поражениях позвоночника, неврологические конtrakтуры со спазмами, кривошея, боль в спине и пояснице.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая дыхательная недостаточность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Сонливость, раздражительность, агрессивность, снижение скорости реакции, миастения, синдром отмены (тревога, миалгия, бессонница, кошмары, диспепсия, судороги), сыпь.

Взаим.: Взаимное усиление эффектов с миорелаксантами, депримирующими средствами, алкоголем.

Передоз.: Симптомы: кома, угнетение дыхания и сердечно-сосудистой системы. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь. 1-й день - по 1/2-1 таблетке (желательно вечером). Затем, постепенно увеличивая дозу на

1/2-1 таблетку в день, - до 3-6 (в исключительных случаях - до 8) таблеток в день в 3-4 приема. Детям - 4 мг/кг в день. Длительность лечения должна быть ограниченной.

Предост.: Необходима осторожность и строгий медицинский контроль при лечении пациентов с миастенией. Следует помнить о снижении скорости реакции.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Миоспрей® (Miospray®)

Сост. и ф.в.: 150 г аэрозоля для наружного применения содержат бензилникотината 180 мг, никотинамида 180 мг и ментола 160 мг; в баллоне-распылителе.

Фарм. действ.: Анестезирующее, вазодилатирующее, разогревающее.

Показ.: Миалгии, миозиты, мышечные спазмы, спортивные травмы, ушибы.

Поб. действ.: Аллергические реакции (зуд, гиперемия).

Примен. и доз.: Наносят на кожу несколько раз в день с расстояния 10-15 см до образования толстого слоя и втирают.

Предост.: Не применять при нарушении целостности кожных покровов, не распылять на слизистые оболочки.

Произв.: Lek (Словения)

Мирена (Mirena®)

Левоноргестрел*

Сост. и ф.в.: Т-образная внутриматочная спираль содержит левоноргестрела 52 мг и обеспечивает контролируемую диффузию гормона по 20 мкг в сутки.

Фарм. действ.: Контрацептивное, гестагенное.

Фармакокин.: Из вертикального стержня Т-образной спирали (левоноргестрел-содержащий контейнер) непрерывно происходит диффузия гормона - 20 мкг в сутки; концентрация в плазме крови стабильна и составляет 100-200 пг/мл (0,3-0,6 нмоль/л).

Фармакодин.: Увеличивает вязкость цервикальной слизи (препятствующей проникновению сперматозоидов в полость матки), угнетает овуляцию, предотвращает пролиферацию эндометрия, снижает объем менструального кровотечения, снимает пред- и менструальные боли.

Клин. фарм.: Контрацепция эффективна в течение 5 лет. Способность к деторождению восстанавливается у 50% женщин через 6 мес после удаления спирали, у 96,4% - через 12 мес.

Показ.: Контрацепция, меноррагия, дисменорея.

Противопоказ.: Злокачественные опухоли (в т.ч. предполагаемые) половых органов и молочной железы, воспалительные процессы в малом тазу, маточные кровотечения неясной этиологии, тромбоэмболические заболевания, острые заболевания печени, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, нагрубание молочных желез, мажущие кровянистые выделения, акне.

Взаим.: Эффективность снижает длительное применение барбитуратов, фенитоина, бензодиазепинов, рифампицина.

Примен. и доз.: Внутриматочно.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Модивид (Modivid®)

Цефодизим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефодизима 0,25, 0,5, 1 или 2 г в комплекте с растворителем в ампулах по 4, 10 и 40 мл; в упаковке 2 и 4 комплекта.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Клин. фарм.: Чувствительная флора включает: стрептококки, стафилококки (кроме устойчивых к метициллину штаммов), гемофильную и кишечную палочки, шигеллы, протей, менингококк, гонококк и др., но не *Pseudomonas* sp., *Acinetobacter* sp., *Enterococcus faecalis*, *Listeria*, *Mycoplasma* и *Chlamidia*.

Показ.: Инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей, нижних отделов дыхательных путей, гонорея и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности (особенно в первом триместре) применяют только по жизненным показаниям; при лактации - противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, эозинофилия, гемолитическая анемия, повышение содержания креатинина и мочевины в крови, повышение уровня ферментов печени, боль и раздражение в месте введения, аллергические реакции.

Взаим.: Пробенецид замедляет выведение. Аминогликозидные антибиотики, амфотерицин В, циклоспорин, цисплатин, ванкомицин, полимиксин В, колистин, фуросемид усиливают риск нефротоксичности.

Передоз.: В случае возникновения анафилактического шока прекращают вве-

дение препарата и вводят в/в адреналин, глюкокортикоиды; используют при необходимости искусственное дыхание, оксигенотерапию, антигистаминные средства.

Примен. и доз.: В/м или в/в. При неосложненных инфекциях нижних отделов мочевыводящих путей - 1-2 г/сутки однократно; при других инфекциях нижних и верхних отделов мочевыводящих путей - 1-2 г/сутки однократно или 2 г 2 раза в день с интервалом 12 ч. При инфекциях нижних дыхательных путей - 1-2 г через 12 ч; курс - 10-14 дней. У больных с нарушениями функций почек доза препарата зависит от клиренса креатинина. Больным, находящимся на гемодиализе, назначают в суточной дозе 0,5-1 г после окончания сеанса гемодиализа.

Предост.: Осторожно вводить больным с аллергическими реакциями (даже в анамнезе) на пенициллины и другие бета-лактамы антибиотиков.

Произв.: Hoechst (Германия)

Модитен (Moditen®)

Флуфеназин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит флуфеназина гидрохлорида 1; 2,5 или 5 мг.

Фарм. действ.: Антипсихотическое.

Показ.: Тревожные состояния, тяжелая психомоторная ажитированность, возбуждение, опасное импульсивное поведение (связанное с насильственными действиями); шизофрения; психозы, особенно параноидальные; маниакальные и гипоманиакальные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (к фенотиазинам), коматозные состояния, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, феохромоцитомы, почечная, печеночная и тяжелая сердечная недостаточность, тяжелые депрессии, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Экстрапирамидные расстройства, острая дистония, поздние дискинезии, мимические гиперкинезы, сонливость, летаргия, нарушение остроты зрения, сухость во рту, запоры, расстройства мочеиспускания, гипотония, нарушение интеллектуальных и физических функций, судорожные приступы, транзиторные лейкопения, тромбоцитопения, нарушение функции печени, желтуха, нарушения ритма сердца, аномальная пигментация кожи, нарушения терморегуляции, гормональные расстройства (галакторея, гинекомастия, олиго- или аменорея, нарушения половой функ-

ции); синдром отмены, кожные аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает депримирующие эффекты алкоголя, снотворных и седативных средств, сильных анальгетиков; повышает действие антикоагулянтов, кардиодепрессивное действие хинидина, всасывание кортикостероидов, дигоксина, миорелаксантов.

Примен. и доз.: Внутрь, при тревоге и др. непсихотических нарушениях поведения - по 1 мг 2 раза в день, при необходимости - по 2 мг 2 раза в день; при шизофрении и др. психозах, гипоманиакальных состояниях - по 2,5-10 мг (до 20 мг) в день в 2 приема; престарелым - в дозах, соответствующих нижним границам указанных доз.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени и сердца, аритмиями, тиреотоксикозом, гипотиреозом, тяжелыми респираторными заболеваниями, эпилепсией, болезнью Паркинсона, закрытоугольной глаукомой, миастенией, аденомой предстательной железы; пациентам, работающим в условиях повышенной температуры; престарелым. Отмену препарата следует проводить постепенно. Во время терапии не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Модитен депо (Moditen depo)

Флуфеназин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит флуфеназина деканоата 25 мг; в ампулах по 0,5 и 1 мл, в упаковке 5 шт. и во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, противорвотное, блокада дофаминовых рецепторов в ЦНС, адреноблокирующее (центральное).

Клин. фарм.: Обладает пролонгированным действием.

Показ.: Шизофрения (все формы), параноидальные психозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, коматозные состояния, выраженный атеросклероз сосудов и органические заболевания головного мозга, тяжелые нарушения функции печени и почек, выраженная сердечная недостаточность, феохромоцитомы, заболевания крови, гипертрофия предстательной железы, тяжелые депрессии.

Бер. и корм. гр.: При беременности назначают только по строгим показаниям. Противопоказано при лактации.

Поб. действ.: Экстрапирамидные расстройства, поздние дискинезии, мимические гиперкинезы, утомляемость, головокружения, нарушение интеллектуальных функций, судорожные реакции, сухость во рту, запоры, тошнота, нарушения ритма сердца, галакторея, нарушения менструального цикла, аномальная пигментация кожи, лейкопения, тромбоцитопения, транзиторные нарушения функции печени, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект алкоголя и др. средств, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: В/м, вводят глубоко в мышцы - по 12,5-25 мг каждые 2-4 нед. Возможно повышение дозы до 50-100 мг. Рекомендуется индивидуальный подбор доз.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени, аритмиями, тиреотоксикозом, эпилепсией, болезнью Паркинсона, закрытоугольной глаукомой; пациентам, работающим в условиях повышенной температуры, имеющим контакт с фосфорсодержащими инсектицидами; престарелым. Во время лечения пациентам не следует заниматься деятельностью, требующей повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Модуретик (Moduretic®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амилорида гидрохлорида 5 мг и гидрохлоротиазида 50 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Натрийуретическое, диуретическое, калийсберегающее, гипотензивное.

Клин. фарм.: Диуретический эффект наступает через 2 ч и сохраняется в течение суток.

Показ.: Артериальная гипертония, сердечные отеки, асцит и отечный синдром при циррозе печени.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, гиперкалиемия, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, слабость, депрессия, нарушение сна, гипотония, аритмия, диспептические расстройства, подагра, боли в суставах, судороги, нарушение функции почек, гиперкалиемия, гипонатриемия, обезвоживание, импотенция, сыпь и др.

Взаим.: При одновременном назначении ингибиторы АПФ повышают риск гиперкалиемии; алкоголь, барбитураты, гипотензивные средства усиливают гипотонию, НПВС снижают эффекты. Модуретик уменьшает реакцию на прессорные амины, усиливает эффект недеполяризующих миорелаксантов. При совместном назначении с противодиабетическими препаратами необходимо корректировать их дозу. Не рекомендуется комбинировать с препаратами лития, калия и калийсберегающими средствами.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1-2 таблетки 1-2 раза в день. Суточная доза не должна превышать 4 таблеток (по 2 таблетки 2 раза в день).

Произв.: MSD (США)

Монизол (Monizol®)

Изосорбида мононитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изосорбид-5-мононитрата 20 или 40 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Фармакокин.: Быстро всасывается. Максимальная концентрация (186 нг/мл) в плазме достигается через 1 ч, период полувыведения - 5 ч. Не связывается с протеинами плазмы. 95% подвергается денитрации и конъюгации; 5% выводится почками в неизмененном виде.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда с гипотензией, острая недостаточность левого сердца, выраженная артериальная гипотония, черепно-мозговая травма, беременность (первый триместр), лактация.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Тахикардия, гипотензия, головная боль, головокружение, тошнота, рвота.

Взаим.: Эффект усиливают другие вазодилататоры, антагонисты кальция, трициклические антидепрессанты, алкоголь.

Передоз.: Симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, тахикардия, гипотензия. Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке (40 мг) утром после завтрака или по 1/2 (40 мг) - 1 (20 мг) таблетке 2 раза в сутки (не более 80 мг в сутки).

Предост.: С осторожностью назначают больным с глаукомой, повышенным

внутричерепным давлением. Не следует применять для купирования приступа стенокардии. Не рекомендуется управлять автомобилем во время лечения (снижение концентрации внимания и скорости реакций).

Произв.: Zorka (Югославия)

Моноклин (Monocline®)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: Таблетка содержит доксициклина (в виде гидрохлорида) 100 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое.

Фармакокин.: Быстро всасывается в верхней части пищеварительного тракта. C_{max} в плазме крови - в течение 2-4 ч. Хорошая внутри- и внеклеточная диффузия. $T_{1/2}$ в плазме крови 16-22 ч (при приеме 200 мг). Концентрируется в желчи, выводится с мочой (40% в течение 3 дней) и калом (32%). Концентрация в моче в 10 раз выше, чем в плазме.

Показ.: Инфекции легких, мочеполовой системы, бруцеллез, риккетсиозы, холера, акне, глазная хламидийная инфекция, инфекция, вызванная микоплазмой (мочеполовая и легочная), гонококками, *Haemophilus influenzae*, трепонемой (при сифилисе назначают только при аллергии на бета-лактамы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 8 лет), беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано (доксициклин проникает через плаценту и в материнское молоко).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, тошнота, гастралгия, диарея, анорексия, глоссит, гепатотоксичность, суперинфекция, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, фотосенсибилизация, аллергические реакции: уртикарная кожная сыпь, зуд; зубная дисхромия, гипоплазия эмали (при применении до 8 лет).

Взаим.: Несовместим с ретиноидами. Осторожно сочетать с оральными антикоагулянтами, препаратами железа, магния, алюминия, кальция, индукторами ферментов печени. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки в день в один прием во время еды.

Произв.: Laboratoires Doms Adrian (Франция)

Монолонг (Monolong®)

Изосорбида моонитрат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула с микрогранулами пролонгированного действия содержит изосорбида моонитрата 40 или 60 мг; в упаковке 20, 30 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее, снижение потребности миокарда в кислороде и гемодинамической нагрузки на сердце.

Показ.: Стенокардия (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая форма анемии.

Бер. и корм. гр.: При назначении препарата беременным и кормящим матерям следует сопоставить риск и терапевтическую пользу.

Поб. действ.: Тахикардия, ортостатическая гипотензия, обморок, коллапс, непроизвольное мочеиспускание, головная боль, головокружение, беспокойство, диспептические явления, покраснение кожи.

Передоз.: Симптомы: головная боль, головокружение, сердцебиение; быстрое падение артериального давления, обморок, зрительные расстройства, покраснение и перспирация кожи, тошнота и рвота (возможно с коликами или даже кровавым поносом), метгемоглобинемия с цианозом и аноксией, гиперпноэ, диспноэ, брадикардия, блокада сердца, повышение внутричерепного давления, паралич, кома. Описаны случаи смерти вследствие циркуляторного коллапса. Лечение: промыть желудок, больного согреть, рекомендуются движения конечностей (в постели), которые могут усилить венозный отток. При необходимости следует дать кислород. В случае возникновения метгемоглобинемии - метиленовый синий (1% раствор) внутривенно 1-2 мг/кг. Адреналин и родственные ему соединения противопоказаны.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле (40-60 мг) в день; в редких случаях дозу увеличивают до 80 мг в день.

Предост.: При длительном применении может развиваться толерантность. В этом случае следует сделать недельный перерыв, в течение которого эффективность восстанавливается. С осторожностью применяют при кровоизлиянии в мозг, черепно-мозговой травме и гипертиреозе.

Произв.: CTS (Израиль)

Мононит (Mononit)

Изосорбида моонитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит изосорбита 5-моонитрата 0,02 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее, венодилатирующее, снижение преднагрузки, коронаролитическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 20 мин после приема.

Показ.: Стенокардия, хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда с низким давлением заполнения левого желудочка, гипотония, коллапс, шок, внутричерепное кровоизлияние, гипертрофическая кардиомиопатия.

Бер. и корм. гр.: По строгим показаниям и под контролем врача.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, шум в ушах, гиперемия лица, тахикардия, гипотония, тошнота, рвота, гастралгия, метгемоглобинемия, аллергические реакции.

Взаим.: Гипотензивный эффект усиливается другими вазодилаторами, антагонистами кальция, алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, по 40 мг/сутки, при необходимости дозу увеличивают до 80-120 мг/сутки за 2 приема с интервалом в 7 ч и 17-часовым ночным перерывом. Лечение начинают с малых доз с постепенным их увеличением.

Произв.: Акрихин (Россия)

Моноприл (Monopril®)

Фозиноприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фозиноприла натрия 10 и 20 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, ингибирование АПФ.

Фармакокин.: Выделяется печенью (с желчью) и почками.

Фармакодин.: Ингибирует превращение декапептида ангиотензина-I в октапептид ангиотензин-II. Как следствие - снижается вазоконстрикция, секреция альдостерона, нормализуется содержание натрия и воды в организме, подавляется деградация брадикинина (обладает сосудорасширяющими свойствами), развивается антигипертензивный эффект.

Клин. фарм.: Может применяться для монотерапии и в сочетании с другими

антигипертензивными средствами, особенно с диуретиками. Одинаково эффективен для всех возрастных групп (молodye, больные преклонного возраста). Толерантность во время лечения не развивается, внезапная отмена препарата не вызывает эффекта отдачи. Компенсаторное выведение через печень и желчь обеспечивает возможность применения моноприла у больных с нарушением функции почек (значение креатининового клиренса от менее 10 до 80 мл/мин, т.е. включая почечную недостаточность в терминальной стадии), при этом общий клиренс препарата изменяется незначительно.

Показ.: Гипертоническая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе ангионевротические отеки при использовании других ингибиторов АПФ в анамнезе), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головокружение, чувство усталости, кашель, симптомы со стороны верхних дыхательных путей, расстройства ЖКТ, сердцебиения, боли в грудной клетке, мышечно-скелетные боли, изменение вкуса, нарушение чувствительности, высыпания, зуд, ангионевротический отек, гипотония.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10 мг в сутки, при необходимости - по 20 мг 1-2 раза в день. Дозу следует подбирать в соответствии с динамикой АД. При недостаточной степени снижения АД целесообразна комбинация с диуретиком.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Моносуинсулин МК (Monosuinsulinum MC)

Инсулин нейтрал для инъекций*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 40 ЕД инсулина свиного высокоочищенного МК (монокомпонентного), а также кислоту уксусную, натрия гидроокись, глицерин, нипагин (1,0-1,3 мг) и воду для инъекций; во флаконах по 5 или 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Гипогликемическое действие быстрое, но относительно непродолжительное: начинается через 15-20 мин, достигает максимума через 2 ч и продолжается 6-7 ч.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет, другие заболевания, требующие инсулинотерапии у детей и взрослых.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия, гипогликемия.

Взаим.: Нежелательно сочетание с глюкокортикоидами, диуретическими средствами, алкоголем.

Передоз.: При передозировке и задержке приема углеводов может наступить гипогликемия, вплоть до (в тяжелых случаях) гипогликемической комы.

Примен. и доз.: П/к или в/м за 15-20 мин до еды, от одного до нескольких раз в сутки. Дозы устанавливаются индивидуально в зависимости от общего состояния пациента, тяжести и особенностей течения заболевания, а также от уровня суточной глюкозурии и гипогликемического профиля. При необходимости, например, в случае ком, можно вводить в/в. Обычно суточная доза составляет 0,5-1 ЕД/кг массы тела.

Предост.: В случае появления симптомов гипогликемического кризиса немедленно принять сахар, а в тяжелых случаях ввести внутривенно 40% раствор глюкозы и подкожно глюкагон.

Произв.: Эндокринный препарат (Литва)

Монотард® МС (Monotard® МС)

Инсулин цинк суспензия составная*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит монокомпонентного свиного инсулина 40 МЕ (цинк суспензия - 30% аморфного и 70% кристаллического); во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Действие начинается через 2,5 ч после п/к введения, достигнет максимума между 7-15 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа (при резистентности к производным сульфонилмочевины, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в постоперационном периоде, при беременности).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Гипогликемия, аллергические реакции, липодистрофия (при длительном применении).

Примен. и доз.: П/к, доза определяется индивидуально. Перед употреблением флакон необходимо осторожно встряхнуть.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Монотард® НМ (Monotard® НМ)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 40 ЕД (суспензия цинк-инсулина, 30% аморфного и 70% кристаллического), во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 2,5 ч после инъекции, достигает максимума к 7-15 ч и продолжается 24 ч. При сахарном диабете I типа применяется в качестве базального инсулина в сочетании с инсулином короткого действия. При сахарном диабете II типа - как в качестве монотерапии, так и в сочетании с быстродействующими инсулинами.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет, инсулиннезависимый сахарный диабет при резистентности к производным сульфонилмочевины, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в постоперационном периоде, при беременности.

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано, но требует корректировки дозы (при беременности).

Поб. действ.: Гипогликемические состояния, аллергические реакции; редко - покраснение и липодистрофия в местах инъекции.

Взаим.: Ингибиторы МАО, бета-адреноблокаторы, алкоголь усиливают сахароснижающий эффект, пероральные контрацептивы, кортикостероиды, тиреоидные гормоны, диуретики - ослабляют.

Передоз.: Характеризуется гипогликемией (внезапное появление пота, сердцебиение, тремор, чувство голода, возбужденность, раздражительность, парестезии в полости рта, бледность, головная боль, сонливость, неуверенность движений, нарушение речи и зрения, депрессия), комой (потеря сознания, холодный пот, напряжение тканей глазного яблока, судороги по типу Джексона, вплоть до конвульсий, рефлекс Бабинского). Лечение: внутрь раствор глюкозы (если больной в сознании), п/к, в/м или в/в введение глюкагона, или в/в глюкозы.

Примен. и доз.: П/к, доза определяется индивидуально. Перед употреблением содержимое флакона осторожно перемешивают до достижения однородности суспензии. При переводе больного с высокоочищенного на человеческий инсу-

лин того же типа, доза должна оставаться неизменной; при переводе со свиного или смешанного типов инсулина доза обычно снижается на 10%, за исключением тех случаев, когда суммарная дневная доза превышает 0,6 МЕ/кг массы тела. Пациенты, получающие 100 МЕ/сутки и более, при замене инсулина должны быть госпитализированы.

Предост.: При смене инсулина должен проводиться тщательный контроль сахара крови. Способность к управлению автомобилем после перевода больных на человеческий инсулин может временно ухудшаться. Дозу препарата необходимо корректировать при инфекционных заболеваниях, хирургических вмешательствах, нарушении функции щитовидной железы, болезни Аддисона, гипопитуитаризме, почечной недостаточности, у лиц старше 65 лет.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Моночинкве® (Monocinique®)

Изосорбида мононитрат*

Моночинкве ретард (Monocinique® retard)

Изосорбида мононитрат*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (1 капсула ретард) содержит изосорбида-5-мононитрата 40 мг (50 мг); в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью всасывается, биодоступность около 100%, распределяется по всему организму. C_{max} достигается в плазме крови через 1-1,5 ч, $T_{1/2}$ около 5 ч. Экскретируется в виде глюкуронидов преимущественно почками.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца (профилактика приступов стенокардии, постинфарктные состояния).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая стадия инфаркта миокарда, острая циркуляторная недостаточность (шок, циркуляторный коллапс), выраженная артериальная гипотензия.

Бер. и корм. гр.: Только в случае крайней необходимости и при постоянном контроле врача.

Поб. действ.: Головная боль, гиперемия, слабость, потливость, артериальная гипотензия (вплоть до коллапса), эксфолиативный дерматит.

Взаим.: Гипотензивный эффект усиливает алкоголь. Комбинация с гипотензивными препаратами в высоких дозах действует как физиологический антагонист ацетилхолина, гистамина, норадреналина.

Передоз.: Рекомендуются вызвать рвоту и промыть желудок.

Примен. и доз.: Внутрь, запивая небольшим количеством воды, по 1/2-1 таблетке 2-3 раза в день или по 1 капсуле 1 раз в день утром.

Предост.: С осторожностью применяют у пациентов с глаукомой и артериальной гипертензией.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Морадол (Moradol)

Буторфанол*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит буторфанола тартрата 2 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее.

Фармакокин.: После в/в введения действие наступает сразу, а после в/м - в течение 10 мин. Максимальный анальгезирующий эффект развивается через несколько минут после в/в и через 30-60 мин после в/м введения, сохраняется в течение 3-4 ч.

Фармакодин.: Не вызывает угнетения дыхательной и сердечно-сосудистой систем, спазма сфинктера Одди; минимально воздействует на гладкую мускулатуру кишечника; не угнетает диурез; не приводит к развитию лекарственной зависимости.

Показ.: Болевой синдром средней и сильной интенсивности, премедикация перед операцией и введением в наркоз, сбалансированная анестезия, послеоперационное обезболивание.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский и юношеский возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Головокружение, седация, эйфория, галлюцинации, сны необычного содержания, тошнота, рвота, потливость.

Взаим.: Эффект усиливают фенотиазины и транквилизаторы.

Передоз.: При передозировке вводят налоксон.

Примен. и доз.: В/м, по 2 мг каждые 4 ч (в диапазоне от 1 до 4 мг). В/в, разовая доза - 1 мг (диапазон от 0,5 до 2 мг, введенные каждые 3-4 ч); при сбалансированной анестезии - от 2 до 4 мг, повторное введение - 2 мг. Общая доза составляет от 4 до 12,5 мг (от 0,06

до 0,18 мг/кг массы тела) при последовательном введении.

Предост.: С осторожностью используется у пациентов эмоционально неустойчивых, имеющих в анамнезе лекарственную зависимость, с черепно-мозговыми травмами, острым инфарктом миокарда (особенно при повышенной чувствительности к морфину), тяжелыми нарушениями функции печени и почек, а также у женщин с преждевременными родами в анамнезе. Не рекомендуется для лечения больных, зависимых от наркотиков, и при болях неизвестной этиологии (острый живот).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Мориамин форте (Moriamin forte)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит L-лейцина 18,3 мг, L-изолейцина 5,9 мг, L-лизина гидрохлорида 25 мг, L-фенилаланина и L-триптофана по 5 мг, L-треонина 4,2 мг, L-валина 6,7 мг, DL-метионина 18,4 мг, 5-оксипантраниловой кислоты 0,2 мг, витамина А 2000 МЕ, витамина D₂ 200 МЕ, витамина В₁ (нитрата) и пантотената кальция по 5 мг, витамина В₂ 3 мг, никотиамида и витамина С по 20 мг, витамина В₆ 2,5 мг, фолиевой кислоты 0,2 мг, витамина В₁₂ 1 мкг и витамина Е 1 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение относительного и абсолютного дефицита витаминов и незаменимых аминокислот.

Показ.: Слабость, экстремальные условия (для поддержания нормального самочувствия и физического состояния); пищевая добавка для детей, беременных, кормящих матерей; цинга, бери-бери, рахит, невриты, гемералопия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены. Во время применения препарата моча может приобретать желтоватую окраску (из-за присутствия витамина В₂).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 (не более) капсулы в день.

Произв.: Iskra (Япония)

Морская капуста (Thalli Laminariae)

Сост. и ф.в.: Слоевища ламинарии в упаковке по 150 г.

Фарм. действ.: Слабительное, противосклеротическое.

Показ.: Атонический запор, энтероколит, проктит, гипотиреоз, атеросклероз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к йоду), геморрагический диатез, нефрит.

Поб. действ.: Йодизм.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1/2-1 чайной ложке на ночь (запивают водой), курс лечения 15-30 дней.

Произв.: Архангельский опытный водорослевый комбинат (Россия)

Морфина гидрохлорид (Morphini hydrochloridum)

Морфин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит морфина гидрохлорида 0,01 г; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противокашлевое, снотворное, возбуждение опиатных рецепторов.

Показ.: Выраженный болевой синдром (травмы, злокачественные новообразования, инфаркт миокарда в послеоперационном периоде и др.), подготовка к операции, бессонница, связанная с сильными болями, кашель, сильная одышка при острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Противопоказ.: Общее выраженное истощение, дыхательная недостаточность, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, угнетение дыхания; выраженная эйфория, лекарственная зависимость.

Примен. и доз.: П/к, взрослым - по 1 мл. Высшие дозы для взрослых: разовая - 0,02 г, суточная 0,05 г.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Мотилиум® (Motilium®)

Домперидон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит домперидона 10 мг; в упаковке 10 или 30 шт.

1 мл суспензии для приема внутрь - 1 мг; во флаконах по 100 или 200 мл.

Фарм. действ.: Противорвотное.

Показ.: Диспептический синдром, тошнота и рвота различного происхождения: функциональная, органическая, вследствие инфекции, нарушения диеты, рентгенотерапии, лекарственной терапии, особенно антипаркинсоническими средствами - агонистами дофамина, например леводопой, бромокриптином (в качестве специфического антидота).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, пролактинсекретирующая опу-

холь гипофиза, желудочно-кишечное кровотечение, механическая обструкция или перфорация желудка, применение таблеток у детей до 5 лет.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется, однако может применяться в случаях, если ожидаемый эффект оправдывает потенциальный риск.

Поб. действ.: Преходящие спазмы кишечника, гинекомастия, галакторея, неврологические нарушения у детей и у лиц с повышенной проницаемостью ГЭБ, аллергические реакции (крапивница).

Взаим.: Антихолинергические препараты снижают эффект. Антацидные или антисекреторные препараты при одновременном приеме внутрь уменьшают биодоступность.

Передоз.: Симптомы: сонливость, дезориентация и экстрапирамидные реакции (преимущественно у детей). Лечение: активированный уголь и тщательное наблюдение. При появлении экстрапирамидных реакций - антихолинергические, антипаркинсонические или антигистаминные препараты с антихолинергическими свойствами.

Примен. и доз.: Внутрь, за 15-30 мин до еды и перед сном (при необходимости). При хронических диспептических состояниях взрослым - по 10 мг (1 таблетка или 10 мл суспензии) 3 раза в сутки, детям - по 2,5 мл суспензии на 10 кг массы тела 3 раза в сутки; при необходимости дозу можно удвоить (за исключением детей до 1 года). При острых и подострых диспептических состояниях с тошнотой и рвотой взрослым - по 20 мг (2 таблетки или 20 мл) 3-4 раза в сутки, детям - по 5 мл/10 кг массы тела (суспензия) 3-4 раза в сутки. У больных с почечной недостаточностью рекомендуется коррекция дозы.

Предост.: На фоне Мотилиума антацидные или антисекреторные препараты следует принимать после еды. С большой осторожностью и под тщательным медицинским наблюдением назначают грудным детям, пациентам с нарушениями функции печени и почек. При длительной терапии больные должны находиться под регулярным наблюдением.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Моэкс (Moex®)

Моэксиприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит моэксиприла гидрохлорида 7,5 или 15 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибция АПФ.

Фармакодин.: Блокирует образование ангиотензина II, уменьшает его сосудосуживающее действие и стимулирующее влияние на секрецию альдостерона. Снижает общее периферическое сопротивление сосудов, уменьшает постнагрузку на сердце.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек при лечении ингибиторами АПФ в анамнезе, аортальный стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия, выраженные нарушения функции печени, почек; гемодиализ, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Кашель, головная боль, головокружение, ощущение усталости, нарушение сна, боли стенокардического характера, сердцебиение, изменение аппетита, тошнота, диарея, запор, покраснение кожи, сыпь.

Взаим.: Гипотензивный эффект усиливают диуретики, однако при сочетании с калийсберегающими - возникает опасность гиперкалиемии. Повышает риск литиевой интоксикации.

Примен. и доз.: Внутрь, начальная доза - 3,75-7,5 мг, далее - повышение дозы, средняя суточная - 7,5-15 мг, максимальная суточная - 30 мг.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Мукалтин (Mucaltinum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мукалтина (смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного) 0,05 г, натрия гидрокарбоната 0,087 г и винной кислоты 0,16 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее.

Показ.: Острые и хронические заболевания дыхательных путей (бронхит, пневмония, бронхоэктазия и др.).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки перед едой. Курс лечения - в среднем от 7 до 14 дней. Детям таблетку можно растворить в 1/3 стакана теплой воды, добавив сладкий сироп.

Произв.: Тюменский химфармзавод (Россия)

Мукодин (Mucodyn®)

Карбоцистеин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит карбоцистеина 375 мг, в упаковке 30 шт.

100 мл сиропа (сиропа для детей) - 5 г (2,5 г); во флаконах по 200 мл.

Фарм. действ.: Муколитическое, отхаркивающее.

Фармакокин.: Быстро всасывается в ЖКТ. Максимальная концентрация в крови достигается через 2 ч. Дольше всего задерживается в крови, печени и среднем ухе. Выводится почками.

Показ.: Заболевания дыхательной системы (бронхиты и др.), сопровождающиеся обильной и вязкой бронхиальной секрецией, воспалительные заболевания среднего уха и придаточных пазух носа; подготовка пациента к бронхоскопии или бронхографии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенные поражения ЖКТ, нарушение функции почек, острый гломерулонефрит, цистит, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, диарея, кровотечение в ЖКТ, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект ослабляют другие противокашлевые и атропиноподобные средства.

Передоз.: Симптомы: головная боль, тошнота, рвота, диарея, боли в эпигастрии (требуют уменьшения дозы).

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - 2 капсулы или 15 мл (3 чайных ложки) 5% сиропа 3 раза в день. После улучшения - по 1 капсуле или 10 мл (2 чайных ложки) 5% сиропа 3 раза в день. Детям от 2 до 5 лет - 2,5-5 мл (1/2-1 чайную ложку) 2,5% сиропа 4 раза в сутки; от 5 до 12 лет - 10 мл 2,5% сиропа (2 чайные ложки) 4 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе.

Произв.: Zorka (Югославия)

Мукоза композитум (Mucosa compositum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл раствора для инъекций содержит Mucosa parisi suis D8, Mucosa oris suis D8, Mucosa pulmonis suis D8, Mucosa oculi suis D8, Mucosa vesicae felleae suis D8, Mucosa vesicae urinariae suis D8, Mucosa pilori suis D8, Mucosa duodeni suis D8, Mucosa oesophagi suis D8, Mucosa jejuni suis D8, Mucosa ilei suis D8, Mucosa coli suis D8, Mucosa recti suis D8, Mucosa ductus choledochi suis D8, Ventriculus suis D8, Pankreas suis D10, Argentum nitricum D6, Belladonna D10, Oxalis acetosella D6, Anacardium D6, Phosphorus D8, Lachesis D10, Ipecacuanha D8, Nuxvomica D13, Veratrum D4, Pulsatilla D6,

Kreosotum D10, Sulfur D8, Natrium oxalaceticum D8, Colibacillinum D28, Condurango D6, Kalium bichromicum D8, Hydrastis D4, Mandragora D10, Momordica balsamina D6, Ceanothus D4 по 22 мкл; в упаковке 5, 100 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, противовоспалительное, ускорение регенерации, спазмолитическое.

Показ.: Функциональные нарушения и катаральное воспаление слизистых оболочек различного типа и локализации (ЖКТ, органов дыхания, урогенитальных органов, глаз): гастрит, энтерит, колит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреопатии, бронхит, бронхиальная астма, цистит, холецистит, пиелит, конъюнктивит и др.).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Аллергические кожные реакции (требуют отмены препарата).

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/к (при необходимости в/в) - по 1 ампуле 1-3 раза в неделю, в острых случаях - ежедневно.

Произв.: Neel (Германия)

Мукосол (Mucosol®)

Карбоцистеин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит карбоцистеина 375 мг; в упаковке 20 и 1000 шт.

1 чайная ложка (5 г) сиропа без сахара содержит карбоцистеина 250 мг; во флаконах по 110 мл.

Фарм. действ.: Муколитическое, отхаркивающее, разжижение и увеличение объема бронхиального секрета.

Фармакокин.: Быстро всасывается. Максимальная концентрация в крови достигается в течение 1,5 ч (сироп) - 2 ч (капсулы).

Показ.: Повышенная вязкость мокроты при острых и хронических заболеваниях органов дыхания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая пептическая язва.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (особенно в первом триместре беременности).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные кровотечения (редко), кожная сыпь.

Взаим.: Эффект ослабляют атропиноподобные и противокашлевые средства.

Передоз.: Головная боль, тошнота, рвота, диарея.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым в начале лечения - по 2 капсулы или по 1 столовой ложке сиропа 3 раза в день.

При улучшении симптомов - по 1 капсуле 4 раза в день или по 2 чайные ложки сиропа 3 раза в день. Детям 5-12 лет - по 2 чайные ложки сиропа 3 раза в день, 2-5 лет - по 1/2-1 чайной ложке сиропа 4 раза в день, младше 2 лет - в суточной дозе 20 мг/кг, разделенной на несколько приемов. Мукосол сироп не содержит сахара и подходит для пациентов с диабетом.

Предост.: Появление болей в эпигастральной области требует уменьшения дозы.

Произв.: CTS (Израиль)

Мукофальк (Mucofalk®)

Сост. и ф.в.: 5 г гранул для приготовления оральной суспензии с запахом яблока или апельсина содержат гидрофильных волокон из наружной оболочки семян подорожника (*Plantago ovata*) 3,25 г; в пакетиках по 5 г в упаковке 20, 100 или 200 шт. и в банках по 150 и 300 г.

Фарм. действ.: Регуляция деятельности кишечника.

Показ.: Запоры (привычный и беременных), трещины заднего прохода и геморрой (для смягчения консистенции стула), операции в аноректальной области (постоперационный период), для нормализации стула при функциональной диарее, синдроме раздражения кишечника, дивертикулезе толстой кишки, болезни Крона.

Противопоказ.: Органические стриктуры ЖКТ, угрожающая или имеющаяся кишечная непроходимость, труднокомпенсируемый сахарный диабет, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Усиление метеоризма и появление чувства переполнения в животе (в первые дни приема).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям - по 1 чайной ложке 2-6 раз в сутки. Перед употреблением 1 чайную ложку гранул высыпают в стакан, который медленно наполняют холодной водой, затем содержимое размешивают, тотчас выпивают и запивают еще одним стаканом жидкости (в день следует выпивать не менее 1,5 л жидкости).

Предост.: Не следует назначать одновременно с другими препаратами антидиарейного действия или угнетающими моторику кишечника (из-за возможного замедления всасывания). Иногда требуется снижение дозы инсулина у больных инсулинозависимым сахарным диабетом.

Произв.: Dr. Falk (Германия)

Мульти-Саностол (Multi-Sanostol®)

Сост. и ф.в.: 10 мл сиропа для детей содержат витамина А 2400 МЕ, витамина D₃ 200 МЕ, витамина В₁ хлорид гидрохлорида 2 мг, витамина В₂ натрия фосфата 2 мг, витамина В₆ гидрохлорида 1 мг, аскорбиновой кислоты 100 мг, витамина Е ацетата 2 мг, никотинамида 10 мг, пантенола 4 мг, глюконата кальция 50 мг и фосфолактата кальция 50 мг; во флаконах по 300 г.

Фарм. действ.: Восполнение потребности в витаминах и кальции, стимуляция клеточного метаболизма и иммунитета, нормализация структуры и функции костей и зубов, стимулирует обмен веществ.

Показ.: Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах (период роста и полового созревания, рахит, физические и нервные перегрузки, период выздоровления после перенесенных заболеваний); ослабление внимания, потеря аппетита, школьное утомление, поддержание функций почек, сниженная сопротивляемость организма.

Противопоказ.: Гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь - детям от 1 года до 5 лет - по 10-15 мл в день, детям школьного возраста и взрослым - по 10-15 мл 2 раза в день.

Предост.: Не следует применять в больших количествах и дольше, чем предписано. Осторожно назначают при камнях в почках и болезни Бека. После приема Мульти-Саностола возможно усиление желтого цвета мочи (витамин В₂).

Произв.: Roland (Германия)

Мульти-табс DD-4 (Multi-tabs® DD-4)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина А 3300 МЕ, витамина D 200 МЕ, витамина Е 10 мг, витамина В₁ 1,5 мг, витамина В₂ 1,7 мг, витамина В₆ 2,2 мг, витамина В₁₂ 3 мкг, никотинамида 19 мг, пантотеновой кислоты 6 мг, фолиевой кислоты 100 мкг, витамина С 60 мг, магния 100 мг, железа 18 мг, цинка 15 мг, меди 2,5 мг, марганца 3,8 мг, молибдена 250 мкг, хрома 125 мкг, селена 125 мкг и йода 150 мкг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и минеральных веществ в организме.

Показ.: Профилактика гиповитаминоза, ослабление иммунитета.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям с 4-х лет - по 1 таблетке в день, во время или после еды.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Мульти-табс Е (Multi-tabs® Е)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приема внутрь содержит витамина А 1000 МЕ, витамина D 400 МЕ и витамина С 35 мг; во флаконах с пипеткой по 30 мл.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов.

Показ.: Профилактика авитаминоза у детей до 1 года.

Взаим.: Не принимать с препаратами, содержащими витамин D.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 мл в день.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Мульти-табс GD (Multi-tabs® GD)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина А 1235 МЕ, витамина D 200 МЕ, витамина Е 10 мг, витамина В₁ 1,5 мг, витамина В₂ 1,7 мг, витамина В₆ 2,2 мг, витамина В₁₂ 3 мкг, никотинамида 19 мг, пантотеновой кислоты 6 мг, фолиевой кислоты 100 мкг, витамина С 60 мг, бета-каротина 3,78 мг, магния 100 мг, железа 18 мг, цинка 15 мг, меди 2,5 мг, марганца 3,8 мг, молибдена 250 мкг, хрома 125 мкг, селена 125 мкг и йода 150 мкг; в упаковке 80 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и минеральных веществ в организме.

Показ.: Профилактика авитаминоза, ослабление иммунитета.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям с 4-х лет - по 1 таблетке в день, во время или после еды.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Мульти-табс LJ (Multi-tabs® LJ)

Сост. и ф.в.: 1 жевательная таблетка с малиново-клубничным вкусом содержит витамина А 1333 МЕ, витамина D 400 МЕ, витамина Е 5,0 мг, витамина В₁ 0,7 мг, витамина В₂ 0,8 мг, витамина В₆ 0,9 мг, витамина В₁₂ 1 мкг, никотинамида 9 мг, пантотеновой кислоты 3 мг, фолиевой кислоты 20 мкг, витамина С 40 мг, железа 10 мг, цинка 5 мг, меди 1 мг, марганца 1 мг, хрома 20 мкг, селена 25 мкг и йода 70 мкг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и минеральных веществ.

Показ.: Профилактика гиповитаминоза у детей 1-4 лет, несбалансированная диета, плохой аппетит.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, по 1 жевательной таблетке в день.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Мульти-табс LK (Multi-tabs® LK)

Сост. и ф.в.: 1 жевательная таблетка с малиново-клубничным вкусом содержит витамина А 2667 МЕ, витамина D 200 МЕ, витамина Е 10 мг, витамина В₁ 1,4 мг, витамина В₂ 1,6 мг, витамина В₆ 2 мг, витамина В₁₂ 1 мкг, никотинамида 18 мг, пантотеновой кислоты 6 мг, фолиевой кислоты 100 мкг, витамина С 60 мг, железа 14 мг, цинка 15 мг, меди 2 мг, марганца 2,5 мг, хрома 50 мкг, селена 50 мкг и йода 150 мкг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов, микроэлементов и минеральных солей.

Показ.: Профилактика гиповитаминоза у детей с 4-х лет и взрослых, ослабление иммунитета.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям с 4-х лет, во время или после еды - по 1 жевательной таблетке в день.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Мульти-табс с Витамином С (Multi-tabs® Vitamin C)

Аскорбиновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 жевательная таблетка с апельсиновым вкусом содержит аскорбиновой кислоты 180 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витамина С.

Показ.: Профилактика авитаминоза, простуда, стрессы.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, по 1 жевательной таблетке в день - взрослым и детям с 10 лет, при простуде - по 2 таблетки.

Произв.: Ferrosan (Дания)

Мультитест КИ (Multitest CMI)

Сост. и ф.в.: Кожный тест для определения уровня клеточного иммунитета, выпускающийся в виде аппликатора из акриловой смолы с нанесенными на него

7 антигенными и 1 контрольным тестами. Каждая ячейка Мульти тест КИ содержит каплю антигена в глицериновом растворе с соотношением веса к объему, равным 70%, в т.ч.: антиген столбняка 550 000 единиц Мерье/мл, антиген дифтерии 1 100 000 единиц Мерье/мл, антиген стрептококка (группа С) 2000 единиц Мерье/мл, антиген туберкулина 300 000 единиц Мерье/мл, антиген *Candida albicans* 2000 единиц Мерье/мл, антиген *Trichophyton mentagrophytes* 150 единиц Мерье/мл и антиген *Proteus mirabilis* 150 единиц Мерье/мл; набор для проведения 1 или 10 тестов, а также глицерин (контроль): раствор глицерина в соотношении веса к объему 70%.

Фарм. действ.: Диагностический тест на основе реакции кожной гиперчувствительности замедленного типа.

Показ.: Оценка состояния и динамическое наблюдение за лицами с клеточным иммунодефицитом, в т.ч. вследствие ВИЧ-инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к используемым антигенам.

Поб. действ.: Легкая эритема в течение 3-10 дней. Появление волдырей и изъязвлений (у лиц с повышенной чувствительностью к одному из используемых антигенов).

Примен. и доз.: Мульти тест КИ может применяться только на здоровых участках кожи. Удалить защитную пленку, очистить переднюю поверхность предплечья этиловым спиртом или эфиром, осторожно удалить защитные крышки, поднять предплечье и, натягивая кожу, осторожно ввести иглы теста так, чтобы перекладина в форме буквы Т была направлена в сторону головы пациента. Обеспечить длительность мультипунктуры в течение не менее 5 с. Учет реакции проводится через 48 ч с использованием градуированной шкалы. Измеряется наибольший - А и наименьший - В диаметр зоны индукции в миллиметрах. Ширина зоны индукции определяется пальпацией, край зоны индукции отмечается с помощью чернил. Зона эритемы без индукции во внимание не принимается. Отрицательный результат контрольного теста подтверждает отсутствие сенсибилизации к глицерину. Для каждого компонента теста определяется средний диаметр: $(A+B)/2$. Реакция считается положительной при значении среднего диаметра 2 мм и более. Общий результат теста определяется как сумма средних диаметров всех положительных реакций.

Предост.: Тест может быть использован только врачом или под непосредственным врачебным контролем. Оценка результатов реакции затруднена после перенесенных инфекционных заболеваний, антигены возбудителей которых входят в состав набора, после введения живых вирусных вакцин, при лечении кортикостероидами или иммунодепрессантами.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Мундизал гель (Mundisal gel)

Холина салицилат*

Сост. и ф.в.: 1 г геля содержит холина салицилата 87,1 мг, а также цеталкония хлорида 0,1 мг; в тубах по 8 г.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противовоспалительное (холин салицилат), антимикробное, антисептическое (цеталконий хлорид).

Фармакокин.: Быстро проникает к нервным окончаниям слизистой оболочки полости рта и удерживается на них.

Клин. фарм.: Действие развивается через 2-3 мин и длится 2-3 ч. Этанолсодержащая гелевая основа обеспечивает прочную фиксацию на слизистой оболочке полости рта (не смывается слюной). Отсутствие сахара в составе позволяет применять его у больных сахарным диабетом.

Показ.: Инфекционно-воспалительные, язвенно-некротические и трофические заболевания слизистой оболочки рта, носа и глотки; повреждения слизистой оболочки полости рта (мозоли, язвы, ранки) при ношении зубных протезов, боль при прорезывании зубов у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Чувство жжения на месте аппликации.

Примен. и доз.: Местно, слегка втирая, 1 см геля 3-4 раза в сутки перед едой или перед сном. Гель наносят чистым пальцем, слегка массируя десну или другое больное место.

Произв.: Mundipharma (Австрия)

Муравьиный спирт (Spiritus formicicus)

Муравьиная кислота

Сост. и ф.в.: 1 л раствора на 70% этиловом спирте содержит муравьиной кислоты 14 г; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Местнораздражающее, отвлекающее.

Показ.: Миозит, невралгия и др.

Примен. и доз.: Наружно (растирание).

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Мутамицин (Mutamycin®)

Митомицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит митомицина 5, 20 или 40 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, ингибирование синтеза ДНК, РНК и белка.

Показ.: Диссеминированная аденокарцинома желудка или поджелудочной железы (комбинированная терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тромбоцитопения, коагулопатия, повышенная кровоточивость, беременность.

Поб. действ.: Тромбоцитопения, лейкопения, синдром микроангиопатической гемолитической анемии; поздние высыпания и образование язв на коже, целлюлит, одышка, сухой кашель, инфильтраты в легких, повышение температуры, анорексия, тошнота, рвота, стоматиты, алоpecia, повышение концентрации креатинина.

Примен. и доз.: В/в, 20 мг/кв.м поверхности тела однократно или за 10 дней по схеме: 2 мг/кв.м по 5 дней, с двухдневным перерывом. Перед употреблением содержимое флакона (5 или 20 мг митомицина) растворяют соответственно в 10-40 мл воды для инъекций. При необходимости курсы повторяют, но не ранее 6-8 нед (дозы подбираются в соответствии с восстановлением лейкоцитов и тромбоцитов до определенного количества).

Предост.: Необходимо учитывать изменения стабильности растворов препарата при использовании различных растворителей. Следует контролировать картину крови (во время лечения и в течение 7 нед после его окончания) и появление признаков почечной токсичности.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Мюстофоран (Mustophoran)

Фотемустин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит фотемустина 208 мг в комплекте с растворителем в ампуле 4 мл (этиловый спирт 95% - 3,35 мл и вода для инъекций - до 4 мл). Полученный после

разведения раствор содержит фотемустина 200 мг / 4 мл.

Фарм. действ.: Цитостатическое, противоопухолевое.

Показ.: Диссеминированная злокачественная меланома (в т. ч. локализованная в головном мозге); первичные опухоли головного мозга.

Противопоказ.: Беременность, лактация.

Поб. действ.: Нарушения клеточного состава крови: тромбоцитопения, лейкопения (максимум через 4-6 нед после первой ударной дозы); тошнота, рвота (через 2 ч после инъекции); умеренное и обратимое повышение трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина. Редко - повышение температуры, флебит в месте инъекции, абдоминальные боли, диарея, транзиторное повышение мочевины, зуд, неврологические нарушения (парестезии, потеря вкуса, нарушения сознания).

Взаим.: Возможно усиление гемотоксичности при одновременном или предшествующем назначении других цитостатиков.

Передоз.: Требуется более частого гематологического контроля.

Примен. и доз.: В/в. Раствор готовится непосредственно перед введением; монотерапия: ударная доза - по 208 мг 3 раза с интервалом в одну неделю и последующим перерывом 4-5 нед; поддерживающее лечение - 208 мг 1 раз в 3 нед. Политерапия: третье введение препарата при ударном этапе отменяется. Лечение в обычной дозировке возможно при числе тромбоцитов не менее 100000/куб.мм и гранулоцитов - 2000/куб.мм. Если число тромбоцитов и гранулоцитов снижено до 80000 и 1500/куб.мм соответственно, то дозу уменьшают на 25%. При снижении гранулоцитов до 1000/куб.мм - дозу уменьшают на 50%. Между начальным интенсивным лечением и поддерживающей терапией необходим перерыв 8 нед. Между двумя поддерживающими циклами перерыв должен составлять 3 нед. Для проведения поддерживающей терапии число тромбоцитов и гранулоцитов не должно быть менее 100000/куб.мм и 2000/куб.мм соответственно.

Предост.: Необходим контроль биохимических параметров печени. Не рекомендуется назначать лицам, получавшим химиотерапию менее 4 нед назад (если предыдущее лечение проводилось препаратами нитрозомочевины - 6 нед). Следует избегать попадания препарата на кожу и слизистые оболочки (во время

приготовления раствора надо работать в маске и перчатках), в случае попадания на тело смыть большим количеством воды.

Произв.: Servier (Франция)

Навельбин (Navelbine®)

Винорелбин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит винорельбина дитартрата 13,85 мг или 69,25 мг (что составляет 10 мг или 50 мг винорельбина), во флаконах по 1 и 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Фармакокин.: После в/в введения кинетика в плазме трехфазная. $T_{1/2}$ в 3-й фазе составляет в среднем 40 ч. Связывание с белками плазмы - 50-80%. Хорошо проникает в ткани. Выводится преимущественно с желчью.

Показ.: Рак легкого (кроме мелкоклеточного), рак молочной железы.

Противопоказ.: Нарушение функции печени, беременность, лактация.

Поб. действ.: Гранулоцитопения, анемия; снижение остеохружильных рефлексов, парестезии, слабость нижних конечностей, боль в челюстях, парез кишечника, паралитическая непроходимость кишечника, запоры, тошнота, рвота; затруднение дыхания, бронхоспазм; алоpecia; флебит в месте введения.

Передоз.: Основные симптомы: тяжелая гранулоцитопения с риском развития суперинфекции. Лечение: переливание концентрированной смеси гранулоцитов; введение препаратов, стимулирующих гранулоцитопоз; антибиотикотерапия.

Примен. и доз.: В/в. При монотерапии обычная доза - 25-30 мг/кв.м 1 раз в неделю. Разводят в 125 мл физиологического раствора и вводят 15-20 мин. После инъекции следует тщательно обработать место введения физиологическим раствором.

Предост.: Вводят только в/в. Попадание препарата в окружающие ткани может вызвать боль и некроз. Необходим тщательный гематологический контроль (лейкоциты, гранулоциты и уровень гемоглобина) перед каждой очередной инъекцией. В случае развития гранулоцитопении (менее 2000/куб.мм) рекомендуется отложить очередную инъекцию до нормализации числа нейтрофилов и тщательно наблюдать за больным. Следует избегать случайного попадания препарата в глаза; если это произошло, глаз следует немедленно и тща-

тельно промыть. Особая осторожность требуется при лечении пациентов с нарушением функции почек и печени. Нельзя применять в сочетании с рентгенотерапией, захватывающей область печени.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Навобан (Navoban®)

Трописетрон*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит трописетрона гидрохлорида 5 мг.

1 мл раствора для инъекций - 1 мг; в ампулах по 2 и 5 мл.

Фарм. действ.: Противорвотное, антагонист 5-НТз-рецепторов.

Показ.: Тошнота и рвота при противоопухолевой терапии (профилактика и лечение), в послеоперационном периоде.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (исключая операции по прекращению беременности на ранних сроках), детский возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: При беременности - противопоказано, за исключением случаев, когда целью оперативного вмешательства является прерывание ранней беременности. Матери должны прекратить кормление грудью.

Поб. действ.: Боли в животе, запоры, диарея, головная боль, головокружение, слабость, обморок, циркуляторный шок, остановка сердца; аллергические реакции.

Примен. и доз.: Для профилактики тошноты и рвоты, вызванных противоопухолевой терапией, назначают курсами по 6 дней. Суточная доза для взрослых составляет 5 мг. В первый день (независимо от начала химиотерапии) вводят в/в, в последующие 5 дней - внутрь (по 1 капсуле в день). Детям (старше 2 лет) - в суточной дозе 0,2 мг/кг, максимальная суточная доза - до 5 мг; в первый день - вводят в/в, в последующие 5 дней - внутрь (содержимое ампулы смешивают с апельсиновым соком или напитком типа колы). Для лечения и профилактики послеоперационной тошноты и рвоты взрослым назначают в дозе 2 мг в/в.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при неконтролируемой гипертензии. Пациенты, управляющие транспортными средствами или работающие с машинами и механизмами, должны помнить, что лечение снижает скорость реакции.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Назакорт (Nazacort)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 доза интраназального аэрозоля содержит триамцинолона ацетонида 55 мкг; в баллончике 100 доз.

Фарм. действ.: Глюкокортикостероидное, противовоспалительное, противоаллергическое, противоотечное.

Фармакокин.: При интраназальном введении в дозе 440 мкг/сутки C_{max} в плазме составляет менее 1 нг/мл и сохраняется в среднем 3, 4 ч (от 0,5 до 8 ч). $T_{1/2}$ - около 4 ч (от 1 до 7 ч).

Клин. фарм.: Практически не оказывает системного действия, не подавляет функцию коры надпочечников. Эффект проявляется через 12 ч после начала лечения и достигает максимума на 4-7-й день.

Показ.: Сезонный и круглогодичный аллергический ринит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, чихание, кашель, сухость слизистой оболочки полости носа, ощущение раздражения в носу. Редко: локализованная грибковая инфекция носа и глотки, вызванная *Candida albicans*.

Примен. и доз.: Интраназально. Начальная доза составляет 220 мкг/сутки (по 2 ингаляционные дозы в каждую ноздрю) и применяется однократно. Максимальная доза - 440 мкг/сутки (однократно или делится на 2-4 приема). После достижения лечебного эффекта у ряда больных возможно снижение суточной дозы до поддерживающей (обычно не менее 110 мкг). Снижение дозировки следует проводить постепенно, уменьшая ее на 55 мкг/сутки через каждые 4-7 дней.

Предост.: Следует соблюдать особую осторожность при лечении больных с активным туберкулезом легких, с герпетическим поражением глаз, детей до 12 лет (отсутствует достаточный клинический опыт). У пациентов с язвами носовой перегородки, травмами носа или после хирургических операций в области носа может замедляться заживление ран. Замена глюкокортикостероидов, принимаемых внутрь, на местные должна проводиться постепенно из-за риска развития надпочечниковой недостаточности или обострения основного заболевания. Во избежание развития системных побочных эффектов не следует превышать рекомендуемые дозы.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Наклоф (Naclof®)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит диклофенака натрия 1 мг; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное (ингибирование синтеза простагландинов), анальгезирующее.

Фармакокин.: C_{max} в роговице и в конъюнктиве - через 30 мин после инстилляции; проникает в переднюю камеру глаза.

Клин. фарм.: Блокирует миоз во время операций по поводу катаракты. Профилактическое применение сокращает число случаев цистoidного макулярного отека (или уменьшает тяжесть его течения) у больных с планируемыми операциями удаления катаракты и внутриглазной имплантации хрусталика, предупреждает развитие воспаления и снижает болевой синдром после операции.

Показ.: Миоз во время операции по поводу катаракты (профилактика); воспалительные процессы после операций (удаление катаракты и др.); профилактика цистoidного макулярного отека до и после операций, связанных с удалением и имплантацией хрусталика; воспалительные процессы неинфекционной природы с вовлечением передних отделов глаза (хронический неинфекционный конъюнктивит и др.), Посттравматическое воспаление при проникающих и непроникающих ранениях глазного яблока (как дополнение к местной противоинфекционной терапии), болевой синдром при применении эксимерного лазера.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к диклофенаку натрия или тионерсалу.

Бер. и корм. гр.: Возможно только при крайней необходимости.

Поб. действ.: Проходящее чувство жжения (от легкого до умеренного), временная потеря четкости зрения непосредственно после закапывания глазных капель; аллергические реакции (зуд, покраснение, фоточувствительность).

Примен. и доз.: В конъюнктивальный мешок, до операции - по 1 капле 5 раз в течение 3 ч, после операций - по 1 капле 3 раза сразу после операции, далее - по 1 капле 3-5 раз в сутки в течение необходимого для лечения времени; другие показания - по 1 капле 4-5 раз в сутки в зависимости от тяжести состояния.

Предост.: Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость

зрения, не рекомендуется водить машину или работать с техникой.

Произв.: Ciba Vision Ophthalmics (Франция)

Наклофен (Naklofen)

Диклофенак*

Наклофен Дуо (Naklofen Duo)

Диклофенак*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака натрия 50 или 100 (ретард) мг; в упаковке 20 шт.

1 капсула Наклофен Дуо - 75 мг (25 мг в кислотоустойчивой и 50 мг в ретардной форме); в упаковке 20 шт.

1 ампула с 3 мл раствора для инъекций - 75 мг; в упаковке 5 шт.

1 суппозиторий - 50 мг; в упаковке 10 шт.

1 г геля - 11,6 мг диэтиламмониевой соли диклофенака (соответствует 10 мг диклофенака); в упаковке 60 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее; торможение синтеза простагландинов.

Фармакокин.: Таблетки покрыты кислотоустойчивой оболочкой и растворяются только в кишечнике. Гель хорошо проникает через неповрежденную кожу.

Фармакодин.: Гель уменьшает припухлость, вызванную воспалением, и улучшает подвижность суставов, остальные лекарственные формы вызывают типичные для НПВС системные эффекты.

Показ.: Ревматические заболевания и боли различной этиологии: ревматоидный артрит (в т.ч. ювенильный), спондилоартрит, подагра, псевдоподагра; артроз, спондилез; внесуставной ревматизм (периартрит, бурсит, миозит, тендопериостит, синовит, фиброзит, тендинит, тендовагинит, эпикондилит), миалгия, поясничный или плечевой болевой синдром (без сдавления нерва); травматические поражения (растяжения, вывихи, ушибы, не связанные с повреждением кожи); первичная и вторичная дисменорея, после операций (в т.ч. при стоматологических); почечная и печеночная колики.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим НПВС, к изопропанолу и пропиленгликолю - для геля), "аспириновая астма"; аноректальные поражения и кровотечения, в т.ч. в анамнезе - для свечей; детский возраст (до 1 года).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в последний триместр беременности и во время кормления грудью (для внутреннего и в/м использования). Гель для лечения беременных женщин и маленьких детей можно применять только кратковременно.

Поб. действ.: Тошнота, изжога, боли в животе, запоры; пептические язвы или желудочно-кишечные кровотечения (при длительном приеме больших доз); редко - головокружение, усталость, периферические отеки, сыпь, зуд, повышение печеночных проб; фотосенсибилизация и обратимая острая почечная недостаточность (особенно у больных с патологией почек); местно (при нанесении геля) - покраснение, зуд, жжение.

Взаим.: Повышает концентрацию в крови препаратов лития, дигоксина, концентрацию калия в сыворотке при назначении с калийсберегающими диуретиками. Снижает эффект диуретиков. Ацетилсалициловая кислота и другие НПВС увеличивают риск возникновения побочных эффектов. Не влияет на действие пероральных противодиабетических препаратов и антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м, наружно. Таблетки и капсулы принимают целиком во время или сразу после еды, при плохой переносимости перорального приема используют свечи. Взрослым - от 100 до 150 мг/сутки (по 1 таблетке по 50 мг 2-3 раза в сутки, или по 1 капсуле по 75 мг 1-2 раза в сутки, или 1 ретард таблетка 100 мг однократно в сутки). Для поддерживающей терапии - до 100 мг/сутки. При сильных болях - по 1 ампуле 1-2 раза в день. При почечных коликах - 1 инъекция (75 мг), возможно повторное введение через 30 мин; детям старше 1 года с ювенильным артритом - от 1 до 3 мг/кг массы тела в день, разделенные на 2 или 3 приема. Гель наносят на кожу полоской длиной 5-10 см и осторожно массируют, процедуру повторяют 3-4 раза в день.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с заболеваниями верхних отделов ЖКТ в анамнезе, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, тяжелыми почечной, печеночной и сердечной недостаточностями. Гель не следует наносить на слизистые (избегать попадания в глаза), пораженную кожу, открытые раны.

Произв.: KRKA (Словения)



Наком (Nacom®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит карбидопы 25 мг и леводопы 250 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антипаркинсоническое, дофаминстимулирующее.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый приступ глаукомы, кожные заболевания неизвестной этиологии, тяжелая печеночно-почечная недостаточность, меланома в анамнезе, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Со стороны ЦНС, психики: атаксия, обмороки, головная боль, тремор, тризм, брадикинезия, ригидность мышц, параноидальные состояния, психотические реакции, депрессия с суицидальными наклонностями, деменция, эйфория, летаргия, сонливость, возбуждение, астения, спутанность сознания, расстройства сна, ночные кошмары, галлюцинации, мания, тревожное состояние.

Со стороны органа зрения: туманное зрение, диплопия, расширение зрачков, активация латентного синдрома Горнера.

Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, анорексия, диарея, запор, боли в эпигастриальной области, метеоризм, икота, увеличенное слюноотделение, затруднение глотания, горький привкус, ощущение жжения во рту, сухость во рту; редко - желудочно-кишечные кровотечения, язва двенадцатиперстной кишки.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотония, сердцебиение, редко - артериальная гипертензия.

Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочеиспускания, энурез, гематурия.

Со стороны половой системы: приапизм.

Со стороны дыхательной системы: неправильное дыхание, осиплость голоса. Со стороны системы кроветворения: лейкопения, агранулоцитоз, редко - гемолитическая анемия.

Дерматологические реакции: потливость, отеки, сыпь, алопеция.

Прочие: ощущение жара, гиперемия лица, изменения массы тела, флебит.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Внутрь, 1/2 таблетки 1-2 раза в день после еды с постепенным увеличением дозы (но не более 8 табле-

ток в сутки). Поддерживающая доза - 3-6 таблеток в сутки.

Произв.: Lek (Словения)

Налкром (Nalcrom)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит кромогликата натрия 100 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, противовоспалительное, предотвращение дегрануляции тучных клеток и высвобождения медиаторов аллергии и других биологически активных веществ, прямое воздействие на гастро-интестинальные симптомы и, возможно, уменьшение проницаемости кишечной стенки для антигена.

Фармакокин.: В минимальном количестве всасывается из ЖКТ (менее 1% введенной дозы). Обратимо связывается с белками плазмы (до 65%), не метаболизируется, выводится из организма в неизмененном виде с мочой и желчью приблизительно в равных количествах.

Показ.: Пищевая аллергия (при доказанном наличии антигена): отдельно или в сочетании с диетой, ограничивающей поступление аллергена; в качестве вспомогательного средства при лечении неспецифического язвенного колита, проктита, колопроктита в сочетании с кортикостероидными препаратами или сульфасалазином, как средство выбора у пациентов с повышенной чувствительностью к сульфасалазину.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Боли в суставах, чувство абдоминального дискомфорта, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь.

Передоз.: При передозировке - симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Внутрь. Доза препарата устанавливается индивидуально. Обычно начальная доза для взрослых - 200 мг, для детей - 100 мг. Взрослым (включая лиц пожилого возраста) - по 2 капсулы 4 раза в день за 15 мин до еды. Детям от 2 до 14 лет - по 1 капсуле 4 раза в день за 15 мин до еды. Детям от 2 мес до 2 лет (за исключением недоношенных новорожденных) - 20-40 мг/кг массы тела в сутки в несколько приемов. По достижении устойчивого терапевтического эффекта дозировка может быть снижена до минимума, обеспечивающего отсутствие симптомов заболевания. Пациенты, которым по каким-либо причинам не удается избежать приема пищи, содержащей

аллергены, могут защитить себя от воздействия аллергенов, приняв 1 дозу Налкрома за 15 мин до еды. Оптимальная доза в этом случае может находиться в пределах 100-500 мг. Капсулы следует проглатывать целиком, либо растворить их содержимое в малом объеме горячей воды, затем разбавить холодной водой и выпить. Сопутствующая терапия кортикостероидами: пациентам, получающим терапию кортикостероидами, добавление к терапии натрия кромогликата может позволить уменьшить поддерживающую дозу или полностью отказаться от приема кортикостероидных препаратов. Во время снижения дозы кортикостероидов пациент должен находиться под тщательным врачебным наблюдением; темп снижения дозы не должен превышать 10% в неделю. При лечении проктита и колoproктита Налкром, помимо перорального употребления, можно вводить и в виде микроклизм, приготовляемых путем растворения содержимого капсулы в воде.

Предост.: Пациентам, у которых в анамнезе имеются указания на анафилактический шок или другие угрожающие жизни состояния, возникающие при приеме пищевых продуктов, не следует использовать Налкром в качестве протекторного средства.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Намацит (Namacitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гидрокарбоната натрия 0,5180 г, цитрата натрия 0,1657, сульфата магния 0,0621, сульфата марганца 0,0021 г и сульфата цинка 0,0021 г.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, антицирротическое, антигипоксическое, повышение окислительных и биосинтетических процессов, усиление процессов карбоксилирования.

Показ.: Хронический гепатит и цирроз печени различной этиологии, хроническая гипоксия беременных и плода.

Противопоказ.: Гипоацидный гастрит, возраст (до 7 лет).

Бер. и корм. гр.: При хронической гипоксии беременных и плода назначают после 26 нед беременности.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. При гепатитах и циррозах печени доза 4,5-5,0 г (6-7 таблеток) в сутки в течение 10-14 дней.

Произв.: Дарница (Украина)

Напотон (Napoton)

Хлордиазепоксид*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит хлордиазепоксида 5 или 10 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, снотворное, противосудорожное, миорелаксирующее.

Показ.: Неврозы, реактивные депрессии, нарушения сна, абстинентный синдром, судорожное состояние, климактерические и предменструальные состояния, премедикация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головокружение, спутанность сознания, нарушение памяти и концентрации внимания, торможение психических и двигательных реакций, нарушение походки, затруднение дыхания, кожная сыпь; при длительном применении в высоких дозах - привыкание и лекарственная зависимость.

Взаим.: Усиливает действие алкоголя и других средств, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 5-10 мг 2-4 раза в сутки, при состояниях напряжения в сочетании с нарушениями сна - по 10-20 мг 1 раз в сутки за 1-2 ч до сна. В психиатрической практике - начинают с 50-100 мг в сутки, затем - до 300 мг в сутки (за 3-4 приема). Алкогольное возбуждение - более 300 мг в сутки. Детям от 4 до 7 лет - по 5-10 мг в сутки, 8-14 лет - по 10-20 мг в сутки, 15-18 лет - по 20-30 мг в сутки; кратность приема - 3-4 раза в сутки.

Предост.: Пациентам необходимо воздерживаться (во время лечения) от занятий, требующих повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Произв.: Romferchim (Румыния)

Натрия оксibuтират (Natrii oxybutyras)

Натрия оксибат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит натрия оксibuтирата 2 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Наркозное, снотворное, седативное, миорелаксирующее, антигипоксическое, противошоковое, ноотропное.

Показ.: Неингаляционный наркоз (вводный и базисный, при малотравматических операциях, при оперативном родоразрешении, для "отдыха" роже-

ниц, для повышения устойчивости матери и плода к гипоксии), открытоугольная глаукома, невроты, невротоподобные состояния, интоксикации и травматические повреждения ЦНС, бессонница, нарколепсия.

Противопоказ.: Гипокалиемия, миастения, поздний токсикоз беременности с артериальной гипертензией.

Поб. действ.: Двигательное и речевое возбуждение, рвота. При быстром внутривенном введении - судороги (купируются барбитуратами, нейролептиками, промедолом).

Взаим.: Усиливает эффект анальгетиков и средств для наркоза. Выраженный антагонизм с бемебридом.

Примен. и доз.: В/в, медленно (1-2 мл/мин раствора, разведенного 50-100 мл 5-40% раствора глюкозы) 0,05-0,12 г/кг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Кальцекс (Латвия); Фармак (Украина)

Нафтизин (Naphthyzinum)

Нафазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для местного интраназального применения содержит нафтизина 1 мг; в тубиках-капельницах по 1,5 мл.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее, противовоспалительное (противоотечное), альфа-адреномиметическое.

Показ.: Острые риниты, гайморит, носовое кровотечение, аллергические конъюнктивиты; в комбинации с местноанестезирующими средствами; риноскопия.

Противопоказ.: Гипертония, тахикардия, выраженный атеросклероз.

Поб. действ.: Раздражение, головная боль, тошнота, реактивная гиперемия, интенсивное набухание слизистой оболочки (при применении более 1 нед).

Примен. и доз.: Местно. При ринитах - интраназально, взрослым - по 1-2 капли 2-3 раза в день. Для удлинения действия местных анестетиков при поверхностной анестезии в 1 мл раствора анестетика добавляют 2-4 капли раствора нафтизина.

Предост.: Применять препарат следует кратковременно - не более 1 нед, затем рекомендуется перерыв на несколько дней. Нельзя комбинировать с ингибиторами МАО.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия); Фармак (Украина)

Небцин (Nebcin)

Тобрамицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с раствором для инъекций содержит тобрамицина сульфата 40 мг/мл, 20 мг/2 мл или 80 мг/2 мл.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Инфекции нижних дыхательных путей; интраабдоминальные инфекции (в т.ч. первичные), инфекции костей и кожи (включая ожоговые), осложненные и рецидивирующие инфекции мочевых путей, сепсис, менингит, перитонит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Поражение вестибулярной и слуховой ветвей VIII пары черепно-мозговых нервов (необратимая двусторонняя глухота может развиваться после отмены препарата, головокружение, вертиго, шум и посторонние звуки в ушах, тугоухость); нарушение функции почек (олигурия, цилиндрурия, протеннурия); анемия, лейкопения, лейкоцитоз, эозинофилия, гранулоцитопения, тромбоцитопения, лихорадка, сыпь, зуд, крапивница, тошнота, рвота, диарея, головная боль, спутанность сознания, нарушение ориентации, повышение печеночных ферментов, уровня билирубина в крови, снижение содержания кальция, магния и натрия в сыворотке, нервно-мышечная блокада, респираторная недостаточность, боль в месте инъекции.

Взаим.: Повышает нейро- и/или нефротоксичность других препаратов. Вероятность побочных явлений увеличивается на фоне сильных диуретиков (фуросемид, этакриновая кислота).

Примен. и доз.: В/м или в/в капельно, взрослым - 3 мг/кг в сутки в 3 приема (каждые 8 ч); при тяжелых инфекциях дозу увеличивают до 5 мг/кг в сутки в 3-4 приема. Детям - 6-7,5 мг/кг в сутки в 3-4 приема, недоношенным и новорожденным (до 1 нед) - до 4 мг/кг в сутки в 2 приема. Курс лечения - 7-10 дней. У пациентов с нарушением функции почек режим дозирования зависит от значений клиренса креатинина. Для в/в инфузий препарат разводят в 50-100 мл изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы; длительность инфузии - 20-60 мин.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Нейпоген (Neupogen®),

Филграстим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 1 и 1,6 мл раствора для инъекций содержит филграстима 30 и 48 млн. ЕД соответственно; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция гемопоэза, регуляция продукции и высвобождения нейтрофилов из костного мозга.

Показ.: Нейтропении, в том числе у больных, получающих цитостатические средства по поводу немиелоидных злокачественных заболеваний; для сокращения продолжительности нейтропении и ее клинических последствий у пациентов, готовящихся к трансплантации костного мозга; для активации аутологичных клеток-предшественниц в периферической крови; миелосупрессивная химиотерапия (с целью ускорения восстановления кроветворения после нее вводятся клетки-предшественницы); тяжелая наследственная, периодическая или злокачественная нейтропения (число нейтрофилов менее или равно $0,5 \times 10^9 / \text{л}$) и тяжелые или рецидивирующие инфекции в анамнезе.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; тяжелая наследственная нейтропения (синдром Костманна) с патологической цитогенетикой; тяжелые нарушения функции печени и почек, беременность, кормление грудью; с осторожностью применяют при любых злокачественных и предопухолевых заболеваниях миелоидного характера.

Поб. действ.: Мышечно-костные боли, расстройства мочеиспускания, снижение АД, повышение уровней в крови лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы, мочевой кислоты, аллергические реакции.

Взаим.: Безопасность и эффективность введения препарата в один день с цитотоксическими химиотерапевтическими средствами, угнетающими кроветворение, не установлена.

Примен. и доз.: П/к и в/в, из расчета 0,5 млн.ЕД (5 мкг)/кг 1 раз в день. Больным, готовящимся к трансплантации костного мозга, рекомендуемая начальная доза составляет 10 мкг/кг/сутки (в/в в течение 0,5-24 ч, п/к, непрерывно в течение 24 ч). Препарат разводят в 20 мл 5% раствора глюкозы. Интервал между введением Нейпогена и цитостатика не должен быть менее 24 ч. Для активации клеток-предшественниц периферической крови в качестве самостоятельной терапии на-

значают 10 мкг/кг/сутки путем непрерывного круглосуточного в/в вливания или одноразовых п/к инъекций в течение 6 дней подряд; после миелосупрессивной химиотерапии - п/к - 5 мкг/кг/сутки, начиная с 1-го дня после завершения химиотерапии до достижения нормальных значений нейтрофилов. Больным с тяжелой хронической нейтропенией - начальная доза при наследственной нейтропении - 12 мкг/кг/сутки п/к, при злокачественной или периодической - 5 мкг/кг/сутки п/к. Суточную дозу вводят в 1 или несколько приемов.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Нейромультивит (Neuromultivit®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит тиамина гидрохлорида (витамин В₁) 100 мг, пиридоксина гидрохлорида (витамин В₆) 200 мг и цианокобаламина (витамин В₁₂) 200 мкг; в упаковке 20 или 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение относительного или абсолютного недостатка витаминов (В₁, В₆ и В₁₂).

Показ.: Полинейропатии, невриты, невралгии, корешковый синдром, вызванный дегенеративными изменениями позвоночника, ишиас, люмбаго, плекситы, межреберная невралгия, невралгия тройничного нерва, парез лицевого нерва.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, тахикардия, кожные реакции (зуд, уртикарная сыпь).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1 таблетке 1-3 раза в сутки.

Предост.: Не рекомендуется лечение высокими дозами более 4 нед.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Нейротрат форте (Neurotrat® forte)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит тиамина нитрата (витамин В₁) 100 мг и пиридоксина гидрохлорида (витамин В₆) 100 мг; в упаковке 20, 60 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение относительного или абсолютного дефицита витаминов группы В₁ и В₆.

Фармакодин.: Оба витамина участвуют в регуляции обменных процессов нервной системы: недостаточное снабжение ими организма может стать причиной нарушений в нервной системе.

Показ.: Заболевания периферической нервной системы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции (крапивница, высыпания, шок).

Взаим.: Ослабляет действие L-Допы, циклосерина.

Примен. и доз.: Внутрь, после или во время еды, по 1 таблетке, запивая небольшим количеством жидкости, 3 раза в день в течение 4 нед.

Произв.: Knoll (Германия)

Нейтронорм (Neutronorm®)

Циметидин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит циметидина 200 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка ретард - 350 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 200 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение кислотопродукции, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение, профилактика обострений), симптоматические язвы, эрозивный гастрит, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, стрессовые поражения верхних отделов ЖКТ и кровотечения из верхних отделов ЖКТ, в т.ч. в послеоперационном периоде (профилактика).

Противопоказ.: Беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, утомляемость; диарея (или запоры); боли в мышцах; кожные высыпания, гинекомастия, галакторея, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, снижение либидо, редко - нарушения функции почек и печени.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, не разжевывая. Капсулы - по 200 мг (при необходимости по 400 мг) 3 раза в день и 400 мг перед сном, максимальная суточная доза - 2 г; для профилактики - по 400 мг (перед сном). Таблетки ретард: при легких формах - в начале по 2 таблетки перед сном (или по 1 таблетке утром и вечером), затем - по 1 таблетке перед сном; при тяжелых формах - сначала по 1 таблетке ретард 3 раза в день

(1 нед), затем - по 1 таблетке 2 раза в день; для профилактики - по 1 таблетке (перед сном). Парентерально: в/м (редко), в/в - в виде капельной инфузии - по 200 мг со скоростью введения 75-100 мг/ч (максимально - 150 мг/ч), повторно - с интервалами 4-6 ч, максимальная суточная доза - 1,5 г.

Предост.: Не следует резко прерывать лечение; при длительном применении необходим контроль за состоянием печени и периферической крови.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Нелорен® (Neloren®)

Линкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 500 мг линкомицина в форме хлорида моногидрата; в упаковке 16 и 100 шт.

1 мл инъекционного раствора - 300 мг; в ампулах по 1 и 2 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое.

Показ.: Инфекции мочевых и дыхательных путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, недостаточность функции печени и почек, беременность.

Поб. действ.: Диарея, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, глоссит, стоматит; редко - лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, повышение уровня печеночных трансаминаз и билирубина в плазме крови. При в/в введении больших доз возможен флебит, при быстром введении - понижение АД, головокружение, слабость.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1-2 ч до еды - по 500 мг 3-4 раза в день, детям - по 30-60 мг/кг в сутки в 3-4 приема. В/м, 600-1200 мг в сутки, детям - 10-20 мг/кг в сутки. В/в, капельно (в течение 1 ч) - по 600 мг в 250 мл 5% раствора глюкозы 2-3 раза в сутки, детям - 10-20 мг/кг в 2-3 приема. Максимальная суточная доза - 8 г.

Предост.: Не следует назначать новорожденным. С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта (особенно при колите), бронхиальной астмой и аллергическими реакциями (в анамнезе). При длительном лечении необходим систематический контроль функции печени и состава крови.

Произв.: Lek (Словения)

Неместран (Nemestran®)

Гестринон*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит гестринона 2,5 мг; в календарной упаковке по 8 шт.

Фарм. действ.: Антипрогестагенное, подавление секреции гонадотропина.

Показ.: Эндометриоз (включая осложненный бесплодием).

Противопоказ.: Тяжелые формы сердечной, почечной или печеночной недостаточности, беременность, период лактации, детский и старческий возраст.

Поб. действ.: Кровянистые выделения из влагалища, акне, себорея, задержка жидкости в организме, прибавление массы тела, гирсутизм, изменение голоса, головная боль, приливы, нервозность, депрессия, судороги, изменение аппетита, транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз, изменение либидо, уменьшение объема молочных желез.

Взаим.: Эффект снижают индукторы микросомального окисления (противоэпилептические средства, рифампицин); несовместим с пероральными контрацептивами.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле 2 раза в неделю в течение 6 мес; первую капсулу принимают в 1-й день менструации, вторую - на 4-й день, затем принимают по тем же 2 дням недели на протяжении курса лечения.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Неотон (Neoton)

Фосфокреатин

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит фосфокреатина 0,5 г в комплекте с растворителем в ампулах по 4 мл; в упаковке 6 комплектов или 1, 2 и 5 г в комплекте с растворителем во флаконах по 50 мл и набором для переливания (капельница).

Фарм. действ.: Кардиопротективное, стимуляция энергетического обмена.

Показ.: Гипоксические и метаболические нарушения миокарда: миокардиосклероз, кардиопатия (при гипертонии, хроническая ишемическая), скрытая форма стенокардии. Кардиозащита: при острой ишемии миокарда, в кардиохирургии (добавление к кардиоплегическим растворам).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Падение АД при быстром в/в введении в дозах, превышающих 1 г.

Примен. и доз.: В/м - по 0,5-1 г/день. В/в - по 1-2 г/день. При острой ишемии миокарда: в 1-й день в/в болюсно 2 г с последующей капельной инфузией 4 г/ч в течение 2 ч; 2-6-й дни: 4-8 г ежедневно. В кардиохирургии вводят в концентрации 10 ммоль/л в кардиоплегические растворы.

Произв.: CSC (Италия)

Нервофлукс (Nervoflux®)

Сост. и ф.в.: 100 г растворимого чая содержат 25,6 г сухого экстракта следующего состава: цветков померанца 16 г, цветков лаванды 24,0 г, листьев мяты лимонной 18 г, корня лакричника 56,0 г, шишек хмеля 14 г и сухого экстракта корня валерианы 3,0 г; порошок по 37,5 или 75 г во флаконах по 150 или 300 мл соответственно.

Фарм. действ.: Седативное.

Показ.: Нервное возбуждение, нарушение засыпания, бессонница.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чашке 3 раза в день (вечером за 1/2-1 ч до сна). Чайную ложку чая кладут в чашку, заливают горячей водой и размешивают (можно подсластить). Флакон следует немедленно закрыть.

Предост.: При наличии диабета следует принять во внимание, что 1 чайная ложка препарата соответствует 0,08 ХЕ.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Нервохель (Nervoheel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Acidum phosphoricum D4, Ignatia D4, Sepia D4, Psorinum D12 по 60 мг, Kalium bromatum D4, Zincum valerianicum D4 по 30 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, антидепрессивное, противосудорожное, снотворное.

Показ.: Психосоматические нарушения (органные, климактерические неврозы, бессонница, депрессия, состояния повышенной нервной возбудимости); нарушения умственного развития у детей (дополнительная терапия).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Heel (Германия)

Нетромицин (Netromycin®)

Нетилмицин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит нетилмицина (в форме сульфата) 25 или 100 мг; в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Бактериemia, септицемия (включая сепсис новорожденных); тяжелые инфекционные заболевания дыхательных путей, инфекции почек и мочеполовых путей, кожи, мягких тканей, костей и суставов, ожоги, раны, послеоперационные инфекции, внутрибрюшные инфекции (включая перитонит), инфекции ЖКТ, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Поражения почек, нарушение вестибулярной и кохлеарной функции; головная боль, недомогание, расстройства зрения, дезориентация, тахикардия, гипотензия, сердцебиение, тромбоцитоз, парестезии, сыпь, озноб, лихорадка, задержка жидкости в организме, рвота, понос, болезненность в месте инъекции; нарушение функции печени, гипергликемия, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, увеличение протромбинового времени, гиперкалиемия, аллергические реакции.

Взаим.: Нефро- и ототоксичность усиливают другие лекарственные средства, поражающие почки (например, цефалоспорины) и слухо-вестибулярный аппарат (например, этакриновая кислота, фуросемид). Миорелаксанты и анестетики повышают риск развития нервно-мышечной блокады и паралича дыхания.

Примен. и доз.: В/м или в/в, в дозе 4-6 мг/кг в день равными порциями через 8-12 ч (2-3 раза). При тяжелой инфекции доза может быть увеличена до 7,5 мг/кг в день в трех равных дозах через 8 ч, через 48 ч доза снижается до 6 мг/кг в день и ниже. При инфекциях мочевых путей - 3 мг/кг в сутки в один прием в течение 7-10 дней. Детям - обычно в суточной дозе 6-7,5 мг/кг в день (по 2,0-2,5 мг/кг через 8 ч); новорожденным старше 1 нед и младенцам назначают в суточной дозе 7,5-9,0 мг/кг в день (2,5-3 мг/кг через 8 ч); недоношенным и новорожденным младше 1 нед - 6 мг/кг в день (по 3,0 мг/кг через 12 ч). Продолжительность курса - 7-14 дней. При гонорее у мужчин и женщин - одно-

кратно 300 мг в/м, глубоко по 1/2 дозы в каждую ягодицу.

Предост.: При лечении необходимо контролировать функцию почек, 8 пары черепномозговых нервов. Исключить совместное и (или) последовательное системное или местное применение других потенциально нейро- и нефротоксических препаратов. Не следует сочетать с этакриновой кислотой и фуросемидом (возможно усиление ототоксичности), цефалоспорины (усиление нефротоксичности). По возможности осуществлять контроль содержания препарата в сыворотке крови. С осторожностью назначать пациентам с нервно-мышечными нарушениями (злокачественная миастения, паркинсонизм, детский ботулизм).

Произв.: Schering-Plough (США)

Неулептил (Neuleptil®)

Перициазин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит перициазина 10 мг; в упаковке 50 или 500 шт.

1 капля 4% раствора для приема внутрь - 1 мг; во флаконах по 125 мл.

Фарм. действ.: Антипсихотическое, спазмолитическое, противорвотное, гипотермическое, седативное, снотворное, адренолитическое, м-холинолитическое, антисеротониновое.

Показ.: Психопатии (возбудимого и истерического типа), психопатоподобные нарушения органического генеза с преобладанием стенического аффекта и поведения, психопатоподобные состояния при шизофрении (в том числе гебоидные), паранойяльные состояния в рамках органических, сосудистых, пресенильных и сенильных заболеваний; эпилепсия с аффективно-взрывчатыми характерологическими проявлениями и дисфорическими состояниями.

Противопоказ.: Токсический агранулоцитоз в анамнезе, закрытоугольная глаукома, порфирия, аденома предстательной железы.

Поб. действ.: Подавленность, дискинезии: ранняя (спазматическая кривошея, окуломоторный криз, тризм), поздняя, экстрапирамидные нарушения; ортостатическая гипотония, сухость во рту, запор, парез аккомодации, задержки мочи, импотенция, фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, гиперпролактинемия, увеличение массы тела, гипертермия, холестатическая желтуха, фотосенсибилизация, агранулоцитоз (крайне редко).

Взаим.: Усиливает эффект наркотиков, анальгетиков, барбитуратов, алкоголя,

гипотензивных средств, транквилизаторов.

Примен. и доз.: Внутрь, в начале лечения - 5-10 мг (больным с повышенной чувствительностью - 2-3 мг) 3-4 раза в день, средние суточные дозы - 30-40 мг, максимальные - 50-60 мг.

Предост.: В случае появления гипертермии следует немедленно прекратить лечение. Особо тщательное наблюдение требуется при лечении эпилепсии (в связи с возможным понижением эпилептогенного порога) и паркинсонизма. Осторожно назначают пожилым пациентам (седативный и гипотензивный эффекты), при сердечно-сосудистых заболеваниях, почечной или печеночной недостаточности, водителям транспорта и лицам, работающим с механизмами (сонливость и сниженная, особенно в начале лечения, реакция).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Ниар (Niar®)

Селегилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит селегилина 5 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Центральное симпатомиметическое, блокада МАО.

Клин. фарм.: Эффективен в качестве дополнительного лечения у больных паркинсонизмом, длительно получающих леводопу в сочетании (или без) с ингибиторами декарбоксилазы (при снижении эффективности лечения).

Показ.: Болезнь Паркинсона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, феохромоцитомы, диффузный тиреотоксический зоб, закрытоугольная глаукома, аденома предстательной железы (с задержкой мочи), тахикардия, аритмия, тяжелая стенокардия, психоз, деменция.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: В комбинации с леводопой - головокружение, головная боль, утомляемость, чувство страха, двигательное беспокойство, возбуждение, бессонница, дискинезия, гипотензия, отеки, сухость во рту, потеря аппетита, тошнота, запор; редко - спутанность сознания, психоз, болезненные позывы на мочеиспускание, одышка, увеличение уровней печеночных ферментов, кожная сыпь.

Взаим.: Несовместим с флуоксетином, симпатомиметиками, депримирующими препаратами, алкоголем. Амантадин и антихолинэргические препараты увеличивают частоту побочных реакций.

Передоз.: Симптомы: приступы головной боли, гипертонический криз (при дозе более 60 мг в день в комбинации с потреблением тираминсодержащих пищевых продуктов). Лечение - симптоматическое (специфического антидота нет).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая водой, по 1-2 таблетки утром (после завтрака) или 1 таблетку после завтрака и 1 таблетку после обеда (суточная доза не должна превышать 10 мг), в комбинации с индивидуально подобранной дозой леводопы.

Предост.: Не назначают больным с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, а также получающим антидепрессанты. Следует иметь в виду, что ухудшается возможность управления транспортными средствами и механизмами. Нельзя назначать флуоксетин ранее, чем через 14 дней после отмены Ниара.

Произв.: Knoll (Германия)

Нидран (Nidran®)

Нимустин*

Сост. и ф.в.: Флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит нимустина гидрохлорид; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Злокачественные опухоли головного мозга (в т.ч. глиобластома), легких, органов пищеварения (желудка, печени, ободочной и прямой кишки), злокачественная лимфома, хронический лейкоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угнетение кроветворения.

Поб. действ.: Лейкопения, тромбоцитопения, гипопротейнемия, анемия; повышенная кровоточивость; анорексия, тошнота, рвота, повышение уровня АЛТ и АСТ, стоматит; повышение концентрации мочевины в крови, протеинурия; интерстициальная пневмония; общая слабость, лихорадка, головная боль, головокружение, судороги, алопеция, аллергические реакции (сыпь).

Взаим.: Эффект повышают винкристин, митомицин-С, адриамицин, лучевая терапия. Раствор несовместим с другими средствами.

Примен. и доз.: В/в или в/а (предварительно растворяют в воде для инъекций из расчета 0,005 г в 1 мл) - по 0,002-0,003 г/кг массы тела однократно или по 0,002 г/кг 1 раз в неделю в течение 2-3 нед; возможно повторение

введения (по обеим схемам) через 4-6 нед.

Предост.: Следует с осторожностью назначать при повышенной кровоточивости, острых инфекциях, заболеваниях печени и почек, детям, взрослым репродуктивного возраста. Рекомендуется еженедельный контроль картины периферической крови, функции печени и почек.

Произв.: Iskra (Япония)

Низорал (Nizoral)

Кетоконазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кетоконазола 200 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Поражения кожи, волос и ногтей дерматофитами и/или дрожжами (дерматофитоз, онихомикоз, кандидозная паронихия, разноцветный лишай, фолликулит), микозы ЖКТ, системные микозы (кандидоз, паракокцидиомикоз, гистоплазмоз, кокцидиомикоз, бластомикоз), вагинальный кандидоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания печени, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, токсический гепатит, повышение уровня трансаминаз в крови, головная боль, головокружение, сонливость, фотофобия, гинекомастия, олигоспермия, выпадение волос, крапивница, артралгии, парестезии, гипертермия.

Взаим.: Рифампицин и изониазид снижают концентрацию в крови. Ингибирует микросомальное окисление одновременно назначаемых препаратов и повышает их концентрацию. Несовместим с терфенадином, астемизолом, алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь по 200 мг 1 раз в день во время еды, при неэффективности - 400 мг 1 раз в день. Детям с массой тела от 15 до 30 кг - 100 мг 1 раз в день во время еды, с массой более 30 кг - дозы, указанные для взрослых. Лечение продолжается в течение не менее недели после исчезновения всех симптомов заболевания. Профилактическое назначение пациентам с иммунодефицитом: взрослым - 400 мг/сутки, детям - 4-8 мг/кг в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Низорал (Nizoral®)

Кетоконазол*

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит кетоконазола 20 мг; в тубиках по 15 или 30 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Микозы, вызванные дерматофитами *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum* (дерматомикозы гладкой кожи, паховый дерматомикоз, эпидермофитии кистей и стоп и др.), кандидоз кожи, отрубевидный лишай, себорейная экзема (вызванная *Pityrosporum ovale*).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Раздражение и чувство жжения в местах аппликации; контактный дерматит.

Примен. и доз.: Местно, наносят на пораженную и окружающую здоровую кожу 1 раз в сутки: при кандидозе кожи и отрубевидном лишае в течение 2-3 нед, паховом дерматомикозе - 2-4 нед, дерматомикозе гладкой кожи - 3-4 нед, эпидермофитии стоп - 4-6 нед. При себорейной экземе наносят на пораженные участки 1-2 раза в сутки (в зависимости от тяжести поражения) в течение 2-4 нед, поддерживающая терапия - 1-2 раза в неделю.

Предост.: Следует избегать попадания крема в глаза. Для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется использовать их утром, а Низорал - вечером с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2-3 нед.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Низорал (Nizoral®)

Кетоконазол*

Сост. и ф.в.: 1 г шампуня содержит кетоконазола 21 мг; в пластиковых флаконах по 60 или 100 мл.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Лечение и профилактика поражений кожи, вызванных дрожжами *Pityrosporum* (перхоть, себорейная экзема, локальный отрубевидный лишай).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местно - раздражение, жжение, зуд. Волосы могут становиться жирными или сухими, возможно изменение их цвета, усиление выпадения (редко).

Передоз.: При случайном приеме внутрь следует применять только поддерживающие меры. Для предотвращения аспирации запрещается вызывать рвоту или проводить промывание желудка.

Примен. и доз.: Промывают волосы шампунем в течение 3-5 мин, затем смы-

вают шампунь водой. При перхоти и себорейной экземе - 2 раза в неделю в течение 3-4 нед; при лишае - ежедневно в течение 5 дней. Для профилактики перхоти и себорейной экземы - ежедневно или 1 раз в 2 нед, лишая - ежедневно в течение 3 дней (разовый курс перед наступлением лета).

Предост.: Следует избегать попадания препарата в глаза (при попадании промывают глаза водой). Для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется продолжать их применение в сочетании с шампунем с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2-3 нед.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Никотиновая кислота (Acidum nicotinicum)

Никотиновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит никотиновой кислоты 10 мг.

Фарм. действ.: Компенсация абсолютного или относительного дефицита витамина PP, вазодилатирующее.

Показ.: Гиповитаминоз, пеллагра, гепатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколит и колит, спазм периферических артерий, атеросклероз, гипертриглицеридемия, диабетическая ангиопатия, неврит лицевого нерва.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, атеросклероз, тяжелые формы гипертонической болезни.

Поб. действ.: Покраснение лица и верхней половины туловища, жжение кожи, головокружение, приливы крови к голове, диспепсия, парестезии, возможно значительное снижение АД.

Примен. и доз.: П/к и в/м, по 1 мл 1% раствора 1-2 раза в день в течение 10-15 дней. При ишемическом инсульте - в/в (медленно) по 1 мл 1% раствора.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Никошпан (Nicospan®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дрометарина гидрохлорида 78 мг и никотиновой кислоты 22 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, гиполипидемическое.

Показ.: Нарушения периферического кровообращения, обусловленные спазмом и склерозом сосудов (облитерирующий эндартериит, коронаросклероз, ан-

гиоспазмы, связанные с менопаузой, головные боли сосудистого происхождения).

Противопоказ.: Тяжелая печеночная, почечная и сердечная недостаточность.

Взаим.: Может ослаблять эффект антидиабетических средств.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки. При ангиоспастических состояниях и климактерических симптомах препарат применяют до полного прекращения симптомов.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Нимотоп® (Nimotop®)

Нимодипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нимодипина 30 мг; в упаковке 42 и 100 шт. 1 флакон с 50 мл раствора для инфузий - 10 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее (преимущественно в отношении сосудов мозга) и нейропротекторное, блокада кальциевых каналов.

Показ.: Спазм мозговых сосудов (профилактика), ишемические нарушения мозгового кровообращения при субарахноидальных кровоизлияниях, сенильная деменция.

Противопоказ.: Выраженные нарушения функции печени, беременность, лактация.

Поб. действ.: Чувство жара, гиперемия, тахикардия, гипотония, головокружение, головные боли, возбуждение, нарушение сна, гиперкинезы, агрессивность, депрессия, диспептические расстройства, нарушение функции почек, периферические отеки, флебит в месте введения.

Взаим.: Усиливает эффект других гипотензивных средств, бета-адреноблокаторов, симпатолитиков и антагонистов кальция. Концентрацию в крови повышает циметидин.

Примен. и доз.: В/в и внутрь. В/в в виде инфузий в начале лечения в дозе 2 мг (10 мл раствора) в течение 2 ч (15 мг/кг в час), затем - 10 мл/ч. Внутрь - по 2 таблетки 6 раз в сутки с интервалами в 4 ч, не разжевывая, с небольшим количеством воды. Курс - 6-10 дней в/в, затем внутрь в течение недели. При сенильной деменции - по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Bayer (Германия)

Нирмин (Nirmin®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1,6 мл концентрата для приготовления инфузий содержит нитроглицерина 5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Фармакокин.: Терапевтическая концентрация в плазме - от 1,2 до 11,1 мг/мл. $T_{1/2}$ - 4 мин. Продолжительность действия - 9 мин.

Показ.: Острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, острая левожелудочковая недостаточность с отеком легких, профилактика гипертензивных реакций, при анестезии, эндотрахеальной интубации, стернотомии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, гипотония, повышенное внутричерепное давление, внутримозговые кровоизлияния, глаукома.

Бер. и корм. гр.: Назначать только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, тошнота, рвота, бледность, тахикардия, гипотония, гиперемия, кожная сыпь.

Взаим.: Эффект усиливают АПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики, алкоголь и гипотензивные средства. Альфа-адренолитики (дигидроэрготамин) снижают антиангинальное действие. Нитроглицерин связывается с пластическими материалами, поэтому растворы для вливаний следует приготавливать в стеклянной таре. Системы для переливания из ПВХ адсорбируют нитроглицерин в пределах 40-80% (особенно в начале вливания и при наименьшей скорости введения препарата).

Передоз.: Лечение: прекратить введение препарата, купировать признаки гипотензии или коллапса (перевести ноги больного в приподнятое положение, при необходимости наложить жгуты). При метгемоглобинемии ввести метиленовый синий.

Примен. и доз.: В/в (концентрат разводят в 5% растворе глюкозы или физиологическом растворе). Начальная доза нитроглицерина в Нирмин-инфузии обычно составляет 5 мкг/мин. Ее можно повышать каждые 5 мин на 5 мкг/мин. Если при дозе 20 мкг/мин не будет достигнут удовлетворительный эффект, то дозу увеличивают на 18-20 мкг/мин до достижения оптимального эффекта. При остром инфаркте инфузию можно

назначать в дозе до 5 мг/ч (83 мкг/мин) нитроглицерина. В прединфарктном состоянии - 2,5-5 мг/ч (41-83 мкг/мин) нитроглицерина. У больных с нормальным или пониженным легочным капиллярным давлением эффект может быть достигнут при введении дозы менее 5 мкг/мин нитроглицерина. Оптимальный эффект у большинства больных достигается при дозе, не превышающей 80-199 мкг/мин нитроглицерина (в случае необходимости можно вводить и более высокие дозы - до 200 мкг/мин нитроглицерина).

Предост.: В ходе введения необходим контроль за гемодинамическими параметрами: при снижении систолического давления ниже 100 мм рт.ст. вливание прекращают. Появление кожной сыпи свидетельствует о нитратной аллергии у больных, поэтому введение препарата следует прекратить. Разлитый раствор из ампулы следует нейтрализовать щелочью.

Произв.: Zorka (Югославия)

Нит-рет (Nit-ret®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка пролонгированного действия содержит нитроглицерина 2,5 мг; в упаковке (фольга, блистер) 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Показ.: Профилактика приступов стенокардии, сердечная недостаточность (вазодилатационная терапия).

Противопоказ.: Ортостатические нарушения, коллапс, повышенное внутричерепное давление, шок.

Поб. действ.: Беспокойство, атаксия, тахикардия, ортостатическая гипотензия, брадикардия, обморок, чувство жара, покраснение лица, рвота, нарушения дыхания, цианоз. Через несколько дней после начала лечения побочные эффекты, как правило, перестают проявляться.

Взаим.: Усиливает (взаимно) эффект алкоголя, фенотиазинов, антигипертензивных препаратов.

Примен. и доз.: Строго индивидуально. Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день. В отдельных случаях для получения терапевтического эффекта дозировка может быть увеличена до 2 таблеток 2-4 раза в день. Общая доза составляет не более 12 таблеток в день. При длительном применении высоких доз (8-12 таблеток в день) рекомендуется регулярный контроль за состоянием пациентов. Таблет-

ки проглатывают не разжевывая, запивая 200 мл воды.

Предост.: Не следует комбинировать с другими нитратами.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Нитазол (Nitazolum)

Аминитрозол*

Сост. и ф.в.: Аэрозоль пенный в баллонах по 60 г.

Фарм. действ.: Антипротозойное (трихомонады и лямблии), противовоспалительное.

Показ.: Трихомонадные инфекции мочеполовых органов. Лямблиоз; гнойно-воспалительные процессы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Возможны головная боль, тошнота, недомогание.

Примен. и доз.: Местно, в виде аэрозольной пены при трихомонадных заболеваниях - 2 раза в день (утром и вечером); при раневой инфекции - 1 раз в день. Ректально - в виде аэрозольной пены при воспалительных заболеваниях в проктологии - 3-4 раза в день. Продолжительность лечения - от 3 до 6 нед. За 1-2 с выделяется 1,0-2,6 г пены, в которой содержится 0,017-0,044 г нитазола.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Нитрадиск (Nitradisk®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: Трансдермальная терапевтическая система (ТДТС) для аппликации в виде диска с площадью высвобождающей поверхности 8 или 16 кв.см содержит нитроглицерина 16 или 32 мг соответственно, со скоростью высвобождения 5 мг/24 ч и 10 мг/24 ч; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное.

Фармакодин.: Трансдермальная форма с регулируемым высвобождением нитроглицерина, который, попадая в системный кровоток, вызывает расширение коронарных и периферических сосудов, уменьшает пред- и постнагрузку на сердце, снижает потребность миокарда в кислороде.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов), хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим нитритам и нитратам), анемия.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, снижение АД, тахикардия.

Примен. и доз.: Пластырь наклеивают на здоровый чистый, сухой, лишенный волосяного покрова участок кожи 1 раз в день. Повторная аппликация на тот же участок кожи может быть произведена только несколько дней спустя. Рекомендуются начинать лечение Нитрадиск 5 мг/24 ч, а Нитрадиск 10 мг/24 ч используют для усиления фармакологического эффекта. Оптимальную дозировку подбирают индивидуально, на основе лечебного эффекта, по влиянию на АД и ЧСС.

Предост.: При остром инфаркте миокарда следует применять под тщательным клиническим и/или гемодинамическим контролем. Для предотвращения потенциального синдрома отмены, дозу и частоту аппликаций необходимо уменьшать постепенно (в течение 4-6 нед).

Произв.: Searle (США)

Нитразепам (Nitrazepamum)

Нитразепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитразепама 10 мг.

Фарм. действ.: Снотворное, успокаивающее, миорелаксантное, противосудорожное.

Показ.: Нарушения сна различной этиологии, невротические (неврозоподобные) расстройства, эпилепсия.

Противопоказ.: Миастения, нарушения функции печени и почек; первый триместр беременности.

Поб. действ.: Дневная сонливость, вялость, мышечная слабость, нарушение походки и координации движений, головная боль; оглушенность, головокружение, тошнота, тахикардия, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. При бессоннице за 30 мин до сна, взрослым - 5-10 мг (максимальная разовая доза - 20 мг), детям: в возрасте до 1 года - 1,25-2,5 мг, 1-5 лет - 2,5-5 мг; 6-14 лет - 5 мг; лицам старческого возраста - 2,5-5 мг на прием; при невротических расстройствах и эпилепсии - по 5-10 мг 2-3 раза в день (в вечерние часы принимают большую часть суточной дозы). Курс лечения - 30-35 дней.

Предост.: Не следует назначать лицам, деятельность которых требует быстрой психической и физической реакции. Во время лечения недопустим прием алкоголя.

Произв.: Томский химфармзавод (Россия)

Нитрам (Nitram)

Нитразепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитразепама 5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, седативное, миорелаксирующее, противосудорожное.

Показ.: Нарушения сна, в т.ч. бессонница, эпилепсия у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. бензодиазепинам), миастения.

Бер. и корм. гр.: Только при острой необходимости: возможны повреждения плода во время поздней фазы беременности и родов, у новорожденных возможно торможение сосательного рефлекса и дыхания.

Поб. действ.: Тошнота, запор, нарушения зрения, головокружение, спутанность речи, гипотония, угнетение дыхания, снижение либидо; сонливость и чувство усталости (на следующий день после приема препарата).

Примен. и доз.: Внутрь. При нарушениях сна - по 5-10 мг за 15-30 мин до сна; пожилым - по 2,5 мг; взрослым другого возраста - в суточной дозе от 2,5 до 25 мг в 2-3 приема. Для лечения эпилепсии детям до 1 года - по 5-10 мг, детям 2-14 лет - по 15 мг в 3 приема.

Предост.: С осторожностью следует назначать препарат при почечной и печеночной недостаточности; во время лечения рекомендуется воздержаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Нитро (Nitro®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приготовления инфузий содержит нитроглицерина 5 мг; в ампулах по 2 и 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антиангинальное, гипотензивное.

Показ.: Инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, гипертензия.

Противопоказ.: Повышенное внутричерепное давление, гипотензия, гиповолемия, констриктивный перикардит, тампонада сердца, инфаркт правого желудочка.

Поб. действ.: Гипотония, головная боль, тахикардия, рвота, гипотермия, цианоз, метгемоглобинемия.

Примен. и доз.: В/в (со скоростью 20-100 мкг/мин). Инфузионный раствор готовят путем разведения содержимого 5 ампул в 500 мл физиологического раствора или 5% раствора глюкозы.

Произв.: Orion (Финляндия)

Нитро (Nitro®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит нитроглицерина 20 мг; в тубах по 45 г.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антиангинальное.

Показ.: Стенокардия.

Противопоказ.: Гипотензия, анемия, стеноз мозговых артерий, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Головная боль, тахикардия, головокружение, гиперемия.

Взаим.: Эффект увеличивает гризеофульвин. Несовместим с метгемоглобинообразующими лекарственными препаратами.

Примен. и доз.: Местно. Только взрослым - индивидуальная дозировка. Эффективная разовая доза - 7,5-30 мг (2-8 см). Мазь наносят на специальную бумагу размером 10х6 см и накладывают на левую верхнюю часть грудной клетки. В зависимости от состояния больного мазь можно применять 1-3 раза в течение суток.

Предост.: Лактирующие женщины должны прекратить грудное вскармливание.

Произв.: Orion (Финляндия)

Нитро Польш инфуз (Nitro Pohl® infus)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл (25 мл) или 1 флакон с 50 мл инфузионного раствора содержат нитроглицерина соответственно 5 мг (25 мг) и 50 мг; в упаковках по 10 ампул или по 1 флакону.

Фарм. действ.: Антиангинальное, вазодилатирующее.

Показ.: Острый инфаркт миокарда; левожелудочковая недостаточность, отек легкого.

Противопоказ.: Острое нарушение кровообращения (шок, сосудистый коллапс), выраженная гипотония (систолическое артериальное давление не более 90 мм рт.ст.), кардиогенный шок.

Бер. и корм. гр.: Возможно только при строгих показаниях и под врачебным контролем.

Поб. действ.: Головная боль, гиперемия лица, спутанность сознания, ортостатическая гипотония, коллапс (иногда с брадикардальными нарушениями сердечного ритма); усиление симптомов стенокардии при резком падении кровяного давления, рефлекторная тахикардия.

Взаим.: Гипотонический эффект усиливается при одновременном приеме других вазодилататоров, гипотензивных средств, антагонистов кальция, трициклических антидепрессантов, алкоголя. Ослабляет действие гепарина.

Примен. и доз.: В/в (введение должно проводиться в стационарных условиях при постоянном контроле АД), дозу подбирают индивидуально в соответствии с клиническими и гемодинамическими параметрами; начальная доза - 0,5-1 мг/ч, максимальная доза составляет 8-10 мг/ч. Продолжительность введения - до нескольких дней. У больных с нормальной сократимостью левого желудочка дозу следует уменьшить.

Предост.: С осторожностью назначают при остром инфаркте миокарда с низким давлением наполнения (АД не должно быть ниже 90 мм рт.ст). При лечении пациентов с сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит 5% глюкозы.

Произв.: Pohl-Boskamp (Германия)

Нитро-дур (Nitro-dur®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: Трансдермальная терапевтическая система с площадью контактной поверхности 10, 15 или 20 кв.см., скоростью высвобождения активного вещества 5 мг/24 ч (нитро-дур 5), 7,5 мг/24 ч (нитро-дур 7,5) и 10 мг/24 ч (нитро-дур 10) и общим содержанием нитроглицерина 40, 60 и 80 мг соответственно; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Показ.: Стенокардия, хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к нитросоединениям, тяжелая анемия.

Бер. и корм. гр.: По строгим показаниям, если польза для женщины превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Поб. действ.: Транзиторная головная боль и/или покраснение лица, головокружение, тошнота, рвота, тахикардия, гипертензия (редко) или гипотензия, аллергические кожные реакции.

Взаим.: Бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция и гипотензивные и/или

антиангинальные средства, алкоголь могут усиливать гипотензивный эффект. Несовместим с дигидроэрготамином.

Примен. и доз.: Пластырь наклеивают каждый день (по возможности, в одно и то же время суток) на здоровый, лишенный волос, сухой и чистый участок кожи на 12-16 ч. Начальная доза - от 10 кв.см (0,2 мг/ч или 5 мг/24 ч). Во избежание развития толерантности рекомендуется делать 8-12 ч перерывы между аппликациями. При развитии толерантности дозу увеличивают до 10 мг/24 ч и выше. Новый пластырь наклеивают на другой участок кожи. Наклеивать Нитро-дур на тот же самый участок кожи можно только спустя 3-5 дней. При необходимости прекратить лечение дозу и частоту аппликаций уменьшают постепенно (по крайней мере в течение 4-6 нед).

Предост.: В остром периоде инфаркта миокарда и при острой сердечной недостаточности можно применять только под строгим врачебным контролем. Осторожно назначать пациентам с обструктивной кардиомиопатией, аортальным или митральным стенозом, повышенным внутричерепным давлением, обезвоживанием организма (в т.ч. вследствие приема мочегонных средств), пониженным систолическим давлением (ниже 90 мм рт.ст.).

Произв.: Schering-Plough (США)

Нитро-Мак ретард (Nitro-Mack® retard)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 капсула пролонгированного действия содержит нитроглицерина 2,5 или 5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Фармакокин.: После приема внутрь нитроглицерин в тонком кишечнике постепенно выделяется из капсулы и всасывается; действие наступает через 30-60 мин и длится 4-6 ч (в течение этого периода в печени происходит его превращение в неактивные метаболиты).

Показ.: Стенокардия, спазмы коронарных сосудов, сердечная недостаточность (вазодилатационная терапия).

Противопоказ.: Повышенное внутричерепное давление, ортостатические расстройства, коллапс, шок.

Поб. действ.: Головная боль, беспокойство, атаксия, приливы, гиперемия лица, сердцебиение, гипотензия, ортостатические расстройства, тахи- или брадикардия, тошнота, рвота, цианоз, нарушение дыхания. Через несколько дней после

начала лечения побочные эффекты, как правило, перестают проявляться.

Взаим.: Усиливает эффект алкоголя, производных фенотиазина, антигипертензивных средств, снижает - миотических препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 капсулы утром и в полдень после еды, запивая водой.

Предост.: Не следует увеличивать количество дневных доз до 3-4. При частом приеме и применении больших доз развивается толерантность; в этом случае рекомендуется отменить препарат на 24-36 ч.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Нитроглицерин (Nitroglycerinum)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит нитроглицерина 0,5 или 1 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 0,5 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное.

Показ.: Стенокардия.

Противопоказ.: Глаукома, черепно-мозговая гипертензия, нарушение мозгового кровообращения, выраженный церебратеросклероз.

Поб. действ.: Шум в ушах, головная боль, головокружение, гипотония, тахикардия.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1/2-2 таблетки, капсулу держат под языком до полного рассасывания, для ускорения эффекта можно раздавить капсулу зубами.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Нитроджект (Nitroject)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приготовления инфузионного раствора содержит нитроглицерина 5 мг, в ампулах по 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, венодилатирующее, снижение пред- и постнагрузки.

Показ.: Стенокардия (нестабильная, постинфарктная, при неэффективности бета-адреноблокаторов), острый инфаркт миокарда (с приемлемым давлением наполнения в левом желудочке), застойная сердечная недостаточность, контролируемая гипотония во время хирургических операций; гипертензия, связанная с хирургическими вмешательствами и манипуляциями (интратрахеальная интубация, анестезия, стернотомия, экстракорпоральное кровообращение, хирургический разрез кожных покровов, ранний послеоперационный период).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальная гипотония, шок, коллапс, острый инфаркт миокарда с низким давлением наполнения левого желудочка, констриктивный перикардит, тампонада сердца, гиповолемия, повышение внутричерепного давления, нарушения мозгового кровообращения (в т.ч. геморрагический инсульт), закрытоугольная глаукома.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, гиперемия кожных покровов, тахикардия, артериальная гипотония, тошнота, рвота, боли в животе, беспокойство, психотические реакции, гипотермия, метгемоглобинемия.

Примен. и доз.: В/в капельно (предварительно 10 мл препарата разводят в 500 мл 0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы); вводят с начальной скоростью 5 мкг/мин, с последующим увеличением на 5 мкг/мин каждые 3-5 мин до скорости 10-20 мкг/мин; в зависимости от эффекта продолжительность введения - от нескольких часов до 3-х суток.

Предост.: Введение проводится под контролем ЧСС и АД. С осторожностью следует назначать при заболеваниях печени, почек, беременности (по жизненным показаниям), лактации, детям.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Нитроксилин (Nitroxolinum)

Нитроксилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит нитроксилина 0,05 г; в упаковке 10 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции мочеполовых путей (уретрит, цистит, пиелонефрит, простатит и др.), профилактика инфекций после операций на почке и мочевых путях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 0,1 г 4 раза в день (до 0,8 г/сутки). Для детей старше 5 лет - 0,2-0,4 г/сутки, до 5 лет - 0,2 г/сутки. Курс - 2-3 нед. Повторные курсы проводят с двухнедельным перерывом. Для профилактики инфекции после операций на почке или

мочевых путях - по 0,1 г 4 раза в день в течение 2-3 нед.

Предост.: С осторожностью назначают при почечной недостаточности.

Произв.: Акрихин (Россия); Томский химфармзавод (Россия)

Нитролингвал-Аэрозоль (Nitrolingual®-Spray)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит нитроглицерина 0,4 мг; во флаконах 11,2 г/12,2 мл (около 200 доз).

Фарм. действ.: Антиангинальное, вазодилатирующее.

Показ.: Стенокардия (купирование и профилактика приступов), острый инфаркт миокарда, острая левожелудочковая недостаточность; спазм коронарных сосудов при проведении коронарной ангиографии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотензия (при систолическом АД меньшем или равном 90 мм рт.ст.), коллапс, шок (включая кардиогенный), гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, констриктивный перикардит, тампонада сердца, первичная легочная гипертензия в сочетании с нарушением коронарного кровотока.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности и лактации применять только строго по предписанию врача.

Поб. действ.: Головная боль, снижение АД и ортостатическая гипотензия, рефлекторное повышение ЧСС, заторможенность и потеря ориентации, головокружение, слабость; коллапс (в некоторых случаях с брадикардальными нарушениями сердечного ритма и глубокими обмороками), тошнота, рвота, приливы крови к лицу, дерматит с крупнопластинчатым шелушением, усиление симптомов стенокардии при резком снижении АД (парадоксальные нитратные реакции), аллергические кожные реакции.

Взаим.: Гипотонию усиливают вазодилататоры, гипотензивные средства, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, трициклические антидепрессанты, алкоголь. Повышает эффект дигидроэрготамина (увеличивается концентрация в крови) и ослабляет гепарина.

Примен. и доз.: Распыление в рот производится с промежутками в 30 с при задержке дыхания (под язык). В начале приступа стенокардии - 0,4-0,8 мг (1-2 дозы); при острой левожелудочковой недостаточности и при инфаркте миокарда,

в зависимости от тяжести состояния, при постоянном контроле АД (систолическое АД выше 100 мм рт.ст.) - от 0,4 до 1,2 мг (1-3 дозы). При необходимости введение можно повторить через 10 мин в той же дозе. Профилактически перед ангиографией коронарных сосудов - 0,4-0,8 мг (1-2 дозы).

Предост.: Необходим тщательный врачебный контроль при остром инфаркте миокарда с низким АД (не допускать снижения систолического АД ниже 90 мм рт.ст.), аортальном и/или митральном стенозе, ортостатической гипотонии, черепно-мозговой гипертензии. Во время лечения не следует заниматься деятельностью, требующей быстрой психической или физической реакции (вождение транспорта, управление сложными механизмами). Пациентам, проходившим ранее лечение органическими нитратами (изосорбид динитратом, изосорбид-5-мононитратом), может потребоваться более высокая доза.

Произв.: Pohl-Boskamp (Германия)

Нитроминт (Nitromint®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит нитроглицерина 0,4 мг; в баллонах по 10 г, содержащих 8 г 1% раствора.

Фарм. действ.: Антиангинальное, венодилатирующее.

Показ.: Стенокардия, острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма), острый инфаркт миокарда с высоким давлением заполнения левого желудочка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотония, черепно-мозговая гипертензия, кровоизлияние в мозг, глаукома, анемия.

Поб. действ.: Пульсирующая головная боль, головокружение, чувство жара, покраснение кожи лица, потливость, пальпитация, тошнота, метгемоглобинемия, жжение в полости рта.

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных препаратов, трициклических антидепрессантов. Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Сублингвально, при приступе - в положении сидя 1-2 дозы (0,4-0,8 мг) под язык, нажимая на дозирующий клапан. При необходимости разрешается введение большего количества, но не более 3 доз в течение 15 мин. Для профилактики - 1 доза за 5-10 мин до нагрузки.

Предост.: Аэрозолем следует пользоваться вдали от огня (взрывоопасно). Необходима осторожность при сочетан-

ном назначении с гипотензивными средствами и трициклическими антидепрессантами.

Произв.: Egis (Венгрия)

Нитронг (Nitrong®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитроглицерина 6,5 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, венодилатирующее, артериодилатирующее, улучшение кровоснабжения миокарда, снижение пред- и постнагрузки, потребности миокарда в кислороде.

Клин. фарм.: Эффект развивается в течение первого часа после приема, достигает максимума через 3-4 ч и продолжается 8-10 ч.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное давление, первые дни острого инфаркта миокарда, выраженная гипотония, закрытоугольная глаукома.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, ощущение жара, покраснение лица, гипотония (у больных острым инфарктом миокарда).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 2-3 раза в день; глотают, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды, перед едой (но не более 39 мг в сутки).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Нитроперкутен ТТС (Nitropercutenum ТТС)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 пластырь (35 кв.см) содержит 74,9 мг нитроглицерина, в герметичных пачках из свето- и влагонепроницаемой ламинированной пленки.

Фарм. действ.: Антиангинальное.

Показ.: Стенокардия, острая коронарная и левожелудочковая недостаточность.

Противопоказ.: Кровоизлияние в мозг, черепно-мозговая гипертензия, гипотония, глаукома.

Поб. действ.: Головокружение, гипотония, тахикардия, местный дерматит, ортостатический коллапс, толерантность.

Примен. и доз.: Накожно (область груди или спины), перед наклеиванием с пластыря снимается защитный бумажный слой, липкой стороной накладыва-

ется на кожу и слегка прижимается, чтобы прилипла вся поверхность. Кожа на месте приклеивания пластыря смачивается водой (пластырь увлажнять нельзя). Во избежание ощущения боли во время снятия пластырь смачивается струей теплой воды, после чего место аппликации промывается теплой водой с мылом. Назначают по 1-2 пластыря (0,5-1 кв.см/кг). Длительность одной аппликации - 1 сутки. Курс лечения 4-14 дней.

Предост.: Пластырь нельзя наклеивать на волосистую поверхность кожи.

Произв.: Санитас (Литва)

Нитросорбид (Nitrosorbid)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изосорбида динитрата 20 мг; в упаковке 30 или 100 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Показ.: Стенокардия, тяжелая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Закрытоугольная глаукома, митральный и аортальный стеноз, обструктивная кардиомиопатия, легочное сердце, сердечная недостаточность при низком давлении наполнения левого желудочка.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, покраснение лица, тахикардия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, по 10-40 мг 2-4 раза в день. Лечение следует начинать с малых доз, затем, в зависимости от эффекта, повышать дозу каждые 1-2 нед.

Произв.: Orion (Финляндия)

Нитросорбид (Nitrosorbidum)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитросорбида 0,01 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее.

Показ.: Предупреждение стенокардии, сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Глаукома, черепно-мозговая гипертензия, внутричерепное кровоизлияние, цереброатеросклероз, гипотония.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, гипотония, тахикардия.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, по 5-40 мг 1-4 раза в день.

Произв.: Акрихин (Россия)

Нитрофунгин (Nitrofungin)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для наружного применения содержит 2-хлор-4-нитрофенола 10 мг, а также триглицол и этанол 50%; во флаконах по 25 мл.

Фарм. действ.: Противогрибковое, фунгистатическое.

Показ.: Дерматомикозы (эпидермофития, трихофития, кандидоз, микотическая экзема), микоз наружного слухового прохода.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местное раздражение, фотосенсибилизация.

Примен. и доз.: Наружно, пораженные участки обрабатывают 2-3 раза в сутки до исчезновения клинических признаков, затем еще не менее, чем в течение 4 нед, применяя препарат 1-2 раза в неделю. Для профилактики рецидивов - 1-2 раза в неделю.

Предост.: Места, обработанные препаратом, не следует подвергать воздействию солнечных лучей. При дерматомикозах, сопровождающихся выраженными местными воспалительными явлениями, и при появлении раздражения можно применять раствор, разбавленный водой в соотношении 1:1.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Нифадил (Nifadil®)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нифедипина 10 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Фармакодин.: Уменьшает число сердечных сокращений и снижает потребность миокарда в кислороде. Понижает тонус периферических артерий, уменьшает периферическое сосудистое сопротивление и АД. Уменьшает тонус коронарных сосудов, увеличивает коронарный кровоток.

Показ.: Стенокардия, артериальная гипертензия (в т.ч. гипертонический криз), гипертрофия миокарда с обструкцией или без нее.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, артериальная гипотония, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, слабость, отеки голеней, непродолжительная за-

грудинная боль (15-30 с), гиперемия кожи, кожные высыпания.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - по 10 мг 3 раза в день или по 20 мг несколько раз в день (интервал между приемами не менее 2 ч). Максимальная суточная доза - 120 мг. При приступах стенокардии возможен сублингвальный прием до полного рассасывания (эффект наступает через несколько минут). При длительном приеме - по 20 мг 2 раза в день.

Предост.: Осторожно сочетают с гипотензивными, бета-адреноблокаторами и нитратами (возможно усиление гипотензивного эффекта). Следует воздержаться во время лечения от употребления алкоголя.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Нифедикор (Nifedikor)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит нифедипина 10 или 20 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка ретард - 20 мг; в упаковке 50 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 20 мг; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, сосудорасширяющее, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Профилактика и лечение острой и хронической коронарной недостаточности, стенокардия, постинфарктные состояния, гипертоническая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Вертиго, приливы, головная боль, нервозность, тремор, судороги, гипотензия, тахикардия, снижение перфузии миокарда, сопровождающееся повышением ЧСС, обострение стенокардии, астения, периферический отек, тошнота, изжога, диарея, запор, метеоризм, гепатит, расстройство зрения, заложенность носа, опухание десен, фарингит, кашель, одышка, тугоподвижность суставов, потливость, озноб, лихорадка, сексуальные расстройства, повышение активности щелочной фосфатазы, ЛДГ и АСТ, гипергликемия, пурпура, тромбоцитопения, анемия, лейкопения.

Взаим.: При сочетании с бета-блокаторами возможны - гипотензия, обострение стенокардии, развитие застойной сердечной недостаточности, аритмии, с дигоксином - изменение гематологических показателей, с гипотензивными препаратами -

ми - тяжелая гипотензия. Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь. Капсулы 10 мг: по 1-2 капсулы, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды 3 раза в день; капсулы по 20 мг: по 1 капсуле 3 раза в день. Капли (40 капель = 20 мг нифедипина): 20-40 капель (10-20 мг) 3 раза в день сразу после растворения в воде. Интервал между приемами - не менее 2 ч. При приступе стенокардии: капсулу можно разжевать и подержать во рту несколько минут; капли - держать под языком.

Предост.: Необходим контроль за АД и уровнем глюкозы в крови. Во время лечения понижается скорость реакции.

Произв.: CSC (Италия)

Нифекард® (Nifecard®)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит нифедипина 10 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка ретард - 20 мг; в упаковке 30 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Стенокардия, артериальная гипертензия, гипертонический криз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, выраженный артериальный и митральный стеноз, декомпенсированная сердечная недостаточность, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, первые 8 дней острого инфаркта миокарда, синдром слабости синусового узла, тахикардия, гипотония, тяжелая печеночная недостаточность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, гиперемия, головокружение, слабость, тошнота, кожные высыпания, отек ног; редко - учащение приступов стенокардии.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10-20 мг, запивая небольшим количеством жидкости 3-4 раза в сутки (но не более 120 мг). Для длительного лечения предпочтительнее таблетки ретард - 2 раза в сутки.

Произв.: Lek (Словения)

Нифелат (Nifelat™)

Нифедипин*

Нифелат Q (Nifelat™ Q)

Нифедипин*

Нифелат P (Nifelat™ R)

Нифедипин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 филмтаблетка содержит нифедипина 10 мг (Нифелат); в упаковке 30 и 100 шт.

1 таблетка длительного высвобождения, покрытая оболочкой, - 20 мг (Нифелат P); в упаковке 30 шт.

1 таблетка быстрого высвобождения, покрытая оболочкой, - 10 мг (Нифелат Q).

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, вазодилатирующее, селективная блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Стенокардия (профилактика - Нифелат P, Нифелат, лечение - Нифелат), артериальная гипертензия (все стадии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кардиогенный шок, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, вялость, слабость, сонливость, приливы крови к лицу, жар в лице, гипотония, периферические отеки, парадоксальное учащение приступов стенокардии, нарушение функции печени (аллергического генеза), кожная сыпь, тошнота, гиперплазия десен, учащение мочеиспускания.

Взаим.: Циметидин и бета-адреноблокаторы усиливают гипотензивное действие. Снижает уровень в сыворотке хинидина.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, запивая небольшим количеством воды; в средней дозе - по 1-2 таблетки 2-3 раза в день (Нифелат) и по 1 таблетке 2 раза в день (Нифелат P); при необходимости - до 2 таблеток 2 раза в день (Нифелат P).

Предост.: С особой осторожностью назначают при гипотонии и низкой сократимостью сердца; следует иметь в виду, что может усугубляться сердечная недостаточность у больных с выраженным аортальным стенозом, гипергликемия - у больных с сахарным диабетом. В период лечения необходимы надежные способы контрацепции. Лактирующие женщины

должны приостановить грудное вскармливание. Прием прекращают при учащении приступов стенокардии.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Нифлугель (Niflugel)

Нифлумовая кислота*

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат нифлумовой кислоты 2,5 г; в тубиках по 60 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Суставной синдром: ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра; внесуставные процессы: бурсит, тендинит, тендовагинит, эпикондилит; травмы: переломы, вывихи, ушибы, повреждения мягких тканей; суставные боли, периоститы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, повреждения слизистых оболочек, кожи.

Поб. действ.: Редко - гиперемия, зуд, сыпь, жжение.

Примен. и доз.: На пораженный участок наносят 5-10 см геля, втирают, легко массируя.

Произв.: UPSA (Франция)

Нифлурил (Nifluril®)

Нифлумовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит нифлумовой кислоты 250 мг; в упаковке 30 шт.

100 г крема - 3 г нифлумовой кислоты; в тубиках по 60 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Капсулы - ревматоидный полиартрит, артроз, экстракция зуба, акушерско-гинекологические вмешательства, аднексит, параметрит, совместно с антибиотиками в оториноларингологии. Крем - ревматоидные тендиниты, артропатии, растяжения, вывихи, ушибы, травматические отеки и боли, люмбаго, поверхностные флебиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, выраженные нарушения функции печени и/или почек, наличие в месте нанесения крема нагноения, экземы, ран, беременность, возраст до 13 лет.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, анорексия, при длительном лечении - мелена, транзиторное повышение печеночных трансаминаз; редко - костный флюороз (после нескольких лет лечения высокими дозами); гиперемия, зуд, жжение, сыпь (местные реакции при использовании крема).

Примен. и доз.: Капсулы - внутрь во время еды. Взрослым - по 1 капсуле 3 раза в день, детям старше 13 лет - 2-3 капсулы в день, курс - не более 4-5 дней. Крем - местно, 5-10 см крема.

Произв.: UPSA (Франция)

Нифлурил (Nifluril®)

Морнифлумат*

Сост. и ф.в.: 1 свеча для взрослых содержит морнифлумата 700 мг.

1 свеча для детей - 400 мг; в упаковке 8 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антиагрегационное, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Ревматоидный полиартрит, артроз, экстракция зуба, акушерско-гинекологические вмешательства, аднексит, параметрит, совместно с антибиотиками в оториноларингологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная или почечная недостаточность, ректиты, ректальные кровотечения, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, мелена, повышение печеночных трансаминаз, аллергические реакции - крапивница, эритема, зуд.

Примен. и доз.: По 1 свече 2 раза в сутки.

Произв.: UPSA (Франция)

Нихлофен (Nichlophenum)

Сост. и ф.в.: 1% раствор нихлофена; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное.

Показ.: Грибковые поражения кожи (эпидермофития, трихофития, экзема, кандидоз).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Раздражение в местах аппликации.

Примен. и доз.: Наружно, пораженные участки кожи смазывают раствором 2-3 раза в день в течение 2-4 нед (до исчезновения клинических проявлений). В случае возникновения раздражения ре-

комендуется разводить препарат водой в соотношении 1:1.

Произв.: Марбиофарм (Россия)

Но-шпа (No-Spa®)

Дротаверин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл водно-спиртового раствора содержит дротаверина гидрохлорида 40 мг; в упаковке 5 и 25 шт.

1 таблетка - 40 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое.

Показ.: Спазм гладкой мускулатуры желудка, кишечника, желче- и мочевыводящих путей, периферических сосудов, при инструментальных исследованиях, простатит, спазм шейки матки при родах.

Противопоказ.: Глаукома, гипертрофия простаты.

Поб. действ.: При парентеральном введении возможны: чувство жара, головокружение, сердцебиение, потливость, аллергические дерматиты.

Примен. и доз.: Внутрь, п/к и в/в. П/к, взрослым - по 2-4 мл 1-3 раза в день; для снятия острых почечнокаменных приступов - по 2-4 мл в/в, медленно. Внутрь - по 1-2 таблетки 3 раза в день. Маленьким детям - по 1/4-1/2 таблетки 1-2 раза в день, подросткам - по 1/2 таблетки 1-2 раза в день.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Нобритем (Nobritem)

Медазепам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит медазепам 5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Успокаивающее (с активирующим компонентом), анксиолитическое, миорелаксирующее, противосудорожное.

Показ.: Первичный нейровегетативный синдром (внутреннее возбуждение, раздражительность, возбудимость, затруднение концентрации внимания и др.); психонейровегетативные сердечно-сосудистые (тахикардия, гипо- или гипертензивные нарушения кровообращения, псевдостенокардитические расстройства и др.) и желудочно-кишечные (ощущение комка в глотке, переполнения желудка, тошнота, спазмы и др.) синдромы; психонейродыхательные синдромы (гипервентиляция, ощущение удушья и др.); психоневрозы, неврозы органов и психосоматические расстройства, характеризующиеся эмоциональным напряже-

нием, беспокойством, раздражительностью и внутренним напряжением.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. бензодиазепинам).

Поб. действ.: Головокружение, чувство усталости и сонливости, запоры.

Взаим.: Усиливает эффект средств, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, в легких и средней тяжести случаях - по 5 мг 3-4 раза в день или по 10 мг 2 раза в день; в тяжелых случаях - по 10 мг 3 раза в день; продолжительность лечения не менее 15 дней.

Предост.: Следует воздерживаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций. Прекращать лечение рекомендуется постепенно (во избежание "синдрома отмены").

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Нова вита (пренатал формула) (Nova Vita (prenatal formula))

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина А 4000 МЕ, витамина D 400 МЕ, витамина Е 11 мг, витамина С 100 мг, витамина В₁ 1,5 мг, витамина В₂ 1,7 мг, витамина В₆ 2,6 мг, никотинамида 18 мг, фолиевой кислоты В_с 800 мкг, витамина В₁₂ 4 мкг, железа (фумарата) 60 мг, кальция (карбоната) 200 мг и цинка сульфата 25 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Компенсация абсолютного или относительного дефицита витаминов и минералов.

Показ.: Гиповитаминоз, нарушение минерального обмена, повышенная потребность в витаминах и микроэлементах перед и во время беременности и в период кормления грудью.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не развиваются при соблюдении режима дозирования.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - по 1 таблетке в день.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Новантрон (Novantrone®)

Митоксантрон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с раствором для инъекций содержит митоксантрона 20 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Фармакокин.: Быстро и равномерно распределяется в тканях, не проходит через гематоэнцефалический барьер.

Медленно выводится из организма, $T_{1/2}$ - в среднем 12 дней (от 5 до 18 дней). 6-11% выводится с мочой, 13-25% - с фекалиями.

Фармакодин.: Тормозит синтез ДНК и ингибирует процесс митоза.

Показ.: Рак молочной железы, рак предстательной железы, неходжкинская лимфома, нелимфоцитарный и рефрактерный лимфобластный лейкозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Снижение аппетита, тошнота, рвота, запор, диарея, стоматит, снижение сердечного выброса и развитие сердечной недостаточности, аритмия, одышка, слабость, аменорея, обратимая алопеция, лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Передоз.: Характеризуется интоксикацией. Лечение симптоматическое; нецелесообразно применять гемо- или перитонеальный диализ.

Примен. и доз.: В/в, при монотерапии рака молочной железы и неходжкинской лимфомы - однократно - 12-14 мг/кв.м поверхности тела 1 раз в 3 нед; в случае предшествующей химиотерапии дозировку уменьшают, последующий режим дозирования устанавливают на основании содержания лейкоцитов и тромбоцитов в крови на 21-й день после лечения; при комбинированной терапии - начальную дозу понижают на 2-4 мг/кв.м по сравнению с дозой монотерапии. При монотерапии нелимфоцитарного лейкоза в фазе рецидива - однократно - в дозе 12 мг/кв.м в сутки в течение 5 дней; при комбинированной терапии - применяется ограниченно.

Предост.: Необходимо избегать беременности во время и в течение 6 мес после окончания лечения. Рекомендуются проводить мониторинг клинических, гематологических и биохимических параметров во время и после лечения. Необходимо избегать попадания препарата на кожу, слизистые, глаза. Следует предупредить пациента, что через 24 ч после введения изменяется цвет мочи на синевато-зеленый. Нельзя смешивать с другими препаратами в одном инфузионном растворе.

Произв.: Wyeth-Lederle (США)

Новиган (Novigan)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ибупрофена 400 мг, п-пиперидинэтокси-о-карбометоксибензофенона гидрохлорида 5 мг и альфа-пиперидинэтилдифени-

лацетамида метобромида 0,1 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, спазмолитическое.

Показ.: Боли, обусловленные спазмом гладких мышц (дисменорея, печеночная, кишечная и почечная колики, дискинезия желчных путей, спазмы ЖКТ, тенезмы, головная боль, мигрень и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, аспиринзависимая бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, обострение (или образование) язвы ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до или через 3 ч после еды, при спастических болях - по 1-2 таблетки до 4 раз в день (максимальная доза ибупрофена 3200 мг), при дисменорее - по 1 таблетке каждые 4 ч. Детям - по 1/2-1 таблетке 4 раза в день.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Новитропан (Novitropan®)

Оксибутинин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит оксибутинина гидрохлорида 5 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, увеличение вместимости мочевого пузыря, снижение частоты сокращений детрузора и сдерживание позывов к мочеиспусканию.

Показ.: Нейрогенный мочевой пузырь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, глаукома, атония кишечника, непроходимость ЖКТ (в т.ч. паралитическая), расширение ободочной кишки, язвенный колит, миастения, обструктивная уропатия, кровотечение, возраст (до 5 лет).

Бер. и корм. гр.: Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не установлена.

Поб. действ.: Сухость во рту, диспептические расстройства (тошнота, рвота, запор, метеоризм), задержка мочи, сонливость или бессонница, слабость, головокружение, нарушения зрения, миопия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, пониженное потоотделение, импотенция, подавление лактации, аллергические реакции.

Передоз.: Симптомы: возбуждение центральной нервной системы (беспо-

койство, тремор, раздражительность, судороги, бред, галлюцинации), лихорадочное состояние, тошнота, рвота, тахикардия, гипо- или гипертензия, дыхательная недостаточность, паралич, кома. Лечение: следует поддерживать дыхание, вызвать рвоту (исключая пациентов в прекоматозном состоянии, с судорогами, психозом) или произвести промывание желудка; назначить активированный уголь и слабительное средство; для реверсии симптомов блокады холинорецепторов используют физостигмин. Гиперпирексию следует лечить симптоматически с помощью холодных компрессов.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза (не более 4) в день, детям - по 1 таблетке 2 раза (не более 3) в день.

Предост.: Соблюдать осторожность при лечении пациентов с нарушениями функции печени и почек, гипертиреозом, ишемической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, аритмией, артериальной гипертензией, гипертрофией предстательной железы, больных с грыжей пищеводного отверстия, связанной с гастроэзофагеальным рефлюксом.

Произв.: CTS (Израиль)

Ново-Пассит (Novo-Passit®)

Сост. и ф.в.: 5 мл раствора для приема внутрь содержат сложного экстракта боярышника, хмеля, зверобоя, Melissa, страстоцвета, бузины и валерианы 150 мг и гвайфенезина 200 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Седативное, анксиолитическое, спазмолитическое.

Фармакодин.: Устраняет страх, психическое напряжение, расслабляет гладкие мышцы.

Показ.: Неврастения, сопровождающаяся раздражительностью, тревогой, страхом, усталостью, рассеянностью, нарушением памяти; психическим истощением; "синдром менеджера" (состояние постоянного психического напряжения); бессонница (легкие формы); головные боли, обусловленные нервным напряжением, мигрень, повышенная нервно-мышечная возбудимость, функциональные заболевания ЖКТ (диспептический синдром, синдром "раздраженного кишечника"), климактерический синдром, нейроциркуляторная дистония, зудящие дерматозы (экзема атопическая и себорейная, крапивница).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения, детский возраст до 12 лет.

Поб. действ.: Головокружение, вялость, усталость, сонливость, снижение концентрации внимания; тошнота, изжога, рвота, диарея или запор; мышечная слабость, судороги, экзантема, зуд.

Взаим.: Усиливает действие алкоголя и других веществ, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, можно неразбавленным или добавлять в напитки, при расстройстве пищеварения - во время еды - по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в сутки (при необходимости можно увеличить разовую дозу до 10 мл), при появлении нежелательной заторможенности - по 2,5 мл утром и днем и 5 мл на ночь. Перед предполагаемой эмоциональной нагрузкой - за 20-30 мин однократно - по 5-10 мл.

Предост.: С осторожностью назначают при тяжелых органических заболеваниях ЖКТ. Во время лечения следует воздержаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых двигательных и психических реакций (вождение транспорта, управление механизмами).

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Новодигал (Novodigal®)

Дигоксин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или 1 мл раствора для инъекций содержат бета-ацетилдигоксина 0,2 мг; таблетки в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Кардиотоническое, антиаритмическое.

Показ.: Хроническая сердечная недостаточность; тахиаритмия с предсердной фибрилляцией, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (профилактика)

Противопоказ.: Гиперчувствительность, интоксикация дигиталисом, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, желудочковая тахикардия, АВ-блокада II и III степени (кроме случаев лечения водителя ритма), WPW-синдром, гиперкальциемия, гипокалиемия, аневризма грудного отдела аорты, синдром каротидного синуса.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (особенно в I триместре беременности).

Поб. действ.: Редко: потеря аппетита, диспептические расстройства, инфаркт брыжейки, аритмии, в т.ч. желудочковая тахикардия, экстрасистолия, АВ-блокада I и III степени, головные боли, нарушения сна, зрения, дезориентация,

депрессия, психозы, афазия, мышечные боли, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект могут усиливать кальций, калийсберегающие диуретики, пенициллины, амфотерицин В, тетрациклины, макролиды, карбеноксолол, глюкокортикоиды, АКТГ, салицилаты, антагонисты кальция, антиаритмики (хинидин, амиодарон, бета-блокаторы и др.), каптоприл, резерпин, тиреостатические препараты, ослаблять - соли кальция, препараты, снижающие резорбцию из ЖКТ (активированный уголь, холестирамин, колестипол, антациды, каолин-пептиды), неомидин, парааминосалициловая кислота, цитостатики, сульфасалазин, фенитоин, метоклопрамид, НПВС, тиреоидные гормоны. Одновременное применение с симпатомиметиками, циклопропаном, резерпином, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами фосфодиэстеразы, суксаметоном хлоридом повышает вероятность развития аритмии.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 0,2 мг 3 раза в сутки в течение 2 дней или по 0,2-0,3 мг в сутки в течение 4 дней; при поддерживающей терапии - по 0,2-0,3 мг в сутки (по возможности утром). Для быстрого насыщения новодигалом - в/в 2-4 ампулы (0,2 мг/мл) в средней суточной дозе 0,6 мг в течение 3-х дней, далее пациентов переводят на прием таблеток.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Новокаин (Novocainum)

Прокаин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит прокаина гидрохлорида 2,5; 5; 10 и 20 мг; в ампулах по 1, 2 и 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия; вагосимпатическая и паранефральная блокада; болевой синдром при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрой, тошнота.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Головокружение, слабость, гипотония, аллергические кожные реакции.

Примен. и доз.: В/м, 5-10 мл 1-2% раствора 3 раза в неделю в течение месяца, после чего делают 10-дневный перерыв. Для проводниковой анестезии используют 1-2% раствор.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия)

НовоПен® 3 (NovoPen® 3)

Показ.: Сахарный диабет.

Примен. и доз.: Перед использованием проводят сборку шприц-ручки НовоПен 3, вставляя картридж Пенфилл в держатель картриджа колпачком с цветовым кодом вперед и плотно привинчивая механическую часть к держателю картриджа; снимают внешний и внутренний колпачки иглы, перед каждой инъекцией удаляют пузырьки воздуха из иглы и гильзы. При установке дозировки убеждаются в том, что селектор дозировки установлен в нулевое положение и устанавливают необходимое для инъекции количество единиц (нечетные числа обозначены длинными штрихами между четными числами). Вводят дозу, нажав на пусковую кнопку до упора. После инъекции игла должна оставаться под кожей 6 с, что обеспечивает полное введение дозы. Если в картридже остается недостаточное количество инсулина, то недостающее количество единиц, которое надо ввести из нового картриджа Пенфилл, будет показано в индикаторном окошке дозировки.

Предост.: При необходимости применять более одного типа инсулина, для каждого типа пользоваться своей шприц-ручкой. Перед инъекцией следует убедиться в том, что шприц-ручка содержит инсулин нужного типа (цвет полоски на картридже Пенфилл указывает на определенный тип инсулинового препарата) и проверить по шкале, достаточно ли осталось инсулина. После инъекции необходимо убедиться, что введена полная доза (на шкале дозировки - нулевая отметка). Категорически запрещается начинать инъекцию суспензии (инсулин пролонгированного действия), если в малом смотровом окошке виден резиновый поршень. Оставшиеся единицы инсулина в горлышке картриджа не могут быть удалены. После инъекции иглу следует немедленно снять (для предотвращения выталкивания части жидкости из картриджа Пенфилл), т.к. если при использовании инсулинового препарата в виде суспензии происходит утечка жидкости, может измениться концентрация (активность) инсулина в картридже Пенфилл. Инсулиновую шприц-ручку НовоПен 3 следует применять только в сочетании с продукцией, совместимой с

ней и позволяющей ручке функционировать надежно и эффективно.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Новофен (Novofen)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит тамоксифена 20 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антиэстрогенное, противоопухолевое.

Показ.: Рак молочной железы, ановуляторное бесплодие.

Противопоказ.: Беременность.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, головокружение, отеки, метроррагии, тромбоцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь. При раке молочной железы - по 1 таблетке 2 раза в сутки; при отсутствии положительного эффекта через 1 мес дозу можно увеличить до 2 таблеток 2 раза в день. При бесплодии - по 1 таблетке 2 раза в сутки; женщинам с регулярным менструальным циклом (без наступления овуляции) рекомендуется прием на 2, 3, 4 и 5 дни цикла; при необходимости дозу постепенно увеличивают в последующие циклы до 2-4 таблеток 2 раза в день, женщинам с нерегулярным циклом можно начинать лечение с любого дня. При наступлении овуляции повторный курс возможен через 45 дней. При наступлении менструации следующий курс начинают со второго дня цикла.

Предост.: Перед началом лечения бесплодия следует исключить беременность. С осторожностью применяют в предменопаузе (существует вероятность наступления беременности).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Ноготков цветки (Flores Calendulae)

Сост. и ф.в.: Цветки в картонных пачках. Содержат горькое вещество календен, каротиноиды, флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, салициловую кислоту и др. вещества.

Фарм. действ.: Антисептическое и противовоспалительное, мягкое седативное, спазмолитическое и желчегонное.

Показ.: Воспалительные заболевания полости рта, ангина, гнойные раны, ожоги; в гинекологической практике.

Поб. действ.: Горечь во рту, гастралгия.

Примен. и доз.: Внутрь, в виде настойки (1:10 на 70% спирте) - по 1 чайной ложке на стакан воды или по 10-20 капель на прием. В виде настоя (20 г или 2 столо-

вые ложки на стакан кипящей воды) - по 1-2 столовые ложки 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Нозепам (Nozerepam)

Оксазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит оксазепам 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, миорелаксирующее.

Показ.: Неврозы, психопатии, тревожные и депрессивные состояния, бессонница, судорожные состояния.

Противопоказ.: Нефрит, гепатит, миастения, беременность (особенно первый триместр).

Поб. действ.: Сонливость, вялость, мышечная слабость, расстройство аккомодации, сухость во рту, диспепсия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 5-10 мг с увеличением в дальнейшем до средней разовой дозы - 20-30 мг 3 раза в день.

Произв.: Олайнфарм (Латвия); Тюменский химфармзавод (Россия)

Нок (Nok®)

Перметрин*

Сост. и ф.в.: Крем-шампунь 1%, в бутылках по 100 мл.

Фарм. действ.: Противопедикулезное, овоцидное.

Показ.: Завшивленность и гнидоносительство.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к пиретрину, пиретроидам и хризантемам), возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Безопасность лечения во время беременности не установлена. В период кормления грудью рекомендуется воздержаться от использования препарата.

Поб. действ.: Неприятные ощущения (жжение, покалывание, онемение) и легкая эритема на коже головы, усиление зуда.

Примен. и доз.: Вымыть голову шампунем, смыть водой, просушить. Нанести достаточное количество на волосы и кожу головы, оставить на 10 мин, затем смыть водой. Расчесать волосы густым гребешком для удаления гнид. Если живые вши обнаруживаются через 7 дней после применения, повторно обрабатывать.

Предост.: Избегать попадания в глаза.

Произв.: CTS (Израиль)

Нолицин (Nolicin®)

Норфлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит норфлоксацина 400 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, блокада ДНК-гиразы.

Фармакокин.: Всасывается быстро, но неполностью, выделяется с мочой (до 80%) преимущественно в неизмененном виде.

Фармакодин.: Активен в отношении большинства грамотрицательных и некоторых грамположительных бактерий (*E.coli*, *Klebsiella*, *Proteus sp.*, *Providentia sp.*, *Enterobacter*, *Morganella*, *Citrobacter*, *Serratia*, *Pseudomonas* и стафилококки), слабее действует на акинетобактерии и энтерококки, не влияет на анаэробы бактерий и стрептококки.

Показ.: Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей, гонорея, дизентерия, сальмонеллез, профилактика инфекций пищеварительного тракта и диареи путешественников.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим препаратам хинолонового ряда), препубертатный возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Редко - слабость, анорексия, диарея, тендинит, разрыв сухожилий, увеличение уровней трансаминазы, щелочной фосфатазы, креатинина в сыворотке, снижение гематокрита, эозинофилия, лейкопения, аллергические реакции (крапивница, зуд).

Взаим.: Усиливает терапевтический эффект циклоспорина и варфарина, побочное действие теофиллина. Антациды и сульфат ухудшают всасывание (должны приниматься как минимум спустя 2 ч после нолицина).

Передоз.: Симптомы: нарушение пищеварения. Специфического лечения не требуется.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды или спустя 2 ч после еды - по 1 таблетке (400 мг) 2 раза в день. Максимальная суточная доза - не более 1500 мг, курс - от 7 до 14 дней. Гонорея - 1 раз в день 800-1200 мг или 2 раза в день по 400 мг в течение 3-7 дней. При нарушении функции почек разовую дозу уменьшают в 2 раза или в 2 раза удлиняют интервал между приемами. Лечение хронического бактериального простатита длится 4-6 нед. Профилактика сепсиса при нейтропении - 400 мг 2 раза в день, диареи путешественников - 400 мг в день за 1 день до отъезда и в течение всего времени пути, профилактика рецидивов

(более чем 4-5 раз в год) инфекций мочевыводящих путей - 1 раз вечером по 200 мг в течение 1 или 2 лет.

Предост.: У больных на гемодиализе (при нормальном диурезе) дозу рекомендуется уменьшить в 2 раза. Следует прекратить прием при появлении болей в сухожилиях или признаков их воспаления. В течение всего лечения необходимо поддерживать нормальный диурез (профилактика нефроуролитиаза).

Произв.: KRKA (Словения)

Нон-Овлон (Non-Ovlon®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит норэтистерона ацетата 1 мг и этинилэстрадиола 50 мкг; в упаковке 21 шт.

Фарм. действ.: Гестаген-эстрогенная контрацепция.

Показ.: Контрацепция, регуляция менструации, функциональное бесплодие и расстройства менструального цикла, дисменорея, гипоплазия матки.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли молочных желез и матки, тяжелые нарушения функции и опухоли печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, тромбоэмболические заболевания (в т.ч. в анамнезе), тромбозы артерий и вен, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, серповидно-клеточная анемия, отосклероз, выраженные нарушения жирового обмена, идиопатическая желтуха или зуд (во время предшествовавшей беременности), герпес беременных, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, депрессия, тошнота, диарея, болезненность молочных желез, при длительном применении - появление на коже коричневых пятен, ухудшение переносимости контактных линз, повышение риска развития тромбоэмболических заболеваний.

Примен. и доз.: Внутрь, для контрацепции - по 1 драже в сутки в течение 21 дня, затем - 7-дневный перерыв; интервал между очередными дозами не должен превышать 36 ч (в среднем поддерживают на уровне 22-26 ч). Лечение функциональных расстройств - доза подбирается индивидуально.

Предост.: С осторожностью применяют у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, варикозным расширением вен, флебитом, отосклерозом, рассеянным склерозом, эпилепсией, заболеваниями печени, эндометриозом, болезнью Сиденхама. Не рекомендуется принимать женщинам, имеющим большие нагрузки на голосовые связки (дикторы и др.). Прием препарата следует

прекратить при наступлении беременности, появлении мигреноподобных головных болей, острых нарушениях зрения, слуха, остром тромбозе, застое желчи или желтухе, повышении артериального давления, продолжительном постельном режиме.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Ноотропил® (Nootropil®)

Пирацетам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пирацетама 800 или 1200 мг; в упаковке 30 или 20 шт. соответственно.

1 капсула - 400 мг; в упаковке 60 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 200 или 333 мг; во флаконах по 125 мл.

1 ампула с 5 или 15 мл раствора для инъекций - 1 или 3 г, в упаковке 12 и 4 шт., соответственно.

1 флакон с 60 мл раствора для инфузий - 12 г.

Фарм. действ.: Ноотропное.

Показ.: Пожилой возраст, болезнь Альцгеймера, деменция (сенильная, вследствие нарушения мозгового кровообращения), постинсультный период, коматозные состояния (как результат сосудистых нарушений, травм, включая травмы головы, интоксикаций) и другие заболевания ЦНС, сопровождающиеся снижением памяти, концентрации внимания, общей активности, расстройствами поведения и т.д.; у детей - при затруднении обучения; купирование абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме; эпилепсия; серповидноклеточная анемия, корковая миоклония.

Противопоказ.: Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 20 мл/мин), беременность, лактация.

Поб. действ.: Нервозность, возбуждение, раздражительность, беспокойство, расстройства сна, слабость, сонливость, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головокружения, головная боль, повышение либидо.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в, для лечения тяжелых состояний - инфузионно. Дозу и курс лечения устанавливают в зависимости от заболевания, возраста и состояния больного. Начинают обычно (в острый период) с дозы - 4,8-12 г в сутки; поддерживающая доза составляет (обычно) 2,4 г в сутки.

Произв.: UCB (Бельгия)

Нопан (Noran®)

Бупренорфин*

Сост. и ф.в.: 1 сублингвальная таблетка содержит бупренорфина гидрохлорида 0,2 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее.

Показ.: Болевые синдромы умеренной и сильной выраженности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, головокружение, сонливость, усиленное потоотделение, галлюцинации (редко).

Взаим.: Усиливает депримирующие эффекты наркотических анальгетиков, фенотиазинов, транквилизаторов, седативных, снотворных, общих анестетиков.

Передоз.: Проявления: тошнота, рвота, сонливость, выраженный миоз. Лечение: промывание желудка, налоксон, стимуляторы дыхания.

Примен. и доз.: По 1-2 таблетки под язык (не разжевывать, не глотать) каждые 6-8 ч.

Предост.: С осторожностью назначают при выраженной легочной и надпочечниковой недостаточности, нарушениях функции печени и почек, гипотиреозе, микседеме, угнетении ЦНС, при черепно-мозговой травме с угнетением дыхания, токсическом психозе, гипертрофии предстательной железы, стриктуре уретры, остром алкоголизме, пожилым и ослабленным больным. Во время лечения не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания (вождение автомобиля, управление станочным оборудованием и т.п.).

Произв.: CTS (Израиль)

Норваск (Norvasc®)

Амлодипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амлодипина бесилата в дозе, эквивалентной 5 или 10 мг амлодипина; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антигипертензивное, блокада кальциевых каналов.

Фармакокин.: После приема внутрь хорошо всасывается и достигает максимального уровня в крови через 6-12 ч. Период полувыведения из плазмы составляет около 35-50 ч. Трансформируется печенью с образованием неактивных метаболитов; 10% неизмененного препарата и 60% его метаболитов выводится с мочой.

Показ.: Артериальная гипертензия; ишемия миокарда (стенокардия стабильная или Принцметала).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к дигидропиридинам.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, головная боль, головокружение, слабость, отеки, гиперемия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 5-10 (максимально) мг один раз в сутки.

Предост.: С осторожностью применять у больных с нарушенной функцией печени (увеличивается период полувыведения).

Произв.: Pfizer (США)

Норгалакс (Norgalax®)

Докузат натрия*

Сост. и ф.в.: Мини-клизма (тюбик с наконечником) с 10 г геля для ректального введения содержит докузата натрия 120 мг, а также натрийкарбоксиметилцеллюлозы 200 мг, глицерина 3 г и воды до 10 г; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Слабительное.

Показ.: Запоры, эндоскопические обследования нижних отделов толстой кишки (подготовка).

Противопоказ.: Геморрой (в стадии обострения), трещины заднего прохода, геморрагический ректоколит.

Примен. и доз.: Ректально (за 5-20 мин до предполагаемой дефекации выдавить содержимое тюбика в анальное отверстие).

Предост.: Не следует использовать длительно.

Произв.: Norgine Pharma (Франция)

Нордитропин® ПенСет® (Norditropin® PenSet®)

Соматропин*

Сост. и ф.в.: Лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора содержит соматропина 12 или 24 МЕ; во флаконах, в комплекте с растворителем, в пенсетах для использования в специальных шприц-ручках Нордиджект 12 и Нордиджект 24.

Фарм. действ.: Соматотропное.

Фармакодин.: Стимулирует рост скелета и увеличение массы тела; активирует транспорт аминокислот в клетки, ускоряет внутриклеточный синтез белка; вызывает задержку в организме азота, минеральных солей (кальция, фосфора, натрия) и жидкости; повышает содержа-

ние сахара в крови за счет ингибирования высвобождения инсулина.

Показ.: Дефицит гормона роста (гипофизарный нанизм, гипофизарная карликовость), синдром Тернера.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к консерванту, входящему в состав препарата), злокачественные новообразования.

Поб. действ.: Возможно угнетение функции щитовидной железы с развитием симптомов гипотиреоза (или их усилением при гипотиреозе); увеличение титра антител к соматотропину, локальные аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Примен. и доз.: При дефиците в организме гормона роста: п/к - 0,07-0,1 МЕ/кг массы тела 1 раз в сутки или в/м - 0,14-0,2 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. При синдроме Тернера: п/к - по 0,1 МЕ/кг массы тела 1 раз в сутки. Предпочтительным методом введения являются п/к инъекции.

Предост.: Для профилактики липоатрофий места инъекций следует чередовать.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Норилет (Norilet)

Норфлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит норфлоксацина 200 или 400 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противомикробное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакодин.: Ингибирует ДНК-гиразу бактерий, препятствуя репликации ДНК.

Показ.: Инфекции мочевыводящих путей (циститы, пиелонефриты, инфекция, осложнившая нейрогенный мочевой пузырь и мочекаменную болезнь), половой системы (простатит, эпидидимит, аднексит, эндометрит), ЖКТ (бактериальные диареи: сальмонеллез, иерсиниоз, дизентерия, брюшной тиф и др.), гонорея, профилактика бактериальных инфекций у больных с гранулоцитопенией и в трансплантологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диспептические явления, головная боль, головокружение, сонливость, эозинофилия, лейкопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. При острых неосложненных инфекциях мочевыводящих путей - по 400 мг 2 раза в сутки в течение 7-10 дней; при хронических рецидивирующих инфекциях моче-

вых путей - по 400 мг 2 раза в сутки, курс - от 4 до 12 нед; при инфекциях половой системы - по 400 мг 2 раза в сутки, курс - от 4 до 6 нед; при острой неосложненной гонорее - 800 мг однократно или по 600 мг 2 раза в течение дня; для лечения бактериальной диареи назначают по 400 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней, для профилактики - по 400 мг однократно не более 3 нед; больным с иммунодефицитом и подавленным иммунитетом - по 400 мг 2 раза в день (курс лечения устанавливается индивидуально).

Предост.: С осторожностью применяют при почечной недостаточности (при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин). В период лечения больные должны получать достаточное количество жидкости.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Норколут (Norkolut)

Норэтистерон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит норэтистерона 5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Прогестагенное.

Показ.: Предменструальный синдром, дисменорея с укорочением секреторной фазы, дисфункциональные маточные кровотечения, кистозная железистая гиперплазия эндометрия, эндометриоз, миома матки, масталгия, предотвращение и прекращение лактации, контрацепция.

Противопоказ.: Злокачественные опухоли молочной железы и половых органов.

Поб. действ.: Диспепсия, тошнота, головная боль, утомляемость, парестезии, масталгия, межменструальные кровотечения, отеки, изменения массы тела.

Взаим.: Препараты, активирующие микросомальные ферменты печени (барбитураты и др.), ускоряют метаболизм и ослабляют эффект, напротив, ингибиторы (циметидин и др.) - усиливают его.

Примен. и доз.: При предменструальном синдроме, масталгии, дисменорее - с 16 по 25-й день менструального цикла по 5-10 мг в день в комбинации с эстрогенами. При дисфункциональных маточных кровотечениях, кистозной железистой гиперплазии эндометрия для прекращения кровотечения - по 5-10 мг в день, в течение 6-12 дней, для предотвращения кровотечения: по 5-10 мг в день с 16 по 25-й день цикла в течение 6 мес. Для прекращения лактации: в первые 3 дня - 20 мг в день, с 4 по 7-й день - по 15 мг в день, с 8 по 10-й день - по

10 мг в день. Контрацепция - 1,25-2,5 мг в день с 5 дня менструального цикла в течение 21 дня (в комбинации с этинилэстрадиолом), затем перерыв 7 дней.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Нормикс (Normix)

Рифаксимин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит рифаксимины 200 мг; в блистерной упаковке 12 шт.

1 (мерный) флакон на 100 мл с гранулами для приготовления суспензии (для приема внутрь) - 2000 мг, 1 мерная ложка (5 мл) - 100 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра.

Показ.: Острые и хронические кишечные инфекции, диарейный синдром, диарея (летняя, путешественников, энтероколит), периоперационная профилактика инфекционных осложнений при операциях на ЖКТ; гипераммониемия (вспомогательное средство).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кишечная непроходимость (включая частичную), язвенные поражения кишечника, беременность, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Рвота, кожные аллергические реакции (крапивница).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 10-15 мг/кг массы тела в день, детям до 12 лет - 20-30 мг/кг в день, курс лечения - не более 7 дней (при отсутствии специальных назначений). При диарее - взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке, детям 6-12 лет - по 1/2-1 таблетке, детям 2-6 лет - по 1 мерной ложке (5 мл) суспензии каждые 6 ч. До и после операции и при гипераммониемии - взрослым и детям старше 12 лет - по 2 таблетки, детям 6-12 - по 1-2 (1-1,5 при гипераммониемии) таблетки, детям 2-6 лет - по 1-2 мерных ложки каждые 12 (при периоперационной профилактике) или 8 ч (при гипераммониемии). Для приготовления суспензии во флакон с гранулами добавляют воду (до отметки), встряхивают и перемешивают, вновь добавляют воду к суспензии до отметки. Перед использованием встряхивают.

Предост.: Пациента следует предупредить, что моча может приобретать красно-розовый цвет (при длительной терапии высокими дозами или при наличии язв слизистой кишечника около 1% введенной дозы всасывается).

Произв.: CSC (Италия)

Норплант (Norplant®)

Левоноргестрел*

Сост. и ф.в.: Имплантируемые подкожно капсулы содержат левоноргестрела по 36 мг каждая; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Прогестагенное, контрацептивное.

Показ.: Контрацепция.

Противопоказ.: Рак молочной железы, гормонозависимые злокачественные опухоли или подозрения на них; маточное кровотечение неизвестной этиологии, тромбоэмболии в анамнезе, активный гепатит.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, нервозность, депрессия, потеря аппетита, тошнота, повышение массы тела, дисменорея, аменорея, акне.

Примен. и доз.: П/к (во внутреннюю область плеча) имплантируют 6 капсул. Длительность эффекта - до 5 лет.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Нукс вомика-Гомаккорд (Nux vomica-Homaccord®)

Сост. и ф.в.: 100 г раствора для приема внутрь содержат Nux vomica D2, D10, D15, D30, D200 и D1000, Bryonia cretica D2, D6, D10, D15, D30, D200 и D1000 по 0,2 мл, Lycopodium clavatum D3, D10, D30, D200 и D1000, Citrullus colocynthis D3, D10, D30 и D200 по 0,3 мл, этанола около 35 об%; во флаконах по 30 и 100 мл.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, противовоспалительное, желчегонное.

Показ.: Спастический колит (в составе комплексной терапии).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, растворив в 100 мл воды 10 капель, 3 раза в день. Раствор выпивают медленно.

Произв.: Heel (Германия)

Нутрамиген (Nutramigen)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 425 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (67 ккал/100 мл) содержит белка (гидролизат) 19 г, таурина 0,04 г, жиров 26 г, L-карнитина 0,014 г, линолевой кислоты 15 г, линоленовой кислоты 380 мг, углеводов 93 г, минеральных веществ (зола) 4,1 г, витамина А 1700 МЕ, витамина D 360 МЕ, витамина Е 30 мг, витамина С 55 мг,

фолиевой кислоты 110 мкг, тиамина 530 мкг, рибофлавина 630 мкг, ниацина 8500 мкг, витамина В₆ 420 мкг, витамина В₁₂ 3 мкг, биотина 53 мкг, пантотеновой кислоты 3200 мкг, витамина К 110 мкг, холина 100 мг, инозитола 34 мг, кальция 630 мг, фосфора 420 мг, йода 47 мкг, железа 12 мг, магния 75 мг, цинка 4,5 мг, меди 740 мкг, марганца 440 мкг, натрия 320 мг, калия 740 мг, хлоридов 600 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма гипоаллергенными питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Фармакодин.: Лечебная смесь для энтерального питания включает ингредиенты высокой степени очистки, сбалансированная по аминокислотному составу, обеспечивает адекватный рост и развитие ребенка с рождения до 1 года и старше, в т.ч. при использовании в качестве единственного продукта питания. Состоит из расщепленного, легко усваиваемого белка - казеина (подвергнут глубокому ферментативному гидролизу с последующей обработкой активированным углем), цистеина, тирозина, триптофана, таурина, L-карнитина, жиров (представлены кукурузным и соевым маслом, что обеспечивает сходный с грудным молоком профиль незаменимых ненасыщенных жирных кислот), углеводов - кукурузный сироп (источник полимеров глюкозы) и модифицированный кукурузный крахмал, не содержит среднецепочечных триглицеридов, лактозы и сахарозы, имеет низкую осмоляльность (320 мОсм/кг воды), хорошо переносится.

Показ.: У детей, начиная с первых дней жизни, при множественной пищевой аллергии, аллергии к белкам коровьего молока (в т.ч. для профилактики), сое, злаковым культурам и др., при непереносимости коровьего молока, длительной диарее различной этиологии, лактазной недостаточности, целиакии (острый период), галактоземии, синдроме короткой кишки, резекции кишечника, в качестве элиминационной диеты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Сухое вещество растворяют в различных объемах воды, в зависимости от требуемой концентрации смеси. Для приготовления 1 л смеси стандартного разведения (67 ккал/1000 мл) необходимо 147 г сухого вещества (30 мерных-ложек без верха) добавить к 890 мл кипяченой воды. Кормление на-

чинают разбавленной вдвое (34 ккал/100 мл) смесью в дозе 5-10 мл в сутки. Затем постепенно (в течение 3-5 дней) повышают концентрацию смеси до стандартного разведения, а объем ее увеличивают до значений, соответствующих возрастным особенностям ребенка. Допустимо кормление детей более старшего возраста, взрослых (в т.ч. через зонд) и более концентрированными смесями (0,83-0,92 ккал/мл). Можно использовать вместо смеси на основе сои для детей, состояние которых не улучшается при попытке перевода на соевую смесь. Продолжительность применения определяется врачом и составляет в среднем 2-3 мес.

Предост.: Используют только по указанию и под наблюдением врача. При приготовлении слишком жидкой или слишком концентрированной смеси ребенок не будет получать адекватное питание. Можно приготовить смесь для нескольких кормлений (но не более, чем на сутки, при условии хранения в холодильнике). Необходимо проинформировать родителей, что продукт имеет сероватый цвет, специфический запах, слегка горьковатый вкус. Если ребенок отказывается от смеси при первом кормлении, попытку повторяют снова через несколько часов или на следующий день.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Обзидан (Obsidan®)

Пропранолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пропранолола гидрохлорида 40 мг; в упаковке 60 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 5 мг.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, бета-адреноблокирующее.

Показ.: Стенокардия напряжения, прогрессирующая стенокардия, безболевого ишемия миокарда, артериальная гипертония, аритмии, гипертрофическая кардиомиопатия, нейроциркуляторная дистония, дигиталисная интоксикация, тиреотоксикоз, мигрень, эссенциальный семейный тремор.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, АВ-блокада II-III степени, выраженная брадикардия, гипотония, obstructивные заболевания дыхательных путей; относительные противопоказания - сахарный диабет в стадии суб- и декомпенсации, псориаз в стадии обострения.

Поб. действ.: Слабость, головокружение, головная боль, парестезии, похолодание конечностей, диспептические расстройства, конъюнктивит, кожные высыпания, зуд.

Взаим.: Усиливает нарушения сократимости и проводимости, вызываемые антагонистами кальция и сердечными гликозидами (совместное назначение не рекомендуется), гипотензию - антигипертензивных средств и циметидина. Увеличивает вероятность развития недостаточности кровообращения при терапии дигопиридом, гипогликемии - при применении инсулина и сахароснижающих препаратов. Повышает эффект лидокаина. Барбитураты и никотин снижают действие.

Примен. и доз.: При гипертензии - по 40 мг 2 раза в день. Дозу можно увеличивать в течение 2-4 нед до 80-160 мг 2 раза в день. При стенокардии, мигрени, эссенциальном треморе - по 20 мг 2-3 раза в день. Дозу можно увеличить в течение 1 нед до 40 мг 4 раза в день или до 80 мг 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 240 мг при мигрени и 480 мг при стенокардии. При аритмии, гипертрофической кардиомиопатии, тиреотоксикозе - по 10-40 мг 3-4 раза в день (до 240 мг/сутки).

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Облепиховое масло (Oleum Hippophaes)

Сост. и ф.в.: Содержит смесь каротина и каротиноидов не менее 180 мг%, сумму токоферолов, стеринов, фосфолипиды, витамин К, а также глицериды олеиновой, линолевой, пальмитолеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Масло во флаконах из оранжевого стекла по 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция репаративных процессов при поражениях кожи и слизистых оболочек.

Показ.: Лучевые поражения и ожоги кожи и слизистых оболочек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологические заболевания.

Противопоказ.: Воспалительные процессы в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, желчно-каменная болезнь.

Поб. действ.: Горечь во рту (при приеме внутрь), ощущение жжения (при наружном применении у обожженных).

Примен. и доз.: Наружно, в виде масляных повязок через день. В гинекологии - смазывание или тампоны, обильно пропитанные. Курс лечения - 8-15 про-

цедур. Внутрь, по 1 чайной ложке 2-3 раза в день (в гастроэнтерологии).

Произв.: Алтайвитамины (Россия)

Ойкамид (Oikamid)

Пирацетам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пирацетама 400 мг; в упаковке 60 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 1000 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное.

Показ.: Острые нарушения мозгового кровообращения, хроническая цереброваскулярная недостаточность, психотические нарушения (включая экзогенный психоз), нарушение памяти, снижение концентрации внимания, изменения настроения, расстройства поведения (болезнь Альцгеймера, сенильная деменция, хронический алкоголизм, травмы головного мозга, миоклония, дислексия и умственная отсталость у детей), купирование абстинентных пре- и делириозных состояний при алкоголизме и наркоманиях, отравление морфином и барбитуратами.

Противопоказ.: Психомоторное возбуждение, беременность (I триместр).

Примен. и доз.: Капсулы: внутрь, взрослым - по 2 капсулы 3 раза в день (суточная доза - 2,4-4,8 г), при необходимости дозу увеличивают до 3 капсул 3 раза в день с последующим снижением до поддерживающей дозы - 1 капсула. Детям - в суточной дозе 40 мг/кг массы тела; в среднем - по 400 мг 3 раза в день, но не более 3 г в день. Раствор для инъекций: в/в (струйно или капельно) и в/м, взрослым - в суточной дозе 3-12 г в день; при дислексии и миоклонии - по 1 г 3 раза в день.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Оксациллин натриевая соль (Oxacillinum-natrium)

Оксациллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит оксациллина натрия 250 или 500 мг; в комплекте с растворителем в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Антимикробное, бактерицидное.

Показ.: Септицемия, пневмония, эмпиема, абсцессы, флегмоны, холецистит, пиелит, цистит, остеомиелит, послеоперационные раневые инфекции, инфицированные ожоги и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции (покраснение кожи, крапивница, зуд).

Примен. и доз.: В/м. Новорожденным и недоношенным детям вводят в сутки 0,02-0,04 г/кг массы тела, детям в возрасте до 3 мес - 0,06-0,08 г/кг, от 3 мес до 2 лет - 1 г, от 2 до 6 лет - 2 г, старше 6 лет и взрослым - 2-4 г в 4 приема.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Оксипрогестерона капронат (Oxuprogesteroni caproas)

Гидроксипрогестерон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций в персиковом масле содержит гидроксипрогестерона капроната 125 (12,5%) мг, в оливковом - 125 (12,5%); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Прогестагенное.

Показ.: Привычный и угрожающий выкидыш в первой половине беременности, аменорея и полименорея, рак матки, рак молочной железы.

Противопоказ.: Вторая половина беременности.

Поб. действ.: Тахикардия.

Примен. и доз.: В/м, 65-125 мг 1 раз в неделю в течение 3-6 нед.

Произв.: ФармаДон (Россия)

Окситоцин (Oxytocin)

Окситоцин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит 5 МЕ синтетического окситоцина; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Утеротонизирующее, стимуляция родовой деятельности.

Показ.: Индукция родов, стимуляция родовой деятельности, кесарево сечение (во время производства операции), атония матки и атонические маточные кровотечения, неполный или септический аборт.

Противопоказ.: Угрожающий разрыв матки, поперечное и косое положение плода, несоответствие величины головки плода размерам таза, узкий таз.

Поб. действ.: Гипертонус матки, внутриутробная гипоксия плода, тахикардия, кратковременная артериальная гипотензия, бронхоспазм.

Взаим.: Усиливает эффект симпатомиметиков (назначать с осторожностью).

Примен. и доз.: В/м, реже в/в медленно по 1-3 МЕ. При кесаревом сечении вводят в мускулатуру матки 5 МЕ. При атонической метроррагии в/м или п/к - по 5-10 МЕ.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Оксициклозоль (Oxycyclosolum)

Сост. и ф.в.: 1 баллон (70 г) содержит окситетрациклина гидрохлорида 0,3 г, преднизона 0,1 г, пентола 3 г и пропеллента до 70 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Ожоги, инфицированные раны (размером не более 15-20 кв.см).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, микозы кожи.

Примен. и доз.: Накожно, распыляют с расстояния 20-30 см в течение 1-3 с ежедневно или 2-3 раза в неделю. Перед употреблением баллон встряхивают; не допускать попадания в глаза.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Оксорален ультра (Oxsoralen ultra)

Метоксален

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит метоксалена 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антипсориазное, фотосенсибилизирующее, уменьшение гиперпролиферации клеток кожи.

Клин. фарм.: Максимальный терапевтический эффект развивается при УФ-излучении 320-400 нм.

Показ.: Псориаз (для повышения чувствительности к фотохимиотерапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к терапии УФ-излучением, тяжелые нарушения функций печени и почек, гематопорфирия, злокачественная меланома, чешуйчатая карцинома кожи.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Головокружение, тошнота, рвота, эритема, зуд, ожоги (при излишней экспозиции УФ-излучения).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды или запивая молоком, за 1,5-2 ч до воздействия УФ-лучей: при массе тела ниже 30 кг - 10 мг, 30-50 кг - 20 мг, 51-65 кг - 30 мг, 66-80 кг - 40 мг, 81-90 кг - 50 мг, 91-115 кг - 60 мг, свыше 115 кг - 70 мг, 1 раз в день или через день в течение 4-6 нед.

Предост.: С осторожностью назначают детям до 12 лет. В начале терапии экс-

позицию воздействия УФ-излучения следует ограничить пятью минутами, постепенно увеличивая до 30 мин. Не рекомендуется применять с препаратами, вызывающими светочувствительные реакции.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Олазоль (Olasolum)

Сост. и ф.в.: 1 аэрозольный баллон (60 г) содержит масла облепихового 5,4 г, левомицетина 1,62 г, анестезина 1,62 г, кислоты борной 0,27 г, триэтаноламина 1,62 г, ланолина безводного 0,27 г, кислоты стеариновой 2,16 г, глицерина дистиллированного 5,4 г, воды очищенной 35,64 г, хладона-12 6 г.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее, антибактериальное, регенерирующее, уменьшение экссудации, ускорение эпителизации ран.

Показ.: Инфицированные раны, ожоги, трофические язвы, микробные экземы, зудящие дерматиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Местно, наносить на раневую поверхность равномерным слоем 1-4 раза в сутки ежедневно или через день (в зависимости от тяжести заболевания).

Произв.: Алтайвитамины (Россия)

Олиговит (Oligovit)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит ретинола (витамина А) 5000 МЕ, холекальциферола (витамина D₃) 500 МЕ, тиамин хлорида (витамина В₁) 5 мг, рибофлавина (витамина В₂) 5 мг, никотинамида 50 мг, аскорбиновой кислоты (витамина С) 100 мг, кальция пантотената 10 мг, пиридоксина хлорида (витамина В₆) 2,5 мг, цианокобаламина (витамина В₁₂) 2,5 мкг, токоферола ацетата (витамина Е) 12,5 мг, вторичного кальция фосфата 200 мг, фтора (в форме натрия фторида) 0,5 мг, железа (в форме сульфата железа) 10 мг, меди (в форме сульфата меди) 0,5 мг, марганца (в форме сульфата марганца) 0,5 мг, магния (в форме окиси магния) 3 мг, кобальта (в форме сульфата кобальта) 0,05 мг, молибдена (в форме молибдена натрия) 0,1 мг, калия (в форме сульфата калия) 2,5 мг и цинка (в форме сульфата цинка) 0,75 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов, макро- и микроэлементов.

Показ.: Профилактика и лечение гиповитаминозов, период реконвалесценции, отставание в росте; состояния, сопро-

вождающиеся повышенной потребностью в витаминах и минералах, беременность, лактация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз А и D.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям - по 1-2 драже в день в течение неограниченного времени.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Олигогал-Se (Oligogal-Se)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит органически связанного селена в пивных дрожжах 0,1 мг, витамина А 1500 МЕ, витамина С 90 мг и витамина Е 45 МЕ; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов А, С, Е и селена, антиоксидантное, иммуностимулирующее, антитоксическое.

Показ.: Сниженный иммунитет и общая сопротивляемость организма, защита от токсического воздействия тяжелых металлов, "компьютерного заболевания", УФ- и радиоактивного излучения, воспалительные процессы, нарушения зрения и дыхания, заболевание печени.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле в день; при необходимости - по 2 капсулы в день; рекомендуется применять длительно.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Олинт (Olynth)

Ксилометазолин*

Сост. и ф.в.: Капли в нос - раствор ксилометазолина гидрохлорида 0,05% и 0,1%; во флаконах (с пипеткой) по 10 мл.

Спрей дозированный - раствор 0,05% и 0,1%; в пульверизаторах по 10 мл.

Спрей (недозированный) - раствор 0,1%; в пульверизаторах по 10 мл.

Фарм. действ.: Антikonгестивное, сосудосуживающее, альфа-адреномиметическое.

Показ.: Ринит (острый, сенной, вазомоторный), диагностические процедуры в носовых ходах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сухость слизистой оболочки носа, закрытоугольная глаукома.

Поб. действ.: Симптомы раздражения слизистой оболочки носа: жжение, покалывание, сухость в носу, чихание, отек слизистой оболочки носа.

Примен. и доз.: Интраназально, в каждый носовой ход, 1 или несколько раз в день. Взрослым и детям старше 6 лет - впрыскивают или закапывают по 2-3 капли 0,1% раствора; детям до 6 лет, грудным - впрыскивают или закапывают по 1-2 капли 0,05% раствора.

Предост.: При хронических воспалениях слизистой оболочки носа длительное применение противопоказано.

Произв.: Parke-Davis/Gödecke (Германия)

Омез (Omez)

Омепразол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит омепразола 20 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение секреции соляной кислоты, блокада протонного насоса ($H^{+}K^{+}$ -АТФазы).

Клин. фарм.: Эффект наступает в течение первого часа, достигает максимума через 2 ч. Ингибирование 50% максимальной секреции длится 24 ч. После отмены секреторная активность восстанавливается через 3-5 дней.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, стрессовые язвы ЖКТ, синдром Золлингера-Эллисона, системный мастоцитоз и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, слабость, сыпь.

Взаим.: Замедляет элиминацию варфарина, диазепама, фенитоина.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле в день в течение 4-8 нед. Синдром Золлингера-Эллисона - 3 и более капсул в день.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Омезол (Omezol®)

Омепразол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит омепразола 20 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение секреции желудочного сока, ингибция протонного насоса в париетальных клетках слизистой желудка (подавление конечной стадии образования соляной кислоты, снижение как базальной, так и стимулированной секреции).

Клин. фарм.: После однократного приема угнетение желудочной секреции наступает быстро и сохраняется в течение

24 ч. Через 3-4 дня после окончания терапии кислородная продукция возвращается к исходному уровню.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Головная боль, диспепсия, кожная сыпь.

Взаим.: Замедляет элиминацию варфарина, диазепама, фенитоина и др. лекарственных средств, метаболизирующихся в печени путем микросомального окисления.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле однократно перед завтраком, проглатывать целиком, запивая небольшим количеством жидкости. При язве двенадцатиперстной кишки - курс лечения 2 нед, при необходимости (если язва не зарубцевалась) - 4 нед. При язве желудка и рефлюкс-эзофагите - курс 4-8 нед. При синдроме Золлингера-Эллисона - по 60 мг однократно. При резистентности к другим противоязвенным препаратам назначают по 40 мг в день в течение 4 нед - при язве двенадцатиперстной кишки, в течение 8 нед - при язве желудка и рефлюкс-эзофагите.

Предост.: Перед началом терапии следует исключить наличие злокачественного процесса. При печеночной и почечной недостаточности, а также лицам пожилого возраста дозу корректируют индивидуально. Случаи передозировки не известны. Однократный прием 160 мг не сопровождается токсическими явлениями.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Омник® (Omnice®)

Тамсулозин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит тамсулозина гидрохлорида 0,4 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Селективная блокада альфа₁-А-адренорецепторов (в гладкой мускулатуре предстательной железы, шейке мочевого пузыря, простатической части уретры).

Фармакокин.: Полностью абсорбируется в ЖКТ, биодоступность - около 100%. После однократного приема 400 мкг C_{max} определяется через 6 ч. Через 5 дней приема (в состоянии равновесной концентрации) C_{max} на 60-70% выше, чем после однократного приема. На 99% связывается с белками плазмы. Объем рас-

пределения - 0,2 л/кг. Большая часть находится в крови в неизмененном виде. T_{1/2} после однократного приема - 10 ч. Медленно метаболизируется в печени с образованием активных метаболитов, сохраняющих высокую селективность к альфа₁-А-адренорецепторам. Выводится почками, 9% выделяется в неизмененном виде.

Фармакодин.: Терапевтический эффект развивается через 2 нед после начала лечения.

Клин. фарм.: Снижает тонус гладкой мускулатуры предстательной железы, шейки мочевого пузыря, простатической части уретры, улучшает отток мочи, уменьшает симптомы обструкции и раздражения при гипертрофии предстательной железы, не вызывает снижения системного АД (практически не связывается альфа₁-адренорецепторами гладких мышц сосудов).

Показ.: Доброкачественная гипертрофия предстательной железы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Редко - головокружение, головная боль, ортостатическая гипотония, сердцебиение, астения, ретроградная эякуляция.

Взаим.: Усиливает гипотензивный эффект альфа₁-адреноблокаторов. Циметидин повышает, а фуросемид понижает концентрацию в плазме крови. Диклофенак и варфарин увеличивают скорость выведения.

Примен. и доз.: Внутрь, после завтрака, запивая достаточным количеством воды, по 1 капсуле в день (капсулу не разжевывают).

Предост.: С осторожностью применяют при предрасположенности к ортостатической гипотензии, выраженных нарушениях функции печени. При появлении признаков ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) больного рекомендуется усадить или уложить.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Омнопон (Omnoponum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит морфина гидрохлорида 6,7 или 13,4 мг, кодеина 0,72 или 1,44 мг, наркотина 2,7 или 5,4 мг, папаверина гидрохлорида 0,36 или 0,72 мг и тебаина 0,05 или 0,1 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, снотворное, противокашлевое, возбуждение опиатных рецепторов.

Показ.: Выраженный болевой синдром при травмах, злокачественных новообразованиях, инфаркте миокарда и др., подготовка к операции и послеоперационный период; бессонница, связанная с сильными болями; кашель, выраженная одышка при острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Противопоказ.: Общее сильное истощение, дыхательная недостаточность, детский возраст до 2 лет.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, угнетение дыхания, выраженная эйфория, лекарственная зависимость.

Примен. и доз.: П/к, по 1 мл. Высшие дозы для взрослых: разовая - 0,02 г (в расчете на морфин), суточная - 0,05 г (в расчете на морфин).

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Оптикром (Opticrom)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: Раствор офтальмологический, содержащий 2% кромогликата натрия; по 13,5 мл во флаконах с пипеткой (1 мл раствора содержит кромогликата натрия 20 мг).

Фарм. действ.: Противоаллергическое, противовоспалительное, ингибирование дегрануляции тучных клеток, возникающей при контакте со специфическими антигенами, уменьшение высвобождения гистамина и других медиаторов воспаления.

Фармакокин.: Практически не всасывается из места введения, в том числе полости носа, ЖКТ.

Клин. фарм.: Оптикром не замедляет время реакции и может применяться у пациентов при широком круге профессий, требующих повышенного внимания.

Показ.: Профилактика и лечение аллергических конъюнктивитов, включая сезонные и круглогодичные формы, весенний кератоконъюнктивит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Применяют с осторожностью.

Поб. действ.: Преходящее ощущение жжения и покалывания в глазах.

Передоз.: Никаких специальных мероприятий, кроме медицинского наблюдения, не требуется.

Примен. и доз.: Взрослым (включая лиц пожилого возраста) и детям - по 1-2 капли в каждый глаз 4 раза в сутки.

Предост.: В связи с содержанием в препарате бензалкония хлорида не рекомендуется носить мягкие контактные линзы на протяжении всего периода лечения.

Произв.: Rhône-Poulenc Roger (Франция-США)

Орвагил (Orvagil)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метронидазола 250 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка вагинальная - 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антипротозойное, антибактериальное, дисульфирамподобное.

Фармакокин.: После перорального приема хорошо всасывается, пик в плазме через 2-3 ч (задерживается 12 ч), и выделяется из организма в неизмененном виде и в форме метаболитов, выделяется также со слюной, материнским молоком, семенной жидкостью, вагинальным секретом.

Фармакодин.: Активен в отношении *Trichomonas vaginalis*, *Lamblia intestinalis*, *Entamoeba histolytica* и анаэробной инфекции. Вызывает отвращение к спирту.

Показ.: Трихомонадный вагинит и уретрит, лямблиоз, амебиаз, хронический алкоголизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания ЦНС, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, дизурия, крапивница, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, при лямблиозе и амебиазе взрослым и детям старше 10 лет - по 1 таблетке 2 раза в день, дети от 2 до 5 лет - по 1 таблетке в день, дети от 5 до 10 лет - по 1,5 таблетки в день; хронический алкоголизм - по 1 таблетке 2 раза в день в течение 2 нед, терапию можно повторить через 4-6 нед. Интравагинально, трихомонадный вагинит: по 1 таблетке 2 раза в день в течение 10-20 дней.

Предост.: Во время лечения не рекомендуется употреблять спиртные напитки. Лактирующие женщины должны приостановить грудное вскармливание. Длительная терапия проводится под контролем картины крови. Во время терапии трихомонадного вагинита рекомендуется воздержание от половой жизни.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Орелокс (Orelox®)

Цефподоксим*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит цефподоксима 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, острый синусит, острый бронхит, пневмония, обострение хронической пневмонии - особенно у лиц, злоупотребляющих алкоголем, курильщиков и у лиц старше 65 лет).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, период лактации, возраст до 12 лет.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боли в животе, диарея, головная боль, тромбоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения, эозинофилия, транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз, щелочной фосфатазы, мочевины и креатинина в крови, кожные высыпания, зуд и другие аллергические реакции.

Примен. и доз.: Дозирование индивидуальное. Внутрь, во время еды 2 раза в сутки (через каждые 12 ч), суточная доза для взрослых и подростков в среднем - 200-400 мг; пациентам с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина ниже 40 мл/мин) разовую дозу уменьшают вдвое.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Ориметен® (Orimeten®)

Аминоглутетимид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аминоглутетимида 250 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антибластомное, ингибирование ароматазы и биосинтеза стероидов.

Показ.: Прогрессирующая карцинома молочной железы у женщин в постменопаузном периоде, метастазирующая карцинома предстательной железы (в качестве палиативного лечения), синдром Кушинга.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Сонливость, летаргия, сыпь (иногда вместе с лихорадкой), агранулоцитоз, лейкопения, недостаточность функции надпочечников, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, гепатит, желтуха, нарушения функции почек, панцитопения, анемия,

аллергические/анафилактические реакции, аллергический альвеолит, гипотиреоз.

Взаим.: Усиливает метаболизм синтетических глюкокортикостероидов, оральных антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), дигоксина, теofilлина, медроксипрогестерона и оральных антидиабетических средств.

Примен. и доз.: При опухолях молочной и предстательной железы - 500-1000 мг в день совместно с гидрокортизоном (30 мг в день) или кортизоном ацетатом (37,5 мг в день), в качестве заместительной терапии. При синдроме Кушинга - 750-1750 мг в сутки.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Ормидол (Ormidol®)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит атенолола 100 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, блокада бета₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия, аритмии (суправентрикулярная, желудочковая тахикардия), профилактика повторного инфаркта миокарда, гипертрофическая кардиомиопатия, феохромоцитомы (вспомогательное средство), мигрень (профилактика), тремор, тиреотоксикоз (вспомогательное средство), синдром пролапса митрального клапана.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сердечная недостаточность (рефрактерная к сердечным гликозидам), кардиогенный шок, АВ-блокада II или III степени, синусовая брадикардия (ЧСС менее 45 ударов в минуту), гипотензия (систолическое давление ниже 100 мм рт.ст.).

Поб. действ.: Слабость, головная боль, нарушение сна, сонливость, депрессия, летаргия, брадикардия, снижение минутного объема сердца, сердечная недостаточность, угнетение АВ-проводимости, васкулит, постуральная гипотензия, боли в ногах, обострение синдрома Рейно, тошнота, понос, затрудненное дыхание, снижение толерантности к глюкозе, агранулоцитоз, пурпура, сыпь.

Взаим.: Блокаторы медленных кальциевых каналов могут усилить гипотензивный и отрицательный хроно- и дромотропный эффекты. При одновременном применении с симпатомиметиками, ксантинами (особенно аминофиллином и тео-

филлином) возможно взаимное ослабление действия.

Примен. и доз.: Внутрь, при гипертензии - в начальной дозе 50 мг 1 раз в сутки, через 2 нед дозу увеличивают (при необходимости) до 100 мг; при стенокардии начальная доза - 50 мг 1 раз в сутки, через 1 нед дозу можно повысить до 100 мг в сутки; после инфаркта миокарда - по 100 мг 1 раз в сутки; при остальных показаниях - начальная доза также 50 мг 1 раз в сутки, затем - до 200 мг в сутки. При нарушении функции почек доза в зависимости от клиренса креатинина 15-35 мл/мин - 50 мг в сутки, ниже 15 мл/мин - 50 мг каждый второй день.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Орницетил (Ornicetil®)

Орнитин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит орнитина альфа-кетоглутарата 2 или 5 г.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное, гипоазотемическое, гепатопротекторное, снижение уровня аммиака в плазме крови.

Показ.: Гипераммонемия, гепатоэнцефалит, хроническая алкогольная интоксикация, гепатиты, цирроз печени, тяжелая печеночная недостаточность, печеночная колика, кома, острый гепатит, порто-кавальные энцефалопатии.

Противопоказ.: Выраженная почечная недостаточность (уровень креатинина более 3 мг/100 мл).

Поб. действ.: В отдельных случаях тошнота, рвота.

Взаим.: Несовместим с пенициллином, витамином К, рифампицином, мепробаматом, диазепамом, фенobarбиталом, этионамидом.

Примен. и доз.: 2 г для в/в, в/м. Во флакон добавляют 10 мл дважды дистиллированной воды, встряхивают до получения прозрачного раствора. Назначают по 2-6 г в сутки в/м или по 2-4 г в сутки в/в (лучше утром и вечером). Курс лечения - 10-20 дней, через 1-2 мес повторить. 5 г для в/в инфузии или перфузии. Во флакон добавляют 10-20 мл дистиллированной воды, взбалтывают, а затем вводят в раствор для инфузии (физиологический раствор, кровезаменители, глюкоза и др.). Назначают по 5-10 флаконов в сутки для инфузионной терапии, которая должна продолжаться не менее 2 ч. Скорость капельного введения не более 40 капель в минуту.

Объем жидкости должен быть не менее 50 мл.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Ортанол® (Ortanol®)

Омепразол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит омепразола 20 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение кислотопродукции, блокада "протонного" насоса.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Малигнизация язвы, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, диарея, запоры, метеоризм, кожная сыпь.

Взаим.: Увеличивает период выведения из организма варфарина, диазепама, фенитонина.

Примен. и доз.: Внутрь, перед завтраком, 20-60 мг (капсулы не следует разжевывать) в течение 4-8 нед.

Предост.: Перед началом терапии необходимо исключить возможность злокачественного процесса (особенно при язве желудка).

Произв.: Lek (Словения)

ОртоВиталь Ф (OrthoVital® F)

ОртоВиталь М (OrthoVital® M)

Общее описание

Сост. и ф.в.: Сбалансированное диетическое средство для дополнительного питания в виде набора из мультивитаминной капсулы, содержащей 13 жизненно важных витаминов, одной таблетки с микроэлементами, одной капсулы с антиоксидантами (витамин Е, бета-каротин, дрожжи с селеном), одной таблетки витамина С, одной капсулы с эссенциальными жирными кислотами и одной таблетки магния и кальция. 1 дневная доза (упаковка) содержит витамина А 2500 МЕ (ретинола 0,75 мг), витамина С 530 мг, витамина Е 150 мг, витамина В₁ 25 мг, витамина В₂ 25 мг, витамина В₆ 25 мг, никотиамида 60 мг, витамина В₁₂ 6 мкг, витамина К 60 мкг, витамина D₃ 5 мкг, фолиевой кислоты 0,4 мг, пантотеновой кислоты 18 мг, биотина 225 мкг, бета-каротина 15 мг, селена (из

дрожжей) 50 мкг, магния 90 мг, железа 8 мг, цинка 10 мг, марганца 2 мг, меди 0,5 мг, хрома 30 мкг, молибдена 60 мкг, йода 150 мкг и концентрата рыбьего жира 0,5 г (в т.ч. омега-3 жирных кислот 0,17 г). 1 дневная доза ОртоВиталь Ф дополнительно содержит кальция 160 мг. В упаковке 15 или 30 наборов.

Фарм. действ.: Нормализация баланса витаминов и микроэлементов в организме.

Фармакодин.: ОртоВиталь Ф и ОртоВиталь М обеспечивают дневную потребность в витаминах и минеральных веществах. Содержат повышенное количество витаминов С и Е, а также бета-каротин и селен: эти антиоксиданты защищают клетки от воздействия свободных радикалов. Селен, кроме того, входит в состав фермента глутатионпероксидазы. Магний присутствует в количестве, достаточном для покрытия около 50% суточной потребности. Цинк и железо обеспечивают полную потребность. Омега-3 жирные кислоты (200 мг, что соответствует 0,5 г рыбьего жира или 30 г морской рыбы) естественным образом влияют на жировой обмен и процессы свертывания крови; регулярное поступление в организм этих жизненно важных веществ имеет большое значение для нормальной работы системы кровообращения. ОртоВиталь Ф, кроме того, содержит около 160 мг кальция (25% ежедневной потребности), влияющего на обмен веществ в костях.

Показ.: Повышенная чувствительность к стрессовым ситуациям, снижение работоспособности, профилактика атеросклероза.

Противопоказ.: Гипервитаминоз.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 дозу ежедневно. Рекомендуется разделить отдельные капсулы и таблетки одной упаковки на отдельные приемы во время или после еды и регулярно принимать, как минимум, через день. Таблетку витамина С можно глотать или сосать. Эффект препарата проявляется при длительном приеме.

Предост.: Принимать следует не более одного набора в день. Повышенное поступление витамина В₂ может привести к изменению цвета мочи.

Произв.: Orthomol (Германия)

ОртоИммун (OrthoImmun®)

ОртоИммун Г (OrthoImmun® G)

Общее описание

Сост. и ф.в.: Сбалансированное диетическое средство для дополнительного питания в виде набора из мультивитаминной капсулы, таблетки с микроэлементами, капсулы с антиоксидантами и двух таблеток витамина С (ОртоИммун) или в виде гранулята (ОртоИммун Г). 1 дневная доза (таблетки и капсулы-ОртоИммун или гранулят-ОртоИммун Г) содержит витамина А 2500 МЕ (ретинола 0,75 мг), витамина С 950 мг, витамина Е 150 мг, витамина В₁ 25 мг, витамина В₂ 25 мг, витамина В₆ 25 мг, никотинамида 60 мг, витамина В₁₂ 6 мкг, витамина К 60 мкг, витамина D₃ 5 мкг, фолиевой кислоты 0,4 мг, пантотеновой кислоты 18 мг, биотина 225 мкг, бета-каротина 15 мг, селена (из дрожжей) 50 мкг, железа 8 мг, цинка 10 мг, марганца 2 мг, меди 0,5 мг, хрома 30 мкг, молибдена 60 мкг, йода 150 мкг. В упаковке 15 или 30 наборов.

Фарм. действ.: Повышение сопротивляемости организма, нормализация баланса витаминов и микроэлементов.

Фармакодин.: Содержит все 13 жизненно важных витаминов; в повышенном количестве присутствуют витамины С и Е, которые совместно с бета-каротином и ретиноидами являются активными антиоксидантами, подавляющими образование в клетках высоко реакционно-способных свободных радикалов. В состав входит необходимая суточная доза эссенциальных микроэлементов (в частности, железо и цинк, а также селен, защищающий клетку от деструкции кислородными радикалами).

Показ.: Сниженная сопротивляемость организма, в частности, при пищевой недостаточности, во время и после лучевой и химиотерапии, иммунодефицит, профилактика раковых заболеваний.

Противопоказ.: Гипервитаминоз.

Поб. действ.: Иногда - учащение дефекации (при нежелательности этого - разделить прием витамина С).

Примен. и доз.: 1 упаковку препарата (дневная доза) принимают внутрь во время или после еды (отдельные капсулы - в любом порядке во время еды). Дневная потребность обеспечивается одной специальной дозой в виде мультивитаминной капсулы (ОртоИммун) или

гранулята (ОртоИммун-Г). Для полного удовлетворения потребности организма в необходимых веществах следует принимать длительно.

Предост.: Ежедневно рекомендуется принимать только одну упаковку. Может изменяться цвет мочи (В₂).

Произв.: Orthomol (Германия)

ОртоИммун Г Юниор (OrthoImmun® G Junior)

Сост. и ф.в.: 1 дневная доза препарата (=10 г) содержит витамина А 0,3 мг (1000 МЕ, эквивалент в виде ретинола), витамина С 200 мг, витамина Е 36 мг, витамина В₁ 1,2 мг, витамина В₂ 2,1 мг, витамина В₆ 1,8 мг, никотинамида 18 мг, витамина В₁₂ 5 мкг, витамина К 50 мкг, витамина D₃ 5 мкг (200 МЕ), фолиевой кислоты 200 мкг, пантотеновой кислоты 12 мг, биотина 150 мкг, бета-каротина 5 мг, кальция 250 мг, магния 75 мг, селена 20 мкг, железа 6 мг, цинка 6 мг, марганца 1,5 мг, меди 1 мг, хрома 20 мкг, молибдена 40 мкг, йода 100 мкг, углеводов 6,3 г (энергетическая ценность) 28 ккал. В упаковке 15 или 30 пакетиков.

Фарм. действ.: Нормализация баланса витаминов и микроэлементов у детей в возрасте до 12 лет, повышение сопротивляемости организма к инфекции.

Фармакодин.: Содержит все жизненно важные витамины, наиболее существенные микроэлементы, антиоксиданты (витамины А, С и Е, бета-каротин и селен), а также минеральные вещества (кальций и магний). Особенно в большом количестве представлены витамины С и Е (для устранения вредного воздействия на клетку свободных радикалов). Селен является составной частью фермента - глутатионпероксидазы. Количество магния покрывает примерно 75%, кальция - 50%, йода, цинка и железа - 100% суточной потребности организма.

Показ.: Сниженная сопротивляемость организма детей (профилактика простудных и инфекционных заболеваний).

Противопоказ.: Гипервитаминоз.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь. Однодневную дозу препарата (10 г) разводят в 100 мл воды и принимают во время еды, вне зависимости от времени суток.

Произв.: Orthomol (Германия)

ОртоКор Плюс (OrthoCor® Plus)

Сост. и ф.в.: 1 дневная доза препарата содержит витамина А 2500 МЕ (ретино-

ла 0,75 мг), витамина С 220 мг, витамина Е 50 МЕ, витамина В₁ 4 мг, витамина В₂ 5 мг, витамина В₆ 5 мг, никотинамида 50 мг, витамина В₁₂ 9 мкг, витамина К₁ 60 мкг, витамина D₃ 5 мкг (200 МЕ), фолиевой кислоты 0,8 мг, пантотеновой кислоты 18 мг, биотина 225 мкг, бета-каротина 15 мг, магния 180 мг, селена 50 мкг, железа 8 мг, цинка 10 мг, марганца 2 мг, меди 1 мг, хрома 60 мкг, молибдена 60 мкг, йода 150 мкг, концентрата рыбьего жира 1500 мг, жирных кислот омега-3 500 мг, коэнзима Q10 15 мг, L-карнитина 200 мг, L-лизина 500 мг, L-пролина 250 мг, L-цистина 80 мг, инозита 100 мг, углеводов 10 г, жиров 1,7 г, белков (с аминокислотами) 1,4 г (энергетическая ценность 64 ккал). В упаковке 15 или 30 пакетиков.

Фарм. действ.: Нормализация витаминного, минерального, аминокислотного и других видов метаболизма.

Фармакодин.: Обеспечивает поступление в организм жизненно важных витаминов в необходимом наборе и в достаточном количестве. Повышенное содержание витаминов С и Е, являющихся натуральными антиоксидантами, определяет защиту клеток от вредного воздействия свободных радикалов. Входящие в состав препарата бета-каротин и селен также являются естественными антиоксидантами. Важнейшие витамины группы В (витамины В₁, В₂, В₆, В₁₂) и особенно фолиевая кислота снижают повреждающее действие гомоцистеина. Содержание магния в препарате обеспечивает минимальную потребность в нем и удовлетворяет специфическим требованиям к питанию больных с заболеванием сердца. Суточная потребность в таких важных микроэлементах, как цинк, железо и йод, полностью покрывается одной суточной дозой. Содержащийся хром способствует улучшению обмена веществ (у больных сахарным диабетом). В дневной дозе содержится 0,5 г жизненно важных жирных кислот омега-3 (количество, эквивалентное 1,5 г рыбьего жира). Входящий в состав препарата коэнзим Q10 способствует нормализации сократительной способности миокарда. Аминокислоты L-лизин, L-пролин обеспечивают стабильную работу сосудов, а L-цистеин является наиболее существенным исходным субстратом для синтеза в организме глутатиона.

Показ.: Повышенная потребность организма в эссенциальных пищевых продуктах, профилактика развития дефицита тех или иных веществ (особенно на

фоне повышенной потребности) у взрослых и подростков, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Противопоказ.: Гипервитаминоз.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Содержимое 1 дневной дозы размешивают в 100-150 мл воды или фруктового сока и выпивают либо во время, либо после еды. Дополнительно принимают капсулы с рыбьим жиром, а также капсулы с коэнзимом Q10 и карнитином. Можно принимать в течение длительного времени.

Предост.: Больным диабетом, принимающим ОртоКор плюс, следует иметь в виду, что желательно вдвое сократить потребление сахара, увеличить потребление рыбы и минеральной воды, снизить прием алкогольных напитков и не курить, следует придерживаться диабетической диеты. Рыбий жир может вызывать легкую отрыжку с рыбным привкусом - во избежание этого целесообразно разделить прием капсул.

Произв.: Orthomol (Германия)

ОртоОстео (OrthoOsteo®)

Сост. и ф.в.: 1 дневная доза препарата (14 г) содержит кальция 600 мг, витамина D 7,5 мкг, витамина K₁ 200 мкг, витамина C 120 мг, витамина B₆ 3 мг, цинка 8 мг, марганца 2 мг, меди 1 мг, фтора 1 мг, трикалия цитрата гидрата 3,24 г, (соответственно калия 1170 мг и цитрата 1890 мг), глюкозы 5,9 г (энергетическая ценность 38 ккал). В упаковке 15 или 30 пакетиков.

Фарм. действ.: Нормализация витаминного и минерального баланса.

Фармакодин.: Содержит важнейшие для роста и развития костных тканей питательные вещества (кальций, "костные витамины" D и K, витамины C и B₆, микроэлементы - цинк, марганец, медь и фтор). Цитрат калия подщелачивает среду (это имеет особенно важное значение при богатом белками питании, а также при высоком уровне распада жирных кислот, что влечет за собой выход кальция в жидкости организма и снижение его содержания в костной ткани). Обеспечивает высокий уровень потребления витамина D, что в свою очередь повышает абсорбцию кальция из ЖКТ и его включение в костную ткань. Витамин K (компонент препарата) активирует синтез остеокальцина, регулирующего метаболизм костной ткани. Витамины B₆ и C обеспечивают нормальное функционирование соединительной ткани.

Показ.: Пищевая добавка для взрослых, в особенности, при нарушении процессов минерализации костной ткани (в частности, при остеопорозе).

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции почек.

Примен. и доз.: 1 дневную дозу растворяют примерно в 100 мл воды и выпивают во время приема пищи (можно разделить на несколько приемов пищи).

Предост.: При нарушении переносимости глюкозы следует осуществлять строгий контроль за уровнем гликемии (ОртоОстео содержит легко усвояемые углеводы).

Произв.: Orthomol (Германия)

Ортофен (Ortophenum)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит диклофенака натрия 25 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов; ревматоидный артрит, ревматизм, остеоартроз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, печеночно-почечная недостаточность, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Гастралгия, отрыжка, тошнота, понос, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, головокружение, головная боль, артериальная гипертензия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - по 50 мг от 1 до 6 раз в день.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Ортофен (Ortophenum)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: Ампула с 3 мл раствора для инъекций содержит диклофенака натрия 75 мг.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Клин. фарм.: По противовоспалительной активности превосходит ацетилсалициловую кислоту, бутадиион, ибупрофен. При ревматизме и болезни Бехтерева эквивалентен преднизолону и индометацину.

Показ.: Воспалительный и болевой синдром (ревматоидный артрит, ревматизм, остеоартроз, анкилозирующий спонди-

лоартрит, артроз, спондилоартроз и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, почечно-печеночная недостаточность, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Боли в эпигастральной области, отрыжка, рвота, понос, головная боль, головокружение, аллергические реакции (в основном кожные).

Взаим.: Концентрация в плазме снижается ацетилсалициловой кислотой.

Примен. и доз.: В/м, по 75-150 мг 1-2 раза в день обычно в течение 2-5 суток (до 2 нед.).

Пронзв.: Кальцекс (Латвия)

Орунгал® (Orungal®)

Итраконазол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит итраконазола 100 мг; в упаковке 4 или 15 шт.

Фарм. действ.: Противогрибковое.

Показ.: Онихомикоз, вульвовагинальный кандидоз, микозы кожи, полости рта и глаз, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами; системные и тропические микозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Бер. и корм. гр.: Допускается только при системных микозах в случаях, когда ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода или вскармливаемого грудью ребенка.

Поб. действ.: Диспепсия, боли в животе, запор, повышение уровня трансаминаз в плазме крови, гепатит, головная боль, головокружение, периферические нейропатии, зуд, крапивница, ангионевротический отек, сыпь, алопеция, синдром Стивенса-Джонсона; дисменорея, гипокалиемия, отеки.

Взаим.: Несовместим с терфенадином, астемизолом, ловастатином, оральными формами мидазолама и триазолама. Рифампицин и фенитоин снижают биодоступность. Усиливает и/или пролонгирует действие оральных антикоагулянтов, циклоспорина А, дигоксина, метилпреднизолона, варфарина, такролимуса, винкристина, блокаторов "медленных" кальциевых каналов. Антацидные препараты снижают всасывание, их прием возможен не ранее, чем через 2 ч после приема Орунгала.

Примен. и доз.: Внутрь, проглатывая целиком, после плотной еды. При онихомикозе - по 200 мг в сутки в течение 3 мес или по 200 мг 2 раза в сутки в течение

1 нед с последующим перерывом на 3 нед. При онихомикозе стоп рекомендуется 3 курса лечения, при онихомикозе кистей - два. При вульвовагинальном кандидозе - по 200 мг 2 раза в течение 1 дня или по 200 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней. При отрубевидном лишае - по 200 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. При дерматомикозах и кандидозе полости рта - по 100 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней (при необходимости курс повторяют). При грибковом кератите - по 200 мг 1 раз в сутки в течение 21 дня. При системных микозах - по 100-200 мг 1-2 раза в сутки в течение 2-12 мес (в зависимости от возбудителя).

Предост.: С осторожностью назначают при повышенном уровне трансаминаз (только, если ожидаемый эффект терапии превышает риск поражения печени). У пациентов с циррозом печени и/или с нарушением функции почек необходимо контролировать концентрацию итраконазола в плазме и, при необходимости, корректировать дозу. При сниженной кислотности желудочного сока рекомендуют принимать вместе с колой. Женщинам детородного возраста в период лечения рекомендуют использовать контрацептивные средства.

Пронзв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Осетрон (Osetron)

Ондансетрон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, или 1 ампула с 2 и 4 мл раствора для инъекций содержат ондансетрона гидрохлорида дигидрата 4 и 8 мг. Таблетки - в упаковке 10 шт.; ампулы - в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противорвотное, блокада серотониновых рецепторов.

Показ.: Профилактика и лечение тошноты и рвоты (при химио- и лучевой терапии онкологических заболеваний, в послеоперационном периоде).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в. Взрослым дозу подбирают индивидуально; средняя разовая доза - 8 мг, суточная - 24-32 мг в 2 приема. Детям - по 4 мг 2 раза в сутки.

Пронзв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Оспамокс (Ospamox®)**Амоксициллин***

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит амоксициллина 250 мг.

1 таблетка - 500 или 1000 мг; в упаковке 12 шт.

. Гранулы для приготовления оральной суспензии - 125 или 250 мг/5 мл; во флаконах вместимостью 60 и 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра.

Показ.: Инфекции дыхательных путей и мочеполовых органов, ЖКТ, кожи, мягких тканей, гинекологические инфекции, лептоспироз, листериоз, инфекционный эндокардит, менингит, септицемия, профилактика хирургической инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, аллергический диатез, бронхиальная астма, сенная лихорадка, мононуклеоз, лимфолейкоз, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, головная боль, слабость, судорожная реакция, боли в суставах, интерстициальный нефрит, агранулоцитоз, тромбоцитопения, эозинофилия, глоссит, стоматит, псевдомембранозный колит, обострения аллергических реакций.

Взаим.: Эффект ослабляют бактериостатические антибиотики, антациды.

Примен. и доз.: Внутрь, запивая большим количеством воды, по 1500-2000 мг (детям 30-60 мг/кг) в сутки в 2-3 приема, при лептоспирозе по 500-750 мг 4 раза в день в течение 6-12 дней.

Предост.: Назначают с осторожностью при аллергическом диатезе, бронхиальной астме, сенной лихорадке.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Оспексин (Ospexin®)**Цефалексин***

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефалексина 250 или 500 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 500 или 1000 мг; в упаковке 12 шт.

Гранулы для приготовления оральной суспензии по 125 или 250 мг/5 мл; во флаконах по 60 и 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочеполовых путей, кожи и мягких тканей, оториноларингологические и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, кормление грудью.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, слабость, кандидоз слизистой оболочки влагалища, зуд заднего прохода, эозинофилия, нейтропения, аллергические реакции.

Взаим.: Потенцирует увеличение протромбинового времени противосвертывающими средствами.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 г (детям до 6 лет - 0,1 г/кг) в сутки в 3-4 приема в течение 7-10 дней.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Оспен (Ospen®)**Феноксиметилпенициллин*****Оспен 750 (Ospen® 750)****Феноксиметилпенициллин****Общее описание*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит феноксиметилпенициллина калия 250 мг; в упаковке 12 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 500000 МЕ (около 800 мг), 1000000 МЕ (около 600 мг) или 1500000 МЕ (около 900 мг); в упаковке 12 и 30 шт.

5 мл сиропа - бензатина феноксиметилпенициллина 400000 МЕ/5 мл; во флаконах по 60 мл.

5 мл (1 мерная ложка) гранул для приготовления оральной суспензии - бензатина феноксиметилпенициллина 400000 МЕ/5 мл (соответствует 250 мг феноксиметилпенициллина); во флаконах вместимостью 60 и 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, ЛОР-органов, скарлатина, рожистое воспаление, контактное импетиго, фурункулез, абсцессы, флегмоны, профилактика ревматической атаки, ревматоидного артрита, малой хореи, эндокардита, гломерулонефрита и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая стадия тяжелой пневмонии, эмпиема, перикардит, артрит.

Поб. действ.: Диарея, гемолитическая анемия, лейкопения, суперинфекции, аллергические реакции.

Взаим.: При сочетании с НПВС возможно перекрестное ингибирование экскреции. Несовместим с бактериостатическими антибиотиками.

Примен. и доз.: Внутрь, по 500-750 мг (детям до 12 лет - 250-500 мг) 3-4 раза в день в течение 7-10 дней.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Оссин (Ossin®)

Натрия фторид

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит фторида натрия 40 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция остеобластов и остеогенеза.

Фармакокин.: Абсорбция - около 48%. Средние уровни флюорида - около 150 нг/мл. Почечная экскреция - около 26% принятой дозы за 48 ч.

Показ.: Первичный остеопороз, стероидный остеопороз (профилактика и лечение), плазмоцитома и остеолитические костные метастазы.

Противопоказ.: Нарушение функции почек, беременность, лактация, период роста.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, боли в нижних конечностях и суставах, нарушение зрения.

Взаим.: Эффект снижают антациды (преждевременно растворяют оболочку).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже 2 раза в день (утром и вечером после еды) в течение 1 года (3 мес терапия - 3 мес перерыв).

Произв.: Grünenthal (Германия)

Остеогенон (Osteogenon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит оссеин-гидроксипатитного комплекса 830 мг; неколлагеновые белки 75 мг и коллагеновые белки 216 мг (что соответствует примерно 291 мг оссеина), кальция 178 мг и фосфора 82 мг (что соответствует примерно 444 мг гидроксипатита); в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция остеобластов, торможение остеокластов, повышение содержания кальция.

Показ.: Первичный (пре-, пери- и постменопаузальный, сенильный) и вторичный (обусловленный применением глюкокортикостероидов, гепарина, иммобилизацией, ревматоидным артритом, заболеваниями печени и почек, гипертиреозом и гиперпаратиреозом, несовершенным остеогенезом) остеопороз (в том числе профилактика), нарушение кальцево-фосфорного обмена во время беременности и кормления грудью, переломы костей (для ускорения заживления).

Противопоказ.: Гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Примен. и доз.: Внутрь, заливая жидкостью. При системном остеопорозе - 2-4

таблетки 2 раза в день. По другим показаниям - 1-2 таблетки в день.

Предост.: У пациентов, предрасположенных к мочекаменной болезни, необходима корректировка дозы. У больных с нарушением функции почек следует избегать длительного применения больших доз.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Остеопан (Osteopan®)

Сост. и ф.в.: Биологически активная пищевая добавка. 1 таблетка со вкусом лимона содержит кальция карбоната 600 мг, оксида магния 250 мг, кальция лактата тригидрата 27,2 мг, кальция цитрата тетрагидрата 23,7 мг, кальция гидрогенофосфата дигидрата 217,11 мг, цинка глюконата 34,84 мг и эргокальциферола (40000 МЕ/мг) 0,0025 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение относительного дефицита микроэлементов (кальция, магния и цинка), витамина D.

Показ.: Профилактика и лечение нарушений минерального и витаминного обмена (мышечная слабость, ограничение подвижности, остеопороз, боли в костно-мышечной системе и др.) у женщин зрелого и пожилого возраста (35 лет и старше) при неполноценном и несбалансированном питании (гипофункции органов пищеварения, снижение всасывания в ЖКТ, повышенные физические и/или психоэмоциональные нагрузки, стрессы, недостаточное пребывание на солнце и др.).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь; для профилактики - по 1-2 таблетки 1 раз в день со стаканом молока или чая; для лечения - по 2 таблетки утром и 1 таблетке вечером, перед сном.

Произв.: Diet Pharma (Германия)

Остеохин (Osteochin®)

Изофлавоны

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит иприфлавоны 200 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиостеопорозное.

Показ.: Остеопороз (постклимактерический, сенильный, вторичный и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, угнетение кроветворения (эритро-, лейко- и тромбопения), тяжелые заболевания

печени и почек, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, усталость, спутанность сознания, аллергические реакции.

Взаим.: Осторожно сочетать с производными кумарина и нестероидными противовоспалительными средствами.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1 таблетке 3 раза в день. Курс - от 4-10 нед до 6-12 мес.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Отипакс (Otipax®)

Сост. и ф.в.: 100 г ушных капель содержат феназона 4 г и лидокаина гидрохлорида 1 г; во флаконах по 16 мл.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее, антисептическое, противовоспалительное.

Показ.: Отиты: острый средний, после гриппа, баротравматический и др. (местное симптоматическое лечение с обезболиванием).

Противопоказ.: Гиперчувствительность на отдельные компоненты препарата, механическое повреждение барабанной перепонки.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Закапывают в наружный слуховой проход по 4 капли 2-3 раза в сутки в течение 10 суток (не более).

Произв.: Laboratoires Biocodex (Франция)

Отривин® (Otrivin®)

Ксилометазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл капель для носа содержит ксилометазолина гидрохлорида 0,5 или 1 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее, уменьшающее отек слизистой носа (альфа-адреномиметическое).

Показ.: Ринит и синуситы (для облегчения оттока секрета), средний отит (уменьшение отека слизистой евстахиевого канала и носоглотки), риноскопия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, состояния после транссфеноидальной гипофизэктомии или хирургических вмешательств с обнажением твердой мозговой оболочки.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью назначают при беременности. В период лактации - только под наблюдением врача.

Поб. действ.: Местное раздражение, жжение в носу и носоглотке, тошнота, головная боль, сухость слизистой носа.

Примен. и доз.: Взрослым и детям старше 6 лет - по 2-3 капли 0,1% раствора в каждую половину носа не чаще 4 раз в сутки. Детям до 6 лет и грудным детям - по 1-2 капли 0,05% раствора в каждую половину носа 1-2 раза в сутки не чаще 3 раз в сутки.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с повышенной чувствительностью к адренергическим средствам. Не следует применять постоянно в течение длительного времени (в частности, при хроническом рините).

Произв.: Novartis Consumer Health (Швейцария)

Офрамекс® (Oframax®)

Цефтриаксон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефтриаксона 250, 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное, подавление синтеза клеточной стенки.

Фармакокин.: После однократного в/в введения 1 г и 2 г пиковые концентрации в плазме достигаются через 0,5 ч и составляют 151 мкг/мл и 257 мкг/мл соответственно. Препарат хорошо проникает в различные ткани и жидкости организма, включая ликвор (особенно при воспалении мозговых оболочек). Обратимо связывается с белками плазмы (85-95%). Период полувыведения - 5,8-8,7 ч (наиболее высокий среди всех цефалоспоринов). Выделяется в неизменном виде с мочой и желчью.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, ЛОР-органов, кожи, мягких тканей, костей и суставов, брюшной полости, гинекологические инфекции, тяжелые системные инфекции (септицемия, бактеримия, инфекции у больных с ослабленным иммунитетом), хирургические инфекции (профилактика), гонорея, ранний сифилис (при аллергии к пенициллинам), менингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Эффективность и безопасность у беременных и кормящих женщин не установлена.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (диарея, тошнота), повышение активности печеночных трансаминаз, азота мочевины, эозинофилия, лейкопения, тромбоцитоз, затемнения на эхограмме желчного пузыря, головная боль, аллергические реакции (сыпь, зуд), раздражение в месте введения.

Взаим.: Пробеницид не оказывает влияния на выделение Офрамакса. Совместим с декстрозой и физиологическим раствором.

Примен. и доз.: В/в или в/м. Взрослым - обычно 1-2 г один раз в сутки, тяжелые инфекции до 4 г/сутки (дозу делят на 2 приема с интервалом 12 ч). Острая неосложненная гонорея - 250 мг в/м однократно. Профилактика послеоперационных инфекций - 1-2 г перед операцией. Суточная доза для новорожденных до 2 нед - 20-50 мг/кг массы тела, для детей от 2 мес до 12 лет - 50-75 мг (не более 2 г). Менингит - 100 мг/кг/сутки (не более 4 г) после введения "ударной дозы" в 75 мг/кг. При лечении менингита у детей до 12 лет суточную дозу желательно делить на два введения.

Предост.: С осторожностью назначают недоношенным новорожденным; больным с выраженным нарушением функции почек необходим контроль концентрации препарата в крови.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Офтальмо-Септонекс (Ophtalmo-Septonex)

Сост. и ф.в.: 1 мл офтальмологического раствора содержит карбетопендециния бромид 200 мкг, борной кислоты 19 мг и натрия тетрабората 500 мкг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Противомикробное.

Показ.: Негнойные конъюнктивиты (острые и хронические), блефариты, поверхностные кератиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сухой кератит или конъюнктивит.

Поб. действ.: Гиперемия и жжение конъюнктивы.

Примен. и доз.: Конъюнктивально. При острых воспалительных процессах - по 1 капле в глаз каждые 2 ч; при хронических воспалительных процессах - по 1 капле 1-3 раза в сутки.

Предост.: При отсутствии улучшения в течение 5 дней лечения или появления побочных эффектов необходимо проконсультироваться у офтальмолога.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Офтан® Дексаметазон (Oftan® Dexamethason)

Дексаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 мл глазных капель содержит дексаметазона (в виде-21-фосфата натрия) 1 мг; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Негнойный и аллергические конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератиты, ириты, иридоциклиты, язвы и травмы роговицы, ранний послеоперационный период, герпес Зостер глаз, воспалительные заболевания глаз.

Противопоказ.: Гнойные и вирусные поражения глаз, ветряная оспа, простой герпес.

Поб. действ.: Повышение внутриглазного давления (при длительном применении); возможно прободение роговой оболочки (при ее истончении).

Примен. и доз.: По 1-2 капли в глаз через 1-2 ч, затем - 4-6 раз в сутки.

Произв.: Santen (Финляндия)

Офтан® Дипивефрин (Oftan® Dipivefrin)

Дипивефрин*

Сост. и ф.в.: 1 мл глазных капель содержит дипивефрина гидрохлорида 1 мг, а также бензалкония хлорид, натрия эдетат, маннит, натрия хлорид, соляную кислоту до pH 3; во флаконах по 5 и 10 мл.

Фарм. действ.: Снижение продукции и усиление оттока внутриглазной жидкости, противоглаукомное.

Клин. фарм.: Снижению внутриглазного давления, продолжающемуся более 12 ч, предшествует кратковременный (менее чем на 1 ч) его подъем.

Показ.: Открытоугольная глаукома, снижение повышенного внутриглазного давления после инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, обструкция угла передней камеры глаза.

Поб. действ.: Редко (длительное применение) возможны местные (мидриаз, макулопатия, аллергический конъюнктивит, чувство жжения и острой боли) и общие (головная боль, тахикардия, экстрасистолия).

Примен. и доз.: По 1 капле в каждый глаз 2 раза в день.

Произв.: Santen (Финляндия)

Офтан® Иду (Oftan® Idu)

Идоксуридин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит идоксуридина 1 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Показ.: Кератит герпетический, вызванный Herpes-simplex.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Головная боль. Редко - контактный дерматит век, помутнение роговицы, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с кортикостероидами.

Примен. и доз.: По 1 капле в глаз вначале каждый час днем и через каждые 2 ч ночью, после улучшения состояния - каждые 2 ч днем и каждые 4 ч ночью; для профилактики рецидивов лечение продолжают еще в течение 3-5 дней после полного выздоровления.

Произв.: Santen (Финляндия)

Офтан® Катахром (Oftan® Catachrom)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит цитохрома С 0,675 мг, натрия сукцината 1 мг, аденозина 2 мг и никотинамида 20 мг; во флаконах-капельницах по 10 мл.

Фарм. действ.: Улучшение обмена и питания роговой оболочки, активация репаративных процессов в переднем отделе глаза.

Показ.: Катаракта.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к цитохрому С.

Поб. действ.: В рекомендованных дозах не выявлены.

Примен. и доз.: По 1-2 капли в глаз 3 раза в день.

Произв.: Santen (Финляндия)

Офтан® Пилокарпин (Oftan® Pilocarpin)

Пилокарпин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит пилокарпина гидрохлорида 10 или 20 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Снижение внутриглазного давления, м-холиномиметическое.

Показ.: Глаукома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания глаз, при которых миоз нежелателен (ирит, циклит, иридоциклит).

Поб. действ.: Головная боль, спазм аккомодации, фолликулярный конъюнктивит (при длительном применении); контактный дерматит век (редко).

Примен. и доз.: По 1-2 капли закапывают в глаз 2-6 раз в день.

Произв.: Santen (Финляндия)

Офтан® Тимолол (Oftan® Timolol)

Тимолол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит тимолола (в виде малеата) 2,5 или 5 мг; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Снижение внутриглазного давления, бета-адреноблокирующее.

Показ.: Открытоугольная глаукома, вторичная глаукома (увеальная, афакическая, посттравматическая), повышение внутриглазного давления.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сердечная недостаточность, АВ-блокада II-III степени, синусовая брадикардия, бронхиальная астма, бронхоспастический синдром.

Поб. действ.: Конъюнктивит, уменьшение слезоотделения, редко - поверхностная точечная кератопатия и корнеальная анестезия.

Примен. и доз.: По 1 капле в глаз 2 раза в день.

Произв.: Santen (Финляндия)

Павестезин (Pavestesin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит анестезина (бензокаина) 0,3 г и папаверина гидрохлорида 0,05 г; в ламинированной бумаге по 6 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, местноанестезирующее.

Показ.: Спазмы гладких мышц.

Противопоказ.: Нарушение АВ-проводимости.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, сонливость, тошнота, запор, потливость.

Взаим.: Ослабляет эффект сульфаниламидов, усиливает - сердечных гликозидов. Фармацевтически несовместим с кофеин-бензоатом натрия, нитритом натрия, аскорбиновой кислотой, эуфиллином.

Передоз.: Характеризуется аритмией, частичной или полной АВ-блокадой.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Паглюферал 1,2,3 (Pagluferralum 1,2,3)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит соответственно фенобарбитала 0,025 г, 0,035 или 0,05 г; бромизовала 0,1, 0,1 или 0,15 г; кофеина-бензоата натрия 0,0075,

0,0075 или 0,01 г; кальция глюконата по 0,25 г и папаверина гидрохлорида 0,015, 0,015 или 0,02 г; по 40 шт. в стеклянной банке или по 10 шт. в контурной упаковке.

Фарм. действ.: Противосудорожное, спазмолитическое, миорелаксирующее.

Показ.: Эпилепсия.

Противопоказ.: Тяжелые заболевания печени и почек (с нарушением их функций), алкоголизм, наркотическая зависимость, миастения, одновременный прием с другими седативными средствами, беременность, лактация.

Поб. действ.: Угнетение ЦНС, снижение АД, изменение формулы крови, аллергические реакции (кожная сыпь).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 2-4 таблетки на прием, до 10 таблеток в сутки. Детям (в зависимости от возраста) - от 1/2 до 1 таблетки на прием, максимальная доза для детей до 10 лет - 5 таблеток в сутки.

Произв.: Московская фармфабрика (Россия)

Пакселадин (Paxeladine®)

Окселадин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит окселадина цитрата 40 мг; в упаковке 15 шт. 1 флакон с сиропом вместимостью 125 мл - 600 мг.

Фарм. действ.: Противокашлевое.

Показ.: Кашель различной этиологии (грипп, ринофарингиты, трахеит, ларингиты, бронхопневмонии, коклюш), кашель спазматический и рефлекторный, кашель курильщиков.

Передоз.: Необходима госпитализация с контролем за деятельностью дыхательной и сердечно-сосудистой систем и симптоматическое лечение (антидот неизвестен).

Примен. и доз.: Взрослым - 1 капсула 2-3 раза в день, детям - 1 мерная ложка сиропа на 10 кг массы тела в сутки; детям в возрасте до 4 лет - 1-2, от 4 до 15 лет - 2-3 мерные ложки в сутки.

Предост.: Не следует назначать капсулы детям до 15 лет.

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Палин® (Palin®)

Пипеминовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пипемидиновой кислоты 400 мг.

1 капсула - 200 мг; в упаковке 20 шт.

1 суппозиторий вагинальный - 200 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Острые и хронические инфекции мочевых путей (пиелонефрит, уретрит, цистит, простатит и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции почек (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин), нарушения функции печени, беременность (первый и третий триместр), детский возраст.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 400 мг (не более 600 мг) 2 раза в сутки, курс - 10 и более дней; при инфекциях мочевыводящих путей у женщин одновременно с пероральным лечением назначают по 1 вагинальной свече на ночь в течение 7-10 дней.

Предост.: Во время лечения следует употреблять большое количество жидкости (под контролем диуреза); избегать УФ облучения.

Произв.: Lek (Словения)

Палитрекс (Palitrex)

Цефалексин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефалексина (в форме моногидрата) 250 мг; в упаковке 16 шт.

5 мл приготовленной суспензии для приема внутрь - 250 мг (для приготовления 100 мл суспензии к сухой субстанции во флакон добавляют 83 мл очищенной воды и хорошо взбалтывают).

Фарм. действ.: Антимикробное, бактерицидное.

Фармакодин.: Ингибирует синтез стенки бактериальной клетки, оказывая бактерицидное действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Показ.: Инфекции дыхательных путей: тонзиллит, фарингит, синусит, воспаление среднего уха, мастоидит; острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь; инфекции мочевых путей: острый и хронический пиелонефрит, цистит; гинекологические и послеродовые инфекции; инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов; гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспорином).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, нейтропения, суперинфекции, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым по 500 мг - 1,5 г каждые 12 ч в зависимости от тяжести инфекции; максимальная су-

точная доза 6 г. Детям - 25-60 мг/кг - 100 мг/кг в сутки, в 2 приема; от 1 до 6 лет - 1-2 чайные ложки сиропа каждые 12 ч; от 7 до 12 лет - 2 капсулы по 250 мг или 500 мг каждые 8 ч; максимальная суточная доза для детей - 4 г. Лечение продолжают еще 2 дня после исчезновения клинических симптомов. При хронических и осложненных инфекциях мочевых путей - терапия в течение 14 дней. При гонорее - однократно 3 г препарата вместе с 1 г пробенецида (мужчины) или 2 г препарата и 0,5 г пробенецида (женщины).

Предост.: С осторожностью применяют у больных с аллергией к пенициллинам из-за возможности развития перекрестной реакции. Тест Кумбса у больных, получающих цефалоспорины или пенициллины, иногда дает ложноположительный результат.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Памба (Pamba®)

Аминометилбензойная кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аминометилбензойной кислоты 250 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 50 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антифибринолитическое, ингибция протеолиза (фибринолиза).

Показ.: Локальные и генерализованные кровотечения, обусловленные активацией фибринолиза.

Противопоказ.: Почечная недостаточность, кровоизлияние в стекловидное тело, гиперкоагуляционная фаза коагулопатии потребления, беременность (первый триместр).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головокружения, колебания АД, тахикардия, почечная колика (при лечении гематурии).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 3-4 раза в день. При остром генерализованном фибринолитическом кровотечении в/в - 50-100 мг или в/м - 100 мг. Возможно инфузионное введение (100 мг/ч) с изотоническим раствором натрия хлорида или глюкозы. Для прерывания фибринолитической терапии (стрептокиназа, урокиназа) вводят 50 мг. При развитии синдрома коагулопатии потребления дополнительно к лечению гепарином вводят в/в 50-100 мг.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Памид (Pamid®)

Индапамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит индапамида 2,5 мг; в упаковке 30 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, диуретическое.

Показ.: Артериальная гипертония, отечный синдром при хронической сердечной недостаточности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим сульфонидам).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, утомляемость, слабость, заторможенность, нервозность, раздражительность, парестезии, мышечные спазмы.

Взаим.: Препараты наперстянки и кортикостероидов увеличивают риск возникновения гипокалиемии. Не рекомендуется в сочетании с препаратами лития.

Передоз.: Характеризуется резким усилением диуреза.

Примен. и доз.: Внутрь (утром); при гипертонии начальная суточная доза - 1,25 мг, через 4 нед можно увеличить до 5 мг; лечение отека при хронической сердечной недостаточности начинают с суточной дозы 2,5 мг, через 1 нед (при отсутствии эффекта) - до 5 мг в день.

Предост.: Осторожно применять у пациентов с выраженными нарушениями функции почек. Необходим контроль за электролитным составом, концентрацией глюкозы и мочевой кислоты крови, артериальным давлением.

Произв.: CTS (Израиль)

Панангин (Panangin)

Калия и магния аспарагинат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит калия аспарагината 454 мг и магния аспарагината 400 мг; в упаковке 5 шт.

1 драже - 140 и 158 мг активных веществ соответственно; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, компенсация дефицита магния и калия.

Показ.: Аритмии, гипокалиемия, дигиталисная интоксикация.

Противопоказ.: Почечная недостаточность, гиперкалиемия.

Взаим.: Улучшает переносимость сердечных гликозидов.

Примен. и доз.: В/в капельно по 1-2 ампулы, разбавленных в 50-100 мл 5% раствора глюкозы, 1-2 раза в сутки. Внутрь по 2 драже 3 раза в день, под-

держивающая доза - 1 драже 3 раза в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Панкреатин (Pancreatin)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит панкреатин с протеолитической активностью 200 ЕД FIP, амилалитической активностью 3500 ЕД FIP и липолитической активностью 4300 ЕД FIP; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Компенсация дефицита ферментов поджелудочной железы, улучшение процесса пищеварения.

Фармакодин.: Облегчает переваривание углеводов, жиров и белков, разлагаясь в двенадцатиперстной кишке. Дезактивируется в желудочном соке и активируется в щелочной среде.

Показ.: Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз); хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря; диспепсия; метеоризм; подготовка к рентгенологическому исследованию и УЗИ органов брюшной полости.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, сразу после еды, не разжевывая, запивая большим количеством воды, по 2 драже (не более 12 драже в день).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Панкреатин (Pancreatinum)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: Порошок с наполнителем - сахарной пудрой, содержащий в активной форме основные ферменты поджелудочной железы, главным образом, трипсин.

Фарм. действ.: Улучшение пищеварения.

Показ.: Ахилия, панкреатит, расстройства пищеварения при заболеваниях печени, поджелудочной железы, анацидном и гипоацидном гастрите, хронических энтероколитах.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,5-1 г 3-4 раза в день перед едой.

Произв.: Микомс (Россия)

Пансорал (Pansoral®)

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат холина салицилата 8,7 г, цеталкония хлорида 0,01 г, 95% этилового спирта 39 г; в тубах по 12 г.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, антимикробное.

Показ.: Воспаление, боль и высыпания на слизистой оболочке полости рта (язвочки, повреждения, связанные с ношением зубных протезов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 2,5 лет).

Примен. и доз.: Наносят, слегка массируя, на болезненный участок во рту около 1 кв.см 4 раза в день (в т.ч. обязательно перед сном) или тонким слоем по всему участку, поврежденному ношением зубных протезов.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Пантенол (Panthenol)

Декспантенол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит декспантенола 100 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита пантотеновой кислоты.

Показ.: Таблетки: воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (бронхит, фарингит, ларингит, трахеит, ринит), состояние после тонзиллэктомии, стоматит. Раствор для инъекций: предупреждение и лечение послеоперационной атонии кишечника, паралитическая непроходимость кишечника; парентерально или внутрь: недостаточность пантотеновой кислоты (ощущения покалывания, онемения, боли в пальцах ног и в ступнях).

Противопоказ.: Гемофилия, механическая кишечная непроходимость (для парентерального введения).

Поб. действ.: Аллергические реакции (при парентеральном введении).

Примен. и доз.: Внутрь. Заболевания слизистой оболочки - от 2 до 4 таблеток в день через равные промежутки времени (дать таблеткам раствориться во рту). При недостаточности пантотеновой кислоты - 1 таблетка (100 мг) независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости (не более 5 таблеток в день). П/к, в/м, в/в. Профилактика послеоперационной атонии кишечника - по 2 ампулы во время или вскоре после операции (в/в); лечение послеоперационной атонии кишечника - по 2 ампулы

(при необходимости инъекции можно повторять через 6 ч) в/в или в/м; при паралитической непроходимости кишечника - вводят 1 ампулу в/м или в/в - затем через 2 и далее через 6 ч до нормализации деятельности кишечника.

Предост.: Следует назначать с осторожностью при хронической почечной недостаточности.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Пантенол (Panthenol)

Декспантенол*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с распылительным клапаном содержит 140 г аэрозоля.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, стимулирующее регенерацию.

Показ.: Раны (в т.ч. ссадины и асептические операционные раны), трещины, ожоги, трофические язвы, пузырьковый и буллезный дерматозы, герпес, плохо заживающие трансплантаты кожи, лучевые поражения кожи (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Распыляют на пораженные участки с расстояния 10-20 см (перед употреблением баллон встряхивают) короткими импульсами в течение 1/2 с.

Произв.: Ankerpharm (Германия)

Пантоцид (Pantocidum)

Моналазон динатрия*

Сост. и ф.в.: Таблетки по 0,0082 г содержат активный хлор; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое, дезинфицирующее.

Показ.: Обеззараживание воды, дезинфекция рук, влажных ран.

Примен. и доз.: Наружно. Для дезинфекции рук - 1-1,5% растворы; для обработки ран - 0,1-0,5% растворы; для обеззараживания воды по 1-2 таблетки на 0,5-0,75 л в течение 15 мин.

Произв.: Ирбитский химфармзавод (Россия)

Панцитрат (Panzytrat®)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 капсула с резистентными к желудочному соку микротаблетками содержит панкреатин из поджелудочной железы свиней с активностью липазы 10 000, 20 000 или 25 000 ЕД; амилазы 9000, 18 000 или 22 500 ЕД и протеаз

500, 1000 или 1250 ЕД соответственно (по европейской фармакопее).

Фарм. действ.: Восполнение дефицита экзосекреции поджелудочной железы, нормализация пищеварения, стимуляция метаболических процессов.

Фармакокин.: Капсулы содержат микротаблетки в специальной оболочке, резистентной к желудочному соку, что гарантирует освобождение всех ферментов в кишечнике.

Показ.: Нарушение пищеварения вследствие внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: хронический панкреатит, кистозный фиброз (муковисцидоз), состояние после резекции поджелудочной железы, после наложения желудочно-кишечных анастомозов (гастроэнтеростомия), закупорка протоков поджелудочной железы и желчных путей (например, при новообразованиях); вторичные симптомы нарушения пищеварения (вздутие, чувство тяжести в животе, метеоризм, стеаторея).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к продуктам из свинины, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.

Бер. и корм. гр.: Ограничений не существует в том числе и для панцитрата с активностью липазы 25000 ЕД.

Поб. действ.: Аллергические реакции, образование стриктур в илеоцекальном отделе и в восходящей ободочной кишке после приема больших доз (у некоторых больных муковисцидозом).

Передоз.: Отравлений не вызывает (не содержит токсических компонентов), у детей передозировка может вызвать тяжелые запоры.

Примен. и доз.: Внутрь. Доза зависит от степени недостаточности функции поджелудочной железы. Обычно (ориентируются на содержание липазы) назначают в день детям до 18 мес до 50 000 ЕД липазы, детям старшего возраста - до 100 000 ЕД, взрослым - до 150 000 ЕД. При необходимости дозы повышают. При полной недостаточности поджелудочной железы необходимо замещение общей суточной потребности в липазе, как правило, до 400 000 ЕД в день. При муковисцидозе дозы не должны превышать количество ферментов, необходимое для адекватного всасывания жиров, с учетом качества и количества потребляемой пищи. Доза может быть увеличена только под контролем врача. Не следует превышать ежедневную дозу ферментов в 15 000-20 000 ЕД липазы/кг массы тела. Продолжительность лечения

не ограничена. Капсулы следует распределять в течение дня, проглатывать целиком, не разжевывая, во время приема пищи, запивая большим количеством нещелочной жидкости (например, фруктовыми соками). Чтобы облегчить проглатывание, особенно у больных после гастрэктомии, можно раскрыть капсулу и проглотить ее содержимое, не разжевывая.

Предост.: Капсулы или их содержимое должны приниматься целиком без разжевывания, т.к. в полости рта активные ферменты препарата могут вызвать раздражение слизистой оболочки. У больных муковисцидозом известны осложнения в виде закупорки кишечника. Поэтому при наличии симптоматики, схожей с симптоматикой кишечной непроходимости, следует учитывать возможность стриктур кишечника. У больных с аллергией к продуктам из свинины и лактозе возможны нарушения со стороны ЖКТ.

Произв.: Knoll (Германия)

Папаверина гидрохлорид (Papaverini hydrochloridum)

Папаверин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит папаверина гидрохлорида 40 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, сосудорасширяющее.

Показ.: Спазм сосудов головного мозга, стенокардия, эндартериит, холецистит, пилороспазм, спастические колиты, спазм мочевыводящих путей, бронхоспазм.

Противопоказ.: АВ-блокада.

Поб. действ.: АВ-блокада, желудочковая экстрасистолия, гипотония, запоры, сонливость.

Примен. и доз.: П/к, 1-2 мл 2-4 раза в сутки, в/в (медленно) - 1 мл.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Папаверина гидрохлорид (Papaverini hydrochloridum)

Папаверин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит папаверина гидрохлорида 0,04 г.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, гипотензивное.

Показ.: Спазмы сосудов головного мозга, стенокардия, эндартериит, холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика.

Противопоказ.: Атриовентрикулярная блокада.

Поб. действ.: Атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия, гипотония, запоры, сонливость.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,04-0,06 г 3-5 раз в сутки. Высшая разовая доза - 0,4 г, суточная - 0,6 г.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Папазол (Papazolum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бендазола и папаверина гидрохлорида по 30 мг; в упаковке 6 или 10 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, гипотензивное.

Показ.: Артериальная гипертензия (лабильная), спазм гладкой мускулатуры внутренних органов, остаточные явления полиомиелита.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия у пожилых.

Поб. действ.: Нарастание сердечной недостаточности.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Параплатин (Paraplatin®)

Карбоплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекций или 1 флакон с раствором для инъекций содержат карбоплатина 50, 150 или 450 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, алкилирующее.

Показ.: Поздние стадии аденомы яичников эпителиального происхождения, мелкоклеточная карцинома легкого, сквамозно-клеточная карцинома головы и шеи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к препаратам, содержащим платину), тяжелые нарушения функции почек, миелосупрессия.

Поб. действ.: Миелосупрессия (лимитирует дозу), повышение уровня креатинина и мочевины и снижение концентрации магния, калия и кальция в сыворотке крови, тошнота, рвота, изменение вкуса, снижение остроты слуха, парестезии, снижение глубоких сухожильных рефлексов, нарушения функции печени, алоpecia, повышение температуры, озноб, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, однократная инфузия в течение 15-60 мин - по 400 мг/кв.м поверхности тела; повторная инфузия - не ранее, чем через 4 нед. При предшествующем лечении миелосупрессивными препаратами и у больных с низким функциональным статусом рекомендуется снижение дозы на 20-25%. Корректировка доз рекомендуется у больных в возрасте 65 лет и старше, у пациентов с нарушением функции почек и при сочетании с др. химиотерапевтическими препаратами. Перед употреблением содержимое флакона следует растворить в воде для инъекций, 5% растворе глюкозы или в 0,9% растворе хлорида натрия до конечной концентрации 10 мг/мл (50 мг в 5 мл, 150 мг в 15 мл и 450 мг в 45 мл). Возможно дальнейшее разбавление теми же растворами до концентрации 0,5 мг/мл.

Предост.: Следует исключить контакт растворов препарата с алюминием. Рекомендуются еженедельный контроль клеточного состава крови (с целью корректировки доз), неврологические обследования.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Парацетамол (Paracetamol)

Парацетамол*

Парацетамол 120

Берлин-Хеми

(Paracetamol 120

Berlin-Chemie)

Парацетамол*

Парацетамол 200

Берлин-Хеми

(Paracetamol 200

Berlin-Chemie)

Парацетамол*

Парацетамол 500

(Paracetamol 500)

Парацетамол*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит парацетамола 250 мг; в упаковке 10 шт.

5 мл раствора для приема внутрь (1 мерная ложка/мерный колпачок) - 120 или 200 мг; во флаконах по 60 мл.

1 таблетка - 500 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Боли слабой и средней интенсивности, лихорадка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Поб. действ.: Гиперемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, панцитопения, экзантема, бронхоспазм, поражения печени (при передозировке), аллергические реакции (отек Квинке, удушье, потливость, тошнота, падение АД до коллапса). При использовании свечей - местные реакции (раздражение, выделение кровавой слизи, болезненная дефекация).

Примен. и доз.: Раствор (парацетамол 120 - детям до 12 лет) и таблетки (с большим количеством воды) - внутрь, суппозитории (детям 1-6 лет) - ректально. Взрослым и детям старше 12 лет (свыше 40 кг) - 500-1000 мг 3-4 раза в сутки, с интервалами 4-8 ч, не более 5-7 дней; максимальная суточная доза - 4 г. Детям до 6 мес - 70-100 мг (в сутки до 350 мг), до 1 года - 100-150 мг (в сутки до 500 мг), до 3 лет - 150-200 мг (в сутки до 750 мг), 3-6 лет - 200-300 мг (в сутки до 1 г), 6-9 лет - 300-500 мг (в сутки до 1,5 г), 9-12 лет - 400-600 мг (в сутки до 2 г). С учетом массы тела разовая доза - 10-15 мг/кг, суточная - до 50 мг/кг. У пациентов с нарушениями функции печени и почек, с синдромом Жильбера дозу следует снизить (или увеличить интервал между приемами).

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Парацетамол (Paracetamolum)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит парацетамола 200 или 500 мг; в упаковке 6 или 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Фармакокин.: Быстро и практически полностью всасывается в ЖКТ. Проникает через плацентарный барьер, обнаруживается в молоке кормящих матерей. Метаболизируется в печени. Выводится в основном с мочой в виде конъюгатов. Максимальный эффект развивается в течение 2 ч.

Показ.: Болевой и лихорадочный синдромы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции почек.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Атропин и другие спазмолитики задерживают всасывание, метоклопропамид - ускоряет. Холестерин и активированный уголь снижают биодоступность. Барбитураты, противоэpileптические средства, рифампицин и этиловый спирт увеличивают скорость биотрансформации и образование метаболитов, в т.ч. гепатоксических.

Примен. и доз.: Внутрь, 200-500 мг (детям от 6 до 12 мес - 25-50 мг, до 5 лет - 100-150 мг, до 12 лет - 150-250 мг) 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Парацетамол (Paracetamolum)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 5 мл сиропа содержат парацетамола 0,12 г; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Болеутоляющее, жаропонижающее.

Показ.: Болевой синдром средней и малой интенсивности: боль головная, зубная, при травмах, ожогах, мигрень; невралгия, миалгия; лихорадка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени или почек; дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови, грудной возраст (до 3 мес).

Поб. действ.: Тошнота, боли в эпигастрии, анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинемия; гепатотоксичность (в высоких дозах при длительном применении), аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке).

Взаим.: Барбитураты, противосудорожные средства, рифампицин повышают гепатотоксичность.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 0,2-0,4 г на прием; высшие дозы (для взрослых): разовая - 0,5 г, суточная - 1,5 г. Детям 6-12 мес - по 0,025-0,05 г; 2-5 лет - по 0,1-0,15 г; 6-12 лет - по 0,15-0,25 г 2-3 раза в день.

Предост.: С осторожностью следует назначать при нарушениях функции печени и почек, доброкачественной гипербилирубинемии, пожилым, при беременности и лактации. Во время лечения необходим контроль периферической крови и функционального состояния печени.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Парембал (Parembal®)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат 5 г водного экстракта коры гамамелиса (соответствует 22,5 г свежего сырья) и 10 г висмута галлата основного.

1 суппозиторий с марлевым тампоном - 100 и 200 г действующих веществ соответственно.

Мазь в тубах по 20 и 50 г, суппозитории в упаковке 8 и 16 шт. или комбинированной упаковке 20 г мази + 8 шт. суппозитория.

Фарм. действ.: Противогеморроидальное.

Фармакодин.: Ослабляет болевую чувствительность слизистой анальной области, способствует регенерации, обладает выраженным обволакивающим и противовоспалительным действием, устраняет зуд и боль.

Показ.: Геморроидальные узлы (в т.ч. с сопутствующими воспалительными явлениями).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Мазь наносят на слизистую заднего прохода 2-3 раза в день после опорожнения кишечника и растирают пальцем. Для облегчения введения мази используют прилагаемую канюлю, которую навинчивают на верхушку тюбика, слегка обмазывают мазью и вводят в задний проход. Медленно вытаскивая канюлю, легким нажатием на тюбик выжимают небольшой столбик мази и равномерно распределяют по очагу воспаления. После использования канюлю обмывают теплой водой. Суппозитории - по 1-му вводят в задний проход 1-2 раза в день, по возможности, после опорожнения и тщательного очищения кишечника. Длительность лечения - до 4 нед.

Предост.: При кровоточащих геморроидальных узлах применять следует только после консультации врача.

Произв.: Knoll (Германия)

Парлодел (Parlodel®)

Бромокriptин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромокriptина мезилата 2,5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция дофаминовых рецепторов, ингибирование секреции пролактина.

Показ.: Пролактинзависимые нарушения менструального цикла и женское

бесплодие, синдром поликистозных яичников, ановуляторные циклы (в дополнение к антиэстрогенам), предменструальный синдром, гиперпролактинемия у мужчин, пролактиномы, акромегалия, подавление лактации (по медицинским показаниям), послеродовое нагрубание молочных желез, начинающийся послеродовой мастит, масталгия и другие формы доброкачественных заболеваний молочных желез, болезнь Паркинсона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, злокачественные опухоли молочных желез, гипертония (неконтролируемая, при беременности, в послеродовом периоде), ИБС и другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, психические заболевания (в т.ч. в анамнезе).

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, рвота, запоры, головокружение, головная боль, сонливость, слабость, спутанность сознания, психомоторное возбуждение, галлюцинации, дискинезии, судороги мышц ног, похолодание верхних и нижних конечностей, ортостатическая гипотония, коллапс, заложенность носа, выпадение волос, аллергические кожные реакции. При длительном лечении больных паркинсонизмом высокими дозами - экссудативный плеврит, плевральный, легочный или ретроперитонеальный фиброз. У рожениц в редких случаях отмечались развитие артериальной гипертензии, инфаркт миокарда, судороги, инсульт, психические нарушения.

Взаим.: Макролиды могут повышать концентрацию в плазме. Переносимость снижается на фоне алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1,25-40 мг в день в зависимости от показаний.

Предост.: В послеродовом периоде не рекомендуется комбинировать с сосудосуживающими препаратами или алкалоидами спорыньи. Необходимо периодически контролировать АД; если развивается артериальная гипертензия, сильная головная боль, нарушения зрения или симптомы нейроинтоксикации, лечение прекращают. Следует соблюдать особую осторожность при вождении транспортных средств или работе с механизмами. Поскольку парлодел может восстанавливать репродуктивную функцию, женщины детородного возраста, не желающие беременности, должны проконсультироваться в отношении надежного метода контрацепции. Необходима осторожность при язве желудка (в т.ч. в анамнезе). При длительном (в течение нескольких лет) применении высоких доз Парлодела у больных паркинсонизмом су-

ществует риск развития ретроперитонеального фиброза. Если установлен диагноз фиброзных изменений в брюшной области или имеется подозрение на такие изменения, лечение Парлоделом следует прекратить.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Пармидин (Parmidinum)

Пирикарбат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пармидина 0,25 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Ангиопротективное.

Показ.: Атеросклероз сосудов мозга, сердца, конечностей, глаз (комплексное лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Головная боль, диспепсия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,25-0,75 г 3-4 раза в день. Средняя суточная доза - 1-2 г. Курс - 2-6 мес.

Произв.: Акрихин (Россия)

Пародиум (Parodium®)

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат хлоргексидина диглюконата 20 мг, экстракта ревеня 200 мг и формальдегида 100 мг; в тубах по 50 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, дезодорирующее.

Показ.: Гингивиты, кровотечения из десен, болезненность десен при ношении зубных протезов, неприятный запах изо рта.

Примен. и доз.: Наносить на десну пальцем или специальным аппликатором 3 раза в день.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Парседил (Parsedyl®)

Дипиридамола*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит дипиридамола 75 мг; в упаковке 15 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, антиадгезивное, артериодилатирующее, улучшение микроциркуляции, ингибция фосфодиэстеразы, улучшение снабжения миокарда кислородом.

Показ.: Профилактика и лечение тромбозов, тромбоэмболических осложнений, хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Повышенная чувствительность, острый инфаркт миокарда.

Бер. и корм. гр.: Следует соблюдать осторожность при беременности (особенно во II и III триместре).

Поб. действ.: Головная боль, тахикардия, гастралгия, диспепсия.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак за 1 ч до еды. Для профилактики и терапии тромбоэмболических осложнений - по 75 мг 5-6 раз в день. При хронической сердечной недостаточности - по 75 мг 3 раза в день.

Произв.: Alkaloid (Македония)

ПееХоо (PeeHoo®)

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии содержит сухого геля алюминия гидроксида с магнием карбонатом 0,063 г, магния гидроксида 0,04 г, алюминия гидроксида 0,065 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Антацидное.

Показ.: Гиперацидные состояния, гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказ.: Уремия.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям школьного возраста - по 10-15 мл суспензии до 6 раз в сутки.

Произв.: Orion (Финляндия)

Пейн (Pain)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Caju-putum 4X, Camphora 4X, Capsicum annuum 4X, Gaultheria procumbens 4X, Ipecacuanha 4X, Lobelia inflata 4X, Pothos foetida 4X, Sanguinaria canadensis 4X; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Умеренный болевой синдром: невралгия, мышечная, ревматическая, головная боли.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача до начала приема.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения. Взрослым - по 1 таблетке каждые 10-20 мин до облегчения состояния, затем - по 1 таблетке каждые 1-2 ч до полного исчезновения болей; в дальнейшем - по 1 таблетке 4 раза в день. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослых.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. В начале лече-

ния возможно обострение симптоматики заболевания. Если улучшение не наступает после 5 дней лечения, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Пенглоб (Penglobe®)

Бакампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бакампициллина 400 или 800 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакодин.: Действует на грамположительные (за исключением штаммов, продуцирующих пенициллиназу) и грамотрицательные аэробные кокки, другие грамотрицательные аэробные бактерии.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к ампициллину микроорганизмами, в т.ч.: пневмония, бронхит, дизентерия, гонорея, сальмонеллез, гнойные инфекции кожи и мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч.к цефалоспорином), нарушения функции печени.

Поб. действ.: Аллергические реакции (крапивница, эритема, отек Квинке, ринит, конъюнктивит, эозинофилия, анафилактический шок); редко - лихорадка, боли в суставах, тошнота, диарея.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - по 400 мг 2 раза в сутки, максимальная суточная доза - 1,6 г. При острой неосложненной гонорее - однократно в дозе 1,6 г. Детям - из расчета 12,5 мг/кг массы тела 2 раза в сутки. В тяжелых случаях дозу можно удвоить.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с предрасположенностью к аллергическим реакциям, бронхиальной астмой, сенной лихорадкой. Не следует назначать кормящим матерям (проникает в грудное молоко).

Произв.: Astra (Швеция)

Пенициллин G натриевая соль (Penicillin G sodium)

Бензилпенициллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит бензилпенициллина натриевой соли 1; 5 и 10 млн.ЕД.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, ингибция биосинтеза клеточной стенки микроорганизмов.

Показ.: Пневмония, эмпиема плевры, сепсис, септицемия, перикардит, эндокардит, менингит, остеомиелит, инфекции мочевыводящих и желчных путей, кожи и мягких тканей, слизистых, рожистое воспаление, бактериемия, дифтерия, сибирская язва, актиномикоз, инфекции ЛОР-органов, гонорея, бленнорея, сифилис.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м и в/в, в дозе до 1000000-5000000 ЕД в сутки, детям - 30000-100000 ЕД/кг.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Пенодил (Penodil)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ампициллина тригидрата 250 и 500 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания, в т.ч. бронхит, пневмония, дизентерия, сальмонеллез (и сальмонеллоносительство), коклюш, пиелонефрит, эндокардит, менингит, сепсис и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. бета-лактаминам), нарушение функции печени, детский возраст (включая период новорожденности).

Поб. действ.: Поражения нервной системы (при назначении высоких доз больным с почечной недостаточностью), диспептические явления, кишечный дисбактериоз, суперинфекция (кандидоз), реакция обострения (реакция Яриш Герксгеймера) у больных с бактериемией, аллергические реакции (крапивница, эритема, отек Квинке, ринит, конъюнктивит, редко - лихорадка, боли в суставах, эозинофилия, анафилактический шок).

Примен. и доз.: Внутрь, за 0,5-1 ч до или через 2 ч после еды каждые 6 ч. Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от тяжести течения и локализации инфекции, чувствительности возбудителя к препарату. Взрослым - по 100-250 мг; детям - по 125-500 мг. Продолжительность лечения - 5-14 дней (в зависимости от локализации инфекции и течения заболевания).

Предост.: С осторожностью назначают при беременности и лактации (следует приостановить грудное вскармливание). Во время лечения необходим систематический контроль функции печени, почек, картины периферической крови.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Пентаглобин (Pentaglobin®)

Иммуноглобулин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инфузий содержит протеина плазмы человека 50 мг (при этом иммуноглобулина больше или равно 95%), причем IgM 6 мг, IgA 6 мг, IgG 38 мг и прочие компоненты: моногидрат глюкозы (27,5 мг), хлорид натрия, вода для инъекций; в ампулах по 10 и 20 мл или во флаконах по 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее.

Фармакокин.: После в/в введения сравнительно быстро распределяется между плазмой и внесосудистой жидкостью, спустя 3-5 дней достигается равновесие между сосудистой и внесосудистой системами. Период полураспада содержащихся в пентаглобине иммуноглобулинов соответствует значениям такового для эндогенных иммуноглобулинов. Иммуноглобулины и комплексы иммуноглобулинов утилизируются клетками ретикуло-эндотелиальной системы. Аминокислоты и пептиды выводятся почками.

Показ.: Бактериальные инфекции, сепсис, включая сепсис новорожденных, бактериальный менингит (в сочетании с антибиотиками); иммунодефицитные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к препаратам человеческого иммуноглобулина; наличие антител к IgA.

Бер. и корм. гр.: Назначать во время беременности и кормления грудью следует с осторожностью, учитывая соотношение польза-риск. Иммуноглобулины переходят в материнское молоко и могут способствовать передаче защитных антител новорожденным.

Поб. действ.: Головная боль, озноб, повышение температуры, тошнота, рвота, ломота в суставах, боль в спине, в редких случаях - понижение кровяного давления, в единичных случаях - анафилактический шок.

Примен. и доз.: Дозировка зависит от иммунного статуса пациента и тяжести заболевания. Новорожденным и грудным детям назначают ежедневно 5 мл/кг в течение 3 дней, скорость введения - 5 мл/кг/ч (с помощью перфузора). Детям более старшего возраста и взрослым при тяжелых бактериальных инфекциях - 5 мл/кг в течение 3 дней, скорость введения детям с массой тела 20 кг - 8 мл/ч, взрослым (70 кг) - 28 мл/ч. Необходимость повторного курса

зависит от клинического течения болезни. При заместительной терапии иммуноглобулинами у пациентов с подавленным иммунитетом и вторичным синдромом недостаточности антител - 3-5 мл/кг, курс лечения можно повторить через 1 нед. Раствор перед введением следует подогреть до температуры тела. Раствор можно смешивать только с изотоническим раствором хлорида натрия. Больной должен находиться под наблюдением врача во время и в течение 20 мин после переливания.

Предост.: Мутные или с осадком растворы использовать нельзя.

Произв.: Biotest (Германия)

Пентакард-10, 20, 40 (Pentacard®)

Изосорбида мононитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изосорбида мононитрата 10, 20 или 40 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда с низким давлением заполнения левого желудочка, острая циркуляторная недостаточность (шок, коллапс).

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, сердцебиение, ортостатическая гипотензия.

Взаим.: Вазодилатирующий эффект усиливается алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 мг 3 раза в день или по 40 мг 2 раза в день.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Пентакаринат (Pentacarinat®)

Пентамидин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для ингаляций или для инъекций содержит пентамидина изотионата 300 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противопроtoзойное, ингибция тимидинсинтетазы, блокада синтеза ДНК.

Показ.: Ингаляции: профилактика пневмонии, вызываемой *Pneumocystis carinii* (в том числе у больных СПИДом или у лиц с антителами к ВИЧ). Парентеральное введение: лечение пневмонии, вызываемой *Pneumocystis carinii*, в случае непереносимости или противопоказаний к применению котримоксазола; висцеральный и кожный лейшманиоз, ран-

ние стадии африканской сонной болезни.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Ингаляции: кашель, одышка, астматическое дыхание, бронхоспазм, анорексия, металлический привкус во рту, слабость, головокружение, сыпь. Парентеральное введение: болезненность в месте инъекции, бледность, гипотензия, обмороки, тошнота, нарушения функции почек и печени, повышение уровня мочевины и креатинина в крови, снижение клиренса креатинина, гиперкалиемия, гематурия, протеинурия, нарушения углеводного обмена, острый панкреатит, лейкопения, анемия, тромбоцитопения; аллергические реакции.

Примен. и доз.: Ингаляционно, по 300 мг 1 раз в месяц. Парентеральное введение: пневмоцистная пневмония - 4 мг/кг в/во (в течение 1 ч) ежедневно в течение 14 дней; висцеральный лейшманиоз - 3-4 мг/кг через день (до 10 инъекций), при необходимости возможно повторение курса лечения; кожный лейшманиоз - 3-4 мг/кг через два дня на третий, суммарно - 3-4 инъекции; африканская сонная болезнь - 4 мг/кг через день, всего - 7-10 инъекций. При почечной недостаточности рекомендуется снижение дозы на 30-50%.

Предост.: Особая осторожность требуется при лечении пациентов с нарушениями функции печени и/или почек, артериальной гипер- и гипотензией, гипер- или гипогликемией, лейкопенией, анемией, тромбоцитопенией. Больной при парентеральном введении должен находиться в горизонтальном положении, при этом необходим регулярный контроль АД. Следует сводить к минимуму контакт больных, персонала с находящимся в воздухе аэрозолем. Порошок во флаконе следует растворять дистиллированной водой или 5% раствором глюкозы (так как в физиологическом растворе образуется преципитат).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Пенталгин-Н® (Pentalginum-N)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит анальгина 300 мг, напроксена 100 мг, кофеина 50 мг, коденна 8 мг и фенобарбитала 10 мг; в банке или в контурной ячейковой и безъячейковой упаковке по 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное, спазмолитическое, седативное.

Показ.: Острый болевой синдром различной этиологии (головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, артралгия и др.); лихорадочные состояния, простудные и другие заболевания, сопровождающиеся болью и воспалительными явлениями.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая печеночная недостаточность, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, беременность, лактация, возраст (до 7 лет).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, боли в подложечной области, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, угнетение кроветворения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1 таблетке (детям старше 7 лет - по 1/2 таблетки) 2-3 раза в день в течение 2-3 дней (до 1 нед).

Произв.: Томский химфармзавод (Россия)

Пентамин (Pentaminum)

Азаметония бромид*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл инъекционного раствора содержит азаметония бромида 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Ганглиоблокирующее, спазмолитическое, гипотензивное.

Показ.: Гипертонический криз, спазм периферических артерий, кишечная, желчная и почечная колики, бронхиальная астма, эклампсия, каузалгия, отек мозга и легких.

Противопоказ.: Гипотония, печеночно-почечная недостаточность, дегенеративные изменения в центральной нервной системе, тромбофлебит.

Поб. действ.: Сухость во рту, слабость, головокружение, тахикардия, мидриаз, ортостатическая гипотония.

Примен. и доз.: В/м, по 0,5-3 мл раствора 2-3 раза в день. Высшая разовая доза - 3 мл 5% раствора, суточная - 9 мл.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Пентамон (Pentamon)

Пентоксифиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пентоксифиллина 400 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, улучшение микроциркуляции, нормализация реологических свойств крови.

Показ.: Нарушения периферического (артериального и венозного) кровообращения вследствие атеросклероза, сахарного диабета, воспаления, ангионейропатии, посттромботического синдрома; на-

рушения мозгового кровообращения: церебральный атеросклероз, ишемические и постинсультные состояния, нарушения кровоснабжения сетчатки глаза и внутреннего уха.

Противопоказ.: Возраст (до 18 лет).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, после еды; начальная доза - 1 таблетка 3 раза в сутки, поддерживающая доза - 1 таблетка 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 1200 мг. Курс лечения - 2-3 (или более) месяца.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Пентоксил (Pentoxylum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 0,2 г 4-метил-5-оксиметилурацила; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Лейкопозитическое.

Показ.: Лейкопения, агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, интоксикация бензолом.

Противопоказ.: Гемобластозы, лейкозы, лимфогранулематоз.

Поб. действ.: Диспепсия, головная боль, головокружения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 0,2-0,4 г 3-4 раза в день, детям - 15 мг (до 1 года), 0,1-0,15 г (старше 12 лет). Курс - 15-20 дней.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Пентрексил (Pentrexil)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 5 мл приготовленной суспензии содержат ампициллина (в виде тригидрата) 250 мг; во флаконах для приготовления 100 мл суспензии.

1 флакон с порошком для инъекций - ампициллина (в виде натриевой соли) 500 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: Хорошо всасывается, быстро выводится (в основном почками), 30-40% препарата выводится с мочой в неизмененном виде.

Фармакодин.: Не действует на пенициллиназообразующие стафилококки (разрушается пенициллиназой).

Показ.: Инфекции дыхательных путей и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, ЖКТ, ЛОР-органов, хирургические инфекции, септицемия, бактериальный эндокардит, менингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. беталактаминам), инфекционный мононуклеоз.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции (зуд, крапивница, анафилактический шок).

Взаим.: Эффект снижают хлорамфеникол, тетрациклин, фенотиазиды, фенобарбитал, бактериостатические антибиотики. Уменьшает противозачаточный эффект оральных контрацептивов. В сочетании с аллопуринолом вызывает появление сыпи на коже.

Примен. и доз.: Внутрь, суспензия: взрослым и детям с массой тела свыше 40 кг - по 250 мг 4 раза в сутки, детям с массой менее 40 кг - 25 мг/кг в сутки, в равных дозах каждые 6 ч. В тяжелых случаях доза удваивается. В/м, взрослым - 250-500 мг через каждые 6-8 ч, при тяжелых инфекциях 1-2 г каждые 6-8 ч; грудным детям и детям до 13 лет - 25-50 мг/кг в сутки (при тяжелых инфекциях - 150-200 мг/кг в сутки), в равных дозах каждые 6-8 ч. В/в, взрослым - 250-500 мг каждые 6-8 ч, при тяжелых инфекциях - 150-200 мг/кг в сутки, в равных дозах каждые 6-8 ч.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Пепонен® (Peronen®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит масла семян тыквы 0,3 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Снижение дизурических симптомов, гиполипидемическое, иммуностимулирующее.

Фармакодин.: Снимает болевой синдром при простатите, повышает потенцию у мужчин, активизирует иммунную систему организма.

Показ.: Аденома предстательной железы (начальная стадия), гиперлипидемия На и Нв типов, атеросклероз (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, при аденоме предстательной железы - по 1-2 капсулы 3 раза в день; при гиперлипидемии - по 1-2 капсулы 3 раза в день, в течение 3-4 мес (возможна комбинация с другими гиполипидемическими средствами); для профилактики атеросклероза - по 1-2 капсулы 2-3 раза в день (длительно).

Произв.: Biogal (Венгрия)

Пепсин (Pepsinum)

Сост. и ф.в.: Порошок с наполнителем - сахарной пудрой.

Фарм. действ.: Улучшение пищеварения.

Показ.: Расстройства пищеварения (ахилия, гипо- и анацидные гастриты, диспепсия).

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,2 г 2-3 раза в день перед едой или во время еды.

Произв.: Микомс (Россия)

Пергонал (Pergonal®)

Менотропин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит менотропина (человеческий менопаузный гонадотропин, содержащий ФСГ и ЛГ в соотношении 1:1) 75 и 150 МЕ в комплекте с растворителем в ампулах по 1 мл (раствор хлорида натрия для инъекций); в упаковке 1 или 10 комплектов.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита ФСГ и ЛГ, стимуляция роста и созревание фолликулов, повышение уровня эстрогенов, стимуляция пролиферации эндометрия, нормализация сперматогенеза, стимуляция клеток Сертоли семенных канальцев.

Показ.: У женщин бесплодие: стимуляция роста одного фолликула, при нарушении гипоталамо-гипофизных взаимоотношений или с гипогонадотропным гипогонадизмом (с ановуляторными нарушениями), стимуляция роста множественных фолликулов. У мужчин - первичный и вторичный гипогонадотропный гипогонадизм, азооспермия, олигоастеноспермия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к менотропинам, персистирующее увеличение кист яичников, не обусловленных синдромом поликистозных яичников, первичная недостаточность яичников, аномалии развития половых органов или мнома матки, несовместимые с беременностью, гинекологические кровотечения неясной этиологии, рак яичников, матки, молочной железы, беременность, лактация, рак предстательной железы и другие андрогенозависимые опухоли у мужчин.

Поб. действ.: Местные реакции в области инъекции, лихорадка, артралгии, боли в молочных железах, желудочно-кишечные расстройства, вздутие живота, боли в подложечной области и внизу живота, увеличение яичников, образование кист в яичниках, синдром гиперстимуляции яичников (гиповолемия, гемоконцентрация, электролитные нарушения, асцит, гемоперитониум, гидроторакс, явления тромбоза эмболии); гинекомастия (у мужчин).

Взаим.: Несовместим в одном шприце с другими препаратами.

Примен. и доз.: Вводится только в/м. Лечение начинается с ежедневной инъекции 75 МЕ в первые 7 дней цикла у менструирующих женщин до достижения адекватного ответа (первая схема). По другой схеме вводится в эквивалентных количествах через день: начальная доза составляет 225-375 МЕ в течение недели. Гипогонадотропный гипогонадизм у мужчин; олигоастеноспермия и азооспермия: 75-150 МЕ 3 раза в неделю в течение 3-4 мес (при идеопатической нормогонадотропной олигоспермии); лечение сочетается с гонадотропином хорионическим (Профази).

Предост.: До начала лечения следует провести терапию гипотиреоза, гиперпролактинемии, опухолей гипофиза или гипоталамуса.

Произв.: Serono (Швейцария)

Перистил (Peristil)

Цизаприд*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит цизаприда моногидрата 5 или 10 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл суспензии для приема внутрь - 1 мг; во флаконах по 60 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция тонуса и моторики ЖКТ, повышение уровня ацетилхолина, антирефургитантное, послабляющее.

Показ.: Парез желудка и кишечника, желудочная диспепсия, рефлюкс-эзофагит, хронический запор, регургитация у новорожденных.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозу устанавливают индивидуально. Взрослым - по 5-20 мг 2-4 раза в сутки; детям - по 0,15-0,3 мг/кг массы тела 2-3 раза в сутки.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Перитол (Peritol®)

Ципрогептадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципрогептадина гидрохлорида 4 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл сиропа - 0,4 мг; во флаконе 100 мл.

Фарм. действ.: Противоаритмическое, блокада H₁-гистамино-, серотонино- и м-холинорецепторов, повышение аппетита, снижение гиперсекреции АКГГ и СТГ.

Показ.: Аллергические заболевания (крапивница, сывороточная болезнь, поллинозы, вазомоторный ринит, контактный дерматит, нейродермиты, отек Квинке, аллергические реакции на укусы насекомых), анорексия, кахексия (период реконвалесценции, хронические заболевания, гипертиреоз), головная боль сосудистого происхождения, мигрень.

Противопоказ.: Глаукома, предрасположенность к отекам, задержка мочи, беременность, возраст (до 6 мес).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, головокружение, беспокойство, сонливость, атаксия, снижение реакции, заторможенность, зрительные галлюцинации, кожная сыпь.

Взаим.: Несовместим с алкоголем, усиливает эффект болеутоляющих и снотворных.

Примен. и доз.: Внутрь. Детям от 6 мес до 2 лет - 0,4 мг/кг в сутки, от 2 до 6 лет - 6 мг за 3 приема, старше 6 лет и взрослым - по 4 мг 3 раза в день. В начале терапии назначают вечером, после еды. При хронической крапивнице суточная доза взрослого - 6 мг (3 раза по 1/2 таблетки или по 1 чайной ложке сиропа), при острой мигрени - от 4 до 8 мг в течение 4-6 ч.

Произв.: Egis (Венгрия)

Перлинганит (Perlinganit®)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инфузий содержит нитроглицерина 10 мг в изотоническом 5% растворе глюкозы; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антиангинальное.

Показ.: Нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, острая левожелудочковая недостаточность, гипертонический криз на фоне сердечной недостаточности, управляемая гипотония.

Противопоказ.: Шок, коллапс, выраженная гипотензия, кардиогенный шок.

Поб. действ.: Головная боль, снижение АД, тахикардия, тошнота, рвота, сонливость, слабость.

Взаим.: Снижает эффект гепарина. Гипотензию усиливают вазодилататоры, антагонисты кальция, дигидроэрготамин, циклические антидепрессанты, алкоголь.

Примен. и доз.: В/в, через перфузор. Дозы подбираются индивидуально - от 0,75-8 мг/ч до 10 мг/ч.

Предост.: Не рекомендуется сочетать с гипотензивными препаратами, антагонистами кальция, вазодилататорами, алкоголем, циклическими антидепрессантами, дигидроэрготамином.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Пермакс (Permax®)

Перголид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит перголида мезилата 0,05; 0,25 или 1,0 мг.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, стимуляция D₁- и D₂-дофаминорецепторов (нигростриарной системы), подавление секреции пролактина.

Фармакокин.: Хорошо всасывается. Метаболизируется с образованием 10 метаболитов. На 90% связывается с белками плазмы; выводится в основном через почки.

Показ.: Болезнь Паркинсона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, в т.ч. к препаратам спорыньи.

Бер. и корм. гр.: Назначать при беременности следует только по строгим показаниям и под контролем врача. Из-за возможной экскреции в грудное молоко рекомендуется прекращение кормления грудью или отмена препарата (в зависимости от важности применения его для матери).

Поб. действ.: Дискинезии, головокружение, галлюцинации, спутанность сознания, сонливость или бессонница; диспептические расстройства (сухость во рту, анорексия, тошнота, рвота, диарея или запор), респираторные нарушения (диспноэ, ринит), меньше, чем плацебо-нарушения зрения и вкуса, боли (головная, в области грудной клетки, в области шеи и др.), гипо- или гипертензия, обморок, сердцебиение, анемия, лейкопения или лейкоцитоз; периферические отеки, изменение массы тела, обострение подагры и другие проявления расстройства обмена веществ, потливость, лихорадка, сыпь, зуд, нарушения мочеполовой системы, злокачественный нейролептический синдром (повышение температуры, мышечная ригидность, спутанность сознания и др.).

Взаим.: Усиливает эффекты (в т.ч. побочные: может спровоцировать появление галлюцинаций, спутанности сознания, дискинезий) леводопы - ее доза должна быть редуцирована на 5-30%.

Примен. и доз.: Внутрь, начинают с дозы 0,05 мг в сутки в течение 2-х дней.

Затем дозу постепенно повышают: вначале на 0,1-0,15 мг/сутки каждый третий день в течение 12 дней, далее - на 0,25 мг (каждый третий день) до достижения оптимальной терапевтической дозы. Препарат обычно назначают 3 раза в сутки. Средняя терапевтическая доза - 3 мг/сутки. На фоне подбора дозы Пермакса дозировка назначаемой параллельно Леводопы/Карбидопы может быть снижена (до средней суточной дозы Леводопы - 650 мг).

Предост.: Не следует сочетать с антагонистами допамина (нейролептики: фенотиазины, бутирофеноны, тioxсантены и метоклопрамид), т.к. возможно снижение эффекта. С осторожностью назначать в комбинации с другими препаратами, влияющими на связывание с белками плазмы. Нужно предупредить больного, что препарат (особенно в начале терапии) может вызвать гипотонию (ортостатическую или стойкую), поэтому рекомендуется начинать лечение с малых доз, постепенно их увеличивая. Следует назначать с осторожностью больным с аритмиями, а также с плевритом, плевральным выпотом, плевральным фиброзом, перикардитом, перикардальным выпотом, ретроперитонеальным фиброзом и др. видами аналогичной патологии (может быть связана с предшествующим использованием производных спорыньи). Эта категория пациентов должна находиться под тщательным клиническим наблюдением, включающим рентгенологические и лабораторные исследования. Отмену препарата, снижение дозы или изменение схемы лечения (включающей пермакс) следует проводить постепенно. Безопасность препарата у детей не изучена.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Пермиксон (Permixon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит липидо-стеролового экстракта из плодов пальмового дерева *Serenoa repens* 80 мг; в упаковке 60 шт.

1 капсула - 160 мг, в упаковке 30 или 60 шт.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, вазопротекторное, противовоспалительное, уменьшение проницаемости сосудов, блокада 5-альфа-редуктазы типов I и II со снижением образования дигидротестостерона и фосфолипазы A₂ (участвующей в начальной фазе синтеза простагландинов).

Показ.: Обструктивные и воспалительные симптомы, обусловленные неослож-

ненной аденомой предстательной железы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Тошнота (при приеме натощак).

Взаим.: Не выявлено антагонизма Пермиксона и препаратов, наиболее часто употребляемых при лечении обструктивных и воспалительных заболеваний простаты (антибиотики, уроантисептики, противовоспалительные средства).

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 таблетки или по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Перофен (Perofen™)

Ибупрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая сахарной или пленочной оболочкой, содержит ибупрофена 200 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз и др. артропатии неревматоидного генеза, бурсит, тендинит, тендовагинит, чувство холода в плечевой области, боли поясничные, при повреждениях мягких тканей и растяжениях.

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диспепсия и др. желудочно-кишечные расстройства, кожные сыпи.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - по 600-1200 мг в день в несколько приемов, при тяжелых состояниях возможно увеличение дозы до 1600 мг/сутки; при зубных и послеоперационных болях - в начальной дозе по 800 мг; максимальная суточная доза - 2400 мг. Детям - по 20 мг/кг массы тела в день.

Предост.: С осторожностью следует назначать астматическим больным, особенно с выраженным бронхоспазмом (в анамнезе) после приема др. НПВС.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Персен® форте (Persen® forte)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит экстракта валерианы 125 мг, экстракта перечной мяты 25 мг, экстракта лимонной мяты 25 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Седативное, снотворное, стимуляция аппетита.

Показ.: Повышенная утомляемость, раздражительность, напряженность, подавленность, снижение памяти, снижение способности к концентрации внимания, бессонница, потливость ладоней, тремор.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 капсулу за час до сна.

Произв.: Lek (Словения)

Перти (Perti)

Пефлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пефлоксацина 400 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции органов дыхания, ЛОР-органов, мочеполовых путей, ЖКТ, органов брюшной полости и малого таза, костей и суставов, кожи и мягких тканей, сепсис, эндокардит, менингоэнцефалит, хламидиоз, гонорея, инфекции на фоне угнетения иммунитета.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, лактация, детский возраст (до окончания интенсивного роста).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головокружение, слабость, головная боль, бессонница, тремор, миалгия, тромбоцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 400 мг 2 раза в день; при патологии печени - 8 мг/кг/сутки.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Перфторан (Perftoranum)

Сост. и ф.в.: Субмикронная (0,05-0,15 мкм) 10 об.% эмульсия (белого цвета с голубоватым оттенком) на основе перфторорганических соединений. 100 мл водной эмульсии для инфузий содержат перфтордекалина 13 г, перфторметилциклогексилпиперидина 6,5 г, проксанола-268 4 г, натрия хлорида 0,6 г, калия хлорида 0,039 г, магния хлорида 0,019 г, натрия гидрокарбоната 0,065 г, натрия гидрофосфата 0,02 г и глюкозы 0,2 г; во флаконах по 200 и 400 мл.

Фарм. действ.: Газотранспортное, плазмозамещающее, дезинтоксикационное, мембраностабилизирующее, кардиопр-

текторное, диуретическое, блокада "медленных" кальциевых каналов, противоишемическое, противошоковое.

Фармакокин.: Не метаболизируется в организме (химически инертен). Депонируется в ретикулоэндотелиальной системе, временно скапливается в печени, селезенке, костном мозге. Полностью выводится из организма в течение 18-24 мес через легкие и кожу.

Клин. фарм.: Газотранспортная функция перфторана связана со способностью переносить кислород (7 об.% при давлении 760 мм рт.ст.) и углекислый газ (60 об.% при $p\text{CO}_2$ - 760 мм рт.ст.), а также с большой поверхностью газообмена, обуславливающей значительное увеличение скорости диффузии кислорода. Субмикронный размер частиц эмульсии позволяет в достаточной мере снабжать кислородом ишемизированные участки ткани, восстанавливая гемодинамику. Проксанол - стабилизатор, входящий в состав эмульсии, улучшает реологические свойства крови и периферическую микроциркуляцию за счет снижения вязкости и предотвращения агрегации эритроцитов.

Показ.: Гиповолемия и гипоксия вследствие кровопотери, шока, травмы, интоксикации; нарушения микроциркуляции, тканевого метаболизма, газообмена; противоишемическая защита донорских органов; для использования в аппаратах искусственного кровообращения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гемофилия, аллергические заболевания, коллагенозы.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Иногда наблюдаются: гиперемия, гипертермия, тахикардия, гипотония, головная боль, боли за грудной и в поясничной области, затруднение дыхания, аллергические (в т.ч. анафилактикоидные) реакции.

Взаим.: Несовместим с полиглюкином, реополиглюкином, оксиэтилкрахмалом; при необходимости совместного использования их вводят до или после инфузии перфторана. Совместим с донорской кровью, растворами альбумина, глюкозы, антибиотиков, изотоническим и кристаллоидным растворами.

Примен. и доз.: В/в капельно или струйно, после введения первых 3-5 и последующих 30 капель следует сделать перерыв на 3 мин (для оценки результатов биологической пробы). Дозы и интервалы между введением выбирают в соответствии с показаниями и состоянием больного. Обычная доза - 5-30 мл/кг

массы тела; возможно повторное введение в той же дозе 3 раза с интервалом 1-4 дня. Максимальные дозы: разовая - 30 мл/кг, суточная - 100 мл/кг. При необходимости для повышения оксигенационного эффекта рекомендуется подача воздушной смеси, обогащенной кислородом (40-60%).

Предост.: Не следует вводить в одной системе и использовать в одном аппарате искусственного кровообращения с растворами декстранов. Не пригоден к применению, если после размораживания при встряхивании на дне флакона остается осадок.

Произв.: Перфторан (Россия)

Перца стручкового настойка (Tinctura Capsici)

Сост. и ф.в.: Настойка (1:10) на 90% спирте содержит от 0,1 до 1% капсаицина. Флаконы по 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Раздражающее, отвлекающее.

Показ.: Невралгии, радикулиты, миозиты, люмбаго, ишиалгии.

Поб. действ.: Сильное жжение на месте аппликации.

Примен. и доз.: Наружно в виде растираний. Используется также для приготовления мазей и линиментов.

Произв.: Томский химфармзавод (Россия)

Пефлацин (Peflacin®)

Пефлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пефлоксацина мезилата 400 мг; в упаковке 10 или 50 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 400 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное, ингибирование ДНК-гиразы.

Фармакокин.: Абсорбция - 90%. C_{max} в крови - 4 мкг/мл - после однократной инфузии 400 мг, а также через 1,5 ч после приема внутрь такой же дозы, на фоне курсового лечения - 10 мкг/мл; C_{max} в слизистой бронхов наблюдается через 4 ч после применения и превышает 5 мкг/мл; концентрация в спинномозговой жидкости после трехкратного приема 400 мг - 4,5 мкг/мл, при увеличении дозы до 800 мг - 9,8 мкг/мл (соотношение между концентрацией препарата в плазме крови и жидкости составляет 89%). Концентрация в других органах и тканях через 12 ч после последнего приема: щитовидная железа - 11,4 мкг/г,

слюнные железы - 2,2 мкг/г, кожа - 7,6 мкг/г, слизистая носоглотки - 6 мкг/г, миндалины - 9 мкг/г, мышцы - 5,6 мкг/г. Т1/2 - около 12 ч. Объем распределения - 1,7 л/кг. Связь с белками плазмы не превышает 30%. Метаболизируется до норфлоксацина и пefлоксацин-N-оксида, выводится с мочой и желчью. Концентрация неизмененного препарата в моче через 1-2 ч после приема составляет примерно 25 мкг/мл, через 12-24 ч - 15 мкг/мл. Плохо диализуется (коэффициент экстракции в среднем равен 23%).

Клин. фарм.: Обладает широким спектром действия. Чувствительные микроорганизмы: *Escherichia coli*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Proteus*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Haemophilus*, *Staphylococcus*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Legionella*. Умеренно чувствительные микроорганизмы: *Streptococcus*, *Pneumococcus*, *Acinetobacter*, *Clostridium perfringens*, *Mycoplasma*, *Chlamydia trachomatis*. Устойчивые: грамотрицательные анаэробы, спирохеты, *Mycobacterium tuberculosis*.

Показ.: Инфекции, вызванные грамотрицательными бациллами или стафилококками: хирургические и внутрибольничные инфекции, инфекции почек и мочевыводящих путей, костной ткани и суставов, брюшной полости, малого таза и печени, кожи, дыхательных путей, септицемия, эндокардит, менингит, гонорея, простатиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к фторхинолонам, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, возраст (до 15 лет), беременность, лактация.

Поб. действ.: Фотосенсибилизация, покраснение кожи; миалгия; артралгия; тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения; гастралгия, тошнота, рвота; головная боль, бессонница.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 400 мг 2 раза в день. Возможно назначение ударной дозы - 800 мг. В/в, медленно (в течение 1 ч) 2 раза в день, при этом содержимое ампулы растворяют в 250 мл 5% раствора глюкозы. У больных с нарушенной функцией печени или почек инфузию проводят из расчета 8 мг/кг 2 раза в день, если отсутствуют асцит и гепатит; при наличии асцита - каждые 36 ч, при наличии гепатита - 1 раз в день, при сочетании признаков асцита и гепатита - каждые 2 дня.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Пикамилон (Picamilonum)

Никотиноил-гамма-масляная кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пикамилон 0,02 или 0,05 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное, транквилизирующее, улучшение мозгового кровообращения, антиоксидантное, дезагрегирующее, антимигренозное.

Показ.: Нарушения мозгового кровообращения (острые ишемические, подострый и восстановительный периоды ишемического инсульта, хроническая недостаточность мозгового кровообращения), вегетососудистая дистония, астения, депрессия, сенильный психоз; алкоголизм (период абстиненции), острая интоксикация алкоголем, мигрень, черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, первичная открытоугольная глаукома (для стабилизации зрительной функции).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания почек.

Поб. действ.: Тошнота, головная боль, головокружение, раздражительность, возбуждение, ощущение тревоги, аллергические реакции (сыпь, зуд).

Примен. и доз.: Внутрь, при цереброваскулярных заболеваниях - по 0,02-0,05 г 2-3 раза в течение 1-2 мес; при депрессиях - по 0,04-0,2 г в 2-3 приема в сутки в течение 1,5-3 мес; в качестве антиастенического и транквилизирующего средства - 0,04-0,08 г в сутки, в отдельных случаях - до 0,2-0,3 г в сутки в течение 1-1,5 мес; при алкоголизме: в период абстиненции - по 0,1-0,15 г в сутки (курс - 6-7 дней), вне абстиненции - 0,04-0,06 г в сутки 4-5 нед.

Произв.: Акрихин (Россия)

Пилозурил (Pilosuryl®)

Сост. и ф.в.: 100 мл 14,7% спиртового раствора для приема внутрь содержат экстракта из ястребинки волосистой (пилозеллы) 20 г и экстракта из филантуса 3 г и апельсиновой эссенции 2 г; во флаконах по 250 мл.

Фарм. действ.: Диуретическое, антиазотемическое.

Показ.: Хроническая почечная недостаточность, недостаточность выделительной функции почек.

Противопоказ.: Детский возраст.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2-3 чайные ложки на полстакана воды 2 раза в день перед едой в течение 20 дней в месяц.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)

Пилокарпин

Сост. и ф.в.: 1% глазные капли; в полиэтиленовом флаконе по 10 мл.

Фарм. действ.: М-холиномиметическое.

Показ.: Глаукома, тромбоз центральной вены сетчатки, острая непроходимость артерий сетчатки, атрофия зрительного нерва, кровоизлияния в стекловидное тело.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Инстиллянии в конъюнктивальный мешок, 2-4 раза в день.

Произв.: Фармак (Украина)

Пилокарпина гидрохлорид с метилцеллюлозой (Pilocarpini hydrochloridum cum Methylcelluloso)

Пилокарпин

Сост. и ф.в.: Глазные капли в виде раствора, содержащего 1% пилокарпина гидрохлорида в комплексе с метилцеллюлозой; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противоглаукомное, миотическое, м-холиномиметическое.

Показ.: Глаукома (различные формы).

Противопоказ.: Ирит, иридоциклит, др. заболевания глаз, при которых нежелателен миоз.

Поб. действ.: Головная боль; фолликулярный конъюнктивит (при длительном применении); преходящее ухудшение зрения (при начальной катаракте).

Примен. и доз.: В конъюнктивальный мешок, по 1-2 капли 2-6 раз в сутки, возможны комбинации с симпатомиметиками, бета-адреноблокаторами, ингибиторами карбоангидразы и др. препаратами.

Предост.: Необходимо постоянно контролировать внутриглазное давление.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Пилорид® (Pylorid®)

Ранитидин висмут нитрат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ранитидина висмута цитрата 400 мг.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада гистаминов H₂-рецепторов.

Фармакокин.: Абсорбция висмута из препарата составляет менее 1% от введенной дозы. C_{max} для ранитидина - 15-60 мин, для висмута - 1-3 ч. T_{1/2} для ранитидина - 3 ч, для висмута - 5-10 дней. Висмут, в отличие от ранитидина, аккумулируется в плазме после двухдневного приема, устойчивая концентрация достигается после 4-х нед лечения.

Фармакодин.: Подавляет рост *Helicobacter pylori*, снижает секрецию соляной кислоты и пепсина, защищает слизистую оболочку.

Показ.: Язва двенадцатиперстной кишки (лечение, профилактика, в т.ч. рецидивов), доброкачественная язва желудка, наличие *Helicobacter pylori* (в сочетании с кларитромицином или амоксициллином).

Противопоказ.: Гиперчувствительность; острая порфирия, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин); детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Почернение языка и стула; головная боль, дискомфорт и боли в желудке, диарея или запор, кожная сыпь, зуд, анафилактические реакции.

Взаим.: Абсорбция повышается при сочетании с кларитромицином.

Передоз.: В случае передозировки - промывание желудка. Оба компонента (ранитидин и висмут) могут быть удалены из кровотока путем гемодиализа.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи дважды в день (утром и вечером). Лечение язвы двенадцатиперстной кишки - 400 мг 2 раза в день в течение 4-8 нед. Доброкачественная язва желудка - 400 мг 2 раза в день в течение 8 нед. Язвенная болезнь, ассоциированная с *Helicobacter pylori* - 400 мг 2 раза в день, с кларитромицином - 250 мг 4 раза в день или амоксициллином - 500 мг 3 раза в день в течение 2 нед, затем принимают Пилорид - по 400 мг 2 раза в день в течение 2 нед.

Предост.: Перед началом лечения у больных с язвой желудка необходимо исключить малигнизацию.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Пимафукорт® (Pimaфucort®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержат натамицина 10 мг, неомицина 3,5 мг и гидрокортизона 10 мг; в тубах по 15 г.

1 г лосьона - натамицина 10 мг, неомицина 1,75 мг и гидрокортизона 5 мг; во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противогрибковое, противовоспалительное (местное).

Фармакокин.: Натамицин и неомицин практически не всасывается через неповрежденную кожу и слизистые оболочки (через поврежденную кожу абсорбция неомицина возможна), гидрокортизон - на 1-3%. При экземе абсорбция увеличивается в два раза, при инфекционных поражениях кожи - в 4 раза.

Фармакодин.: Устраняет воспалительные явления, зуд (гидрокортизон), активен в отношении ряда грамположительных (стафилококков, энтерококков) и грамотрицательных (*Klebsiella*, *Proteus species*, *E.coli*) бактерий - неомицин; эффективен в отношении дрожжевых, дрожжеподобных грибов, дерматофитов, трихомонад (натамицин).

Показ.: Поверхностные дерматозы, инфицированные бактериями или грибами; гнойничковые и грибковые дерматозы, отомикозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности не рекомендуется наносить препарат на обширные поверхности кожи, применять его под повязки.

Поб. действ.: Обострение заболевания (в начале лечения); при длительном использовании - образование стрий в месте нанесения.

Взаим.: Может развиваться перекрестная аллергия с неомицином, канамицином, паромомицином, гентамицином, перекрестная устойчивость (микроорганизмов к аминогликозидам).

Примен. и доз.: Наружно, взрослым и детям наносят на пораженные участки кожи 2-4 раза в сутки в течение 2-4 нед.

Предост.: Следует избегать попадания в глаза. При нанесении на большие поверхности кожи или под повязки возможно подавление продукции кортикостероидных гормонов. При продолжительном лечении и при наличии ран возможен риск проявлений нефро- и ототоксичности (неомицина). При появлении

суперинфекции (в т.ч. грибковой) лечение следует прекратить.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Пимафуцин® (Pimaфucin®)

Натамицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит натамицина 100 мг; в упаковке 20 шт.

1 вагинальный суппозиторий - 100 мг; в упаковке 3 шт.

1 мл суспензии для местного применения - 25 мг; во флаконах по 20 мл с пипеткой.

1 г крема - 20 мг; в тубиках по 30 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое, фунгицидное.

Фармакодин.: Связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функцию, что приводит к гибели грибов. Оказывает действие на многие патогенные дрожжевые грибы, особенно *Candida albicans* (менее чувствительны - дерматофиты).

Клин. фарм.: Практически не всасывается. Таблетки покрыты оболочкой, растворяющейся только в кишечнике, что обуславливает действие в его просвете. В период назначения суппозитория возможны половые контакты. Хорошо переносится и не противопоказан даже новорожденным, а также в период беременности и лактации.

Показ.: Грибковые заболевания кожи и слизистых: грибковые заболевания ротовой полости (в т.ч. острый псевдомембранозный и атрофический кандидоз у пациентов с кахексией, иммунодефицитом, после терапии антибиотиками, кортикостероидами, цитостатиками); отомикозы, наружные отиты (в т.ч. осложнившиеся кандидозом); кандидоз кожи и ногтей, кандидоз кишечника, вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, баланопоститы, дерматомикозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Таблетки: тошнота, диарея; суспензия, крем, суппозитории: местные реакции - легкое раздражение, ощущение жжения.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при кандидозе кишечника - по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение недели; детям - по 1 таблетке 2 раза в сутки. Местно, взрослым при кандидозе ротовой полости - по 1 мл суспензии 4-6 раз в сутки на пораженную область, в начале лечения - по 0,5 мл каждый час. Детям - по 0,5 мл суспензии 4-6 раз в день (максимально в

сутки - до 4 мл). При дерматомикозах (в т.ч. кандидозы кожи, ногтей, опрелость у детей) крем или суспензию наносят на пораженную поверхность один или несколько раз в день, при отомикозах - по 2-3 мл суспензии или смазывание кремом один или несколько раз в день (перед применением очищают ухо, а после применения помещают в слуховой проход тампон из хлопка или шерсти). При баланопостите - крем наносят на пораженные участки кожи один или несколько раз в сутки. После исчезновения симптомов лечение рекомендуется продолжить еще несколько дней. Вагинально, при вагинитах, вульвовагинитах - по 1 суппозиторию в течение 3-6 дней (суппозиторий вводят во влагалище в положении лежа, как можно глубже 1 раз в сутки, на ночь). Во время менструации лечение прерывают. При упорном течении вагинитов - дополнительно принимают таблетки (1-4 раза в сутки в течение 10-20 дней) и используют крем при кандидозе половых органов партнера.

Предост.: При использовании суспензии флакон необходимо встряхивать.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Пиносол (Pinosol®)

Сост. и ф.в.: В 10 г раствора масла сосны обыкновенной 375,2 мг, масла мяты перечной 100 мг, эвкалиптового масла 50 мг, тимола 3,2 мг, азулена 2 мг, токоферола ацетата 170 мг, бутилгидроксанизола 1,2 мг, лабрафила М 1 г и фритола до 10 г; во флаконах по 10 мл с пробкой-капельницей.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое, стимуляция роста грануляций.

Показ.: Насморк, острые и хронические воспаления слизистой носа, носоглотки, трахеи, бронхов, особенно при простудных заболеваниях.

Противопоказ.: Детский возраст (до 1 года).

Поб. действ.: Ощущение жжения, покалывания после закапывания препарата.

Примен. и доз.: Интраназально и ингаляционно; несколько капель в обе ноздри с интервалом 1 ч; ингаляционно - по 2 мл 2 раза в день. Детям - по 1-2 капли 3-4 раза в день.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Пиперазина адипинат (Piperazini adipinas)

Пиперазин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пиперазина адипината 0,2 или 0,5 г; в упаковке 50 и 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антигельминтное.

Показ.: Аскаридоз, энтеробиоз.

Противопоказ.: Органические заболевания ЦНС.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Тошнота, боли в животе, головная боль, мышечная слабость, тремор.

Примен. и доз.: Внутрь, 2 раза в день за 1 ч или спустя 0,5-1 ч после еды в течение 2 дней; при аскаридозе - по 1,5-2 г на прием; детям до 1 года - по 0,2 г, от 2 до 3 лет - по 0,3 г, 4-5 лет - по 0,5 г, 6-8 лет - по 0,75 г, 9-12 лет - по 1 г, 13-15 лет - по 1,5 г на прием.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Пипольфен (Pipolphen®)

Прометазин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит прометазина гидрохлорида 25 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 50 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, снотворное, седативное, противорвотное, блокада H₁-гистамино- и м-холинорецепторов.

Показ.: Аллергические заболевания (кожная сыпь, зуд, пруриго, экзема, бронхиальная астма, анафилактический шок, экссудативный диатез, астматический бронхит, ложный круп, сыпороточная болезнь, медикаментозная аллергия), беспокойство, неврозы, психозы, вызванные нейролептиками, экстрапиримидные расстройства.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, коматозное состояние, алкогольная интоксикация, беременность, лактация, возраст (до 2 мес).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сонливость, ортостатическая гипотония, запор, сухость во рту, гиперактивность, беспокойство, экстрапиримидные расстройства, парез аккомодации, агранулоцитоз, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает действие анальгетиков, антидепрессантов, седативных и гипотензивных препаратов. Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 12,5-25 мг 3-4 раза в сутки в дневные часы и 50 мг вечером; для седации (до и после хирургических вмешательств и гинекологических операций) - однократно 25-50 мг. Детям от 2 до 12 мес - 6,25 мг, с 1 до 6 лет - 12,5 мг, от 6 до 14 лет - 25 мг 3-4 раза в день. В/м, взрослым за 2,5 ч до операции - 50 мг (в составе литической смеси), через 1 ч дозу можно повторить; детям всех возрастных групп - 0,5-1 мг/кг массы тела 3-5 раз в день, в/в - 0,15-0,3 мг/кг.

Произв.: Egis (Венгрия)

Пипортил (Piportil®)

Пипотиазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пипотиазина 10 мг; в упаковке 20 и 500 шт.

1 капля 4% раствора для приема внутрь - 1 мг; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое.

Фармакокин.: Всасывается быстро, биодоступность - около 40%. C_{max} в крови - через 1-2 ч после приема. $T_{1/2}$ - 4-5 суток. Выводится в основном через кишечник, с участием желчной экскреции; 5-10% выводится через почки.

Клин. фарм.: Оказывает общее воздействие на комплекс психотических процессов - уменьшает психотическую симптоматику, редуцирует психотический страх, деперсонализацию, психомоторное возбуждение, агрессивность, противоречивость, устраняет психомоторную заторможенность. Действует более продолжительно, чем другие нейролептики. Обладает удовлетворительной переносимостью.

Показ.: Хронические психозы, дефицитарная или параноидная формы шизофрении, гебефрения, хронические галлюцинаторные и аффективно-бредовые состояния. Острые психозы и острые кризисы хронических психозов - маниакальные приступы, приступы бреда различного рода, состояния возбуждения.

Противопоказ.: Токсический агранулоцитоз в анамнезе, закрытоугольная глаукома, порфирия, заболевания простаты.

Бер. и корм. гр.: Безвредность применения у беременных и при кормлении грудью не установлена.

Поб. действ.: Подавленность, дискинезии: ранняя (спазматическая кривошея, окуломоторный криз, тризм) и поздняя дискинезии, экстрапирамидные нарушения, ортостатическая гипотония, сухость во рту, запор, парез аккомодации, за-

держка мочи, импотенция, фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, гиперпролактинемия, увеличение массы тела, гипертермия, холестатическая желтуха, фотосенсибилизация, агранулоцитоз (крайне редко).

Передоз.: Возможно возникновение острого синдрома паркинсонизма и комы. Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 раз в день, обычно утром. Начальная доза - 10 мг, средняя терапевтическая доза - 20-30 мг. При необходимости дозировку можно увеличить до 60 мг/сутки и при возможности вернуться к средним терапевтическим дозам.

Предост.: При появлении гипертермии лечение немедленно прекращают. Особо тщательное наблюдение требуется при лечении эпилепсии (в связи с возможным понижением эпилептогенного порога) и паркинсонизма. Осторожность необходима при назначении у пожилых пациентов (седативный и гипотензивный эффекты), при сердечно-сосудистых заболеваниях, почечной или печеночной недостаточности, у водителей транспорта и лиц, работающих с механизмами (сонливость и снижение реакции, особенно в начале лечения).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Пипортил Л4 (Piportil® L4)

Пипотиазин*

Сост. и ф.в.: Ампула с 1 или 4 мл раствора в масле для внутримышечных инъекций содержит пипотиазина пальмитата 25 или 100 мг соответственно; в упаковке 3 и 50 или 1 и 50 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое.

Клин. фарм.: Оказывает общее воздействие на комплекс психотических процессов - уменьшает психотическую симптоматику, редуцирует психотический страх, деперсонализацию, психомоторное возбуждение, агрессивность, противоречивость, устраняет психомоторную заторможенность. Активное вещество препарата медленно высвобождается при гидролизе пальмитата в месте введения, что позволяет отказаться от ежедневных инъекций.

Показ.: Хронические психозы, бредовые расстройства, шизофрения.

Противопоказ.: Токсический агранулоцитоз в анамнезе, закрытоугольная гла-

укома, порфирия, заболевания простаты.

Бер. и корм. гр.: Безвредность применения не установлена.

Поб. действ.: Подавленность, дискинезии: ранняя дискинезия (спазматическая кривошея, окуломоторный криз, тризм), экстрапирамидные нарушения; поздняя дискинезия. Ортостатическая гипотония, сухость во рту, запор, парез accommodation, задержка мочи; импотенция, фригидность, аменорея, галакторея, гинекомастия, гиперпролактинемия, увеличение массы тела; гипертермия, холестатическая желтуха, фотосенсибилизация, агранулоцитоз (крайне редко).

Передоз.: Может развиваться паркинсонизм и кома. Лечение - симптоматическое.

Примен. и доз.: Инъекции пипортила L4 назначают после приема пипортила внутрь. Вводить глубоко в/м (избегать попадания в вену) сначала в стационарных условиях, затем амбулаторно - 25-200 мг (1-8 мл) 1 раз в месяц. У пожилых пациентов и больных, страдающих эпилепсией, энцефалопатией и алкоголизмом, первоначальная доза составляет 25 мг и увеличивается по мере необходимости. У детей в зависимости от возраста первоначальная доза составляет 12,5-50 мг, с последующим увеличением - до 25-100 мг.

Предост.: При появлении гипертермии назначение немедленно прекращают. Особо тщательное наблюдение требуется при лечении эпилепсии (в связи с возможным понижением эпилептогенного порога) и паркинсонизма. Осторожность необходима при назначении у пожилых пациентов (седативный и гипотензивный эффекты), при сердечно-сосудистых заболеваниях, почечной или печеночной недостаточности, у водителей транспорта и лиц, работающих с механизмами (сонливость и снижение реакции, особенно в начале лечения).

Произв.: Rhône-Poulenc Roger (Франция-США)

Пипрацил (Pipracil)

Пиперациллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным сухим веществом для приготовления инъекционного раствора содержит пиперациллина натриевой соли 2 или 4 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: После в/м введения (при пероральном приеме не адсорбиру-

ется) C_{max} в плазме достигается через 30 мин. $T_{1/2}$ - от 36 мин до 1 ч 12 мин. 16% связывается с белками плазмы крови. Хорошо проникает во все ткани и жидкости организма, включая кости, предстательную железу, при менингитах проникает через ГЭБ. Экскретируется преимущественно почками в неизмененном виде, создавая высокую концентрацию в моче. В первые 24 ч с мочой выводится от 20 до 60% препарата. При незначительных повреждениях почек время $T_{1/2}$ возрастает в 2 раза, а при тяжелых - в 5-6 раз.

Фармакодин.: Активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая энтерококки (*S. faecalis*), облигатных анаэробов, бактероидов, *C. difficile* и грамотрицательных бактерий: *Enterobacteriaceae*, *Klebsiella*, *Serratia*, *Pseudomonas*, *E. coli*, *Proteus*, *Citrobacter*, анаэробов, энтерококков, а также бета-лактамазопroduцирующего гонококка. Ингибирует синтез пептогликана клеточной стенки бактерий.

Показ.: Инфекции: интраабдоминальные; урогенитальные (в т.ч. эндометрит, тазовый целлюлит); нижних дыхательных путей; кожи и мягких тканей; костей и суставов; септицемия (в т.ч. бактериемия); гонорея; профилактика при хирургических интраабдоминальных процедурах, вагинальных и абдоминальных гистерэктомиях, кесаревом сечении.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к цефалоспорином и другим пенициллинам).

Бер. и корм. гр.: Допустимо. Во время беременности применяется строго по показаниям, у кормящих матерей - с осторожностью, так как экскретируется (хотя и в незначительных количествах) с молоком.

Поб. действ.: Головная боль, парестезии, утомление; тошнота, рвота, диарея, нарушения стула; аллергические реакции: зуд, сыпь; редко - псевдомембранозный колит, интерстициальный нефрит, гипербилирубинемия, повышение печеночных ферментов, суперинфекция, включая кандидоз, геморрагические проявления, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, эозинофилия; местно - тромбоз флебит.

Взаим.: Увеличивает длительность миорелаксации, вызванной антидеполяризующими миорелаксантами.

Примен. и доз.: В/м, разводят 1 г в 2 мл раствора до получения концентрации 1 г на 2,5 мл, вводится не более 2 г в одно место инъекции. В/в, капельно в течение 20-30 мин, или в/в, медленно в

течение 3-5 мин, растворяя 1 г в 5 мл растворителя. Взрослым: максимальная доза - 24 г в сутки за 3 или 4 введения (каждые 8 или 6 ч) в течение 7-10 дней, при гинекологических инфекциях - 3-10 дней. При острых инфекциях терапию проводят в течение 48-72 ч после исчезновения симптомов; при инфекциях, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, - в течение 10 дней. Пациентам, находящимся на гемодиализе, назначают до 6 г в сутки (2 г каждые 8 ч).

Предост.: Не рекомендуется смешивать с аминогликозидами в одном шприце. При развитии аллергических реакций или кровотечения препарат отменяют. При в/в введении возможно повышение нервно-мышечной возбудимости и развитие судорог.

Произв.: Wyeth-Lederle (США)

Пиралвекс (Pyralvex®)

Сост. и ф.в.: 100 мл спиртового раствора для наружного применения или геля содержат сухого очищенного натриевого экстракта ревеня 5 г и салициловой кислоты 1 г; раствор во флаконах с кисточкой по 10 и 25 мл, гель в тубиках по 15 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антибактериальное.

Показ.: Воспаления слизистой оболочки полости рта (стоматиты, гингивиты, афты, последствия хирургических вмешательств), раздражение от протезов, болезненный рост зубов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (грудные дети).

Поб. действ.: Желтое окрашивание зубов (кратковременное).

Примен. и доз.: Раствор - кисточкой, смоченной раствором, смазывать слизистую ротовой полости в пораженном месте 2-4 раза в день (не полоскать рот после смазывания); гель - нанести небольшое количество на слизистую и слегка втирать 2-4 раза в день.

Произв.: Norgine Pharma (Франция)

Пирацетам (Pyracetamum)

Пирацетам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пирацетама 0,4 г; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное.

Показ.: Хронические и острые нарушения мозгового кровообращения, коматозные и субкоматозные состояния после травм и интоксикаций головного мозга,

заболевания ЦНС, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций, депрессии различной этиологии, психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии; в качестве вспомогательного средства при плохой переносимости нейрорепарантов с целью устранения или предотвращения вызываемых ими сомато-вегетативных, неврологических или психических осложнений; для купирования абстинентных, пре- и делириозных состояний при алкоголизме и наркомании, в случае отравления алкоголем, морфином и т.д.

Противопоказ.: Острая почечная недостаточность, беременность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Повышенная раздражительность, возбудимость, нарушение сна, диспептические явления, у пожилых обострение стенокардии.

Примен. и доз.: Внутрь, при хронических состояниях - 1,2-2,4 г в сутки (до 3,2 г в сутки и более) в 3-4 приема. Курс - от 2-3 нед до 2-6 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Пирацетам (Pyracetamum)

Пирацетам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пирацетама 0,2 г; в упаковке 120 шт.

1 капсула - 0,4 г; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное.

Показ.: Хронические и острые нарушения мозгового кровообращения, коматозные и субкоматозные состояния после травм и интоксикаций головного мозга, заболевания ЦНС, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций, депрессии, психоорганический синдром с признаками астении и адинамии; для купирования абстинентных, пре- и делириозных состояний при алкоголизме и наркомании, отравления алкоголем, морфином и т.д.

Противопоказ.: Почечная недостаточность, беременность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Повышенная раздражительность и возбудимость, бессонница, диспепсия, стенокардия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1,2-2,4 г в сутки (до 3,2 г) в 3-4 приема. Курс - от 2-3 нед до 2-6 мес.

Произв.: Акрихин (Россия); Олайнфарм (Латвия)

Пирвиниум (Pyrvinium)

Пирвиния эмбонат

Сост. и ф.в.: 10 мл суспензии для приема внутрь содержат пирвиния (в форме эмбоната) 100 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антигельминтное.

Фармакодин.: Активен в отношении остриц; блокирует ферментные системы гельминтов.

Показ.: Энтеробиоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кишечника, нарушения опорожнения желудка (в т.ч. при пилоростенозе), возраст (до 3 мес).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, окрашивание кала в красный цвет, кожная сыпь, фотодерматоз.

Примен. и доз.: Внутрь, однократно, утром после легкого завтрака или через 2-3 ч после еды, запивая водой или фруктовым соком, в дозе 5 мг/кг.

Предост.: Лечить следует всех членов семьи или весь детский коллектив. При положительных контрольных пробах курс рекомендуется повторить через 6-8 нед. Окрашивает белье в красный цвет. Перед употреблением суспензию необходимо хорошо взболтать.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Пиридитол (Pyriditolum)

Пиритинол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пиридитола 0,1 г; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное.

Фармакодин.: Усиливает обменные процессы в мозговой ткани, повышает усвоение и метаболизм глюкозы, обмен нуклеиновых кислот, активность ряда ферментов и медиаторных систем мозга, устойчивость мозга к гипоксии.

Показ.: Остаточные явления нарушений мозгового кровообращения, расстройства памяти, мышления, задержка психического развития, цереброастенический синдром, энцефалопатия у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, психомоторное возбуждение, эпилепсия, повышенная судорожная готовность.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Нарушение сна, повышенная возбудимость, диспептические явления, кожные аллергические реакции.

Редко - головокружение, головная боль, холестаза.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 0,1-0,2 г 3 раза в сутки, детям - 0,05-0,3 г.

Произв.: Акрихин (Россия)

Пиридоксина гидрохлорид (Pyridoxini hydrochloridum)

Пиридоксин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит пиридоксина гидрохлорида 10 или 50 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 2 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витамина В₆.

Показ.: Гиповитаминоз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипохромная и микроцитарная анемии, паркинсонизм, хорея, токсикоз беременных, гепатит, дерматит, экссудативный диатез, нейродермиты, псориаз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, при паркинсонизме - 100 мг/сутки; при анемии - 1 мл 2 раза в неделю. Внутрь, по 2-5 мг/сутки; детям - по 2 мг/сутки. Курс - 1-2 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Пиркон (Pyrcon®)

Пирвиния эмбонат

Сост. и ф.в.: 5 мл (1 мерная ложка) суспензии для приема внутрь содержат пирвиния эмбоната 75 мг (что соответствует 50 мг пирвиния основания); во флаконах по 25 мл.

Фарм. действ.: Антигельминтное.

Клин. фарм.: В период приема не требуется соблюдения особой диеты или приема слабительных средств.

Показ.: Инвазия острицами (энтеробиоз, оксиуриаз).

Противопоказ.: Воспалительные заболевания кишечника, нарушение опорожнения желудка; детский возраст (до 3 мес).

Бер. и корм. гр.: При дозировании препарата для беременных исходят из массы тела женщины до беременности.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, окрашивание стула в красный цвет.

Примен. и доз.: Внутрь, однократно, перед употреблением следует взболтать; можно разбавить водой или фруктовым соком; при дозировании мерную ложку наполняют до края (5 мл, что соответствует массе 10 кг) или до отметки "1/2" (2,5 мл, что соответствует массе 5 кг). Дозу устанавливают в зависимости от массы тела. Взрослым (свыше 60 кг) - по 6-8 мерных ложек (30-40 мл); детям (во время или после завтрака): 3 мес (5 кг и более) - по 1/2 мерной ложки (2,5 мл), 1-2 года (10 кг и более) - по 1 мерной ложке (5 мл), 3-4 года (15 кг и более) - по 1,5 мерные ложки (7,5 мл), 5-6 лет (20 кг и более) - 2 мерные ложки (10 мл), 7-8 лет (25 кг и более) - 2,5 мерные ложки (12,5 мл), 9-10 лет (30 кг и более) - 3 мерные ложки (15 мл), 11-12 лет (35 кг и более) - 3,5 мерные ложки (17,5 мл), 13-14 лет (40 кг и более) - 4 мерные ложки (20 мл), 14-15 лет (50 кг и более) - 5 мерных ложек (25 мл). При необходимости - повторный прием через 2 нед.

Предост.: Следует учитывать, что в 1 мерной ложке содержится 1,2 об.% алкоголя, а обычная доза для взрослых содержит около 6 г сахара (96 кДж или 23,4 ккал). При попадании суспензии на одежду возникают трудности удаления пятна.

Произв.: Krewel Meuselbach (Германия)

Пироксикам (Piroxicam)

Пироксикам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пироксикама 10 или 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, тендовагинит, травмы мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, подагра, невралгии, острые болевые синдромы корешкового происхождения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, почечная и печеночная недостаточность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, нарушения функции печени и почек, головная боль, сонливость или бессонница, депрессия, отеки лодыжек, фотосенсибилизация, сыпь.

Взаим.: Ослабляет действие диуретиков. В сочетании с антикоагулянтами

снижает способность тромбоцитов к агрегации.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 - 40 мг в день в 1-2 приема.

Предост.: Следует исключить употребление спиртных напитков.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Пирроксан (Pyrrroxanum)

Пророксан*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пророксана гидрохлорида 15 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Седативное, гипотензивное, антиабстинентное, противозудное, блокада альфа-адреноблокаторов.

Показ.: Аллергические дерматозы, морская болезнь, морфинная абстиненция, гипертонический криз, диэнцефальный криз.

Противопоказ.: Тяжелые формы атеросклероза, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, застойная сердечная недостаточность, возраст (до 6 мес).

Поб. действ.: Гипотония, брадикардия, стенокардия.

Примен. и доз.: Внутрь, для купирования диэнцефальных и гипертонических кризов - по 15-30 мг 1-3 раза в день. Для профилактики синдрома укачивания - по 15-30 мг за 30-40 мин до полета. При морфинной абстиненции - по 45 мг 3 раза в день в течение 5 дней. Высшие дозы: разовая - 60 мг, суточная - 180 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Плазма-Лит 148 Водный Раствор (Plasma-Lyte 148 Solution in Water)

Сост. и ф.в.: 1 л стерильного, апиrogenного раствора для в/в введения содержит натрия хлорида 5,26 г, калия хлорида 370 мг, натрия ацетата 3,68 г, натрия глюконата 5,02 г, магния хлорида 300 мг, воды для инъекций до 1 л; в пластиковых контейнерах по 500 и 1000 мл.

Фарм. действ.: Плазмозамещающее, восполнение дефицита жидкости и электролитов. Коррекция кислотно-щелочного равновесия.

Показ.: Дегидратация различного происхождения, потеря жидкости при ожогах, перитонитах, кишечной непроходимости.

Противопоказ.: Отеки, гипертоническая дегидратация, тяжелая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: В/в. Дозировка зависит от возраста, массы тела и клинического состояния пациента.

Произв.: Baxter (США)

Плаквенил (Plaquenil®)

Гидроксихлорохин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит гидроксихлорохина сульфата 200 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Иммунодепрессивное.

Показ.: Артрит (ревматический, юношеский, хронический), красная волчанка, заболевания кожи, связанные с повышенной чувствительностью к солнечному свету.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, макулопатия, беременность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, нарушение зрения, повреждения сетчатой оболочки глаза, отложения в роговице, алоpecia, депигментация кожи и волос, нервно-мышечная блокада, угнетение кроветворения, шум в ушах, тугоухость, головокружение, головная боль, нервозность, психоз.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды. При ревматоидном артрите - по 400 мг в день дробными дозами в течение 4-12 нед. При красной волчанке - начальная доза - 400 мг в день; поддерживающая доза - 200-400 мг в день. Минимальная эффективная доза - 6,5 мг/кг.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Плантекс (Plantex®)

Сост. и ф.в.: 100 г растворимого чая для детей содержат экстракта плодов фенхеля 55 г, отдушки фенхеля с 16% эфирного масла 0,3 г, глюкозы 50 г, лактозы 44,7 г; в пакетах по 5 г. Энергетическая ценность 100 г составляет 1584 кДж (379 ккал).

Фарм. действ.: Ветрогонное, сокогонное, спазмолитическое, снижение газообразования в кишечнике.

Показ.: Метеоризм, нарушение пищеварения у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не отмечены.

Примен. и доз.: Внутрь. Грудным детям - 5 г растворяют в 100 мл кипятка или горячего молока и дают в качестве самостоятельного напитка или с едой. Маленьким детям - 10 г растворяют в 100-

150 мл кипяченой воды. Чай не подслащивают.

Произв.: Lek (Словения)

Платимит (Platimit)

Цисплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цисплатина 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Метастазирующая злокачественная опухоль яичка или яичников (в сочетании с др. цитостатиками), прогрессирующий рак мочевого пузыря, рак шейки матки, легкого, плоскоклеточный рак головы и шеи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения функции почек, нарушения слуха, миелосупрессия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, нейротоксичность, нефротоксичность, ототоксичность, миелосупрессия, нарушения зрения, нарушение электролитного баланса, поражение кровеносных сосудов, гиперурикемия, анафилактоидные реакции.

Примен. и доз.: В/в, медленно, в течение 6-8 ч - по 50-100 мг/кв.м поверхности тела каждые 3-4 нед или по 15-20 мг/кв.м в сутки однократно в течение 5 дней; курс повторяется каждые 3-4 нед. При нарушении функции печени рекомендуется назначать более низкие дозы.

Предост.: Необходимы интервалы между курсами (не менее 3-4 нед). Рекомендуется использование только в специализированных стационарах.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Платинол (Platinol®)

Цисплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с раствором для инъекций содержит цисплатина 10, 25 или 50 мг; во флаконах по 10, 50 или 100 мл соответственно.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, алкилирующее.

Показ.: Метастазирующие опухоли яичка и яичника, поздние стадии рака мочевого пузыря.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к другим препаратам, содержащим платину), нарушение функции почек и слуха, миелосупрессия.

Поб. действ.: Нефротоксичность (индукция почечной недостаточности), ототоксичность (тиннит, тугоухость), миелосупрессия, выраженная тошнота,

рвота, анорексия, снижение электролитов (Mg, Ca, K) и повышение мочевой кислоты в сыворотке крови, гипофосфатемия, периферические нейропатии, потеря вкуса, судороги, анафилактические реакции (отек лица, бронхоспазм, тахикардия, снижение АД и др.).

Примен. и доз.: В/в, инфузия в течение 6-8 ч; опухоли яичка - по 20 мг/кв.м поверхности тела ежедневно в течение 5 дней, 3 курса с интервалом в 3 нед в сочетании с блеомицином и винбластином; опухоли яичника - по 50 мг/кв.м 1 раз в 3 нед в сочетании с доксорубицином или по 100 мг/кв.м с интервалом в 4 нед для монотерапии; рак мочевого пузыря - по 50-70 мг/кв.м с интервалом в 3-4 нед. Перед употреблением содержимое флакона растворяют в 2 или 5% глюкозы на физиологическом растворе. Перед введением препарата (за 8-12 ч) рекомендуется гидратация больных (1-2 л жидкости).

Предост.: Необходим еженедельный контроль картины крови, периодическая проверка функции почек и печени, регулярное неврологическое и аудиометрическое обследование. Повторные дозы препарата не следует назначать до подтверждения нормальных пределов остроты слуха. Повторные курсы не проводят, если креатинин сыворотки менее 1,5 мг/100 мл или не нормализовался клеточный состав крови (тромбоциты до > 100000/куб.мм, лейкоциты до > 4000/куб.мм). При приготовлении и введении раствора необходимо исключить контакт с инструментами (иглы, системы), содержащими алюминий (реакция с выпадением осадка и потерей активности).

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Плендил (Plendil®)

Фелодипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с пролонгированным высвобождением содержит фелодипина 5 или 10 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, артериолодилатирующее, диуретическое (натрийуретическое), блокада кальциевых каналов.

Показ.: Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, гиперемия кожи лица, сердцебиение, гипотония, отечность в области голеностопного сустава,

незначительное увеличение десен (на фоне гингивита или периодонтита), кожная сыпь и зуд.

Взаим.: Циметидин увеличивает (на 50%), фенитоин, карбамазепин, барбитураты снижают концентрацию в плазме.

Передоз.: Симптомы: выраженная гипотензия, брадикардия. Лечение при гипотонии: симптоматическое (пациент переводится в горизонтальное положение на спине); при брадикардии - в/в 0,5-1 мг атропина, инфузия глюкозы, солевого раствора или декстрана; альфа1-адреномиметики.

Примен. и доз.: Внутрь, таблетки проглатывать целиком (не крошить, не жевать), запивая водой, начиная с 5 мг, затем - по 5 или 10 мг (поддерживающая доза), однократно утром.

Произв.: Astra (Швеция)

Пленка с линкомицином (Membranula cum lincosucino)

Линкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 стерильная салфетка из биорастворимого трикотажного полотна содержит линкомицин с активностью не менее 300 мг/г. Салфетки размером 10,5 x 7,5 см (для хирургической практики) или 4 x 1 см (для стоматологической практики), в полиэтиленовой или полиэтилцеллофановой упаковке.

Фарм. действ.: Антибактериальное, гемостатическое местное, стимуляция регенерации тканей.

Клин. фарм.: Обладает выраженным гемостатическим действием (но кровотечения из крупных сосудов не купирует), не вызывает местного раздражения, не кумулирует (полностью рассасывается в течение месяца), усиливает регенерационные процессы в месте наложения/имплантации. Линкомицин, входящий в состав пленки, угнетает в течение длительного времени рост грамположительных микробов (стафилококков, в т.ч. устойчивых к другим антибиотикам, стрептококков и пневмококков, палочки дифтерии, некоторых анаэробов, в т.ч. возбудителей газовой гангрены и столбняка).

Показ.: Остановка и профилактика паренхиматозных и капиллярных кровотечений, кровотечений из костей и мышц (при операциях на органах гепатобилиарной системы, опорно-двигательном аппарате, хирургическом лечении гнойно-воспалительных заболеваний различной

этиологии и др. Гнойно-воспалительные заболевания полости рта: пародонтиты средней и тяжелой степени, периостит, периодонтит и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Местно. В хирургической практике - в зависимости от характера и величины раневой поверхности, применяют в виде салфетки или сделанного из нее тампона, которые накладывают на кровотокающую поверхность в 1-2 слоя. При необходимости (для профилактики повторного кровотечения и гнойно-воспалительных явлений) оставляют в ране в виде одно- или двухслойной полоски. Обычно используют 1-5 салфеток препарата (исходя из величины раны, площади и силы кровотечения, опасности возникновения гнойных осложнений). Для лечения пародонтитов и других гнойно-воспалительных процессов в полости рта вводят рыхло в патологический зубодесневой карман до его дна. Первую имплантацию осуществляют на одни сутки. Последующие имплантации проводят 1 раз в двое суток и сопровождают фиксирующей повязкой.

Предост.: При извлечении пленки из упаковки необходимо сохранить ее стерильность. Не рекомендуется слишком плотно накладывать на раны.

Произв.: Борисовский ЗМП (Беларусь)

Плибекот (Plibekot)

Беклометазон*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит беклометазона дипропионата 50 мкг; в аэрозольных баллонах по 200 доз.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное (местное).

Показ.: Профилактика и лечение бронхиальной астмы (у детей и взрослых).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые приступы бронхиальной астмы.

Поб. действ.: Охриплость голоса, ощущение раздражения в горле, парадоксальный бронхоспазм, кандидоз полости рта и глотки.

Примен. и доз.: Ингаляционно, после ингаляции ротовую полость рекомендуют прополоскать водой. Дозы устанавливают индивидуально. Взрослым - обычно по 4 ингаляции (200 мкг) 2 раза в сутки или 2 ингаляции (100 мкг) 3-4 раза в сутки; в тяжелых случаях - до

600-800 мкг в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых - не более 1 мг. Детям - по 50-100 мкг 2-4 раза в сутки. Максимальная суточная доза для детей до 12 лет - не более 500 мкг. Рекомендуется регулярный прием препарата.

Предост.: С осторожностью следует назначать при активном туберкулезе легких.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Пливалгин (Plivalgin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит парацетамола и пропифеназона по 210 мг, кофеина 50 мг, фенobarбитала 25 мг и кодеина фосфата 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгетическое, жаропонижающее, седативное.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 30 мин после приема.

Показ.: Головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, неврит, полиневрит, ишиалгия, миалгия, артралгия, дисменорея, простуда, грипп и др. инфекции, сопровождающиеся лихорадкой.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Следует избегать назначения при беременности, особенно в первые 3 мес и в последние 4 нед. Кормление грудью во время лечения необходимо прекратить (компоненты препарата проникают в грудное молоко).

Поб. действ.: Сонливость, слабость.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1-2 таблетки на прием; при необходимости - до 6 таблеток в день в 3-4 приема. Детям - по 1/4-1/2 таблетки 1-4 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают лицам, профессия которых требует повышенного внимания.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Пливасепт (Plivasept)

Хлоргексидин*

Сост. и ф.в.: 1 мл концентрата для наружного применения (окрашенный или неокрашенный, с ПАВ) содержит хлоргексидина 50 мг; во флаконах по 1 л и канистрах по 5 л.

1 г крема - 10 мг; в тубах по 50 г.

1 г эмульсии для наружного применения 10 мг; во флаконах по 200 мл.

1 мл настойки для наружного применения - 200 мг; во флаконах с распылителем по 250 мл; во флаконах с дозатором по 500 мл и в канистрах по 5 л.

1 мл пенообразующего раствора для наружного применения - 45 мг; во флаконах с дозатором по 500 мл и в канистрах по 5 л.

1 мл раствора для внутриполостного введения (Пливасепт-глюконат) - 50 мг; во флаконах по 1 л и канистрах по 5 л.

Фарм. действ.: Дезинфицирующее, антисептическое, антибактериальное, противовирусное (включая вирусы СПИДа и гепатита В), антипротозойное, противогрибковое (фунгицидное).

Показ.: Антисептическая обработка кожи, дезинфекция медицинского оборудования и инструментов (водные и водно-спиртовые растворы с ПАВ и без ПАВ), обработка рук оперирующего персонала, операционного поля (водно-спиртовые растворы с ПАВ и без ПАВ, настойка, пенообразующий раствор), обработка ран, ожогов, послеоперационных швов (стерильные водные растворы с ПАВ и без ПАВ), промывание глаз, мочевого пузыря и других полостей тела (растворы без ПАВ), лечение и профилактика диабетических язв стоп (негрибковой этиологии), лечение пиодермии, импетиго, паронихии, панариция, опрелостей, простых угрей; обработка микротравм, царапин, ссадин и ожогов (нулевой степени) кожи рук; уход за кожей рук медицинского персонала (крем), мануальные и инструментальные исследования в гинекологии, акушерстве, урологии, проктологии; вульвовагиниты и вагиниты (обусловленные условно-патогенными микробами); профилактика венерических заболеваний (эмульсия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Наружно. Водный и спиртовой растворы готовят и применяют в соответствии с показаниями, крем или эмульсию наносят на перчатки, инструменты и катетеры; при обработке кожи и слизистой наружных половых органов - стерильным ватным тампоном (5-10 мл), в случае самостоятельной обработки самим пациентом - гигиеническим тампоном или чисто вымытыми руками.

Предост.: Рекомендуются наносить на чистую, сухую кожу, тщательно смыв остатки мыла.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Повидон-йод (Povidone-Iodine)

Повидон-йодин

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для обработки операционного поля содержат ак-

тивного йода (в форме комплекса с поливинилпирролидом) 1 г; во флаконах по 100, 500 и 5000 мл.

100 мл раствора пенного для обработки операционного поля и рук хирурга - 0,75 г; во флаконах по 500 и 5000 мл.

100 мл раствора для полоскания рта и горла - 0,85 г; во флаконах по 50 мл.

100 г мази - 10 г; в тубах по 40 г.

1 вагинальный суппозиторий - 200 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое, дезинфицирующее.

Фармакокин.: Бактерицидное действие развивается быстро, обычно в течение 15-60 с. При контакте с кожей и слизистой комплекс поливинилпирролидон йода на 30% превращается в йодиды, а остальная часть - в бактерицидно активный йод. В соединении Повидон-йод содержится около 10% элементарного йода (9-11%), т.е. 7,5% повидон-йода содержат 0,75% элементарного йода.

Фармакодин.: Йод представлен в виде комплекса поливинилпирролидон йода, который относится к йодоформам, связывающим элементарный йод и служащим средством торможения высвобождения элементарного йода. Спектр антимикробного действия очень широк.

Показ.: До- и послеоперационная обработка рук хирурга, гигиеническое мытье рук медицинского персонала, обработка инструментов и предметов ухода за больным, пред- и послеоперационная обработка кожи и слизистой больного, до и после проведения исследований: инъекции, отбор крови, пункции и т.д.; для полоскания рта и горла при инфекциях носоглотки; в стоматологии - при хирургических вмешательствах, лечении зубов, челюстей, для подавления неприятного запаха из полости рта; для профилактики инфекций при ожогах, переломах, порезах, открытых ранах, пролежнях, язвах на коже недиабетиков, при пиодермии; для местного лечения монилиаза, трихомониаза, неспецифического вагинита.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, почечная недостаточность, аденома щитовидной железы, беременность, лактация. Не рекомендуется применять у новорожденных детей.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с другими дезинфицирующими средствами. Щелочность среды, присутствие жира, крови, гноя, веществ с кислой реакцией нивелируют антисептическую эффективность.

Передоз.: Может появиться раздражение в месте применения (необходимо сократить частоту использования).

Примен. и доз.: Используют неразбавленный раствор для смазывания, промывания и влажных компрессов. Для дезинфекции рук хирургического персонала - 5 мл неразбавленной пены втирают в руки около 5 мин, затем руки промывают водой с последующим повторным втиранием еще 5 мл препарата. Для дезинфекции кожи операционного поля - на бритую и увлажненную водой кожу наносят препарат и втиранием распространяют пену (1 мл достаточен для 50-70 см, втирание производят 5 мин), после удаления пены кожу смазывают неразведенным раствором и оставляют до высыхания. Полоскание рта и горла производят несколько раз в день, каждый раз предварительно размешав 1 чайную ложку раствора в 1/4 стакана воды. До применения вагинальных суппозиториев рекомендуется подмывание и дезинфекция; оптимальная дневная доза - 1-2 суппозитория, назначают сроком на 14 суток или по указанию врача. Мазь на пораженный участок кожи наносят тонким слоем 1 раз в день.

Предост.: Перед систематическим применением препарата провести пробное его использование. Не применяют в комплексе с другими антисептиками и мазями.

Произв.: Zorka (Югославия)

Позикор (Posicor)

Мибефрадил

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мибефрадила дигидрохлорида 50 или 100 мг.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, вазодилатирующее, блокада кальциевых Т- и L-каналов.

Фармакокин.: Всасывается быстро и полностью. Достигает максимальных концентраций в плазме через 1-2 ч. Биодоступность после однократного приема - 70%, биодоступность в равновесном состоянии - до 90% (при этом объем распределения - 200 л). Связывается с белками плазмы (альфа1-кислым гликопротеином) - до 99%. Метаболизируется путем гидролиза боковой эфирной цепи и окислением системой цитохрома P450. Элиминируется путем метаболической инактивации и экскреции с желчью (75%) и мочой (25%), при этом менее 3% выводится с мочой в неизмененном виде. Пероральный клиренс при хроническом приеме терапевтических доз - 9 л/ч.

Фармакодин.: Уменьшает периферическое сопротивление сосудов, снижает АД, урежает сердечный ритм, уменьшает нагрузку на сердце и потребность миокарда в кислороде, увеличивает снабжение миокарда кислородом (расширяя коронарные артерии). Не вызывает рефлекторной тахикардии.

Клин. фарм.: Действует постепенно, полный эффект достигается в пределах 1-2 нед. Гипотензия проявляется в положении сидя, стоя, лежа и продолжается на протяжении 24 ч. При длительном применении не наблюдается привыкания и синдрома отмены.

Показ.: Эссенциальная и почечная гипертензия; хроническая стабильная стенокардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синдром слабости синусового узла, АВ-блокада II или III степени (без искусственного водителя ритма), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности назначают в случае, когда преимущества для матери оправдывают возможный риск для плода. Во время лечения матери рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Поб. действ.: Головокружение, слабость, отеки ног; редко - брадикардия, АВ-блокада II степени.

Взаим.: Увеличивает плазменные концентрации терфенадина (не рекомендуется одновременный прием), циклоспорина А, хинидина, метопролола, а также препаратов, метаболизируемых цитохромами P450 2D6 и P450 3A4.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая (до, после или во время еды), начальная доза - 50 мг 1 раз в сутки (до 100 мг однократно в зависимости от реакции на лечение).

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с тяжелым аортальным стенозом, застойной сердечной недостаточностью, печеночной недостаточностью, нарушением сердечной проводимости (ЧСС - менее 50 ударов в минуту).

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Поливит бэби (Polyvit® Baby)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приема внутрь содержит витамина А 1500 МЕ, витамина D 400 МЕ, витамина Е (D1-альфа токоферол ацетата) 5 МЕ, витамина С 35 мг, витамина В₁ 0,5 мг, витамина В₂ 0,6 мг, витамина В₆ 0,4 мг, ниацина 8 мг и витамина В₁₂ 2 мкг; во

флаконах по 50 мл, в комплекте с дозатором.

Фарм. действ.: Компенсация дефицита витаминов.

Показ.: Гиповитаминоз у детей до 3 лет (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 мл в день или по предписанию врача. Можно добавлять в еду и питье ребенка.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Поливит гериатрик (Polyvit® geriatric)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина А (в том числе бета-каротина) 3333 МЕ, витамина D 200 МЕ, витамина Е (D₁-альфа токоферол ацетата) 15 МЕ, витамина С 60 мг, витамина В₁ 1,2 мг, витамина В₂ 1,4 мг, витамина В₆ 2 мг, никотинамида 15 мг, фолиевой кислоты В_с 200 мкг, витамина В₁₂ 2 мкг, витамина К 80 мкг, железа (фумарата) 10 мг, кальция (фосфата) 130 мг, фосфора (фосфата кальция) 100 мг, йода (йодида калия) 150 мкг, магния (оксида) 35 мг, цинка (оксида) 15 мг и селена 70 мкг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Компенсация абсолютного или относительного дефицита витаминов и минералов.

Показ.: Гиповитаминоз и минеральная недостаточность у людей старше 50 лет, пониженная сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям, повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка, неполноценное питание, неблагоприятные экологические условия, нарушение утилизации витаминов (рвота, диарея, курение, алкоголизм), атеросклероз, заболевания нервной системы, заболевания сосудов, катаракта, понижение остроты зрения, лучевая болезнь, анемия, сахарный диабет, послеоперационный период.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не развиваются при соблюдении режима дозирования.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - по 1 таблетке в день.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Полидан (Натрия нуклеоспермат) (Polydanum (Natrii nucleospermas))

Натрия нуклеоспермат

Сост. и ф.в.: 1 флакон 1,5% раствора для инъекций содержит натрия нуклеоспермата 0,075 г; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Лейкопозитическое.

Фармакокин.: Экскреция (T_{1/2} - 63-69 ч), в т.ч. метаболитов, осуществляется в основном почками (по экспоненциальной зависимости). Основная часть выводится в течение первых суток.

Фармакодин.: Ускоряет гранулоцитоз на стадии промиелоцитов и миелоцитов, увеличивает индекс созревания нейтрофилов, предупреждает развитие лейкопении и нейтропении и связанных с ними инфекционных осложнений.

Клин. фарм.: Уменьшается выраженность повреждения гранулоцитарного кроветворения, восстанавливает гематологические показатели, сниженные в результате химиотерапии опухолей цитостатическими средствами. Не обладает эмбриотоксическим, иммунотоксическим, мутагенным и тератогенным действием. Терапевтический эффект наступает в течение 3-10 дней (в зависимости от тяжести лейкопении).

Показ.: Лейкопения (профилактика и лечение) на фоне цитостатической терапии у взрослых больных со злокачественными новообразованиями, получающих химио- и лучевую терапию в интенсивном режиме.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Гиперемия и болезненность в месте инъекции, краткосрочное повышение температуры тела до 38 град.С, не требующее симптоматических средств.

Примен. и доз.: П/к (медленно - в течение 1-2 мин), предварительно подогреть флакон в руке до температуры тела. Разовая доза препарата (0,075 г) содержится в 1 флаконе. Максимальные суточная доза - 10 мл, максимальная курсовая - 150 мл.

Произв.: Фармэк+ (Россия)

Поликапран (Polycapranum)

Сост. и ф.в.: 1 стерильная салфетка из непрозрачного трикотажного полотна размером 7,5 x 10,5 см содержит 73,1% полиангидроглюкуроновой кислоты и

20,9% Е-аминокапроновой кислоты, в полиэтиленовой или полиэтиленцеллофановой упаковке.

Фарм. действ.: Гемостатическое, антифибринолитическое, стимуляция регенерации.

Клин. фарм.: Полностью рассасывается (не оказывая местного раздражающего действия) в течение 23-28 суток, что позволяет имплантировать его в организм. Е-аминокапроновая кислота ингибирует фибринолиз и предотвращает повторные кровотечения, связанные с распадом тромба.

Показ.: У взрослых - остановка и профилактика диффузных кровотечений различной локализации и этиологии (в т.ч. обусловленных активацией фибринолиза) при операциях на кровеносных сосудах, органах брюшной полости и забрюшинного пространства, грыжеиссечениях, ампутациях конечностей, нейрохирургических операциях, хирургических вмешательствах у больных с повышенным фибринолизом.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Передоз.: Не установлены.

Примен. и доз.: Местно; в зависимости от характера и величины раневой поверхности применяют в виде салфеток или сделанных из них тампонов, которые накладывают (с соблюдением правил асептики) на всю площадь кровоточащей поверхности обычно в 1-2 слоя. При необходимости - в случае возможного продолжения кровотечения - оставляют в ране до полного рассасывания.

Произв.: Борисовский ЗМП (Беларусь)

Полио Сэбин Веро (Polio Sabin Vero)

Сост. и ф.в.: Раствор для приема внутрь. 1 доза вакцины (2 капли или 0,1 мл) в мультидозной упаковке содержит вирусы полиомиелита: 1-го типа (штамм LS-c 2 ab) - не менее 1000000 ЦПД₅₀, 2-го типа (штамм Р 712, Ch, 2 ab) - не менее 100000 ЦПД₅₀, 3-го типа (штамм Leon 12 a 1b) - не менее 600000 ЦПД₅₀. В состав вакцины также входят: человеческий альбумин - 1%, фенол красный - q.s. для обеспечения окраски, одномолярный буферный раствор хлорида магния - q.s. 1 вакцинальная доза. Вакцина выпускается в ампулах по 1 дозе и во флаконах по 10 и 20 доз.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против полиовирусов.

Клин. фарм.: Иммунитет приобретается после первой пероральной дозы и усиливается после введения последующих 2-х доз. Сероконверсия наблюдается у 98-100% привитых. Имеются данные, указывающие на формирование местного иммунитета посредством стимуляции выработки IgA в слизистых оболочках носоглотки и кишечника у привитых, что позволяет предотвратить фекально-оральный путь передачи дикого полиовируса. Одним из преимуществ вакцины считается возможность создания коллективного иммунитета вследствие передачи вакцинного штамма невакцинированным лицам.

Показ.: Профилактика полиомиелита.

Противопоказ.: Врожденные и приобретенные иммунодефициты. Беременность (первые 5 мес).

Бер. и корм. гр.: Использование у беременных противопоказано. Однако, ее применение у женщин на ранних стадиях беременности (когда они не знали о том, что они беременны) не является показанием для прерывания этой беременности.

Примен. и доз.: Вакцинация проводится только пероральным способом. Вакцинальная доза: 0,5 мл (при использовании монодозной упаковки) или 2 капли (при использовании мультидозной упаковки), которые, при помощи входящей в комплект пипетки, вводятся либо непосредственно в рот, либо предварительно наносятся на кусок сахара или в сироп. В сомнительных случаях (например, при диарее) после выздоровления пациента рекомендуется введение повторной дозы. Вакцинация проводится по меньшей мере тремя вакцинальными дозами, вводимыми с интервалом не менее 4-х нед (за исключением периода эпидемии). В эндемичных районах, как можно раньше после рождения, ребенок должен получать дополнительную дозу. Ревакцинация проводится через 1 год после окончания курса вакцинации, затем каждые 5 лет. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, ВИЧ-инфицированные пациенты должны быть вакцинированы ПОЛИО СЭБИН ВЕРО в соответствии со стандартной схемой иммунизации вне зависимости от клинической симптоматики. Любая вскрытая упаковка вакцины должна быть использована в течение того же дня (при условии, что препарат хранился при температуре от 2 до 8 град.С.).

Предост.: Вакцинация должна проводиться строго перорально. Использовать

осторожно у лиц с аллергией на неомицин.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Полисорб МП® (Polysorbum MP)

Сост. и ф.в.: 1 одноразовый пакетик содержит 1 или 2 г полисорба; 1 полиэтиленовый пакетик - 50 г; 1 флакон - 12 г.

Фарм. действ.: Адсорбирующее, дезинтоксикационное, противомикробное, адаптогенное.

Фармакодин.: Сорбирует из ЖКТ микроорганизмы, эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы (включая продукты обмена веществ, пищевые аллергены, ядовитые соединения и др.).

Показ.: Острые кишечные инфекции (в т.ч. токсикоинфекции), пищевая и лекарственная аллергии, эндогенные и экзогенные интоксикации (включая острые отравления сильно действующими и ядовитыми веществами).

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Взаим.: Снижает эффект др. лекарственных средств (принимаемых одновременно).

Примен. и доз.: Внутрь, в виде приготовленной водной взвеси, за 1 ч до еды. При острых кишечных инфекциях и токсикоинфекциях разовая доза - 2-3 г 3 раза в сутки. При тяжелом диарейном синдроме разовая доза в первые сутки может быть увеличена до 4-6 г. Средняя суточная доза - 12 г. Курс лечения - 3-5 дней. При отравлении сильно действующими ядовитыми веществами, лекарственными препаратами, алкоголем, в зависимости от тяжести состояния - разовая доза из расчета 0,1-0,5 г/кг массы тела (в среднем 7-10 г) 2-3 раза в день. При тяжелых формах отравлений препарат вводят через зонд в предварительно промытый желудок каждые 4-6 ч в течение всей токсигенной фазы отравления. Максимальная доза - 24 г/сутки. При алкогольном абстинентном синдроме разовая доза - 2-4 г 3-4 раза в сутки в течение 3-4 дней. При пищевой и лекарственной токсикоинфекции разовая доза - 2-3 г 2-3 раза в сутки за 1 ч до еды или через 1,5-2 ч после приема пищи или лекарственных препаратов. Курс лечения - 10-15 дней. Перед каждым употреблением взвесь перемешивают.

Произв.: Полисорб (Россия)

Портаген (Portagen)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (67 ккал/100 мл) содержит белка 24 г, жиров 32 г, линолевой кислоты 2200 мг, углеводов 79 г, минеральных веществ 5 г, воды 905 г, витамина А 5300 ЕД, витамина D 530 ЕД, витамина Е 22 ЕД, витамина С 55 мг, фолиевой кислоты 108 мкг, тиамина 1050 мкг, рибофлавина 1220 мкг, ниацина 14400 мкг, витамина В₆ 1440 мкг, витамина В₁₂ 4,2 мкг, биотина 53 мкг, пантотеновой кислоты 7100 мкг, витамина К 108 мкг, холина 115 мг, кальция 630 мг, фосфора 480 мг, йода 50 мкг, железа 13 мг, магния 137 мг, цинка 7,5 мг, меди 1070 мкг, марганца 860 мкг, натрия 370 мг (16,3 мэкв), калия 850 мг (22 мэкв), хлоридов 750 мг (21 мэкв).

Фарм. действ.: Обеспечение организма питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Фармакодин.: Состав препарата специально адаптирован к ограниченным возможностям переваривания, усвоения жиров, улучшает их всасывание. Содержит жиры в виде среднецепочечных триглицеридов. В условиях дефицита пищеварительных ферментов, прежде всего панкреатической липазы и желчных кислот, эти триглицериды легче гидролизуются и всасываются по сравнению с триглицеридами с длинной цепью, находящимися в обычных пищевых жирах. Углеводы представлены полимерами глюкозы (лактоза отсутствует). Смесь обогащена витаминно-минеральным комплексом, соответствующим физиологическим потребностям детей раннего возраста. Низкая осмоляльность (210 мОсм/кг воды) обеспечивает высокую переносимость препарата.

Показ.: Нарушения пищеварения и всасывания жиров в кишечнике (стеаторея) у детей и взрослых при муковисцидозе, расстройствах функции поджелудочной железы (в т.ч. после ее резекции); дефицит желчных кислот, состояние после резекции тонкого кишечника, аномалии развития лимфатической системы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции, дискомфорт со стороны ЖКТ, диарея.

Примен. и доз.: Можно использовать как в качестве составного компонента диеты, так и в качестве единственного источника питания. Для приготовления

1 л смеси для детей первого года жизни (разведение 67 ккал/100 мл) добавляют 144 г сухого вещества к 900 мл кипяченой воды. Для приготовления напитка для детей старше года и взрослых (разведение 100 ккал/100 мл) растворяют 215 г сухого вещества в 850 мл кипяченой воды. Смесь вводят в рацион питания постепенно, начиная с 5-10 мл в сутки. При отсутствии признаков непереносимости объем препарата в течение 3-5 дней увеличивают до значений, соответствующих возрастным потребностям пациента. Режим и продолжительность применения препарата определяется врачом в зависимости от характера заболевания и состояния пациента. Перед употреблением смесь взбалтывают или перемешивают.

Предост.: Как детям, так и взрослым вначале следует принимать небольшие количества (порядка 1 ккал/мл), т.к. может появиться абдоминальный дискомфорт и/или диарея (гиперосмотичность), в этих случаях необходимо снизить потребление напитка или его калорийность (0,5-0,67 ккал/мл). При использовании препарата в качестве единственного источника питания обязательна коррекция водного баланса (поступление воды поддерживается на постоянном уровне). Допускается приготовление смеси для нескольких кормлений ребенка (но не более, чем на сутки, при условии хранения в холодильнике).

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Портал (Portal®)

Флуоксетин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флуоксетина гидрохлорида 20 мг; в упаковке 7, 14, 20 и 28 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, селективная блокада обратного захвата серотонина, антихолинергическое (слабое).

Фармакокин.: Хорошо всасывается. После приема однократной дозы утром (до еды) максимальная концентрация в плазме крови достигается через 6-8 ч. Характеризуется высокой степенью связывания с белками плазмы, большим объемом распределения и интенсивной диффузией в ткани. Метаболиты преимущественно в виде глюкуронидов экскретируются с мочой и калом. $T_{1/2}$ - 1-4 суток. Период полураспада препарата - от 2 до 3 дней, а его основного метаболита норфлуоксетина - 7-9 дней.

Клин. фарм.: Препарат не вызывает ортостатической гипотензии, не кардиотоксичен. У пациентов, страдающих диабетом, возможно возникновение гипогликемии (во время лечения) и гипергликемии (при отмене), поэтому необходима коррекция доз инсулина или гипогликемических средств.

Показ.: Депрессия (все типы и любая степень выраженности), навязчивые состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая почечная недостаточность (клубочковая фильтрация менее 10 мл/мин), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тревожное состояние, нервозность, проявление суицидальных наклонностей (на фоне депрессии), мания или гипомания, бессонница, сонливость, вялость, повышенная утомляемость, астения, головокружение, тремор, потеря аппетита, тошнота, диарея, повышенное потоотделение, васкулиты, снижение либидо, кожные высыпания, крапивница.

Взаим.: Серотонинэргические эффекты усиливает триптофан. При совместном назначении с препаратами лития может увеличивать или уменьшать уровень лития в плазме. Усиливает действие алпрозолама, диазепама и алкоголя. Несовместим с ингибиторами МАО: при одновременном или ранее 5 нед после отмены портала назначении ингибиторов МАО возможны изменения жизненно важных функций, фатальные реакции, гипертермия, окоченение, миоклонус, вегетативная лабильность, возбуждение, бред, кома.

Передоз.: Практически безопасна. Рекомендуются обычные поддерживающие мероприятия; эффективность форсированного диуреза и диализа маловероятна.

Примен. и доз.: Внутрь, 20 мг в день, один раз утром. Максимальная суточная доза - не более 80 мг (для пожилых пациентов - 60 мг) в два приема (утром и днем). Поддерживающая терапия - 20 мг в сутки. Длительность приема до проявления полного ответа - 3-4 нед.

Предост.: С осторожностью назначать пациентам, страдающим эпилепсией (возможно проявление эпилептогенных эффектов препарата). У больных с недостаточностью массы тела следует учитывать анорексигенное действие портала (возможна прогрессирующая потеря веса). При появлении у пациентов кожной сыпи или реакций неустановленной этиологии следует отменить препарат.

Доза для пациентов с почечной и печеночной недостаточностью должна быть скорректирована. Управление транспортными средствами и работа с механизмами, требующими концентрации внимания, воспрещается.

Произв.: Lek (Словения)

Порталак (Portalak®)

Лактулоза*

Сост. и ф.в.: 100 мл сиропа содержат лактулозы 66,7 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Гиперосмотическое, гипоаммониемическое, стимуляция перистальтики кишечника, улучшение всасывания фосфатов и солей кальция.

Показ.: Печеночная прекома и кома, портальная энцефалопатия, гипераммониемия, запоры, сальмонеллезный энтерит, сальмонеллоносительство, пародонтоз (кровотечения, воспаления, дистрофии).

Противопоказ.: Непереносимость лактулозы (или галактозы).

Поб. действ.: Судороги, метеоризм, тошнота, диарея, головная боль, головокружение, аритмия, боли в мышцах, усталость, бессилие.

Примен. и доз.: Внутрь, при портальной энцефалопатии и гипераммониемии назначают по 2-3 столовые ложки 3 раза в день; при запорах в первые 3 дня - 1-3 столовые ложки, затем - 1-2; до 14 лет - в первые 3 дня - 1 столовая ложка, затем 2 чайные ложки в день, до 6 лет - 1-2 чайные ложки в день, грудным детям - 1 чайная ложка в день; при сальмонеллезном энтерите в первые 10-12 дней - по 1 столовой ложке 3 раза в день, после однонедельного перерыва та же доза 5 раз в день; при пародонтозе - 1-2 столовые ложки в день.

Предост.: С осторожностью назначают при повреждениях кишечника, ректальных кровотечениях, коло- или илеостоме, сахарном диабете, подозрении на аппендицит, беременности и лактации. Не рекомендуется применять порталак в течение 2 ч после приема другого лекарства.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Постеризан (Posterisan®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит экстракт и компоненты клеточной оболочки 330 млн. кишечных палочек различных штаммов в 166,7 мг водной суспензии; в тубах по 25 г.

1 суппозиторий содержит экстракт и компоненты клеточной оболочки 660

млн. кишечных палочек в 387,1 мг водной суспензии; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антигеморроидальное, иммуностимулирующее, регенерирующее, противовоспалительное.

Показ.: Геморрой, перианальный дерматит, анальный и генитальный зуд, анопапиллит, анальная трещина.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждой дефекации. Для более глубокого введения мази в анальный канал можно использовать навинчивающийся аппликатор. Ректальные свечи применяют утром и вечером, а также после каждой дефекации. Возможно комбинированное использование мази и свечей. После купирования симптомов заболевания продолжают лечение в течение 2-3 нед.

Произв.: Dr. Kade (Германия)

Постеризан форте (Posterisan® forte)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит экстракт и компоненты клеточной оболочки 500 млн. кишечных палочек различных штаммов и 2,5 мг гидрокортизона в 166,7 мг водной суспензии; в тубах по 25 г.

1 суппозиторий ректальный содержит экстракт и компоненты клеточной оболочки 1000 млн. кишечных палочек и 5 мг гидрокортизона в 387,1 мг водной суспензии; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антигеморроидальное, иммуностимулирующее, противовоспалительное, регенерирующее.

Показ.: Геморрой, перианальный дерматит, анальный и генитальный зуд, анопапиллит, анальная трещина.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, специфические поражения аногенитальной области (туберкулез, сифилис, гонорея, микозы, вирусные заболевания).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью применять в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Аллергические реакции, при длительном применении и/или нанесении на большие поверхности кожи возможны системные побочные эффекты, характерные для глюкокортикостероидов.

Примен. и доз.: Накожно, мазь наносят тонким слоем на пораженную область утром и вечером, а также после каждой

дефекации. Для более глубокого введения мази в анальный канал можно использовать навинчивающийся аппликатор. Свечи в острый период заболевания применяют по 2-3 шт. в сутки. После устранения субъективных симптомов заболевания пораженную область продолжают смазывать 1 раз в сутки в течение нескольких дней. Если препарат используется для лечения хронических дерматитов, рекомендуется после исчезновения кожных проявлений продлить терапию на 1-2 нед. Возможно комбинированное использование мази и свечей. После завершения курса лечения целесообразно применение постеризана в течение 2-3 нед.

Произв.: Dr. Kade (Германия)

Постинор (Postinor)

Левоноргестрел*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левоноргестрела 0,75 мг; в упаковке 4 шт.

Фарм. действ.: Контрацептивное, прогестагенное.

Показ.: Оральная посткоитальная контрацепция.

Противопоказ.: Заболевания печени и желчных путей (в том числе в анамнезе), желтуха во время беременности.

Поб. действ.: Тошнота, менструальноподобное кровотечение.

Примен. и доз.: Внутрь, после первого полового акта - 1 таблетку, при многократных - дополнительно 1 таблетку через 8 ч после приема первой. Возможен прием не более 4 таблеток в месяц.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Празозин (Prazosin)

Празозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит празозина 0,5 или 1 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, антигипертензивное, блокада альфа₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотония, констриктивный перикардит, тампонада сердца, пороки сердца со сниженным давлением заполнения левого желудочка, беременность, лактация, детский возраст до 12 лет.

Поб. действ.: Резкая гипотония; головокружение, головная боль, тахикардия, усталость, тошнота, сухость во рту, учащение диуреза, потемнение в глазах, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с нифедипином. Эффект усиливают диуретики, симпатолитики, бета-адреноблокаторы.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,5-1 мг 2-3 раза в день с постепенным увеличением дозы через 3 дня. Поддерживающая доза 4 - 20 мг в день в разделенных дозах.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Празозин (Prasosin)

Празозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит празозина (в пересчете на празозин-основание) 0,001 г; в контурной ячейковой упаковке по 10 или 25 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, блокада альфа₁-адренорецепторов.

Показ.: Артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, стеноз аорты и митрального клапана, легочная эмболия, ограниченные поражения перикарда, беременность, детский возраст до 12 лет.

Поб. действ.: Коллаптоидная реакция с потерей сознания (в т.ч. в первые 2 ч после приема первой дозы), головная боль, головокружение, сонливость, раздражительность, депрессия, сердцебиение, слабость, сухость во рту, тошнота, понос или запор.

Взаим.: Диуретики и антигипертензивные средства (метилдофа, клофелин и др.) усиливают гипотензивный эффект.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. Первую дозу (0,5 мг) принимают перед сном, далее - по 1 мг 3-4 раза в сутки. Постепенно в течение 4-8 нед дозу увеличивают, добиваясь стойкого гипотензивного эффекта. Поддерживающая доза - от 3 до 20 мг в сутки подбирается индивидуально (в среднем - 6-15 мг в сутки). Суточную дозу делят на 2-4 приема. При развитии толерантности возможно назначение диуретиков или увеличение разовой дозы на 1 мг (и больше). При застойной сердечной недостаточности назначают 3-20 мг в сутки. Длительность лечения не ограничивается.

Предост.: С осторожностью (в уменьшенных дозах) назначают при поражениях почек, пациентам в пожилом и старческом возрасте. Опасно применять препарат при работе на транспортных средствах и с движущимися механизмами.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Прамоксин (Pramoxin®)

Прамокаин*

Сост. и ф.в.: Прамокаина гидрохлорида 1% на кремовой основе; крем в тубах.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Геморрой.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к компонентам крема, трещины заднего прохода.

Примен. и доз.: Наружно (перед применением область поражения следует вымыть с мылом и высушить). Крем наносят до 5 раз в день. Детям до 12 лет - только по рекомендации врача.

Предост.: В случае кровотечения следует немедленно обратиться к специалисту. Рекомендуются прекратить применение препарата, если болезненность не исчезает в течение 7 дней.

Произв.: American Drug Company (США)

Прегестимил (Pregestimil)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (67 ккал/100 мл) содержит белка 19 г, углеводов 93 г, таурина 0,038 г, жиров 27 г, L-карнитина 0,013 г, линолевой кислоты 9,2 г, линоленовой кислоты 433 мг, углеводов 93 г, минеральных веществ (зола) 4,4 г, витамина А 2600 ЕД, витамина D 430 ЕД, витамина Е 16 ЕД, витамина С 75 мг, фолиевой кислоты 110 мкг, тиамина 660 мкг, рибофлавина 600 мкг, ниацина 8500 мкг, витамина В₆ 400 мкг, витамина В₁₂ 3,7 мкг, биотина 50 мкг, пантотеновой кислоты 3200 мкг, витамина К 110 мкг, холина 90 мг, инозитола 50 мг, кальция 630 мг, фосфора 420 мг, йода 48 мкг, железа 15 мг, магния 75 мг, цинка 4,4 мг, меди 660 мкг, марганца 370 мкг, натрия 320 мг, калия 740 мг, хлоридов 570 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма детей (в т.ч. новорожденных) гипоаллергенными питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Фармакодин.: Белок в препарате представлен ферментативно гидролизованным казеином (полный гидролизат), специально обработанным для снижения аллергенности и обладающим высокой биологической активностью и хорошей усвояемостью. Смесь обогащена таурином, биосинтез которого снижен в орга-

низме детей первого года жизни, а также цистеином, тирозином, триптофаном, L-карнитином. Жировой компонент обеспечен кукурузным, соевым и кокосовым (фракционированным) маслами - источник среднецепочечных триглицеридов, которые легко усваиваются и не требуют перегрузки ферментативной и желчеобразующей функции ЖКТ. Углеводы представлены полимерами глюкозы (лактоза отсутствует). Осмоляльность смеси (320 мОсм/кг воды) обеспечивают ее хорошую переносимость и создает низкую осмотическую нагрузку на почки, способствующую сохранению воды в организме ребенка.

Показ.: Лечебное питание детей (начиная с первых дней жизни) при длительной неукротимой диарее, синдроме нарушенного кишечного всасывания (лактазная недостаточность, дисахаридазная недостаточность, целиакия, непереносимость белков коровьего молока), синдроме короткой кишки (в результате резекции), нарушении всасывания жира после перенесенной острой кишечной инфекции или хирургических вмешательств, муковисцидозе, незрелости ЖКТ недоношенного ребенка, множественной пищевой аллергии, аллергии к белкам коровьего молока, сое, злаковым культурам и др., выраженных нарушениях нутритивного статуса различного генеза, тяжелой белково-калорийной недостаточности, при переходе от парентерального питания к физиологической диете.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Сухое вещество растворяют в различных объемах воды в зависимости от требуемой концентрации смеси. Для приготовления 1 л смеси стандартного разведения (67 ккал/100 мл) 147 г (30 мерных ложек) сухого вещества добавляют к 890 мл кипяченой воды. Кормление начинают разбавленной в два (34 ккал/100 мл) или более раз смесью в дозе 5-10 мл в сутки. Затем постепенно (в течение 3-5 дней) повышают концентрацию смеси до стандартного разведения, а объем ее увеличивают до значений, соответствующих возрастным особенностям ребенка.

Предост.: Применяют только под наблюдением врача. Готовую смесь используют в течение суток (при условии хранения в холодильнике). Следует проинформировать родителей, что приготовленная смесь имеет сероватый цвет, специфический запах, слегка горьковатый

вкус. Если ребенок отказывается от смеси, рекомендуется повторить кормление снова через несколько часов.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Прегнавит (Pregnavit®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ретинола пальмитата 3000 МЕ, колекальциферола 200 МЕ, токоферола ацетата 10 мг, тиамин мононитрата 1,5 мг, рибофлавина 2,5 мг, пиридоксина гидрохлорида 5 мг, цианокобаламина 5 мкг, никотиамида 15 мг, аскорбиновой кислоты 75 мг, кальция пантотената 10 мг, фолиевой кислоты 0,75 мг, железа фумарата 30 мг и дикальция фосфата 250 мг; в упаковке 30, 60 и 180 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов, железа и кальция.

Показ.: Лечение и профилактика гиповитаминоза и дефицита минеральных веществ (беременность, лактация, период реконвалесценции после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в т.ч. инфекционных).

Противопоказ.: Пернициозная анемия.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды с небольшим количеством жидкости. Во время беременности: в первом триместре - 1 капсула в день, во втором триместре - 2 капсулы, в третьем триместре - 3 капсулы в сутки. В послеродовой период, при лактации - по 3 капсулы ежедневно.

Предост.: В период беременности суточная доза ретинола пальмитата (в составе препарата) не должна превышать 10000 МЕ. Не рекомендуется назначать в течение длительного времени совместно с другими поливитаминными препаратами (возможна передозировка жирорастворимых витаминов).

Произв.: Merckle (Германия)

Предиан (Predian®)

Гликлазид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гликлазида 80 мг, в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое, стимуляция инсулиносекреции бета-клеток поджелудочной железы, антиагрегационное, антиагрегационное.

Фармакокин.: Быстро всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация в крови достигается через 2-6 ч. 94,2% связывается с протеинами плазмы. $T_{1/2}$ составляет 12 ч. Выводится

с мочой (70%), калом (12%) в виде метаболитов.

Показ.: Сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная и почечная недостаточность, юношеский диабет, прекома, кома, кетоз, ацидоз, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Встречаются крайне редко диспептические расстройства, головная боль, гипогликемия, кожный зуд.

Взаим.: Сульфаниламиды, производные фенилбутазона, салицилаты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы МАО, тиазидные диуретики и стероидные гормоны усиливают гипогликемический эффект.

Передоз.: Проявляется гипогликемией. В тяжелых случаях показано введение гипертонического (10-30%) раствора глюкозы.

Примен. и доз.: Внутрь во время еды. Доза подбирается индивидуально. Средняя суточная доза составляет 0,04-0,32 г (1/2-4 таблетки). В начале лечения 0,04-0,08 г в сутки (1/2-1 таблетка), затем дозу постепенно увеличивают до достижения компенсации диабета.

Предост.: Следует проводить контроль уровня глюкозы в крови. Перед началом лечения больных следует предупредить о возможных последствиях сочетанного действия Предиаана с другими лекарственными средствами (см. Взаимодействие).

Произв.: Zorka (Югославия)

Преднизолон (Prednisolon)

Преднизолон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит преднизолон 30 мг; в упаковке 3 шт.

1 таблетка - 5 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: В/в или в/м - шок, тяжелые аллергические реакции, астматический статус, острая недостаточность надпочечников, печеночная кома; внутрь - системная красная волчанка, дерматомиозит, системные васкулиты, ревматоидный артрит, острый ревматический кардит, болезнь Аддисона, адреногенитальный синдром, бронхиальная астма, острые и хронические аллергические заболевания, гепатит, нефрит, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура, ге-

молитическая анемия, лимфогранулематоз, пузырчатка, эксфолиативный дерматит, симпатическая офтальмия, иридоциклит, хориоретинит.

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Кушинга, остеопороз, психозы, предрасположенность к тромбоэмболиям, почечная недостаточность, тяжелая артериальная гипертензия, ветряная оспа, простой герпес, период вакцинации, беременность.

Поб. действ.: Язвообразование в ЖКТ, гипергликемия, сахарный диабет, ятрогенный синдром Кушинга, артериальная гипертензия, остеопороз, гипокалиемия, недостаточность функции коры надпочечников, отрицательный азотистый баланс, понижение сопротивляемости к инфекциям.

Взаим.: Барбитураты, ускоряя метаболизм, ослабляют эффект. Снижает действенность оральных гипогликемизирующих препаратов, усиливает гипокалиемию на фоне диуретиков, повышает риск развития желудочно-кишечных кровотечений при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов и антикоагулянтов.

Примен. и доз.: В/в или в/м, при шоке - 30-90 мг, по другим показаниям - 30-45 мг; детям от 2 до 12 мес - 3-2 мг/кг, от 1 года до 14 лет - 2-1 мг/кг. Внутрь, при острых состояниях - по 20-30 мг в сутки. Поддерживающая доза - 5-10 мг в день. Детям - по 1-2 мг/кг в сутки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Предуктал (Preductal®)

Триметазидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триметазида дигидрохлорида 20 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, цитопротективное, в т. ч. в органах зрения и слуха.

Фармакокин.: $T_{1/2}$ - 6 ч, выводится почками.

Клин. фарм.: У больных со стенокардией триметазидин с 15 дня лечения увеличивает коронарный резерв (увеличивает время до появления ишемических нарушений при физической нагрузке), сокращает частоту приступов стенокардии и снижает потребление нитратов.

Показ.: Стенокардия, хориоретинальные сосудистые нарушения, шум в ушах, головокружения сосудистого происхождения и при болезни Меньера.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Servier (Франция)

Премарин (Premarin)

Эстрогены конъюгированные

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит конъюгированные эстрогены 0,625 или 1,25 мг; соответственно в упаковке 20, 40, 60 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Фармакодин.: Облегчает и снимает проявления климактерического синдрома (чувство жара, потливость, головокружение, раздражительность, депрессивное состояние), предотвращает развитие остеопороза, препятствует инволюции половых органов, нормализует менструальный цикл у женщин детородного возраста, снижает уровень тестостерона у мужчин.

Показ.: Климактерический синдром, эстрогенная недостаточность в менопаузный и постменопаузный период, постменопаузный остеопороз, дисфункциональные маточные кровотечения, дисменорея, аменорея, рак предстательной железы.

Противопоказ.: Рак молочной железы и эстрогензависимые новообразования; маточные кровотечения неясной этиологии; тромбофлебит; тромбоэмболические заболевания; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; выраженные нарушения функции печени или почек; серповидно-клеточная анемия; врожденная тугоухость; нарушение свертывающей системы крови, длительная иммобилизация.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, увеличение массы тела, отеки, маточные кровотечения, пигментация кожи лица, узловатая эритема, транзиторное повышение уровня трансаминаз в плазме крови, гипербилирубинемия; аллергические реакции (сыпь); редко - геморрагические высыпания на коже, новообразования эндометрия.

Взаим.: Эффект снижают барбитураты, гидантоины, бутадиион, рифампицин.

Примен. и доз.: Внутрь. Для циклического применения - 625 мкг-1,25 мг в сутки, чередуя прием в течение 3 нед с перерывом в 1 нед, при менструальном кровотечении - начинают прием с 5-го дня менструального цикла, а с 15 по 21-й день дополнительно используют гестагенный препарат (при длительном отсутствии менструации лечение начинают в любой день). При необходимости - на 5-7-й день лечения суточная доза может

быть увеличена - до 3,75 мг, затем ее уменьшают - до 1,25 мг. Лечение злокачественных новообразований - 3,75-7,5 мг.

Предост.: С осторожностью назначают при сахарном диабете, артериальной гипертонии, эпилепсии, рассеянном склерозе, порфирии, тетании, мастопатии, тиреотоксикозе.

Произв.: Wyeth-Lederle (США)

Престариум (Prestarium)

Периндоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит периндоприла трет-бутиламина 4 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, вазодилатация в связи с блокадой ангиотензин-превращающего фермента.

Показ.: Артериальная гипертония, сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст до 15 лет.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, нарушения настроения, сна, астения, судороги, кашель, сухость во рту, нарушение вкуса, диспепсия, снижение потенции, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. При сердечной недостаточности утром (до еды) - 2-4 мг; при артериальной гипертензии - 4 мг, при недостаточной эффективности через месяц лечения дозу увеличивают до 8 мг.

Предост.: При почечной недостаточности доза снижается в соответствии с клиренсом креатинина.

Произв.: Servier (Франция)

Примамет® (Primamet®)

Циметидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циметидина 200 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

1 ампула с 2 мл инъекционного раствора - 200 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение кислотопродукции, блокада H₂-гистаминрецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст до 14 лет.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, запор, метеоризм, слабость, головокружение, миалгия, гиперемия, гиперпролактинемия, гинекомастия, повышение

активности сывороточных трансаминаз; редко - спутанность сознания, парестезия, интерстициальный нефрит, повышение содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови, импотенция.

Примен. и доз.: Внутрь, 200 мг 3 раза в день во время еды и 400 мг на ночь (или 300 мг 3 раза в день и 300 мг на ночь), но не более 2,4 г/сутки. В/в капельно (100 мг/ч) - 200 мг каждые 4-6 ч. Курс - 4-6 нед. Поддерживающая доза - 400 мг на ночь в течение 6 мес.

Произв.: Lek (Словения)

Примолот-Нор (Primolut®-Nor)

Норэтистерон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит норэтистерона ацетата 5 или 10 мг; во флаконах по 20 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Гестагенное.

Показ.: Гипоплазия матки, эндометриоз, первичная и вторичная аменорея, дисфункциональные маточные кровотечения, предменструальный синдром, необходимость изменения сроков наступления менструации, мастопатия, прогрессирующая карцинома молочной железы.

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе), герпес в анамнезе, идиопатическая желтуха или зуд во время предшествующей беременности.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Тошнота, тромбоз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки, запивая жидкостью.

Произв.: Schering (Германия)

Принорм (Prinorm)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит атенолола 100 мг; в упаковке 14 или 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Фармакодин.: Снижает частоту и интенсивность приступов стенокардии, потребность в нитратах; увеличивает переносимость физической нагрузки; снижает систолическое и диастолическое давление.

Показ.: Артериальная гипертония, стенокардия, нарушения ритма сердца.

Противопоказ.: AV-блокада I-II степени, кардиогенный шок.

Бер. и корм. гр.: При беременности назначается в случае особой необходимости.

Поб. действ.: Похолодание конечностей.

Примен. и доз.: Внутрь, 100 мг в сутки в один или два приема.

Предост.: С осторожностью используется при сердечной недостаточности в комбинации с сердечными гликозидами и диуретиками. Нарушения выделительной функции почек требуют коррекции дозы (подбирается в зависимости от показателей клиренса креатинина).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Про-эфффералган (Pro-Efferalgan)

Пропацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит пропацетамол 1 г; в упаковке 1, 2 или 5 шт. в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Боли, лихорадочные состояния при инфекционных заболеваниях и в послеоперационном периоде.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Локальная болезненность в месте инъекции, аллергические реакции: эритема, крапивница, сыпь; крайне редко - тромбоцитопения.

Примен. и доз.: В/м или в/в в течение 1-2 мин, либо перфузионно в 5%-ном растворе глюкозы (125 мл) или в 0,9% физиологическом растворе в течение 15 мин. Взрослым - 1-2 флакона 2-4 раза в течение суток с минимальным интервалом между приемами - 4 ч (не более 8 флаконов в день).

Произв.: UPSA (Франция)

Провирон-25 (Proviron®-25)

Местеролон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит местеролон 25 мг; во флаконах по 20 шт.

Фарм. действ.: Андрогенное.

Фармакодин.: По сравнению с тестостероном оказывает менее выраженное влияние на секрецию гипофизом гонадотропина и на функцию мужских половых желез.

Показ.: У мужчин: психо-вегетативные нарушения и снижение работоспособности в среднем и пожилом возрасте, нарушения потенции, пониженная функция половых желез (гипогонадизм), бесплодие, связанное с олигоспермией и недостаточностью клеток Лейдига, апластическая анемия.

Противопоказ.: Рак предстательной железы, опухоли печени (в т.ч. в анамнезе).

Поб. действ.: Частая и продолжительная эрекция (требуется снижение доз или отмена препарата).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1-3 раза в день. Для улучшения качества и увеличения количества сперматозоидов - по 50-75 мг (2-3 таблетки) в сутки в течение одного цикла сперматогенеза (90 дней).

Произв.: Schering (Германия)

Прогинова (Progynova®)

Эстрадиола валерат*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит эстрадиола валерата 2 мг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Эстрогенная недостаточность (постменопаузный период, овариоэктомия при доброкачественных заболеваниях, лучевая кастрация): приливы, повышенная потливость, нарушения сна, депрессивные состояния, раздражительность, головные боли, головокружение, гиперстезия мочевого пузыря, дегенеративные изменения кожи и слизистых; профилактика остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы в постменопаузе.

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе), тяжелый сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, нарушения жирового обмена, серповидноклеточная анемия, рак молочной железы или эндометрия; идиопатическая желтуха, зуд или ухудшение атеросклероза во время имевшей место беременности, герпес (в анамнезе).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушения функции желудка, нагрубание молочных желез, изменение массы тела, маточные кровотечения, появление пятен коричневого цвета на лице.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно в течение 21 дня, затем -

перерыв 7 дней. Продолжительность лечения - до 6 мес.

Произв.: Schering (Германия)

Продеп (Proder)

Флуоксетин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флуоксетина 20 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное.

Фармакокин.: Хорошо всасывается (прием пищи не влияет на биодоступность), метаболизируется в печени, выводится почками.

Показ.: Депрессии различной этиологии, булимия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, атония мочевого пузыря, почечная недостаточность, аденома предстательной железы, эпилепсия, глаукома.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тревога, нервозность, чувство жара, головная боль, бессонница, головокружение, сонливость, утомляемость, тремор, диспептические расстройства (анорексия, сухость во рту, тошнота, рвота, понос), дисфония, снижение либидо, гипонатриемия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО. Одновременное применение с другими антидепрессантами, а также триптофаном увеличивает риск возникновения побочных явлений.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 20 мг/сутки утром, через 3-4 нед дозу увеличивают до 20 мг 2 раза в день; максимальная суточная доза - 80 мг. При булимии - 60 мг/сутки.

Предост.: Следует назначать с осторожностью при нарушенной функции печени или почек. У больных сахарным диабетом может возникнуть необходимость корректировки дозы инсулина или пероральных гипогликемических средств. Не менее чем за 5 нед до начала лечения необходимо отменить ингибиторы МАО.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Продерм (Proderm®)

Бензоилпероксид

Сост. и ф.в.: Бензоила пероксида 10% на кремовой основе; крем в тубах.

Фарм. действ.: Антибактериальное, подсушивающее.

Показ.: Юношеские угри.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Гиперемия и сухость кожи, обесцвечивание волос.

Примен. и доз.: Наружно. Тщательно очищают кожу и наносят точечно на камедоны 1-3 раза в день.

Предост.: Следует применять только наружно, избегать попадания в глаза, на губы и в ротовую полость.

Произв.: American Drug Company (США)

Прозак (Prozac®)

Флуоксетин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флуоксетина 20 мг (в форме гидрохлорида); в упаковке 14 и 28 шт.

1 растворимая таблетка - 20 мг.

Фарм. действ.: Антидепрессивное.

Показ.: Депрессии, булимия, обсессивно-компульсивный синдром (навязчивые мысли и действия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, лактация, беременность.

Поб. действ.: Нервозность, сонливость, беспокойство, повышенная утомляемость, дрожь, потливость, диспептические расстройства, изменение вкуса, головокружение, реже - головная боль, снижение либидо.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО (с момента прекращения приема ингибиторов МАО до начала терапии флуоксетином должно пройти как минимум 14 дней. После прекращения приема флуоксетина до начала терапии ингибиторами МАО - как минимум 5, возможно, более недель). Изменяет уровень лития в крови. В сочетании с триптофаном и фенитоном повышается вероятность развития побочных эффектов.

Примен. и доз.: При депрессии начальная доза - 20 мг в день (утром). Увеличение дозы (при отсутствии клинического эффекта) возможно через несколько недель после консультации врача. Дозы более 20 мг в день принимаются в 2 приема (утром и днем). Больным с выраженными нарушениями функций печени или почек, а также пожилым, имеющим сопутствующие заболевания, рекомендуется снижение суточной дозы. При булимии - суточная доза 60 мг (в 3 приема). Максимальная суточная доза не должна превышать 80 мг. При обсессивно-компульсивном синдроме - 20-60 мг/сутки.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Прозерин (Proserinum)

Неостигмина метилсульфат

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит неостигмина

бромид 0,5 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 15 мг.

Фарм. действ.: Антихолинэстеразное, повышение сократимости гладких мышц, утеротонизирующее.

Показ.: Миастения, параличи, полиомиелит, энцефалит, слабость родовой деятельности, атрофия зрительного нерва, невриты, глаукома; атония желудка, кишечника и мочевого пузыря.

Противопоказ.: Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия, атеросклероз.

Поб. действ.: Гиперсаливация, тошнота, рвота, брадикардия, гипотония, слабость, подергивание мышц языка, тремор.

Примен. и доз.: П/к, по 0,5 мг (1 мл 0,05% раствора) 1-2 раза в сутки; детям - по 0,05 мг на год жизни, но не более 0,75 мл 0,05% раствора. Конъюнктивально, по 1-2 капли 0,5% раствора 1-4 раза в сутки. Внутрь, по 0,015 г 2-3 раза в день. Высшие дозы: разовая - 0,015 г, суточная - 0,05 г. Курс - 25-30 дней, интервал между курсами - 3-4 нед.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Прокто-Гливенол (Procto-Glyvenol®)

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит трибенозида 400 мг и лидокаина 40 мг; в упаковке 10 шт.

1 г крема - трибенозида 50 мг и лидокаина 20 мг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Уменьшает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, повышая тонус вен, обладает противовоспалительным (трибенозид), местноанестезирующим действием (лидокаин).

Показ.: Геморрой (наружные и внутренние геморроидальные узлы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Легкое жжение, кожные высыпания в перианальной области.

Примен. и доз.: При выраженных клинических симптомах - по 1 свече (или по 1 дозе крема) утром и вечером. При регрессии острых симптомов дозу уменьшают до 1 свечи (или 1 дозы крема) в сутки. Для повышения эффективности местного лечения можно дополнительно назначить гливенол внутрь.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с выраженными нарушениями функции печени.

Произв.: Novartis Consumer Health (Швейцария)

Проктоседил (Proctosedyl®)

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий или 1 г мази содержат цинхокаина гидрохлорида 5 мг и гидрокортизона 5 мг; суппозитории в упаковке 12 шт.; мазь в тубах по 15 и 30 г (с аппликатором).

Фарм. действ.: Местноанестезирующее, противовоспалительное, противозудное.

Показ.: Геморрой, зуд в области заднего прохода.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Жжение, сухость слизистой оболочки, присоединение вторичной инфекции; эффекты, характерные для системного действия глюкокортикоидов.

Примен. и доз.: Суппозитории вводят утром и вечером, а также после каждой дефекации. Небольшое количество мази утром и вечером, а также после каждой дефекации наносят пальцем на участки локализации зуда или боли. Для более глубокого введения надеть до упора аппликатор на тюбик и осторожно нажимать на тюбик с нижнего конца, постепенно вынимая его.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Пролейкин (Proleukin®)

Альдеслейкин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инфузий (1 мг/мл) содержит алдеслейкина 1,2 мг (18 млн. МЕ/мг); в упаковке 1 и 10 шт.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее.

Показ.: Метастатическая ренальная клеточная карцинома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, статус больных ECOG >2, статус ECOG 1 и поражение более, чем одного органа метастазами, период менее 24 мес между первоначальным диагнозом первичной опухоли и даты, когда больного оценивают для лечения пролейкином, тяжелые сердечные заболевания (в т.ч. в анамнезе), тяжелые инфекции, требующие терапии антибиотиками, метастазы в ЦНС, припадки, аутоиммунные заболевания, лейкопения (менее 4000/куб.мм), тромбоцитопения (менее 100000/куб.мм), беременность, лактация и др.

Поб. действ.: Гипотензия, аритмии, тахикардия, стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения коагуляции, носовые кровотечения, тромбозы, гипертензия,

пальпитация, флебит, олигурия, гематурия, одышка, пульмонарный отек, гипербилирубинемия, повышение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы, тошнота, анорексия, дисфагия, диспепсия, гастрит, тревога, беспокойство, замешательство, головокружение, сонливость, парестезии, синкопе, депрессия, галлюцинации, паралич, расстройства речи, конвульсии, эритема, сыпь, конъюнктивит, мукозит, тромбоцитопения, лейкопения, увеличение массы тела, отеки, лихорадка с ознобом, головная боль, боли в суставах, миалгия, асцит, гипергликемия, гипокальциемия, гиперкалиемия.

Взаим.: Негативные эффекты увеличивают препараты с гепатотоксическим, нефротоксическим, миелотоксическим или кардиотоксическим действиями, уменьшают (позитивные тоже) - глюкокортикоиды. Антигипертензивные препараты, такие как бета-блокаторы, усиливают гипотензию.

Примен. и доз.: В/в непрерывной инфузией; взрослым - 1 мг/кв.м в течение 24 ч непрерывной инфузии 5 дней, затем перерыв 2-6 дней, еще 5 дней в/в введение непрерывной инфузией (один индукционный цикл). После 3-недельного периода отдыха следует проводить второй индукционный цикл. Можно проводить до четырех поддерживающих циклов (1 мг/кв.м в течение 24 ч непрерывной инфузии в течение 5 дней) больным, у которых отмечен эффект лечения или стабилизация заболевания. Каждый флакон пролейкина для инъекций следует разводить в 1,2 мл воды для инъекций. Направлять струю воды по стенке флакона, чтобы избежать пенообразования. Осторожно покачивать содержимое вплоть до полного растворения. Не встряхивать. Полученный в результате раствор должен представлять собой прозрачную бесцветную жидкость. При вышеуказанном разведении в 1 мл содержится 1 мг. Ежедневная доза пролейкина в воде для инъекций при необходимости разводится в растворе, содержащем до 500 мл 5% декстрозы для инъекций, с добавлением 0,1% человеческого альбумина (для предотвращения потери биоактивности) и вводится в течение 24 ч. Порядок добавления: человеческий альбумин следует добавлять и смешивать с декстрозой для инъекций до добавления пролейкина. При появлении тяжелых токсикозов инфузию следует прервать до полного исчезновения проявлений токсичности. Возобновляют

введение пролейкина на уровне 50% дозы.

Предост.: Следует применять только под контролем врача. Не рекомендуется лицам обоего пола в репродуктивном возрасте, если они не пользуются средствами контрацепции.

Произв.: CSC (Италия)

Пролинат (Prolinate)

Флуфеназин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит флуфеназина деканоата 25 мг.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, седативное, противорвотное, блокада центральных дофаминовых рецепторов.

Показ.: Психозы, шизофрения (особенно хронические формы), мании, беспокойство, психическое возбуждение, двигательное возбуждение, страх, старческий психоз, ажитированная депрессия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, кома, заболевания крови, атеросклероз сосудов мозга, эпилепсия, гипертрофия предстательной железы, феохромоцитома, депрессия, застойная сердечная недостаточность, алкогольная интоксикация, беременность, лактация.

Поб. действ.: Экстрапирамидные нарушения, мимические гиперкинезы, судорожный синдром, акинезия, дискинезия, потливость, утомляемость, головокружение, сухость во рту, тошнота, рвота, запор, холестаза, артериальная гипертензия, аритмия, дисменорея, галакторея, воспалительные поражения слизистых оболочек, агранулоцитоз, фотосенсибилизация, аллергические реакции (лихорадка и др.).

Примен. и доз.: В/м (глубоко), в дозе 12,5-25 мг 1 раз в 2-4 нед. Максимальная разовая доза - 100 мг. При необходимости назначения дозы более 50 мг ее следует повышать постепенно на 12,5 мг в каждое введение.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Промедол (Promedolum)

Тримеперидин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит тримеперидина 0,01 или 0,02 г; в ампулах и шприц-тюбиках по 1 мл.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, снотворное, спазмолитическое, повышение тонуса и ритмических сокращений

матки, возбуждение опиатных рецепторов.

Показ.: Выраженный болевой синдром (травмы, злокачественные новообразования, послеоперационный период и др.), подготовка к операции, роды (обезболивание).

Противопоказ.: Дыхательная недостаточность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, слабость, головокружение. Возможно развитие лекарственной зависимости.

Примен. и доз.: П/к или в/м, по 1 мл; максимальные дозы для взрослых: разовая - 0,04 г, суточная - 0,16 г.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Пронаксен (Pronaxen)

Напроксен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит напроксена 250 или 500 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное, снижение синтеза простагландинов.

Показ.: Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, мигрень, дисменорея, опухолевые, травматические, периоперационные боли.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженная печеночная и почечная недостаточность, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, головная боль, головокружение, слабость.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 250-500 мг 2 раза в день. При дисменорее и мигрени - 500 мг, максимально - до 1750 мг в день. Детям старше 5 лет - 10 мг/кг в день за 2 приема.

Предост.: Лактирующие женщины на период лечения должны прекратить грудное вскармливание.

Произв.: Ogiop (Финляндия)

Пропосол (Proposolum)

Сост. и ф.в.: 1 аэрозольный баллон (50 г) содержит прополиса 2,1 г, глицерина дистиллированного 4,9 г, спирта этилового ректифицированного 28 г, пропеллента (хладона-12) 15 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, антисептическое.

Показ.: Катаральные гингивиты и стоматиты, воспалительные заболевания полости рта.

Примен. и доз.: Местно, в остром периоде воспалительного процесса орошение производят 2-3 раза в день, при его затихании - 1-2 раза в день. Препарат применяют в течение 3-7 дней.

Произв.: Алтайвитамины (Россия)

Проскар (Proscar®)

Финастерид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит финастерида 5 мг.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, ингибирование 5-альфа-редуктазы, угнетение биосинтеза дигидротестостерона.

Фармакокин.: Хорошо всасывается и проникает в ткани и биожидкости, в т.ч. в эякулят.

Клин. фарм.: Подавление образования дигидротестостерона сопровождается уменьшением объема простаты, увеличением максимальной скорости тока мочи и уменьшением симптомов непроходимости мочевых путей. При постоянном приеме статистически значимый эффект регистрируется через 3 мес (уменьшение объема железы), 4 мес (увеличение максимальной скорости тока мочи) и 7 мес (уменьшение общих симптомов и симптомов непроходимости мочевых путей). Неэффективен у пациентов, страдающих раком предстательной железы.

Показ.: Аденома предстательной железы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Беременные женщины должны избегать контакта с измельченными или потерявшими целостность таблетками препарата. Женщинам, которые могут забеременеть, беременным и кормящим матерям не следует иметь половой контакт (без кондома) с партнером, принимающим проскар (возможно нарушение развития наружных половых органов у плодов и грудных детей мужского пола).

Поб. действ.: Нарушение половой функции (импотенция, снижение либидо, уменьшение объема эякулята).

Взаим.: Клинически значимых последствий взаимодействия с другими лекарственными препаратами не обнаружено.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день в течение 6-7 мес и более.

Предост.: У пациентов с большим объемом остаточной мочи и/или резко сниженным током мочи необходимо осуществлять тщательный контроль за возможным развитием обструктивной уropатии.

Произв.: MSD (США)

Проставерн Уртика ликвид (Prostawern Urtica Liquidum)

Сост. и ф.в.: Жидкий экстракт из корней крапивы (соотношение - высушенное лекарственное растение : экстракт = 1 : 1); во флаконах по 100, 250 и 500 мл.

Фарм. действ.: Повышение объема мочеиспускания, снижение количества остаточной мочи в мочевом пузыре.

Показ.: Дизурия при аденоме предстательной железы I и II степени.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Легкие желудочно-кишечные расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь, можно принимать в неразбавленном виде или с небольшим количеством жидкости (вода, чай, сок) по 5 мл (мензурка) 1 раз в день или по 2-3 мл (1/2 чайной ложки) 2 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени, эпилепсией, повреждениями головного мозга, больным алкоголизмом (препарат содержит 30% алкоголя).

Произв.: Pharma Wernigerode (Германия)

Простагут (Prostagutt®)

Сост. и ф.в.: Простагут моно: 1 капсула содержит 160 мг липофильного экстракта из плодов сабаль; в упаковке 60 шт.

Простагут форте: 1 капсула содержит 160 мг стандартизированного экстракта из плодов сабаль и 120 мг стандартизированного сухого экстракта из корней крапивы двудомной; в упаковке 60 шт.

1,1 г раствора (соответствует 30 каплям) содержит 80 мг стандартизированного экстракта из плодов сабаль и 60 мг стандартизированного сухого экстракта из корней крапивы двудомной; во флаконе 100 мл.

Фарм. действ.: Дегидратирующее (снижает отек простаты).

Фармакодин.: Ингибирует 5 альфа-редуктазу и ароматазу, вследствие чего подавляется разрастание ткани простаты. Обладает противоотечным действием.

Показ.: Нарушение мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II степени.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Диспептические расстройства.

Примен. и доз.: Капсулы: принимать внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. Глотать не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости; капли: по 20-40 капель 3 раза в день. Принимать разведенными в небольшом количестве воды.

Произв.: Dr. Willmar Schwabe (Германия)

Простаплант (Prostaplant)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 320 мг липофильного экстракта из плодов сабаль; в упаковке 30 и 60 шт.

Фарм. действ.: Дегидратирующее (снижает отек простаты).

Фармакодин.: Ингибирует 5 альфа-редуктазу и ароматазу, вследствие чего подавляется разрастание ткани простаты. Обладает противоотечным действием.

Показ.: Нарушение мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II степени.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Диспептические расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, по 1 капсуле 1 раз в день.

Произв.: Dr. Willmar Schwabe (Германия)

Простафлин (Prostaphlin®)

Оксациллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит оксациллина (в виде натриевой соли) 250 мг.

1 флакон с порошком для приготовления раствора для инъекций - 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: После парентерального введения быстро всасывается и создает высокие концентрации в крови. Выделяется из организма с высокой скоростью - через 4-6 ч не обнаруживается в крови, при этом 40-50% дозы экскретируется с мочой в активной форме, создавая бактерицидные концентрации в моче. После перорального приема всасывается хорошо, но не полностью (резорбцию замедляет прием пищи). Однократная доза 250 мг обеспечивает C_{max} через 1 ч - 1,65 мкг/мл. В крови связывается с белками (главным образом, с альбуминами). Плохо проникает в спинномозговую и асцитическую жидкости, в терапевтичес-

ких концентрациях обнаруживается в плевральной полости, желчи, амниотической жидкости.

Фармакодин.: Устойчив к пенициллинам, продуцируемым стафилококками. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Diplococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, включая штаммы, резистентные к пенициллину G и другим антибиотикам.

Показ.: Инфекции дыхательных путей (пневмония, бронхит, инфекции ЛОР-органов), кожи и мягких тканей (фурункулез, септические язвы, инфицированные раны, целлюлиты, абсцессы), остеомиелит, инфекции мочеполовой системы, стафилококковый энтероколит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим пенициллинам).

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. При беременности используют в случае необходимости (с учетом соотношения пользы и возможного риска). С осторожностью применяют во время кормления грудью (оксациллин выделяется с молоком).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос, стоматит, глоссит, почернение языка (более вероятны при пероральном приеме); почечная недостаточность, гематурия, протеинурия, эозинофилия, агранулоцитоз, подавление функции костного мозга; суперинфекции (псевдомембранозный колит, кандидоз слизистой оболочки полости рта и прямой кишки), аллергические реакции (крапивница, зуд, ангионевротический отек, спазм гортани, бронхоспазм, гипотония, коллапс, лихорадка, миалгия, артралгия, абдоминальные боли); редко - амблиопия, нейропатия, нефропатия.

Взаим.: Эффект ослабляют бактериостатические препараты.

Примен. и доз.: В/м (медленно, глубоко); в/в (медленно или капельно); внутрь (за 1 ч до или 2 ч после приема пищи). Взрослым и детям с массой 40 кг и более - от 250 до 500 мг каждые 4-6 ч, детям с массой менее 40 кг - 50 мг/кг в день равными дозами каждые 6 ч - при инфекциях верхних дыхательных путей, кожи и мягких тканей легкой или средней тяжести; при тяжелых инфекциях нижних отделов дыхательных путей и диссеминированных: взрослым и детям с массой 40 кг и более - по 1 г или более с интервалом 4-6 ч, детям с массой менее 40 кг - 100 мг/кг в день равными дозами каждые 4-6 ч. После парентерального лечения - внутрь: взрослым от 500 мг (при легких и умеренных инфекциях) до

1 г (при тяжелых) через 4-6 ч, детям - от 50 мг/кг в день (при легких и умеренно выраженных инфекциях) до 100 мг/кг в день (при тяжелых) равными дозами через 6 ч или 4-6 ч. Инфекции, вызванные бета-гемолитическим стрептококком, лечат не менее 10 дней.

Предост.: Перед назначением требуется провести тщательный сбор аллергологического анамнеза.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Протамин сульфат (Protamine sulfate)

Протамин сульфат*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл раствора для в/в введения содержит протамин сульфата 50 мг в изотоническом растворе натрия хлорида.

Фарм. действ.: Гемостатическое, ингибция гепарина.

Клин. фарм.: Эффект развивается мгновенно ("на игле") и продолжается 2 ч.

Показ.: Кровотечения, вызванные передозировкой гепарина; перед операцией (на фоне гепариновой терапии); после операций на сердце и кровеносных сосудах с экстракорпоральным кровообращением.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, идиопатическая или врожденная гипергепаринемия.

Поб. действ.: Аллергические реакции, брадикардия, артериальная гипертензия.

Примен. и доз.: В/в струйно или капельно, по 1 ампуле, при необходимости можно вводить повторно через 15 мин, максимальная доза - 150 мг/ч (1 мг протамин нейтрализует 1 мг гепарина). При кровотечениях - капельно в 2 приема с интервалом 6 ч, суточная доза - 5-8 мг/кг массы тела, максимальный курс - 3 дня.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Протафан® НМ (Protaphane® НМ)

Инсулин человеческий*

Протафан® НМ Пенфилл® (Protaphan® НМ Penfill®)

Инсулин человеческий*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического инсулина человеческого 40 ЕД; во флаконах

по 10 мл, или 100 ЕД; в картриджах Пенфилл 1,5 мл для использования в инсулиновых шприц-ручках НовоПен и НовоПен II и в картриджах Пенфилл 3 мл для шприц-ручки НовоПен 3.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 1,5 ч после п/к введения, достигая максимума к 4-12 ч и продолжается 24 ч. Протафан НМ Пенфилл при инсулинзависимом сахарном диабете применяется в качестве базального инсулина в сочетании с инсулином короткого действия. При инсулиннезависимом сахарном диабете можно применять как для монотерапии, так и в сочетании с быстродействующими инсулинами.

Показ.: Сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа (при резистентности к производным сульфонилмочевины, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в постоперационном периоде, при беременности).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Гипогликемические состояния, аллергические реакции, липодистрофия (при длительном применении).

Взаим.: Гипогликемический эффект усиливают ацетилсалициловая кислота, алкоголь, альфа- и бета-адреноблокаторы, амфетамин, анаболические стероиды, клофибрат, циклофосфамид, фенфлурамин, флуоксетин, ифосфамид, ингибиторы МАО, метилдопа, тетрациклины, тритоквалин, трифосфамид; ослабляют - хлорпротиксен, диазоксид, диуретики (в особенности тиазиды), глюкокортикоиды, гепарин, гормональные противозачаточные средства, изониазид, лития карбонат, никотиновая кислота, фенотиазины, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты.

Передоз.: Характеризуется гипогликемией (внезапный пот, сердцебиение, тремор, чувство голода, возбужденность, раздражительность, парестезии в полости рта, бледность, головная боль, сонливость, неуверенность движений, нарушение речи и зрения, депрессия) или комой (потеря сознания, холодный пот, напряжение тканей глазного яблока, судороги по типу Джексона, вплоть до конвульсий, рефлекс Бабинского). Лечение: прием сахара (если больной в сознании), в/м 1 мг глюкагона или в/в глюкозу (40-80 мл 40% раствора).

Примен. и доз.: П/к, доза определяется индивидуально. Протафан НМ: перед употреблением содержимое флакона осторожно перемешивается до достижения однородной суспензии. При переводе па-

циентов с высокоочищенного свиного инсулина на человеческий, доза остается прежней. При переводе с бычьего или смешанного (свиной/бычий) инсулинов дозу снижают на 10%, за исключением тех случаев, когда исходная доза менее 0,6 ЕД/кг массы тела.

Предост.: При переходе от смешанного (свиной/говяжий) или говяжьего инсулина на человеческий, может возникнуть необходимость коррекции дозы. Не следует употреблять препарат, если при перемешивании суспензия не становится полностью гомогенной.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Протафан® МС (Protaphane® МС)

Инсулин изофан*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит монокомпонентного свиного инсулина 100 ЕД (изофан протамин инсулин); во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 1,5 ч после п/к введения, достигнет максимума к 4-12 ч и продолжается 24 ч.

Показ.: Сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа (при резистентности к производным сульфонилмочевины, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в постоперационном периоде, при беременности).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Гипогликемическое состояние, аллергические реакции, липодистрофия (при длительном применении).

Примен. и доз.: П/к, перед употреблением осторожно встряхивать флакон для полного перемешивания инсулина с растворителем. Доза определяется индивидуально.

Предост.: Дозу препарата необходимо корректировать при инфекционных заболеваниях, хирургических вмешательствах, беременности, нарушении функции щитовидной железы, болезни Аддисона, гипопитуитаризме, почечной недостаточности, у пациентов старше 65 лет.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Протеин-спорт (Protein-sport)

Сост. и ф.в.: 250 г порошка для приготовления питательной смеси содержат протеинов не менее 50%, жиров не более 1%, углеводов 22%, полисахаридов 19%, глюкозы 3% и сахарина натрия 0,09%;

энергетическая ценность 100 г порошка - 215 ккал (900 кДж).

Фарм. действ.: Субстратное обеспечение энергетического обмена.

Показ.: Периоды усиленного роста, реконвалесценции; в качестве пищевой добавки при занятиях спортом.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, растворяя 3-4 ложки (45-60 г) порошка в 100 мл холодной воды, в суточной дозе не более 200 г. При занятиях спортом дозируют индивидуально - от 0,5 до 2 г на 1 кг массы тела в день, в зависимости от вида спорта.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Протиазин Экспекторант (Prothiazine Expectorant®)

Сост. и ф.в.: 5 мл (1 чайная ложка) сиропа содержат прометазина гидрохлорида 5 мг, гуайфенезина 45 мг и жидкого экстракта ипекакуаны 10 мг; в бутылке 110 мл.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, противокашлевое, антигистаминное, седативное.

Показ.: Кашель при воспалительных и аллергических состояниях, постоянный и сезонный аллергический ринит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к фенотиазинам), бронхиальная астма, возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Во избежании возникновения желтухи и экстрапирамидных симптомов у новорожденного прием прекращают за 1-2 нед до родов. Во время лактации не используется.

Поб. действ.: Сухость во рту, сонливость, головокружение, повышение (незначительное) артериального давления, помутнение зрения.

Взаим.: Потенцирует эффект ингибиторов моноаминоксидазы. Действие удлиняют средства, угнетающие ЦНС (включая алкоголь).

Передоз.: Симптомы: рвота. Лечение симптоматическое; следует искусственно вызвать рвоту (если ее нет) или промыть желудок.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. 2-3 чайные ложки (дети 5-10 лет - 1 чайная ложка, дети 2-5 лет - 1/2-1 чайная ложка) 2-3 раза в день.

Произв.: CTS (Израиль)

Протрадон (Protradon)

Трамадол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит трамадола гидрохлорида 50 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее (взаимодействие с опиатными рецепторами).

Показ.: Боли (послеоперационные, посттравматические, при злокачественных опухолях, остром инфаркте миокарда, почечной и желчнокаменной коликах, панкреатите (остром и обострении хронического), в первой стадии родов, при пункциях, лапароскопии, плевральные; артралгии, невралгии и невриты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первом триместре беременности; в поздние сроки беременности и во время лактации назначают только по строгим показаниям.

Поб. действ.: Головокружение, чувство тяжести в голове, утомляемость, сонливость, сухость во рту, тошнота, рвота, повышенное потоотделение, кожные высыпания, зуд.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО. Усиливает эффект бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов, спазмолитиков.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,05-0,1 г (1-2 капсулы); суточная доза - не более 0,4 г.

Произв.: Pro.Med.CS Praha (Чехия)

Профази (Profasi®)

Хорионический гонадотропин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит человеческого хорионического гонадотропина 2000 или 5000 МЕ в комплекте с растворителем в ампулах по 1 мл; в упаковке 3 шт. в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: У женщин - преимущественно лютеинизирующее, у мужчин - преимущественно стероидогенное, инициирует и поддерживает сперматогенез.

Показ.: У женщин - бесплодие, связанное с ановуляцией, "суперовуляция" (при осуществлении различных вспомогательных методов репродукции для наступления зачатия), недостаточность желтого тела и поддержание лютеиновой фазы, привычное невынашивание беременности, угрожающий самопроизвольный выкидыш. У мужчин - гипогонадо-

тропный гипогонадизм, крипторхизм, олигоастеноспермия и азооспермия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, опухоль яичников, гипофиза, карцинома или гормонально-зависимая опухоль предстательной железы; дисгенезия гонад, отсутствие матки, раннее наступление менопаузы, непроходимость маточных труб; тромбофлебит; лактация.

Поб. действ.: Головные боли, слабость, раздражительность, беспокойство, депрессия; изредка аллергические реакции; боль в области инъекции; у женщин - синдром гиперстимуляции яичников, у мужчин - задержка жидкости, отеки, повышенная чувствительность сосков и гинекомастия, преждевременное половое созревание.

Примен. и доз.: Вводят (раствор готовят непосредственно перед употреблением, используя прилагаемый растворитель) в/м или п/к; при ановуляторном бесплодии - до 10000 МЕ в середине цикла после лечения Гоналом-Ф, Метродином или Пергоналом; для "суперовуляции" - до 10000 МЕ однократно; при недостаточности желтого тела - 5000 МЕ в/м на пятый день после овуляции, привычном невынашивании (не позднее 8 нед беременности до 14 нед), угрозе самопроизвольного выкидыша - 10000 МЕ в/м в первый раз, затем по 5000 МЕ 2 раза в неделю; мужчинам для нормализации уровня тестостерона сыворотки крови - до 4000 МЕ еженедельно, для индукции сперматогенеза - до 12000 МЕ еженедельно в течение 6-9 мес или 4000 МЕ трижды в неделю в течение 6-9 мес с последующим снижением дозы до 2000 МЕ трижды в неделю еще 3 мес; при препубертатном крипторхизме, возникшем не в результате анатомических нарушений, применяют три различные схемы введения: 4000 МЕ п/к или в/м 3 раза в неделю в течение 3 нед или 5000 МЕ п/к или в/м через день 4 инъекции или 15 п/к или в/м инъекций в дозах 500-1000 МЕ в течение 6 нед; при идиопатической нормогонадотропной олигоспермии - 5000 МЕ еженедельно в течение 3 мес вместе с пергоналом, при олигоспермии и астеноспермии - 2500 МЕ каждые 5 дней или 10000 МЕ 1 раз в 2 нед в течение 3 мес.

Произв.: Serono (Швейцария)

Профенан (Profenan)

Пропрофенон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пропрофенона гидрох-

лорида 150 и 300 мг; в упаковке 50 шт.; 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций - 35 мг (в 1 мл - 3,5 мг); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоаритмическое (блокада натриевых каналов).

Показ.: Все формы желудочковых и наджелудочковых экстрасистол, тахикардий и тахиаритмий (лечение и профилактика); WPW-синдром.

Противопоказ.: Выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок (кроме, обусловленного аритмией), тяжелая брадикардия, предшествующие синоатриальные, АВ и интравентрикулярные нарушения проведения, синдром слабости синусового узла, обструктивные заболевания легких, выраженная гипотония, тяжелая миастения, нарушение электролитного баланса.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первом триместре беременности. Кормление грудью следует прекратить.

Поб. действ.: Потеря аппетита, горький вкус и чувство онемения во рту, тошнота, рвота, головная боль, головокружение.

Взаим.: Увеличивает концентрацию в плазме дигоксина, варфарина, метопролола, бета-адреноблокаторов. Местные анестетики, препараты, уменьшающие ЧСС или обладающие отрицательным инотропным эффектом, могут усиливать действие.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в. Доза подбирается индивидуально.

Предост.: Лечение (особенно в/в введения) необходимо проводить под контролем ЭКГ и АД, поскольку большие дозы могут вызывать желудочковую тахикардию или фибрилляцию. Мужчинам не рекомендуется в/в введение более 1 нед (т.к. возможны нарушения в сперматогенезе). Тяжелые заболевания печени и почек могут привести к кумуляции.

Произв.: Slaviamed (Югославия)

Профенид (Profenid®)

Кетопрофен*

Профенид гель 2,5% (Profenid gel 2,5%)

Кетопрофен*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит кетопрофена 50 мг; в упаковке 24 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 12 шт.

1 флакон с лиофилизатом - 100 мг; в

упаковке 6 шт; 1 г геля - 25 мг; в тубах по 30 и 60 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, снижение агрегации тромбоцитов, блокада синтеза простагландинов.

Фармакокин.: Хорошо всасывается (капсулы, свечи), $T_{1/2}$ - 6 ч; проникает в ткани, создает высокую концентрацию в синовиальной жидкости, связывается с белками плазмы на 99%; проникает через плацентарный барьер; выводится почками. При местном применении в виде геля всасывается чрезвычайно медленно и практически не аккумулируется в организме. Биодоступность геля составляет около 5%, что позволяет достичь местного эффекта без воздействия на другие органы.

Показ.: Хронические воспалительные артриты (ревматоидный полиартрит, анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит, артрозы); внесуставный ревматизм, артриты, острый радикулит, боли в пояснице (купирование болевого приступа); послеоперационные боли (в/м форма). Гель: неосложненные травмы, в частности спортивные, растяжения или разрывы связок и сухожилий, мышц, тендиниты, ушибы мышц и связок, посттравматические боли и отеки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная и печеночная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения. Свечи: проктит и прокторрагия (в анамнезе). Гель: дерматозы, экземы, инфицированные ссадины и раны (мокнущие).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в I и III триместре беременности, в период лактации.

Поб. действ.: Диспептические явления (тошнота, рвота, запор или понос, боли в животе); язва желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечения (в том числе скрытые), перфорация кишечника; головная боль, головокружение, сонливость, аллергические реакции.

Взаим.: Одновременное (и предшествующее) назначение антикоагулянтов повышает риск развития желудочно-кишечных кровотечений.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, в начале лечения суточная доза - 300 мг в 2-3 приема, поддерживающая - 150-200 мг/сутки. Ректально - по 1 свече утром и вечером. В/м - 1 флакон (100 мг) в сутки (в острых случаях 2 флакона в сутки) в течение 5-10 дней, затем переходят на прием внутрь и/или ректаль-

но. Гель необходимо наносить дважды в день с последующим длительным и осторожным втиранием его в воспаленные или болезненные участки тела, затем можно наложить сухую повязку.

Предост.: Нельзя допускать попадания геля на слизистые оболочки и в глаза.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Псориатен (Psoriaten®)

Сост. и ф.в.: 10 г мази содержат матричной настойки *Mahonia aquifolium* 1 г, а также ланолин, спиртовую мазь (состоит из спиртов на основе ланолина, белого вазелина, цетилстеаринового спирта), густой парафин и очищенную воду; в тубах по 50 и 100 г.

Фарм. действ.: Противопсориатическое (уменьшение образования кожных чешуек, устранение шелушения), антипролиферативное, противовоспалительное.

Клин. фарм.: Устранение шелушения, исчезновение покраснения, псориатических очагов, оздоровление кожи наблюдается через 10-20 дней от начала лечения.

Показ.: Псориаз, сухие кожные высыпания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к ингредиентам мазевой основы.

Поб. действ.: Аллергические кожные реакции - в редких случаях.

Примен. и доз.: Наносить на пораженные участки кожи, в т.ч. на лицо, шею, волосистую часть головы, складки кожи и области перехода кожи в слизистые оболочки тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день (можно использовать длительно).

Предост.: В случаях первичного ухудшения следует прекратить применение препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Псоринохель (Psorinoheel®)

Сост. и ф.в.: 100 г 35% спиртового раствора содержат Psorinum D10, Me-dorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja D6, Bufo D10, Luesinum D12, Natrium chloratum D12, Vaccinium D8 по 10 г, Wismut-Kaliumjodid D5, Oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12 по 5 г; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоэкссудативное, ускорение регенерации, гепатопротективное, кератолитическое.

Показ.: Хронические заболевания кожи и слизистых оболочек (пигментные родимые пятна, келоидные рубцы, нейродермит, экзема, дерматоз, эритема, бородавки, волчанка); мигрень, глаукома, хронический полиартрит, нефрозы; нарушение функций печени; вялотекущие трудно поддающиеся лечению острые и хронические заболевания внутренних органов, в т.ч. и опухолевые процессы; язвы голени (вспомогательная терапия).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, обычно по 10 капель 3 раза в день. При опухолевом процессе комбинируют с Лимфомиозотом и Галиум-Хель.

Произв.: Neel (Германия)

Псоркутан (Psorcutan®)

Кальципотриол*

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит кальципотриола 50 мкг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Противопсориатическое, нормализация пролиферации и дифференциации кератиноцитов.

Показ.: Псориаз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Локальное раздражение кожи, гиперкальциемия (при применении более 100 г мази в неделю).

Примен. и доз.: Накожно, наносится на пораженные участки кожи 2 раза в день, не более 100 г в неделю.

Произв.: Schering (Германия)

Пульмекс (Pilmex®)

Пульмекс беби (Pilmex® baby)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 г мази для взрослых и детей старше 3 лет содержит перуанского бальзама (не содержащего смолы) 60 мг, камфоры 125 мг, масла эвкалиптового эфирного 50 мг и масла розмаринового эфирного 50 мг, в тубах по 40 г; 1 г мази для детей младшего возраста - перуанского бальзама (не содержащего смолы) 60 мг, масла эвкалиптового эфирного 50 мг и масла розмаринового эфирного 50 мг; в тубах по 20 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное, отхаркивающее.

Показ.: Простудные заболевания, бронхит, кашель.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, судороги в анамнезе, детский воз-

раст до 6 мес (мазь Пульмекс для детей младшего возраста) и до 3 лет (мазь Пульмекс).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наносят небольшое количество (мазь Пульмекс для взрослых и детей старше 3 лет - 2-3 раза, мазь Пульмекс для детей младшего возраста - 2 раза в день) на верхнюю часть груди и спины, вдоль средней линии. Слегка втирают до полного впитывания. Прикрывают места втирания фланелью или теплой сухой тканью.

Предост.: Нельзя наносить мазь на слизистые оболочки, в частности, глаз, носа и рта (если это произошло - немедленно промывают холодной водой), на ожоговые поверхности или поврежденную кожу.

Произв.: Novartis Consumer Health (Швейцария)

Пульмикорт (Pulmicort®)

Будесонид*

Пульмикорт Турбухалер (Pulmicort® Turbuhaler®)

Будесонид*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 доза порошка для ингаляций (Пульмикорт турбухалер) содержит будесонида 200 мкг; в упаковке 100 или 200 доз.

1 доза аэрозоля для ингаляций (Пульмикорт) - 50 или 200 мкг; в упаковке 200 и 100 доз соответственно.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное.

Фармакодин.: Уменьшает реактивность дыхательных путей к эндогенным медиаторам воспаления и аллергии, снижает явления бронхиальной обструкции.

Клин. фарм.: Эффективный период действия после однократного применения 100-1600 мкг составляет 10-12 ч. Для развития полного терапевтического эффекта необходимо 5-7 дней курсового применения.

Показ.: Бронхиальная астма.

Противопоказ.: Активный туберкулез легких, грибковые и вирусные поражения дыхательных путей.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Раздражение слизистой, кашель, охриплость голоса, кандидоз;

бронхоспазм в момент ингаляции (редко).

Взаим.: Метаболизм замедляется циметидином.

Примен. и доз.: Ингаляционно (вдохом из турбухалера). Взрослым - от 400-800 мкг до 800-1600 мкг (при тяжелом течении заболевания) в сутки (в 2-4 приема). Детям старше 7 лет - 200-800 мкг в сутки (в 2-4 приема). Поддерживающая доза (по возможности минимальная) - 2 раза в сутки (утром и вечером).

Предост.: Не следует использовать для купирования приступов. Перед ингаляцией (за 5-10 мин) рекомендуется провести ингаляцию бета₂-адреномиметика. После каждой ингаляции следует полоскать рот и горло водой (профилактика грибкового поражения).

Произв.: Astra (Швеция)

Пульмозим (Pulmozyme)

Альфа-ДНК-аза

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,5 мл раствора для ингаляций содержит альфа-ДНК-азы 2,5 мг.

Фарм. действ.: Муколитическое (ферментативное, расщепление внеклеточной ДНК).

Фармакокин.: Характеризуется малым системным всасыванием и отсутствием кумуляции.

Фармакодин.: Уменьшает вязкость мокроты при муковисцидозе, катализирует гидролиз внеклеточной ДНК (вязкий полианион) гнойной мокроты.

Клин. фарм.: Ингаляция альфа-ДНК-азы в дозах до 40 мг в течение до 6 дней не приводила к достоверному увеличению концентрации ДНК-азы в сыворотке по сравнению с нормальными эндогенными уровнями. Сывороточная концентрация ДНК-азы не превышала 10 нг/мл.

Показ.: Муковисцидоз (с показателем форсированной жизненной емкости легких - не менее 40% от нормы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 5 лет).

Бер. и корм. гр.: При беременности назначают только по абсолютным показаниям. Кормление ребенка грудным молоком во время лечения матери следует прекратить.

Поб. действ.: Фарингит, ларингит, изменение голоса, кожная сыпь (с зудом или без него), аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница); редко - появление антител к альфа-ДНК-азе.

Взаим.: Применение одновременно с антибиотиками, бронхорасширяющими

препаратами, пищеварительными ферментами, ингаляционными и системными кортикостероидами, анальгетиками эффективно и безопасно.

Примен. и доз.: Ингаляционно, с помощью компрессорного воздушного небулайзера, ежедневно, однократно - по 2,5 мл неразведенного раствора (т.е. 1 ампула); пациентам старше 21 года - возможно двухразовое введение. Рекомендуется ежедневный (без перерыва) прием препарата с продолжением обычного курса физиотерапии на грудную клетку.

Предост.: Водный раствор препарата не должен разводиться или смешиваться с другими препаратами или растворами в емкости небулайзера (возможны нежелательные структурные или функциональные изменения компонентов смеси).

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Пумпан (Pumpan®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Crataegus D1 20 мл, Arnica D6 10 мл, Kalium carbonicum D6 10 мл, Digitalis D12 10 мл, Convallaria D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Коронарорасширяющее, гипотензивное, антиаритмическое, метаболическое.

Показ.: Сердечно-сосудистые заболевания (хроническая ИБС, инфекционно-токсические миокардиты, миокардиодистрофии, артериальная гипертензия I-IIA стадии, нарушения сердечного ритма типа экстрасистол, сердечная недостаточность); функциональные расстройства сердечной деятельности (кардиалгия, физическое перенапряжение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза в день, взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды. При острых состояниях - каждые 0,5-1 ч: подросткам и взрослым - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Произв.: Bittner (Австрия)

Пури-нетол® (Puri-nethol®)

Меркаптопурин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит меркаптопурина 50 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Острый лейкоз, индукция ремиссии при острых лимфобластном и миелобластном лейкозах, хронический миелолейкоз.

Бер. и корм. гр.: В каждом случае ожидаемая польза для матери должна быть сопоставлена с возможным риском для плода. Матери, принимающие препарат, не должны кормить грудью.

Поб. действ.: Миелосупрессия (лейкопения, тромбоцитопения), нарушения функции печени (вплоть до фатальных), анорексия, тошнота, рвота, изъязвления в полости рта, в кишечнике (в последнем редко), лихорадка, кожная сыпь.

Взаим.: Подавляет антикоагулянтную активность варфарина. Катаболизм замедляется аллопуринолом.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям - по 2,5 мг/кг в день.

Предост.: Редукция дозы рекомендуется при назначении на фоне аллопуринола (4-кратная) и пациентам с почечной или печеночной недостаточностью. Во время лечения необходим контроль уровня мочевой кислоты в крови и моче, ежедневный полный анализ крови, еженедельная постановка функциональных печеночных проб (при уменьшении количества лейкоцитов и тромбоцитов ниже допустимого уровня, появлении желтухи препарат отменяют). Следует использовать контрацепцию, если один из партнеров принимает препарат.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Пустырника настойка (Tinctura Leonuri)

Сост. и ф.в.: Настойка (1:5) на 70% спирте; во флаконах-капельницах по 50 мл.

Фарм. действ.: Седативное.

Показ.: Сердечно-сосудистые неврозы, вегето-сосудистая дистония, повышенная нервная возбудимость, артериальная гипертензия (лабильная).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Совместим с другими седативными и сердечными препаратами; усиливает действие снотворных и анальгетиков.

Примен. и доз.: Внутрь, по 30-50 капель 3-4 раза в день.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Пустырника трава резано-прессованная (Herbae Leonuri consica)

Сост. и ф.в.: Трава резаная; в пачках по 100 г. Содержит стероидные и флавоноидные гликозиды, стахидрин, алкалоид леонурин, сапонины и дубильные вещества.

Фарм. действ.: Седативное.

Показ.: Сердечно-сосудистые неврозы, гипертоническая болезнь (ранние стадии), повышенная нервная возбудимость.

Взаим.: Совместим с другими седативными и сердечными препаратами; усиливает действие снотворных и анальгетиков.

Примен. и доз.: Внутрь, в виде настоя (15 г травы на 1 стакан воды) - по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Радевит (Radevitum)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат ретинола пальмитата 1 г, эргокальциферола 0,005 г, токоферола ацетата 0,5 г.

Фарм. действ.: Дерматопротективное, противовоспалительное, противозудное, стимуляция регенерации.

Показ.: Профилактика и лечение старения кожи, ихтиоз, ихтиозиформные дерматозы, себорейный дерматит, трещины, эрозии, неинфицированные раны и язвы, ожоги, аллергодерматозы.

Противопоказ.: Гипервитаминозы А, Е, D, воспалительные заболевания кожи, беременность.

Поб. действ.: Зуд, гиперемия.

Примен. и доз.: Накожно, наносят на кожу тонким слоем 2 раза в день (утром и на ночь); при сильном шелушении кожи накладывают окклюзионную повязку. Перед нанесением мази трещины и другие дефекты кожи обрабатывают антисептическими растворами.

Произв.: Ретиноиды (Россия)

Радомин (Radomin®)

Пентоксифиллин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит пентоксифиллина 400 мг; в контурной ячейковой упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Ангиопротекторное, сосудорасширяющее, антиагрегационное, улучшение микроциркуляции.

Фармакокин.: Максимальная концентрация достигается через 2-4 ч и устойчиво сохраняется 12 ч.

Клин. фарм.: Ингибируя фосфодиэстеразу и повышая в тканях ц-АМФ, вызывает снижение агрегации тромбоцитов и эритроцитов, улучшает микроциркуляцию, периферическое кровообращение, реологию крови и снабжение тканей кислородом.

Показ.: Посттромбофлебитический синдром, трофические язвы голени, гангрена, отморожения, болезнь Рейно, сосудистые нарушения глаза и органов слуха, нарушения мозгового кровообращения, диабетическая ангиопатия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первые месяцы беременности.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, кожные аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает антитромботический эффект гепарина и фибринолитических средств, действие некоторых гипотензивных и гипогликемических препаратов.

Передоз.: Симптомы: гиперемия (лицо), гипотония, клоникотонические судороги, потеря сознания, рвота (иногда "кофейной гущей"), лихорадка. Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая небольшим количеством жидкости, по 1 драже 2-3 раза в день.

Предост.: Дозу необходимо снижать при одновременном назначении с антидиабетическими и гипотензивными средствами.

Произв.: ЈАКА-80 (Македония)

Раниберл® (Raniberl®)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ранитидина 150 мг (в форме гидрохлорида); в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, антигистаминное (блокада H₂-гистаминовых рецепторов).

Показ.: Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, анастомоза; рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона; стрессовые повреждения слизистой оболочки и рецидивирующие кровотечения в ЖКТ, аспирация кислоты во время родов (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, порфирия (в анамнезе), беременность, лактация, детский возраст (до 10 лет).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, слабость, спутанность сознания, галлю-

цинации, брадикардия, АВ-блокада, нарушение зрения, боли в суставах, алоpecia, изменение картины крови, аллергические реакции, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. При язве желудка и кишечника или язвах анастомозов - по 1 таблетке 2 раза в день или по 2 таблетки 1 раз вечером. Для профилактики - ежедневно вечером по 1 таблетке. При рефлюкс-эзофагите - по 1 таблетке 2 раза в день; при синдроме Золлингера-Эллисона - по 1 таблетке 3 раза в день (до 4-6 таблеток 3 раза в день); для предупреждения аспирации кислоты во время родов принимают 1 таблетку перед родоразрешением.

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Ранитал® (Ranital®)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ранитидина хлорида 150 или 300 мг; в упаковке 20 и 30 шт. соответственно.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 50 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, повышенная кислотность желудочного сока, кровотечения в верхней части пищеварительного тракта (парентеральное введение).

Противопоказ.: Не выявлены.

Бер. и корм. гр.: Назначается в крайних случаях.

Поб. действ.: Головные боли, переутомление, запоры, тошнота, лейко- и тромбоцитопения; увеличение креатинина и трансаминазы, кожные высыпания.

Взаим.: Изменяет (взаимно) эффекты мидазолама, теofilлина, варфарина, этанола.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке (150 мг) утром и вечером, или 1 таблетку (300 мг) вечером перед сном. Длительность лечения - 4-8 нед. При синдроме Золлингера-Эллисона - до 6 г в день. Поддерживающее лечение - по 1 таблетке (150 мг) вечером перед сном 6-12 мес. В/м, по 50 мг каждые 6-8 ч. В/в, содержимое ампулы (50 мг) разводят физиологическим раствором, 5% глюкозой или др. совместимым раствором до 20 мл, вводят в течение не менее 5 мин каждые 6-8 ч. В/в инфузия - по 50 мг, разведенного в 100 мл физиологического раствора, 5% глюкозе или др. совместимом растворе, в течение не менее 15 мин

каждые 6-8 ч, или по 25 мг в час в течение 2 ч. Максимальная дневная доза - 400 мг.

Предост.: Детям до 14 лет назначается только в случае особой необходимости. Требуется осторожность при определении дозы у больных с заболеваниями печени и нарушением функции почек. Рекомендуются исследование мочи на присутствие белка (проба с сульфосалициловой кислотой).

Произв.: Lek (Словения)

Ранитидин (Ranitidine)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ранитидина 0,15 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H_2 -гистаминовых рецепторов.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью всасывается. 70% выделяется почками в неизмененном виде. Проникает через плаценту и в грудное молоко.

Фармакодин.: Подавляет базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты и пепсина.

Клин. фарм.: Продолжительность действия - 8-12 ч.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; послеоперационная язва анастомоза; состояния, сопровождающиеся гиперацидностью желудочного сока, в т.ч. рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, ощущение усталости, тошнота, запор или диарея, нарушения функции печени, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 0,15 г 2 раза в сутки (утром и вечером); продолжительность лечения при язве желудка или двенадцатиперстной кишки и рефлюкс-эзофагите - 4-8 нед. При синдроме Золлингера-Эллисона - по 0,15 г 3 раза в сутки; при неэффективности - до 0,6-0,9 г (4-6 таблеток) в сутки. При нарушении функции почек суточную дозу снижают в 2 раза.

Произв.: Мосхимфармпрепараты (Россия)

Ранитидин (Ranitidine)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит ранитидина 150 или 300 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение секреции соляной кислоты, блокада H_2 -гистаминных рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона, рефлюкс-эзофагит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, запор, диарея, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, алоpecia, повышение сывороточного креатинина и трансаминазы, аритмии, сыпь на коже.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 150 мг 2 раза в день (утром и вечером) или 300 мг вечером перед сном в течение 4-8 нед; для профилактики рецидива - по 150 мг вечером перед сном в течение 6-12 мес; при синдроме Золлингера-Эллисона - 600-900 мг в сутки в 3 приема; при рефлюкс-эзофагите - по 150 мг 2 раза в день; пациентам с клиренсом креатинина менее 50 мл/мин дозу уменьшают до 150 мг в сутки.

Предост.: Следует исключить злокачественные процессы в ЖКТ. С осторожностью назначают при нарушениях функции печени.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Ранитидин (Ranitidine)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ранитидина гидрохлорида 150 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H_2 -гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона, рефлюкс-эзофагит, другие заболевания, сопровождающиеся гиперсекрецией.

Противопоказ.: Детский возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головные боли, усталость, головокружение, экзантема.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день, в промежутках между едой. Курс - 4-6 нед.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Раствор Глюкозы (Glucose solution)

Декстроза

Сост. и ф.в.: 1000 мл раствора для инфузий содержат глюкозы обезвоженной 50 или 100 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Гидратирующее, восполнение дефицита питательных веществ.

Показ.: Гипертоническая дегидратация; парентеральное питание; исследование функции почек у дегидрированных больных (10% раствор).

Противопоказ.: Гипотоническая дегидратация.

Примен. и доз.: В/в, при почечной недостаточности нельзя превышать суточную дозу в 500 мл; 10% раствор вводят с прибавлением кристаллического инсулина (4-12 ЕД/500 мл).

Предост.: Не рекомендуется использовать совместно с кровью, консервированной раствором АСД. С осторожностью применяют при потере большого количества электролитов.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Раствор Натрия хлорида 0,9% (Solution Sodium chloride 0,9%)

Натрия хлорид

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для в/в содержит натрия хлорида 9 г; в пластиковых флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Плазмозамещающее, гидратирующее, восполнение дефицита ионов натрия, хлора.

Показ.: Возмещение дефицита воды и натрия (рвота, диарея, заболевания почек и др.), коррекция гипонатриемии в сочетании со сниженным объемом экстрацеллюлярной жидкости (хронические заболевания почек, недостаточность коры надпочечников и др.), поддержание объема экстрацеллюлярной жидкости во время и после операций, в качестве растворителя лекарственных препаратов.

Противопоказ.: Декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия.

Поб. действ.: Гипокалиемия, гипомагниемия, гипофосфатемия; боль и раздражение в месте введения, тромбофлебит.

Взаим.: При применении с кортикостероидами потенцируется гипернатриемия.

Передоз.: Характеризуется синдромом водной интоксикации (головная боль, тошнота, судороги в животе, слабость, ступор, конвульсии, кома). Рекомендуются введение гипертонического раствора NaCl, сильных диуретиков (при острой сердечной недостаточности и отеке легких), коррекция баланса электролитов.

Примен. и доз.: В/в, медленно в периферическую вену, взрослым - 500-2000 мл в сутки со скоростью 80 капель в минуту (250 мл/ч); детям - 5 мл/кг/ч, в течение первых 24 ч обеспечивают суточную потребность и половину дефицита жидкости, в течение следующих двух дней - по четверти дефицита жидкости.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Раствор Натрия хлорида с глюкозой 5% (Solution Sodium chloride with Glucose 5%)

Сост. и ф.в.: 1000 мл раствора для инфузий содержат натрия хлорида 9 г, глюкозы обезвоженной 50 г (Na⁺ 154 ммоль, Cl⁻ 154 ммоль); во флаконах по 500 мл. Раствор изотоничен с плазмой.

Фарм. действ.: Плазмозамещающее, гидратирующее, восполнение дефицита глюкозы, ионов натрия, хлора.

Показ.: Возмещение изотонического дефицита воды и натрия (рвота, диарея, заболевания почек и др.); коррекция гипонатриемии в сочетании со сниженным объемом экстрацеллюлярной жидкости (хронические заболевания почек, недостаточность коры надпочечников и др.); поддержание объема экстрацеллюлярной жидкости во время и после операций; в качестве растворителя лекарственных средств.

Противопоказ.: Гиперволемиа, гипернатриемия, гипокалиемия, острая почечная недостаточность.

Поб. действ.: Гипокалиемия, гипомагниемия, гипофосфатемия; тромбофлебит; боль и раздражение в месте введения; при быстром или длительном введении большого объема - отеки, синдром водной интоксикации: головная боль, тошнота, судороги в животе, слабость, ступор, конвульсии, кома.

Передоз.: Характеризуется синдромом водной интоксикации. Рекомендуется введение гипертонического раствора NaCl, сильных диуретиков (при острой

сердечной недостаточности и отеке легких), коррекция баланса электролитов.

Примен. и доз.: В/в медленно в периферическую вену, взрослым - 500-2000 мл раствора в сутки со скоростью 80 капель в минуту (250 мл/ч); детям - 5 мл/кг/ч, в течение первых 24 ч обеспечивают суточную потребность плюс половину дефицита жидкости, в течение следующих двух дней - по четверти дефицита жидкости.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Раствор Рингера (Ringer's solution)

Сост. и ф.в.: 1000 мл раствора для инфузий содержат натрия хлорида 8,6 г, калия хлорида 0,3 г и кальция хлорида ($\text{CaCl}_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$) 0,5 г; во флаконах по 500 мл.

Фарм. действ.: Возмещение дефицита экстрацеллюлярной жидкости, основных электролитов.

Показ.: Дефицит экстрацеллюлярной жидкости (при отсутствии необходимости возмещения эритроцитов): шок, коллапс, ожоги, замерзание, рвота, понос.

Противопоказ.: Декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия.

Примен. и доз.: В/в, медленно, 500-1000 мл.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Раствор Хартмана (Hartman's solution)

Сост. и ф.в.: 1000 мл раствора для инфузий содержат натрия хлорида 6,02 г, калия хлорида 0,373 г, кальция хлорида 0,294 г, натрия лактата 3,138 г (ионов натрия 131 ммоль, калия 5 ммоль, кальция 2 ммоль, хлора 112 ммоль, лактата 28 ммоль); во флаконах по 500 мл. Раствор изотоничен с экстрацеллюлярными жидкостями.

Фарм. действ.: Временное поддержание объема плазмы, восполнение дефицита электролитов.

Показ.: Восполнение дефицита воды и электролитов при сохраненном КЩС или слабом ацидозе (рвота, понос, ожоги, перитонит, тяжелые инфекции); поддержание объема экстрацеллюлярной жидкости во время и после операций; начальная терапия дефицита крови, шока, травм.

Противопоказ.: Гипертоническая дегидратация, алкалоз, лактический ацидоз, острая почечная недостаточность, отек

легких, тяжелые нарушения функции печени, беременность.

Примен. и доз.: В/в, со средней скоростью 60 капель/мин, до 2500 мл в сутки. При неотложных состояниях - до 180 капель/мин, в объеме, зависящем от состояния больного. В течение первых 24 ч необходимо обеспечить суточную потребность в жидкости плюс половину дефицита жидкости, в течение следующих двух дней - по четверти дефицита жидкости.

Предост.: Необходимо постоянно контролировать кислотно-щелочное равновесие. Не следует применять для коррекции значительного дефицита катионов калия и кальция. С осторожностью используют при сердечной недостаточности, нарушениях функции почек и печени, гипопроотеинемии, на фоне кортикостероидов или кортикотропина.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Раствор Хартманна (Hartmann's Solution)

Сост. и ф.в.: 1 л раствора для инфузий содержит натрия хлорида 7 г, калия хлорида 0,4 г, кальция хлорида 0,2 г и натрия лактата 3 г (натрий 146,4 ммоль, калий 5,4 ммоль, кальций 1,8 ммоль, хлор 128,8 ммоль, лактат 26,8 ммоль); в мешках из ПВХ по 500 мл. Раствор близок к изотоническому. Осмолярность 290 мосмол/кг.

Фарм. действ.: Гидратирующее, восстановление кислотно-щелочного равновесия.

Показ.: Снижение экстрацеллюлярного объема (при изотонической дегидратации), метаболический ацидоз.

Противопоказ.: Гиперволемиа, гипертоническая дегидратация, гиперкалиемиа, гипернатриемиа, тяжелые формы гипертензии, серьезные нарушения функции сердца и/или почек, гиперхлоремия, алкалоз, функциональные расстройства печени (снижение образования гидрокарбоната из лактата); гиперлактацидемия.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Тромбофлебиты, расширение и повышенное наполнение кровеносных сосудов, гипергидратация, сердечная декомпенсация, гиперхлоремия, беспокойство.

Взаим.: Возможно увеличение задержки натрия в организме в связи с приемом следующих лекарственных веществ: НПВС, андрогенов, анаболических стероидов, эстрогенов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров

и ганглиоблокаторов. Усиливает гиперкалиемию на фоне калий-сберегающих диуретиков. Увеличивает (кальций) вероятность токсических эффектов сердечных гликозидов. Защелачивая мочу и тормозя экскрецию, может повысить и удлинить действие амфетаминов и родственных субстанций. Ускоряет выделение лития и салицилатов.

Примен. и доз.: В/в. Дозировка препарата зависит от состояния больного и устанавливается лечащим врачом в каждом конкретном случае. Максимальная суточная доза 2500 мл.

Предост.: Требуется повышенная осторожность при назначении пациентам со слабой или средней степенью гипертензии и нарушением функции почек, склонностью к сердечной декомпенсации, дыхательной недостаточностью, острой дегидратацией, а также получающим кортикостероиды. Рекомендуется проводить регулярный мониторинг крови на содержание электролитов, жидкости, изменение значений рН и pCO_2 .

Произв.: CSC (Италия)

Растоцин (Rastocin)

Доксорубин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит доксорубина 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Острый лимфобластный лейкоз, острый миелобластный лейкоз, злокачественная лимфома, опухоль Вильмса, нейробластома, саркома мягких тканей, остеосаркома, рак молочной железы, яичников, мочевого пузыря, щитовидной железы, легких и желудка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженное нарушение функции кроветворения вследствие предшествующей химио- или лучевой терапии, предшествующая терапия антрациклинами в максимальных суммарных дозах.

Поб. действ.: Нарушение функции миокарда, миелосупрессия, потеря аппетита, тошнота, рвота; редко - язвенные поражения слизистой ротовой полости или толстой кишки, приводящие к кровотечению, анафилактические реакции.

Примен. и доз.: В/в, в течение 3-5 мин, обычно в дозе 60-75 мг/кв.м поверхности тела 1 раз с повторением курса каждые 3 нед или 20 мг/кв.м 1 раз в неделю. Суммарная доза не должна превышать 550 мг/кв.м поверхности тела. Возможна моно- или полихимиотерапия. Боль-

ным старческого возраста назначают более низкие дозы.

Предост.: С осторожностью назначают при болезнях сердца (в т.ч. в анамнезе). Лечение рекомендуется проводить в специализированном стационаре (в начале лечения) под наблюдением химиотерапевта, под постоянным контролем функций сердца, печени, костного мозга.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Реальдирон™ (Realdironum)

Интерферон альфа*

Сост. и ф.в.: 1 ампула или 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекций содержат интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного 1; 3 или 6 млн МЕ; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное, противоопухолевое.

Фармакодин.: Активное вещество (интерферон альфа-2b, человеческий рекомбинантный) выделяют из биомассы бактерий *Pseudomonas putida*, в генетический аппарат которых встроен ген человеческого лейкоцитарного интерферона альфа-2b. Взаимодействуя с родственными рецепторами на поверхности клетки, инициирует сложную цепь изменений внутри клетки. Предотвращает репликацию вирусов, тормозит пролиферацию клеток, оказывает иммуностимулирующее действие, повышает фагоцитарную активность макрофагов, цитотоксическую активность Т-клеток и "натуральных киллеров".

Показ.: Вирусные заболевания (острый гепатит В, хронический активный гепатит В, хронический гепатит С, клещевой энцефалит) и онкологические заболевания: волосатоклеточный лейкоз, хронический миелолейкоз, рак почек, связанная со СПИДом саркома Капоши, кожная Т-клеточная лимфома (грибовидный микоз и синдром Сезари), злокачественная меланома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Беременным женщинам и кормящим матерям препарат следует назначать с осторожностью и только при явном преобладании ожидаемого терапевтического эффекта по сравнению с возможным нежелательным воздействием на плод (особенно в первые 3 мес) или ребенка.

Поб. действ.: Гриппоподобные симптомы (озноб, повышение температуры,

утомляемость, вялость, головная боль, мышечные боли, артралгия, потеря аппетита), лейко- и тромбоцитопения, изменение показателей функции печени, которые нормализуются после прекращения лечения Реальдином. Для смягчения гриппоподобных симптомов рекомендуется одновременное назначение парацетамола до 1 г/сутки. При сохранении или усилении побочных эффектов дозу препарата снижают до 50% или прекращают лечение.

Примен. и доз.: В/м или п/к, растворив непосредственно перед применением содержимое ампулы или флакона в 1 мл воды для инъекций (раствор должен быть прозрачным, без посторонних включений). При остром гепатите В препарат вводят по 1 млн. МЕ 2 раза в сутки в течение 5-6 дней, затем дозу снижают до 1 млн. МЕ/сутки и вводят еще 5 дней. При необходимости (после контрольных биохимических исследований крови) курс лечения может быть продолжен - по 1 млн. МЕ 2 раза в неделю в течение 2 нед. Наибольшая эффективность отмечается в начале желтушного периода (до 5-го дня желтухи), и не эффективен при развивающейся печеночной коме и холестатическом течении заболевания. При хроническом активном гепатите В - по 3-6 млн. МЕ 3 раза в неделю в течение 6 мес; при отсутствии эффекта в течение 3 мес лечение прекращают. При хроническом гепатите С - по 3 млн. МЕ 3 раза в неделю в течение 6 мес; если в течение месяца не наблюдается снижения на 50% активности АЛТ, дозу увеличивают до 6 млн. МЕ 3 раза в неделю; при отсутствии эффекта в течение 3 мес лечение прекращают. При менингитальных формах клещевого энцефалита - по 1-3 млн. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней, затем (поддерживающая терапия) - 5 раз по 1 млн. МЕ через каждые 2 дня. Эффективная доза препарата при опухолях составляет не менее 18 млн. МЕ 3 раза в неделю; терапевтический эффект достигается после 8-12 нед лечения или даже позднее. При волосатоклеточном лейкозе - по 3 млн. МЕ ежедневно в течение 2 мес, при достижении гематологической ремиссии - по 3 млн. МЕ 3 раза в неделю. При хроническом миелолейкозе - по 9 млн. МЕ ежедневно, при достижении ремиссии - по 6 млн. МЕ 3 раза в неделю или ежедневно. При раке почек - по 18 млн. МЕ 3 раза в неделю (наиболее эффективен при легочных метастазах). При саркоме Капоши, связанной со СПИДом, - по 36 млн. МЕ ежедневно (если нет

резкого прогрессирования заболевания или тяжелых проявлений непереносимости препарата). После достижения лечебного эффекта - поддерживающая терапия по 18 млн. МЕ 3 раза в неделю. При кожной Т-клеточной лимфоме - 18 млн. МЕ ежедневно. При злокачественной меланоме - 9-18 млн. МЕ ежедневно, поддерживающая терапия - 9-18 млн. МЕ 3 раза в неделю.

Предост.: С осторожностью назначают больным с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы (возможны аритмии, ухудшение состояния из-за колебания температуры тела). Следует исключить употребление алкоголя. Следует учесть, что в зависимости от индивидуальной чувствительности и дозы могут наблюдаться слабость, сонливость, утомляемость, замедленная реакция.

Произв.: Биофа (Литва)

Ребиф (Rebif®)

Интерферон бета*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит 3000000 МЕ рекомбинантного человеческого бета-интерферона, в комплекте с растворителем (физиологический раствор) в ампулах по 2 мл; в упаковке 1 или 3 комплекта.

Фарм. действ.: Противовирусное, противоопухолевое, иммуномодулирующее.

Показ.: Острые, рецидивирующие и хронические вирусные инфекции: генитальный герпес, вирусные папилломы, плоские и остроконечные кондиломы, Herpes labialis, опоясывающий лишай (локальный и генерализованный), хронический активный гепатит В у взрослых; хронические активные гепатиты др. происхождения, опухоль шейки матки (внутриэпителиальная), неопластический плевральный выпот, волосатоклеточный лейкоз, карцинома молочных желез и эндометрия (с последующей гормональной терапией).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, тяжелые сердечные заболевания и нарушения функции печени, почек, ЦНС (включая эпилепсию); гепатиты (хронические на фоне цирроза печени, терапии иммунодепрессантами, аутоиммунный), предшествующие заболевания щитовидной железы.

Поб. действ.: Нарушения сердечно-сосудистой системы и ЦНС, повышение температуры тела, головная боль, астения, миалгия, тошнота, рвота; при дли-

тельном применении - тахикардия, гипотония, отсутствие аппетита, диарея, боли в костях и суставах, головокружение, бессонница, одышка, выпадение волос, анемия, лейко- и тромбоцитопения.

Примен. и доз.: В/м (предпочтительно), в/в (при лейкомии). Дозу и курс лечения устанавливают индивидуально в зависимости от заболевания. Обычные однократные дозы при герпетических инфекциях - по 2-3 млн. МЕ, при гепатитах - по 5-6 млн. МЕ (с дальнейшей коррекцией дозы); в онкологии - по 2-6 млн. МЕ (при плевральном выпоте - внутривенно, до 20 млн. МЕ).

Произв.: Seroно (Швейцария)

Ревит (Revitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, или 1 драже содержат ретинола ацетата 0,00086 г (2500 МЕ), тиамин бромид 0,00129 г, рибофлавина 0,001 г и кислоты аскорбиновой 0,035 г.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов.

Показ.: Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах (повышенная физическая и психическая нагрузка, беременность, реконвалесценция после инфекционных заболеваний).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки или драже 2-3 раза в сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Ревиталайз-АДС® (Revitalize-ADC)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А (ретинола) 5000 ЕД, витамина С (аскорбиновой кислоты) 61,5 мг, витамина Д 400 ЕД, витамина Е (альфа-токоферола) 30 ЕД, витамина В₁ (тиамина) 1,5 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,7 мг, витамина В₆ (пиридоксина) 2,0 мг, никотинамида 20 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, пантотената кальция 10 мг, витамина В₁₂ (цианокобаламина) 6 мкг, бета-каротина 0,6 мг.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов.

Показ.: Дефицит витаминов в зимне-весенний сезон, период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний, хронические заболевания ЖКТ, печени, органов дыхания, нарушения об-

мена веществ и общего состояния у пациентов старших возрастных групп.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: При использовании рекомендуемых дозировок не описаны.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке ежедневно.

Предост.: Не следует превышать рекомендуемую дозу (во избежание развития гипервитаминоза).

Произв.: American Drug Company (США)

Ревиталайз-К-АДС® (Revitalize-K-ADC)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка в виде фигурки животных содержит витамина А (ретинола) 2500 ЕД, витамина С (аскорбиновой кислоты) 60 мг, витамина Д - 400 ЕД, витамина Е (альфа-токоферола) 15 ЕД, витамина В₁ (тиамина) 1,05 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,2 мг, витамина В₆ (пиридоксина) 1,05 мг, никотинамида 13,5 мг, фолиевой кислоты 300 мкг, витамина В₁₂ (цианокобаламина) 4,5 мкг.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов.

Показ.: Дефицит витаминов в зимне-весенний сезон, период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний, хронические заболевания ЖКТ, печени, органов дыхания, нарушения обмена веществ и общего состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день, во время еды (разжевывая).

Предост.: Не следует применять большие дозы (во избежание гипервитаминоза). Не рекомендуется назначать в течение длительного времени детям младше 4 лет.

Произв.: American Drug Company (США)

Ревиталайз-Мульти-М АДС® (Revitalize-Multi-M ADC)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А (ретинола) 5000 ЕД, витамина С (аскорбиновой кислоты) 60 мг, витамина Д 400 ЕД, витамина Е (альфа-токоферола) 30 ЕД, витамина В₁ (тиамина) 1,5 мг, витамина В₂ (рибофлавина) 1,7 мг, витамина В₆

(пиридоксина) 2 мг, никотинамида 20 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, пантотената кальция 10 мг, витамина В₁₂ (цианкобаламина) 8 мкг, бета-каротина 0,6 мг, витамина К 25 мкг, биотина 30 мкг; кальция 162 мг, магния 100 мг, калия 40 мг, железа 18 мг, цинка 15 мг, марганца 2,5 мг, меди 2 мг, бора 150 мкг, йода 150 мг, хрома 25 мкг, селена 20 мкг, молибдена 25 мкг, кремния 2 мг, ванадия 10 мкг, олова 10 мкг, никеля 5 мкг.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов, минералов и микроэлементов.

Клин. фарм.: Повышает сопротивляемость к физическим нагрузкам, стрессу, инфекциям, увеличивает работоспособность и снижает утомляемость.

Показ.: Дефицит витаминов и микроэлементов в зимне-весенний сезон, период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний, хронические заболевания ЖКТ, печени, органов дыхания, нарушения обмена веществ и общего состояния у пациентов старших возрастных групп, беременных женщин и кормящих матерей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, микросфероцитарная анемия, гемосидероз, а также состояния и заболевания, при которых противопоказано применение препаратов, содержащих железо или медь.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью (перед началом приема следует проконсультироваться с врачом).

Примен. и доз.: Внутрь, 1 таблетку, не разжевывая, во время еды, ежедневно.

Предост.: Не следует превышать рекомендуемую дозу (во избежание гипервитаминоза).

Произв.: American Drug Company (США)

Ревма-гель® (Rewma-Gel®)

Сост. и ф.в.: 10 г геля содержат матричной настойки *Rhus toxicodendron* 0,5 г, матричной настойки *Ledum* 0,5 г, матричной настойки *Symphytum ad usum externum* 1,0 г, а также 10% раствор гидроксида натрия, полиакриловую кислоту, очищенную воду; в тубах по 35 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, усиление кровоснабжения тканей, снижение мышечного напряжения.

Клин. фарм.: *Rhus toxicodendron* усиливает кровоснабжение тканей, уменьшает интенсивность воспаления (особенно эф-

фективен при хронических болях в суставах). *Ledum* усиливает кровоснабжение опорной мускулатуры. *Symphytum* обладает болеутоляющими свойствами (особенно при повреждении костной ткани и надкостницы).

Показ.: Ревматические и дегенеративные заболевания мышц и суставов, болезненные напряжения и растяжения мышц, люмбаго (боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к *Rhus toxicodendron* (сумах ядовитый).

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наносить на болезненные места, слегка втирая в кожу, 3 раза в день.

Предост.: В случае первичного ухудшения следует прекратить использование препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Ревмон гель (Rheumon® gel)

Этофенамат*

Сост. и ф.в.: 1 г геля содержит этофенамата 50 мг; в тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, противоревматическое.

Показ.: Ревматические заболевания мягких тканей и костно-мышечной системы, миозит, миалгия, люмбаго, ишиас, тендосиновит, бурсит, болезни позвоночного столба и суставов, вызванные перегрузкой или дегенерацией (спондилезы, артрозы), ушибы, растяжения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Покраснение кожи, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно, втирают полоску геля 5-10 см длиной (1650-3300 мг). Курс лечения - от нескольких дней до нескольких месяцев. Гель не наносят на поврежденную кожу или на место экзематозного воспаления.

Произв.: Bayer (Германия)

Регенерин (Regenerin®)

Сост. и ф.в.: Биологически активная пищевая добавка. 1 капсула содержит масла бурачника 250 мг, пиридоксина гидрохлорида 52,5 мг, цитрата цинка 15 мг, DL-альфа-токоферола ацетата 21 мг, оксида магния 85 мг, гидрированного и негидрированного масла сои 86,8 и 5,8

мг и оксида кремния 3,9 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение относительного дефицита витаминов (В₆ и Е) и микроэлементов (цинка и магния), метаболическое, антиоксидантное, восстановление гормонального равновесия (эстрогенов и прогестеронов), антисклеротическое.

Клин. фарм.: Лекарственные растения бурачник и соя приводят к освобождению организма от токсинов. Восстановление гормонального равновесия достигается за счет гамма-линоленовой кислоты (из масла бурачника) и солей цинка и магния, которые способствуют синтезу в тканях простагландинов.

Показ.: Вегетативные и психо-эмоциональные нарушения при предменструальном синдроме и климаксе (у женщин).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи, по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером; при предменструальном синдроме - за 10 дней до ожидаемого начала менструаций в течение трех менструальных циклов; при климаксе - независимо от менструального цикла до исчезновения климактерических нарушений. Для профилактики любых функциональных нарушений у практически здоровых женщин - по 1 капсуле 1 раз в день (утром натощак).

Произв.: Diet Pharma (Германия)

Регидрон (Rehydron)

Сост. и ф.в.: 1 доза порошка для приготовления питья содержит натрия хлорида 3,5 г, калия хлорида 2,5 г, натрия цитрата 2,9 г и глюкозы 10 г; в пакетиках по 20 шт.

Фарм. действ.: Восстановление водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса.

Показ.: Диарея у детей.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Содержимое пакетика растворить в 1 л холодной свежее кипяченой воды (в течение суток можно хранить в холодильнике) и принимать после каждого жидкого стула - по 30 мл/кг за 6-10 ч.

Произв.: Orion (Финляндия)

Реглан® (Reglan®)

Метоклопрамид*

Сост. и ф.в.: 1 делимая таблетка содержит метоклопрамида (гидрохлорида) 10 мг; в упаковке 40 шт.

1 ампула с 2 мл инъекционного раствора - 10 мг; в упаковке 12 шт.

100 мл раствора (ароматизированного) для приема внутрь - 100 мг (0,1%); во флаконах по 200 мл.

Фарм. действ.: Противорвотное (центральное), нормализация моторной функции ЖКТ, нейролептическое.

Показ.: Диспепсии, обусловленные нарушением моторики ЖКТ, тошнота, рвота; подготовка к диагностическим исследованиям ЖКТ.

Противопоказ.: Желудочно-кишечное кровотечение, обтурация или перфорация желудка или кишечника, дискинезия мышц тела (вследствие лечения нейролептиками), подозрение на феохромоцитому, лактация.

Поб. действ.: Сонливость, бессонница, утомляемость, головокружение, экстрапирамидные симптомы, головная боль, понос, метеоризм, гиперпролактинемия, аменорея, галакторея, гинекомастия, дискинезия мышц тела, депрессия.

Взаим.: Несовместим с нейролептиками, алкоголем, противопаркинсоническими препаратами.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды; взрослым - по 5-10 мг (1/2-1 таблетка) или 1-2 чайные ложки (5-10 мл) раствора орального 3 раза в день; при обострении - 2 мл в/м или в/в (при необходимости - повторно); детям - по 2,5-5 мг внутрь, в/м или в/в - по 1 мл.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с почечной недостаточностью, болезнью Паркинсона, эпилепсией, водителям и работающим с техникой.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Регулакс (Regulax®)

Сеннозиды А и Б

Сост. и ф.в.: 1 ароматизированный, делимый, фруктовый кубик для приема внутрь содержит порошка листьев сенны (кассии) 0,71 г и плодов сенны 0,3 г, мусс из слив, пасту из инжира, сорбиновую кислоту, сорбит, инертный сахар; в упаковке 6, 18 или 36 шт.

Фарм. действ.: Слабительное, увеличение объема кишечного содержимого, стимуляция перистальтики.

Клин. фарм.: Действие наступает через 8 ч после приема.

Показ.: Запоры (редкий и/или жесткий стул); атония кишечника.

Противопоказ.: Паралитическая кишечная непроходимость; острые воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит и др.); боли в животе неизвестного происхождения; детский возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется (проникает в грудное молоко).

Поб. действ.: Спастические нарушения ЖКТ, при длительном применении - потеря электролитов, гипокалиемия (нарушения функции сердца, мышечная слабость); альбуминурия, гематурия; псевдомеланоз кишечника.

Взаим.: Усиливает (при длительном или в высоких дозах применении) эффект сердечных гликозидов и антиаритмических средств (следствие гипокалиемии). Тиазидные мочегонные, гормоны коры надпочечника, препараты из корня солодки увеличивают риск развития гипокалиемии.

Примен. и доз.: Внутрь, предварительно разжевать, по возможности вечером, перед сном. Взрослым - по 1 кубику, детям старше 12 лет - по 1/4-1/2 кубика. Индивидуально правильной является наименьшая доза, необходимая для получения мягкого стула. Не следует применять более 1-2 нед без консультации врача.

Предост.: Нежелательно применение в течение длительного времени или в высоких дозах, т.к. возможно усиление атонии кишечника. Рекомендуется только в случаях, когда изменением питания или применением набухающих препаратов не достигается терапевтический эффект. Следует иметь в виду, что физиологическая калорийность 1 кубика - примерно 63 кДж, равная 15,4 ккал или 0,31 ХЕ.

Произв.: Krewel Meuselbach (Германия)

Редактив (Redactiv)

Рифаксимин*

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат рифаксимины 5 г; в тубиках по 30 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра.

Показ.: Контагиозное импетиго, опрелость, фолликулит, фурункулез, ангулярный хейлит, гидраденит, эритразма, эктима и др. кожные инфекции, вызванные пиогенными микробами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, младенческий возраст.

Поб. действ.: Местное раздражение (покраснение кожи и повышение температуры), сенсibilизация (при длительном применении).

Примен. и доз.: Накожно, наносят на пораженное место (без втирания) полоску мази от 2 до 10 см 2-4 раза в день; курс лечения - не менее 5 и не более 15 дней.

Произв.: CSC (Италия)

Редергин® (Redergin®)

Дигидроэрготоксин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дигидроэрготоксина мезилата 1,5 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл раствора для приема внутрь (20 капель) - 1 мг; во флаконах по 50 мл.

1 мл раствора для инъекций - 0,3 мг; в ампулах по 1 и 5 мл; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, вазодилатирующее, альфа-адреноблокирующее, центральное дофамин- и серотонинстимулирующее, улучшение кровоснабжения мозга.

Показ.: Цереброваскулярная и вертебробазилярная недостаточность, ишемический инсульт, состояние после геморрагического инсульта или травматического повреждения головного мозга, периферические ангиопатии (болезнь Бюргера, болезнь Рейно), ретинопатия и кохлеовестибулярный синдром сосудистого происхождения, мигрень, вазомоторная головная боль, артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, брадикардия, артериальная гипертензия.

Поб. действ.: Анорексия, диспепсия, тошнота, рвота, абдоминальные боли, нарушения зрения, заложенность носа, ортостатическая гипотония, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, по 30-40 капель (1 таблетке) 3 раза в день. Парентерально (в/в, в/в капельно, в/м, п/к) - не менее 3 мг в сутки в течение первых 10-15 дней, затем дозы снижают. При артериитах - в/а по 0,3-0,6 мг/сутки или электрофоретически (с положительного полюса).

Произв.: Lek (Словения)

Рекормон (Recormon®)

Эпоэтин бета*

Сост. и ф.в.: 1 флакон содержит рекомбинантного человеческого эритропоэтина в виде лиофилизированного вещества по 1000, 2000 или 5000 МЕ; в упаковке 10 шт. (1000 и 2000 МЕ) и 5 шт. (5000 МЕ); в комплекте с растворителем в ампулах по 1 мл.

Фарм. действ.: Гемопоэтическое, активация митоза, стимуляция образования эритроцитов.

Фармакокин.: Биодоступность при п/к введении составляет 46%. $T_{1/2}$ при п/к введении - 16 ч, при в/в - 4-12 ч.

Клин. фарм.: Эффект (повышение гематокрита) проявляется через 4 нед после начала лечения.

Показ.: Анемия (почечная, у новорожденных и недоношенных детей, при злокачественных новообразованиях), угнетение эритропоэза, вызванное дефицитом эритропоэтина.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальная гипертензия (плохо поддающаяся лекарственной коррекции).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Симптоматика гриппа или простуды (в начале лечения), повышение АД, аллергические реакции (акнеподобная сыпь, анафилактоидные реакции).

Примен. и доз.: В/в, п/к. При п/к введении начальная доза составляет 20 МЕ/кг 3 раза в неделю, или 10 МЕ/кг 7 раз в неделю; в случае слабого увеличения гематокрита доза увеличивается на 20 МЕ/кг каждые 3 нед. При в/в введении начальная дозировка составляет 40 МЕ/кг 3 раза в неделю; при недостаточном эффекте доза увеличивается на 40 МЕ/кг каждые 4 нед. При любом пути введения максимальная доза не должна превышать 720 МЕ/кг. У детей старше 2 лет препарат применяется в тех же дозах, что и у взрослых.

Предост.: Осторожно назначать больным с артериальной гипертензией, злокачественными новообразованиями, эпилепсией, тромбоцитозом, серповидноклеточной анемией и заболеваниями сосудов.

Произв.: Boehringer Mannheim (Германия)

Ремантадин (Remantadinum)

Римантадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит римантадина гидрохлорида 50 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Показ.: Грипп (ранние стадии), профилактика клещевого энцефалита.

Противопоказ.: Гепатит, нефрит, почечная недостаточность, тиреотоксикоз, беременность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гастралгия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, в 1-е сутки - по 100 мг 3 раза (или 300 мг однократно), во 2-й и 3-й день - по 100 мг 2 раза, в 4-й день - 100 мг 1 раз; детям от 7 до 10 лет - по 50 мг 2 раза в день, от 11 до 14 лет - 3 раза в день. Курс - 5 дней. В качестве профилактического средства - по 50 мг 1 раз в день в течение 10-15 дней. После укуса энцефалитного клеща - 100 мг 2 раза в день в течение ближайших 72 ч.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Ременс (Remens®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Cimicifuga D1 5 мл, Sanguinaria D6 10 мл, Aristolochia D6 10 мл, Sepia D12 10 мл, Lachesis D12 10 мл, этиловый спирт 43% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30, 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Регуляция функций женских половых органов, противовоспалительное.

Показ.: Нарушения менструального цикла (альгодисменорея, вторичная аменорея, меноррагия, метроррагия), предменструальный синдром, климактерический синдром, воспалительные заболевания женской половой сферы (эндометрит, сальпингоофорит, цервицит, кольпит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды, 3 раза в день за 30 мин до или через 1 ч после еды. При острых состояниях принимать каждые 0,5-1 ч по 5-7 капель до наступления улучшения,

но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Произв.: Bittner (Австрия)

Реместип (Remestyp®)

Терлипрессин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит терлипрессина 200 мкг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Вазопрессорное, гемостатическое.

Показ.: Кровотечения из ЖКТ (в т.ч. из варикознорасширенных вен пищевода), мочеполовой системы, интраоперационные абдоминальные кровотечения.

Противопоказ.: Ранние сроки беременности, токсикоз беременных, эпилепсия, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, аритмии, бронхиальная астма.

Поб. действ.: Побледнение, усиление перистальтики кишечника (боли в животе, отрыжка, тошнота, рвота), сокращения матки (боли).

Взаим.: Усиливает эффект окситоцина и метилэргометрина.

Примен. и доз.: В/в, в/м, в миометрий - по 200-800 мкг, максимальная продолжительность курса - 7 дней.

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Реметан (Remetan™)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка в кишечнорастворимой оболочке содержит диклофенака натрия 25 или 50 мг; в упаковке 30 или 20 и 100 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, боли в пояснице и в плечевых суставах, воспаления сухожилий, бурсит, растяжения, разрывы, острая подагра, болевой и воспалительный синдромы в ортопедической, зубной и др. "малой" хирургии; у детей - юношеский хронический артрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, пептическая язва, беременность.

Поб. действ.: Боль в эпигастральной области, тошнота, диарея, пептическая язва, рвота с кровью (мелена), головная боль, головокружение, периферические отеки, изменения сывороточных трансаминаз, фотосенсибилизация, полиморфная эритема, синдром Стивенса-

Джонсона и Лайелла, кожные высыпания, в т.ч. буллезные.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым, включая пожилых, - по 75-150 мг в день в 2-3 приема, детям - по 1,3 мг/кг массы тела в день в несколько приемов.

Предост.: С осторожностью следует назначать при пептической язве в анамнезе, рвоте с кровью, геморрагическом диатезе, тяжелой печеночной и почечной недостаточности.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Ремоксикам (Remoxicam®)

Пироксикам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пироксикама 10 или 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, угнетение синтеза простагландинов (подавления активности циклооксигеназы).

Фармакокин.: Хорошо всасывается - C_{max} в плазме достигается в течение 4-8 ч. Продолжительность действия - 36-48 ч. $T_{1/2}$ - около 45 ч. Выводится из организма с мочой преимущественно в связанном виде.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартрозы, анкилозирующий спондилит, подагра, внесуставной ревматизм, травматические и послеоперационные боли, повреждения мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, невралгии, миалгии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, недостаточность функции печени и почек, беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, пептические изъязвления, желудочно-кишечные кровотечения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, по 10-40 мг/сутки за 1 прием.

Предост.: С осторожностью назначать больным с бронхиальной астмой, нарушением свертываемости крови. Не следует сочетать с др. противоревматическими средствами.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Ренель (Reneel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Berberis D2 15 мг, Acidum nitricum D4, Cantharis D5, Plumbum aceticum D6, Pareira brava D3, Sabal serrulatum D2 по

30 мг, Causticum Hanemannii D4 60 мг, Alumina D12 75 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, диуретическое, обезболивающее, противовоспалительное.

Показ.: Мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания мочевыводящих путей (цистит, цистопиелит); аденома простаты и гидронефроз, почечные колики, боли в спине по утрам, особенно, в области почек; недержание мочи.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, обычно по 1 таблетке 3 раза в день. При аденоме простаты и гидронефрозе назначают в сочетании с Траумель С, при почечной колике - со Спаскупрель.

Произв.: Heel (Германия)

Ренитек (Renitec®)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 5, 10 или 20 мг.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, блокада АПФ.

Фармакокин.: Быстро всасывается при пероральном приеме, в незначительных количествах определяется в плаценте и молоке. Гидролизуется до эналаприлата.

Показ.: Эссенциальная гипертензия (легкая, средняя и тяжелая формы); реноваскулярная гипертензия; сердечная недостаточность I-III стадии; профилактика коронарной ишемии у пациентов с дисфункцией левого желудочка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, гиперкалиемия, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: В период беременности применяют только по жизненным показаниям (возможна смерть плода или новорожденного). При назначении кормящим матерям следует соблюдать осторожность.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, астения, судороги и другие нарушения со стороны нервной системы (депрессия, спутанность сознания и др.), гипотензия, в том числе ортостатическая, диспептические расстройства, нарушения дыхательной системы (легочные инфильтраты, бронхоспазм), почечная недостаточность, аллергические реакции с кожными проявлениями, ангионевротический отек (лицо, губы, язык, голосовая щель, гортань, конечности).

Взаим.: Совместим с другими гипотензивными препаратами (аддитивный эффект). Уменьшает потерю калия, инду-

цированную диуретиками; применение с калийсберегающими диуретиками или солями калия может привести к выраженной гиперкалиемии. Снижает клиренс лития.

Передоз.: Основными симптомами являются выраженная гипотензия (через 6 ч после приема препарата) и ступор. Лечение: в/в инфузии изотонического раствора, промывание желудка, гемодиализ.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. При эссенциальной гипертензии начальная доза - 10-20 мг однократно в сутки. Доза препарата устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае, но не должна превышать 40 мг в день. При реноваскулярной гипертензии начальная доза - не более 5 мг. У большей части больных эффект проявляется при ежедневном приеме 20 мг. Лечение диуретиками следует прекратить за 2-3 дня до начала применения ренитека. При почечной недостаточности суточная доза зависит от клиренса креатинина: 80-30 мл/мин - 5-10 мг, 30-10 мл/мин - 2,5-5 мг, менее 10 мл/мин - 2,5 мг (в дни диализа). При хронической сердечной недостаточности начальная доза - 2,5 мг, при необходимости дозу постепенно повышают до 20 мг в сутки однократно или в 2 приема. Подбор дозы проводится в течение 2-4 нед или в более короткие сроки.

Предост.: Препарат подвергается диализу. Коррекция дозировки в дни, когда диализ не проводится, должна осуществляться в зависимости от уровня АД. До и во время лечения необходим мониторинг АД, функции почек, содержания калия в плазме. У больных со сниженным объемом циркулирующей крови (в результате терапии диуретиками), при ограничении потребления соли, при проведении диализа, при поносе и рвоте возможно развитие симптоматической гипотонии. Следует наблюдать за больными с тяжелой сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и заболеваниями сосудов мозга, у которых резкое снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту, нарушению функции почек. Не рекомендуется применение диализных мембран AN69 в сочетании с ингибиторами АПФ.

Произв.: MSD (США)

Реницин® (Renicin®)

Рокситромицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит рокситро-

мицина 50, 100, 150 или 300 мг; в упаковке 10, 12 и 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Пик концентрации в плазме (6-8 мг/мл) достигается через 2 ч после приема внутрь дозы 150 мг. Хорошо проникает в ткани, особенно в легкие, миндалины, простату. Частично метаболизируется в печени, выводится: 50% кишечником (в неизмененном виде), 12% - почками, 15% - легкими.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей (ларингит, синуситы, пневмония, бронхит), кожи и мягких тканей, одонтогенные инфекции, средний отит, дифтерия, газовая гангрена, обыкновенные угри, острый гастроэнтероколит, язва двенадцатиперстной кишки и хронический гастрит, хронический простатит, инфекции, вызванные *Mycoplasma*, *Chlamidia*, *Legionella*, профилактика ревматической лихорадки, другие инфекции при гиперчувствительности к пенициллинам.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, порфирия, беременность (первый триместр).

Бер. и корм. гр.: Во втором и третьем триместрах беременности можно назначать только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, метеоризм, диарея, повышение уровня трансаминаз, обратимая печеночная недостаточность, повышение температуры тела, эозинофилия, кожные аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с эрготамином и другими алкалоидами спорыньи (возможен артериальный спазм и ишемия). Повышает сывороточный уровень теофиллина. Не исключено взаимовлияние при комбинировании с варфарином, циклоспином, астемизолом, терфенадином (назначать с осторожностью).

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой. Взрослым - 300 мг в сутки в 1 или 2 приема. Больным с печеночной недостаточностью и с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 0,25 мл/с) - по 150 мг в сутки. Детям - 5-10 мг/кг в 2 приема.

Предост.: Необходимо тщательное наблюдение при лечении пациентов старше 65 лет, а также больных с печеночной недостаточностью (только по жизненным показаниям и под контролем функций печени).

Произв.: Lek (Словения)

Ренни (Rennie®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кальция карбоната 680 мг и магния карбоната 80 мг; в упаковке 24 и 48 шт.

Фарм. действ.: Антацидное.

Показ.: Симптомы, обусловленные повышенной кислотностью желудочного сока: изжога, чувство переполнения или тяжести в надчревной области, метеоризм; эпизодические боли в желудке.

Противопоказ.: Тяжелые нарушения почечной функции, гиперкальциемия, миастения.

Поб. действ.: Изменение консистенции стула, гипермагниемия и гиперкальциемия (у больных с почечной недостаточностью).

Взаим.: Снижает всасывание тетрациклинов, дигоксина, пероральных препаратов железа (между приемами Ренни и этих препаратов следует соблюдать перерыв в 2 ч), усиливает выделение почками салицилатов.

Примен. и доз.: Внутрь, разжевать или держать во рту до полного рассасывания 1-2 таблетки. При необходимости повторяют прием каждые 2 ч. Высшая суточная доза - 16 таблеток. Если боли длятся более 1 нед, рекомендуется обратиться к врачу на предмет выявления возможных органических заболеваний. Применение препарата в рекомендуемых дозах от случая к случаю может происходить без каких-либо временных ограничений. Замечание для диабетиков: 1 таблетка содержит 475 мг сахарозы.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Реопирин (Rheopyrin)

Сост. и ф.в.: 1 ампула (5 мл) содержит натрия фенилбутазона 750 мг, аминофеназона 750 мг; в упаковке 5 шт.

1 драже - 0,125 и 0,125 г активных веществ соответственно; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгетическое.

Показ.: Неинфекционные артриты (острый ревматический артрит, острый подагрический артрит и др.), болевой синдром, воспалительные заболевания позвоночника, внесуставных мягких тканей, аднексит, параметрит, перикардит, полисерозит, невралгии, полиневрит, ирит, ретинит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения ритма сердца, пороки сердца, кардиомиопатия, заболевания почек и печени, язвенная болезнь желудка

ка и двенадцатиперстной кишки, отечный синдром, угнетение кроветворения; эпилепсия (даже подозрение) - парентеральное применение.

Поб. действ.: Боли, асептический абсцесс (в месте инъекции), задержка воды и натрия, лейкопения, глюкозурия, гематурия, сонливость.

Примен. и доз.: При острых, резко выраженных болевых синдромах: по 5 мл ежедневно или через день глубоко в большую ягодичную мышцу при помощи длинной иглы, медленно в течение 1-2 мин. Внутрь - 4-6 драже в день. Детям в возрасте 7-14 лет - внутрь по 1/2-1 драже 3 раза в день или глубоко в/м по 0,5-1 мл ежедневно или через день.

Предост.: В связи с повышенным риском развития побочных явлений реопирин детям назначают лишь в чрезвычайных случаях и только в стационаре при постоянном контроле картины крови, мочи, функций печени. При продолжительном лечении необходимо каждую неделю контролировать число лейкоцитов.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Репарил-гель Н (Reparil®-gel N)

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат эсцина 1 г и диэтиламинсалицилата 5 г; в упаковке 40 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, охлаждающее (местное).

Показ.: Травмы (ушибы, растяжение или разрыв связок, размозжение, гематома, воспаление сухожильного влагалища), болевые синдромы, связанные с позвоночником (боли в затылке, люмбаго, ишиас), поверхностные воспаления вен (в т.ч. после инъекций или инфузий), варикозное расширение вен.

Поб. действ.: Аллергические кожные реакции.

Примен. и доз.: Накожно, наносят на пораженное место, равномерно распределяя гель по всему участку (возможно втирание), один или несколько раз в день.

Предост.: Не следует наносить на слизистые оболочки, на поврежденную кожу или участки, подвергавшиеся облучению.

Произв.: Madaus (Германия)

Ретаболил (Retabolil)

Нандролон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл масляного раствора для инъекций содержит нандролон деканоата 50 мг.

Фарм. действ.: Анаболическое.

Показ.: Диабетическая ретинопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия, синдром Верднига-Гоффмана, рак молочной железы у женщин, выраженные ожоги, остеопороз.

Противопоказ.: Рак предстательной железы, рак молочной железы у мужчин, нефротический синдром, беременность.

Поб. действ.: Замедление роста (у детей) в связи с преждевременным закрытием соответствующих зон трубчатых костей, вирилизация, гипофункция яичников, дисменорея, усиление либидо, повышение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы в крови.

Взаим.: Усиливает эффекты не прямых антикоагулянтов, оральных противодиабетических средств.

Примен. и доз.: В/м по 25-100 мг каждые 3-4 нед; у больных с почечной недостаточностью - 50 мг каждый второй день. Детям - 0,4 мг/кг каждые 3-4 нед.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Ретарпен (Retarpen®)

Бензатина бензилпенициллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит бензатина бензилпенициллина 1,2 или 2,4 млн. МЕ; флаконы в комплекте с растворителем в ампулах по 3 и 5 мл соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Сифилис и другие заболевания, вызванные спирохетами, острый тонзиллит, скарлатина, рожа, раневая инфекция, профилактика рецидивов ревматизма и инфекций при тонзиллэктомии и экстракции зубов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Болезненность и инфильтраты в месте введения, стоматит, глоссит, реакция Яриша-Герксгеймера, суперинфекции, аллергические реакции.

Взаим.: Конкурентно ингибирует выведение из организма противовоспалительных, противоревматических и жаропонижающих средств (индометацин, фенилбутазон и салицилаты). Не сочетать с бактериостатическими антибиотиками.

Примен. и доз.: В/м, детям до 12 лет - 1,2 млн. МЕ каждые 2-4 нед, взрослым

- 2,4 млн. МЕ 1 раз в неделю. При первичном серонегативном сифилисе - однократно 2,4 млн. МЕ. При первичном серопозитивном и вторичном свежем сифилисе - 2,4 млн. МЕ дважды с интервалом в 1 нед. При вторичном рецидивном и скрытом раннем сифилисе первую инъекцию производят в дозе 4,8 млн. МЕ (по 2,4 млн. МЕ в каждую ягодицу), вторую и третью инъекции - по 2,4 млн. МЕ с интервалом в одну неделю; новорожденным и детям младшего возраста - 1,2 млн. МЕ.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Ретафил (Retafyl)

Теофиллин

Сост. и ф.в.: 1 депо таблетка содержит теофиллина безводного 200 или 300 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, сосудорасширяющее.

Показ.: Бронхиальная астма, обструктивные заболевания легких, легочная гипертензия, ночное апноэ, мигрень, нарушение мозгового кровообращения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аритмия, возбуждение ЦНС.

Взаим.: Снижает всасывание фенитоина; эритромицин и цитометидин могут усиливать эффект.

Примен. и доз.: Внутрь, однократно в 20 ч (оптимальное время), желательно вместе с ужином. Взрослым: 1-я неделя - 300 мг в сутки, затем - 450 мг в сутки (при массе тела менее 70 кг) или 600 мг в сутки (при массе тела более 70 кг). Детям: 100 мг (при массе до 20 кг), 150 мг (при массе до 30 кг) и 200 мг (при массе до 40 кг) 2 раза в день.

Произв.: Orion (Финляндия)

Ретиноевая мазь (Unguentum Retinoici)

Третиноин*

Сост. и ф.в.: 100 г мази на эмульсионной основе содержат 13-цис-ретиноевой кислоты соответственно 0,1; 0,05 или 0,01 г.

Фарм. действ.: Дерматопротективное, антисеборейное, себостатическое, противовоспалительное, керато- и иммуномодулирующее; стимуляция процессов регенерации в коже.

Показ.: Угристые высыпания (при большом количестве высыпаний), пери-

оральный дерматит, нерезко выраженная себорея.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Отечность, покраснение и сухость кожи.

Примен. и доз.: Наружно, наносят тонким слоем на предварительно очищенную кожу 1-2 раза в день. Продолжительность лечения - 4-6 нед.

Предост.: Применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени, почек, хроническом панкреатите, декомпенсации сердечной деятельности. Не следует назначать больным, получающим другие препараты из группы ретиноидов.

Произв.: Ретиноиды (Россия)

Ретинола ацетат (Витамин А) (Retinoli acetas (Vitaminum A))

Ретинол*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл инъекционного раствора содержит ретинола ацетата 25000, 50000 или 100000 МЕ.

1 капсула - 3300 МЕ, 5000 МЕ или 33000 МЕ.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витамина А.

Показ.: Гиповитаминоз А, инфекционные заболевания (корь, дизентерия, трахеит, бронхит, пневмония); заболевания кожи (ожоги, обморожения, раны, туберкулез кожи, гиперкератозы, ихтиоз, псориаз, пиодермия, некоторые формы экзем); заболевания глаз (пигментный ретинит, гемералопия, ксерофтальмия, кератомалиция, конъюнктивиты); хронический энтероколит, гепатит.

Противопоказ.: Желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, рвота, лихорадка, сонливость, шелушение кожи, гипervитаминоз А.

Примен. и доз.: В/м, разовые дозы не должны превышать 50000 МЕ для взрослых и 5000 МЕ для детей, суточные, соответственно, 100000 МЕ и 20000 МЕ. Внутрь, взрослым и детям старше 7 лет - по 1 капсуле в сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Ретровир® (Retrovir®)

Зидовудин*

Сост. и ф.в.: 1 мл сиропа содержит зидовудина 10 мг.

1 капсула - 100 или 250 мг.

1 мл раствора для инфузий - 20 мг.

Фарм. действ.: Противовирусное.

Клин. фарм.: У больных на ранних стадиях заболевания ВИЧ проявления токсического действия на систему крови менее часты.

Показ.: Ранние (с числом клеток T_4 менее 500/куб.мм) и поздние стадии заболевания ВИЧ, СПИД.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; выраженная нейтропения, значительно сниженный уровень гемоглобина.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Анемия, нейтропения, лейкопения, анорексия, рвота, боли в животе, диспепсия, головная боль, повышение температуры, бессонница, недомогание, боли в мышцах, парестезии, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - начальная доза по 200 мг каждые 4 ч (1200 мг в день). Диапазон дозировок - 500-1500 мг в день. Поддерживающие дозы - 1000 мг в день в 4 или 5 приемов.

Предост.: Рекомендуется проводить исследования крови каждые 2 нед в течение первых 3 мес лечения, а затем - не реже 1 раза в месяц (особенно у больных с нарушениями костного мозга). В случае ухудшения гематологических показателей требуется уточнение дозы или прекращение лечения. С осторожностью применять при самолечении, особенно, в сочетании с аспирином, парацетамолом, кодеином.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Рефортан® (Refortan®)

Полигидроксиэтилкрахмал

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для в/в введения содержит полигидроксиэтилкрахмала (с молекулярной массой 200000) 60 мг; во флаконах по 250 и 500 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Плазмозамещающее.

Показ.: Гиповолемия; профилактика и лечение гиповолемического шока при ожогах, травмах, операциях; гемодилюция (включая изоволемическую).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипervолемия, гипергидратация, тяжелая застойная сердечная недостаточность, выраженное нарушение функции почек с олиго- или анурией, тяжелые геморрагические диатезы.

Поб. действ.: Анафилактоидные реакции.

Примен. и доз.: В/в капельно. Первые 10-20 мл препарата следует вводить медленно, контролируя состояние больного. При гиповолемии - 250-1000 мл в сутки

(до 20 мл/кг массы тела в сутки). При гемодилюции - по 500 мл в сутки, в течение нескольких дней (подряд), общая доза - не более 5 л (при превышении в исключительных случаях может быть распределена на срок до 4 нед). Дозу, скорость и длительность вливания устанавливают в зависимости от тяжести кровопотери и гиповолемии, значения гематокрита; при отсутствии экстренной ситуации рекомендуемая продолжительность вливания - не менее 30 мин на 500 мл.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Рибасан форте (Ribasan forte®)

Сост. и ф.в.: Биологически активная пищевая добавка. 1 капсула содержит очищенного лососевого жира 11000,5 мг, лимонного масла 2 мг и d-альфа-токоферола (1000 МЕ/г) 7,5 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, противоопухолевое, противоаллергическое, противомигренозное, антиагрегационное, гипохолестеринемическое, гиполипидемическое, противовоспалительное, противозудное (ингибция лейкотриенов).

Показ.: Профилактика раковых заболеваний (особенно рака легких и рака прямой кишки); псориаз и себорейный дерматит (вспомогательное средство); аллергические состояния и мигрени (профилактика и купирование приступа); профилактика и лечение инфаркта миокарда и тромбоза кровеносных сосудов (вспомогательное средство), профилактика функциональных и органических нарушений вследствие нерационального или несбалансированного питания, понижения сопротивляемости организма и др.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. Для профилактики - по 2 капсулы утром (натощак) и по 1 капсуле вечером (перед сном). При псориазе и для предотвращения реинфаркта миокарда, аллергии, мигрени - по 6 капсул в день в течение нескольких (до 12) недель.

Произв.: Diet Pharma (Германия)

Рибоксин (Riboxinum)**Инозин***

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 мл раствора для инъекций содержит инозина 100 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 200 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, коронародилатирующее, активация синтеза нуклеотидов. метаболизма.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда, стенокардия), кардиомиопатии различного генеза, дигиталисная интоксикация, дистрофия миокарда на фоне тяжелых физических нагрузок, инфекционной и эндокринной патологии, заболевания печени, порфирия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, подагра.

Поб. действ.: Обострение подагры, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, струйно или капельно (40-60 капель/мин) - по 200 мг 1 раз в день, при хорошей переносимости - 400 мг 1-2 раза в день в течение 10-15 дней. Внутрь, по 0,6-2,4 г/сутки, в течение 2-3 дней дозу увеличивают до 1,2-2,4 г/сутки, разделенных на 3 приема. Курс - 4-12 нед. При уропорфирии - по 0,8 г/сутки.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Кальцекс (Латвия)

Рибоксин (Riboxinum)**Инозин***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит инозина 0,2 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция синтеза нуклеотидов, окислительно-восстановительных процессов.

Показ.: ИБС (инфаркт миокарда, стенокардия), кардиомиопатии различного генеза, дигиталисная интоксикация, дистрофия миокарда на фоне тяжелых физических нагрузок, инфекционной и эндокринной патологии, заболевания печени.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, подагра.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Обострение подагры, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,6-2,4 г/сутки, в течение 2-3 дней дозу увеличивают - до 1,2-2,4 г/сутки, разделив на 3 приема. Курс - 4-12 нед. При уропропорфирии - по 0,8 г ежедневно.

Произв.: Акрихин (Россия); Олайнфарм (Латвия)

Рибомунил (Ribomunyl®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или 1 пакетик с 500 мг гранулята для приготовления питьевого раствора содержат рибосом, титрованных до 70% РНК, 0,25 или 0,75 мг (включая рибосомы *Klebsiella pneumoniae* 35 долей; рибосомы *Diplococcus pneumoniae* 35 долей, рибосомы *Streptococcus pyogenes* 30 долей и рибосомы *Haemophilus influenzae* 5 долей) и протеогликанов мембранной части *Klebsiella pneumoniae* 0,375 или 1,125 мг; в упаковке 12 или 4 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее (специфическая и неспецифическая иммуномодуляция), усиление фагоцитоза (полинуклеарного и макрофагального), стимуляция Т-лимфоцитов, повышение выработки сывороточных и секреторных (IgA) иммуноглобулинов.

Показ.: Рецидивирующие инфекции дыхательных путей (хронические бронхиты, трахеиты, пневмонии) и ЛОР-органов (отиты, синуситы, ангины, риниты, фарингиты, ларингиты).

Поб. действ.: Гиперсаливация.

Взаим.: Не отмечено.

Примен. и доз.: Внутрь, утром натощак по 3 таблетки или по 1 пакетик (после растворения в стакане воды) 4 дня в неделю в течение 3 нед в первый месяц лечения, в последующие 5 мес - первые 4 дня каждого месяца.

Предост.: С осторожностью назначают при аутоиммунных заболеваниях и узловом периартериите.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Рибофлавин (Riboflavinum)**Рибофлавин***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит рибофлавина 2, 5 или 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витамина В₂, регуляция окислительно-восстановительных процессов.

Показ.: Гиповитаминоз, гемералопия, конъюнктивиты, ириты, кератиты, длительно незаживающие раны и язвы, лучевая болезнь, экземы, вирусный гепатит А, заболевания печени, нарушения функции ЖКТ, железодефицитная анемия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 5-10 мг (детям 2-5 мг) 1-3 раза в день в течение 1-1,5 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Ригевидон (Rigevidon)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левоноргестрела 0,15 мг и этинилэстрадиола 0,03 мг; в упаковке 3x21 шт.

Фарм. действ.: Контрацептивное.

Показ.: Контрацепция, дисменорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания печени и желчного пузыря, хронический колит, заболевания эндокринной системы, декомпенсированный сахарный диабет, нарушения липидного обмена, тяжелые органические заболевания сердца, артериальная гипертензия, цереброваскулярные заболевания, повышенная склонность к тромбозам, серповидноклеточная анемия, хроническая гемолитическая анемия, злокачественные опухоли, тетания, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, масталгия, увеличение или уменьшение массы тела, снижение толерантности к глюкозе, изменения либидо, кровянистые выделения из влагалища, лабильность настроения, утомляемость, головные боли, судороги в икроножных мышцах, кожные высыпания.

Взаим.: Эффект снижают индукторы микросомального окисления (рифампицин, барбитураты, фенитоин), антибиотики широкого спектра, сульфаниламиды, производные пиразолона.

Примен. и доз.: Внутрь, в вечернее время, для предупреждения беременности принимают с 5-го дня менструации по 1 таблетке в день в течение 21 дня. После 7-дневного перерыва (в это время наступает менструальноподобное кровотечение) приступают к следующему 21-дневному курсу.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Рикавит (Rikavitum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит рибоксина 0,1 г, калия хлорида 0,05 г, глутаминовой кислоты 0,1 г, аскорбиновой кислоты 0,02 г, никотинамида 0,01 г, рибофлавина 0,002 г и пиридоксина гидрохлорида 0,002 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение витаминной недостаточности, коррекция метаболизма (при старении), анаболическое, антиоксидантное, мембраностабилизирующее, адаптогенное, кардиотоническое, гепатопротекторное.

Показ.: Пожилой и старческий возраст (для улучшения обмена веществ и профилактики развития его нарушения), гипоксия, повышенная физическая нагрузка, профилактика синдрома перенапряжения у спортсменов, интоксикация (включая лекарственную), адаптация к неблагоприятным условиям; в составе комплексной терапии (ИБС, недостаточность кровообращения, атеросклеротический кардиосклероз, миокардиодистрофия различного генеза, аритмии, хронический гепатит, цирроз печени).

Противопоказ.: Выраженные нарушения пуринового обмена.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 3 раза в день. Курс - 3-4 нед, интервал между курсами - 2-3 мес.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Римактан (Rimactan®)

Рифампицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит рифампицина 150 или 300 мг; в упаковке 8 или 16 и 8 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противотуберкулезное.

Показ.: Все формы туберкулеза и лепры (в комбинации с другими антибиотиками/химиотерапевтическими средствами), немикобактериальные инфекции, бруцеллез (в комбинации с тетрациклинами), менингококковый менингит (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью при беременности.

Поб. действ.: Повышение уровня печеночных ферментов, гепатит, желтуха, лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, гриппозоподобный синдром, пурпура, гемолитическая анемия, одышка, приступы, напоминающие бронхиальную астму, шок, почечная недостаточность (при проведении интермиттирующей терапии или после временного прекращения лечения), эрозивный гастрит, эксфолиативный дерматит, синдром Лайелла, пемфигоидные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. При туберкулезе и лепре взрослым - 450-600 мг в сутки ежедневно или с регулярными интервалами; детям - 10-20 мг/кг в сутки. Максимальная доза - 600 мг в сутки.

Предост.: Следует избегать нерегулярного приема. С осторожностью назначают новорожденным (особенно недоношенным), истощенным больным, пациентам, злоупотребляющим алкоголем,

при заболеваниях печени, порфирии. При развитии тромбоцитопении, пурпуры, гемолитической анемии, одышки, шока, почечной недостаточности лечение прекращают.

Пронзв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Ринитал (Rhinital®)

Сост. и ф.в.: 100 г спиртового (19 об.%) раствора для приема внутрь содержат *Luffa operculata* D4 10г, *Galphimia glauca* D3 10 г, *Cardiospermum* D3 10 г; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Противоаллергическое (*Galphimia glauca*), торможение гиперсекреции слизистой оболочки полости носа, глотки и придаточных пазух, уменьшение зуда, жжения и сухости слизистых оболочек полости носа, устранение заложенности носа (*Luffa operculata*); устранение зуда при аллергических и воспалительных заболеваниях (*Cardiospermum halicacabum*).

Клин. фарм.: Применение Ринитала сопровождается снижением частоты приступов чихания. Возможно временное первичное ухудшение состояния, которое требует отмены препарата и дополнительной консультации врача.

Показ.: Аллергические заболевания верхних дыхательных путей: сенной насморк (поллиноз) и аллергический ринит; профилактика поллинозов.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Не выявлено.

Примен. и доз.: Внутрь (подержав капли перед проглатыванием некоторое время во рту) за полчаса до или после еды. При острых заболеваниях взрослым - по 10 капель каждый час (не более 12 раз в день) не более 1-2 дней, после улучшения - по 10-20 капель 3 раза в день. Детям до 12 лет - по 10 капель каждые 2 ч (не более 8 раз в день) до наступления улучшения. Затем - по 10 капель 3 раза в день. Профилактический курс при пыльцевых аллергиях назначают за 6-8 нед до появления пыльцы - по 10 капель 3 раза в день.

Пронзв.: DHU (Германия)

Рисполепт® (Rispolept®)

Рисперидон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит рисперидона 1, 2, 3 или 4 мг; в упаковке 20 или 60 шт.

Фарм. действ.: Антипсихотическое, нейролептическое.

Показ.: Шизофрения (острая, хроническая) и другие психотические состояния с преобладанием продуктивной (бред, галлюцинации), негативной или аффективной симптоматики.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности допустимо в случаях, когда предполагаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск для плода. Прием в период лактации требует прекращения грудного вскармливания.

Поб. действ.: Нарушение сна, повышенная возбудимость, беспокойство, страх, головная боль, головокружение, сонливость, экстрапирамидные расстройства, боли в животе, диспептические расстройства, ринит, галакторея, гинекомастия, нарушения менструального цикла и сексуальной сферы, увеличение массы тела, отеки, гипотония, тахикардия (при высоких начальных дозах), сыпь.

Взаим.: Уменьшает эффект леводопы и других допамин-агонистов. Фенотиазины, трициклические антидепрессанты и бета-адреноблокаторы могут повышать концентрацию в плазме.

Передоз.: Симптомы: сонливость, тахикардия, гипотония, экстрапирамидные расстройства. Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым начинают с дозы 1 мг 2 раза в день, ежедневно увеличивая ее на 1 мг, и затем назначают по 2-4 мг 2 раза в день. Пожилым больным, а также больным с почечной и печеночной недостаточностью следует начинать с 0,5 мг 2 раза в сутки с постепенным увеличением на 0,5 мг до максимальной разовой дозы - 2 мг 2 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью следует назначать при сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, нарушениях проводимости сердца, инсульте, болезни Паркинсона, эпилепсии.

Пронзв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Риталмекс (Ritalmex)

Мексилетин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит мексилетина 200 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое.

Показ.: Желудочковые экстрасистолы (лечение и профилактика).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, сонливость, спутанность сознания,

нарушение артикуляции, гипотония, синусовая брадикардия.

Примен. и доз.: Внутрь, начальная доза - 400-600 мг, затем - по 600 мг каждые 6 ч в первый день; поддерживающая терапевтическая доза - 3 капсулы по 200 мг каждые 8 ч.

Предост.: Рекомендуется с осторожностью комбинировать с другими антиаритмическими средствами, препаратами, усиливающими перистальтику ЖКТ, влияющими на функции печени. С особой осторожностью назначают при кардиогенном шоке, АВ-блокаде II и III степени, кормлении грудью.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Ритмонорм (Rytmonorm®)

Пропафенон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пропафенона гидрохлорида 150 или 300 мг; в упаковке 50 шт. 1 ампула с 20 мл раствора для инъекций - 70 мг; в упаковке 5 шт.

1 таблетка, покрытая оболочкой, для детей - 10 мг.

Фарм. действ.: Антиаритмическое.

Показ.: Профилактика и лечение всех форм желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии, тахикардии и тахиаритмии, WPW-синдром.

Противопоказ.: Выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок (кроме обусловленного аритмией), тяжелая брадикардия, атриовентрикулярные и интравентрикулярные нарушения проводимости, синдром слабости синусового узла, электролитные нарушения, обструктивные заболевания легких, гипотензия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности, при миастении беременных и лактации.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, нарушения зрения, нарушения сна, спутанность сознания, экстрапирамидные расстройства, судороги, ортостатические нарушения, брадикардия, АВ-блокада, холестаз, снижение потенции и количества сперматозоидов, лейкопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Инъекционно и внутрь. Дозы и схема лечения подбираются индивидуально. В период подбора дозы, а также для поддерживающей терапии суточная доза составляет 450-600 мг (от 1 таблетки 150 мг 3 раза в день до 1 таблетки 300 мг 2 раза в день); макси-

мальная суточная доза - 900 мг в 3 приема. Таблетки следует принимать после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Детям в средней суточной дозе - 10-20 мг/кг в 3-4 приема. В/в капельно со скоростью 0,5-1 мг/мин в течение 1-3 ч в начальной дозе 0,5 мг/кг, при недостаточном эффекте - 1-2 мг/кг. При необходимости через 90-120 мин можно проводить повторную инфузию.

Произв.: Knoll (Германия)

Рифадин (Rifadin)

Рифампицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит рифампицина 150 или 300 мг; в упаковке 8, 16 или 100 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противотуберкулезное, противолепрозное.

Показ.: Туберкулез различной локализации, лепра, бессимптомное носительство менингококков и гемофильной палочки, остеомиелит, пневмония, бруцеллез, болезнь легионеров, сыпной тиф, трахома, сибирская язва.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, желтуха, недавно перенесенный (менее 1 года) инфекционный гепатит, печеночно-почечная недостаточность, беременность, лактация, грудной возраст.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, анорексия, нарушение функции почек, головная боль, нарушение координации движений, артралгия, лихорадка, бронхоспазм, дисменорея, нарушение зрения, гемолитическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, повышение уровня печеночных трансаминаз, гипербилирубинемия, аллергические реакции (крапивница, эозинофилия, отек Квинке).

Взаим.: Ускоряет биотрансформацию многих препаратов (стимулирует микросомальное окисление) и укорачивает их действие.

Примен. и доз.: Внутрь, при туберкулезе и лепре суточная доза - 10 мг/кг, при носительстве *N.meningitidis* и *H.influenzae* - по 600 мг/сут за один прием в течение 4 дней. При других инфекциях - 600-1200 мг/сут за 2-4 приема. Детям - 10-20 мг/кг, но не более 600 мг/сут.

Произв.: Marion Merrell Dow (США)

Рифамор (Rifamor)

Рифампицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит рифампицина 150 или 300 мг; в упаковке 104 или 16 и 104 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное широкого спектра.

Показ.: Туберкулез легких и других органов; инфекции дыхательных путей: фарингит, бронхит, пневмония, бронхопневмония, бронхоэктазы, абсцесс легких, эмпиема, плеврит; кожи и мягких тканей (фурункулез, абсцесс и др.); моче- и желчевыводящих путей: холецистит, пиелонефрит, пиелостит, холангит; инфекции в хирургии (профилактика и лечение); острая гонорея; менингококковое носительство.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, желтуха, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, понос; почечная дисфункция; тромбоцитопения, лейкопения; желтуха и увеличение трансаминаз в крови (при комбинировании с др. противотуберкулезными средствами), аллергические реакции.

Взаим.: Уменьшает эффект непрямых антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, взрослым - туберкулез: однократно 450-600 мг в день; инфекции дыхательных, моче- и желчевыводящих путей - суточную дозу 600-900-1200 мг делят на 2-3 приема; гонорея - разовую дозу 900 мг можно повторить через день и через 2 дня; другие инфекции - 450-900 мг в день (в тяжелых случаях - 1200 мг) в 1-3 приема. Детям до 12 лет - 10-15 мг/кг в сутки (максимально 600 мг в сутки) делят на 1-3 приема, старше 12 лет - 20 мг/кг в сутки в 1-3 приема. Лечение продолжают в течение нескольких дней после исчезновения симптомов.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушенной функции печени (хронический алкоголизм), грудным детям. Пожилые пациенты, истощенные и дети при комбинированном лечении с изониазидом и ПАСК должны принимать препараты с интервалом в 8 ч. Следует предупредить больных, что слезная жидкость, мокрота окрашиваются в красный цвет.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Рифампицин (Rifampicinum)

Рифампицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит рифампицина 0,15 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакодин.: Активен в отношении микобактерий (туберкулез, проказа), грамположительных (особенно стафилококки) и грамотрицательных (менингококки, гонококки) микроорганизмов.

Показ.: Туберкулез, лепра, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые заболевания печени, нарушения функции почек, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, повышение уровня трансаминаз, аллергические реакции.

Взаим.: Индуцирует микросомальные ферменты печени и может ускорять биотрансформацию одновременно применяемых препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь. При туберкулезе - утром, натощак, назначают взрослым в дозе 450-600 мг 1 раз в сутки; детям в возрасте старше 7 лет - по 10 мг/кг массы тела, грудного и младшего возраста - по 15 мг/кг 1 раз в сутки. При гонорее в 1-й день лечения - 900 мг 1 раз, во 2-й и 3-й день - по 600 мг 1 раз в сутки. При лепре - по 450-600 мг 1 раз в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Рифарен (Rifaren™)

Рифампицин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит рифампицина 150 и 300 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, противотуберкулезное.

Показ.: Все формы туберкулеза.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, желтуха, беременность (возможен тератогенный эффект).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, гепатонекроз (редко), лихорадка, нарушение функции почек, кровотечения (в последние недели беременности, постнатальные), окрашивание мочи, слюны, слезной жидкости в красный цвет, эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, кожные реакции (сыпь).

Взаим.: Ускоряет метаболизм (снижает эффект) кортикостероидов, дапсона, фениитоина, сердечных гликозидов, хинидина, метадона.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, 1 раз в сутки. Дозу устанавливают в зависимости от массы больного. Взрослым - по 450-600 мг/сутки: с массой тела 50 кг и более - по 600 мг, менее 50 кг - по 450 мг. Детям: недоношенным и новорожденным - по 10 мг/кг массы; др. возраста - в максимальной разовой дозе по 600 мг/сутки (до 20 мг/кг массы).

Предост.: С осторожностью следует назначать при нарушении функции печени. Во время лечения женщинам детородного возраста рекомендуется использование негормональных противозачаточных средств.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Рифогал (Rifogal)

Рифамицин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1,5 или 3 мл раствора для в/м введения содержит рифамицина СВ (в виде натриевой соли) 125 или 250 мг, а также аскорбиновой кислоты 12,5 или 25 мг и лидокаина хлорида 5 или 10 мг; в упаковке по 5 шт.

1 ампула с раствором для в/в введения - 500 мг, а также аскорбиновой кислоты 50 мг; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: После парентерального введения терапевтическая концентрация сохраняется 8-12 ч. Около 80% введенной дозы связывается с белками крови. Выводится из организма в основном с желчью, в меньшей степени - с мочой.

Фармакодин.: Подавляет синтез РНК путем образования комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой. Активен в отношении стафилококков, гемолитических стрептококков, пневмококков, микобактерий туберкулеза, менингококков, гонококков, энтеробактерий.

Показ.: Пневмококковые и стрептококковые инфекции: стафилококковые, устойчивые к полусинтетическим пенициллинам, у больных с гиперчувствительностью к беталактаминам, туберкулез, гонорея, инфекции желчных путей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, желтуха, беременность (I триместр).

Поб. действ.: Аллергические реакции: кожные высыпания, эозинофилия; при длительном в/в введении - тромбофлебит, облитерация вен.

Примен. и доз.: В/м, в/в, местно (в очаге инфекции). Взрослым и детям старше 6 лет (масса тела свыше 25 кг) в/м 500-750 мг каждые 8-12 ч или в/в 0,5 г в день; детям до 6 лет - в/м 125 мг

каждые 12 ч, детям с массой менее 25 кг - в/в 10-30 мг/кг в день, разделенные на 2-4 дозы. Местно - при лечении туберкулезных поражений. Бронхиальная ингаляция: 125 мг (в 2-3 мл воды для инъекций) 1 раз в 2 дня; изъязвления, фистулы, патологические изменения кожи - 125 мг (в 1 мл воды для инъекций); эмпиема: 125-250 мг (в 1 мл или 2 мл воды для инъекций соответственно); внутримышечное введение - 125 мг (в 1 мл воды для инъекций). Для в/в капельного введения предварительно растворить в изотоническом растворе хлорида натрия или глюкозы.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушениях функции печени (возможно развитие желтухи).

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Роаккутан (Roaccutane®)

Изотретиноин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит изотретиноина 10 или 20 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противосеборейное, уменьшение размеров и подавление функции сальных желез, противовоспалительное.

Показ.: Тяжелые формы узелково-кистозных акне, особенно кистозные и конглобатные акне (прежде всего на туловище), не поддающиеся другим видам терапии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная и почечная недостаточность, гипервитаминоз А, гиперлипидемия, детородный период у женщин (при несоблюдении мер контрацепции), беременность (тератогенное действие), лактация.

Поб. действ.: Сухость слизистых оболочек, конъюнктивит, светобоязнь, снижение сумеречного зрения, катаракта, васкулит, анемия, нейтропения, увеличение или уменьшение числа тромбоцитов, повышение СОЭ, нарушение слуха, местные или системные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами, в частности, *Staphylococcus aureus*; кожная сыпь, зуд, дерматит лица, потливость, гнойные гранулемы, паронихия, дистрофия ногтей, усиленное разрастание грануляционной ткани в области угрей, выпадение волос, гирсутизм, гиперпигментация, боли в мышцах и суставах, воспалительные заболевания кишечника, гиперурикемия, нарушения психики и ЦНС; изменения в костях и гиперостозы (при длительном применении высоких доз).

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, в суточной дозе 0,5 мг/кг за один или несколько приемов. Примерно через 4 нед возможен переход на поддерживающую дозу - 0,1-1 мг/кг/сутки. Максимальную суточную дозу - 1 мг/кг можно назначать только на ограниченное время. Курс - до 16 нед. Перед повторным лечением следует сделать перерыв не менее 8 нед.

Предост.: Следует избегать одновременного применения с витамином А (возможно развитие гипервитаминоза А) и тетрациклинами.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Ровамицин (Rovamycine®)

Спирамицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит спирамицина 1,5 или 3 млн. МЕ; в упаковке 16 и 10 шт. соответственно.

1 флакон с лиофилизатом для инфузий - 1,5 млн. МЕ.

1 пакет с гранулами для перорального приема - 1,5, 0,75 или 0,375 млн. МЕ; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Всасывается быстро (период полуабсорбции составляет 20 мин). После приема внутрь 6 млн. МЕ C_{max} в крови достигается через 1,5-3 ч; $T_{1/2}$ составляет приблизительно 8 ч. В спинномозговую жидкость не проникает, хорошо диффундирует в ткани, слюну и грудное молоко. Концентрация в легочной ткани составляет 20-60 мкг/г, в миндалинах - 20-80 мкг/г, в синусах (при воспалении) - 75-110 мкг/г, в костной ткани - 5-100 мкг/г, селезенке, печени и почках - 5-7 мкг/г. Связывание с белками плазмы слабое, не превышает 10%. Метаболизируется (в печени) очень медленно. Выводится главным образом через желчные протоки, почки (10-14%) и в незначительной степени - с калом.

Показ.: Инфекции нижних дыхательных путей (пневмония, в т.ч. вызванная микоплазмами, хламидиями, легионеллами; обострение хронического бронхита), ЛОР-органов (синусит, тонзиллит, отит), кожи и мягких тканей (рожа, вторичные инфицированные дерматозы, абсцессы и флегмоны), мочевыводящих путей (простатит, уретриты различной этиологии), гинекологические заболевания, венерические заболевания (хламидиоз, сифилис, гонорея и их сочетание), токсоплазмоз, в т.ч. у беременных; ос-

теомиелит, артрит; профилактика менингококкового менингита среди лиц, контактировавших с больным, не более чем за 10 дней до его госпитализации; профилактика острого суставного ревматизма; лечение бактерионосительства возбудителей коклюша и дифтерии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при кормлении грудью.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, диарея, рвота), аллергические реакции (кожные).

Примен. и доз.: Для взрослых суточная доза для приема внутрь составляет 6-9 млн. МЕ, детям с массой тела более 20 кг назначают из расчета 1,5 млн. МЕ/10 кг в сутки за 2-3 приема. Детям с массой тела до 10 кг назначают 2-4 пакетика гранул по 0,375 млн. МЕ в сутки; 10-20 кг - 2-4 пакетика по 0,75 млн. МЕ, более 20 кг - 2-4 пакетика по 1,5 млн. МЕ. В/в (инфузии) назначают только взрослым. Содержимое флакона растворяют в 4 мл воды для инъекций и вводят в течение 1 ч в 100 мл 5% глюкозы. При острых бронхолегочных заболеваниях доза составляет 1,5 млн. МЕ каждые 8 ч (4,5 млн. МЕ в сутки), в тяжелых случаях доза может быть удвоена. У больных с почечной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Рокальтрол (Rocaltrol®)

Кальцитриол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит кальцитриола 0,25 или 0,5 мкг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Регуляция обмена кальция, увеличение всасывания кальция в кишечнике, стимуляция остеобластов, нормализация костной минерализации.

Показ.: Климактерический остеопороз; остеодистрофия почечного генеза у больных с хронической почечной недостаточностью (особенно у находящихся на гемодиализе); послеоперационный и идиопатический гипопаратиреоз; псевдогипопаратиреоз; псевдодефицитный витамин-D-зависимый рахит; врожденный витамин-D-резистентный рахит (фосфат-диабет).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиперкальциемия.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Гиперкальциемия: анорексия, головная боль, рвота, запоры,

дистрофия, расстройства чувствительности, лихорадка, жажда, полиурия, обезвоживание, апатия, задержка роста, инфекции мочевых путей.

Взаим.: Тиазидные диуретики увеличивают риск гиперкальциемии. Антагонизм с кортикостероидами (разнонаправленное влияние на всасывание кальция в кишечнике). Фенитоин и фенobarбитал снижают уровень в сыворотке крови. Холестирамин тормозит всасывание кальцитриола в кишечнике. Несовместим с витамином D и его производными.

Примен. и доз.: Дозу подбирают индивидуально в зависимости от содержания кальция в сыворотке крови. При климатическом остеопорозе - по 0,25 мкг 2 раза в день. Содержание кальция и креатинина следует определять через 4 нед, 3 и 6 мес после начала лечения, затем - с интервалами в 6 мес. При почечной остеодистрофии - начальная суточная доза - 0,25 мкг, больным с нормальным или слегка пониженным уровнем сывороточного кальция достаточно 0,25 мкг через день; при гипопаратиреозе и рахите - начальная доза - 0,25 мкг в сутки (утром). Если клинические показатели не улучшаются в течение 2-4 нед лечения, суточную дозу увеличивают на 0,25 мкг с интервалами в 2-4 нед. В течение этого периода следует определять сывороточный кальций не реже 2 раз в неделю. У большинства больных терапевтический эффект наступает при суточной дозе 0,5-1 мкг.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Роксан (Roxan®)

Роксатидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит роксатидина 75 или 150 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H₂-гистаминовых рецепторов, подавление продукции соляной кислоты обкладочными клетками желудка.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, симптоматические язвы желудка, эрозивный эзофагит, рефлюкс-эзофагит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, слабость, сонливость, депрессия, парестезии, миалгия, транзиторное повышение уровня транс-

аминаз в крови, нейтропения, тромбоцитопения, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, обычно по 75 мг утром и вечером или 150 мг вечером. Для профилактики приступов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки назначают 75 мг вечером. Пациентам с нарушением функции почек режим дозирования устанавливают с учетом значений клиренса креатинина: при клиренсе креатинина 20-50 мл/мин - 75 мг 1 раз в сутки (вечером), при клиренсе менее 20 мл/мин - 75 мг 1 раз в 2 дня (вечером), профилактически - 75 мг 2 раза в неделю (в вечернее время). Длительность лечения устанавливают индивидуально. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая большим количеством воды.

Произв.: Hoechst (Германия)

Роксимизан (Roximisan)

Рокситромицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит рокситромицина 150 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра.

Фармакодин.: Активен в отношении атипичных и продуцирующих бета-лактамазы микроорганизмов.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей; кожи и мягких тканей; мочеполового тракта и передающиеся половым путем (кроме гонореи), в т.ч. хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз; профилактика менингококкового менингита у лиц, контактировавших с больным.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головокружение, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, переходящее повышение активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы, аллергические реакции.

Взаим.: Увеличивает риск развития эрготизма с некрозом конечностей при назначении с эрготамином или эрготаминоподобными сосудосуживающими средствами. Повышает антипаркинсоническую активность бромкриптина. Возможен рост уровня креатинина в крови при назначении с циклоспорином.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 таблетке (150 мг) 2 раза в день (утром и вечером) до еды. При тяжелой печеночно-клеточной недостаточности - по 150 мг 1 раз в сутки.

Предост.: С осторожностью назначают при печеночной недостаточности. Не следует комбинировать с препаратами типа эрготамина и дигидроэрготамина.

Произв.: Slaviamed (Югославия)

Ромазулан (Romazulan®)

Сост. и ф.в.: 100 мл концентрата для приготовления раствора для приема внутрь, наружного или местного применения содержат экстракта ромашки аптечной 96 мл и эфирного масла ромашки аптечной 0,3 мл (в т.ч. 6% азулена).

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антимикробное, спазмолитическое, активация регенерации, дезодорирующее, противозудное.

Показ.: При приеме внутрь: гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты, метеоризм; в виде микроклизм: спастические колиты, геморрой; при местном использовании: инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и полости рта (фарингит, тонзиллит, отит, стоматит, гингивит), инфекции мочеполовой системы; при наружном применении: дерматиты, трофические язвы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, развести 1/2 чайной ложки в стакане горячей воды; наружно, местно, для микроклизм - развести 1,5 чайные ложки в 1 л воды (используют для полосканий, промываний, инстилляций, компрессов, тампонов).

Произв.: Romferchim (Румыния)

Ронал (Rhonal®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 500 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Жаропонижающее, анальгезирующее, противовоспалительное, антиагрегационное.

Клин. фарм.: В таблетке ацетилсалициловая кислота заключена в микрокапсулы, высвобождается в тонком кишечнике, что значительно снижает риск ulcerации слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ.

Показ.: Болевой и лихорадочный синдромы; ревматические заболевания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к салицилатам, обострения язвенной болезни, геморрагии, пероральный прием антикоагулянтов в высоких дозах, лече-

ние большими дозами метотрексата, возраст (младше 10 лет), последний триместр беременности.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в последний триместр беременности.

Поб. действ.: Шум в ушах, снижение остроты слуха, головная боль (признаки передозировки), возникновение (обострение) язвы желудка, желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический синдром, аллергические реакции (отек Квинке, крапивница, бронхиальная астма, анафилаксия).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - 250-2000 мг 1-6 раз в сутки (но не более 6 г); детям (10-15 лет) - 250-500 мг (не более 2,5 г/сутки).

Предост.: Применять с осторожностью при почечной недостаточности, бронхиальной астме, при использовании внутриматочных противозачаточных средств. Не рекомендуется применение при подагре, при метро- и меноррагии. Нежелателен одновременный прием антикоагулянтов, метотрексата, других НПВП, гепарина.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Ронидаза (Ronidasum)

Гиалуронидаза*

Сост. и ф.в.: Порошок во флаконах по 5 и 10 г

Фарм. действ.: Повышение проницаемости тканевых мембран, рассасывание рубцов.

Показ.: Раневые и рубцовые поражения кожи (преимущественно недавнего происхождения), контрактуры Дюпюитрена в начальной стадии, тугоподвижность суставов, длительно незаживающие язвы (в том числе лучевые), подготовка к кожнопластическим операциям по поводу рубцовых стяжений.

Противопоказ.: Злокачественные опухоли, туберкулез.

Поб. действ.: Раздражение кожи и местные аллергические реакции (обычно исчезают при кратковременном перерыве в лечении).

Примен. и доз.: Порошок наносят на увлажненную стерильным изотоническим раствором натрия хлорида стерильную марлевую салфетку (сложенную в 4-5 слоев), которую накладывают на пораженный участок, покрывают вощаной бумагой и фиксируют мягкой повязкой. Повязку оставляют сроком на 16-18 ч. Назначают ежедневно в течение 15-30 дней в зависимости от терапевтического эффекта. При длительном применении

делают перерывы на 3-4 дня после каждых 2 нед лечения. Количество применяемого препарата дозируют соответственно площади поражения, но не менее 16 усл.ед. (100 мг) на каждые 1 кв.см поверхности. При больших площадях поражения (более 5% от общей поверхности тела) препарат наносят в дозах, не превышающих 64 усл.ед. на 1 кв.см поверхности (можно напылять инсуфлятором на раневые поверхности). При контрактурах и тугоподвижности суставов лечение сочетают с лечебной гимнастикой.

Произв.: Микомс (Россия)

Роферон А (Roferon-A®)

Интерферон альфа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит генноинженерного высокоочищенного интерферона альфа-2а - 3, 9 или 18 млн. МЕ; в комплекте с ампулой 1 мл воды для инъекций.

1 флакон с 1 или 3 мл раствора для в/м или п/к введения, не содержащего сывороточного альбумина человека, содержит интерферона альфа-2а 3; 4,5; 6; 9; 18 или 18 млн.МЕ соответственно.

1 шприц-тюбик с 0,5 мл (одна доза) раствора для п/к введения, не содержащего сывороточного альбумина человека, - 3; 4,5; 6 или 9 млн.МЕ.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, противовирусное, иммуностимулирующее.

Показ.: Волосатоклеточный лейкоз; кожная Т-клеточная лимфома (грибовидный микоз и синдром Сезари); саркома Капоши на фоне СПИДа; рак почек; метастатическая меланома; хронический миелолейкоз; тромбоцитоз, связанный с миелопролиферативными заболеваниями; хронический гепатит В; хронический гепатит С, миеломная болезнь, неходжкинская лимфома, остроконечные кондиломы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые заболевания сердца (в том числе в анамнезе), выраженные нарушения функции печени, почек или системы кроветворения, эпилепсия и/или другие нарушения функций ЦНС; хронический гепатит на фоне декомпенсированного цирроза печени; хронический гепатит у больных, получающих или незадолго до этого получавших терапию иммунодепрессантами (за исключением кратковременного предварительного лечения стероидами); дет-

ский возраст; с осторожностью назначают беременным и в период кормления грудью.

Поб. действ.: Вялость, лихорадка, озноб, потеря аппетита, мышечные боли, головная боль, боли в суставах, потливость, тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, сухость во рту, потеря массы тела, понос, боли в животе, запоры, метеоризм, повышение перистальтики кишечника, изжога, нарушение функции печени, гепатит, головокружение, расстройства зрения, ишемическая ретинопатия, забывчивость, депрессия, сонливость, нарушение сознания, нервозность, нарушение сна, нарушение мозгового кровообращения, парестезия, потеря чувствительности, невропатия, зуд, тремор, гипо- или гипертония, отеки, цианоз, аритмия, боли в груди, кашель, одышка, отек легких, застойная сердечная недостаточность, остановка сердца, остановка дыхания, инфаркт миокарда, алоpecia, сухость кожи, сыпь, кровотечение из носа, электролитные нарушения, обезвоживание, протеинурия, угнетение кроветворения, лейкопения, гипокальциемия и др.

Взаим.: Усиливает нейротоксические, гематотоксические, кардиотоксические эффекты многих препаратов.

Примен. и доз.: В/м и п/к. Вводят по схеме в зависимости от заболевания. Волосатоклеточный лейкоз: начальная доза - 3 млн. МЕ в сутки в течение 16-24 нед, поддерживающее лечение - 3 млн. МЕ 3 раза в неделю. Кожная Т-клеточная лимфома: 1-3-й день - 3 млн. МЕ в сутки, 4-6-й день - 9 млн. МЕ в сутки, 7-84-й день - 18 млн. МЕ в сутки; поддерживающее лечение - максимально переносимую дозу (но не более 18 млн. МЕ) вводят 3 раза в неделю. Саркома Капоши на фоне СПИДа: начальная доза - 3 млн. МЕ в сутки в первые 3 дня, 4-6-й день - 9 млн. МЕ в сутки, 7-9-й день - 18 млн. МЕ в сутки, при переносимости дозу увеличивают до 36 млн. МЕ в течение 10-84-го дня; поддерживающее лечение - максимально переносимая доза (но не более 36 млн. МЕ) 3 раза в неделю. Почечноклеточный рак: 36 млн. МЕ в сутки при монотерапии или 18 млн. МЕ 3 раза в неделю в комбинации с винбластином. Дозу повышают постепенно, по схеме, начиная с 3 млн. МЕ в течение 84 дней. Меланома: 18 млн. МЕ 3 раза в неделю в течение 8-12 недель. Хронический миелолейкоз и тромбоцитоз при хроническом миелолейкозе: 1-3-й день - 3 млн. МЕ в сутки, 4-6-й день - 6 млн. МЕ в сутки, 7-84-й день - 9 млн. МЕ в сутки,

курс - 8-12 нед. Тромбоцитоз при миело-пролиферативных заболеваниях, кроме хронического миелолейкоза: 1-3-й день - 3 млн. МЕ в сутки, 4-30-й день - 6 млн. МЕ в сутки. Хронический активный гепатит В: 4,5 млн. МЕ 3 раза в неделю в течение 6 мес. Хронический гепатит С: начальная доза - 6 млн. МЕ 3 раза в неделю в течение 3 мес; поддерживающая доза - 3 млн. МЕ 3 раза в неделю в течение еще 3 мес. Миеломная болезнь: по 3 млн.МЕ 3 раза в неделю; дозу еженедельно увеличивают до максимально переносимой (9-18 млн.МЕ) 3 раза в неделю. Неходжкинская лимфома низкой степени злокачественности: поддерживающая терапия после стандартной химиотерапии (с лучевой терапией или без) - в дозе 3 млн.МЕ 3 раза в неделю в течение не менее 12 мес. Остроконечные кондиломы: 1-3 млн.МЕ 3 раза в неделю в течение 1-2 мес.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Роцефин (Roscephin®)

Цефтриаксон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефтриаксона (в форме натриевой соли) 0,25; 0,5; 1 или 2 г, в комплекте с растворителем; в упаковке 5 и 50 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Сепсис, менингит, перитонит, инфекции желчных путей и желудочно-кишечного тракта, костей, суставов, мягких тканей, кожи, раневые инфекции, инфекции почек и мочевых путей; инфекции дыхательных путей (особенно пневмония); инфекции уха, горла и носа, половых органов (включая гонорею). Профилактика послеоперационной инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (диарея, тошнота, рвота, стоматит, глоссит), изменения в крови (эозинофилия, лейкопения, гранулоцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения), кожные реакции (сыпь, аллергический дерматит, зуд, крапивница, отеки, экссудативная многоформная эритема), головная боль, головокружение, увеличение активности ферментов печени, затемнения на эхограмме желчного пузыря, олигурия, увеличение креатинина сыворотки, микозы полового тракта, лихорадка, озноб, нарушения

свертываемости крови, флебиты в месте введения, анафилактические реакции.

Примен. и доз.: Обычно - 1-2 г 1 раз в день. При тяжелых инфекциях суточную дозу увеличивают до 4 г. Новорожденным (до 2 нед) - 20-50 мг/кг 1 раз в день, максимальная суточная доза - 50 мг/кг; грудным и детям младшего возраста (с 3-й недели до 12 лет) - 20-80 мг/кг 1 раз в сутки. Детям с массой тела более 50 кг назначают дозы для взрослых. В/в дозы - 50 мг/кг или выше следует вводить вливанием в течение 30 мин. При менингите у грудных детей и детей младшего возраста лечение начинают с дозы 100 мг/кг (но не более 4 г) 1 раз в день. Продолжительность лечения - 4-14 дней (в зависимости от возбудителя заболевания). При гонорее - однократно 250 мг в/м. Для профилактики инфекций в хирургии вводят 1-2 г за 30-90 мин до начала операции.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Рувакс (Rouvax)

Сост. и ф.в.: 1 доза (0,5 мл) вакцины после растворения лиофилизата содержит не менее 1000 ЦПД₅₀ живого гиперттенуированного вируса кори (штамм Schwarz), следы неомидина. Порошок лиофилизированный для инъекций во флаконах по 1 или 10 доз в комплекте со стерильным растворителем в ампулах, шприцах или флаконах.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее (формирование специфического иммунитета против вируса кори).

Фармакодин.: Специфический иммунитет против вируса кори развивается в течение 15 дней после вакцинации и сохраняется не менее 20 лет. Сероконверсия наблюдается у 95-98% привитых пациентов. У детей в возрасте до 9 мес иммунизация может оказаться неэффективной в связи с сохранением у них материнских антител.

Показ.: Профилактика кори у детей (начиная с 9-месячного возраста), особенно посещающих детские сады и школы и страдающих дистрофией; у лиц с хроническими заболеваниями сердца, муковисцидозом, бронхиальной астмой, туберкулезом и другими хроническими заболеваниями легких.

Противопоказ.: Тяжелая форма аллергии к белкам куриных яиц и неомидину, лейкомия, лимфомы, прочие злокачественные заболевания в генерализованной форме (не являются противопоказаниями незначительное повышение темпера-

туры тела, легкопротекающие респираторные инфекции или диарея, другие заболевания в легкой форме), иммунодефицит, терапия кортикостероидами, алкилирующими препаратами, антиметаболитами, лучевая терапия; введение иммуноглобулинов (до вакцинации).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Вакцинация обычно хорошо переносится. Побочные реакции могут наблюдаться между 5-м и 12-м днем: повышение температуры (до 38,8-39 град.С), нарушения пищеварения, редко - непродолжительный ринофарингит, незначительной выраженности кожные сыпи (в виде мелких розеол и фиолетовых пятен различного размера).

Взаим.: Совместима с другими вакцинами. Наиболее широко применяется комбинированная вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи. Нельзя вводить иммуноглобулины и препараты крови в течение 2 нед после вакцинации (во избежание возможной инактивации вакцинного штамма сывороточными белками). После вакцинации временно может отмечаться ложнонегативный туберкулиновый тест.

Примен. и доз.: П/к или в/м однократно 0,5 мл растворенной вакцины; детям, вакцинированным до 1 года, через 6 мес рекомендуется ревакцинация. Перед употреблением лиофилизат растворяют в растворителе - 0,5 мл на 1 дозу.

Предост.: Рекомендуется назначение антипиретиков при повышении температуры после вакцинации. Не следует проводить вакцинацию в течение 6 нед (по возможности - 3 мес) после введения иммуноглобулинов и препаратов крови во избежание возможной инактивации вакцинного штамма сывороточными антителами. Вся неиспользованная разведенная вакцина должна быть уничтожена.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Рудивакс (Rudivax)

Сост. и ф.в.: 1 доза (0,5 мл) вакцины после растворения лиофилизата содержит не менее 1000 ЦПД₅₀ живого аттенуированного вируса краснухи (штамм Wistar RA 27/3М), следы неомидина. Порошок лиофилизированный для инъекций во флаконах по 1 дозе в комплекте с растворителем (вода для инъекций) в шприцах или ампулах по 0,5 мл, в упаковке 1 или 10 шт.; во флаконах по 10

доз в комплекте с растворителем во флаконах по 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее (формирование специфического иммунитета против вируса краснухи).

Фармакодин.: Специфический иммунитет против вируса краснухи развивается в течение 15 дней после вакцинации и сохраняется не менее 20 лет. Сероконверсия наблюдается у 95-100% привитых пациентов. Вакцина может вводиться детям в возрасте до 1 года, но может оказаться неэффективной (из-за возможного сохранения у ребенка материнских антител) - требуется ревакцинация. При серологическом обследовании результат анализа будет серопозитивным (положительным) при разведении равном или превышающем 1/20 (в РТГА): в этом случае пациент расценивается как обладающий специфическим иммунитетом и вакцинация для него не требуется. Серонегативным рассматривается результат при разведении менее 1/20.

Показ.: Профилактика краснухи: у детей старше 1 года, у девочек препубертатного периода, у женщин детородного возраста.

Противопоказ.: Острые инфекционные заболевания, врожденные или приобретенные иммунодефициты (возможность иммунизации детей с ВИЧ-инфекцией решает консилиум педиатров), острые и хронические прогрессирующие заболевания, введение иммуноглобулинов (до вакцинации), гиперчувствительность к неомидину.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Редко: повышение температуры, эритема, лимфаденопатии, кожная сыпь (в виде мелких розеол или фиолетовых пятен различного размера). У пациентов в постпубертатном возрасте могут отмечаться незначительные быстро проходящие реакции: небольшое увеличение лимфатических узлов (преимущественно заднеушных), неяркая краснушная сыпь, воспаление и боль в суставах (в коленных и лучезапястных). Эти реакции возникают в интервале между 10 и 15 сутками после иммунизации у 10% пациентов.

Взаим.: Совместима с другими вакцинами. Наиболее широко применяется комбинированная вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи. Нельзя вводить иммуноглобулины в течение 2 нед после вакцинации во избежание возможной инактивации вакцинного штамма сывороточными антителами. После

вакцинации временно может отмечаться ложнонегативный туберкулиновый тест.

Примен. и доз.: П/к или в/м однократно 0,5 мл (растворенной вакцины); у девочек в препубертатном возрасте (11-13 лет) рекомендуется проводить ревакцинацию (без предварительного серологического обследования).

Предост.: Не проводить вакцинацию в течение 6 нед (по возможности 3 мес) после введения иммуноглобулинов и препаратов крови во избежание возможной инактивации вакцинного штамма сывороточными антителами. Вся разведенная вакцина должна быть немедленно использована, остатки необходимо уничтожить. Рекомендуется воздержаться от беременности в ближайшие 2 мес после вакцинации - назначаются противозачаточные средства. У женщин детородного возраста с серонегативным анализом вакцинация проводится с использованием противозачаточных средств.

Пронзв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Рудотель (Rudotel®)

Медазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит медазепам 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анксиолитическое, слабое седативное, миорелаксирующее.

Показ.: Беспокойство, фобии непсихотического характера, психосоматические и психовегетативные жалобы.

Противопоказ.: Миастения, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, парестезии, снижение способности к обучению, повышение аппетита, мышечная слабость, атаксия, снижение либидо, потенции, нарушение менструального цикла, в редких случаях увеличение грудных желез и/или галакторея, потеря ориентации, агрессивность, альвеолярная гиповентиляция, лекарственная зависимость.

Взаим.: Усиливает эффект барбитуратов и других нейролептиков, антидепрессантов, анальгетиков, наркотических препаратов, снотворных, алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 (до 4) таблетки в день перед едой, запивая небольшим количеством воды.

Пронзв.: Byk Gulden (Германия)

Рулид (Rulid®)

Рокситромицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит рокситромицин 150 или 300 мг; в упаковке

10 шт.

1 таблетка для детей - 50 или 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, антипротозойное.

Фармакокин.: Быстро всасывается после введения внутрь (прием пищи через 15 мин не влияет на скорость C_{max} резорбции) и обнаруживается в сыворотке крови через 15 мин. C_{max} в крови (150 мг внутрь) - 6,6 мг/л (в среднем) достигается через 2,2 ч. Эффективные концентрации в крови сохраняются в течение суток при двукратном приеме (с интервалом 12 ч). Равновесная концентрация в плазме определяется на 2-4-й день. Хорошо проникает в ткани (особенно в легкие), в небные миндалины и предстательную железу, а также внутрь клеток (особенно в нейтрофильные лейкоциты и моноциты, стимулируя их фагоцитарную активность). Связывание с белками крови составляет 96%, носит насыщаемый характер и уменьшается при концентрациях свыше 4 мг/л. Метаболизируется частично, более половины активного вещества выводится в неизменном виде преимущественно кишечником и почками. Период полувыведения после однократного приема составляет в среднем 10,5 ч.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей, мочеполового тракта (включая инфекции, передающиеся половым путем, кроме гонореи); профилактика менингококкового менингита у лиц, находившихся в контакте с заболевшим.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, период лактации, возраст (до 2 мес).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боль в животе, диарея, головокружение, транзиторное повышение трансаминаз и щелочной фосфатазы, аллергические реакции.

Взаим.: Увеличивает вероятность развития "эрготизма" и некроза тканей конечностей на фоне эрготамин и эрготаминоподобных сосудосуживающих средств, желудочковой аритмии на фоне терфенадина (более характерно для других макролидов).

Передоз.: Лечение: промывание желудка и симптоматическая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. Взрослым назначают 150 мг 2 раза в сутки; в случае печеночной недостаточности назначают 150 мг 1 раз в сутки. Детям - из расчета 5-8 мг/кг/сутки в 2 приема в течение не более 10 дней.

Предост.: Необходимо тщательное наблюдение в случае сочетанного применения с терфенадином.

Пронзв.: Roussel Uclaf (Франция)

Румалон (Rumalon®)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит экстракта хряща телят 0,31 г и экстракта костного мозга телят 0,21 г, в ампулах по 1 мл; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Нормализация обмена веществ в хрящевой ткани, стимуляция биосинтеза сульфатированных мукополисахаридов и коллагена хрящевой ткани.

Показ.: Дегенеративные заболевания суставов: спондилоартроз, менископатии, хондромалиция надколенника, спондилез, гонартроз, артрозы пальцев, коксартрозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, начиная с 0,3 мл до 1-2 мл 2-3 раза в неделю; курс, включающий 25 инъекций по 1 мл или 15 инъекций по 2 мл (в течение 6-8 нед), повторяют 2-4 раза в год в течение многих лет.

Пронзв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Сайзен (Saizen®)

Соматропин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит соматропина 4 или 10 МЕ; флаконы, содержащие 10 МЕ препарата, предназначены для проведения повторных инъекций.

Фарм. действ.: Соматотропное, увеличение скорости роста (опосредуется через соматомедин С - инсулиноподобный ростовой фактор 1).

Фармакокин.: После в/м введения (4 МЕ человеческого гормона роста/кв.м) 12 добровольцам максимум содержания в плазме достигался через 3 ч, при п/к введении - через 4-6 ч (достоверная корреляция с аналогичными величинами для эндогенного человеческого гормона роста), при этом площади под кривыми концентраций не зависели от пути введения.

Показ.: Нарушение секреции эндогенного гормона с отставанием роста, дисгенезия гонад (синдром Тернера).

Противопоказ.: Признаки прогрессирующего развития опухоли мозга, сахарный диабет (относительное противопоказание).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Формирование антител к Сайзену; боль, потеря чувствительности, покраснение и припухлость в месте введения у детей.

Взаим.: Глюкокортикоиды могут подавлять чувствительность к Сайзену; неандрогенные стероиды вызывают дополнительное увеличение скорости роста.

Передоз.: Проявляется гипогликемией, сменяющейся гипергликемией. Длительная передозировка приводит к симптоматике акромегалии.

Примен. и доз.: Дозировки и режим введения подбираются индивидуально. Обычно при задержке роста из-за нарушения нормальной секреции гормона, назначают 12 МЕ/кв.м поверхности тела или 0,6 МЕ/кг массы тела в неделю. При слишком слабой реакции на терапию доза может быть увеличена до 20 МЕ/кв.м или 0,8 МЕ/кг массы тела и более в неделю. При в/м введении недельную дозу разделяют на три разовые (по 4 МЕ/кв.м поверхности тела или 0,2 МЕ/кг массы тела), вводить предпочтительнее в вечернее время. При п/к введении недельную дозу можно разделить на 6 или 7 разовых (по 2 или 1,7 МЕ/кв.м поверхности тела). При задержке роста вследствие дисгенезии гонад при синдроме Тернера - 18 МЕ/кв.м поверхности тела или 0,6-0,7 МЕ/кг массы тела еженедельно. Во второй год терапии дозу можно увеличить до 24 МЕ/кв.м или 0,8-1 МЕ/кг массы тела. Недельную дозу делят на 7 разовых, вводят п/к (в вечернее время). Введение препарата прекращают при достижении нормальной для взрослого возраста величины роста или после закрытия эпифизальных зон роста.

Предост.: Терапию проводят в условиях систематического медицинского контроля. Для профилактики локальной липотрофии следует ежедневно менять места подкожных инъекций. В ходе терапии возможно развитие гипотиреоза, устраняемого введением тиреоидных гормонов. Бензиловый спирт в составе растворителя оказывает токсическое действие на новорожденных (используется разведение в физиологическом растворе без консерванта или в стерильной воде для инъекций).

Пронзв.: Serono (Швейцария)

Сайтотек (Cytotec®)

Мизопростол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мизопростола 200 мкг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное.

Фармакодин.: Аналог натурального простагландина E₁, ингибирует базальную, стимулированную и ночную секрецию, снижает объем и протеолитическую активность желудочного сока. Защищает слизистую оболочку желудка, способствует заживлению пептической язвы.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвы, вызванные применением НПВС (лечение и профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная печеночная патология, беременность.

Поб. действ.: Боли в животе, тошнота, диспепсия, метеоризм, диарея (легкие формы).

Примен. и доз.: Для заживления язв (желудка, двенадцатиперстной кишки и вызванных применением НПВС) - 800 мкг в сутки, разделенных на 2-4 приема (во время еды и на ночь). Первичный курс лечения - 4 нед, при необходимости может быть продлен до 8 нед. Для профилактики язвы, вызванной применением НПВС, назначается в дозе 200 мкг 2-4 раза в сутки.

Предост.: Следует с осторожностью назначать больным с гипотензией.

Произв.: Searle (США)

Саламол (Salamol)

Сальбутамол*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит сальбутамола 100 мкг; во флаконе 200 доз.

Фарм. действ.: Бронхорасширяющее, стимуляция бета₂-адренорецепторов.

Фармакодин.: Стимулирует бета₂-адренорецепторы в бронхах, миометрии, кровеносных сосудах (при ингаляционном введении - в основном в бронхах). Обладает выраженным бронхолитическим влиянием: купирует и предупреждает спазмы бронхов, понижает сопротивление в дыхательных путях, увеличивает жизненную емкость легких. Одновременно вызывает уменьшение выделения гистамина, медленно реагирующей субстанции анафилаксии и других биологически активных веществ из тучных клеток.

Показ.: Купирование и профилактика приступов бронхиальной астмы; бронхи-

ты, эмфизема легких и другие заболевания, сопровождающиеся бронхоспастическим синдромом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказан в первом триместре беременности и угрозе выкидыша во втором триместре, в т.ч. в связи с кровотечениями и симптомами токсикоза.

Поб. действ.: Тахикардия, понижение АД (при использовании высоких доз), головная боль, беспокойство, тревога; мышечный тремор.

Взаим.: Теофиллин повышает риск возникновения тахикардии и аритмий, в частности, наджелудочковой экстрасистолии.

Передоз.: Симптомы: тахикардия, слабость, снижение АД, мышечный тремор. Лечение: селективные бета₁-адреноблокаторы (следует избегать их введения в высоких дозах, т.к. у лиц с повышенной чувствительностью это может вызвать бронхоспазм).

Примен. и доз.: Ингаляционно, взрослым для купирования приступов удушья - 1-2 ингаляции однократно; для систематической терапии - по 2 ингаляции 3-4 раза в сутки. Детям для купирования приступов удушья назначают 1 ингаляцию однократно, для систематической терапии - по 1 ингаляции 3-4 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью назначают больным с заболеваниями сердца, артериальной гипертонией, сахарным диабетом.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Саламол легкое дыхание (Salamol easy breathe)

Сальбутамол*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит сальбутамола 100 мкг; во флаконе-ингаляторе с оптимизатором 200 доз.

Фарм. действ.: Бронхорасширяющее, стимуляция бета₂-адренорецепторов.

Показ.: Купирование бронхоспазма при всех формах бронхиальной астмы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Взрослым - обычная доза для купирования приступа - 1-2 впрыскивания, детям - 1 впрыскивание (под присмотром взрослых).

Пронзв.: Norton Healthcare / Galena (Великобритания)

Салициловая кислота (Acidum salicylicum)

Салициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1% и 2% спиртовой раствор салициловой кислоты; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, местно раздражающее.

Показ.: Кожные заболевания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Наружно, наносят на пораженные участки кожи.

Пронзв.: ICN Полифарм (Россия)

Салициловая мазь (Unguentum Acidi salicylici)

Салициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит салициловой кислоты 0,04 г; в банках из темного стекла по 100 г.

Фарм. действ.: Антимикробное, противовоспалительное, антипротеолитическое, ранеоочищающее.

Показ.: Раны и ожоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Поб. действ.: Повышение температуры, боли в области раны.

Примен. и доз.: Местно, в виде аппликаций, наносят тонким слоем на поверхность раны и закрывают стерильной салфеткой или накладывают на рану стерильную повязку, пропитанную мазью. Перед наложением повязки рану очищают от некротических тканей, вскрывают пузыри, промывают антисептическим раствором. Смену повязки проводят 1 раз в 2-3 дня до полного очищения от гнойно-некротических масс. Расход мази на одну повязку зависит от обширности раны и в среднем составляет 0,2 г на 1 кв.см раневой поверхности. Длительность курса лечения - 6-20 суток.

Пронзв.: Нижфарм (Россия)

Салмо (Salmo)

Сальбутамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сальбутамола 2 мг; в упаковке 60 шт.

1 доза аэрозоля для ингаляций - 100 мкг; в аэрозольных баллонах по 200 доз.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, бета2-адреномиметическое.

Показ.: Обструкция дыхательных путей при бронхиальной астме, хроническом бронхите (купирование и профилактика приступа).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тахикардия, аритмия, первый и второй триместры беременности (в связи с угрозой выкидыша).

Поб. действ.: Тремор кистей рук, головная боль, сердцебиение, тахикардия, экстрасистолия, аритмия, расширение периферических сосудов, гипокалиемия, ацидоз, увеличение концентрации глюкозы и свободных жирных кислот, пототделение, тошнота, потеря аппетита, аллергические реакции (ангионевротический отек, сыпь, бронхоспазм, гипотония, коллапс).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 2 таблетки 3-4 раза в день, при необходимости дозу постепенно увеличивают, но не более 4 таблеток 3-4 раза в день. Пожилым или сверхчувствительным к бета-2-адреномиметикам - по 1 таблетке 3-4 раза в день. Детям от 2 до 6 лет - не более 12 мг в день, от 6 до 12 лет - не более 24 мг в день, старше 12 лет - по 1-2 таблетки 3-4 раза в день. Ингаляции: для купирования и профилактики бронхоспазма вследствие физического напряжения взрослым и детям старше 4 лет - 1-2 ингаляции; при длительном лечении взрослым и детям - по 1 ингаляции 3-4 раза в сутки (детям до 4-х лет - не более 2 ингаляций 4 раза в день). Следует соблюдать интервал не менее 6 ч между очередными дозами препарата.

Предост.: С особой осторожностью назначают больным при сердечно-сосудистых заболеваниях (ИБС, аритмия, тахикардия, окклюзии сосудов, гипертония, аневризмы, артериосклероз), сахарном диабете, закрытоугольной глаукоме.

Пронзв.: Pliva (Хорватия)

Салофальк (Salofalk®)

Месалазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с кишечнорастворимой оболочкой содержит месалазина 250 или 500 мг; в упаковке 100 и 50 шт.

1 суппозиторий - 250 или 500 мг; в упаковке 10 и 30 шт.

Микроклизма одноразового применения - 4 г в 60 г суспензии; в упаковке 7 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антибактериальное.

Показ.: Неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, проктит, проктосигмоидит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, болезни крови, печеночная недостаточность, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Гипертермия, бронхоспазм, красная волчанка, метгемоглобинемия, аллергическая экзантема.

Примен. и доз.: Внутрь, при тотальных и субтотальных формах язвенного колита (легкие и среднетяжелые формы) - 1,5 г в сутки в 3 приема, в случае тяжелого течения суточная доза может быть увеличена до 3-4 г на срок не более 8-12 нед. Для профилактики рецидивов - 1,5 г в сутки, при необходимости в течение нескольких лет. Таблетки следует принимать после еды, запивая большим количеством воды. Ректально (в виде свечей или клизм), при проктите, проктосигмоидите и левостороннем язвенном колите (возможно в комбинации с таблетками). Свечи - в суточной дозе 1,5 г (в 3 приема). Клизмы с препаратом (60 г суспензии) - 1 раз в сутки перед сном (предварительно рекомендуется очистить кишечник).

Произв.: Dr. Falk (Германия)

Сальбутамол (Salbutamol)

Сальбутамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит сальбутамола 2 или 4 мг; в упаковке 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Бронхорасширяющее, токолитическое, селективная стимуляция бета₂-адренорецепторов.

Показ.: Бронхиальная обструкция всех типов, в т.ч. при бронхиальной астме, хронических бронхитах, эмфиземе, бронхоспазме у больных с гипертензией и заболеваниями сердца; преждевременные роды.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (за исключением угрозы выкидыша).

Поб. действ.: Тремор скелетной мускулатуры (особенно рук), тахикардия, сердцебиение, нервозность, раздражительность, бессонница и др. симптомы возбуждения ЦНС, расстройства ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - в обычной дозе по 4 мг 3-4 раза в день; при необходимости - каждую дозу постепенно увеличивают до максимальной - 8 мг; у некоторых больных адекватная бронходилатация достигается при приеме 2 мг 3-4 раза в день; у пожилых - начальная доза 2 мг 3-4 раза в день. Детям назначают 3-4 раза в день: 2-6 лет - по

0,5-2 мг, 6-12 лет - по 2 мг, старше 12 лет - по 2-4 мг.

Предост.: С осторожностью следует назначать препарат при гипертиреозе, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, включая коронарную недостаточность и артериальную гипертензию, лактации (необходимо приостановить грудное вскармливание), при гиперчувствительности к симпатомиметикам, с особой осторожностью - при гипоксии и лечении тяжелых приступов астмы в сочетании с ксантинами, глюкокортикостероидами, диуретиками (возможно развитие гипокалиемии).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Сальметер (Salmeter)

Салметерол*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит салметерола ксинафоата 25 мкг; во флаконе 120 доз.

Фарм. действ.: Противоастматическое, бронходилатирующее, бета₂-адреномиметическое.

Показ.: Бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, бронхоспазм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Тремор, сердцебиение, головная боль, гипокалиемия.

Примен. и доз.: По 2 ингаляции 2 раза в день. В тяжелых случаях - по 4 ингаляции 2 раза.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Санапрокс (Sanaprox)

Напроксен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит напроксена 250 или 500 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее.

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, боли в позвоночнике, невралгии, миалгии, травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, заболевания ЛОР-органов, головная и зубная боль, аднексит, первичная дисменорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, "аспириновая" астма, нарушение кроветворения, функции почек, печени.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастрии, кровотечения и эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, эозинофильная пневмония, нарушение слуха, функции печени и почек, тромбоцитопения, гранулоцитопения, апластическая анемия, кожная сыпь, отек Квинке, крапивница и другие аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 500-1000 мг в сутки в 2 приема, максимальная суточная доза - 1750 мг. Детям 1-5 лет суточная доза - 2,5-5 мг/кг массы тела в 1-3 приема. Курс лечения - 2 нед.

Предост.: Необходимо контролировать функции печени и почек, клеточный состав периферической крови.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Сандиммун-Неорал (Sandimmun®-Neoral®)

Циклоспорин*

Сандиммун (Sandimmun®)

Циклоспорин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мягкая желатиновая капсула содержит циклоспорина 25, 50 или 100 мг; в упаковке 50 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 100 мг; во флаконах по 50 мл.

1 мл концентрата для приготовления инфузионного раствора - 50 мг.

Фарм. действ.: Иммунодепрессивное.

Показ.: Трансплантация солидных органов (почки, печени, сердца, сердечно-легочного комплекса, легких, поджелудочной железы); трансплантация костного мозга; эндогенные увеиты, нефротический синдром, выраженные формы ревматоидного артрита в активной фазе, тяжелые формы псориаза и атопического дерматита.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности применяют с осторожностью. Грудное вскармливание должно быть прекращено.

Поб. действ.: Боли в животе, анорексия, тошнота, рвота, диарея, головная боль, слабость, гипертензия, нарушение функции почек и печени, панкреатит, парестезии, судороги, мышечные спазмы, миопатия, тремор, обратимая дисменорея и аменорея, анемия; тромбоцитопения, в некоторых случаях сопровождающаяся микроангиопатической гемо-

литической анемией и почечной недостаточностью; гиперкалиемия, гиперурикемия, гипомагниемия, появление отеков, увеличение массы тела, гипертрофия десен, гипертрихоз, повышенная восприимчивость к инфекциям, развитие малигнизации и лимфопролиферативных расстройств.

Взаим.: Снижает эффективность вакцинации.

Примен. и доз.: Выбор начальной дозы и коррекцию режима дозирования в процессе лечения проводят с учетом клинических и лабораторных параметров, а также значений концентрации препарата в плазме крови, определяемых ежедневно. Капсулы следует проглатывать целиком.

Предост.: Лечение следует проводить только в специализированных лечебных учреждениях под систематическим контролем АД, функций почек и печени, концентрации калия в плазме, уровня липидов в сыворотке и др. Следует избегать избыточного поступления калия в организм (с пищей, с калийсодержащими препаратами), не рекомендуется назначать калийсберегающие диуретики. С осторожностью назначают при нарушениях функции печени/почек, гиперурикемии, гиперкалиемии (даже с тенденцией).

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Сандостатин (Sandostatin®)

Октреотид*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит октреотида (в виде свободного пептида) 0,05; 0,1 или 0,5 мг; в упаковке 10 шт.

1 многодозовый флакон с 5 мл раствора для инъекций - 1 мг.

Фарм. действ.: Подавление секреции гормона роста.

Показ.: Акромегалия (при отсутствии эффекта или невозможности проведения хирургического лечения, лучевой терапии или лечения агонистами дофамина), купирование симптоматики эндокринных опухолей гастроэнтеропанкреатической системы (карциноидные опухоли с признаками карциноидного синдрома; опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией вазоактивного интестинального пептида); глюкагономы; гастриномы/Синдром Золлингера-Эллисона, инсуломы, ВИПомы); опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией соматолиберина; рефрактерная диарея у больных

СПИДом; профилактика осложнений после операций на поджелудочной железе; кровотечения (и профилактика рецидивов), связанные с варикозным расширением вен пищевода и желудка у больных с циррозом печени (неотложное лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, анорексия, спастические боли в животе, ощущение вздутия живота, метеоризм, жидкий стул, диарея и стеаторея, имитация острой кишечной непроходимости (прогрессирующее вздутие живота, сильные боли в эпигастрии, болезненность и напряжение брюшной стенки при пальпации); нарушение функции печени; образование желчных камней (при длительном использовании), острый панкреатит, выпадение волос, нарушение посталиментарной толерантности к глюкозе, гипергликемия, гипогликемия. В месте инъекции возможны боль, ощущение зуда или жжения, краснота и припухлость.

Взаим.: Замедляет всасывание циметидина, циклоспорина.

Примен. и доз.: При акромегалии и опухолях гастроэнтеропанкреатической системы п/к - по 0,05-1 мг 1-2 раза в день, при необходимости доза может быть постепенно увеличена до 0,1-0,2 мг 3 раза в день. При рефрактерной диарее, при СПИДе п/к - по 0,1 мг 3 раза в день, при необходимости постепенно увеличивая дозу до 0,25 мг 3 раза в день. Для профилактики осложнений после операции на поджелудочной железе первую дозу 0,1 мг вводят п/к за 1 ч до лапаротомии; затем после операции вводят п/к по 0,1 мг 3 раза в сутки на протяжении семи последовательных дней. Для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода или желудка вводят по 25 мкг/ч в виде постоянного в/в введения.

Предост.: Раствор препарата должен иметь комнатную температуру. При лечении гастроэнтеропанкреатических эндокринных опухолей в редких случаях может наступить внезапный рецидив симптомов. У больных с инсулиномами на фоне лечения может отмечаться увеличение выраженности и продолжительности гипогликемии. Существенные колебания гликемии можно уменьшить путем более частого введения Сандостатина в меньших дозах. У больных, получающих инсулин, может снижаться потребность в нем. Поскольку в случаях

кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода у больных с циррозом печени повышен риск развития инсулинзависимого диабета или изменения потребности в инсулине в случае уже имеющегося диабета, необходим систематический контроль концентрации глюкозы в крови.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Сандра® (Sandra)

Сост. и ф.в.: Комплексный гомеопатический препарат, состоящий из 10 компонентов растительного, животного и минерального происхождения в гомеопатических дозах. Таблетки (от белого до светло-желтого цвета) по 0,25 г; 40 таблеток в банке или 10-20 таблеток в контурной ячейковой упаковке.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, общеукрепляющее.

Показ.: Острые респираторные, простудные и парагриппозные заболевания (профилактика и лечение), общеукрепляющая терапия.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: По 1 таблетке под язык (держат до полного растворения) через каждые 2 ч (7-8 раз в сутки). После снижения температуры в течение последующих 2-х дней - по 1 таблетке 4 раза в день. Курс лечения - 5-6 дней. Профилактически - по 1 таблетке 4 раза в день.

Произв.: ВИЛАР НПО ПЭЗ (Россия)

Саникам (Sanicam)

Пироксикам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пироксикама 10 или 20 мг; в упаковке 60 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее.

Показ.: Острый артрит, хронические артриты, болезнь Бехтерева, артроз, спондилоартрит, внесуставной ревматический синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь ЖКТ, бронхиальная астма, индуцируемая порфирия, беременность, возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Метеоризм, тошнота, чувство переполнения желудка, диарея, кровотечения и язвы ЖКТ, головная боль, головокружения, замедление реакции, бронхоспазм, гипотензия, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 мг/сутки, максимальная доза - 40 мг/сутки.

Предост.: Необходимо контролировать клеточный состав крови, функцию почек и печени.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Санорин (Sanorin)

Нафазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл эмульсии для интраназального применения содержит нафазолина нитрата 1 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее (альфа₂-адреномиметическое).

Фармакодин.: При нанесении на слизистые оболочки уменьшает отечность, гиперемию, экссудацию; облегчает носовое дыхание.

Клин. фарм.: При длительном применении сосудосуживающий эффект постепенно уменьшается, в связи с чем через 5-7 дней лечения следует сделать перерыв на несколько дней.

Показ.: Острый ринит, синусит, ларингит, евстахиит; риноскопия.

Противопоказ.: Артериальная гипертония, увеличение щитовидной железы; детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Раздражение слизистой оболочки, реактивная гиперемия; при длительном применении - набухание слизистой; тошнота, головная боль, повышение АД, тахикардия (при резорбтивном действии).

Примен. и доз.: Интраназально. По 1-3 капли закапывают в каждый носовой ход несколько раз в сутки.

Предост.: Не следует применять одновременно с ингибиторами МАО или в течение 10 дней после их отмены. Не рекомендуется использовать при хронических ринитах.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Санорин-Аналергин (Sanorin-Analergin)

Сост. и ф.в.: 10 мл капель содержат нафазолина нитрата 2,5 мг и антазолина мезилата 50 мг.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее (симпатомиметическое), антигистаминное.

Показ.: Насморк (аллергический, сенной), острый ринит, хронический конъюнктивит, астенопические расстройства (нарушение аккомодации при повышенной зрительной нагрузке), весенние

конъюнктивиты (дополнительная терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, высокое АД, гипертиреозидизм, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Головные боли, раздражительность, тошнота, сыпь; интенсивное набухание слизистой оболочки (при применении более 1 нед в нос).

Передоз.: Симптомы: заторможенность, сонливость, понижение температуры.

Примен. и доз.: Взрослым, в нос по 2-3 капли в каждый носовой проход; в глаза - 1-2 капли в полость конъюнктивы 3-4 раза в день. Детям - по 1-2 капли в каждый носовой проход 3-4 раза в день. Применяется кратковременно, не более 1 нед, затем делается перерыв на несколько дней.

Предост.: Не следует принимать одновременно с ингибиторами МАО (препарат можно использовать не ранее, чем через 2 нед после окончания их приема).

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Саносон (Sanoson®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит экстракта валерианы 60 мг и экстракта хмеля 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Седативное, снотворное.

Показ.: Бессонница, раздражительность, тревога, страх.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 6 лет).

Примен. и доз.: Внутрь, по 2-3 (детям - 1-2) таблетки за час до сна.

Произв.: Lek (Словения)

Сант-Е-гал (Sant-E-gal)

Витамин Е

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит токоферола ацетата 150 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиоксидантное, иммуностимулирующее.

Фармакодин.: Защищает липиды мембран и др. клеточные структуры от окислительных изменений, ускоряет транспорт жиров и предохраняет кровеносные сосуды от склеротических изменений, активизирует половые железы.

Показ.: Старение клеток организма, сниженная мышечная активность и переносимость психофизических нагрузок, атеросклероз (профилактика), слабая сопротивляемость организма (хронические болезни, лица, употребляющие спиртные напитки).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 драже в день.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Санфидипин (Sanfidipin)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит нифедипина 5 или 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, сосудорасширяющее, блокада кальциевых каналов.

Показ.: Стенокардия (профилактика и купирование приступов), артериальная гипертензия, гипертонический криз, гипертрофическая кардиомиопатия, болезнь Рейно.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, артериальная гипотония, коллапс, кардиогенный шок, сердечная недостаточность, аортальный стеноз, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Гиперемия, головная боль, тошнота, отеки, артериальная гипотония, учащение приступов стенокардии, увеличение ЧСС, асистолия, желудочковая тахикардия, увеличение суточного диуреза, боли в мышцах, гиперплазия десен.

Примен. и доз.: Внутрь, 10-20 мг 3-4 раза в сутки, максимальная доза - 120 мг в сутки.

Предост.: Контроль за функцией печени и почек.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Санфинак (Sanfinac)

Диклофенак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит диклофенака натрия 25 или 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Суставной синдром (ревматоидный артрит, подагра), боли в позвоночнике, невралгия, миалгия, ревматическое поражение мягких тканей, первичная дисменорея, проктит, болевой синдром при травмах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, "аспириновая" астма, нарушение кроветворения, беременность, возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, анорексия, метеоризм, запор, боли в эпигастриальной области, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, кровотечения, головная боль, па-

рестезии, нарушение функции почек, печени, зрения, шум в ушах, выпадение волос, анемия, лейкопения, тромбоцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь, по 25-50 мг 2-3 раза в сутки, максимальная суточная доза - 150 мг.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Санфипурол (Sanfipurool)

Аллопуринол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аллопуринола 100 или 300 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоподагрическое.

Показ.: Подагра, гиперурикемия любого генеза, оксалатно-кальциевые почечные камни, острая нефропатия при цитостатической и лучевой терапии опухолей и лейкозов (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции почек и печени, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Диспептические явления, гепатит, артралгия, повышение температуры, слабость, головная боль, кома, парестезии, нейропатии, катаракта, ангины, бесплодие, гинекомастия, импотенция, сахарный диабет, тромбоцитопения, лейкопения, гематурия, кожные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 100-200 мг 1 раз в сутки. Детям до 15 лет - 10-20 мг/кг массы тела в сутки или 100-400 мг в сутки.

Предост.: Во время лечения следует потреблять не менее 2 л жидкости в сутки.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Саридон (Saridon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит парацетамола 250 мг, пропифеназона 150 мг и кофеина 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Головная, зубная, менструальная, послеоперационная и ревматическая боли, лихорадка при гриппозных инфекциях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции печени и почек, нарушения кроветворения; алкогольная нефропатия, алкоголизм, врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, острая печеночная порфирия, беременность, лактация, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Нарушения функции печени и почек, аллергические реакции

(кожная сыпь, крапивница, зуд, эритема, сосудистый отек, одышка, астма) вплоть до анафилактического шока.

Взаим.: Алкоголь усиливает гепатотоксичность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки (детям 12-16 лет - 1 таблетка) до 3 раз в день в течение 1 нед (не более). Таблетки принимают с большим количеством жидкости.

Предост.: Следует воздержаться от приема алкоголя.

Произв.: Hoffmann-La Roche (Швейцария)

Сахарин (Saccharinum)

Сахарин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сахараина 0,04 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Подслащающее.

Показ.: Сахарный диабет, ожирение.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Сбор грудной N 4 (Species pectorales N 4)

Сост. и ф.в.: Измельченная смесь содержит цветков ромашки 20%, побегов багульника 20%, цветков календулы 20%, травы фиалки 20%, корней солодки 15% и листьев мяты 5%. Растительное сырье для приготовления настоев; в пачках по 50 г или фильтр-пакетах по 2 г - в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое и общетонизирующее.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, склонность к аллергическим реакциям.

Примен. и доз.: 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, нагревают на водяной бане 15 мин, настаивают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают, полученный настой доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в сутки в течение 2-3 нед. Перед употреблением взбалтывают.

Произв.: Красногорсклексредства (Россия)

Сбор желудочно-кишечный (Species gastrointestinales)

Сост. и ф.в.: Измельченная смесь содержит цветков ромашки 20%, листьев мяты 20%, плодов укропа 20%, корневищ аира 20% и корней солодки 20%. Растительное сырье для приготовления настоев; в пачках по 50 г или в фильтр-пакетах по 2 г - в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антимикробное, спазмолитическое, желчегонное, ветрогонное, ускорение регенерации.

Показ.: Гастриты с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты, дискинезии желчевыводящих путей, спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ, метеоризм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: 1 столовую ложку сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, нагревают на водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают и доводят объем кипяченой водой до 200 мл. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в сутки за 30 мин до еды. Длительность лечения зависит от характера заболевания.

Произв.: Красногорсклексредства (Россия)

Сбор желчегонный N 3 (Species cholagogae N 3)

Сост. и ф.в.: Сбор содержит измельченную смесь следующего состава: цветков ромашки аптечной 23%, листьев мяты перечной 23%, цветков ноготков 23%, травы тысячелистника 23% и цветков пижмы 8%. Растительное сырье для приготовления настоев; в пачках по 50 г или в фильтр-пакетах по 2 г - в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Желчегонное, противовоспалительное, спазмолитическое, повышение аппетита, нормализация моторики ЖКТ.

Показ.: Заболевания печени и желчных путей (острые и хронические холециститы и гепатиты, холангиты, дискинезии желчевыводящих путей, постхолецистэктомический синдром).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, настаивают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают, полученный настой доводят кипяченой водой до объема 200 мл. Принимают по 1/3-1/2 стакана 3 раза в сутки в течение 2-4 нед. Перед употреблением взбалтывают.

Предост.: Прием настоя необходимо согласовать с врачом.

Произв.: Красногорсклексредства (Россия)

Сбор урологический (мочегонный) (*Species urologicae (diureticae)*)

Сост. и ф.в.: Измельченная смесь содержит листьев толокнянки 40%, цветков ноготков 20%, плодов укропа огородного 20%, корневищ и корней элеутерококка 10% и листьев мяты перечной 10%. Растительное сырье для приготовления отваров; в пачках по 50 г или фильтр-пакетах по 2 г - в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое, антимикробное, общеукрепляющее.

Показ.: Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит, уретрит, обострение хронического простатита.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, нагревают на водяной бане 30 мин, настаивают при комнатной температуре 15 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают, полученный отвар доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в сутки в течение 2-4 нед. Перед употреблением взбалтывают.

Предост.: При мочекаменной болезни прием отвара необходимо согласовать с врачом-урологом.

Произв.: Красногорсклексредства (Россия)

Сбор успокоительный N 3 (*Species sedativae* N 3)

Сост. и ф.в.: Измельченная смесь следующего состава: корневищ с корнями

валерианы 17%, травы донника 8%, травы чабреца 25%, травы душицы 25% и травы пустырника - 25%. Растительное сырье для приготовления настоев; в пачках по 50 г или в фильтр-пакетах по 2 г - в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Седативное, спазмолитическое, гипотензивное.

Показ.: Нарушения сна, повышенная нервная возбудимость, неврастении, мигрень, неврозы сердечно-сосудистой системы, климактерические расстройства, гипертоническая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, склонность к аллергическим реакциям.

Примен. и доз.: 1 столовую ложку сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, настаивают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают, полученный настой доводят кипяченой водой до объема 200 мл. Принимают по 1/3 стакана 4 раза в сутки за 30 мин до еды. Продолжительность лечения - 10-14 дней, перерыв между курсами лечения - 10 дней. Приготовленный настой перед употреблением взбалтывают.

Произв.: Красногорсклексредства (Россия)

Сбора Бруснивер-Т брикет круглый (*Briketum speciei* *Brusniverum-T rotundum*)

Сост. и ф.в.: 1 круглый брикет по 8 г содержит измельченную смесь следующего состава: травы череды 10%, плодов шиповника 40%, травы зверобоя 20% и листьев толокнянки 30%; в упаковке 6 шт. Растительное сырье для приготовления настоев и отваров.

Фарм. действ.: Диуретическое, антимикробное, противовоспалительное.

Показ.: Заболевания мочеполовых органов (мочекаменная болезнь, циститы, уретриты, пиелиты, хронические воспаления почек и мочевыводящих путей, ночное недержание мочи).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Отвар: один брикет заливают 500 мл кипятка, настаивают 1 ч, кипятят на слабом огне 15 мин и настаивают еще 45 мин. Настой: 1 брикет заливают в термосе 500 мл кипящей воды, настаивают не менее 2 ч. Настой и отвар принимают внутрь по 1/4-1/3

стакана 3-4 раза в сутки (взбалтывая перед употреблением) в течение 2-3 нед. Местно применяют разбавленным в 2 раза в виде орошений, спринцеваний, ванночек, примочек или микроклизм по 20-30 мл.

Произв.: Красногорсклексредства (Россия)

Седакорон (Sedacoron®)

Амиодарон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амиодарона гидрохлорида 200 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 3 мл концентрата для инфузий - 150 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, антиангинальное, блокада альфа- и бета-адренорецепторов.

Показ.: Суправентрикулярная и желудочковая пароксизмальная тахикардия, мерцание и трепетание предсердий; пароксизмальная тахикардия и мерцательная аритмия (профилактика), суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, аритмии при WPW-синдроме; аритмии на фоне стенокардии; нестабильная стенокардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к йоду), синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, синоатриальная блокада, АВ-блокада, гипотиреоз, коллапс, шок, лактация.

Поб. действ.: Брадикардия, замедление АВ-проводимости, нарушения функции щитовидной железы, отложения на роговице, фотосенсибилизация, аллергические реакции (сыпь).

Примен. и доз.: Дозу устанавливают индивидуально. Внутрь, обычно в начальной дозе по 1 таблетке 3-4 раза в день (8-14 дней) до достижения терапевтического эффекта с последующим снижением дозы до 1 таблетки 1-2 раза в день, затем до минимальной поддерживающей - по 1/2 таблетки ежедневно или 1 таблетке через день (в течение длительного периода). В/в - инфузионно по 5 мг/кг массы тела в течение 10-20 мин в 40 мл 5% раствора глюкозы или по 0,6-1,2 г в сутки (максимальная суточная доза 1,5 г) в 500-1000 мл 5% раствора глюкозы (или 150 мг в 250 мл 0,9% физиологического раствора). Детям - в начальной дозе 8-10 мг/кг массы тела.

Предост.: В/в введение следует проводить только в стационаре (под контролем ЧСС, АД, ЭКГ); во время лечения необходимы периодические осмотры окулиста, эндокринолога (в связи с воз-

можным нарушением функции щитовидной железы).

Произв.: Ebewe (Австрия)

Седокард-ретард (Cedocard-retard®)

Изосорбида динитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка замедленного высвобождения содержит изосорбида динитрата 20 или 40 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, повышенное внутричерепное давление, шок, коллапс, гипотензия, анемия.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, сердцебиение, ортостатическая гипотензия, гиперемия, редко, аллергические реакции.

Взаим.: Вазодилатирующий эффект усиливается алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, по 20 мг 1-2 раза в день с интервалами между приемами, не превышающими 6 ч. Максимальная доза - до 80 мг/сутки.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Седуксен (Seduxen)

Диазепам*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора содержит диазепам 10 мг; в упаковке 5 шт.

1 таблетка - 5 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, седативное, миорелаксирующее, противосудорожное, спазмолитическое.

Показ.: Неврозы (особенно в сочетании с тревожным синдромом), нервное напряжение, тревога и беспокойство при психосоматических заболеваниях, эндогенные психозы, эпилепсия (большие и малые судорожные припадки, психомоторное возбуждение, множественные эпилептические припадки), спазмы, ригидность мышц, контрактуры, эклампсия, столбняк и другие судорожные состояния, психические болезни, сопровождающиеся двигательным беспокойством, возбуждением, резкой тревогой; премедикация, угрожающие преждевременные роды и спастические состояния с риском аборта (только после первого триместра беременности); симптомы невропатии в педиатрической практике (тревога, головная боль, нарушение сна, энурез, реакция упрямства, тик, плохие привычки и т.д.), болезнь Литля, забо-

левания, сопровождающиеся повышенным мышечным тонусом, спастичностью и гиперкинезией.

Противопоказ.: Тяжелая миастения, острый приступ глаукомы, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Утомляемость, сонливость, зависимость, синдром отмены, снижение скорости реакции.

Взаим.: Усиливает эффекты препаратов, угнетающих ЦНС, трициклических антидепрессантов, миорелаксантов, алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь. Средняя суточная доза - 5-15 мг, пожилым и ослабленным больным - 2,5-7,5 мг; у детей в возрасте 6 мес-2 года - 1,25-5 мг, 2-6 лет - 2,5-7,5 мг, 7-14 лет - 5-15 мг. Парентерально: при эпилептическом статусе - в/в 10-30 мг (детям - 2-10 мг), повторно через 1/2-1 ч, затем через 4 ч. При психомоторном возбуждении, тревоге взрослым - 10-20 мг в/м или в/в однократно, затем по 10 мг 3-4 раза в день. При невротических состояниях - 10 мг в/м. При алкогольном делирии - по 10 мг 3-4 раза в день в/м. Для премедикации - 10 мг в/м за 30 мин до хирургического вмешательства. При спазме, мышечной ригидности - 10 мг 1-2 раза в день в/м.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Сектраль (Sectral®)

Ацебутолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ацебутолола гидрохлорида 200 или 400 мг; в упаковке 20 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Бета-адреноблокирующее селективное с собственной симпатомиметической активностью, гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, мембраностабилизирующее, гипотензивное, снижение активности ренина плазмы крови.

Фармакокин.: При приеме внутрь абсорбция - 97%; C_{max} в плазме - через 2-3 ч. Метаболизируется до фармакологически активного диацетолола. C_{max} метаболита в плазме крови - через 4 ч. Связь с белками плазмы у сектраля - 9-11%, у диацетолола - 6-9%. Период полураспределения сектраля - 4-6 ч, $T_{1/2}$ около 13 ч; период полураспределения диацетолола - примерно 6 ч, $T_{1/2}$ - 16 ч. 47% препарата выводится с мочой в неизменном виде и в виде диацетолола, остальное - через ЖКТ. При почечной недостаточности $T_{1/2}$ сектраля не меняется, диацетолола - удлиняется.

Показ.: Артериальная гипертония, стенокардия (профилактика приступов), наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, мерцание и трепетание предсердий.

Противопоказ.: АВ-блокада высокой степени, брадикардия (менее 50 ударов/мин), тяжелая сердечная недостаточность, бронхиальная астма.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется, поскольку проникает через плацентарный барьер и в молоко кормящих матерей.

Поб. действ.: Астения, диспептические расстройства, парестезии конечностей, синдром Рейно, сердечная недостаточность, АВ-блокада, брадикардия, гипотония, гипогликемия, бронхоспазм, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Средняя суточная доза - 400 мг (в один или два приема), максимальная - 800 мг. Дозу следует снижать постепенно в течение не менее 2 нед, так как внезапное прекращение лечения может вызвать тяжелую аритмию, инфаркт миокарда.

Предост.: Необходим строгий врачебный контроль при лечении больных с почечной недостаточностью, с признаками болезни Рейно, с АВ-блокадой, с компенсированной сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией, при феохромоцитоме. Пожилым больным следует назначать наименьшие эффективные дозы. Не рекомендуется сочетать с амиодароном, дилтиаземом, верапамилом, хинидином, галогенсодержащими средствами для наркоза, инсулином и производными сульфаниламочевина, а также препаратами, содержащими гидроокись алюминия. Осторожность необходима при комбинировании с НПВС и нейролептиками.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Селегилин-CTS (Selegiline-CTS®)

Селегилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит селегилина гидрохлорида 5 мг; в упаковке 50 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Антипаркинсоническое, ингибирование MAO типа B с накоплением дофамина и тираминоподобных веществ.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При назначении препарата беременным и кормящим матерям следует сопоставить риск и терапевтическую пользу.

Поб. действ.: Понижение артериального давления, тошнота, спутанность сознания, психоз.

Взаим.: Усиливает и удлиняет эффект леводопы.

Передоз.: Симптомы: возбуждение и непроизвольные движения, исчезающие при снижении дозы.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 1 таблетки утром (вместе с завтраком); если нет результата - дозу увеличивают до 2 таблеток в день.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, расстройствами ЖКТ, нарушениями функции почек, глаукомой.

Произв.: CTS (Израиль)

Селлсепт (Cellcept)

Мофетила микофенолат

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит мофетила микофенолата 250 мг.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 500 мг.

Фарм. действ.: Иммунодепрессивное, цитостатическое, селективная неконкурентная обратимая блокада инозинмонофосфатдегидрогеназы.

Фармакокин.: Быстро и полностью всасывается с образованием активного метаболита. Биодоступность - 94% (от такой при в/в введении). Прием пищи не влияет на степень всасывания, однако Стах при приеме препарата во время еды снижается на 40%. После приема препарата через 6-12 ч наблюдается вторичное повышение его концентрации в плазме за счет энтерогепатической циркуляции; на 97% связывается с альбумином плазмы. Метаболизируется под действием глюкуронилтрансферазы с образованием неактивного фенольного глюкуронида. После перорального приема 93% дозы выделяется с мочой, а 6% - с калом, большая часть (около 87%) выводится с мочой в виде фенольного глюкуронида.

Фармакодин.: Подавляет синтез гуанозинового нуклеотидов, не встраиваясь в ДНК. Оказывает более выраженное действие на лимфоциты по сравнению с др. клетками.

Показ.: Профилактика и лечение рефрактерного к терапии отторжения органов у пациентов после аллогенной пере-

садки почки (в комбинации с циклоспорином и кортикостероидами).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к микофенольной кислоте), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Назначается, когда потенциальная польза превышает возможный риск для плода. Выбор между кормлением грудью или приемом препарата делают с учетом важности лечения для матери.

Поб. действ.: Диарея, рвота, сепсис, лейкопения, повышение частоты инфекций; редко - головные боли, бессонница, тремор, повышение температуры, боли в груди и пояснице; астения; анемия, лейкоцитоз, тромбоцитопения; инфекции мочевыводящих путей, некроз почечных канальцев, гематурия; артериальная гипертензия; инфекции дыхательных путей (пневмония, бронхит, фарингит), одышка, кашель; кандидоз слизистой полости рта, акне, сыпь, герпетические инфекции; тошнота, диспепсия; периферические отеки, гипер- и гипокалиемия, гипергликемия, гипофосфатемия, гиперхолестеринемия.

Взаим.: При назначении с ацикловиром повышаются плазменные концентрации обоих препаратов. Уменьшают всасывание антациды, содержащие гидроокись магния и алюминия. Холестерамин снижает эффективность лечения. Одновременное назначение с препаратом, выделяющимся путем канальцевой секреции (пробенецид), приводит к увеличению плазменной концентрации обоих средств.

Передоз.: При передозировке не применим гемодиализ (можно использовать желчные кислоты, например, холестирамин).

Примен. и доз.: Внутрь, для профилактики отторжения почечных трансплантатов - по 1 г 2 раза в сутки (суточная доза - 2 г), первая доза должна быть принята в пределах 72 ч после трансплантации; лечение рефрактерного отторжения - в суточной дозе 3 г; у больных со скоростью клубочковой фильтрации менее 25 мл/мин/1,73 кв.м - не более 2 г в сутки.

Предост.: Во время лечения необходимо определять развернутую формулу крови еженедельно (в течение первого месяца), 2 раза в месяц (на 2 и 3 мес лечения), затем ежемесячно в течение 1 года. Лечение прерывают при количестве нейтрофилов менее 1300 в 1 мкл. С осторожностью используют при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения. Не рекомендуется назначение совместно с азатиоприном. До, во время и в течение 6 нед

после лечения обязательно использование эффективных мер контрацепции.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Семакс (Semax)

Сост. и ф.в.: 1 капля раствора для интраназального применения содержит синтетического аналога адренокортикотропного гормона (АКТГ 4-10) 50 мкг; во флаконах по 3 мл с пробкой-пипеткой. Консервирующее средство: нипагин (0,1%).

Фарм. действ.: Ноотропное, адаптогенное.

Фармакокин.: Всасывается со слизистой оболочки носовой полости (до 60-70% в пересчете на активное вещество).

Фармакодин.: Является синтетическим пептидным аналогом АКТГ (4-10). Полностью лишен гормональной (адренокортикотропной) активности, усиливает избирательное внимание при обучении и анализе информации, улучшает запоминание, повышает устойчивость организма к гипоксии, церебральной ишемии, наркозу.

Клин. фарм.: В условиях нервно-психического утомления облегчает концентрацию внимания, улучшает операторскую деятельность, способствует сохранению и ускоряет восстановление умственной работоспособности. Также рекомендуется потенциально здоровым лицам (операторам, водителям, спортсменам и др.) при напряженной работе, требующей постоянного повышенного внимания. Эффект после однократного интраназального введения начинается в течение первого часа и сохраняется 1-2 суток.

Показ.: Интеллектуально-мнестические расстройства при сосудистых поражениях мозга, состояниях после черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций; профилактика и лечение постнаркозных и астеноневротических расстройств различного генеза, в т.ч. после ионизирующего излучения; для повышения адаптации в экстремальных ситуациях; профилактика психического утомления при монотонной операторской деятельности в напряженные периоды работы и в аварийных ситуациях.

Противопоказ.: Острые психотические состояния; расстройства, сопровождающиеся тревогой; заболевания эндокринной системы.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Не исследовано.

Примен. и доз.: Интраназально, по 2-3 капли (не более) в каждый носовой ход, 2-3 раза в день с интервалами 4-5 ч, ежедневно в течение 3-5 дней (до 14 дней); при необходимости увеличения дозы введение осуществляют в несколько приемов с интервалами 10-15 мин. Разовая доза 200-2000 мкг (3-30 мкг/кг), суточная - 500-5000 мкг (7-70 мкг/кг).

Произв.: Институт молекулярной генетики (Россия)

Семпрекс® (Semprex®)

Активастин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит акривастина 8 мг.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное.

Показ.: Аллергический ринит, аллергические дерматозы, атопическая экзема.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к трипролидину), выраженная почечная недостаточность, детский возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Сонливость (редко), снижение скорости реакции.

Взаим.: Снижение скорости реакции усиливается при одновременном приеме алкоголя или средств, угнетающих ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам, деятельность которых требует быстрой реакции (водителям транспортных средств, работающим с механизмами).

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Сенна (Senna)

Сеннозиды А и Б

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит стандартизированную сенну в количестве эквивалентном 7,5 мг сеннозидов (в пересчете на сеннозид В); в упаковке 30, 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Слабительное.

Показ.: Запоры различного генеза (идиопатические, у пожилых, беременных, рожениц, при симптомах раздражения кишечника, обусловленных длительным сдерживанием акта дефекации и др.), геморрой, заболевания ЦНС и сердечно-сосудистой системы, послеоперационный период и др. (для избежания натуживания).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые и хронические заболевания ЖКТ с абдоминальными симптомами.

Поб. действ.: Спутанность сознания, слабость, аритмия, судороги, окрашивание мочи (имеющей кислую реакцию) в красно-коричневый и коричневый цвет.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, на ночь. Взрослым - по 2-4 таблетки, детям старше 6 лет - по 1-2 таблетки; курс - не более 1 нед (если нет специальной рекомендации врача).

Предост.: Во время лечения рекомендуется принимать не менее 6-8 стаканов жидкости в день (для формирования более мягкого стула). Следует отменить препарат при появлении признаков аппендицита или др. воспалительных процессов в кишечнике, сыпи, в случае отсутствия стула в течение 1-2 дней. С осторожностью назначают при беременности.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Сенорм (Senorm)

Галоперидол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит галоперидола 0,25, 1,5; 5; 10 или 20 мг; в упаковке 10 шт.

1 мл раствора для инъекций (Сенорм-5 Ин.) содержит галоперидола 5 мг, в ампулах по 1 мл; в упаковке 5 шт.

1 мл раствора для инъекций (Сенорм-50 Ин.) содержит галоперидола деканоата 50 мг, во флаконах по 3 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, противорвотное.

Показ.: Шизофрения, психозы, алкогольный делирий, маниакально-депрессивные состояния, гипомании, синдром Жилля де ля Туретта, расстройства поведения у детей (агрессия, взрывчатая возбудимость, гиперактивность); неукротимая рвота.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угнетение функций ЦНС, кома, депрессия, истерия, паркинсонизм; в/м введение - детский возраст (до 3 лет).

Бер. и корм. гр.: Применяют только в случае, если ожидаемый эффект превосходит возможный риск для плода. Во время лечения грудное вскармливание должно быть прекращено.

Поб. действ.: Экстрапирамидные расстройства, депрессия, головная боль, сонливость, тахикардия, гипотензия, анорексия, запор, диарея, тошнота, рвота, печеночная недостаточность, ане-

мия, агранулоцитоз, гинекомастия, угнетение дыхания (в/м введение).

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,5-5 мг 2-3 раза в день, постепенно увеличивая дозу. Максимальная суточная доза - 200 мг, поддерживающая - 5-10 мг. Детям до 5 лет - 0,5-1 мг/сутки, 6-15 лет - 1-2 мг. При острых психотических расстройствах - в/м по 2-5 мг каждые 4-8 ч; детям 3-12 лет - в дозе 0,075-0,15 мг/кг/сутки. Сенорм 50 Ин. - в/м (глубоко), в дозе 0,5 мл каждые 15-30 дней (для длительной поддерживающей терапии психозов); при необходимости дозу можно увеличивать до 2-3 мл.

Предост.: С осторожностью назначают больным с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, судорожным синдромом, а также принимающим другие противосудорожные препараты.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Сенсигель (Sensigel®)

Сост. и ф.в.: 100 г геля для зубов содержат никометанола фторгидрата (флуоринола) 0,85 г и калия нитрата 5 г; в тубах по 50 мл.

Фарм. действ.: Образование защитного слоя на зубной эмали (фтор), снижение восприятия внешних раздражений нервными окончаниями дентина (калий).

Показ.: Зубная боль при контакте с горячей, холодной, сладкой или кислой пищей, при чистке зубов.

Примен. и доз.: Наносят мягкой зубной щеткой или пальцем на болезненные участки после чистки зубов.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Септолете (Septolete®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит хлорида бензалкония 1 мг, ментола 1,2 мг, эфирного масла мяты перечной 1 мг, эфирного масла эвкалипта 0,6 мг и тимолола 0,6 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое, дезинфицирующее, освежающее.

Фармакодин.: Имеет приятный освежающий вкус. Предотвращает распространение инфекции: хлорид бензалкония уничтожает многие бактерии и некоторые типы дрожжей, ментол и масло мяты перечной облегчают боль и чувство дискомфорта (жжение, боль при глотании), тимол обладает дезинфицирующим действием, масло эвкалипта уменьшает секрецию слизистой оболочки верхнего отдела дыхательных путей и облегчает дыхание.

Показ.: Инфекции полости рта и горла (умеренной тяжести); профилактика гриппозных и простудных заболеваний; воспаление десневого края и слизистой оболочки полости рта, охриплость голоса, устранение неприятного запаха.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 4 лет).

Бер. и корм. гр.: Можно применять по рекомендации врача.

Поб. действ.: Тошнота, рвота (при передозировке).

Примен. и доз.: Внутрь (предварительно рассосав), по 1 драже каждые 2-3 ч, в сутки - 6-8 драже. Детям старше 4 лет - 4 драже в день, старше 10 лет - 6 драже в день.

Произв.: KRKA (Словения)

Септрин® (Septrin®)

Ко-тримоксазол

Септрин®-форте (Septrin®-forte)

Ко-тримоксазол

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфаметоксазола 400 мг и триметоприма 80 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка форте - 800 и 160 мг.

1 таблетка для детей - 100 и 20 мг.

5 мл суспензии для детей - 200 и 40 мг.

1 ампула с 5 мл раствора для в/в инъекций - 400 и 80 мг соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Бактериальные инфекции нижних дыхательных путей, мочеполовой системы, синусит, воспаление среднего уха, кожные инфекции, септицемия, тиф, паратиф.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим сульфаниламидам), возраст (недоношенные и доношенные младенцы в неонатальном периоде).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, глоссит, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла, гематологические изменения, гемолиз (у больных с недостаточностью глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы), желтуха, печеночный некроз, асептический менингит.

Примен. и доз.: Внутрь, таблетки и суспензия принимаются каждые 12 ч. Взрослые и дети старше 12 лет - 1 таблетка форте или 2 таблетки для взрослых. Дети 6-12 лет - 10 мл суспензии для детей или 1 таблетка для взрослых, 6 мес-5 лет - 5 мл суспензии для детей, 6 нед-5 мес - 2,5 мл суспензии для детей. Курс не менее 5 дней. При острых ин-

фекциях лечение продолжается еще 2 дня после исчезновения симптомов.

Предост.: Длительное лечение рекомендуется проводить под контролем крови. С осторожностью назначают в пожилом возрасте при гематологических расстройствах, нарушении функции почек, подозрении на недостаточность фолата, в сочетании с тиазидами, пуриметамином, варфарином, препаратами сульфонилмочевины, фенитоином, циклоспорином. Больным с почечной недостаточностью необходимо снижать дозу. При острых инфекциях лечение следует продолжать до тех пор, пока у больных в течение 20 дней не будет наблюдаться симптомов (обычно требуется не менее 5 дней).

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Серевент® (Serevent®)

Салметерол*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит сальметерола 25 мкг; в ингаляторе 60 и 120 доз.

1 доза порошка для ингаляций - 50 мкг; в ротадиске по 4 дозы.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, стимуляция бета₂-адренорецепторов.

Фармакодин.: Ингибирует освобождение из клеток гистамина, лейкотриенов и простагландина D₂; уменьшает гиперреактивный ответ бронхов на аллергены.

Клин. фарм.: Эффект (расширение бронхов) развивается через 5-10 мин с момента ингаляции и продолжается до 12 ч. Используется как дополнение к профилактическим средствам типа ингаляционных кортикостероидов. Снижает потребность в других бронхолитиках.

Показ.: Бронхиальная астма, (в т.ч. у пациентов с ночными приступами или вызываемыми физической нагрузкой), хронические бронхиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, использование бета-блокаторов неизбирательного действия (типа пропранолола).

Бер. и корм. гр.: Возможно, если ожидаемая польза для матери больше потенциальной опасности для плода.

Поб. действ.: Гипокалиемия, головная боль, ощущение сердцебиения, тремор, парадоксальный бронхоспазм.

Взаим.: Несовместим с бета-блокаторами (в т.ч. с кардиоселективными). Производные ксантина, стероиды, диуретики, недостаток кислорода могут усилить гипокалиемию.

Передоз.: Симптомы: тремор, головная боль, тахикардия. Лечение: селективные бета-блокаторы (следует применять с осторожностью у больных, в анамнезе которых имеется указание на бронхоспазм).

Примен. и доз.: Ингаляционно. Взрослые - по 50 мкг (содержимое одного блистера или 2 ингаляции) 2 раза в сутки, при необходимости используют до 100 мкг (содержимое 2-х блистеров или 4 ингаляции) 2 раза в сутки.

Предост.: С осторожностью используют у пациентов с тиреотоксикозом. Прокалывать блистер следует только непосредственно перед употреблением. Терапевтический эффект может снижаться, если ингалятор холодный.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Серокриптин (Serocriptine®)

Бромокриптин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бромокриптина мезилата 2,87 мг, что эквивалентно 2,5 мг бромокриптина; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Ингибция секреции пролактина, допаминэргическое, снижение уровня гормона роста в крови при повышенной концентрации его и/или пролактина.

Показ.: Галакторея в сочетании с аменореей или без нее: послеродовая (синдром Къяри-Фроммеля), идиопатическая (синдром Аргонса-дель Кастильо), опухолевая (синдром Форбса-Олбрайта), индуцированная лекарственными средствами (психотропными, противозачаточными средствами), пролактин-зависимая аменорея без галактореи, клинические состояния, связанные с менструальными расстройствами (предменструальный синдром, укороченная лютеиновая фаза), пролактин-зависимый гипогонадизм у мужчин, акромегалия.

Противопоказ.: Беременность.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, рвота, головокружение, психомоторное возбуждение, помутнение сознания, судороги в нижних конечностях, дискинезии, спазм сосудов, снижение АД, кровотечение в ЖКТ (при лечении акромегалии).

Взаим.: Следует с осторожностью назначать в сочетании с гипотензивными и психоактивными средствами.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды. При галакторее и/или пролактин-зави-

симой аменорее: по 1/2 таблетки 3 раза в день, при необходимости доза может быть постепенно увеличена до 1 таблетки 2-3 раза в день, лечение продолжают до полного прекращения лактации или до возобновления нормальных менструальных циклов при аменорее. Для подавления лактации: 1 таблетку 2 раза в день, во время завтрака и ужина, на протяжении 14 дней. Предменструальный синдром: 1/2-2 таблетки (начиная с 14 дня цикла с 1/2 таблетки, постепенно повышая дозу) ежедневно до появления менструаций. При укороченной лютеиновой фазе: по 1/2 таблетки 3 раза в день до восстановления нормальной лютеиновой фазы. При мужском гипогонадизме: по 1/2-1 таблетке 3 раза в сутки ежедневно на протяжении 2-3 мес. При акромегалии терапию начинают с ежедневного приема 1 таблетки, постепенно увеличивая дозу до 4-8 таблеток в сутки на протяжении 1-2 нед. Суточную дозу разделяют на 4 равные части.

Произв.: Serono (Швейцария)

Серофен (Serofene®)

Кломифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кломифена цитрата 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антиэстрогенное, блокада эстрогенных рецепторов, усиление секреции гонадотропинов, стимуляция созревания и эндокринной активности фолликулов в яичниках, овуляции и развития функционирующего желтого тела (в малых дозах), торможение секреции гонадотропина (в высоких дозах).

Показ.: Бесплодие, функциональные маточные кровотечения, вторичная аменорея, выраженная олигоменорея, синдром поликистозных яичников (типа Штейна-Левенталя) при сохраненной функции яичников.

Противопоказ.: Нарушения функции печени, имеющиеся или имевшиеся ранее нарушения зрения, кисты яичников, беременность.

Поб. действ.: Приступы жара, потливость, повышенная возбудимость, утомляемость, головокружение, бессонница, головная боль, увеличение размеров яичников и кист яичников, боли в области придатков матки, обильные менструации, чувство тяжести в эпигастральной области, метеоризм, тошнота, рвота, нарушение остроты зрения, увеличение массы тела, тяжесть в груди, полиурия, поллакиурия, невыраженное обратимое облысение, аллергические реакции: крапивница или аллергический дерматит.

Примен. и доз.: Внутрь. Лечение следует начинать на 5 день цикла; при отсутствии менструации терапия может быть начата в любое время. Пробный курс - однократный прием 1 таблетки (50 мг) в сутки между приемами пищи в течение 5 дней. Если овуляция не наступает через 30 дней, проводится второй курс терапии (1 таблетка 2 раза в сутки между приемами пищи ежедневно в течение 5 дней). Возможный третий курс лечения проводится по той же схеме. Лечение дозами более 100 мг в сутки не следует продолжать свыше 5 дней.

Произв.: Seroно (Швейцария)

Серпенс (Serpens®)

Сост. и ф.в.: 1 мягкая капсула содержит очищенного экстракта пальмы ползучей (*Serenoa repens*) 160 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, противоотечное, ингибция 5-альфа редуктазы (с прекращением синтеза дигидротестостерона), блокада дигидротестостероновых рецепторов простаты.

Показ.: Гипертрофия и аденома простаты, простатиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Тошнота.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1 капсуле 2 раза в день на протяжении 30 дней (не менее).

Произв.: Lisapharma (Италия)

Сибазон (Sibazonum)

Диазепам*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит диазепам 5 мг; в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Транквилизирующее.

Показ.: Неврозоподобные и психопатоподобные расстройства с напряжением, тревогой; страх, психомоторное возбуждение, судорожный синдром; алкогольная абстиненция и психозы; эпилепсия.

Противопоказ.: Тяжелая печеночно-почечная недостаточность, миастения, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Сонливость, слабость, головные боли, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в и в/м. Средняя разовая доза - 0,01 г (2 мл 0,5% раствора), средняя суточная - 0,03 г. Максимальная разовая доза - 0,03 г, суточная - 0,07 г.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Сибазон (Sibazonum)

Диазепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сибазона 0,005 г, в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Транквилизирующее, противосудорожное, миорелаксирующее.

Показ.: Неврозы, психопатии, неврозоподобные и психоподобные состояния при шизофрении, органические поражения головного мозга, эпилепсия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночно-почечная недостаточность, миастения, закрытоугольная глаукома, беременность.

Бер. и корм. гр.: Только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Головокружение, сонливость, замедление реакции, снижение психической и двигательной активности, мышечная слабость, атаксия, сухость во рту, диспепсия, тошнота, диарея, диспноэ, бронхоспазм.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - в дозе 4-15 мг за 2 приема (максимальная доза - 60 мг в сутки); детям - 0,1-0,3 мг/кг массы тела в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Сибикорт (Sibicort®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит гидрокортизона 10 мг и хлоргексидина глюконата 10 мг; в тубах по 20, 50 и 100 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, антибактериальное.

Показ.: Острая и хроническая экзема, дерматит с сопутствующими бактериальными инфекциями.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, вирусные инфекции, кожные проявления туберкулеза и сифилиса.

Поб. действ.: Фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно, наносят тонким слоем на воспаленные участки кожи 1-3 раза в день.

Произв.: Ogiop (Финляндия)

Сиднокарб (Sydnocarbum)

Мезокарб*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мезокарба 0,005 или 0,01 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Психостимулирующее.

Показ.: Астения в результате интоксикаций, инфекций и травм головного мозга, физического и психического переутомления, неврозы с заторможеннос-

тью, вялотекущая шизофрения, апато-булические расстройства.

Противопоказ.: Повышенная возбудимость, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия.

Поб. действ.: Головная боль, бессонница, раздражительность, беспокойство, анорексия, артериальная гипертензия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 5 мг 2 раза в день; при необходимости - до 50 мг в сутки. Высшая разовая доза - 75 мг, суточная - 150 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

СиѝНУ (CeeNU®)

Ломустин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит ломустина 10, 40 или 100 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Новообразования ЦНС; первичные и метастатические опухоли мозга; опухоли глотки, гортани, легких; лимфогранулематоз, злокачественная лимфома, миелома; рак желудка, рак толстой кишки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миелосупрессия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, анорексия, стоматит, алоpecia, нарушение функции печени, расстройства менструальной функции.

Взаим.: Совместим с другими цитостатиками.

Примен. и доз.: Внутрь, по 100-130 мг/кв.м поверхности тела 1 раз (однократно) в 6 нед или по 75 мг на кв.м поверхности каждые 3 нед; в комбинации (с другими цитостатиками) - по 70-100 мг на кв.м поверхности каждые 6 нед.

Предост.: Во время лечения необходим постоянный контроль клеточного состава крови. Учитывая возможность позднего проявления тромбоцитопении и иных признаков нарушения кроветворения, другие цитостатики следует назначать не ранее 3-6 нед с начала лечения.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Силегон® (Silegon®)

Силибинин*

Сост. и ф.в.: В 1 драже 70 мг силимарина, полученного из 100 мг экстракта *mariae fructus* и содержащего не менее 30 мг силибинина; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное.

Фармакодин.: Обладает мембрано-стабилизирующим эффектом, обеспечивает защиту печени от отрицательных факторов, усиливает регенеративную способность поврежденных печеночных клеток.

Показ.: Токсические поражения печени, цирроз печени, гепатит (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Диарея (редко).

Примен. и доз.: Внутрь, лечение - по 2 драже 3 раза в день; профилактика и лечение легких случаев - по 1 драже 3 раза в день. Принимать можно в течение нескольких месяцев.

Произв.: Biogal (Венгрия)

Силест® (Cilest®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит норгестимата 0,250 мг и этинилэстрадиола 0,035 мг; в упаковке 21 и 63 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенно-прогестагенное, контрацептивное.

Показ.: Контрацепция.

Противопоказ.: Опухоли молочных желез и органов репродуктивной системы, ациклические кровянистые выделения из половых путей неустановленного генеза, тромбофлебит, тромбоэмболии, заболевания печени, серповидно-клеточная анемия, заболевания сосудов головного мозга, коронаросклероз; гестационный герпес в анамнезе, беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, нагрубание молочных желез, головная боль, депрессия, пигментные пятна на лице, кожные аллергические реакции, выпадение волос, зуд, холестатическая желтуха, вагинальный кандидоз, эрозия шейки матки, дискомфорт при ношении контактных линз, изменение массы тела, снижение либидо.

Взаим.: Антибиотики, барбитураты, противоэпилептические средства, гризеофульвин, фенилбутазон снижают эффект.

Примен. и доз.: Внутрь, в одно и тоже время суток (по возможности), по 1 таблетке в день, начиная прием с первого дня менструального цикла, в течение 21 дня с последующим 7-дневным перерывом. После перерыва прием возобновляют.

Предост.: С осторожностью назначается при заболеваниях сердца, печени, артериальной гипертензии, сахарном диабете, бронхиальной астме, заболеваниях желчного пузыря, варикозном расширении вен, фиброме матки, депрессии, эпи-

лепсии. Не рекомендуется принимать женщинам старше 40 лет (курящим - старше 35). При пропуске приема таблетки свыше 24 ч необходимо как можно быстрее принять следующую таблетку и до конца цикла применять дополнительные методы контрацепции. Следует иметь в виду, что эффективность снижается при упорной рвоте, диарее. Препарат следует отменять при длительной иммобилизации, за 3 мес до планового хирургического вмешательства, а также в ранний послеоперационный период.

Произв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Силибин (Silybin)

Силибинин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит силибинина 35 или 70 мг.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, антитоксическое, стабилизация мембран гепатоцитов.

Показ.: Токсические повреждения печени, хронический гепатит, цирроз печени (комплексная терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, механическая обструкция желчных путей.

Бер. и корм. гр.: Возможно лишь в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Поб. действ.: Диарея (как правило, при передозировке).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 капсуле (35 мг) 2-4 раза в день или по 1 капсуле (70 мг) 1-2 раза в день. По мере улучшения состояния следует увеличивать интервалы между приемом в 2 раза. Поддерживающую терапию можно проводить длительное время.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Силимар (Silymarum)

Сост. и ф.в.: Таблетки по 0,1; г в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Торможение процессов цитолиза, снижение активности аминотрансфераз (АСТ, АЛТ), предупреждение холестаза (уменьшение активности гамма-глутаматтрансферазы и щелочной фосфатазы), нормализация желчевыделительной и обезвреживающей функций печени; антиоксидантное, противовоспалительное, спазмолитическое.

Показ.: Гепатиты, цирроз печени.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлено.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения - 25-30 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 1-3 мес.

Произв.: ВИЛАР НПО ПЭЗ (Россия)

Силубин ретард (Silubin® retard)

Буформин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит буформина гидрохлорида 100 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое, повышение утилизации глюкозы (в присутствии инсулина), торможение глюко-неогенеза, снижение всасывания глюкозы.

Фармакокин.: Быстро всасывается в кишечнике. Абсорбция - около 80%. Максимальная концентрация в плазме - через 2,5 ч. Выводится почками. $T_{1/2}$ - 3-4 ч.

Клин. фарм.: Начало действия через 2-4 ч, продолжительность действия около 8 ч.

Показ.: Акетонурический диабет при избыточном весе, сахарный инсулиннезависимый диабет II типа, некорректируемый диетой.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инсулинзависимый сахарный диабет, кетонурия, гипергликемическая кома, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (потеря аппетита, металлический вкус во рту, тошнота, рвота, диарея), слабость, похудание.

Взаим.: Гипогликемический эффект ослабляют производные фенотиазина (аминазин), кортикостероиды, тиреотропные гормоны, эстрогены, мочегонные, усиливают - ингибиторы МАО, противодиабетические сульфаниламиды, салицилаты.

Передоз.: Проявляется лактоацидозом.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, начиная с 50-100 мг/сутки с последующим повышением дозы (но не более 300 мг).

Произв.: Grünenthal (Германия)

Симесан (Cimesan)

Циметидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит циметидина 200, 400 или 800 мг; в упаковке 120, 60 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоязвенное, подавление продукции соляной кислоты, снижение активности пепсина, блокада H_2 -гистаминрецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. профилактика обострений), симптоматические язвы, эрозивный и рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, профилактика поражений верхних отделов ЖКТ, вызванных стрессом, профилактика рецидивов кровотечений из верхних отделов ЖКТ и кровотечений в послеоперационном периоде.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени и почек, беременность, лактация, возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, слабость, сонливость, запор, рвота, диарея, метеоризм, тошнота, миалгия, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, гинекомастия, галакторея, импотенция, транзитное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина, кожная сыпь.

Взаим.: Повышает в крови концентрацию препаратов, метаболизирующихся в печени (пропранолол, верапамил).

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой или во время еды - по 200 мг 3 раза в день и 400 мг перед сном, максимальная суточная доза - 2000 мг.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Симикол (Simicol®)

Симетикон

Сост. и ф.в.: Капли для перорального приема во флаконе 30 мл с градуированным шприцом, содержащие симетикона 40 мг/0,6 мл.

Фарм. действ.: Ветрогонное, пеногасящее (снижение поверхностного натяжения, предупреждение соединения газовых пузырей в ЖКТ).

Показ.: Задержка газов, рези в животе; колики и метеоризм у новорожденных.

Противопоказ.: Неизвестны.

Поб. действ.: Неизвестны.

Передоз.: Лечение симптоматическое.

Примен. и доз.: Внутрь (предварительно содержимое флакона взболтать) - по 0,3-0,6 мл перед каждым приемом пищи.

Произв.: CTS (Израиль)

Синафлана мазь (Unguentum Synaflani)

Флуоцинолона ацетонид*

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат синафлана 0,025 г; в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Воспалительные и аллергические заболевания кожи и слизистых оболочек (экзема, нейродермит, кожный зуд, псориаз).

Противопоказ.: Инфекционные заболевания кожи, язвенные поражения или раны на участках аппликаций, беременность.

Поб. действ.: Вторичные инфекционные кожные поражения, атрофия кожи.

Примен. и доз.: Накожно, наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день в течение 5-10 (до 25) дней. Можно применять под окклюзионные повязки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Синекод (Sinecod®)

Бутамират*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приема внутрь содержит бутамирата дигидроцитрата 5 (капли) или 0,8 (сироп) мг; капли во флаконах по 10 мл, сироп - 200 мл.

1 драже содержит бутамирата дигидроцитрата 20 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противокашлевое, бронхолитическое.

Показ.: Сильный кашель (коклюш, в пред- и послеоперационном периоде и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Тошнота, диарея, головокружение, экзантема.

Примен. и доз.: Парентерально, перед, во время и после оперативного вмешательства в/в - по 1-2 ампулы или в/м - до 5 ампул в сутки. Перед оперативным вмешательством - 1 драже форте. Капли, детям от 6 до 12 мес (8 кг) - по 10 капель 4 раза в день, детям 1-3 лет (10-15 кг) - по 15 капель 4 раза в день, детям старше 3 лет - по 25 капель 4 раза в день. Сироп, детям 1-3 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день, детям 3-6 лет (15-22 кг) - по 2 чайные ложки, детям 6-9 лет (22-30 кг) - по 1 столовой ложке 3 раза в день, старше 9 лет (40 кг) - по 1 столовой

ложке 4 раза в день, взрослым - по 2 столовые ложки 3 раза в день. Драже, детям 6-12 лет - по 1 драже 2 раза в день, детям старше 12 лет - по 1 драже 3 раза в день, взрослым - по 2 драже 2-3 раза в день каждые 8-12 ч.

Произв.: Немофарм (Югославия)

Синекод (Sinecod®)

Бутамират*

Сост. и ф.в.: 1 мл каплей для приема внутрь для детей содержит бутамирата дигидрогенцитрата 5 мг; во флаконах по 20 мл.

1 мл сиропа - 1,5 мг; во флаконах по 200 мл.

1 таблетка депо - 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противокашлевое.

Показ.: Кашель (в т.ч. в пред- и послеоперационных периодах при хирургических вмешательствах и бронхоскопии), коклюш.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст до 12 лет (депо-таблетки) и до 3 лет (сироп).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется в первом триместре беременности. При кормлении грудью применяют с осторожностью.

Поб. действ.: Головокружение, тошнота, диарея, сыпь.

Примен. и доз.: Депо таблетки проглатывают целиком, взрослым - по 1 таблетке 2-3 раза в день, детям старше 12 лет - по 1 таблетке 1-2 раза в день. Капли для детей: детям от 2 мес до 1 года - по 10 капель, от 1 до 3 лет - по 15 капель, старше 3 лет - по 25 капель 4 раза в сутки. Сироп: детям от 3 до 6 лет - по 5 мл 3 раза в день, от 6 до 12 лет - по 10 мл 3 раза в день, 12 лет и старше - по 15 мл 3 раза в сутки, взрослым - по 15 мл 4 раза в день, используя градуированную мерницу. Препарат желательно принимать перед едой.

Произв.: Novartis Consumer Health (Швейцария)

Синемет (Sinemet®)

Синемет СР (Sinemet SR®)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 делимая таблетка содержит карбидопы 25 или 50 мг и леводопы 250 или 200 мг соответственно; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, дофаминергическое, ингибция декарбоксилазы.

Показ.: Болезнь и синдром Паркинсона: ригидность, брадикинезия, тремор, дисфагия, сialорей, ортостатическая неустойчивость тела.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, недиагностированные кожные заболевания, меланома в анамнезе, закрытоугольная глаукома, беременность, лактация, возраст (до 18 лет).

Поб. действ.: Дискинезии (блефароспазм, подергивание мышц, хорееподобные, дистонические и др. непроизвольные движения), транзиторные психозы, депрессия, деменция, головокружение, сонливость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, кровотечение из ЖКТ, развитие язвы двенадцатиперстной кишки, сердцебиение, ортостатическая гипотония, боли за грудиной, одышка, анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, парестезии.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО. Сочетание с антигипертензивными средствами может потенцировать ортостатическую гипотонию. Фенотиазины, бутирофеноны могут снизить терапевтический эффект, фенотин и папаверин - нивелировать его. При высокобелковой диете может нарушаться абсорбция леводопы.

Примен. и доз.: Внутрь. Рекомендуется индивидуальный подбор дозы. Начальная доза - по 1/2 таблетки 1-2 раза в день; при необходимости добавляют по 1/2 таблетки каждый день или через день (до получения оптимального эффекта); максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Предост.: Осторожно назначают пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких (в т.ч. бронхиальной астмой), почек, печени и эндокринной системы, пептической язвой в анамнезе, судорогами, хронической открытоугольной глаукомой. Рекомендуется периодический контроль функций печени, кроветворной и сердечно-сосудистой систем, почек. Отменять следует постепенно.

Произв.: MSD (США)

Синепрес (Sinepres®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит дигидроэрготоксина метансульфоната 0,6 мг, резерпина 0,1 мг и гидрохлоротиазида 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, симпатолитическое, альфа-адреноблокирующее, седативное, диуретическое.

Показ.: Артериальная гипертония.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, язвенный колит, тяжелая печечно-почечная недостаточность, бронхоспастический синдром, депрессия, гипокалиемия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Анорексия, сухость во рту, тошнота, рвота, головокружение, сонливость, снижение скорости реакции. Редко - нарушения зрения, гипокалиемия, депрессия, аллергические кожные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже 1-2 раза в сутки (максимальная доза - 3 драже/сутки).

Произв.: Lek (Словения)

Синкумар (Syncumar)

Аценокумарол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аценокумарола 2 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное не прямое, антагонизм с витамином К.

Фармакодин.: Нарушает синтез протромбина и других витамин К-зависимых факторов свертывания крови (VII, IX, X).

Показ.: Тромбозы и эмболии (профилактика).

Противопоказ.: Гемофилия, почечная недостаточность, выраженные нарушения функции печени, гипертония, язва ЖКТ, гиповитаминоз К, аневризма сердца, состояние после нейрохирургических операций, беременность.

Поб. действ.: Кровотечение, редко - агранулоцитоз, временное выпадение волос, некроз кожи, кожная сыпь.

Взаим.: НПВС, сульфаниламиды, некоторые антибиотики, местные анестетики усиливают эффект, барбитураты, мочегонные, противозачаточные средства, препараты дигиталиса - ослабляют.

Примен. и доз.: Устанавливается индивидуально.

Предост.: Лечение проводится под постоянным контролем, необходимо тщательно следить за общим состоянием пациента и изменениями в свертывающей системе крови.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Синопдерм (Sinoderm)

Флуоцинолона ацетонид*

Сост. и ф.в.: 100 г мази, крема или геля содержат флуоцинолона ацетонида 0,025 г; в тубах по 15 г (мазь и крем) или по 30 г (гель).

Фарм. действ.: Местное противовоспалительное и сосудосуживающее, противозудное.

Показ.: Экзема, нейродермит, аллергические заболевания кожи, дискоидный эритематоз, красный плоский лишай, хронический псориаз (с диффузными бляшками), кожный зуд.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, туберкулезные, сифилитические, вирусные и грибковые поражения кожи.

Поб. действ.: Телеангиоэктазии, атрофия или растяжения кожи, гипертрихоз; при использовании на больших участках кожи или длительном применении возможны системные осложнения.

Примен. и доз.: Местно, слегка втирая в пораженные участки кожи, 2-3 раза в день. При сухих заболеваниях кожи рекомендуется мазь (при необходимости возможно применение повязки), при влажных изменениях на коже - крем, при поражениях на волосистых участках тела - гель.

Предост.: Не следует допускать попадания препарата в глаза. С осторожностью назначают детям грудного возраста, девушкам в период полового созревания, при беременности.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Синупрет (Sinupret®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит порошок Radix Gentianae (корень генцианы) 6 мг, Flores Primulae cum Calycibus (цветы первоцвета с чашечкой) 18 мг, Herba Rumicis (щавель) 18 мг, Flores Sambuci (бузина) 18 мг, Herba Verbenae (вербена) 18 мг; в упаковке 50 шт.

100 г раствора для приема внутрь содержат 29 г водно-спиртового экстракта из Radix Gentianae (корень генцианы) 0,2 г, Flores Primulae cum Calycibus (цветы первоцвета с чашечкой) 0,6 г, Herba Rumicis (щавель) 0,6 г, Flores Sambuci (бузина) 0,6 г, Herba Verbenae (вербена) 0,6 г; во флаконах по 100 мл (содержит 19 об.% спирта).

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, противовоспалительное.

Показ.: Острые и хронические заболевания дыхательных путей с гиперпродукцией вязкой мокроты, воспаление придаточных пазух носа.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Возможно, но только при строгом соблюдении режима дозирования.

Поб. действ.: Изжога, тошнота, рвота.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 драже или 50 капель 3 раза в сутки; грудным детям - по 10 капель 3 раза в день; детям от 1 года до 5 лет - 15 капель 3 раза в день; детям школьного возраста - 25 капель или 1 драже 3 раза в день. Капли применяют обычно в неразведенном виде, детям можно добавлять в сок или чай. Драже принимают, не раскусывая, с небольшим количеством жидкости.

Произв.: Bionorica (Германия)

Синусан (Sinusan®)

Сост. и ф.в.: 1 флакон содержит 10 мл частично дементолизированного эфирного масла японской мяты (*Mentha arvensis piperascens*).

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное, противоотечное, анальгезирующее.

Клин. фарм.: Снижает отечность и утолщение слизистой оболочки придаточных пазух носа, тем самым улучшая вентиляцию и дренаж, т.е. удаление чрезмерных выделений слизи из синусов. Устраняются сильные боли в надбровной области, под глазами, переносице, гайморовых пазухах и др. Местное длительное применение не приводит к раздражению слизистой оболочки.

Показ.: Профилактика гиперхолестеринемии и атеросклероза сосудов головного мозга. Профилактика расстройств памяти и способности сосредоточения, головокружения, повышенной возбудимости, плохого настроения и др. нарушений вследствие атеросклеротических изменений мозговых сосудов; недостаточность мозгового кровообращения.

Противопоказ.: Нет.

Примен. и доз.: Местно; при насморке, синусите - кончиком пальца, смоченным препаратом, слегка прикасаются к коже под носом; при мигрени, ишиасе, ревматизме - несколько капель капают в теплую воду; затем натирают или массируют полученным раствором больные места. Внутрь; при болях в желудке - по 3-5 капель на кусок сахара или в стакан с теплой водой.

Предост.: Во время лечения рекомендуется избегать чрезмерно напряженной работы и недосыпания (развивается выраженная общая слабость); хранить в местах недоступных для детей.

Произв.: Diet Pharma (Германия)

Синэстрол (Synoestrolum)

Гексэстрол*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций в персиковом масле содержит гексэстрола 1 мг (0,1%) и 20 мг (2%), в оливковом масле - 20 мг (2%); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Гипофункция яичников, аменорея, бесплодие, климактерические расстройства у женщин, аденома предстательной железы, рак предстательной и молочной желез.

Противопоказ.: Заболевания печени, почек, беременность.

Поб. действ.: Головокружение, тошнота, рвота, нарушения функции печени, гиперпролиферация эндометрия, метроррагия, феминизация.

Примен. и доз.: В/м, по 1-2 мл 0,1% раствора (1-2 мг) 2 раза в день в течение 6-8 суток, по 0,5-5 мл 2% раствора 1 раз в день в течение месяца.

Произв.: ФармаДон (Россия)

Сиофор® 500 (Siofor® 500)

Метформин*

Сиофор 850 (Siofor® 850)

Метформин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит метформина гидрохлорида 500 (Сиофор 500) или 850 мг (Сиофор 850); в упаковке 30 или 60 и 120 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Показ.: Инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа), особенно на фоне ожирения (при неудовлетворительной компенсации обмена веществ диетой и физической нагрузкой).

Противопоказ.: Инсулинзависимый диабет (I типа), полное прекращение эндогенной секреции инсулина при сахарном диабете II типа (толерантность к производным сульфонилмочевины).

Поб. действ.: Металлический вкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, понос, мегалобластная анемия (в результате подавления всасывания витамина B₁₂ и фолиевой кислоты в тонком кишечнике), кожные аллергические реакции.

Взаим.: Совместим с производными сульфонилмочевины.

Примен. и доз.: Внутрь. Терапию рекомендуют проводить с постепенным увеличением доз. Начинают с суточной дозы 1-2 таблетки сиюфора 500 или 1 таблетки сиюфора 850 (что соответствует 0,5-1 г или 0,85 г метформина гидрохлорида). Затем, в зависимости от состояния метаболизма, дозу увеличивают с интервалами в несколько дней (сиофор 500) или от нескольких дней до двух недель (сиофор 850) до обычной суточной дозы - 3 таблетки сиюфора 500 или 2 таблетки сиюфора 850 (что соответствует 1,5 или 1,7 г метформина гидрохлорида), при необходимости дозу можно увеличить до 6 таблеток в день сиюфора 500 или до 3 таблеток в день сиюфора 850 (3 или 2,55 г метформина гидрохлорида соответственно), но следует учитывать, что к дальнейшему увеличению действия эти дозировки не приводят. Таблетки сиюфора 850 можно делить на части.

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Сирдалуд (Sirdalud®)

Тизанидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тизанидина 2, 4 или 6 мг.

Фарм. действ.: Центральное миорелаксирующее.

Фармакодин.: Снижает выброс возбуждающих аминокислот из промежуточных нейронов спинного мозга, уменьшает сопротивление пассивным движениям, повышает силу произвольных сокращений.

Показ.: Мышечная боль, сопровождающаяся спазмом: различные заболевания позвоночника (остеохондроз, спондилез, шейный и поясничный синдромы и др.), хирургические вмешательства (по поводу грыжи межпозвоночного диска или тазобедренного остеоартроза), спастичность при неврологических заболеваниях (рассеянный склероз, хроническая миелопатия, дегенеративные заболевания спинного мозга, черепномозговые травмы, нарушения мозгового кровообращения и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью при беременности; грудное вскармливание должно быть прекращено.

Поб. действ.: Тошнота, сухость во рту, желудочно-кишечные расстройства, головокружение, слабость, сонливость, незначительное снижение АД.

Примен. и доз.: Для снятия болезненного мышечного спазма назначают внутрь - по 2-4 мг 3 раза в день. В тяжелых случаях - дополнительно 2-4 мг на ночь. При спастических состояниях мышц, обусловленных неврологическими заболеваниями, доза устанавливается индивидуально. Начальная доза не должна превышать 6 мг в сутки, разделенных на 3 приема. Дозу постепенно увеличивают на 2-4 мг с интервалами от 3-4 дней до недели. Оптимальный терапевтический эффект обычно достигается при дозе 12-24 мг в сутки, распределенной на 3-4 приема через равные промежутки времени. Не следует превышать дозу 36 мг в сутки.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при нарушении функции почек и/или печени. Рекомендуется избегать всех видов деятельности, требующих высокой степени концентрации внимания (вождение транспортных средств, работа с машинами и механизмами).

Прозв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Сирепар (Sirepar)

Сост. и ф.в.: Разбавленный гидролизированный экстракт печени, содержащий цианокобаламин. 1 флакон (10 мл) содержит 100 мкг цианокобаламина; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное.

Показ.: Гепатит (хронический и подострый), цирроз печени, жировая дистрофия печени, токсические и лекарственные поражения печени.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый гепатит.

Поб. действ.: Покраснение лица, чувство жара, боли в животе, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, в/в (медленно) по 2-3 мл. Курсовая доза - 150-200 мл. Для в/в введения разводят физиологическим раствором или кровью. Детям в возрасте 1-14 лет - 1-3 мл в/в или в/м ежедневно в течение 2-6 нед.

Прозв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Скелид (Skelid)

Тилудроновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит натрия тилудроната 240 мг, что эквивалентно содержанию тилудроновой кислоты 200 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Остеопротективное, нормализация состояния костной ткани, донирование дифосфонатов.

Показ.: Болезнь Педжета (у взрослых).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к дифосфонатам в анамнезе, тяжелая почечная недостаточность, юношеская болезнь Педжета.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Боли в области живота, тошнота, понос.

Взаим.: Несовместим с солями кальция (разрыв между приемом должен быть не менее 2 ч). Не следует сочетать с препаратами, локально действующими на ЖКТ, антацидами и индометацином.

Примен. и доз.: Внутрь, запивая небольшим количеством воды или фруктового сока, - по 2 таблетки 1 раз в день в течение 3 мес. Повторный курс - через 6 мес.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с нарушением функции почек. Во время лечения необходим прием кальция (через 2 и более часов после скелета) и витамина D. Нельзя применять в течение 2 ч до или после приема любой пищи или напитков.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Скенап (Skenan)

Морфина сульфат

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит морфина сульфата по 10, 30, 60 или 100 мг; в упаковке 14 шт.

Фарм. действ.: Центральное анальгезирующее.

Показ.: Интенсивная хроническая боль; боль, не купируемая другими анальгетиками, онкологическая боль.

Противопоказ.: Дыхательная недостаточность, резкая абдоминальная боль неясной этиологии, тяжелая печеночно-клеточная недостаточность, травма головного мозга или внутричерепная гипертензия, эпилептический статус, острая алкогольная интоксикация, делирий, возраст (до 2,5 лет), терапия с использованием ингибиторов МАО.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, запор, делирий, галлюцинации, повышение внутричерепного давления, холестаза, задержка оттока мочи, угнетение дыхания, физическая и психическая зависимость - спустя 1-2 нед (при регулярном приеме); синдром отмены: зевота, мидриаз, слезотечение, выделения из носа, чихание, мышечные подергивания, головная боль, астения, потливость, беспокойство, раздражительность, бессонница, анорексия, тошнота, рвота, потеря веса, диарея, дегидратация, боль в конечностях, абдоминальные и мышечные спаз-

мы, тахикардия, неровное дыхание, гипертермия, гипертензия.

Примен. и доз.: Внутрь, глотать не разжевывая, по 1 капсуле 2 раза в день (через каждые 12 ч), дозу варьируют индивидуально в зависимости от интенсивности боли и анальгезирующего эффекта.

Произв.: UPSA (Франция)

Скинорен (Skinoren®)

Азелаиновая кислота

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит азелаиновой кислоты 200 мг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, противовоспалительное местное.

Показ.: Угри.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Раздражение кожи.

Примен. и доз.: Местно. Крем наносят на всю поверхность лица или на другие участки пораженной кожи 2 раза в день (утром и вечером).

Произв.: Schering (Германия)

Слезка натуральная (Tears naturale®)

Сост. и ф.в.: 1 мл стерильного офтальмологического раствора содержит декстрана-70 0,1% и гидроксипропилметилцеллюлозы 0,3%, а также 0,05% ЭДТА и 0,01% бензалкония хлорида в качестве консервантов; во флаконах по 15 мл с дозатором Дроп-Тейнер.

Фарм. действ.: Повышение стабильности слезной пленки, восполнение дефицита слезной жидкости.

Фармакодин.: Полимерная система DUASORB (искусственный заменитель муцина) взаимодействует с естественной слезой и улучшает увлажнение роговицы - повышается стойкость слезной пленки на поверхности роговицы. Действие препарата сохраняется 90 мин и более (после однократного закапывания).

Показ.: Симптомы, обусловленные высыханием роговицы (недостаточная функция слезного аппарата, нарушение состава слезной жидкости, напряжение зрения при вождении автомобиля, работе с компьютером): дискомфорт, жжение в глазу, светобоязнь, слезотечение, чувство инородного тела в глазу (роговичный синдром).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ношение мягких контактных линз (содержит бензалкония хлорид).

Примен. и доз.: По 1-2 капли в глаз (по мере необходимости).

Предост.: При отсутствии эффекта следует закапывание прекратить.

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Смекта (Smecta®)

Сост. и ф.в.: 1 пакетик содержит 3 г диоктаэдрического смектита из природной глины; в упаковке 10 и 30 шт.

Фарм. действ.: Обволакивающее, адсорбирующее, противодиарейное.

Показ.: Острая и хроническая диарея, гастрит, рефлюкс-эзофагит.

Противопоказ.: Кишечная непроходимость.

Поб. действ.: Запоры.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 пакетик (развести в 1/2 стакана воды) 3 раза в день; детям до 1 года - 1 пакетик в день, от 1 года до 2 лет - 2 пакетика в день, старше 2 лет - 2-3 пакетика.

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Совентол (Soventol®)

Бамипин*

Сост. и ф.в.: 1 г геля содержит бамипина лактата 20 мг; в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противоаллергическое (антигистаминное, противоотечное, противозудное).

Показ.: Зуд различной этиологии, заболевания кожи, сопровождающиеся зудом (крапивница, сенная лихорадка и другие аллергические проявления на коже и слизистых, дерматозы), укусы насекомых, солнечные ожоги, ожоги медуз, обморожения, легкие термические ожоги.

Противопоказ.: Осложненная краугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы (с наличием остаточной мочи), повышенная чувствительность к пропиленгликолю.

Бер. и корм. гр.: Назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Чувство жжения (прекращается через несколько минут), развитие системных побочных эффектов (при нанесении на обширные участки кожи).

Примен. и доз.: Тонким слоем наносят (возможно осторожное втирание) на поверхность кожи. При необходимости процедуру повторяют через 30 мин.

Произв.: Knoll (Германия)

Солексин (Solexin) Солексин-КИД (Solexin-KID) Солексин-Форте (Solexin-Forte)

Цефалексин*

Сост. и ф.в.: 1 диспергируемая таблетка содержит цефалексина 125 (Солексин-КИД) или 250 Солексин-Форте) мг; в упаковке 10 блистеров по 10 шт.

1 капсула (Солексин) - 250 или 500 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательного тракта, кожи, костей и мягких тканей, мочеполовой сферы, отит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. Капсулы: обычная доза для взрослых - 250-500 мг каждые 6 ч. Диспергируемые таблетки для детей: 18,75-25 мг/кг массы тела каждые 6 ч.

Произв.: Sol Pharmaceuticals (Индия)

Солковагин (Solcovagyn®)

Сост. и ф.в.: Раствор органических кислот и нитрата цинка в азотной кислоте для наружного применения во флаконах по 0,5 мл; в упаковке 2 шт.

Фарм. действ.: Прижигающее.

Фармакодин.: При аппликации препарат некротизирует эктопированный цилиндрический эпителий и субэпителиальную строму эрозии. Впоследствии некротизированная ткань заменяется плоским эпителием.

Показ.: Доброкачественные поражения эпителия шейки матки: эктопии влагалищной части шейки (эрозия, эритроплакия, псевдоэрозия), зоны перестройки эпителия, кисты наботовых желез (после вскрытия), полипы канала шейки, послеоперационные гранулемы (при гистерэктомии).

Противопоказ.: Клеточная дисплазия, подозрение на малигнизацию эрозии шейки матки, беременность.

Поб. действ.: Местная реакция (раздражение).

Примен. и доз.: Местно, наносят на пораженное место с помощью ватного тампона обычно дважды с интервалом в 1-2 мин.

Предост.: Следует избегать контакта препарата с одеждой, глазами, кожей. При случайном попадании необходимо немедленно промыть водой или 1% раствором соды.

Произв.: Solco Basel (Швейцария)

Солкодерм (Solcoderm®)

Сост. и ф.в.: Раствор органических кислот и нитрата меди в азотной кислоте для наружного применения, в ампулах по 0,2 мл в комплекте с аппликатором; в упаковке 1 и 5 комплектов.

Фарм. действ.: Прижигающее.

Фармакодин.: Через 1-10 мин после нанесения препарат проникает в ткань, вызывая ее прижизненную фиксацию. Образующийся струп отпадает самостоятельно, заживление происходит без образования рубцов.

Показ.: Остроконечные кондиломы, простые и подошвенные бородавки, себорейный кератоз, актинокератоз, невоклеточный невус при подтвержденной доброкачественности.

Противопоказ.: Злокачественные опухоли кожи (в т.ч. подозрение на малигнизацию), веснушки, келоидные рубцы.

Поб. действ.: Жжение, преходящая эритема кожи вокруг обработанной поверхности, депигментированные пятна или рубцы (при глубоком прижигании).

Примен. и доз.: Накожно, наносят на пораженное место с помощью стеклянного капилляра - по 0,05-0,1 мл; одномоментно обрабатывают не более 4-5 кв.см.

Предост.: Следует избегать контакта препарата с одеждой, глазами, кожей. При случайном попадании немедленно смывают водой или 1% раствором соды; при мытье не рекомендуется сильно натирать обработанную поверхность.

Произв.: Solco Basel (Швейцария)

Солкосерил (Solcoseryl®)

Солкосерил дентал адгезивная паста (Solcoseryl® dental adhesive paste)

Общее описание

Сост. и ф.в.: Стандартизированный депротеинизированный гемодиализат из крови здоровых молочных телят.

1 мл раствора для инъекций содержит активного ингредиента в расчете на сухое вещество 42,5 мг; в ампулах по 2 мл; в упаковке 25 шт. или по 5 и 10 мл; в упаковке 5 шт.

10 или 20% раствор для инфузий (в изотоническом растворе натрия хлорида) - 4,25 и 8,5 мг соответственно; во флаконах по 250 мл.

1 таблетка, покрытая оболочкой, - 200 мг; в упаковке 100 шт.

1 г 5% мази - 2,07 мг; в тубах по 20 г.

1 г 10% желе - 4,15 мг; в тубах по 20 г.

1 г 20% глазного геля - 8,3 мг; в тубах по 5 г.

1 г пасты для применения в стоматологии (солкосерил дентал адгезивная паста) - 2,125 мг и полидоканола (местный анестетик) 10 мг; в тубах по 5 г.

Фарм. действ.: Стимуляция метаболизма, антигипоксическое, ранозаживляющее, мембраностабилизирующее, ангиопротекторное, цитопротекторное.

Клин. фарм.: Активирует обмен веществ в тканях; повышает потребление кислорода клетками, особенно, в условиях гипоксии; нормализует метаболизм; улучшает транспорт глюкозы; стимулирует синтез АТФ, тем самым ускоряя регенерацию поврежденных клеток и тканей; стимулирует ангиогенез, способствует реваскуляризации ишемизированных тканей; ускоряет реэпителизацию и закрытие раны; обладает анестезирующим эффектом (паста).

Показ.: Заболевания периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия, варикозное расширение вен), сопровождающиеся трофическими нарушениями (трофические язвы, предгангрена и др.); острые и хронические нарушения мозгового кровообращения (ишемический и геморрагический инсульт, черепно-мозговые травмы); цереброваскулярные заболевания; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; длительно незаживающие раны, пролежни, язвы, ожоги (химические и термические), обморожения, лучевые поражения, травмы и др. механические, термические и химические повреждения кожи и слизистых оболочек (дерматиты, язвы, ожоги), механические, термические и химические повреждения глаз (травмы, ожоги); язвы и эрозии роговицы, воспалительные заболевания роговицы и конъюнктивы (сухой кератоконъюнктивит, кератит, буллезный кератит), раздражение от контактных линз; воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, десен и губ: стоматит, гингивит, пародонтит, афты, заеда, простой герпес, пролежни от зубных протезов, болевой синдром (после снятия зубного камня, экстракции зубов, при прорезывании зубов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Применение топических форм препарата определяется степенью его необходимости. Парентеральные формы назначаются только в случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Аллергические реакции, включая крапивницу и зуд (таблетки, растворы); при аппликации на большую раневую поверхность - чувство жжения (не требует отмены препарата); локальная отечность, изменения вкуса и окраски зубов (паста).

Взаим.: Парентеральные формы несовместимы с препаратами нафтидрофурила, бенциклана фумарата, экстракта *Ginkgo biloba*; при инфузии не следует смешивать с др. средствами (кроме растворов глюкозы и физиологического).

Примен. и доз.: Парентерально или местно. Раствор для инъекций: в/в или в/а - по 5-10 мл; при облитерирующем эндартериите - по 10-15 мл в/в или в/а (в зависимости от клинической симптоматики), курс - около 6 нед; при хронической венозной недостаточности - по 5-20 мл в/в 1 раз в сутки каждый день или через день в течение 4-5 нед; при ожогах - по 10-20 мл в/в 1 раз в сутки, при необходимости до 50 мл (в виде инфузии); при нарушениях ранозаживления - по 6-10 мл в/в ежедневно в течение 2-6 нед; в/м можно вводить не более 5 мл раствора. Раствор для инфузий: в/в капельно (со скоростью 20-40 капель/мин) - по 250-500 мл ежедневно или несколько раз в неделю, курс - 10-14 дней. Таблетки: по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Мазь и желе: наносят тонким слоем на поврежденную поверхность 2-3 раза в сутки. Лечение мокнущих и глубоких ран следует начинать с применения желе; свежее образовавшийся эпителий у края раны обрабатывают мазью. После эпителизации большого участка кожи и прекращения выделений из раны применяют мазь; в случае замедления заживления возвращаются к использованию желе. Глазной гель: конъюнктивально, по 1 капле 3-4 раза в сутки. Паста: наносят тонким слоем на предварительно высушенный (ватным или марлевым тампоном) пораженный участок, равномерно распределяют и увлажняют кончиком пальца, смоченным водой, 3-5 раз в сутки после еды и перед сном (паста сохраняется в месте аппликации 3-5 ч).

Предост.: Парентеральные формы следует с осторожностью назначать пациентам с тяжелой сердечной недостаточнос-

тью, отеком легких, олигурией и анурией. После нанесения глазного геля зрение может стать "расплывчатым", поэтому минимум на 20 мин после использования препарата следует воздержаться от управления автомобилем.

Произв.: Solco Basel (Швейцария)

Солкотриховак (Solcotrichovac®)

Сост. и ф.в.: Лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах (1 прививочная доза) в комплекте с растворителем, в упаковке 1 или 3 комплекта. 1 доза вакцины содержит 7×10^9 инаktivированных лиофилизированных микроорганизмов штамма ацидофильных лактобацилл (*Lactobacillus acidophilus*).

Фарм. действ.: Нормализация влажной микрофлоры.

Фармакокин.: Под действием вакцины происходит нормализация влажного pH, что обеспечивает восстановление нормальной микрофлоры влажного (вытесняются *Trichomonas vaginalis* и др. патогенные микроорганизмы). Вакцина обеспечивает длительный защитный эффект, предупреждая реинфекцию трихомонадами и др. неспецифическими микроорганизмами.

Показ.: Трихомониаз у женщин (все стадии); неспецифические бактериальные вагиниты.

Противопоказ.: Острые лихорадочные состояния, болезни кроветворной системы, заболевания почек, сердечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Лихорадка, эритема и отечность в месте инъекции.

Взаим.: Возможно ослабление эффекта при одновременном применении иммуносупрессивных средств и проведении лучевой терапии.

Передоз.: Сведений о передозировке нет.

Примен. и доз.: В/м, основная иммунизация - по 1 дозе (0,5 мл), 3 инъекции с интервалом в 2 нед; ревакцинация - 0,5 мл однократно через 12 мес. Для приготовления вакцины необходимо ввести стерильный растворитель во флакон, содержащий лиофилизат.

Произв.: Solco Basel (Швейцария)

Солутан (Solutan)

Сост. и ф.в.: 1 мл (= 34 капли) содержит радобелина 100 мкг, масла укропно-

го 400 мкг, сапонины 1 мг, прокаина гидрохлорида 4 мг, эфедрина гидрохлорида 17,5 мг, натрия йодида 100 мг, экстракта толуанского бальзама 25 мг и воды горькоминдальной 30 мг; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Бронхолитическое, отхаркивающее.

Показ.: Бронхиальная астма, бронхиты.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, декомпенсированная глаукома.

Бер. и корм. гр.: Входящий в состав препарата натрия йодид проникает через плацентарный барьер.

Поб. действ.: Головная боль, атаксия, беспокойство, нарушение сна, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, диарея, сухость во рту (при высоких дозах), тахикардия, боли в области сердца, желудочковые аритмии, повышение АД, мышечная слабость, усиление потоотделения, расширение зрачков, контактный дерматит.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 10-30 капель 2-3 раза в сутки (при приступах удушья дозу увеличивают - до 60 капель на прием). Детям 1-6 лет - по 5 капель, 6-15 лет - по 5-10 капель 2-3 раза в сутки. Следует иметь в виду, что появление при хранении помутнения или осадка не является препятствием к использованию препарата.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Сомбревин (Sombrevin)

Пропанидид*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл 5% раствора для инъекций содержит пропанидида 500 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Наркозное.

Показ.: Вводный наркоз, наркоз при кратковременных операциях и диагностических процедурах.

Противопоказ.: Склонность к судорогам, тяжелые заболевания сердца, почек и печени, артериальная гипертензия, гемолитическая анемия, острая алкогольная интоксикация, шок.

Поб. действ.: Учащение дыхания, гиповентиляция.

Примен. и доз.: В/в, в течение 30 с, для 5-минутного наркоза достаточно 500 мг (у детей, у больных в возрасте более 60 лет и при кахексии рекомендуется дополнительное двукратное разведение препарата физиологическим раствором). При стоматологических операциях обычно применяется в дозе 5-10 мг/кг. Наркотическая доза для кахектических больных и в возрасте старше 60 лет - 2-3

мг/кг. Детям - по 7-10 мг/кг; в возрасте до 4 лет разовая доза - 100-150 мг, 4-6 лет - 150-200 мг, 6-10 лет - 200-300 мг, 10-16 лет - 300-500 мг, в возрасте старше 16 лет - 5-10 мг/кг массы. Если операция затягивается, введение можно повторить (2/3 или 3/4 исходной дозы), но не более двух раз, общая доза не должна превышать 1,5-2 г.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Сорбифер Дурулес (Sorbifer Durules®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит железа сульфата 320 мг (соответствует 100 мг железа (II)) и кислоты аскорбиновой 60 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Эритропоэтическое, компенсация дефицита железа.

Показ.: Железодефицитная анемия, профилактика недостаточности железа.

Противопоказ.: Гемосидероз, стриктуры ЖКТ, обструктивные заболевания ЖКТ, возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Тошнота, гастралгия, понос или запор.

Взаим.: Обоюдное снижение всасывания (из-за образования хелатов) тетрациклинов, Д-пенициллина; резорбцию ограничивают (по той же причине) антациды, содержащие соли алюминия, магния и кальция (между приемами препаратов должно пройти не менее 2 ч).

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды, по 1 таблетке 2 раза (утром и вечером). В первые 6 мес беременности рекомендуется 1 таблетка в день, в третьем триместре беременности и во время лактации - по 1 таблетке 2 раза в день.

Произв.: Egis (Венгрия)

Составной натрия лактат (Compound Sodium Lactate)

Сост. и ф.в.: В 1 л раствора с pH около 6 содержится натрия хлорида 6 г, натрия лактата 3,22 г, калия хлорида 0,4 г, кальция хлорида 0,27 г; в пластиковых контейнерах по 500 или 1000 мл.

Фарм. действ.: Нормализация водно-электролитного баланса, восстановление щелочного резерва крови (медленный перевод лактата в бикарбонат в крови).

Показ.: Дефицит воды и электролитов, истощение щелочного резерва крови.

Противопоказ.: Непереносимость лактата (тяжелое поражение печени, респираторный алкалоз), нарушения обмена натрия (органическое поражение серд-

ца, почечная недостаточность, цирроз печени, легочное сердце, гипернатриемия при применении кортикостероидов).

Поб. действ.: Гипертермия, гиперволемиа, развитие инфекции, тромбоз или тромбофлебит в месте введения, экстравазация.

Примен. и доз.: В/в. Доза подбирается индивидуально (зависит от возраста, массы тела и состояния больного).

Предост.: Упаковка раствора предназначена для однократного использования. Вводят с осторожностью, поскольку передозировка ведет к метаболическому ацидозу. Необходимо тщательно контролировать уровень электролитов плазмы. Введение раствора при нарушенной функции почек может вызвать гипернатриемию. Любые добавки (обязательно тщательное перемешивание) проводятся в условиях асептики. После введения добавок раствор должен храниться при температуре 2-8 град.С не дольше срока, указанного на этикетке. Каждая упаковка предназначена для разового использования. Использовать можно только прозрачный раствор в неповрежденном контейнере. Через 24 ч система для в/в введения должна заменяться.

Произв.: Baxter (США)

Соталекс (Sotalex)

Соталол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит соталола гидрохлорида 80 и 160 мг; в упаковке 14 и 28 шт.

1 мл раствора для инъекций - 10 мг, в ампулах по 4 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, блокада бета1-, бета2-адренорецепторов.

Фармакодин.: Уменьшает ЧСС и сократимость миокарда, замедляет АВ-проводимость (блокада бета1-адренорецепторов). Антиаритмическое действие обусловлено увеличением длительности потенциала действия и удлинением абсолютного рефрактерного периода во всех участках проводящей системы сердца (III класс антиаритмических средств). Блокада бета2-адренорецепторов проявляется в повышении тонуса гладких мышц бронхов и сосудов.

Показ.: Симптоматические суправентрикулярные тахикардии: атриовентрикулярные (узловые), пароксизмальные тахикардии, тахикардии при WPW-синдроме, пароксизмальные мерцательные аритмии предсердий; тяжелые симптоматические вентрикулярные нарушения сердечного ритма типа тахикардий и их профилактика.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в том числе к сульфаниламидам), хроническая сердечная недостаточность II-III степени, шок, артериальная гипотензия, АВ-блокада II и III степени, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла, брадикардия, удлинение интервала QT, облитерирующие заболевания сосудов, обструктивные заболевания дыхательных путей, метаболический ацидоз, отек гортани, тяжелый аллергический ринит.

Бер. и корм. гр.: При беременности и лактации только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Брадикардия, АВ-блокада, усиление симптомов сердечной недостаточности, артериальная гипотензия, бронхоспазм, головокружение, головная боль, утомляемость, нарушение сна, сонливость, депрессия, парестезии, похолодание конечностей, мышечная слабость, сухость во рту, тошнота, диарея, запор, гипогликемия, половая дисфункция, кожные аллергические реакции. Очень редко - усиление приступов стенокардии, нарушение остроты зрения, кератит, конъюнктивит, синкопальные состояния.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой, запивая небольшим количеством жидкости; при тахикардиях - по 40 мг 2-3 раза в день, затем (по мере необходимости) - по 160 мг 3 раза в день. При пароксизмальных формах аритмий - в/в медленно (в течение 5 мин) - 20 мг, при необходимости возможно повторное введение через 20 мин (в той же дозе). Максимальная суточная доза - 1,5 мг/кг массы тела. У больных с ограниченной функцией почек доза зависит от величины почечного клиренса: при понижении креатининового клиренса до 10-30 мл/мин рекомендуется снижение дозы наполовину, при клиренсе ниже 10 мл/мин дозу снижают до одной четверти.

Предост.: С осторожностью назначать пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда, при сахарном диабете, феохромоцитоме, псориазе, нарушении функции почек. Терапию следует проводить под контролем ЧСС, АД, ЭКГ. В случае отмены при ишемической болезни и нарушениях сердечного ритма, после продолжительного приема рекомендуется медленное и постепенное прекращение терапии (во избежание ухудшения состояния больного). Отмена или изменение режима дозирования у пациентов с угрожающими жизни нарушениями сердечного ритма возможны только

после консультации с лечащим врачом. При назначении препарата пациентам, перенесшим инфаркт миокарда и со сниженной сократительной способностью миокарда необходимо наблюдение кардиолога. Следует учитывать возможность нарушения водительской реакции и способности к работе с механизмами, особенно в начале курса лечения, при смене препаратов и при сочетании с алкоголем.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Софрадекс (Sofradex®)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит софрамицина 5 мг, грамицидина 0,05 мг и дексаметазона 0,5 мг; во флаконах по 8 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, антибактериальное.

Показ.: Инфекционные, воспалительные заболевания глаз и ушей, сопровождающиеся зудом (блефарит, инфекционная экзема век, аллергический конъюнктивит, острый и хронический наружный отит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гнойное воспаление глаз, глаукома, перфорация барабанной перепонки, вирусные (в том числе герпетические) или грибковые инфекции, беременность, лактация.

Поб. действ.: Раздражение, жжение, боль, зуд и дерматит на месте аппликации, повышение внутриглазного давления, образование субкапсулярной катаракты, истончение роговицы (при заболеваниях роговицы и склеры, сопровождающихся уменьшением толщины этих оболочек).

Примен. и доз.: По 1-2 капли в глаз до 6 раз в сутки или чаще; в ухо закапывают по 2-3 капли 3-4 раза в сутки. Курс - до 7 дней.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Спаздолзин® (Spasdolzin®)

Метамизол натрия*

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит метамизола натрия 650 или 200 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Показ.: Боли (головная, коликообразные, зубная, при травмах, ранениях, операциях, опухолях); лихорадка.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и/или почек.

Примен. и доз.: Ректально, взрослым и подросткам старше 14 лет (с массой тела более 53 кг) - по 1 суппозиторию (650 мг), детям от 2 до 5 лет (с массой тела от 15 до 20 кг) - по 1 суппозиторию (200 мг) 1-4 раза в сутки с интервалом от 6 до 8 ч.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Спазмoverалгин Нео (Spasmoveralgin® neo)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пропифеназона 150 мг, фенобарбитала 20 мг, папаверина хлорида 30 мг, кодеина дигидрофосфата 15 мг, эфедрина хлорида 5 мг и атропина метобромида 0,5 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, седативное, спазмолитическое.

Показ.: Спазмы ЖКТ и мочевого пузыря, желчные, печеночные и почечные колики, мигрень, спастическая дисменорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, механический стеноз ЖКТ, запор, мегаколон, тахикардия, аритмия, артериальная гипертензия, тяжелая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, тиреотоксикоз, гипертрофия простаты, глаукома, лейкопения, порфирия, беременность, лактация, возраст (до 6 лет).

Поб. действ.: Лейкопения, агранулоцитоз, сухость во рту, запор, нарушения аккомодации, тахикардия, затрудненное мочеиспускание, лекарственная зависимость (кодеин), аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО, алкоголем. Усиливает эффект пероральных противодиабетических средств, сульфаниламидов, антикоагулянтов, глюкокортикоидов (ульцерогенность), снижает - транквилизаторов и гормональных противозачаточных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 (детям до 15 лет - по 1/2-3/4) таблетке 1-3 раза в день.

Предост.: При длительном назначении следует контролировать клеточный состав крови (возможны острый иммуноагранулоцитоз и хроническая нейтропения).

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Спазмомен® 40 (Spasmomen® 40)

Отилоний бромид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит отилония бромида 40 мг; в блистерной упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Устранение спазмов ЖКТ.

Фармакокин.: Всасывается около 5% введенной дозы; большая часть выводится через желчные каналы.

Показ.: Спастические состояния и дискинезии ЖКТ; синдром раздраженной толстой кишки - слизистый колит, гастрит, гастродуоденит, энтерит, эзофагит; подготовка к проведению эндоскопических исследований: эзофагоскопии, гастроскопии, дуоденоскопии, колоноскопии, ректоскопии.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: При применении в рекомендуемых дозах отсутствуют.

Передоз.: Специфических симптомов передозировки не выявлено. При необходимости рекомендуется проводить симптоматическую и поддерживающую терапию.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Предост.: С осторожностью применять у больных с глаукомой.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Спаскупрель (Spascupreel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Colocynthis D4, Ammonium bromatum D4, Atropinum sulfuricum D6, Veratrum D6, Magnesium phosphoricum D6, Gelsemium D6 по 30 мг, Passiflora incarnata D2, Agaricus D4, Chamomilla D3, Cuprum sulfuricum D6 по 15 мг, Aconitum D6 60 мг; в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, обезболивающее, седативное, противосудорожное.

Показ.: Спастический болевой синдром (спазмы гладких мышц полых органов и поперечнополосатой мускулатуры), колика желчного пузыря, холецистит, спазмы при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический колит, почечная колика; дисменорея, тянущие боли в области мочевого пузыря; различные формы бронхиальной астмы, спастический бронхит, спазмы гортани (ложный круп, коклюш), зубные боли у младенцев, пупочная колика, спазмы сосу-

дов, мигрень, мышечное напряжение (в частности, при остеохондрозе).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, обычно по 1 таблетке 3 раза в день. При коликах желчного пузыря назначают в сочетании с Хепель, при почечных коликах - с Ренель, при бронхиальной астме - с Энгистол и Галиум-Хель.

Произв.: Heel (Германия)

Спигелон (Spigelon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Spigelia D3, Belladonna D3, Bryonia D3, Gelsemium D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3 по 30 мг, Acidum silicicum D12, Thuja D12 по 60 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Обезболивающее, седативное, антидепрессивное.

Клин. фарм.: Не влияет на скорость реакции (например, у водителей транспорта).

Показ.: Головные боли различного происхождения (на нервной почве, при шейных мигренях, невралгиях затылочного и тройничного нервов, после перенапряжений).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Heel (Германия)

Спиронаксан (Spironaxan)

Спиринолактон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит спинолактона 25 или 50 мг; в упаковке 100 шт.; 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, калийсберегающее.

Показ.: Отечный синдром при хронической сердечной недостаточности, циррозе печени; бронхиальная астма, миастения, гиперальдостеронизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая почечная недостаточность, гиперкалиемия, гиперкальциемия, гипонатриемия, беременность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, головокружение, атаксия, гинекомастия, дис- и аменорея, нарушение эрекции, изменение голоса, повышенное выделение мочевины, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, 100-200 мг в сутки в 2-3 приема.

Предост.: Не следует сочетать с препаратами, содержащими калий.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Спиронол (Spironol)

Спиронолактон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит спиронолактона 0,025 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Фармакодин.: Повышает выделение ионов натрия и уменьшает - калия (антагонист альдостерона).

Показ.: Отеки у больных с хронической сердечной недостаточностью, циррозом печени, нефротическим синдромом. Первичный гиперальдостеронизм. Артериальная гипертензия при альдостероме надпочечников, инфекционно-аллергическая астма.

Противопоказ.: Гиперкалиемия, острая и хроническая почечная недостаточность, беременность, период кормления грудью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, головокружение. Иногда - сонливость, атаксия, кожная сыпь. При длительном применении у мужчин - гинекомастия, у женщин - нарушения менструального цикла.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым в случае отеков при хронической сердечной недостаточности, циррозе печени, нефротическом синдроме - по 100 мг в сутки; при гипертонической болезни - по 50-100 мг в сутки (при необходимости - до 200 мг в сутки). Детям - 3 мг/кг массы тела в сутки.

Произв.: Акрихин (Россия)

Спониф 10 (Sponif® 10)

Нифедипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит нифедипина 10 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, вазодилатирующее, коронарорасширяющее, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Стенокардия (стабильная и коронарорасширяющая Принцметала), артериальная гипертензия, гипертонический криз, болезнь Рейно, легочная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тахикардия, артериальная гипотония, острый период инфаркта миокарда, сосудистый и кардиогенный шок, коллапс, выраженная сердечная недостаточность.

Поб. действ.: Гиперемия и ощущение прилива крови к лицу, головокружение, головная боль, артериальная гипотония, периферические отеки, рефлекторная тахикардия, ощущение сердцебиения; парадоксальное усиление ангинальных болей (в начале лечения); редко - усиление ишемии миокарда (в остром периоде инфаркта миокарда и при выраженном постинфарктном кардиосклерозе); диарея, внутрипеченочный холестаз, повышение активности печеночных трансаминаз; гиперплазия десен; кожная сыпь и другие аллергические реакции.

Взаим.: Гипотензивный эффект усиливают нитраты, бета-адреноблокаторы, диуретики, трициклические антидепрессанты, алкоголь, циметидин и ранитидин. Повышает действие теофиллина, концентрацию в плазме дигоксина. Вероятность развития выраженной артериальной гипотонии, брадикардии, аритмии и отеков увеличивает хинидин.

Передоз.: Симптомы: резкая брадикардия или тахикардия, артериальная гипотония, в тяжелых случаях коллапс, замедление AV-проводимости. Лечение симптоматическое: рекомендуется в/в введение хлорида или глюконата кальция.

Примен. и доз.: Устанавливают индивидуально. Внутрь, после еды; начальная доза - 10 мг (для ускорения эффекта таблетку можно разжевать) 3-4 раза в сутки; при необходимости постепенно увеличивают дозу до 20 мг 3-4 раза в сутки. При вариантной стенокардии и тяжелой артериальной гипертензии разовую дозу можно увеличить до 30 мг, максимальная суточная доза - не выше 120 мг. Для купирования приступа стенокардии и гипертонического криза - сублингвально по 10-20 мг (при необходимости - 30 мг).

Предост.: С осторожностью назначают кормящим матерям, больным с гемодиализом (из-за возможной гипотонии), работающим с техникой и транспортными средствами (замедляется скорость реакций). Заканчивать лечение следует постепенно (в связи с возможностью синдрома отмены).

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Спофиллин ретард 100 (Sporphylline retard 100®)

Теофиллин

Спофиллин ретард 250 (Sporphylline retard 250®)

Теофиллин

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит теофиллина 100 или 250 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Бронходилатирующее, вазодилатирующее, кардиотоническое, диуретическое.

Фармакокин.: Хорошо всасывается в ЖКТ. Связь с белками плазмы - 60% (у детей и больных циррозом печени - 35%). Проникает через плацентарный барьер, в грудное молоко. C_{max} - через 6 ч (у детей - 4 ч), $T_{1/2}$ - 10-15 ч. Терапевтическая концентрация в плазме - 10-20 мкг/мл. Метаболизируется в печени. Выводится с мочой (в неизменном виде около 10%).

Показ.: Бронхиальная астма, бронхообструктивный синдром, хроническая дыхательная недостаточность с гиповентиляцией, бронхиолиты у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение в ЖКТ, печеночная недостаточность, инфаркт миокарда, аритмия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тиреотоксикоз, эпилепсия, глаукома.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, желудочно-пищеводный рефлюкс, желудочно-кишечные кровотечения, головная боль, бессонница, беспокойство, судороги, тахикардия, аллергические реакции.

Взаим.: Циметидин, аллопуринол, циклоспорин, макролиды, оральные контрацептивы, противогриппозная вакцина повышают концентрацию в плазме; фенобарбитал, фенитоин, ксантиновые препараты, другие индукторы микросомального окисления - снижают. Усиливает эффект диуретиков, снижает - пропранолола, пиразолоновых производных, пробенецида, кумариновых антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, за 30 мин до еды по 250 мг 2 раза в сутки (при ночных приступах удушья вечернюю дозу увеличивают в 1,5-2 раза и принимают в 22-24 ч). Дети (массой до 30 кг) - 10-20 мг/кг/сутки за 2 приема.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Стабизол® (Stabisol®)

Полигидроксиэтилкрахмал

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для в/в введения содержит полигидроксиэтилкрахмала (с молекулярной массой 450000) 60 мг, во флаконах по 500 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Плазмозамещающее.

Показ.: Гиповолемия; профилактика и терапия гиповолемического шока при ожогах, травмах, операциях; гемодилюция.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиповолемия, гипергидратация, тяжелая застойная сердечная недостаточность, выраженные нарушения функции почек с олигурией или анурией, тяжелые геморрагические диатезы, детский возраст (до 10 лет).

Поб. действ.: Анафилактические реакции.

Примен. и доз.: В/в капельно. Первые 10-20 мл препарата следует вводить медленно, контролируя состояние больного. При гиповолемии - по 500-1000 мл в сутки (до 20 мл/кг в сутки). Дозу, скорость и длительность вливания устанавливают в зависимости от тяжести кровопотери и гиповолемии, от значения гематокрита. При отсутствии экстренной ситуации рекомендуемая продолжительность вливания - не менее 30 мин на 500 мл.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Стадол (Stadol®)

Буторфанол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит буторфанола тартрата 2 мг; во флаконах и ампулах по 1 мл.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противокашлевое, седативное.

Показ.: Болевой синдром средней и сильной выраженности различной этиологии: постоперационный, во время родов, для премедикации и сбалансированной анестезии и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано (за исключением болевого синдрома при родах).

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, тошнота и рвота; редко - головные боли, ощущение жара, сердцебиение, сухость во рту, гастралгия, чувство тревоги, спутанность сознания, эйфория, нервозность, парестезии, зуд, нару-

шение остроты зрения, лабильность АД, нарушения мочеиспускания, лекарственная зависимость, привыкание (при длительном применении), крапивница.

Взаим.: Усиливает угнетающее действие на ЦНС алкоголя, барбитуратов, транквилизаторов, антигистаминных препаратов.

Примен. и доз.: Устанавливают индивидуально. Для купирования болевого синдрома вводят в/в или в/м в средних дозах 1 и 2 мг (соответственно) однократно, при необходимости (в зависимости от интенсивности боли) - по 0,5-2 мг или 1-4 мг (соответственно) каждые 3-4 ч. До операции - по 2 мг (в/в, в/м) за 60-90 мин, во время операции - 0,5-1 мг (в/в) в несколько введений. У рожениц - по 1-2 мг (в/в, в/м), при необходимости - 1 раз повторно через 4 ч.

Предост.: С осторожностью назначать в период подготовки к родам, больным с черепно-мозговыми травмами, угнетением дыхания, эмоциональной неустойчивостью, наркотической зависимостью в анамнезе, с нарушением функции печени, почек и сердечно-сосудистой системы, престарелым, работающим с механизмами, транспортными средствами.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Стадол НС (Stadol® NS)

Буторфанол*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит буторфанол тартрата 1 мг (1 мл раствора - 10 мг); во флаконах с дозатором 2,5 мл.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противокашлевое, седативное.

Показ.: Болевой синдром средней и сильной выраженности различной этиологии: после операций (в том числе после кесарева сечения), при мигрени и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Сонливость, бессонница, головокружение, тошнота, рвота, заложенность носа; редко - анорексия, запор, тремор, бронхит, кашель, одышка, носовые кровотечения, обострение инфекций верхних дыхательных путей, отек слизистой носовых пазух, ринит, синусит, боль и звон в ушах, неприятный вкус во рту, обильный липкий пот, кожные высыпания, зуд, лекарственная зависимость (при длительном применении), синдром отмены.

Взаим.: Сосудосуживающие препараты замедляют эффект.

Примен. и доз.: Интраназально, 1 мг (1 дозу в одну ноздрю), при необходимости распыляют повторно через 60-90 мин, и далее с интервалами в 3-4 ч, или 2 мг (по 1 дозе в каждую ноздрю) 1 раз (в лежачем положении). Больным с нарушениями печени и почек, престарелым - 1 мг, при необходимости - повторное распыление не ранее 90 мин.

Предост.: С осторожностью назначать больным с черепно-мозговыми травмами, с угнетением дыхания, с эмоциональной неустойчивостью, с наркотической зависимостью в анамнезе, с нарушением функции печени, почек и сердечно-сосудистой системы, престарелым. Во время лечения не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей повышенного внимания, быстроты психических и двигательных реакций.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Стамло (Stamlo)

Амлодипин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амлодипина (бесилата) 5 или 10 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, блокада (продолжительная) "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Артериальная гипертензия, стабильная и вазоспастическая стенокардия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Повышенная утомляемость, головная боль, сердцебиение, тахикардия, периферические отеки, головокружение, гиперемия (лицо).

Примен. и доз.: Внутрь, в начальной дозе - по 5 мг 1 раз в сутки; максимальная доза - 10 мг 1 раз в сутки.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Стандациллин (Standacillin®)

Ампициллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит ампициллина 500, 1000 или 2000 мг, в комплекте с растворителем.

1 капсула - 250 или 500 мг; в упаковке 12 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных и желчевыводящих путей, мочеполовой системы, отит, бактериальная диарея, шигел-

лез, сальмонеллез, коклюш, менингит, эндокардит, хирургические инфекции (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, первый триместр беременности (только по жизненным показаниям).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, гемолитическая анемия, лейко- и тромбоцитопения, эозинофилия, дисбактериоз, суперинфекции, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м и в/в, по 1-2 г 3-4 раза в сутки; недоношенным детям и новорожденным - по 50-150 мг/кг в сутки, детям с массой тела до 10 кг - по 500 мг 3 раза в сутки, 1-3 лет - по 500-1000 мг 3 раза в сутки, 3-6 лет - по 1 г 3-4 раза в сутки, 6-12 лет - по 0,5-2 г 4 раза в сутки; при менингите, сепсисе и других тяжелых инфекциях - 8-16 г в сутки (детям по 300-400 мг/кг 2 раза в сутки). Внутрь, детям 6-12 лет - по 500 мг 3-4 раза в сутки, старше 12 лет - по 500 мг 4 раза в сутки.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Стекловидное тело (Corpus vitreum)

Сост. и ф.в.: Препарат из стекловидного тела глаза скота, в ампулах по 2 мл; в коробке 10 шт.

Фарм. действ.: Биостимулирующее.

Показ.: Для размягчения и рассасывания рубцовой ткани (при ожоговых, послеоперационных, келоидных и другого происхождения обширных рубцах и контрактурах суставов), для ускорения образования костной мозоли при переломах, для уменьшения боли при радикулитах, невралгиях, фантомных болях.

Противопоказ.: Инфекционные заболевания, острые воспалительные процессы, кахексия, нефрит, нефросклероз, цирроз печени, застойная сердечная недостаточность, злокачественные опухоли.

Примен. и доз.: Вводят п/к по 2 мл ежедневно. Курс лечения при невралгиях 8-10 дней, при рубцах, контрактурах и переломах - до 25 дней.

Произв.: Микомс (Россия)

Стеригал (Sterigal)

Сост. и ф.в.: 100 г водного раствора для наружного использования содержат лауроиллоксипропил-бета-аминомасляной кислоты 1 г, додециламинопропил-бета-аминомасляной кислоты 1 г и бензалкония хлорида 0,5 г; во флаконах по 500 и 5000 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, дезинфицирующее.

Фармакодин.: Оказывает антибактериальный эффект, действуя на грамотрицательные и грамположительные бактерии, микобактерию туберкулеза, вирусы полиомиелита, герпеса и аденовирусы; обладает трихомонацидным действием. Активность не уменьшается в присутствии белков, крови, сыворотки, сахара. К препарату не вырабатывается устойчивость микроорганизмов.

Показ.: Антисептика в хирургии: травмы, раны (в т.ч. операционные), ожоги, пролежни, послеоперационный уход; микробные инфекции кожи, язвы; вагинальные промывания; дезинфекция медико-хирургических материалов, посуды, помещений, обработка рук медицинского персонала.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Наружно. Для повязок, компрессов, промываний используется 2,5% раствор без разведения 1-2 раза в день; при экземе - в разведении 1:10; в гинекологии для промываний - в разведении от 1:50 до 1:100; для обработки рук медицинского персонала - в разведении 1:10, руки держат в растворе в течение 1 мин, после чего сушат в стерильных условиях; для дезинфекции медико-хирургических материалов - 2,5% раствор без разведения.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Стерилин® (Sterilin™)

Ноноксинол*

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит ноноксинола-9 в полиэтиленгликолевой основе 100 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Контрацептивное, спермицидное.

Фармакодин.: Не содержит гормонов, не всасывается, не вызывает раздражения, обладает смазывающим действием, лишен неприятного запаха.

Показ.: Местная контрацепция.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности и подозрении на беременность.

Примен. и доз.: Ввести свечу после удаления обертки с помощью указательного пальца глубоко в отверстие влагалища не позже, чем за 15 мин и не более чем за 1 ч до полового акта (осторожно - не попасть свечой в отверстие уретры). Если половое сношение отложено на срок более чем 1 ч, после того как вставлена свеча, или будет повторено, вставь-

те новую свечу; частота применения не ограничена. В спринцевании нет необходимости, но оно возможно не ранее, чем через 6 ч после полового акта.

Предост.: В случае нарушения менструального цикла необходимо обратиться к врачу. Следует прекратить использование при раздражении кожных покровов у одного из партнеров.

Произв.: Four Ventures (США)

Стиламин (Stilamin®)

Соматостатин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с сухим веществом для приготовления инъекционного раствора содержит соматостатина 250 и 3000 мкг, в комплекте с растворителем - 1 мл 0,9% раствора хлорида натрия для инъекций.

Фарм. действ.: Соматостатин-подобное, снижение выделения гастрина, желудочного сока, пепсина, уменьшение эндокринной и экзокринной секреции поджелудочной железы, подавление секреции глюкагона.

Фармакодин.: Препятствует выделению гормона роста. Уменьшает объем кровотока во внутренних органах, не вызывая значительных колебаний в системном АД.

Показ.: Выраженные острые кровотечения при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, из варикозно-расширенных вен пищевода, при эрозивных и геморрагических гастритах; свищи поджелудочной железы, желчные и кишечные свищи (вспомогательное лечение); профилактика послеоперационных осложнений при хирургических вмешательствах на поджелудочной железе; диабетический кетоацидоз (вспомогательное лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к соматостатину.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головокружение, приливы, тошнота и рвота (только при скорости введения препарата свыше 50 мкг/мин).

Взаим.: Увеличивает эффект (продолжительность сна) гексобарбитала и пентетразола - одновременное применение стиламина с указанными (или подобного действия) препаратами не рекомендуется. Не следует смешивать стиламин в одном шприце (или в одном инфузионном растворе) с другими лекарственными препаратами.

Примен. и доз.: Вводят в/в - сначала медленно струйно в течение 3-5 мин в "ударной" дозе 250 мкг, затем немедлен-

но переходят на непрерывную инфузию со скоростью 250 мкг/ч (что соответствует приблизительно 3,5 мкг/кг/ч). Активное вещество непосредственно перед первоначальным введением разводят прилагаемым растворителем. Для приготовления раствора, предназначенного для длительной инфузии в течение 12 ч, используют ампулу, содержащую 3000 мкг активного вещества. Для разведения используют физиологический раствор или 5% раствор декстрозы. Рекомендуется использование перфузионного шприца. При выраженных острых кровотечениях из верхних отделов ЖКТ, в т.ч. из варикозно расширенных вен пищевода, препарат применяют как указано выше. При перерыве между двумя инфузиями более 3-5 мин производят дополнительную медленную в/в инъекцию препарата в дозе 250 мкг для обеспечения непрерывности лечения. После остановки кровотечения (обычно через 12-24 ч) продолжают лечение препаратом еще в течение 48-72 ч во избежание рецидива кровотечения. Общая продолжительность лечения составляет до 120 ч. При вспомогательном лечении свищей поджелудочной железы, желчных и кишечных свищей осуществляют непрерывную инфузию до закрытия фистулы (2-20 дней) одновременно с полным парентеральным питанием. При этом доза препарата составляет 250 мкг/ч. При закрытии свища лечение продолжают еще 1-3 дня и прекращают его постепенно во избежание эффекта отмены. Для профилактики послеоперационных осложнений после хирургических вмешательств на поджелудочной железе препарат вводят в начале хирургического вмешательства со скоростью 250 мкг/ч и продолжают введение в течение 2-5 дней. При вспомогательном лечении диабетического кетоацидоза проводится инфузия препарата со скоростью 100-500 мкг/ч вместе с терапией инсулином (инъекция "ударной" дозы в 10 МЕ и инфузия со скоростью 1-4,8 МЕ/ч) в течение 3-4 ч.

Предост.: В начале лечения может развиться временная гипогликемия (следует контролировать содержание глюкозы в крови каждые 3-4 ч). Необходимо избегать повторных курсов лечения (возможна сенсibilизация).

Произв.: Serono (Швейцария)

Стопангин (Stopangin)

Сост. и ф.в.: 45 мл аэрозоля для орошения содержат гексетидина 86,5 мг, смеси эфирных масел 66,2 мг и метилсалици-

лата 10 мг.

250 мл раствора - 0,25 г, 0,2873 г и 0,0439 г активных веществ соответственно.

Фарм. действ.: Антисептическое, противогрибковое, кровоостанавливающее, обезболивающее, обволакивающее.

Клин. фарм.: Эффект продолжается 10-12 ч.

Показ.: Воспалительные заболевания полости рта и гортани (ангина, тонзиллит, фарингит, стоматит, афты, глоссит, гингивит, пародонтоз, пародонтопатии, инфицирование альвеол); грибковые заболевания полости рта и гортани (молочница); кровоточивость десен, гигиена полости рта (дезодорирующее средство), до и после оперативных вмешательств, травмы полости рта и гортани, грипп и острые респираторные заболевания (вспомогательное средство), ангина, вызванная стрептококками (совместно с антибиотиками).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сухой фарингит атрофического типа, детский возраст (до 8 лет).

Поб. действ.: Ощущение жжения слизистой ротовой полости (временное), аллергические реакции; при случайном проглатывании (во время полоскания) - тошнота.

Примен. и доз.: Наружно. Впрыскивают в полость рта, при задержанном дыхании - 1 раз в правую и 1 раз в левую сторону, 2-3 раза в день (после еды или в промежутках между приемами пищи). Раствор - полоскать или промывать рот (в течение не менее 30 с) неразбавленным раствором в объеме 10-15 мл (1 столовая ложка) 2-5 раз в день (после еды или в промежутках между приемами пищи). Возможно, особенно у детей, смазывать слизистую с помощью ватного тампона на палочке. Между отдельными дозами должен быть перерыв не менее 4 ч, применяется не более 7 дней.

Предост.: Аэрозоль не следует вдыхать. Он не должен попадать в глаза. У детей можно применять, если нет опасности неконтролируемого проглатывания препарата (раствор) или если они способны задерживать дыхание при впрыскивании (аэрозоль). Следует иметь в виду, что раствор содержит 61,3 об.% этанола и 0,0052 г натрия (в 250 мл). Водителям не рекомендуется управление автомобилем в течение 30 мин после применения. В случае ухудшения самочувствия, повышения температуры, медленного заживления или появления необычных реакций рекомендуется обратиться к врачу.

Произв.: Norton Healthcare / Galena (Великобритания)

Стоптуссин (Stoptussin)

Сост. и ф.в.: 1 мл (= 30 капель) содержит бутамирата цитрата 4 мг и гвайфенезина 100 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Противокашлевое, муколитическое, отхаркивающее.

Фармакодин.: Цитрат бутамирата обладает бронхолитическим и противокашлевым эффектом, связанным с периферическим местноанестезирующим действием на рецепторы бронхов и бронхиол. Гвайфенезин - снижает вязкость мокроты, улучшает ее отхождение, уменьшает частоту кашля.

Клин. фарм.: Препарат не содержит сахарозы, может быть использован у больных сахарным диабетом.

Показ.: Кашель (сухой, раздражающий, трудно успокаиваемый, в т.ч. при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних отделов дыхательных путей).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, соответствующее количество капель растворяют в 100 мл жидкости (вода, чай, фруктовый сок); доза зависит от массы тела: до 7 кг - по 8 капель 3-4 раза в сутки; 7-12 кг - по 9 капель 3-4 раза; 12-20 кг - по 14 капель 3 раза в сутки; 20-30 кг - по 14 капель 3-4 раза; 30-40 кг - по 16 капель 3-4 раза; 40-50 кг - по 25 капель 3 раза; 50-70 кг - по 30 капель 3 раза; 70-90 кг - по 40 капель 3 раза в сутки.

Предост.: Следует иметь в виду, что 1 мл стоптуссина содержит 280 мг этанола.

Произв.: Norton Healthcare / Galena (Великобритания)

Сторилат (Storilat™)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит карбамазепина 200 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, анальгезирующее.

Показ.: Эпилепсия (проявляющаяся генерализованными, тонико-клоническими и малыми припадками); болевой синдром при невралгии тройничного нерва.

Противопоказ.: Нарушения АВ-проводимости (при отсутствии водителя ритма), беременность.

Поб. действ.: Головокружение, вялость, диплопия, сухость во рту, тошнота, рвота, диарея, дискразия крови, отеки, гипонатриемия, генерализованная эритематозная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, с пищей. При эпилепсии дозу подбирают индивидуально; взрослым назначают в начальной дозе 100-200 мг 1-2 раза в день, постепенно повышая до обычной поддерживающей - 0,8-1,2 г в день в 2-4 приема, при необходимости - по 1,6 г/сутки. Детям: до 1 года - по 100-200 мг, 1-5 лет - по 200-400 мг, 5-10 лет - по 400-600 мг, 10-15 лет - по 600-1000 мг. Для поддержания достаточного терапевтического уровня препарата в крови (оптимальный 4-12,5 мкг/мл) проводят регулярные измерения концентрации. При невралгии тройничного нерва начальная доза - по 100 мг 2 раза в день. Увеличение дозы на 100 мг проводят каждые 12 ч до максимальной - 1,2 г/сутки, средняя поддерживающая доза - 400-800 мг в день в 2-4 приема. После купирования болевого синдрома используют минимальные дозы, затем прекращают прием (до следующего приступа).

Предост.: С осторожностью следует назначать при заболеваниях сердца, печени, почек, заболеваниях крови (в т.ч. в анамнезе). Во время лечения необходим регулярный анализ крови, лактирующие женщины должны приостановить грудное вскармливание.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Стрептаза (Streptase®)

Стрептокиназа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит стрептокиназы 250000, 750000 или 1500000 МЕ; в упаковке 1 и 10 шт.

Фарм. действ.: Фибринолитическое.

Показ.: Острый инфаркт миокарда, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, острые и подострые тромбозы периферических артерий, хронические окклюзионные заболевания артерий, окклюзионные поражения центральных сосудов глаза.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, внутренние кровотечения, геморрагический диатез, тромбоцитопения, печеночно-почечная недостаточность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, менструальное кровотечение, ранние сроки после нарушений мозгового кровообращения, операций, родов; активный туберкулез, внутричерепные ново-

образования, артериальная гипертензия, гипокоагуляция, кровотечение, диабетическая ретинопатия, мерцание предсердий на фоне митрального порока, бактериальный эндокардит, беременность (первые 18 нед).

Поб. действ.: Лихорадка, озноб, головная боль, желудочно-кишечные нарушения, генерализованная экзантема, артралгия, миалгия, артериальная гипотония, тахикардия, брадикардия, кровотечение, аллергические реакции (включая анафилактический шок).

Взаим.: Риск кровотечения усиливается при сочетанном назначении с антикоагулянтами, антиагрегантами.

Примен. и доз.: В/в капельно, при остром инфаркте миокарда - 1,5 млн МЕ в течение одного часа. Интракоронарно, болюсно 20000 МЕ, с последующей инфузией в течение 30-90 мин со скоростью 2000-4000 МЕ/мин. Долговременный тромболитиз: начальная доза - 250000 МЕ/30 мин, поддерживающая - 100000 МЕ/ч, если тромбиновое время через 16 ч еще превышает четырехкратное нормальное значение, то следует вводить удвоенную поддерживающую дозу в течение нескольких часов вплоть до снижения тромбинового времени; длительность лечения зависит от клинической эффективности, однако она не должна превышать 12 ч при тромбозах центральной артерии глаза и 5 дней при любых других показаниях. Кратковременный тромболитиз при тромбозах периферических артерий или вен: вводят начальную дозу - 250000 МЕ/30 мин, затем в течение 6 ч поддерживающую - 1,5 млн. МЕ/ч. Локальный тромболитиз: интраартериально - 1000-2000 МЕ, курсовая доза не должна превышать 120000 МЕ. После каждого сеанса локального тромболита следует проводить дополнительное долговременное лечение гепарином (во избежание ретромбирования).

Произв.: Behringwerke (Германия)

Стрептонитол (Streptonitolum)

Сост. и ф.в.: 100 г мази содержат стрептоцида 5 г и нитазола 2 г в гидрофильной эмульсионной основе; в тубах по 30 и 150 г или в банках по 30, 100 и 1800 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Гнойные раны, ожоги II-IV степени, пролежни, трофические язвы, диабетическая гангрена, рожистое воспаление, дерматиты, пиодермия, угри.

Противопоказ.: Раны с обильной гнойной экссудацией.

Поб. действ.: В отдельных случаях возможны чувство жжения, незначительная болезненность.

Примен. и доз.: Местно, нанести тонким слоем на пораженную поверхность и наложить стерильную повязку - 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется динамикой заживления пораженной поверхности.

Произв.: Алтайвитамины (Россия)

Стрептоцид (Streptocidum)

Сульфаниламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфаниламида 0,3 или 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Инфекции кожи, дыхательных путей, ЛОР-органов, мочевыводящих путей, раневые инфекции (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания кроветворной системы, почечная недостаточность, тиреотоксикоз.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 0,5-1,0 г 5-6 раз в день; высшая разовая доза - 2 г, суточная - 7 г; детям до 1 года - по 0,05-0,1 г на прием, от 2 до 5 лет - по 0,2-0,3 г, от 6 до 12 лет - по 0,3-0,5 г. При глубоких ранах вносят в полость раны в виде тщательно измельченного простерилизованного порошка (5-15 г), одновременно назначая антибактериальные препараты внутрь.

Предост.: При длительном лечении следует периодически проводить анализы крови.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Стресс формула 600 (Stress formula 600)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит альфа-токоферола 30 мг, аскорбиновой кислоты 600 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, тиамин 15 мг, рибофлавина 15 мг, никотинамида 100 мг, пиридоксина гидрохлорида 5 мг, цианокобаламина 12 мкг, биотина 45 мкг и пантотеновой кислоты 20 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов, стимуляция окислительно-восстановительных реакций, интенсификация белкового, жирового, углеводного обмена.

Показ.: Профилактика и лечение патологических состояний, развившихся в результате влияния стрессовых факторов (умственные и психоэмоциональные нагрузки, физическое перенапряжение, резкое изменение климатических условий или часовых поясов, смена сезонов года), профилактика, лечение и реабилитация после респираторных заболеваний, повышение иммунитета в период эпидемий гриппа.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз.

Поб. действ.: Не наблюдались при соблюдении дозировки (1 таблетка в день).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день.

Произв.: U.S. Quality Drug (США)

Стресс формула с железом (Stress formula with Iron)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит альфа-токоферола 30 мг, аскорбиновой кислоты 600 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, тиамин 15 мг, рибофлавина 15 мг, никотинамида 100 мг, пиридоксина гидрохлорида 12 мкг, цианокобаламина 12 мкг, биотина 45 мкг, пантотеновой кислоты 20 мг, железа фумарата 27 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и железа в организме, стимуляция окислительно-восстановительных процессов, интенсификация белкового, жирового, углеводного обмена.

Показ.: Профилактика железодефицитных состояний при потере крови, физических перегрузках, неблагоприятных воздействиях, работе в горячих цехах, геморрое, обильных менструациях, в период реконвалесценции после тяжелых инфекций или хирургических вмешательств.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз.

Поб. действ.: Не наблюдались при соблюдении дозировки (1 таблетка в день).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день.

Произв.: U.S. Quality Drug (США)

Стресс формула с цинком (Stress formula with Zinc)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит альфа-токоферола 30 мг, аскорбиновой кислоты 600 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, тиамин 20 мг, рибофлавина 10 мг,

никотинамида 100 мг, пиридоксина гидрохлорида 5 мг, цианокобаламина 12 мкг, биотина 45 мкг, пантотеновой кислоты 25 мг, меди оксида 3 мг, цинка сульфата 23,9 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение недостатка витаминов и микроэлементов, стимуляция окислительно-восстановительных реакций; повышение уровня гемоглобина в крови (медь); стимуляция синтеза гормонов (включая половые), белков и соляной кислоты, снижение содержания углекислого газа в крови (цинк).

Показ.: Тяжелые заболевания, состояния после хирургического вмешательства и травм, физические перегрузки на фоне психоэмоционального стресса в сочетании с нерациональным питанием.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки.

Произв.: U.S. Quality Drug (США)

Строфантин-Г (Strophantin-G)

Убаин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит убаина 0,25 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Положительное инотропное, отрицательное хроно- и дромотропное, угнетение Na-K АТФ-азы миокардиоцитов.

Клин. фарм.: Действие начинается через 3-10 мин после инъекции, достигает максимума в течение 1/2-2 ч и сохраняется 1-3 дня.

Показ.: Сердечная недостаточность (III-IV стадии по NYHA), суправентрикулярная тахикардия, мерцание и трепетание предсердий (мерцательная тахисистолическая аритмия).

Противопоказ.: Интоксикация сердечными гликозидами, острый инфаркт миокарда, АВ блокада II и III степени, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия и констриктивный перикардит, синдром каротидного синуса.

Поб. действ.: Аритмия, тошнота, рвота, понос, брыжеечный инфаркт; головная боль, слабость, бессонница, депрессия, галлюцинации, психозы, расстройства зрения, гинекомастия. При быстром в/в введении - брадиаритмия, тахикардия (вентрикулярная), АВ-блокада, остановка сердца.

Примен. и доз.: В/в медленно - 250 мкг (1 ампула), затем в дозе 100 мкг в час до общей дозы - 1 мг за 24 ч.

Предост.: С осторожностью используют при вентрикулярной тахикардии, синдроме преждевременного возбуждения желудочков, торакальной аневризме аорты, брадиаритмии, нарушениях проведения возбуждения, тяжелой недостаточности функции почек и печени, гипотиреозе, гипокалиемии, гиперкальциемии, гипомагниемии, у больных пожилого возраста.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Структум (Structum)

Сост. и ф.в.: 1 желатиновая капсула содержит хондроитин сульфата натрия 250 мг; в упаковке по 60 шт.

Фарм. действ.: Участие в построении основного вещества костной и хрящевой тканей, стимуляция регенерации и подавление дегенерации хрящевой ткани, обезболивающее, противовоспалительное.

Показ.: Артрозы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, запивая небольшим количеством воды. Взрослым - по 3 капсулы 2 раза в день в течение первых 3 нед, далее - по 2 капсулы 2 раза в день. Детям до 1 года - по 1 капсуле, от 1 до 5 лет - по 2 капсулы, старше 5 лет - от 2 до 4 капсул в день.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Струмель (Strumeel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Spongia D3 150 мг, Calcium jodatum D4 90 мг, Acidum silicicum D4, Fucus vesiculosus D4 по 30 мг (1 таблетка содержит 9,3 мкг йода); в упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Протиреоидное.

Показ.: Заболевания щитовидной железы с пониженной секреторной функцией (диффузный зоб, последствия облучения); недостаток йода в организме; атеросклероз, коронарный склероз, вспомогательная терапия при гипертонии, ожирении, крупе.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к йоду.

Поб. действ.: Симптоматика тиреотоксикоза (тахикардия, потливость, раздражительность, потеря массы тела и т.д.).

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Предост.: При лечении пациентов с заболеваниями щитовидной железы необходим постоянный врачебный контроль.

Произв.: Heel (Германия)

Стугерон (Stugeron)

Циннаризин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циннаризина 25 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Церебровасодилатирующее, улучшение мозгового кровообращения, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Нарушения мозгового кровообращения (головокружение, шум в ушах, головная боль сосудистого генеза, нарушения памяти и др.), лабиринтные расстройства, мигрень (профилактика приступов), нарушения периферического кровообращения (болезнь Рейно, акроцианоз, перемежающаяся хромота, трофические нарушения и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сухость во рту, диспепсия, холестатическая желтуха, потливость, увеличение массы, сонливость, головная боль, экстрапирамидные нарушения, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект усиливают (взаимно) антидепрессанты, препараты, угнетающие ЦНС, алкоголь.

Примен. и доз.: Внутрь по 25 мг 3 раза в день; при нарушениях периферического кровообращения - 50-75 мг 3 раза в день; максимальная суточная доза - 225 мг/сутки. Детям назначают половину дозы для взрослых.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Сукламат (Suclamate®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит цикламата натрия 60 мг и сахараина натрия 6 мг.

Фарм. действ.: Подслащивающее.

Показ.: Необходимость ограничения приема углеводов (диабет, ожирение, некоторые сердечно-сосудистые заболевания и т.д.).

Противопоказ.: Неизвестны.

Поб. действ.: Неизвестны.

Примен. и доз.: 1 таблетка (эквивалентна одной чайной ложке сахара) или более (по вкусу) добавляется к чаю (или другим блюдам).

Произв.: CTS (Израиль)

Сукрат (Sucrat)

Сукральфат*

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с 5 мл геля для приема внутрь содержат сукральфата 1 г; в упаковке по 30 шт.

Фарм. действ.: Гастропротекторное, противоязвенное, образование защитного комплекса на поверхности язвы.

Показ.: Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; острый и хронический гастрит; гастродуоденит; раздражение слизистой оболочки желудка при приеме лекарственных препаратов, содержащих салицилаты, кортизон и др., изжога; гастропатия и рефлюкс-эзофагит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Редко - запоры.

Взаим.: Инактивирует тетрациклин (связывает с образованием сложной соли), может изменять биодоступность других препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, натошак, за 1 ч перед едой или перед сном, гель запивают водой или др. жидкостью. В начальной дозе - 1 пакетик геля 2 раза в день; для поддерживающей терапии - 1 пакетик геля в день (лучше вечером).

Предост.: С осторожностью следует назначать больным с почечной недостаточностью, при беременности. Рекомендуются двухчасовой интервал между приемом сукральфата и др. лекарственных средств.

Произв.: Lisapharma (Италия)

Сулотрим (Sulotrim®)

Ко-тримоксазол

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфаметоксазола 400 мг и триметоприма 80 мг; в упаковке 20, 100 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Обострение хронического бронхита у взрослых, энтероколит, острое воспаление среднего уха у детей, пневмоцистная пневмония, особенно у больных с ослабленным иммунитетом (включая больных СПИДом), диарея путешественников, инфекции мочевых путей, мягкий шанкр, паховая гранулема и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к сульфамидам (включая фуросемид, тиазидовые диуретики, производные сульфонилмочевины, ингибиторы карбоангидразы) или триметоприму, дискразии крови, мегалобластная анемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, почечная и печеночная недостаточность, порфирия, возраст до 2 мес (но не при врожденном токсоплазмозе и пневмоцистной пневмонии).

Поб. действ.: Дискразия крови, гепатит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, кристаллурия, гематурия, нарушение функции щитовидной железы, интерсти-

циальный нефрит, тубулярный некроз, метгемоглобинемия, фотосенсибилизация, аллергические реакции (повышение температуры, зуд, кожная сыпь).

Взаим.: Вытесняет из связи с белками и повышает эффективность (и/или токсичность) оральных антикоагулянтов, противодиабетических средств и метотрексата. Замедляет метаболизм и увеличивает содержание в плазме противосудорожных средств (гидантоинов).

Примен. и доз.: Внутрь, запивая водой, взрослым и детям (с массой тела выше 40 кг) - 800 мг сульфаметоксазола и 160 мг триметоприма каждые 12 ч; максимальная суточная доза - 3200 мг сульфаметоксазола и 640 мг триметоприма. При пневмоцистозе - 18,75-25 мг/кг сульфаметоксазола и 3,75-5 мг/кг триметоприма каждые 6 ч. Детям (с массой тела до 40 кг) - 20-30 мг сульфаметоксазола и 4-6 мг триметоприма на 1 кг каждые 12 ч. При пневмоцистозе детям назначают 18,75-25 мг/кг сульфаметоксазола и 3,75-5 мг/кг триметоприма каждые 6 ч. Курс лечения при хроническом бронхите - не менее 10-14 дней, при шигеллезе - 5 дней, при остром воспалении среднего уха у детей - 10 дней, при пневмоцистозе - 21 день. При инфекциях нижнего отдела мочевого тракта - 4 таблетки однократно или в течение 1-3 дней; при инфекциях верхнего отдела мочевого тракта курс лечения - 14 дней и более. У больных с пониженной функцией почек доза зависит от клиренса креатинина: более 30 мл/мин - обычная доза, 15-30 мл/мин - 1/2 обычной дозы, менее 15 мл/мин - не назначать. При приеме сулотрима взрослым необходимо обеспечить диурез не менее 1200-1500 мл в день.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Сульпирид (Sulpirid)

Сульпирид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит сульпирида 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антидепрессивное, антипсихотическое, противорвотное, блокада D₂-рецепторов дофамина.

Показ.: Острый и хронический шизофренный психоз, острый делириозный психоз, психогенная (невротическая) и инволюционная депрессии, невроз, головокружение центрального и периферического происхождения (вертебрально-базилярная недостаточность, вестибулярный неврит, болезнь Меньера, травма головы, воспаление среднего уха),

язва желудка и двенадцатиперстной кишки (как вспомогательное средство).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, феохромоцитома, острое отравление алкоголем, снотворными и анальгезирующими средствами; эпилепсия, гиперпролактинемия, лактация, в период беременности применяют только по строгим показаниям.

Поб. действ.: Ревертирующая гиперпролактинемия (галакторея, аменорея, гинекомастия, импотенция, фригидность), увеличение массы тела, потливость, сухость во рту; заторможенность, сонливость, экстрапирамидный синдром, дискинезия, ортостатическая гипотензия, злокачественный нейролептический синдром (гипертермия и др.).

Взаим.: Производные морфина, H₁-гистаминоблокаторы, барбитураты, бензодиазепины, транквилизаторы, клонидин и алкоголь могут усиливать седативный эффект. Повышает вероятность ортостатической гипотензии при совместном назначении с гипотензивными средствами. Несовместим с леводопой (взаимный антагонизм).

Примен. и доз.: При психотических состояниях назначают 800-1600 мг в сутки в 2-3 приема. При невротических состояниях - 400-600 мг в сутки в 2-3 приема. При головокружении - 150-300 мг в сутки в 2-3 приема, при необходимости дозу увеличивают; курс - не менее 14 дней. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки - 150 мг в сутки в 2-3 приема. Суточная доза для детей составляет 5-10 мг/кг массы тела. Пожилым назначают сниженные дозы.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)

Сульфадиметоксин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфадиметоксина 0,2 или 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Острые респираторные заболевания, ангина, бронхит, пневмония, гайморит, отит, менингит, дизентерия, воспалительные заболевания желче- и мочевыводящих путей, раневая инфекция, пиодермия, гонорея, трахома, рожистое воспаление.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к сульфаниламидам.

Поб. действ.: Головная боль, диспепсия, лихорадка, кожные высыпания, лейкопения.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 раз в сутки, в 1-й день - 1-2 г, затем - по 0,5-1 г/сутки; детям - по 25 мг/кг/сутки в первый день и 12,5 мг/кг/сутки - в последующие.

Предост.: Во время лечения следует регулярно проводить анализы крови и мочи.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Томский химфармзавод (Россия)

Сульфален (Sulfalenum)

Сульфален*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфалена 0,2 г; в упаковке по 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное, бактериостатическое.

Фармакокин.: После однократного введения длительно (более 24 ч) циркулирует в организме.

Показ.: Инфекции органов дыхания, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей, гнойные инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, головная боль, лейкопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. При острых инфекциях в первый день - 1 г, затем - по 0,2 г в сутки. При хронических инфекциях - 1 раз в 7-10 дней в разовой дозе 2 г.

Произв.: Акрихин (Россия)

Сульфаргин® (Sulfargin®)

Сульфадиазин*

Сост. и ф.в.: 50 г мази содержат серебряной соли сульфазина 0,5 г и мазевой основы до 50 г; в алюминиевых тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное, противогрибковое.

Фармакодин.: Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода кандиды и дерматофитов. Бактерицидный эффект обусловлен освобождающимися при гидролизе серебряной соли сульфазина ионами серебра и дополняется бактериостатическим эффектом сульфазина. Мазь обладает умеренной осмотической активностью.

Показ.: Раны (в т.ч. длительно незаживающие), трофические язвы, пролежни, ожоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глубокие гнойные раны и ожоги с обильной экссудацией, беремен-

ность, лактация; противопоказан недоношенным новорожденным и детям до 3 мес.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, жжение, боль на месте аппликации, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Местно, после хирургической обработки раны и удаления некротических тканей на поврежденную поверхность наносят тонким слоем (2-4 мм) мазь (под повязку или открытым способом). Повязку меняют 1-2 раза в день или реже. Максимальная разовая доза препарата - 300 г. Длительность лечения - до 3 нед.

Предост.: При применении мази на обширной поверхности следует контролировать функцию почек, печени, содержание форменных элементов крови. Следует назначать больным обильное щелочное питье. При местном применении возможно всасывание с поврежденной поверхности до 1% ионов серебра и 10% сульфазина.

Произв.: Таллинский фармацевтический завод (Эстония)

Сульфацил натрия (Sulfacylum-natrium)

Сульфацетамид*

Сост. и ф.в.: 20 и 30% глазные капли; в полиэтиленовых флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Конъюнктивиты, блефариты, гнойные язвы роговицы и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местное раздражение.

Взаим.: Новокаин, дикаин снижают бактериостатический эффект.

Примен. и доз.: Инстилляци в конъюнктивальный мешок, взрослым - 2-3 капли 30% раствора 3 раза в день, детям - 10-20% раствор.

Произв.: Фармак (Украина)

Сульфodeкортэм (Sulfodecortemum)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит серы осажденной 0,1 г и гидрокортизона ацетата 0,004 г; в тубах по 25 г.

Фарм. действ.: Кератолитическое, антипаразитарное, противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Себорея, розовые угри, псориаз волосистой части головы (прогрессирующая и стационарная стадии), чесотка, осложненная дерматитом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Эритема и зуд (требуют отмены препарата).

Примен. и доз.: Местно, мазь наносят тонким слоем, слегка втирая в пораженный участок кожи 2 раза в день на протяжении 5-14 дней. В случае необходимости через 5-7 дней курс лечения повторяют. При псориазе волосистой части головы препарат наносят после мытья головы с мылом. При розовых угрях мазь применяют после обработки кожи антисептическими растворами.

Произв.: Нижфарм (Россия)

Сульфокамфокаин (Sulfocamphocainum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит 200 мг комплексного соединения сульфокамфорной кислоты и новокаина основания; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Аналептическое.

Показ.: Острая сердечная и дыхательная недостаточность, кардиогенный и анафилактический шок.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в острых случаях в/в (струйно или капельно) - по 2 мл раствора 2-3 раза в день.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при введении препарата больным с низким АД.

Произв.: ICN Полифарм (Россия)

Сульфокамфокаин® (Sulfocamphocain®)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит кислоты сульфокамфорной (в пересчете на безводную) 0,0992 г и новокаина-основания 0,1008 г; в коробке из картона по 10 шт.

Фарм. действ.: Аналептическое.

Показ.: Кардиогенный и анафилактический шок, острая и хроническая дыхательная и сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к новокаину, беременность.

Поб. действ.: Диспептические явления, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Парентерально, по 2 мл (0,2 г), при необходимости 2-3 раза в сутки. При кардиогенном и анафилактическом шоке - в/в медленно. При хронической сердечной и дыхательной недостаточности вводят п/к или в/м в течение

20-30 дней. Максимальная суточная доза для взрослых - 1,2 г (12 мл).

Предост.: Следует соблюдать осторожность у больных с низким АД.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Сумамед® (Sumamed)

Азитромицин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит азитромицина 125 или 500 мг; в упаковке 6 и 3 шт. соответственно.

1 капсула - 250 мг; в упаковке 6 шт.

5 мл сиропа или сиропа форте - 100 или 200 мг соответственно; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей (в т.ч. пневмонии, бронхит), ЛОР-органов (ангина, синусит, тонзиллит, средний отит), кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично-инфицированные дерматозы), урогенитального тракта (гонорейный и негонорейный уретрит и/или цервицит), скарлатина, болезнь Лайма (начальная стадия - мигрирующая эритема).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Нарушения ЖКТ: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, понос, транзиторное повышение активности ферментов печени, сыпь.

Взаим.: Всасывание снижают антациды (рекомендуется перерыв не менее 2 ч между приемом).

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды или через 2 часа после еды 1 раз в день. Взрослым - при инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей - по 500 мг ежедневно в течение 3-х дней (курсовая доза - 1,5 г); при острых урогенитальных инфекциях - по 1 г однократно (2 таблетки по 500 мг); при болезни Лайма - по 1 г (2 таблетки по 500 мг) в 1-й день и по 500 мг ежедневно со 2-го по 5-й день (курсовая доза - 3 г). Детям с массой тела более 10 кг - по 10 мг/кг массы тела ежедневно в течение 3-х дней (курсовая доза - 30 мг/кг).

Произв.: Pliva (Хорватия)

Суметролим (Sumetrolim®)

Ко-тримоксазол

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфаметоксазола 400 мг и триметоприма 80 мг; в упаковке 20 шт.

1 флакон со 100 мл сиропа для детей -

сульфаметоксазола 2500 мг и триметоприма 500 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей (бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония, тонзиллит, синусит, фарингит), ЖКТ, желчевыводящих путей (энтерит, брюшной тиф, паратиф, дизентерия, холецистит, холангит), кожи и мягких тканей (пиодермия, фурункулез, абсцесс, раневая инфекция), почек и мочевыводящих путей (гонококковый уретрит, простатит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночно-почечная недостаточность, анемия, лейкопения, беременность (первый триместр и предродовой период), лактация, детский возраст (до 6 нед).

Поб. действ.: Слабость, головная боль, гастралгия, анорексия, тошнота, рвота, нарушение функции печени, лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Взаим.: Вытесняет из связи с белками плазмы крови и усиливает эффект антикоагулянтов, оральных гипогликемизирующих препаратов метотрексата. Концентрацию в крови повышают нестероидные противовоспалительные средства.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды 2 раза в день, начальная доза - 2 таблетки, поддерживающая - 1 таблетка. Детям от 1 года до 2 лет - по 1/4 таблетки или 1 мл сиропа; от 2 до 6 лет - 1/2 таблетки или 6-8 мл сиропа; от 7 до 12 лет - по 1/2-1 таблетке или 8-16 мл сиропа 2 раза в день после еды.

Предост.: Грудным детям до 3-месячного возраста препарат можно назначать только в исключительных случаях.

Произв.: Egis (Венгрия)

Суппозитории ректальные с эвкалимином (Suppositoria rectales cum Eucalimino)

Суппозитории вагинальные с эвкалимином (Suppositoria vaginales cum Eucalimino)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий ректальный или вагинальный содержит эвкалимина 0,05 г.

Фарм. действ.: Антимикробное, противовоспалительное.

Показ.: Острые и хронические гнойно-воспалительные заболевания слизистых оболочек и мягких тканей в гинекологии, урологии и проктологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: В гинекологической практике - вагинально и ректально ежедневно (исключая дни менструаций); курс лечения - от 5-10 до 20-25 дней. В проктологии - 1-3 раза в сутки ежедневно в течение 1-4 нед, в зависимости от формы и течения заболевания. В урологической практике - суппозитории вводят 1-3 раза в сутки ректально или вагинально, курс лечения - 10-15 дней и более в зависимости от характера заболевания. Возможны повторные курсы лечения.

Произв.: Нижфарм (Россия)

Супрадин Рош (Supradyn® Roche)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит витамина А 3333 МЕ, витамина В₁ 4,5 мг, витамина В₂ 5,1 мг, витамина В₆ 6 мг, витамина В₁₂ 6 мкг, витамина С 180 мг, витамина D₃ 200 МЕ, витамина Е 10 мг, биотина 0,3 мг, фолиевой кислоты 0,2 мг, никотиамида 57 мг, пантотеновой кислоты 21 мг, кальция 50 мг, магния 40 мг, фосфора 50 мг, хрома 10 мкг, меди 0,4 мг, железа 3,6 мг, марганца 0,5 мг, цинка 3 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов и микроэлементов.

Показ.: Недостаточное поступление витаминов в организм: длительное лечение ожирения, специальные диеты, желудочно-кишечные заболевания (например, синдром мальабсорбции), хронический алкоголизм; повышенная потребность в витаминах: острые и хронические заболевания, период выздоровления, послеоперационный период, во время и после лечения антибиотиками и химиотерапевтическими средствами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипервитаминоз А и/или D, гиперкальциемия, почечная недостаточность; одновременный прием других препаратов, содержащих витамины А и/или D, период лечения системными ретиноидами.

Поб. действ.: Расстройство пищеварения, пожелтение мочи (обусловлено рибофлавином), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 шипучей таблетке в день (если нет других указаний). Шипучую таблетку (содержит 300 мг натрия, что соответствует примерно 750 мг поваренной соли) растворяют в стакане воды. Больным на бессолевой диете рекомендуется вместо шипучих таблеток назначать капсулы или таблетки, покрытые оболочкой.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Супрастин (Suprastin®)

Хлорпирамин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит хлорпирамина гидрохлорида 25 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 20 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антигистаминное, седативное, блокада H₁-гистамино- и м-холинорецепторов.

Показ.: Аллергический конъюнктивит, вазомоторный ринит, крапивница, сенная лихорадка, отек Квинке, сывороточная болезнь, бронхиальная астма, экзема, аллергодерматозы.

Поб. действ.: Вялость, сонливость, головокружение, расстройства координации, снижение реакции, сухость во рту, гастралгия.

Взаим.: Усиливает эффект препаратов, угнетающих ЦНС. Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 25 мг 3-4 раза в день во время еды; детям от 1 до 12 мес - по 6,25 мг (1/4 таблетки), от 1 года до 6 лет - по 8,33 мг (1/3 таблетки), от 7 до 14 лет - по 12,5 мг (1/2 таблетки) 2-3 раза в день. В/м, взрослым - по 1-2 мл.

Произв.: Egis (Венгрия)

Сургам (Surgam®)

Тиапрофеновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или суппозиторий для взрослых содержат тиапрофеновой кислоты 300 мг; таблетки в упаковке по 40 шт.

1 таблетка или суппозиторий для детей содержат тиапрофеновой кислоты 100 мг.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, заболевания и повреждения околосуставных мягких тканей (капсулит, бурсит, эпи-

кондилит, фиброзит и др.), боль в нижней части спины, послеоперационный болевой синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе в анамнезе), бронхиальная астма (провоцируемая препаратами, подавляющими синтез простагландинов), выраженные нарушения функций почек и/или печени.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, боль в эпигастрии, диарея, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения, изменение функциональных проб печени, приступы бронхиальной астмы, шум в ушах, головокружение, гипотония, задержка натрия и воды, тромбоцитопения, фотосенсибилизация, зуд, сыпь.

Примен. и доз.: Таблетки: взрослым - по 300 мг 2 раза в сутки во время еды; детям (старше 3 лет) - 10 мг/кг/сутки в 2-3 приема. Суппозитории: взрослым - по 1 суппозиторию (300 мг) 2 раза (утром и вечером) или однократно на ночь; детям - по 1 суппозиторию (150 мг) 2-3 раза в день. Курс лечения - от 3 до 5 дней.

Произв.: Roussel Uclaf (Франция)

Сустанк форте (Sustac forte)

Нитроглицерин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка форте содержит нитроглицерина 0,0064 г; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, сосудорасширяющее, вазодилатирующее, гипотензивное.

Показ.: Стенокардия (профилактика приступов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипотония, кровоизлияние в мозг, черепно-мозговая гипертензия, глаукома, стеноз устья аорты.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, покраснение лица, ощущение жара, гипотония, тахикардия.

Примен. и доз.: Внутрь (не разжевывая). Дозы подбираются индивидуально. Суточная доза составляет 20-80 мг в зависимости от тяжести ИБС, суточную дозу делят на 3-4 приема.

Произв.: Акрихин (Россия)

Таблетки витаминов В₁, В₂, С (Tablets with vitamins В₁, В₂, С)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиамина бромид 6,45 мг, рибофлавина 5 мг и кислоты аскорбиновой 100 мг.

Фарм. действ.: Компенсация дефицита витаминов.

Показ.: Гиповитаминозы.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по одной таблетке 3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Тавегил® (Tavegil®)

Клемастин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит клемастина (в форме кислой fumarатовой соли) 1 мг.

1 мл раствора для инъекций - 1 мг; в ампулах по 2 мл.

5 мл сиропа - 0,5 мг; во флаконах по 60 и 100 мл.

Фарм. действ.: Антигистаминное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Таблетки: аллергические риниты (в т.ч. сенная лихорадка), крапивница, кожный зуд, зудящие дерматозы, экзема, контактные дерматиты, кожные реакции, обусловленные приемом лекарственных препаратов или укусами насекомых. Раствор для инъекций: анафилактический или анафилактоидный шок, ангионевротический отек; профилактика и лечение аллергических или псевдоаллергических реакций (введение рентгеноконтрастных средств, переливание крови, применение гистамина для диагностических целей).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 1 года).

Бер. и корм. гр.: Только по абсолютным показаниям.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, боли в области желудка, головные боли, головокружение, слабость, седация или стимуляция (особенно у детей) ЦНС, кожные высыпания; в очень редких случаях после в/в введения возможны одышка, шок.

Взаим.: Усиливает эффект седативных, снотворных, ингибиторов МАО, алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером). В тяжелых случаях суточную дозу увеличивают до 6 таблеток. Детям от 6 до 12 лет - по

1/2-1 таблетке перед завтраком или перед сном; от 1 года до 6 лет рекомендуется сироп. В/в медленно (в течение 2-3 мин) или в/м - в разовой дозе 2 мл утром или вечером. Детям - в/м в суточной дозе 0,025 мг/кг в два приема. Для профилактики аллергических реакций - в/в медленно 2 мл непосредственно перед возможной анафилактической реакцией.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при узкоугольной глаукоме, стенозирующей язве желудка, обструктивных явлениях в пилорической и дуоденальной области, гипертрофии предстательной железы (сопровождающейся задержкой мочеиспускания), обструктивных явлениях в шейке мочевого пузыря. Необходимо предупредить больного о снижении скорости реакции (водители транспортных средств, работающие с машинами и механизмами). Нельзя вводить в/а.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Тазоцин (Tazocin)

Сост. и ф.в.: 1 флакон с сухим веществом для инъекций содержит пиперациллина 4 или 2 г и тазобактама 500 или 250 мг соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакодин.: Активен в отношении (в т.ч., продуцирующих бета-лактамазу), грамотрицательных аэробных бактерий (*E.coli*, *Citrobacter*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Proteus*, *Pseudomonas aeruginosa* и др. *Pseudomonas*, *N.gonorrhoeae*, *Haemophilus inf.*), грамположительных стрептококков (*S.pneumoniae*, *S.pyogenes*, *S.bovis*, *S. группы С и G*); энтерококков (*E.faecalis*, *E.faecium*), стафилококков (*St.aureus*, *St.epidermidis*), анаэробных микроорганизмов (*Bacteroides*, *Bact.fragilis*, *B.ovatus*, *Fusobacter*).

Показ.: Инфекции (среднетяжелого и тяжелого течения) нижних отделов дыхательных путей, интраабдоминальные, кожи и мягких тканей (в т.ч. целлюлит, абсцесс, инфицированные трофические язвы), органов малого таза (в т.ч. эндометрит); бактериальная инфекция у пациентов с нейтропенией; септицемия; тяжелые инфекционно-воспалительные заболевания до идентификации возбудителя.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к цефалоспорином и другим пенициллинам).

Бер. и корм. гр.: Допустимо. При беременности используют строго по показаниям, во время лактации - с осторожностью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, эритема); редко - транзиторное повышение в крови печеночных трансаминаз, щелочной фосфатазы.

Примен. и доз.: В/в медленно, в течение 30 мин (2 г пиперациллина и 250 мг тазобактама растворяют в 5 мл физиологического раствора или 5% раствора декстрозы или стерильной воды для инъекций). Взрослым и детям старше 12 лет - по 2,25 г каждые 6 ч или по 4,5 г каждые 8 ч (средняя суточная доза - 12 г пиперациллина и 1,5 г тазобактама); больным, находящимся на гемодиализе, назначают по 2,25 г каждые 8 ч. Курс - 7-10 дней.

Предост.: Лечение рекомендуется прекратить при появлении симптомов нарушения гипокоагуляции.

Произв.: Wyeth-Lederle (США)

Тайлед (Tilade®)

Недокромил*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит недокромила натрия 2 мг; во флаконе по 56, 82 и 112 доз.

Фарм. действ.: Противоастматическое, противоаллергическое, противовоспалительное, уменьшение высвобождения гистамина, лейкотриена C₄, простагландина D₂ и других биологически активных веществ из тучных клеток.

Фармакокин.: После ингаляции оседает на стенках бронхиального дерева. 5% введенной дозы попадает в системный кровоток. Незначительное количество (2-3%) впоследствии абсорбируется из ЖКТ. Связь с белками плазмы - до 89%. Не метаболизируется, выводится из организма в неизмененном виде с мочой (около 70%) и калом (около 30%).

Клин. фарм.: Обладает большей эффективностью при легких и среднетяжелых формах астмы. Улучшает ночную симптоматику и снижает потребность в дневном назначении бронхорасширяющих препаратов.

Показ.: Заболевания дыхательных путей с обратимой обструкцией: бронхиальная астма различного генеза, астматический бронхит, астма физических усилий, бронхоспастические реакции, вызываемые рядом стимулов, таких как холодный воздух, вдыхаемые аллергены, атмосферные загрязнения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст до 12 лет.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью назначают в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Головная боль, кашель, бронхоспазм, тошнота, рвота, боль в животе, другие диспептические нарушения.

Взаим.: Совместим с пероральными и ингаляционными формами стимуляторов бета-адренергических рецепторов и кортикостероидами, теофиллином и другими производными метилксантина, а также ипратропиумом бромидом (при всех подобных комбинациях возможен эффект потенцирования).

Передоз.: Вероятность передозировки крайне низка. В случае ее развития проводится симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Взрослым (включая лиц пожилого возраста) и детям старше 12 лет начальная доза - 2 ингаляции (4 мг) 4 раза в сутки. При необходимости доза препарата может быть увеличена до 2 ингаляций 6-8 раз в сутки. Дополнительный прием может быть непосредственно перед физической нагрузкой для профилактики астмы физического действия. По достижении адекватного контроля за симптомами заболевания возможен переход на поддерживающую терапию по 2 ингаляции 2 раза в сутки. Терапевтический эффект развивается к концу первой недели приема препарата.

Предост.: Необходим регулярный ежедневный прием. Не применяют для купирования остро развившегося приступа удушья.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Таксол (Taxol®)

Паклитаксел*

Сост. и ф.в.: 1 (однодозовый) флакон с 5 мл концентрата для приготовления раствора для инъекций содержит паклитаксела 30 мг; в упаковке 1 и 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитотоксическое.

Показ.: Метастазирующая карцинома яичника.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нейтропения (менее 1500 клеток/куб.мм), беременность, лактация.

Поб. действ.: Угнетение функции костного мозга (нейтропения, лихорадка, лейкопения, тромбоцитопения, анемия), тяжелые аллергические реакции (одышка, загрудинные боли, тахикардия, гипотония); брадикардия; периферические нейропатии, судороги, артралгии, миал-

гии; инфекции (мочевых и верхних дыхательных путей, сепсис); алоpecia; тошнота, рвота, диарея, мукозиты, нарушение функции печени.

Примен. и доз.: В/в, по 135 мг/кв.м поверхности тела, инфузия в течение 24 ч с интервалом в 3 нед. Повторное введение возможно при содержании нейтрофилов в периферической крови не менее 1500 клеток/куб.мм, а тромбоцитов - не менее 100000 клеток/куб.мм. Перед употреблением содержимое флакона следует развести (0.9% раствором хлорида натрия, 5% раствором глюкозы и др.) до концентрации 0,3-1,2 мг/мл. Для профилактики реакции гиперчувствительности у всех больных до введения препарата проводят премедикацию: дексаметазон внутрь по 20 мг за 12 и 6 ч, дифенгидрамин в/в - 50 мг и циметидин в/в - 300 мг (или ранитидин - 50 мг) за 30-60 мин.

Предост.: Во время лечения необходим регулярный контроль картины крови. С осторожностью назначают пациентам с выраженными нарушениями функции печени. Женщинам детородного возраста (во время лечения) рекомендуется эффективная контрацепция. Для введения препарата не рекомендуется использовать инфузионные системы из поливинилхлорида. Растворы следует готовить и хранить в стеклянных, полипропиленовых и полиолефиновых системах, вводить через системы с внутренней поверхностью из полиэтилена.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Таксотер (Taxotere®)

Доцетаксел*

Сост. и ф.в.: Флакон с концентратом для приготовления инфузионного раствора содержит доцетаксела 20 (0,5 мл) или 80 (2 мл) мг, растворитель - раствор этанола 13% в воде для инъекций, соответственно 1,5 или 6 мл. Флаконы 7 или 15 мл в комплекте с растворителем; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое цитостатическое; нарушение фазы митоза и межфазных процессов в опухолевых клетках, накопление тубулина в микротрубочках.

Фармакокин.: После однократного в/в введения (100 мг/кв.м поверхности тела) средняя C_{max} в плазме - 3,7 мкг/мл, средние величины системного клиренса и равновесного объема распределения - 21 л/ч/кв.м и 113 л соответственно. Связь с белками плазмы - 90%. Около 6% введенной дозы выводится с

мочой и 75% - с калом, главным образом, в виде метаболитов.

Показ.: Рак (в т.ч. метастатический) молочной железы, немелкоклеточный рак легкого.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нейтропения (менее 1500 клеток/куб.мм).

Поб. действ.: Нейтропения, тромбоцитопения, анемия; тошнота, рвота, диарея, стоматит (редко), гипотония, гиперстезии, боли, бронхоспазм (редко), отеки (после 4-5 циклов лечения), алоpecia, артралгия, миалгия, астения, увеличение уровня трансаминаз и билирубина в сыворотке крови, аллергические реакции.

Взаим.: Совместим с другими цитостатиками.

Примен. и доз.: В/в, медленно (в течение 1 ч) в дозе 100 мг/кв.м поверхности тела каждые 3 нед. Концентрат разводят прилагаемым растворителем (стабильность при температуре 15-25 град.С до 6 ч и до 24 ч при 2-8 град.С). Полученный раствор разводят в 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы. При развитии на фоне лечения серьезных побочных реакций дозу препарата уменьшают до 50-75 мг/кв.м.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Тактивин (Tactivinum)

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 1 мл стерильного раствора для инъекций в изотоническом физиологическом растворе содержит тактивина 100 мкг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Иммуномодулирующее.

Фармакодин.: Нормализует количественные и функциональные показатели Т-системы иммунитета, стимулирует продукцию лимфокинов, в т.ч. альфа- и гамма-интерферона, восстанавливает активность Т-киллеров, функциональную активность стволовых гемопоэтических клеток.

Показ.: Иммунодефицитные состояния с преимущественным поражением Т-системы иммунитета, возникающие при инфекционных, гнойных и септических процессах, лимфопролиферативных заболеваниях (лимфогранулематоз, лимфолейкоз), рассеянном склерозе, туберкулезе, псориазе и др.

Противопоказ.: Атопическая форма бронхиальной астмы, беременность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: П/к (обычно в верхнюю треть плеча) 1 раз в день (на ночь)

из расчета 40 мкг/кв.м поверхности тела (1-2 мкг/кг) в течение 5-14 дней. При необходимости курсы лечения повторяют. Одноразовая доза для взрослого человека - 1 мл (100 мкг); детская - 50 и 25 мкг.

Произв.: Биомед им. И.И.Мечникова (Россия)

Талеум (Taleum®)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля содержит кромогликата натрия 1 или 5 мг; в баллонах по 200 и 100 доз соответственно.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, стабилизация мембраны тучных клеток.

Показ.: Атопическая бронхиальная астма, астматический бронхит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхоспазм, первый триместр беременности, лактация, возраст (до 5 лет).

Поб. действ.: Раздражение слизистой ротовой полости, сухость и неприятный вкус во рту, тошнота, кашель, бронхоспазм.

Примен. и доз.: Ингаляционно, по 2 мг (2 ингаляции), в тяжелых случаях - по 5 мг 4 раза в день (не более 8), при необходимости - 6-8 ингаляций в день. Аэрозольный баллон перед употреблением необходимо взбалтывать; держать его следует в вертикальном положении - клапан вниз.

Произв.: Egis (Венгрия)

Тальцид (Talcid®)

Гидроталцит*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гидроталцита (алюминий-магний гидроксикарбонат гидрат) 500 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

10 мл суспензии для приема внутрь - 1000 мг, в пакетиках (саше) по 10 мл; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, гастропротективное, связывание пепсина.

Показ.: Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, диспептические расстройства.

Противопоказ.: Нарушение выделительной функции почек, беременность, детский возраст (до 6 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Жидкий стул, учащение дефекации.

Взаим.: Снижает всасывание тетрациклинов, препаратов железа, производных кумарина, хенодесоксихолевой кис-

лоты, циметидина и дигоксина (все они должны назначаться на 1-2 ч раньше или позже). Устраняет токсическое действие НПВС на ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, через 1-2 ч после еды, если нет особых предписаний - 1-2 таблетки перед сном, при появлении желудочных жалоб, диспепсии - по 500-1000 мг (детям - по 250-500 мг) 4 раза в день (или при появлении симптомов - боль, изжога и т.п.). При пептической язве - 1000-2000 мг 4 раза в день в течение не менее 4 нед. Детям 6-12 лет назначают 1/2 взрослой дозы.

Произв.: Bayer (Германия)

Тамицин (Tamicin®)

Цефпирамид*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефпирамида натрия 1 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: Равномерно распределяется по тканям, создавая терапевтические концентрации. Накапливается в желчи, где создается высокий уровень (энтерогепатическая циркуляция). $T_{1/2}$ - 4,5 ч. Терапевтическая концентрация (50 мкг/мл) сохраняется на протяжении 12-24 ч (после внутривенного введения 1 г). Выводится с мочой - 22% введенной дозы за сутки.

Показ.: Тяжелые бактериальные инфекции, смешанные анаэробно-аэробные инфекции: дыхательных путей, гепатобилиарной зоны, органов малого таза, кожи и мягких тканей, костей, септицемия, эндокардит, перитонит, менингит, инфицированные раны и ожоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая печеночно-почечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Безопасность не доказана, поэтому применяют только по строгим показаниям.

Поб. действ.: Диспепсия, псевдомембранозный колит, гранулоцитопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, повышение активности печеночных трансаминаз, повышение уровня креатинина. Редко - гиповитаминоз К, заболевание почек с олигурией, протеинурией, гематурией, аллергические реакции (крапивница, зуд, покраснение кожи, лихорадка, эозинофилия, отек Квинке, анафилактический шок).

Взаим.: Несовместим с алкоголем. Выведение снижается "петлевыми" диуре-

тиками. Нельзя смешивать в одном шприце с другими препаратами.

Примен. и доз.: В/в, струйно или капельно (в течение 30-60 мин), в/м - в суточной дозе 1-4 г (в два приема); детям - 30-150 мг/кг в сутки (в 2-3 приема). В качестве растворителя при в/в введении используются вода для инъекций (1 г в 10 мл воды), глюкоза или физиологический раствор, при в/м - 0,5% раствор лидокаина.

Предост.: С осторожностью назначают препарат новорожденным, пациентам с выраженными нарушениями функции печени и почек, с аллергическими реакциями на пенициллины и другие бета-лактамы в анамнезе. Может обусловить ложноположительную реакцию при определении сахара в моче и положительный прямой тест Кумбса.

Произв.: Lek (Словения)

Тамоксен (Тамохен®)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тамоксифена цитрата 10 или 20 мг; в упаковке 30, 60, 100 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы (главным образом в постменопаузном периоде).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности. Во время лечения следует обеспечивать надежную контрацепцию.

Поб. действ.: Потеря аппетита, тошнота, рвота, приливы, головокружение, головная боль, депрессия; периферические отеки, тромбоцитопения, лейкопения, анемия, редко - гиперкальциемия. У больных, получающих исключительно высокие дозы в течение длительного времени, возможно появление офтальмологических реакций (снижение остроты зрения, помутнение роговицы, ретинопатия).

Взаим.: Усиливает гепатотоксичность аллопуринола; эффект производных кумарина.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10-20 мг 2 раза в день.

Предост.: Необходимо контролировать содержание кальция в крови (особенно при метастазировании в кости). Высокий уровень (гиперкальциемия) требует прекращения лечения. С осторожностью назначать пациентам с лейкопенией или тромбоцитопенией (необходимо периодически производить полный анализ крови).

Произв.: CTS (Израиль)

Тамоксифен (Tamoxifen)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тамоксифена цитрата 10 или 20 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы (эстрогензависимый), ановулярное бесплодие, некоторые виды мужского бесплодия.

Поб. действ.: Диспепсия, головокружение, отеки, лейкопения, тромбоцитопения, гиперкальциемия, кератопатия, ретинопатия, дисменорея, приливы, метроррагия, зуд вульвы, обратимое кистозное набухание яичников.

Примен. и доз.: Внутрь, при раке молочной железы - по 10-20 мг 2 раза в день (на курс - 2,4-9,6 г); лечение следует продолжать в течение 1-2 мес после появления признаков регрессии процесса.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Тамоксифен (Tamoxifen)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тамоксифена 10, 20 или 40 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы, рак почки, меланома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Приливы, вагинальное кровотечение, отечность, зуд вульвы, головокружение, головная боль, тромбоцитопения, депрессия, тромбофлебит.

Взаим.: Несовместим с препаратами, содержащими эстрогены; применение с цитостатиками повышает риск тромбообразования.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20-40 мг в день за 1-2 приема в течение 2-3 лет.

Предост.: Следует иметь в виду, что Тамоксифен полностью прекращает менструации у женщин в предменопаузальном периоде. У больных с метастазами в кости возможно развитие гиперкальциемии на ранних стадиях лечения. Лактирующие женщины должны прекратить грудное вскармливание.

Произв.: Orion (Финляндия)

Тамоксифен Эбеве (Tamoxifen Ebewe)

Тамоксифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тамоксифена цитрата 10, 20, 30 или 40 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы, эндометрия, почки, саркома мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая тромбоцитопения, лейкопения, гиперкальциемия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, покраснение и сухость кожи, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, боли в костях и очагах поражения, зуд в области гениталий, вагинальные кровотечения, отечность, алопеция, нарушения зрения, тромбоэмболия, флебит. В очень редких случаях - изменения картины крови, увеличение яичников, нарушения (вплоть до прекращения месячных) менструального цикла.

Взаим.: Цитостатики повышают риск тромбообразования.

Примен. и доз.: Внутрь, запивая водой, по 0,01-0,02 г 2 раза в день, в течение 2-3 лет.

Предост.: До начала лечения больные должны пройти гинекологическое (для исключения беременности) и терапевтическое обследование; женщинам детородного возраста необходимо использовать надежные контрацептивные средства (не оральные), причем контрацепция должна продолжаться в течение 3 мес. после окончания курса. При лечении следует периодически контролировать содержание кальция в крови, картину крови (лейкоциты, тромбоциты). Особая осторожность и тщательное наблюдение необходимы за больными с патологией почек, сахарным диабетом, офтальмологическими заболеваниями и тромбоэмболическими нарушениями (даже в анамнезе).

Произв.: Ebewe (Австрия)

Танакан (Tanakan®)

Гинко Билоба экстракт стандартизованный Egb 761

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или 1 мл раствора для приема внутрь содержат 40 мг стандартизованного экстракта листьев Ginkgo biloba (Egb 761). Таблетки в упаковке 30 шт, раствор во флаконах по

30 мл в комплекте с регулятором объемной дозы.

Фарм. действ.: Венотонизирующее, антиагрегационное, противоотечное, улучшение микроциркуляции, снижение проницаемости сосудов, нормализация мозгового и периферического кровообращения и метаболизма в мозге.

Фармакодин.: Стандартизированный и титрированный растительный препарат, действие которого обусловлено характером его влияния на процессы обмена веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию, а также на вазомоторные реакции кровеносных сосудов. Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом и глюкозой. Обладает вазорегулирующим действием на всю сосудистую систему: артерии, вены, капилляры. Способствует улучшению кровотока, препятствует агрегации эритроцитов (anti-sludge effect), оказывает тормозящее влияние на фактор активации тромбоцитов (anti-PAF effect). Нормализует метаболические процессы, оказывает антигипоксическое действие на ткани. Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Оказывает выраженное противоотечное действие как на уровне головного мозга, так и на периферии. Воздействует на высвобождение, повторное поглощение и метаболизм нейромедиаторов (норадреналина, допамина, ацетилхолина) и на их способность к соединению с мембранными рецепторами.

Показ.: Дисциркуляторная энцефалопатия различного генеза (последствия инсульта, черепно-мозговых травм, в старческом возрасте), проявляющаяся расстройствами внимания и/или памяти, снижением интеллектуальных способностей, чувством страха, нарушениями сна; нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции, в т.ч. артериопатии нижних конечностей, синдром Рейно; нейросенсорные нарушения (головокружение, звон в ушах, гипоакузия, старческая дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия).

Противопоказ.: Не установлены.

Поб. действ.: Возможны расстройства пищеварения, головная боль, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 1 таблетке или 1 мл раствора 3 раза в сутки. Первые признаки улучшения состояния появляются через 1 мес после начала лечения. Средняя продолжительность курса лечения - 3 мес.

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Таннакомп (Tannacompr®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит танина альбумината 500 мг и этакридина лактата 50 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Вяжущее, антимикробное, противовоспалительное, противодиарейное (нормализация консистенции кала).

Показ.: Профилактика и лечение неспецифических диарей: во время путешествий в странах с жарким климатом, при изменении характера питания, при внезапной перемене климатических условий, при острых заболеваниях ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности с осторожностью.

Поб. действ.: Окрашивание кала в желтый цвет (обусловлено этакридином), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь (таблетки перед приемом измельчают), до или во время еды, с достаточным количеством воды. Для профилактики - по 1 таблетке дважды в сутки, для лечения - по 1 таблетке 4 раза в день; детям в возрасте 6-14 лет - по 1 таблетке 3-4 раза в день, 1-6 лет - по 1/2 таблетки 4 раза в день, детям грудного возраста (до 3 мес) - по 1/2 таблетки 2-3 раза в день. Лечение заканчивают с прекращением диареи.

Предост.: Следует прекратить прием, если температура тела повышается или в течение 3 дней эффекта нет.

Произв.: Knoll (Германия)

Тантум Верде (Tantum Verde)

Бензидамин*

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для полоскания рта и горла содержат бензидамина гидрохлорида 150 мг; во флаконах по 120 мл.

1 доза аэрозоля (0,17 мл) - 0,255 мг; во флаконах по 30 мл.

1 таблетка для рассасывания - 3 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное нестероидное, анальгезирующее, местноанестезирующее, антибактериальное.

Фармакодин.: Обезболивающий эффект длится 1,5 ч.

Клин. фарм.: Спрей показан пожилым или послеоперационным больным (при неспособности проводить полоскание).

Показ.: Воспалительные болезненные состояния рта и горла: фарингит, афтозные язвы, гингивит, стоматит, тонзиллит, посттонзиллэктомические состояния; воспаления слизистой рта после радио- и химиотерапии, хирургических вмешательств.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, возраст до 12 лет (для применения раствора); фенилкетонурия (для таблеток).

Поб. действ.: Онемение тканей, чувство жжения в ротовой полости, сухость во рту, сонливость, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Раствор для наружного применения: полоскать горло или рот 15 мл (1 столовая ложка) раствора каждые 1,5-3 ч для облегчения боли; после полоскания раствор необходимо выплюнуть. Таблетки: по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Аэрозоль: взрослым и больным пожилого возраста - по 4-8 доз каждые 1,5-3 ч. Детям 6-12 лет - по 4 дозы, детям младше 6 лет - по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально - 4 дозы) каждые 1,5-3 ч.

Предост.: Непрерывное длительное (более 7 дней) лечение следует проводить под контролем врача.

Произв.: CSC (Италия)

Тантум Роза (Tantum Rosa)

Бензидамин*

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с порошком для приготовления раствора для наружного применения содержит бензидамина гидрохлорида 500 мг; в упаковке 10 шт.

1 одноразовый флакон-спринцовка со 140 мл раствора для наружного применения - 140 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Неспецифические вагиниты (до и после операции в вагинальной области, после лучевой терапии, при применении внутриматочных пессариев), грибковые и трихомонадные инфекции, воспаление в области "зева" матки, эстрогенная терапия при атрофированном влагалище в старческом возрасте.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно только после консультации с врачом.

Поб. действ.: Сухость во рту, сонливость, аллергические реакции.

Передоз.: Симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Наружно - вагинальное промывание. Использовать теплый рас-

твор 1-2 раза в день. Процедуру проводить лежа, жидкость должна оставаться во влагалище несколько минут. Раствор в спринцовках готов к употреблению. Порошок (1 пакетик) растворяют в 500 мл воды.

Произв.: CSC (Италия)

Тардиферон (Tardyferon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сульфата железа 256,3 мг, мукопротеозы 80 мг и аскорбиновой кислоты 30 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа, стимуляция кроветворения.

Показ.: Профилактика и лечение железодефицитной анемии, беременность, лактация, период интенсивного роста.

Противопоказ.: Состояния, сопровождающиеся повышенным содержанием железа в организме: гемолитическая анемия, гемосидероз, гемохроматоз или нарушение утилизации железа (апластическая анемия); возраст (до 10 лет).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, потемнение кала.

Взаим.: Несовместим с антацидами, производными тетрациклина и препаратами железа для парентерального введения.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до приема пищи - по 1-2 таблетки в день; беременным - по 1 таблетке в день в течение последних 6 мес беременности.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Таривид (Tarivid®)

Офлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит офлоксацина 200 мг; в упаковке 10 шт.

1 флакон 100 мл с раствором для инфузий - 200 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное, фторхинолон; блокада ДНК-гидразы, прекращение репликации ДНК.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью (95%) всасывается после приема внутрь, биодоступность - около 100%. C_{max} в плазме крови достигается через 30-60 мин. Высокие концентрации создаются в моче, слюне, мокроте, желчи, коже, тканях, экссудате и секрете предстательной железы. Период полувыведения 5-7 ч. До 90% препарата выводится почками в неизмененном виде.

Клин. фарм.: К препарату чувствительны синегнойная, гемофильная и кишеч-

ная палочки, шигеллы, сальмонеллы, менингококк, гонококк, стафилококки, продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу, легионеллы, микоплазмы, хламидии, микроорганизмы, продуцирующие бета-лактамазу, и др.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, брюшной полости (включая малый таз), почек и мочевыводящих путей, инфекции в акушерстве и гинекологии, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эпилепсия, возраст (до 18 лет), поражения ЦНС с пониженным судорожным порогом.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, нарушение сна, беспокойство, снижение реакции, временное повышение уровня билирубина и активности ферментов печени, фотосенсибилизация, аллергические реакции (кожная сыпь, отек лица и голосовых связок, удушье, шок).

Взаим.: Эффективность снижается (уменьшается резорбция) антацидами.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи, по 1 таблетке 2 раза в день; курс - 7-10 дней (не рекомендуется принимать в течение более 8 нед). При гонорее - 2 таблетки однократно. Максимальная суточная доза - 0,8 г. При сниженной почечной функции доза рассчитывается исходя из тяжести заболевания почек. При инфекциях тяжелого течения - в/в (капельно в течение 1 ч) 0,2 г на 5% растворе глюкозы.

Предост.: Возможно снижение скорости реакции (следует учитывать при управлении автомобилем).

Произв.: Hoechst (Германия)

Тартефедрель (Tartephedreel®)

Сост. и ф.в.: 100 г раствора для приема внутрь содержат Tartarus stibiatus D4, Hepatica nobilis D3, Atropa belladonna D4, Natrium sulfuricum D4, Arsenum jodatum D6 и Quebracho D5 по 10 г, Naphthalinum D6, Betonica D2, Anisum stellatum D3, Lobelia inflata D4, Ipecacuanha D4, Blatta orientalis D6, Medorrhinum-Nosode D8 и Ephedra distachya D3 по 5г, этанола около 35 об%; во флаконах по 30 или 100 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, спазмолитическое, противокашлевое.

Показ.: Воспалительные и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

Противопоказ.: Заболевания щитовидной железы.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, растворив в 100 мл воды 10 капель, 3 раза в день. Раствор выпивают медленно. При острых заболеваниях - в начале по 10 капель каждые 15 мин в течение 2 ч.

Произв.: Neel (Германия)

Тауредон (Tauredon®)

Натрий ауротиомалат*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 0,5 мл раствора для инъекций содержит ауротиомалата натрия 10 (Тауредон 10), 20 (Тауредон 20) или 50 (Тауредон 50) мг; в упаковке 1 или 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, иммунодепрессивное.

Показ.: Ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, псориатический артрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, поливалентная аллергия, анемия, панцитопения, нарушения функции почек, тяжелые поражения печени, активная форма туберкулеза легких, коллагенозы (системная красная волчанка, узелковый периартериит, склеродермия, дерматомиозит), язвенный колит, осложненные формы сахарного диабета, беременность, кормление грудью.

Поб. действ.: В период активной терапии: тахикардия, изменения ЭКГ по типу ишемии миокарда, кожная сыпь, головная боль, лихорадка, снижение АД, тошнота, боли в животе. Во время поддерживающей терапии: стоматит, алоpecia, протеинурия (редко нефротический синдром), нарушения функции печени, холестаза, нарушения гемопоэза (тромбоцитопения, лейкопения, анемия), фотосенсибилизация, дерматиты, кожный зуд.

Взаим.: Другие противоревматические средства увеличивают вероятность побочных эффектов.

Примен. и доз.: Глубоко в/м. Период насыщения: 2 инъекции в неделю, с 1-й по 3-ю инъекцию вводят по 10 мг (Тауредон 10), с 4-й по 6-ю инъекцию - 20 мг (Тауредон 20), с 7-й инъекции - либо 2 раза в неделю по 50 мг (Тауредон 50), либо 1 раз в неделю 100 мг (2 ампулы Тауредона 50). Эта доза должна сохраняться до достижения клинического эффекта, но не превышая суммарной дозы 1600 мг (максимально 2000 мг). Период

поддерживающей терапии: 100 мг препарата 1 раз в месяц или 50 мг 1 раз в 2 нед. Это лечение может продолжаться месяцы и годы. Детям назначают 0,7-1 мг/кг в неделю до достижения фазы насыщения. В фазе поддерживающей терапии вводят препарат в дозе 1 мг/кг 1-2 раза в месяц.

Предост.: Не рекомендуется применять в сочетании с аминохинолинами, Д-пеницилламином, малыми иммунодепрессантами, сульфасалазином.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Тауфон (Taufonum)

Таурин*

Сост. и ф.в.: 1 мл глазных капель содержит таурина 0,04 г; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Стимуляция регенерации и репарации, антикатарактное.

Показ.: Дистрофические поражения сетчатки у взрослых, в т.ч. наследственные тапеторетинальные абнотрофии; дистрофии и травмы роговицы; катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Местно. При катаракте (в течение 3 мес с повторением курсов через 1 мес) и травмах (в течение 1 мес) - в виде инстилляций по 2-3 капли 2-4 раза в сутки ежедневно. При тапеторетинальных абнотрофиях, дистрофических заболеваниях сетчатки и проникающих ранах роговицы - вводят под конъюнктиву по 0,3 мл раствора 1 раз в сутки в течение 10 дней; курс повторяют через 6-8 мес.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Тахистин (Tachystin®)

Дигидротахистерол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора в масле (примерно 24 капли) содержит дигидротахистерола 1 мг; во флаконах по 10 и 20 мл; в капсулах; в упаковке 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Регуляция обмена кальция.

Показ.: Гипопаратиреоидизм (идиопатический или послеоперационный), псевдогипопаратиреоидизм.

Противопоказ.: Гиперкальциемия, передозировка препаратов витамина D.

Поб. действ.: Гиперкальциемия (отсутствие аппетита, тошнота, рвота, понос, бледность, головные боли, сердцебие-

ние, жажда; при длительной - нарушение функции почек, склероз ткани сердца, легких или почек); нарушение пищеварения.

Взаим.: Несовместим с препаратами витамина D. Гиперкальциемию могут усиливать тиазиды, отмена тироксина.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды или натощак, с небольшим количеством жидкости (высокие дозы смешивают с пищей). Дозы устанавливают индивидуально (в зависимости от содержания кальция в сыворотке крови). Обычно суточная доза составляет 0,5-1,5 мг (соответствует 12-36 каплям).

Произв.: Ankerpharm (Германия)

Тегретол® (Tegretol®)

Карбамазепин*

Тегретол® ЦР (Tegretol® CR)

Карбамазепин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка или 1 таблетка-ретард содержит карбамазепина 200 и 400 мг; в упаковке 50 и 30 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противосудорожное.

Показ.: Эпилепсия (за исключением petit mal), маниакальные состояния, профилактика маниакально-депрессивных расстройств, алкогольная абстиненция, невралгия тройничного и языкоглоточного нервов, диабетическая нейропатия, несахарный диабет.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к трициклическим антидепрессантам), АВ-блокада, миелосупрессия или острая порфирия в анамнезе.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Головокружение, атаксия, умеренная лейкопения, диплопия, повышение уровня печеночных ферментов, рвота, тромбоцитопения, гипонатриемия, нарушение аккомодации, экфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, желтуха, гепатит, мультиорганные реакции гиперчувствительности замедленного типа, волчаночноподобный синдром, неврит, галлюцинации, возбуждение, депрессия, синдром Лайелла, нарушения кроветворения, анафилактическая реакция, АВ-блокада, застойная сердечная недостаточность, тромбоэмболии, остеомалация, дисфункция почек, интерстициальный нефрит, нарушение сексуальных функций.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - 100-1600 мг в сутки (в зависимости от показаний и выраженности заболеваний), детям - 10-20 мг/кг в сутки. Суточная доза разделяется на несколько приемов.

Предост.: Перед началом и в процессе лечения необходим регулярный контроль крови (клеточные элементы) и мочи, показателей функции печени. Требуется осторожность при наличии в анамнезе сведений о заболеваниях сердца, печени или почек, побочных гематологических реакциях, а также при повышенном внутриглазном давлении, латентных психозах, неадекватной реакции на внешние стимулы, возбуждении, заболеваниях, характеризующихся наличием судорог смешанного характера, у пациентов пожилого возраста, а также у водителей автотранспортных средств и лиц, эксплуатирующих механизмы. Следует избегать внезапного прекращения лечения.

Произв.: Novartis Pharma Services (Швейцария)

Телмокс (Thelmoх)

Мебендазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит мебендазола 100 мг; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Антигельминтное.

Показ.: Лечение кишечных инвазий (одиночные, смешанные) острицами (энтеробиоз, оксиуроз), власоглавами (трихоцефалез), аскаридами (аскаридоз), нематодами (анкилостомидоз, некатороз).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (боли в животе, тошнота, рвота, диарея), головная боль, звон в ушах, головокружение, лихорадка, нейтропения, лейкопения, зуд, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, разжевывая или глотая целиком. Взрослым (включая престарелых) и детям старше 2 лет: при энтеробиозе - по 1 таблетке (100 мг) однократно, при необходимости - повторно через 2-3 нед, рекомендуется одновременное лечение всех членов семьи; при трихоцефалезе, аскаридозе, анкилостомидозе, некаторозе - по 1 таблетке (100 мг), утром и вечером в течение 3 дней.

Предост.: Не рекомендуется назначать детям младше 2 лет. Прием во время лактации требует приостановки грудного вскармливания. Во избежание реинва-

зий необходимо строгое соблюдение гигиенического режима.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Тензиомин (Tensiomин®)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит каптоприла 12,5 или 25 мг; в упаковке 30 шт.;

50 или 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибирование АПФ.

Показ.: Артериальная гипертензия (эссенциальная, реноваскулярная, злокачественная), аутоиммунная нефропатия при коллагенозах, застойная сердечная недостаточность, кардиомиопатия, дифференциальная диагностика при реноваскулярной гипертензии и при синдроме Конна.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, лейкопения, тромбоцитопения, беременность, лактация.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Гипотония, тахикардия, сердцебиение, кардиалгия, анорексия, сухость и металлический вкус во рту, афты слизистой полости рта, диспепсия, головная боль, бессонница, парестезия, ларингоспазм, гипоплазия костного мозга, нейтропения, агранулоцитоз, повышение активности печеночных трансаминаз, азотемия, гиперкалиемия, протеинурия, псевдоположительная реакция на ацетон в моче.

Взаим.: Несовместим с калийсберегающими диуретиками. Усиливает эффект гипотензивных средств. Действие ослабляют НПВС.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды. При сердечной недостаточности начальная доза - 6,25 мг 2-3 раза в день. При артериальной гипертензии начальная доза - 12,5 мг 3 раза в день с постепенным увеличением при необходимости до 50 мг 3 раза в день. Максимальная суточная доза - 300 мг, при недостаточной выраженности гипотензивного действия комбинируют с другими гипотензивными препаратами. У больных с почечной недостаточностью требуется снижение суточной дозы, так при клиренсе креатинина от 40 до 21 мл/мин/кв.м - до 150 мг, от 20 до 11 - до 75 мг, ниже 10 - до 37,5 мг.

Произв.: Egis (Венгрия)

Теникам (Tenicam)

Теноксикам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит теноксикама 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгетическое, жаропонижающее.

Фармакокин.: Биодоступность 70-80%. После приема 1-2 капсул (20 или 40 мг) C_{max} в плазме достигается через 0,5-2 ч. Выводится через почки (2/3) и ЖКТ (1/3).

Показ.: Ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилоартрит, подагра, фиброзит, тендинит, тендовагинит, бурсит, люмбалгия, люмбаишиалгия, эпикондилит, травмы и воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения), "аспириновая" астма, выраженные нарушения функции почек.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, тошнота, изжога, боли и неприятные ощущения в животе, диарея, кожная сыпь, зуд, крапивница, эритема.

Взаим.: Снижает мочегонное действие диуретиков. Антацидные средства замедляют всасывание и уменьшают максимальные концентрации в плазме.

Примен. и доз.: Внутрь, по 20 мг (1 капсула) 1 раз в сутки (желательно в одно и то же время). При острых приступах подагры - по 40 мг 1 раз в сутки в течение первых дней, затем - по 20 мг 1 раз в сутки еще 5 дней.

Предост.: С осторожностью назначают больным с заболеваниями печени, почек, кровотечениями из ЖКТ в анамнезе, в послеоперационном периоде. Не следует комбинировать с другими противовоспалительными средствами, антикоагулянтами, пероральными антидиабетическими препаратами, триамтереном, солями лития.

Произв.: Slaviamed (Югославия)

Тенормин (Tenormin)

Атенолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит атенолола 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, селективная блокада бета₁-адренорецепторов.

Фармакодин.: Урежает ЧСС, снижает сократимость и возбудимость миокарда. Не проникает в ЦНС.

Показ.: Гипертония, сердечная астма, синусовая тахикардия, инфаркт миокарда.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, брадикардия, кардиогенный шок, гипотензия, метаболический ацидоз, АВ-блокада II и III степени, нарушение функции надпочечников.

Поб. действ.: Брадикардия, гипотония, охлаждение конечностей, слабость, сухость глаз, нарушение деятельности ЖКТ.

Взаим.: Осторожно сочетают с другими антиаритмическими средствами, верапамилом и прочими антагонистами кальция типа верапамила, инсулином, сульфонидами, гипотензивными средствами.

Примен. и доз.: Внутрь. Начальная и поддерживающая терапевтические дозы - 50-100 мг 1 раз в день.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Теопэк (Theopresum)

Теofilлин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка пролонгированного действия содержит теofilлина 0,3 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, бронхолитическое, диуретическое.

Показ.: Бронхоспастический синдром, бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, обструктивная эмфизема легких.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гиперфункция щитовидной железы, экстрасистолия, острый инфаркт миокарда, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, беспокойство, бессонница, гипотония, тахикардия, гастралгия.

Взаим.: Несовместим с барбитуратами и противосудорожными средствами, метилксантинами, эфедрином, фуросемидом, антибиотиками-макролидами, оральными противозачаточными средствами.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, запивая водой. В первые 1-2 дня - по 0,15 г 1-2 раза в день с интервалом 12-24 ч, затем дозу увеличивают - до 0,3 г 2 раза в день. Курс - 2-3 мес и более.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Теотард (Theotard®)

Теofilлин

Сост. и ф.в.: 1 капсула с микрогранулами пролонгированного действия содержит безводного теofilлина 100, 200 или 300 мг; в упаковке 20, 30, 60 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противоастматическое, бронхолитическое, расслабление гладких мышц.

Клин. фарм.: Терапевтическая концентрация теofilлина в сыворотке крови составляет 10-20 мкг/мл. При уровне 20-25 мкг/мл отмечаются побочные реакции, свыше 30 мкг/мл - симптомы передозировки.

Показ.: Бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких (при наличии обратимого бронхоспазма).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим производным ксантина).

Бер. и корм. гр.: При назначении во время беременности возможно возникновение повышенной возбудимости и тахикардии у новорожденного. Во время лактации - не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, головная боль, бессонница.

Взаим.: Не следует комбинировать с другими ксантинами, циметидином, макролидами.

Передоз.: Симптомы: потеря аппетита, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, возбуждение, раздражительность. Иногда первыми проявлениями могут быть конвульсии или вентрикулярная аритмия. При тяжелом отравлении (особенно у детей) могут развиваться эпилептоидные припадки без возникновения каких-либо предостерегающих признаков. Описаны случаи смерти. Лечение: при потенциальном отравлении без припадка следует вызвать рвоту (предпочтительно сиропом ипекакуаны), назначить слабительное и активированный уголь. При возникновении припадка обеспечить проходимость дыхательных путей и дать кислород. Если концентрация теofilлина в сыворотке превышает 50 мкг/мл, назначают активированный уголь в инфузии.

Примен. и доз.: Внутрь, через каждые 12 ч со стаканом воды натошак за 1/2-1 ч до или через 2 ч после еды (можно во время и сразу после еды). Если больной не в состоянии проглотить капсулу, ее можно вскрыть и содержимое принять с напитком или полужидкой пищей. Дозу подбирают индивидуально под контролем концентрации в крови (особенно при длительном применении или назначении

дозы выше обычной). Высшие разовые дозы для взрослых - 6,5 мг/кг, для детей до 9 лет - 12 мг/кг, 9-12 лет - 10 мг/кг, 12-16 лет - 9 мг/кг.

Предост.: Применять с осторожностью пациентам с нарушением функции печени или почек, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (даже в анамнезе), хронической сердечной недостаточностью, гипоксемией, артериальной гипертонией, гипертиреозом, новорожденным и пациентам старше 55 лет (особенно мужчинам). Дети обладают повышенной чувствительностью к стимулирующему влиянию теофиллина на ЦНС, что следует принимать во внимание при подборе и контроле дозы.

Произв.: CTS (Израиль)

Терален (Theralene®)

Алимемазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит алимемазина 5 мг; в упаковке 5, 50 или 500 шт.

1 ампула 5 мл с 0,5% раствором для инъекций - 25 мг; в упаковке 5 шт.

1 капля 4% раствора для приема внутрь - 1 мг; во флаконе 30 мл.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антигистаминное, спазмолитическое, адrenoлитическое, противорвотное, седативное, снотворное, противокашлевое.

Фармакокин.: Связь с белками плазмы - 20-30%. $T_{1/2}$ - 3,5-4 ч. Выводится в виде метаболита (сульфоксида), в основном с мочой. В течение 48 ч выводится 70-80%. Эффект развивается через 15-20 мин после введения и продолжается 6-8 ч.

Клин. фарм.: Наряду с нейролептическим оказывает "мягкое" успокаивающее и противотревожное действие без оттенка угнетенности, разбитости, подавленности.

Показ.: Неврозы и неврозоподобные состояния эндогенного и органического генеза с преобладанием сенестопатических, ипохондрических, обсессивно-фобических и психовегетативных расстройств. Психопатоподобные состояния с астеническими, психоастеническими и ананкастными расстройствами, тревожно-депрессивные состояния в рамках пограничных, эндогенных и сосудистых заболеваний, сенестопатические депрессии, соматизированные психические расстройства, состояния волнения и тревоги при соматических заболеваниях, нарушения сна различного генеза.

Противопоказ.: Закротоугольная глаукома, аденома предстательной железы, возраст до 1 года.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сонливость, мышечная слабость, сухость во рту, повышение вязкости бронхиального секрета, парез аккомодации, запоры, задержка мочеиспускания. Редко - экстрапирамидные расстройства (гипокинезия, акатизия, тремор).

Взаим.: Усиливает действие на ЦНС алкоголя, снотворных, наркотических анальгетиков и средств общего наркоза, антихолинэргических веществ - на м-холинорецепторы. Раствор для инъекций фармацевтически совместим с физиологическим раствором, 5% раствором глюкозы.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м, в/в. Суточная доза распределяется на 3-4 приема. При приеме внутрь назначают от 5-10 мг/сутки (снотворное действие) до 60-80 мг/сутки (анксиолитическое действие). При психотических состояниях возможно повышение дозы до 200-400 мг/сутки. Средняя суточная доза - 40-50 мг. Начальная доза для в/в капельного введения - 25 мг с дальнейшим постепенным повышением до 75-100 мг.

Предост.: Следует исключить употребление спиртных напитков. Пожилым пациентам необходимо уменьшать дозировку. В/м инъекции проводят только в положении лежа.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Тержинан (Tergynan®)

Сост. и ф.в.: 1 вагинальная таблетка содержит тернидазола 200 мг, неомицина сульфата 100 мг, нистатина 100000 ЕД и преднизолона метасульфобензоата натрия 3 мг, а также эксципиент, включающий масла герани и гвоздики до 1,2 г; в упаковке 6 и 10 шт.

Фарм. действ.: Противотрихомонадное, противогрибковое, антибактериальное, противовоспалительное.

Показ.: Бактериальные вагиниты, вызванные банальной пиогенной флорой; трихомонадные вагиниты, грибковые вагиниты, вызванные *Candida albicans*; вагиниты, вызванные смешанной инфекцией (трихомонадами, анаэробной инфекцией и дрожжеподобными грибами). Для профилактики развития инфекций: перед оперативным лечением гинекологических заболеваний; перед родами или абортom; до и после установки противозачаточной спирали; до и после диатермокоагуляции шейки матки; перед внутриматочными исследованиями (гистерография).

Поб. действ.: Кожные аллергические реакции (в отдельных случаях); очень редко - чувство жжения и местное раздражение (в начале лечения).

Примен. и доз.: По 1 вагинальной таблетке перед сном. Таблетку, смочив в воде в течение 20-30 с, глубоко ввести во влагалище, после чего полежать 10-15 мин. Средняя продолжительность непрерывного лечения - 10 дней. В случаях подтвержденного микоза продолжительность лечения должна увеличиться до 20 дней. Во время менструации лечение не прекращать.

Произв.: Laboratoires du Docteur E. Bouchara (Франция)

Терпинкод® (Terpincodum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кодеина 0,008 г, терпингидрата 0,25 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г; в контурной ячейковой упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противокашлевое, отхаркивающее.

Фармакодин.: Снижает возбудимость кашлевого центра (кодеин), способствует зашлачиванию и разжижению мокроты (гидрокарбонат натрия) и улучшению ее выведения (терпингидрат).

Показ.: Кашель различной этиологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 2 лет).

Взаим.: Усиливает (кодеин) действие анальгетиков, снотворных и седативных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Произв.: Томский химфармзавод (Россия)

Тестостерона пропионат (Testosteroni propionas)

Тестостерон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора в оливковом масле для инъекций содержит тестостерона пропионата 10 или 50 мг (1 или 5% раствор); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Андрогенное.

Показ.: Гипофункция половых желез у мужчин, климакс у мужчин, рак молочной железы, дисфункциональные метроррагии, климакс у женщин.

Противопоказ.: Рак предстательной железы.

Поб. действ.: Повышенное половое возбуждение, задержка солей и воды в организме, маскулинизация.

Примен. и доз.: В/м, п/к, по 1 мл ежедневно; высшая разовая доза 0,05 г, суточная - 0,1 г. Курс - несколько месяцев.

Произв.: ФармаДон (Россия)

Тетракок 05 (Tetracoq 05)

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций. В 1 дозе (0,5 мл) вакцины содержится очищенного дифтерийного анатоксина 1 вакцинальная доза, очищенного столбнячного анатоксина 1 вакцинальная доза, Bordetella pertussis минимум 4 МЕ, инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита 1-го типа 1 вакцинальная доза, инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита 2-го типа 1 вакцинальная доза, инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита 3-го типа 1 вакцинальная доза, гидроокиси алюминия в пересчете на Al максимум 1,25 мг, формальдегида максимум 0,1 мг, 2-фенолэтанола максимум 0,005 мл. Выпускается в шприцах по 1 дозе, в упаковке 1 и 20 шт.; во флаконах по 10 и 20 доз, в упаковке 10 шт. Одна вакцинальная доза дифтерийного анатоксина соответствует по меньшей мере 30 МЕ, при измерении протективной активности параллельно со стандартом ВОЗ или с другим стандартом, оттитрованным в соответствии с международным эталоном. Одна вакцинальная доза столбнячного анатоксина соответствует по меньшей мере 60 МЕ, при измерении протективной активности параллельно со стандартом ВОЗ или с другим стандартом, оттитрованным в соответствии с международным эталоном. Одна доза инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита типов 1, 2 и 3 соответствует количеству антигенов, удовлетворяющих нормам теста антигенной активности, описанного во французской и европейской фармакопеех.

Фарм. действ.: Формирование специфического иммунитета против дифтерийного и столбнячного токсинов, коклюшной палочки и вирусов полиомиелита.

Клин. фарм.: Иммунитет приобретается после 2-ой инъекции вакцины, усиливается при последующих введениях препарата и сохраняется не менее 5 лет. Сероконверсия к дифтерийному токсину наблюдается у 92-100% привитых, к столбнячному токсину - у 100%, к коклюшному токсину - у 93% и к вирусу полиомиелита - у 100%.

Показ.: Сочетанная профилактика дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей в возрасте от 2 мес до 4 лет.

Противопоказ.: Прогрессирующая энцефалопатия, сопровождающаяся судорогами или без таковых; выраженная реакция на предыдущее введение вакцины, содержащей коклюшный компонент: повышение температуры до 40 град.С и выше, синдром длительного плача, судороги, шок (в случае, если эти реакции возникли в течение 48 ч после введения вакцины).

Поб. действ.: Эритематозные высыпания и/или уплотнения в месте инъекции, повышение температуры тела (до 38-39 град.С) в первые 24-48 ч. Как правило, побочные реакции являются преходящими, особенно, если профилактически назначаются салицилаты, барбитураты или антигистаминные препараты. В очень редких случаях коклюшный компонент может вызвать неврологические реакции (судороги, энцефалит, энцефалопатия).

Примен. и доз.: Вакцина вводится п/к или в/м по следующей схеме: 1) первичная вакцинация, состоящая из трех инъекций (по 0,5 мл) с интервалом в 1 мес; 2) ревакцинация: 1 инъекция (0,5 мл) через 1 год после третьей инъекции первичного курса вакцинации. Препарат перед использованием необходимо тщательно взболтать. При проведении массовых вакцинаций вакцину можно вводить при помощи безыгольного инъектора типа IMOJET.

Предост.: Вакцинация должна быть отсрочена в случаях активной фазы любых заболеваний, особенно инфекционных. Наличие в анамнезе судорог, не связанных с предшествующим введением вакцины, не является противопоказанием к применению вакцины, содержащей коклюшный компонент, если у пациента не наблюдается прогрессирующей энцефалопатии. При проведении вакцинации таким пациентам может быть полезен профилактический прием антиконвульсантов и/или антипиретиков. Использовать с осторожностью в случае документированной аллергии к стрептомицину.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Тетурам (Teturamum)

Дисульфирам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дисульфирама 0,15 г; в контурной безъячейковой упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антиалкогольное, блокада алкогольдегидрогеназы.

Показ.: Хронический алкоголизм (при неэффективности других методов лечения).

Противопоказ.: Абсолютные: эндокринные заболевания, выраженный кардиосклероз, атеросклероз сосудов мозга. Относительные: остаточные явления органического поражения мозга, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, травматическая болезнь, ранее перенесенные тетурамовые психозы.

Поб. действ.: Расстройства функционирования (особенно при длительном применении) сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной систем, печени, ЖКТ (в т.ч. обострение заболеваний ЖКТ, сосудов), аллергические реакции (зуд, сыпь и др.), острые психозы (в отдельных случаях).

Примен. и доз.: Внутрь. Дозу подбирают индивидуально. Взрослым - по 0,25-0,5 г/сутки. В дозах ниже 0,15 г/сутки препарат быстро выводится из организма, не оказывая необходимого эффекта. Схема лечения: 1-ю тетурамалкогольную пробу проводят через 7-10 дней от начала лечения (после приема препарата утром в дозе 0,5-0,75 г больной выпивает 20-30 мл 40% этилового спирта или иного алкогольного напитка). Повторные пробы - в условиях стационара через 1-2 дня, в амбулаторных условиях - через 3-5 дней. При слабой реакции дозу алкоголя при последующих пробах увеличивают на 10-20 мл. Максимальная доза водки - 100-120 мл.

Предост.: Лечение следует проводить под стационарным наблюдением врача. До начала терапии необходимо тщательное обследование больного для выявления абсолютных противопоказаний.

Произв.: Борщаговский химфармзавод (Украина)

Тиакем (Tiakem)

Дилтиазем*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дилтиазема 60 мг; в упаковке 30 шт.

1 капсула ретард - 200 и 300 мг; в упаковке по 28 шт.

Фарм. действ.: Блокатор медленных кальциевых каналов, антиангинальное, антигипертензивное.

Показ.: Профилактика приступов стенокардии (в т.ч. - стенокардии Принцметала), артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Дисфункция синусного узла, АВ-блокада II-III степени у боль-

ных без искусственного водителя ритма; тяжелая брадикардия (40 ударов в мин или менее); левожелудочковая недостаточность с застойными проявлениями в легких.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Возможны (редко) - головная боль, приливы к лицу, отеки нижних конечностей, диспепсия, гастралгия, сухость во рту, локальное покраснение кожи (преимущественно простая эритема, реже - уртикарная или десквамативная), астения, сердцебиение. Эффекты, связанные с вазодилатацией (особенно отеки) дозозависимы и чаще бывают у пожилых больных. Крайне редко - брадикардия, синоатриальная или AV-блокада; повышение печеночных трансаминаз, обратимый гепатит.

Взаим.: Совместное использование Тиакема с циклоспорином, дигоксином, карбамазепином, теофиллином повышает их сывороточную концентрацию и риск побочных эффектов. Блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов (циметидин, ранитидин) способны повышать сывороточную концентрацию Тиакема. Не рекомендуется комбинировать Тиакем с антиаритмиками (особенно, амиодароном и бета-адреноблокаторами) из-за возможного потенцирования брадикардии, нарушений проводимости и кардиодепрессивного эффекта. Сочетание с альфа-адреноблокаторами и нитратами может усилить гипотензивный эффект (вплоть до обморока).

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, таблетки - 180 мг в сутки в 3 приема до еды. Максимальная суточная доза 360 мг. Капсулы-ретард - 1 капсула 1 раз в день (200 или 300 мг в зависимости от тяжести стенокардии или гипертонии, а также в зависимости от переносимости). Время приема капсул не имеет значения, но должно оставаться одним и тем же.

Предост.: У больных с брадикардией и AV-блокадой I степени, пожилых, а также больных с печеночной или почечной недостаточностью имеется риск усиления эффектов дилтиазема. С осторожностью следует назначать при проведении общей анестезии. Препарат может без ограничений применяться у больных с хроническими бронхолегочными заболеваниями. Тиакем не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Тиаприд (Tiapridum)

Тиаприд*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиаприда гидрохлорида 0,1 г; во флаконе 30 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, анальгетическое, блокада D₂-дофаминовых рецепторов.

Клин. фарм.: Антипсихотический эффект сочетается со стимулирующим, растормаживающим (в малых и средних дозах) или транквилизирующим (в больших дозах).

Показ.: Гиперкинетический и дискинетический синдром, острая и хроническая хорея, нервный тик, сенильная моторная неустойчивость, дрожание; головная боль нейрогенного происхождения, психомоторное возбуждение, расстройства поведения в пожилом возрасте и при алкоголизме, алкогольный психоз, абстинентные синдромы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первый триместр беременности и при лактации.

Поб. действ.: Сонливость, возбуждение, дискинезия, аменорея, галакторея.

Взаим.: Несовместим с алкоголем. Можно комбинировать с нейролептиками, антидепрессантами, наркотическими анальгетиками, противосудорожными средствами, клофелином.

Примен. и доз.: Внутрь, при психомоторном возбуждении, агрессивности по 200-300 мг в сутки в 2-3 приема; при гиперкинезах, дискинезии по 300-600 мг в сутки; при алкогольном и опиоидном абстинентных синдромах по 400-800 мг в сутки, при необходимости (в наркологии) по 1200-1800 мг в сутки.

Предост.: С осторожностью назначать пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью.

Произв.: Органика (Россия)

Тиапридал® (Tiapridal®)

Тиаприд*

Сост. и ф.в.: 1 делимая таблетка содержит тиаприда (гидрохлорида) 100 мг; в коробках 20 шт.

1 ампула с 2 мл инъекционного раствора - 100 мг; в коробке 12 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, блокада центральных D₂ дофаминовых рецепторов, анксиолитическое, анальгезирующее.

Показ.: Расстройства поведения (возбуждение, агрессивность), особенно у больных алкоголизмом; боли (интенсивные, некупирующиеся); дискинезии (спонтанная, поздняя, хорея Гентингтона).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, феохромоцитома (в т.ч. предполагаемая), лактация.

Поб. действ.: Злокачественный синдром (необъяснимая гипертермия) - требует отмены препарата, сонливость, дискинезия (ранняя, поздняя), экстрапирамидные симптомы, миорелаксация, ортостатическая гипотония, аменорея, галакторея, гиперпролактинемия, гинекомастия, импотенция, фригидность, увеличение массы тела.

Взаим.: Несовместим с алкоголем и леводопой. Может усиливать эффекты препаратов, угнетающих ЦНС, ингибиторов АПФ и др. гипотензивных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, при двигательных расстройствах - по 300-800 мг (3-8 таблеток) в день; при расстройствах поведения - взрослым - по 200-300 мг (2-3 таблетки) в день в течение 1-2 мес, при необходимости курс повторяют; детям старше 7 лет - по 100-150 мг в день (по 1/2 таблетки 2-3 раза в день), при необходимости дозу увеличивают - до 300 мг в день; некупирующиеся боли - 200-400 мг в сутки внутрь (2-4 таблетки) или в/м или в/в (2-4 ампулы). При делириозном (пределириозном) состоянии - в/м или в/в каждые 4-6 ч в суточной дозе - 400-1200 мг (до 1800 мг) (4-12 ампул).

Предост.: С осторожностью назначают больным с эпилепсией, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью, болезнью Паркинсона, при беременности, в пожилом возрасте, новорожденным, работающим с техникой и водителям. Необходимо постоянное наблюдение при комбинированном назначении со средствами, угнетающими ЦНС, гипотензивными препаратами, в т.ч. ингибиторами АПФ.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Тиберал (Tiberal®)

Орнидазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит орнидазола 500 мг; в упаковке 3 и 10 шт.

Фарм. действ.: Противопроtoзойное, антибактериальное.

Показ.: Трихомониаз (инфекции мочеполовых путей, вызванные *Trichomonas*

vaginalis); амебиаз (кишечные инфекции, вызванные *Entamoeba histolytica*, в том числе амебная дизентерия; внекишечный амебиаз, в том числе амебный абсцесс печени), лямблиоз; инфекции, вызванные анаэробными бактериями, профилактика при операциях на ободочной кишке и в гинекологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (I триместр), лактация.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, желудочно-кишечные расстройства, сенсорная или смешанная периферическая невропатии, расстройства ЦНС (дрожание, ригидность, нарушение координации движений, судороги, нарушение сознания).

Взаим.: В отличие от многих имидазолов совместим с алкоголем (не ингибирует альдегиддегидрогеназу). Усиливает эффект антикоагулянтов кумаринового ряда, пролонгирует миорелаксирующее действие векурония бромида.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды. При трихомониазе - по 1 таблетке утром и вечером в течение 5 дней. Детям назначают однократно 25 мг/кг массы тела в день. При амебной дизентерии - курс лечения 3 дня, взрослым и детям с массой тела свыше 35 кг назначают 3 таблетки однократно вечером, взрослым с массой тела свыше 60 кг - по 2 таблетки утром и вечером, детям с массой тела до 35 кг - по 40 мг/кг массы тела в сутки однократно. При всех формах амебиаза курс лечения - 5-10 дней, взрослым и детям с массой тела свыше 35 кг - по 1 таблетке утром и вечером, детям с массой тела до 35 кг - 25 мг/кг массы тела в один прием. При лямблиозе взрослым и детям с массой тела свыше 35 кг - 3 таблетки однократно вечером, детям с массой тела до 35 кг - 40 мг/кг однократно; курс лечения - 1-2 дня. При инфекциях, вызванных анаэробными бактериями, назначают 500 мг каждые 12 ч.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Тиенам (Tienam®)

Сост. и ф.в.: 1 флакон вместимостью 60 или 120 мл со стерильным порошком для приготовления раствора для в/в введения содержит имипенема 250 или 500 мг и циластатина натрия 250 или 500 мг соответственно. 1 флакон со стерильным порошком для приготовления раствора для в/м введения - 500 или 750 мг и 500 или 750 мг соответственно.

Фарм. действ.: Антимикробное широкого спектра, бактерицидное.

Клин. фарм.: Компонент состава - циластатин натрия тормозит метаболизм имипенема в почках и увеличивает его концентрацию в мочевыводящих путях. Пациентам с клиренсом креатинина 5 мл/мин/1,73 кв.м и меньше можно назначать, если каждые 48 ч проводится гемодиализ. Не показан для лечения менингита.

Показ.: Внутрибрюшные инфекции; инфекции нижних дыхательных путей, мочеполовой системы, костей и суставов, кожи и мягких тканей; септицемия; эндокардит; профилактика послеоперационных инфекций; смешанные инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 3 мес).

Бер. и корм. гр.: В период беременности назначается исключительно по жизненным показаниям. Во время лечения кормление грудью должно быть прекращено.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, изменение количественного содержания форменных элементов крови, повышение уровня печеночных ферментов; олигурия, анурия, полиурия, острая почечная недостаточность; миоклония, психические нарушения, спутанность сознания, эпилептические припадки; нарушение вкуса, местные реакции (эритема, боли и инфильтраты в месте введения, тромбофлебиты), псевдомембранозный колит, аллергические реакции (зуд, крапивница, лихорадка, анафилактический шок и др.).

Взаим.: Фармацевтически несовместим с другими антибиотиками. Возможна перекрестная аллергия с бета-лактамами (пенициллинами, цефалоспорины). С лактатами образует химическую связь и инактивируется.

Примен. и доз.: В/м и в/в. В/в в виде инфузии в течение 20-60 мин - по 250-1000 мг каждые 6-12 ч. Максимальная суточная доза - 4000 мг (50 мг/кг). Для профилактики послеоперационных инфекций взрослым в/в - 1000 мг при вводимой анестезии и 1000 мг через 3 ч. Детям, в том числе с массой тела менее 40 кг и при сепсисе - по 15 мг/кг каждые 6 ч (но не более 2000 мг). В/м взрослым - по 500 или 750 мг каждые 12 ч (до 1500 мг в сутки). При гонорейном уретрите или цервиците - однократно в/м в дозе 500 мг.

Предост.: В/м формы препарата не должны использоваться для в/в введения, а в/в - для в/м.

Произв.: MSD (США)

Тизамид (Tisamid®)

Пиразинамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит пиразинамида 500 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противотуберкулезное.

Показ.: Туберкулез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени.

Поб. действ.: Диспептические явления, поражение печени, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 30 мг/кг массы тела в сутки в 1-3 приема. Возможно - 90 мг/кг 1 раз в неделю или 2-2,5 г 3 раза в неделю, или 3-3,5 г 2 раза в неделю в зависимости от массы тела.

Произв.: Orion (Финляндия)

Тизерцин (Tisercin®)

Левомепромазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит левомепромазина 25 мг (в виде 33,8 мг левомепромазина малеата); в упаковке 50 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 25 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, противорвотное, блокада центральных дофамино-, м-холино- и периферических альфа-адренорецепторов.

Показ.: Психомоторное возбуждение, психозы, параноидно-галлюцинаторные синдромы, шизофрения, делирий, эпилепсия, олигофрения, ажитированная депрессия (в качестве вспомогательного средства), неврозы, бессонница, премедикация.

Противопоказ.: Застойная сердечная недостаточность, гипотония, печеночная недостаточность, гипоплазия костного мозга, гранулоцитопения, коматозные состояния на фоне интоксикации алкоголем, наркотиками и снотворными, беременность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Экстрапирамидные расстройства, головокружение, сонливость, снижение АД, ортостатическая гипотония, сухость во рту, запоры, нарушение функции печени, агранулоцитоз, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО (возбуждение ЦНС) и гипотензивными препаратами (чрезмерное снижение АД). Усиливает седативное и м-холинолитическое действие бензодиазепинов, снотворных, анальгетиков, общих анестетиков и трициклических антидеп-

рессантов. Снижает эффективность леводопы.

Примен. и доз.: Внутрь, при психозах начальная суточная доза (25-50 мг) увеличивается до 150-250 мг за 2-4 приема. После достижения терапевтического эффекта - постепенное снижение до поддерживающих доз. При неврозах начальная суточная доза - 12,5-25 мг с увеличением при необходимости до 75-100 мг за 2-4 приема. В/м, глубоко в мышцу, по 75-100 мг в сутки; в/в капельно, по 50-100 мг в сутки (растворив в 250 мл изотонического раствора натрия хлорида или растворе глюкозы). Во время лечения требуется соблюдение строгого постельного режима.

Предост.: Запрещается вождение транспорта. Несовместим с алкоголем. После лечения ингибиторами МАО необходим перерыв 3-6 нед.

Произв.: Egis (Венгрия)

Тиклид (Ticlid®)

Тиклопидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиклопидина гидрохлорида 250 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, антитромботическое.

Показ.: Ишемические заболевания сосудов головного мозга, ишемические кардиопатии, заболевания периферических артерий, сердечно-сосудистые осложнения у больных с перемежающейся хромотой (профилактика), ранняя ретинопатия при сахарном диабете (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, геморрагические диатезы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагический инсульт, заболевания крови, сопровождающиеся удлинением времени кровотечения, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз в анамнезе.

Поб. действ.: Геморрагические явления, агранулоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения, диарея, боли в животе, головокружение, холестатическая желтуха, повышение уровня печеночных трансаминаз, аллергические реакции.

Взаим.: Гепарин, антикоагулянты непрямого действия, ацетилсалициловая кислота повышают риск развития кровотечения.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, по 1 таблетке 1-2 раза в день. Возможно увеличение дозы до 4 таблеток в день, в этом случае лечение должно проводиться короткими курсами.

Предост.: При назначении высоких доз (3-4 таблетки в сутки) необходим контроль времени кровотечения.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Тиклид (Ticlid®)

Тиклопидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиклопидина гидрохлорида 250 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное, дезагрегантное, антиадгезивное, антитромботическое, понижение содержания в крови фактора IV и бетатромбоглобулина.

Показ.: Облитерирующие заболевания сосудов, инфаркт миокарда, субарахноидальное кровоизлияние, серповидноклеточная анемия, постгемотрансфузионный период.

Противопоказ.: Геморрагии, удлинение времени кровотечения, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острая фаза нарушения мозгового кровообращения, применение больших доз гепарина, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, боли в эпигастрии, диарея), кровотечения, изменения картины крови, холестатическая желтуха, сыпь.

Взаим.: Усиливает эффект пероральных антикоагулянтов (антагонистов витамина К), гепарина и НПВС (требуется осторожность и контроль времени кровотечения, т.к. повышается риск развития геморрагии).

Примен. и доз.: Внутрь, после или во время еды, обычная суточная доза - 1-2 таблетки (чаще по 1 таблетке 2 раза в день). Максимальная суточная доза - 4 таблетки, она может назначаться только в течение короткого периода и под наблюдением врача. При гемодиализе - по 1-2 таблетки в день в течение длительного периода (доза определяется в зависимости от состояния больного и дозы гепарина).

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Тимоглобулин (Thymoglobuline)

Сост. и ф.в.: В 1 флаконе с лиофилизатом для приготовления инъекционного раствора содержится кроличье антииммунитарное тимоглобулин для человека 25 мг, а также глицина 50 мг, хлорида натрия 10 мг, маннитола 50 мг. В комплекте с растворителем во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Иммунодепрессивное, специфическое иммунное связывание

кроличьих иммуноглобулинов с Т-лимфоцитами человека.

Показ.: Профилактика и лечение реакций отторжения при трансплантации органов (почек, сердца, поджелудочной железы, печени); синдром "трансплантат-против-хозяина", апластическая анемия.

Противопоказ.: Аллергия к кроличьим белкам, острые вирусные заболевания.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Повышение температуры, эритематозные и гнойничковые поражения кожи, тромбоцитопения, нейтропения, сывороточная болезнь; анафилактические реакции, сопровождающиеся снижением АД, развитием синдрома шокового легкого, лихорадкой и уртикарной сыпью (чаще развиваются во время или сразу после инфузии, как правило, первой).

Взаим.: Циклоспорин повышает риск развития чрезмерной иммунодепрессии. Несовместим с вакцинацией живыми вирусными аттенуированными вакцинами (увеличивается вероятность генерализованных системных инфекций). Препараты крови не должны вводиться одновременно с тимоглобулином. Тимоглобулин нельзя смешивать с другими растворами (особенно жировыми) в одной инфузионной системе.

Передоз.: Возможны лейкопения и тромбоцитопения. Длительное использование может вызвать тяжелые инфекции и увеличение частоты лимфом.

Примен. и доз.: Вводить (после разведения в физиологическом растворе) в крупную вену (предварительно - за 1 ч до инфузии в/в введение антигистаминных препаратов). Профилактика реакций отторжения трансплантата: 1,25-2,5 мг/кг в сутки в течение 1-3 нед при трансплантации почек, поджелудочной железы или печени и в течение 3-10 дней - при трансплантации сердца. Лечение острых реакций отторжения трансплантата и синдрома "трансплантат-против-хозяина": 2,5-5 мг/кг в сутки до клинического улучшения. Апластическая анемия: 2,5-5 мг/кг в сутки в течение 5 дней.

Предост.: Применяется под строгим врачебным контролем (в том числе и во время инфузии) и только у пациентов, находящихся в стационаре. Инфузия должна быть медленной и продолжительной (не менее 4 ч). При появлении анафилактических реакций (абсолютное противопоказание к дальнейшему применению) введение необходимо прекратить и назначить стероиды. Лечение от-

меняется, если уровень тромбоцитов снижается до 50 000/мкл. Мониторинг клеточного состава крови и функции почек должен проводиться в течение 2 нед после окончания курса.

Произв.: Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

Тимоптик (Timoptic®)

Тимолол*

Сост. и ф.в.: 1 флакон содержит 5 мл 0,25 или 0,5% раствора тимолола малеата.

Фарм. действ.: Противоглаукомное, бета-адреноблокирующее.

Фармакодин.: Действие развивается быстро, через 20 мин после аппликации, максимальное снижение внутриглазного давления наступает через 1-2 ч, сохраняется на протяжении 24 ч. Оказывает преимущественно местное действие, но после абсорбции может вызывать системные эффекты, характерные для бета-адреноблокаторов. Понижение внутриглазного давления (ВГД) обусловлено уменьшением образования водянистой влаги и умеренным повышением дренажной функции.

Клин. фарм.: Длительное применение препарата может сопровождаться снижением чувствительности к его действию. Однако, трехлетнее наблюдение за больными во время лечения не выявило достоверных различий ВГД после наступления начальной стабилизации.

Показ.: Повышенное внутриглазное давление: глазная гипертензия, глаукома (хроническая открытоугольная, вторичная, в сочетании с афакией, у детей - при неэффективности других противоглаукомных средств), узкий камерный угол, спонтанная или ятрогенная блокада угла противоположного глаза в анамнезе.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхиальная астма (в т.ч. в анамнезе) и др. хронические обструктивные заболевания легких, синусовая брадикардия, АВ-блокада II-III степени, сердечная недостаточность, кардиогенный шок.

Бер. и корм. гр.: При беременности возможно только при оценке вероятного риска и ожидаемого эффекта. В период лактации рекомендуется отмена препарата или прекращение кормления грудью.

Поб. действ.: Конъюнктивит, блефарит, кератит, снижение чувствительности роговицы; расстройства зрения (изменения рефракции, диплопия, птоз); бра-

дикардия, аритмия, гипотония, коллапс, сердечная блокада, остановка сердца, застойная сердечная недостаточность, боли в груди, пальпитация, нарушения мозгового кровообращения, ишемия мозга, головокружение, головная боль, тошнота, астения, депрессия, утомляемость, бронхоспазм, дыхательная недостаточность, одышка, кожные аллергические реакции: локальная и генерализованная сыпь, крапивница, алопеция, летальный исход (бронхоспазм, сердечная недостаточность).

Взаим.: При сочетанном назначении с норадреналином возможен мидриаз. Совместим (аддитивный эффект) с антагонистами кальция, бета- и альфа-адреноблокаторами (снижение внутриглазного давления, гипотония, выраженная брадикардия).

Примен. и доз.: Конъюнктивально, по 1 капле 0,25% раствора 2 раза в день (0,5% раствор применяют при необходимости повышения дозы); после стабилизации пониженного ВГД (в среднем через 4 нед) возможна инстилляционная по 1 капле 1 раз в день. При назначении тимоптика после других средств (исключая бета-адреноблокаторы) необходимо одновременное применение комбинации в течение 1 дня, на второй день ранее использовавшийся препарат полностью отменяют и продолжают лечение тимоптиком. Детям - 1 капля каждые 12 ч (на фоне других препаратов).

Предост.: Сердечная недостаточность должна быть адекватно компенсирована перед началом лечения и у таких больных следует постоянно контролировать сердечно-сосудистую систему. При закрытоугольной глаукоме препарат может использоваться только в сочетании с миотиком (для раскрытия угла камеры). С осторожностью назначают при ношении мягких контактных линз (на них может откладываться консервант, входящий в состав препарата): инстилляцию производят без линз, и надевать линзы можно только через 15 мин (лучше использовать тимоптик без бензалкония хлорида). С особой осторожностью назначают пациентам, имевшим в анамнезе тяжелые анафилактические реакции, т.к. на фоне бета-адреноблокаторов (при повторном контакте с аллергенами) могут развиваться еще более выраженные реакции.

Произв.: MSD (США)

Тимоптик-депо (Timoptic-depo®)

Тимолол*

Сост. и ф.в.: 1 мл гелевого раствора содержит тимолола малеата 2,5 или 5 мг; во флаконах по 2,5 мл.

Фарм. действ.: Противоуглаукомное, бета-адреноблокирующее.

Клини. фарм.: Действие развивается быстро - через 20 мин после закапывания. Максимальное снижение внутриглазного давления наблюдается через 2-4 ч, эффект продолжается 24 ч.

Показ.: Повышенное внутриглазное давление: глазная гипертензия, глаукома (хроническая открытоугольная, вторичная, в сочетании с афакией, с узким углом передней камеры, со спонтанным или ятрогенным узкоугольным смыканием в противоположном глазу).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, бронхиальная астма (в т.ч. в анамнезе) и др. хронические обструктивные заболевания легких, синусовая брадикардия, АВ-блокада II-III степени, выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью (по жизненным показаниям).

Поб. действ.: Затуманивание зрения (в течение 1/2-5 мин после закапывания), боль, жжение, саднение, зуд и ощущение инородного тела в глазу, слезотечение и усиление выделений из глаза, конъюнктивит, блефарит, кератит, нарушения зрения, диплопия, птоз; поскольку препарат может всасываться из конъюнктивального мешка в системное кровообращение, не исключены головная боль, головокружение, брадикардия, сердечная блокада, остановка сердца, гипотония, обмороки, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность, бронхоспазм, астения, миастения, депрессия, тошнота; аллергические реакции.

Примен. и доз.: Конъюнктивально, по 1 капле 1 раз в день (при необходимости более выраженного эффекта используют 0,5% раствор).

Произв.: MSD (США)

Тимпило (Timpilo®)

Сост. и ф.в.: В 1 флаконе 5 мл комбинации 0,5% раствора тимолола малеата и 2 или 4% раствора пилокарпина гидрохлорида.

Фарм. действ.: Снижение внутриглазного давления, уменьшение выработки и

усиление оттока жидкости из передней камеры глаза; бета-адреноблолирующее, холиномиметическое.

Показ.: Повышенное внутриглазное давление, глаукома (хроническая открытоугольная, вторичная, в сочетании с афакией).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (к любому компоненту препарата), бронхоспазм, бронхиальная астма (в т.ч. в анамнезе), хронические обструктивные заболевания легких, синусовая брадикардия, АВ-блокада II-III степени, застойная сердечная недостаточность, кардиогенный шок; состояния, при которых нежелательно развитие миоза (ириты, иридоциклиты).

Поб. действ.: Обусловленные пилокарпином: миопия, снижение остроты зрения, нарушение сумеречного зрения, головная боль, боль в области надбровных дуг, раздражение глаз, слезотечение, помутнение хрусталика, бронхоспазм, слюноотечение, потливость, тошнота, рвота, понос. Обусловленные тимололом: конъюнктивит, блефарит, кератит, нарушение зрения, птоз, брадикардия, нарушения проводимости вплоть до остановки сердца, гипотония, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и бронхоспазм (возможен летальный исход), головная боль, астения, депрессия, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффекты (гипотония, брадикардия) принимаемых внутрь бета-адреноблокаторов, антагонистов кальция и симпатолитиков.

Примен. и доз.: Внутриконтъюнктивально, закапывают в больной глаз по 1 капле 2 (до 4) раза в день. Растворы тимолола и пилокарпина смешиваются перед употреблением.

Предост.: Введение других препаратов следует прекратить за 1 день до начала лечения. Поскольку могут проявляться резорбтивные эффекты, перед началом лечения следует компенсировать сердечную недостаточность. При заболеваниях сердца необходимо периодически контролировать частоту сердечных сокращений и другие параметры сердечной деятельности. Не следует закапывать в глаза два бета-адреноблокатора одновременно. Необходимо соблюдать осторожность при вождении автомобиля в ночное время, ограничить работу при плохом освещении. Консервант, содержащийся в тимпило, может откладываться на мягких контактных линзах, поэтому линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15

мин после него. Следует учитывать возможность развития анафилактических реакций у больных с атопическими и тяжелыми анафилактическими реакциями в анамнезе.

Произв.: MSD (США)

Тинсет (Tinset)

Оксатомид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит оксатомид 30 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Аллергический ринит, бронхиальная астма, хроническая крапивница, аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, пищевая аллергия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сонливость, слабость (включая мышечную), головокружение, судороги, повышение аппетита, сухость во рту, диспепсия, тошнота, рвота, гепатит, повышение активности печеночных трансаминаз, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект барбитуратов и других снотворных, алкоголя, транквилизаторов, наркотических веществ.

Примен. и доз.: Внутрь после еды по 30 мг 2 раза в сутки; детям с массой более 35 кг - 0,5 мг/кг (15 мг) 2 раза в сутки.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Тиодазин (Thiodazine)

Тиоридазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тиоридазина 10, 25, 50 или 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, антидепрессивное (малые дозы), седативное, противорвотное, симпатолитическое, м-холинолитическое, противозудное.

Показ.: Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, невроз, страх, возбуждение, напряжение, навязчивые состояния, тик, психомоторное возбуждение, абстинентный синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кома, депрессивные состояния, тяжелые заболевания ЦНС, сердечно-сосудистой системы, печени.

Поб. действ.: Экстрапирамидные расстройства, псевдопаркинсонизм, сонливость, спутанность сознания, беспокойство, чрезмерная моторная возбудимость, головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, диарея, желтуха, парез

аккомодации, дисменорея, нарушение эякуляции, отек сосков грудных желез, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10-50 мг 3-4 раза в день. При шизофрении и других психозах назначают до 600-800 мг/сутки, которые делят на 3-4 приема. Курс лечения высокими дозами продолжается не более 5 нед. Детям в возрасте до 7 лет - по 10-20 мг/сутки, 8-14 лет - 20-30 мг/сутки, 15-18 лет - 30-50 мг/сутки. Суточную дозу делят на 2-3 приема.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Тиопентал (Thiopental)

Тиопентал натрий*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит тиопентала натрия 500 или 1000 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Наркозное, антигипоксантное.

Показ.: Наркоз (вводный, базисный, кратковременный (не более 15 мин)); судорожные припадки, эпилептический статус, наркоанализ и наркосинтез в психиатрии, защита нейронов от гипоксии при искусственном кровообращении, каротидной эндартериэктомии и нейрохирургических операциях на сосудах головного мозга.

Противопоказ.: Абсолютные: гиперчувствительность, порфирия. Относительные: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, шок, артериальная гипотония, нарушения функции печени и/или почек, болезнь Аддисона, микседема, тяжелая анемия, бронхиальная астма и астматические состояния, тяжелая миастения, лихорадочные состояния, воспалительные заболевания носоглотки.

Поб. действ.: Угнетение дыхания, угнетение миокарда, тахикардия, аритмии, снижение АД, сонливость, чихание, кашель, бронхо- и ларингоспазм, анафилактикоидные реакции.

Примен. и доз.: Раствор препарата готовят на дважды дистиллированной воде ex tempore. Обычно применяют 2,5% раствор (0,5 г сухого вещества разводят в 20 мл растворителя или 1 г - в 40 мл растворителя). В/в, детям - предпочтительно капельно в виде 2,5% раствора. Раствор готовят перед введением. Дозировка зависит от показания, а у детей и от возраста и массы тела. Больным с выраженным нарушением функции почек рекомендуется коррекция дозы.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Тиопентал (Thiopental)

Тиопентал натрий*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит тиопентала натрия 500 или 1000 мг; в упаковке 25 и 50 шт.

Фарм. действ.: Наркозное.

Показ.: Общее обезболивание.

Противопоказ.: Поражения печени и почек, одышка, астматическое состояние, воспаление верхних дыхательных путей, выраженные нарушения метаболизма.

Поб. действ.: Угнетение дыхания, повышение тонуса парасимпатической системы, спазм сосуда и тромбоз в месте инъекции.

Примен. и доз.: В/в, в виде 2,5-5% раствора, приготавливаемого перед введением.

Предост.: Показана премедикация атропином.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Тиотепа-Тиоплекс (Thiotepa-Thioplex)

Тиотепа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит тиотепы 15 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Фармакокин.: Всасывается быстро, большая часть выводится с мочой.

Фармакодин.: Цитотоксический эффект связан с алкилированием ДНК.

Показ.: Рак молочной железы, рак яичников, рак мочевого пузыря, мезотелиома плевры, ретинобластома, злокачественные заболевания мозговых оболочек, остроконечная кондилома.

Противопоказ.: Лейкопения (количество лейкоцитов менее 4000/куб.мм), тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 150000/куб.мм), выраженная анемия, кахексия; период после лучевой терапии.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Лейкопения, миелосупрессия; редко - тошнота, рвота, алоpecia.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/в, внутривенно, эндолумбально, может вводиться непосредственно в плевральную, перикардальную и перитонеальную полости. Рак молочной железы - по 15-30 мг 3 раза в неделю в течение 2 нед (1 курс лечения) с интервалом между курсами - 6-8 нед - по 15 мг ежедневно, 4 дня в неделю в течение 3 нед, затем -

поддерживающая доза - 15 мг каждые 14-21 день. Рак мочевого пузыря - 60 мг растворяют в 60 мл стерильной воды и через катетер вводят в мочевой пузырь 1 раз в неделю в течение 4 нед. Рак яичника: начальная терапия - по 15 мг каждый день в течение 4 дней, внутриволостное введение - 10-65 мг разводят в 20-60 мл стерильной воды, повторно вводят через 1-2 нед.

Предост.: Перед каждым введением проводится анализ крови; лечение необходимо прекратить при количестве лейкоцитов ниже 3000. Разведенный раствор может храниться в холодильнике не более 24 ч.

Произв.: Wyeth-Lederle (США)

ТиреокOMB® (Thyreosomb®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левотироксина 70 мкг, лиотиронина 10 мкг и калия йодида 150 мкг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Протиреоидное.

Показ.: Гипотиреоз; эутиреоидный зоб у детей и подростков; эутиреоидный диффузный зоб у взрослых и в период беременности; профилактика рецидива зоба (после резекции).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, явный и скрытый гипертиреоз, острый инфаркт миокарда, стенокардия или инфаркт миокарда у пожилых пациентов, миокардит, нелеченные нарушения функции коры надпочечников, автономная аденома, фокальные и диффузные автономии щитовидной железы (при дозировке, когда количество йода составляет выше 300 мкг в день).

Поб. действ.: Симптомы гипертиреоза (дрожание пальцев, тахикардия, повышенная потливость, бессонница, глюкозурия, стенокардитические состояния, нарушения сердечного ритма, понос, потеря массы тела, беспокойство).

Взаим.: Эффект повышают фенитоин, салицилаты, фуросемид, клофибрат, снижает - холестирамин (подавляет всасывание). Усиливает действие пероральных антикоагулянтов, изменяет - противодиабетических средств. Дефицит йода повышает, избыток йода уменьшает реакцию на тиреостатические препараты (струмigenное действие). Перхлорат уменьшает поглощение йода щитовидной железой. Тиреотропный гормон стимулирует поглощение и преобразование йода щитовидной железой.

Примен. и доз.: Внутрь, по возможности натощак, при гипотиреозе - по 1/2-1 1/2 таблетки в день с последующим

увеличением дозы до 3 1/2 таблеток; детям школьного возраста начальная доза - 1/4-1/2 таблетки ежедневно, затем - 100-150 мкг левотироксина на 1 кв.м. поверхности тела. При эутиреоидном зобе и для профилактики рецидива зоба назначают ежедневно по 1-3 таблетки (детям школьного возраста - 1/2-2 таблетки).

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Тиреотом® (Thyreotom®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левотироксина 40 мкг и лиотиронина 10 мкг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Протиреоидное.

Показ.: Гипотиреоз, эутиреоидный зоб, профилактика рецидива после резекции зоба; проведение подавляющей и заместительной терапии при злокачественной опухоли щитовидной железы (особенно после удаления щитовидной железы); дополнительная терапия при лечении гипертиреоза тиреостатическими препаратами (после достижения эутиреоидного состояния).

Противопоказ.: Гипертиреоз, острый инфаркт миокарда, стенокардия или инфаркт миокарда у пожилых пациентов, миокардит, нелеченные нарушения функции коры надпочечников.

Поб. действ.: Симптомы гипертиреоза (дрожание пальцев, тахикардия, повышенная потливость, бессонница, глюкозурия, стенокардитические состояния, аритмии, понос, потеря массы тела, беспокойство), временное увеличение массы тела, алоpecia, нарушение функции почек и повышение предрасположенности к припадкам (у детей).

Взаим.: Эффект усиливают фенитоин, дикумарол, салицилаты, фуросемид, клофибрат, снижает холестирамин (подавляет всасывание); увеличивает действие пероральных антикоагулянтов, уменьшает - противодиабетических средств.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, запивая небольшим количеством жидкости, начиная с 0,5-1 таблетки 1 раз в день, увеличивая с интервалами в 2-4 нед до поддерживающей дозы - 3-6 таблеток.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Тисасен (Tisasen)

Сеннозиды А и Б

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит сеннозидов А+Б 10 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Слабительное.

Фармакодин.: Стимулирует перистальтику толстой кишки, вызывает нормальный стул через 6-12 ч после приема.

Показ.: Запоры, предоперационная подготовка.

Противопоказ.: Кишечная непроходимость, гипокалиемия.

Поб. действ.: Боли в животе по типу колик, метеоризм.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым с целью налаживания стула - 1-2 драже вечером; как слабительное средство - по 2-4 драже после еды. Детям - по 1 драже после еды.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Тисацид (Tisacid)

Гидроталцит*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит гидроталцита (алюминия-магния гидроксикарбоната) 500 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, антацидное.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Отрыжка, запоры.

Примен. и доз.: Обычная однократная доза - 1-2 таблетки. Поддерживающая терапевтическая доза - 1-2 таблетки 3 раза в день (через 1-2 ч после еды).

Предост.: Не следует комбинировать с тетрациклинами, солями железа, фторидом натрия.

Произв.: ICN Alkaloida (Венгрия)

Тиссукол Кит (Tissucol® Kit)

Сост. и ф.в.: Двухкомпонентный фибриновый клей. Состоит из лиофилизированного концентрата клеящего белка для приготовления раствора Тиссукол в комплекте с раствором апротинина (бычьего) активностью 3000 единиц инактивации кининогенинов (ЕИК) и лиофилизированного тромбина 4 или тромбина 500 (человеческого) в комплекте с раствором хлорида кальция 40 ммоль/л. 1 мл готового раствора Тиссукол содержит коагулирующих белков 75-115 мг (в т.ч. фибриногена 70-110 мг и фибронектина плазмы 2-9 мг), фактора XIII 10-50 ед. и плазминогена 40-120 мкг. 1 мл готового раствора тромбина содержит 4 или 500 МЕ тромбина согласно Первому международному стандарту. Выпускается в наборах для приготовления по 0,5; 1; 2 и 5 мл растворов Тиссукол и тромбина для

нанесения с применением системы дуплоджект.

Фарм. действ.: Гемостатическое.

Фармакодин.: Раствор Тиссукол-тромбин, образующийся в результате смешивания двух компонентов набора, превращается в белую эластичную массу, плотно прилипающую к тканям (имитируются основные этапы свертывания крови). Скорость формирования пленки зависит от концентрации тромбина. При концентрации тромбина 4 МЕ/мл этот процесс происходит за 30-60 с, при более высокой концентрации (500 МЕ/мл) - завершается за несколько секунд. Высокую концентрацию тромбина используют для остановки кровотечений, а низкую - для склеивания тканей. В ходе заживления раны фибриновый слой полностью рассасывается.

Показ.: Диффузные кровотечения (после операций на костях и суставах, аденоидэктомии, тонзиллэктомии, стоматологических операций, простатэктомии - тампонирование ложа простаты), для фиксации, изоляции (создание оболочек и прикрепление протезов сосудов, тимпанопластика, обработка фистул ликворопроводящих путей и поврежденной твердой мозговой оболочки, лечение преждевременного разрыва плодного пузыря, изоляция швов на паренхиме легких, плевре, трахее, бронхах, пищеводе, лечение плеврального выпота при злокачественных поражениях, восстановление хрусталика после травм с перфорацией, герметизация швов интестинальных и микроваскулярных анастомозов) и склеивания тканей (паренхима почек, печени, селезенки, поджелудочной железы при операциях, трансплантация губчатой ткани при заполнении костных дефектов, фиксация кожных трансплантатов и костно-хрящевых фрагментов, склеивание периферических нервов, пластическая хирургия после вскрытия верхнечелюстной пазухи), ускорения заживления ран (пересадка кожи на деваскуляризованные и инфицированные участки, некроз кожи, вживление гомологичных костных имплантатов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к препаратам, содержащим белки крупного рогатого скота).

Поб. действ.: Аллергические реакции (после повторного местного использования); при инъекции в ткань или сосуд - анафилактические реакции; при интраваскулярном введении - тромбоэмболия.

Взаим.: Совместим с гепарином (можно использовать у пациентов, подключен-

ных к аппарату искусственного кровообращения).

Примен. и доз.: Местно, наносится тонким слоем тиссукол-тромбиновый раствор или его компоненты. Доза зависит от размеров поверхности и метода нанесения (1 мл раствора тиссукола плюс 1 мл раствора тромбина достаточно для заклеивания не менее 10 кв.см площади поверхности, при распылении - этого количества клея хватит для закрытия от 25 до 100 кв.см). Двухкомпонентный клей готовят путем смешивания лиофилизированного тиссукола с апротинином и добавления тромбина, смешанного с хлоридом кальция (для фиксации нервов используют апротинин с концентрацией 100 ЕИК/мл). Компоненты клея могут быть нанесены с использованием системы дуплоджект (с распылительной головкой, аппликационной иглой, аппликационным катетером) с предварительным смешиванием компонентов; в этом случае необходимо фиксировать склеенные части в течение 3-5 мин.

Предост.: Не следует применять в виде инъекций (только в исключительных случаях). Перед нанесением клея необходимо исключить контакт с растворами, включающими спирт, йод, тяжелые металлы, и, по возможности, прикрыть все ткани, примыкающие к заклеиваемому участку. Готовые растворы тиссукола и тромбина используют не позже, чем через 4 ч.

Произв.: Imtnino (Австрия)

Тобитил® (Tobitil®)

Теноксикам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит теноксикама 20 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегационное, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Боль и воспаление при ревматоидном артрите, остеопорозе, анкилозирующем спондилоартрите, подагре и несуставных ревматических состояниях (тендинит, бурсит, ишиалгия, боль в спине).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, пептические язвы в фазе обострения и в анамнезе, желудочно-кишечные кровотечения, острый гастрит, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, образование пептических язв, желудочно-кишечные кровотечения, интерстициальный нефрит, гломерулонеф-

рит, папиллярный некроз, нефритический синдром, отеки, головные боли, головокружение, сонливость или бессонница, депрессия, нервозность, нарушения функции печени, повышение уровня сывороточных трансаминаз, нарушение зрения, гипокоагуляция, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день (запивая водой) в одно и то же время. При остром подагрическом артрите - по 2 таблетки 1 раз в сутки в течение 2 дней, затем по 1 таблетке в день в течение еще 5 дней.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Тобрацин-АДС (Tobracin-ADC)

Тобрамицин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для парентерального введения содержит тобрамицина сульфата 10 или 40 мг, во флаконах по 2 мл; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Из ЖКТ не резорбируется (вводится в/м). C_{max} (после введения в дозе 1 мг/кг) - 4 мкг/мл; терапевтическая концентрация сохраняется на протяжении 8 ч. $T_{1/2}$ - 2 ч. Равномерно распределяется по тканям, выводится почками в неизмененном виде.

Показ.: Септицемия, пневмония, менингит, перитонит, абсцессы и флегмоны кожи, остеомиелит, пиелонефрит и другие бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к тобрацину микроорганизмами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность. Токсические реакции на аминогликозиды в анамнезе.

Бер. и корм. гр.: При длительном применении проникает через плацентный барьер и может вызывать повреждение плода.

Поб. действ.: Поражения ЦНС, слухового нерва (ототоксичность), почек, анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения, лихорадочный синдром, тошнота, рвота, диарея, головная боль, сонливость, нарушение памяти, нарушение ориентации, боль в месте инъекции, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект миорелаксантов, токсичность цефалоспоринов. Совместное назначение с диуретиками увеличивает риск поражения почек и слухового аппарата.

Передоз.: Симптоматика (и лечение) зависит от дозы, состояния функции почек, сопутствующей дегидратации,

возраста пациента, а также наличия или отсутствия приема других медикаментов, обладающих нефро- и нейротоксичностью.

Примен. и доз.: В/м, 3-5 мг/кг в сутки (за 3-4 введения); детям - 6-7,5 мг/кг в сутки (за 3-4 введения), недоношенным и новорожденным (до 1 нед) - 4 мг/кг в сутки (за 2 введения). Курс - не более 7-10 суток.

Предост.: Следует помнить, что для аминогликозидов характерна перекрестная аллергизация. Метасульфит натрия и сульфиты, содержащиеся в препарате, могут быть причиной псевдоаллергической реакции. Особая осторожность требуется при лечении пожилых больных и пациентов с заболеваниями мышечной системы. Необходимо контролировать уровень препарата: он не должен превышать 12 мкг/мл.

Произв.: American Drug Company (США)

Тобрекс (Tobrex®)

Тобрамицин*

Сост. и ф.в.: Активное вещество - тобрамицин. Капли глазные 0,3% по 5 мл во флаконе-капельнице с дозатором Дроп-Тейнер. Мазь глазная 0,3% по 3,5 г в тубике.

Фарм. действ.: Антибактериальное (местное), бактерицидное, широкого спектра.

Показ.: Наружные инфекции глаза и окружающих тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции; при длительном применении - суперинфицирование (грибковое).

Взаим.: Несовместим с препаратами, содержащими тетрациклин (из-за наличия в тобрексе тилоксапола).

Примен. и доз.: Капли - по 1-2 капли каждые 4 ч; мазь - 1-1,5 см столбика 2-3 раза в день.

Произв.: Alcon Pharmaceuticals (Швейцария)

Томицид (Tomycidum)

Сост. и ф.в.: Стерильный продукт метаболизма непатогенного стрептококка, зеленовато-желтого цвета, прозрачный, без опалесценции и инородных тел, с кисловатым вкусом; в герметично закупоренных флаконах из нейтрального стекла емкостью 250 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Ангины, пиодермии, раневая инфекция (в т.ч. профилактика в хирургии) и др. инфекции, обусловленные грамположительными кокками.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Жжение при аппликации.

Примен. и доз.: Местно. Для лечения ангины - доза препарата для полосканий 10-15 мл. Для лечения пиодермий - на 1 повязку от 5 до 10 мл препарата.

Произв.: Биомед им. И.И.Мечникова (Россия)

Тонзан-акут (Tonsan-akut®)

Сост. и ф.в.: 100 мл капель для приема внутрь содержат Eucalyptus D1 2 мл, Belladonna D6 10 мл, Bryonia D6 10 мл, Phosphorus D12 10 мл, Mercurius solubilis H. D12 10 мл, этиловый спирт 54% по массе; во флаконах с капельным дозатором по 20, 30 и 50 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антисептическое, десенсибилизирующее; отхаркивающее, иммуностимулирующее, активация процессов дезинтоксикации.

Показ.: Острые и хронические воспалительные заболевания нижних дыхательных путей (ларинготрахеит, бронхит, пневмония), бронхиальная астма.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только по назначению врача.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза в день: взрослым и подросткам - по 10-20 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года - по 1-3 капли, разведенных в 1 чайной ложке воды или молока; детям до 12 лет - по 5 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды. При острых состояниях - каждые 0,5-1 ч: взрослым и подросткам - по 5-7 капель; детям до 12 лет - по 2-3 капли; детям до 1 года - по 1 капле до наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Предост.: При появлении повышенного слюноотделения прием препарата следует прекратить.

Произв.: Bittner (Австрия)

Тонзилгон (Tonsilgon®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит порошок Radix Althaeae (корень алтея) 8 мг, Flores Chamomillae (цветы ромашки) 6 мг, Herba Equseti (хвощ) 10 мг, Folia Juglandis (листья ореха) 12 мг, Herba

Millefolii (тысячелистник) 4 мг, Cortex Quercus (кора дуба) 4 мг, Herba Taraxaci (одуванчик) 4 мг; в упаковке 50 шт.

100 г раствора для приема внутрь содержат 29 г водно-спиртового экстракта из Radix Althaeae (корень алтея) 0,4 г, Flores Chamomillae (цветы ромашки) 0,3 г, Herba Equiseti (хвощ) 0,5 г, Folia Juglandis (листья ореха) 0,4 г, Herba Millefolii (тысячелистник) 0,4 г, Cortex Quercus (кора дуба) 0,2 г, Herba Taraxaci (одуванчик) 0,4 г; во флаконах по 100 мл (содержит 19 об.% спирта).

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, противовоспалительное, противовирусное.

Показ.: Острые и хронические бронхолегочные заболевания, воспаления придаточных пазух носа, тонзиллит, вирусные инфекции, пониженная устойчивость к инфекциям.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, при острых заболеваниях назначают по 2 драже или по 25 капель 5-6 раз в сутки; грудным детям и детям до 5 лет - по 1 капле на 1 кг массы тела 5-6 раз в сутки; детям от 5 до 10 лет - 15 капель 5-6 раз в сутки; детям от 10 до 16 лет - 20 капель или 1 драже 5-6 раз в день. После исчезновения острых проявлений заболевания кратность приема сокращается до 3 раз в сутки (при этом однократная доза остается прежней). Курс - 4-6 нед.

Произв.: Bionogica (Германия)

Тонзилотрен (Tonsilotren®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для рассасывания содержит Atropinum sulfuricum D5 12,5 мг, Nepar sulfuris D3 10,0 мг, Kalium bichromicum D4 50,0 мг, Silicea D2 5,0 мг, Mercurius bijodatus D8 25,0 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное (Nepar sulfuris, Kalium bichromicum), уменьшение слезообразования, гипертрофии носоглоточной и небных миндалин, отека лимфатических узлов шеи (Atropinum sulfuricum, Mercurius bijodatus), регенерирующее, иммуностимулирующее (Silicea); устранение симптомов воспаления миндалин и лимфоидного глоточного кольца.

Клин. фарм.: В начальной стадии заболевания (высокая температура, покраснение глотки, отек миндалин, затруднение при глотании) действует Atropinum sulfuricum. При гнойном подостром или хроническом течении заболевания, в т.ч.

с выраженным слизееобразованием проявляется эффект 4-х других ингредиентов. Mercurius bijodatus уменьшает гипертрофию миндалин и отечность лимфоузлов шеи. Nepar sulfuris действует при воспалении, сопровождающемся нагноениями, нарывами и колющими болями, распространяющимися на уши. Kalium bichromicum эффективен при глубоком изъязвлении, увеличении миндалин, затрудненном глотании. Silicea способствует грануляции, заживлению абсцессов, стимулирует иммунную систему.

Показ.: Ангины (катаральная, лакунарная, фолликулярная) легкой и средней степени тяжести, профилактика и лечение обострений хронического тонзиллита, гипертрофия миндалин; для ускорения заживления тканей после удаления миндалин.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к хрому, гипертиреоз.

Поб. действ.: Усиленное слюноотделение, кожные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за полчаса до или через час после еды, медленно рассасывая таблетки во рту. При острых заболеваниях - по 1-2 таблетки каждый час в течение 1-2 дней, далее - по 1-2 таблетки 3 раза в день. При хроническом течении заболевания - по 1-2 таблетки 3 раза в день в течение 6-8 нед. При хронически-рецидивирующей ангине проводят повторные курсы лечения (несколько курсов в год по 6-8 нед.).

Предост.: В случае временного первичного ухудшения состояния, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Тонокальцин (Tonocalcin)

Кальцитонин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций в ампулах и шприц-ампулах содержит салькатонина (кальцитонина) 50 или 100 МЕ; в упаковке 5 шт.

1 доза назального спрея (0,1 мл) - 50 или 100 МЕ; во флаконах по 2,2 или 1,1 мл соответственно.

Фарм. действ.: Гипокальциемическое, антиостеопорозное (ингибция резорбции костной ткани).

Показ.: Болезнь Педжета (деформирующий остоз), остеопороз различного генеза, гиперкальциемия (передозировка витамина D, при злокачественных новообразованиях, гиперпаратиреозидизм), болезнь Садека.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (спрей).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, вазомоторные нарушения, гиперемия лица, сопровождающаяся чувством жара, аллергические реакции (местные и общие), воспаление в месте инъекции.

Примен. и доз.: Парентерально: при остеопорозе, болезни Педжета, болезни Садека - п/к или в/м по 50-100 МЕ 1 раз в день (можно через день), при необходимости до 200 МЕ/день; при гиперкальциемии - по 5-10 МЕ/кг массы тела в день в/в медленно в 2-4 приема в течение дня или в/в капельно в течение 6 ч (в 500 мл физиологического раствора). Интраназально, впрыскивают по 100 МЕ в день (по 50 МЕ в каждый носовой проход или 100 МЕ в один), при необходимости - по 200 МЕ в день в 2 впрыска (утром и вечером). Курс лечения - несколько месяцев.

Предост.: С осторожностью назначают больным с хроническим ринитом и операциями в полости носа в анамнезе (спрей), детям.

Произв.: CSC (Италия)

Тонокардин (Tonokardin)

Доксазозин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит доксазозина мезилата 2 или 4 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, сосудорасширяющее, снижение ОПСС, антиагрегационное, блокада альфа₁-адренорецепторов, гипохолестеринемическое, повышение ЛПВП.

Клин. фарм.: Снижение АД достигает максимума через 2-6 ч, сохраняется в течение 24 ч.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, астения, отеки.

Примен. и доз.: Внутрь, в начальной дозе - по 1 мг в день, затем в зависимости от реакции больного дозу постепенно увеличивают до 2, 4, 8 или 16 мг до достижения желаемого эффекта. Обычно ежедневная доза - 2-4 мг в день.

Предост.: С осторожностью следует назначать больным с нарушением функции печени. При приеме препарата не рекомендуется управление транспортными средствами.

Произв.: Pliva (Хорватия)

Топрал (Topral®)

Сультоприд*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит сультоприда 400 мг; в упаковке 20 и 100 шт. 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 200 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, седативное.

Показ.: Острая стадия шизофрении с возбуждением, состояния возбуждения при алкоголизме, хронические психозы с нарушением поведения, маниакальные состояния, агрессивность, нестабильность поведения у пациентов с психиатрическими заболеваниями.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, гастралгия, диарея, сонливость, слабость, депрессия.

Взаим.: Совместим с антидепрессантами (включая ингибиторы МАО), транквилизаторами, антипаркинсоническими средствами.

Примен. и доз.: Внутрь, в период обострения - по 400-1200 мг/сутки. Впоследствии дозу можно уменьшить при одновременном назначении антипаркинсонических средств. В/м - по 200-1200 мг/сутки.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Торадол (Toradol®)

Кеторолак*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит кеторолака трометамин 10 мг; в упаковке 10, 20 и 50 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 30 мг, в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противовоспалительное, антиагрегационное.

Показ.: Послеоперационные боли, боли при травмах суставов с растяжением или разрывом связок, вывихах, растяжениях; внезапно появляющиеся боли в спине и мышцах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к аспирину и др. НПВС), полипы носа, ангионевротический отек, бронхоспазм, бронхиальная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение функции почек, гиповолемия, обезвоживание, высокий риск послеоперационного кровотечения или неполная остановка кровотечения, нарушения кроветворения, кровоизлияния в головном мозге, беременность, лактация, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Диспепсия, боли в ЖКТ, тошнота, рвота, диарея, ощущение переполнения желудка, пептические язвы, нарушения функции печени, окрашивание стула в черный цвет, ректальные кровотечения, стоматит, головная боль, головокружение, сонливость, потливость, отеки, боль в месте инъекции, метеоризм, гастрит, запоры, диспноэ, бронхиальная астма, крапивница, зуд, астения, пурпура, миалгия, нарушения вкуса и зрения, вазодилатация, бледность, сухость во рту, нервозность, депрессия, учащение мочеиспускания, олигурия, гломерулонефрит, нефротический синдром, острая почечная недостаточность и др.

Взаим.: Несовместим с препаратами лития, пентоксифиллином, пробенецидом, антикоагулянтами (в высоких дозах), с другими нестероидными противовоспалительными средствами. Снижает диуретический эффект фуросемида у лиц с нормоволемией. При одовременном применении с ингибиторами АПФ возрастает вероятность нарушения функции почек.

Примен. и доз.: Дозу подбирают индивидуально с учетом выраженности болевого синдрома. Разовая доза составляет 10-30 мг, кратность введения - до 4 раз в день (каждые 6-8 ч). Максимальная суточная доза при пероральном приеме - 40 мг, при парентеральном введении - 120 мг. Раствор в ампулах (в/в или в/м) назначают для лечения острых и сильных болей в течение не более 5 дней, у детей - 2 дней. Таблетки назначают не более 7 дней. Максимальная суточная доза для пожилых пациентов составляет 60 мг.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Тотацеф (Totacef®)

Цефазолин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефазолина натриевую соль 0,25; 0,5 или 1 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных, желчных и мочеполовых путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, костей и суставов, тканей глаза, эндокардиты, перитониты, септицемия, хирургические инфекции (профилактика) и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, глоссит, редко - чувство сдавления в груди, артралгия, гемолитическая анемия, лейкопения, нейтропения, эозинофилия, повышения содержания сывороточных трансаминаз, щелочной фосфатазы, билирубина, азотемия, дисбактериоз, кандидозные вагиниты, аллергические реакции.

Взаим.: Пробенецид повышает концентрацию в крови и пролонгирует эффект. Усиливает нефротоксичность других препаратов.

Примен. и доз.: В/м, в/в (капельно или струйно). Для лечения - по 0,5-1 г 2-3 раза в день, при необходимости - по 1,0-1,5 г каждые 6 ч или до 12 г в день; детям (с массой менее 40 кг) - по 0,03-0,05 мг/кг в день в 2-3 введения, при необходимости - 0,5-1,0 г в день с интервалами 8-48 ч (в зависимости от клиренса креатинина). Для профилактики - по 1 г за 30-60 мин до операции, при длительности операции свыше 2 ч - дополнительно по 0,5-1 г. В послеоперационный период - по 0,5-1 г каждые 6-8 ч (в течение суток или 3-5 дней). Перед употреблением содержимое флакона растворяют в воде для инъекций (для в/м введения добавляют 0,5% раствор лидокаина).

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с аллергией к пенициллинам, нарушениями функции почек, при беременности и лактации, в раннем младенческом возрасте. Во время лечения возможны ложноположительная реакция Кумбса, повышение (ложное) уровня глюкозы в крови (если используют ферментативные методы).

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Травоген (Travogen®)

Изоконазол*

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит изоконазола нитрата 10 мг; в тубах по 20 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое (фунгистатическое), антибактериальное.

Фармакодин.: Спектр действия включает дерматофиты, дрожжи и дрожжеподобные грибы, плесень, грамположительные микроорганизмы: стафилококки, микрококки, стрептококки.

Показ.: Дерматомикозы: трихофития, эпидермофития, микроспория, кандидозы, поражения, вызванные плесневыми грибами; смешанные инфекции кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Раздражение кожи, легкое жжение, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно. Крем наносят на пораженные участки кожи 1 раз в сутки в течение 3-4 нед. (не менее).

Произв.: Schering (Германия)

Травокорт (Travocort®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит изоконазола нитрата 10 мг и дифлукортолона валерата 1 мг; в тубах по 15 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное, противовоспалительное, противоаллергическое.

Показ.: Дерматомикозы (трихофитии, микроспории, эпидермофитии, кандидозы, заболевания, вызванные плесневыми грибами), сопровождающиеся значительными воспалительными или экзематозными проявлениями, смешанные инфекции кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сифилитические и туберкулезные поражения кожи, ветряная оспа и другие вирусные инфекции, кожные реакции после вакцинации, периоральный дерматит.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Раздражение кожи, кожные аллергические реакции; при длительном применении (свыше 2-4 нед) на большой поверхности (свыше 10% поверхности тела) могут развиваться атрофические изменения кожи, телеангиэктазии, акне, гипертрихоз, дерматит, проявления системных побочных эффектов.

Примен. и доз.: Местно. В остром периоде воспаления крем наносят на кожу 2 раза в день в течение 2 нед, далее лечение можно продолжить препаратом Травоген.

Произв.: Schering (Германия)

Тразикор (Trasicor)

Оксспренолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит окспренолола 80 мг, или 1 таблетка - 20 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое, блокада бета-адренорецепторов (частичная стимуляция).

Показ.: Артериальная гипертензия, стенокардия (профилактика приступов), экстрасистолия, гиперкинетический кардиальный синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, АВ-блокада II и III степени, сино-

атриальная блокада, брадикардия, синдром слабости синусового узла, гипотония, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, кетоацидоз.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Бронхоспазм, брадикардия, АВ блокада, артериальная гипотония, сердечная недостаточность, спазм периферических сосудов, похолодание конечностей, головокружение, слабость, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 160-480 мг в день.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Тразин (Trazine)

Трифлуоперазин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит трифлуоперазина 5 или 10 мг.

Фарм. действ.: Нейролептическое, антипсихотическое, противорвотное.

Показ.: Шизофрения, психозы, аффективные расстройства, параноидный синдром, тревожный синдром непсихического генеза.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миелосупрессия, печеночная недостаточность, кома, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности применять только в случае, если потенциальные преимущества превышают возможный риск. Матери, принимающие препарат, должны прекратить грудное вскармливание.

Поб. действ.: Сонливость, головокружение, бессонница, утомляемость, двигательное беспокойство, мышечная слабость, экстрапирамидные расстройства, псевдопаркинсонизм, поздняя дискинезия, анорексия, сухость во рту, холестатическая желтуха, нарушения зрения, галакторея, аменорея, тромбоцитопения, анемия, агранулоцитопения, панцитопения, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек).

Взаим.: Несовместим с алкоголем и препаратами, угнетающими ЦНС.

Примен. и доз.: Внутрь. При тревожном синдроме непсихотического генеза - по 5 мг 1 раз в день в течение не более 2 нед. При психотических расстройствах - начальная доза 5 мг 1-2 раза в день с увеличением дозы за 2-3 нед до 15-20 мг/сутки. Максимальная суточная доза - 40 мг.

Предост.: При приеме не следует заниматься видами деятельности, которые требуют повышенного внимания, быстрой психических и двигательных реакций (например, вождение автомобиля,

управление механизмами). С осторожностью назначают больным глаукомой, а также людям, работающим в условиях высоких температур. У пожилых пациентов возможно развитие необратимых дискинетических движений (при появлении признаков поздней дискинезии терапию прекращают).

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Тракриум® (Tracrium®)

Атракурия безилат*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит атракуриума бисилата 10 мг; в ампулах по 2,5 и 5 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Недеполяризующий миорелаксант.

Фармакокин.: Инактивируется путем неэнзимной деградации (при физиологических рН и температуре) и неспецифическими эстеразами (гидролиз). Снятие нейромышечного блока не зависит от печеночного и почечного метаболизма и экскреции.

Клин. фарм.: Не оказывает вагусного или ганглиоблокирующего действия и не противопоказан при брадикардии, связанной с использованием анестетиков или с вагусной стимуляцией при операции.

Показ.: Релаксация скелетной мускулатуры для проведения эндотрахеальной интубации при общей анестезии, хирургических операциях, искусственной вентиляции легких.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно, если потенциальная выгода для матери превышает риск для плода. Может быть применен при кесаревом сечении.

Поб. действ.: Высвобождение гистамина (покраснение кожи, транзиторная гипотензия, бронхоспазм); судороги (у больных с предрасполагающей сопутствующей патологией), анафилактические реакции.

Взаим.: Нейромышечную блокаду усиливают галотан, изофлюран, энфлюран, аминогликозиды, полимиксины, спектиномицин, тетрациклины, линкомицин, клиндамицин, пропранолол, блокаторы кальциевых каналов, лидокаин, прокаинамид, хинидин, фуросемид, маннитол, тиазидные диуретики, ацетазоламид, сульфат магнесии, кетамин, соли лития, триметафан, гексаметоний, ослабляют - антиконвульсанты. Маскируют миастению гравис или вызывают миастенический синдром (что приводит к повышен-

ной чувствительности к препарату) прокаинамид, хинидин, хлорохин, Д-пеницилламин, триметафан, хлорпромазин, стероиды, фенитоин, литий, пропранолол, окспренолол, антибиотики. Несовместим с деполяризующими миорелаксантами (суксаметоний), поскольку возможно развитие устойчивого к антихолинэстеразным средствам нервно-мышечного блока.

Передоз.: Симптомы: миоплегия. Лечение: ИВЛ, антихолинэстеразные средства с атропином.

Примен. и доз.: В/в. Взрослым и детям старше 1 мес - 0,3-0,6 мг/кг (релаксация на 15-35 мин), блокада пролонгируется введением 0,1-0,2 мг/кг. Интубация трахеи может выполняться через 90 с после в/в введения 0,5-0,6 мг/кг. После начальной болюсной дозы может вводиться непрерывной инфузией со скоростью 0,3-0,6 мг/кг/ч.

Предост.: При клинически значимой сердечно-сосудистой патологии и/или опасности гипотонии (гиповолемия) препарат вводится в течение 60 с. Не должен смешиваться в одном шприце с тиопенталом или другими щелочными препаратами. С осторожностью используется у пациентов с гиперчувствительностью к гистамину.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Трамадол Ланнахер (Tramadol Lannacher)

Трамадол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит трамадола гидрохлорида 50 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл раствора для инъекций - 50 мг; в упаковке 5 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 5 шт.

30 капель (1 мл) раствора для приема внутрь - 100 мг; во флаконе 10 мл.

Фарм. действ.: Анальгетическое.

Показ.: Болевой синдром сильной и средней интенсивности; боли при проведении диагностических и терапевтических процедур.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острое отравление алкоголем или другими средствами, угнетающими ЦНС, детский возраст (до 1 года).

Поб. действ.: Головокружение, ощущение тяжести в голове, утомляемость, спутанность сознания, сухость во рту, тошнота, повышенное потоотделение, сердцебиение, тахикардия, ортостатическая гипотония, коллапс.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50 мг, при недостаточном эффекте дозу можно повторить через 30-60 мин. В/в медленно или инфузионно, в/м, п/к, по 50-100 мг. Ректально, глубоко, по 100 мг. Максимальная суточная доза - 400 мг. Детям от 1 года до 14 лет - 1-2 мг/кг массы тела.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Трамадол-Акри® (Tramadol-Akri)

Трамадол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит трамадола гидрохлорида 0,05 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее.

Фармакодин.: Неселективный антагонист опиоидных рецепторов, ингибитор нейронального захвата норадреналина и активатор серотонинергического ответа. Нарушает передачу болевых импульсов, обладает седативным действием.

Показ.: Болевой синдром сильной и средней интенсивности различной этиологии; проведение болезненных диагностических или терапевтических мероприятий.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Потливость, головокружение, тяжесть в голове, спутанность сознания, утомляемость, сонливость, сухость во рту, тошнота, рвота.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и детям старше 14 лет - по 0,05 г. Суточная доза не должна превышать 0,4 г.

Произв.: Акрихин (Россия)

Трамал (Tramal®)

Трамадол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для приема внутрь содержит трамадола гидрохлорида 100 мг; во флаконах по 10 мл.

1 мл раствора для инъекций - 50 и 100 мг; в ампулах по 1 и 2 мл соответственно; в упаковке 5 шт.

1 капсула - 50 мг; в упаковке 20 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее (центрально действующий анальгетик), неселективный чистый агонизм с мю, дельта и каппа-опиатными рецепторами, угнетение обратного захвата норадреналина и серотонина в синапсе; обладает

противокашлевым эффектом, не угнетает дыхательный центр, не подавляет моторику ЖКТ.

Фармакокин.: Более 90% всасывается после перорального приема. Абсолютная биодоступность 68% при пероральном приеме и 70% при ректальном введении. Начало действия через 10-15 мин. Максимальная концентрация в плазме через 2 ч. 20% связывается с белками крови. $T_{1/2}$ - 6 ч. Выводится почками.

Показ.: Острые и хронические боли средней и сильной степени выраженности, болезненные диагностические и терапевтические вмешательства.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая интоксикация алкоголем, снотворными, анальгетиками или другими центрально действующими препаратами, синдром отмены наркотиков, беременность, лактация, возраст (до 1 года).

Бер. и корм. гр.: Применять строго по показаниям.

Поб. действ.: Потливость, головокружение, тошнота, рвота, заторможенность, утомляемость, сухость во рту, ортостатическая гипотензия, коллапс, конвульсии.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО. При одновременном применении с транквилизаторами, снотворными средствами, алкоголем возможно усиление эффекта.

Передоз.: Опииноподобные эффекты могут быть купированы налоксоном.

Примен. и доз.: Перорально, ректально, п/к, в/м и в/в - 50-100 мг 2-3 раза в день (не более 400 мг в сутки). Капли - 20 капель 3-4 раза в день, детям (с 1 года) в дозе 1-2 мг/кг (капли, инъекции).

Предост.: Препарат может изменять скорость реакции в виде снижения способности к управлению автомобилем и различными механизмами.

Произв.: Zorka (Югославия)

Трамал (Tramal®)

Трамадол*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит трамадола гидрохлорида 50 мг; в ампулах по 1 и 2 мл.; в упаковке 5 шт.

1 капсула - 50 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл раствора для приема внутрь - 100 мг; во флаконах по 10 мл.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее (центральный неселективный агонизм с мю-, дельта- и каппа-опиатными рецеп-

торами, подавление обратного захвата норадреналина и серотонина в нервном синапсе), противокашлевое (практически без депрессии дыхательного центра, подавления моторики ЖКТ и влияния на сердечно-сосудистую систему).

Фармакокин.: После перорального приема всасывается более 90%. Абсолютная биодоступность составляет 68% при пероральном и 70% - при ректальном введении. C_{max} - через 2 ч. Связывание с белками крови - 20%. $T_{1/2}$ из плазмы во второй фазе - 6 ч. Экскретируется в неизменной форме и в виде метаболитов через почки. Средняя кумулятивная почечная экскреция - 94%. Около 0,1% введенной дозы выделяется с материнским молоком. Эффект развивается через 10-15 мин.

Показ.: Средние и выраженные острые и хронические болевые синдромы, болезненные диагностические или терапевтические вмешательства.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к опиатам), острые интоксикации алкоголем, снотворными, анальгетиками или другими центрально действующими препаратами, синдром отмены наркотиков, детский возраст (до 1 года).

Бер. и корм. гр.: Только строго по показаниям.

Поб. действ.: Утомляемость, заторможенность, потливость, сухость во рту, тошнота, рвота; редко - пальпитация, ортостатическая гипотензия, коллапс, конвульсии.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО. Синергизм с транквилизаторами, снотворными, алкоголем.

Передоз.: Проявляется симптоматикой, характерной для опиатов. Вводят налоксон (блокатор опиатных рецепторов).

Примен. и доз.: Внутрь, ректально, п/к, в/м и в/в, 50-100 мг 2-3 раза в день (как правило, не более 400 мг/сутки); может применяться у детей с 1 года в дозе 1-2 мг/кг/сутки (капли, инъекции).

Предост.: Следует иметь в виду, что может изменяться скорость реакции (способность к управлению автомобилем и различными механизмами).

Произв.: Grünenthal (Германия)

Трамал ретард (Tramal® retard)

Трамадол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит трамадола гидрохлорида 100, 150 или 200 мг; в упаковке 10, 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противокашлевое.

Фармакокин.: Всасывается более 90%, биодоступность - 68%. C_{max} достигается через 2 ч. Связывание с белками крови - 20%, $T_{1/2}$ из плазмы - 12 ч. Метаболизируется в печени, экскретируется (в неизменной форме и в виде метаболитов) через почки.

Фармакодин.: Снижает обратный синаптический захват норадреналина и серотонина, не вызывает дыхательной и сердечно-сосудистой депрессии. Начинает действовать через 15 мин.

Показ.: Болевой синдром выраженный и умеренный.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, интоксикации алкоголем, снотворными, анальгезирующими или другими средствами, действующими на ЦНС, синдром отмены наркотиков, детский возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Только по строгим показаниям (около 0,1% дозы попадает в материнское молоко).

Поб. действ.: Утомляемость, заторможенность, потливость, сухость во рту, тошнота, рвота (редко).

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО. Усиливает (взаимно) эффект транквилизаторов и снотворных.

Передоз.: Лечение: введение налоксона.

Примен. и доз.: Внутрь, подбирая минимальную эффективную дозу; разовая доза - до 200 мг, суточная - до 400 мг.

Предост.: Следует воздержаться от управления автотранспортом и механическим оборудованием (изменяется скорость реакции).

Произв.: Grünenthal (Германия)

Транксен (Tranxene®)

Дикалия клоразепат*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит клоразепата дикалия 5 или 10 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Седативное, анксиолитические, противосудорожное, миорелаксантное.

Показ.: Тяжелые тревожные состояния и их проявления у взрослых: тревога, беспокойство, тоска; у детей: тик, эмоциональная лабильность, неврозы (обусловленные тревожными состояниями), психические и соматические проявления беспокойства, тоски, дневной тревоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дыхательная недостаточность, беременность, лактация, детский возраст (до 2,5 лет).

Поб. действ.: Сонливость, миастения, снижение скорости реакции, антероградная амнезия, чувство опьянения, парадоксальные явления (возбудимость, агрессивность и др.), синдром отмены, кожная сыпь.

Взаим.: Несовместим с алкоголем. Взаимное усиление эффекта при совместном назначении с депримирующими средствами и миорелаксантами.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, под врачебным контролем. Взрослым - по 10-30 мг в день. В тяжелых случаях - до 50 мг и выше в день. Детям - 0,5 мг/кг/день в несколько приемов.

Предост.: Необходима осторожность при назначении пациентам с депрессией, миастенией. Следует помнить о снижении скорости реакции.

Пронзв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Трансамча (Transamcha®)

Транексамовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит транексамовой кислоты 250 мг; в упаковке 100 шт.

1 мл раствора для инъекций - 50 мг, в ампулах 5 мл; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антифибринолитическое, противоаллергическое, противовоспалительное.

Показ.: Гиперфибринолиз (местный, системный), тромбоцитопеническая пурпура, апластическая анемия, лейкозы; кровотечения во время операций и в послеоперационном периоде, мено- и метроррагия, легочное, носовое, почечное и маточное (в т.ч. в родах) кровотечения; экзема, крапивница, лекарственная аллергия, афтозный стоматит, ангина, фаринголарингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Снижение аппетита, тошнота, сонливость, аллергические реакции (сыпь, зуд и др.).

Примен. и доз.: Дозу устанавливают в зависимости от характера заболевания и возраста больного. Внутрь, в средней дозе - по 250-500 мг 3-4 раза в день. В/в или в/м - по 5-10 мл 1-2 раза в день; во время и после операций - однократно, в/в капельно - по 10-50 мл.

Предост.: С осторожностью применять в сочетании с тканевыми гемостатическими препаратами, гемокоагулазой (в больших дозах); раствор не следует добавлять к препаратам крови и смешивать с растворами, содержащими пенициллин.

Пронзв.: Iskra (Япония)

Трасилол® (Trasylol®)

Апротинин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 5 или 10 мл раствора для инъекций и инфузий содержит апротинина соответственно 100000 КИЕ или 200000 КИЕ; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антиферментное, ингибирование трипсина, плазмина, калликреина.

Показ.: Гиперфибринолитические кровотечения при травмах, операциях, родах, применении аппаратов экстракорпорального кровообращения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции, тромбофлебиты (в месте введения).

Примен. и доз.: В/в только в положении лежа медленно (не более 5 мл/мин) в начальной дозе 500000 КИЕ, затем по 200000 КИЕ каждые 4 ч; в акушерской практике начальная доза 1000000 КИЕ, затем по 200000 каждый час до остановки кровотечения. Дети: 2000 КИЕ/кг в сутки.

Пронзв.: Bayer (Германия)

Траумель С (Traumeel® S)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Arnica D2, Calendula D2, Hamamelis D2, Millefolium D3 по 15 мг, Belladonna D4 75 мг, Aconitum D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulphuris D8 по 30 мг, Chamomilla D3, Symphytum D8 по 24 мг, Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpureae D2 по 6 мг, Hypericum D2 3 мг; в упаковке 50 шт.

1 ампула с 2,2 мл раствора для инъекций содержит Arnica D2, Calendula D2, Millefolium D3, Belladonna D2, Chamomilla D3, Symphytum D6 по 2,2 мкл, Aconitum D2 1,32 мкл, Bellis perennis D2 1,1 мкл, Hypericum D2 0,66 мкл, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpureae D2 по 0,55 мкл, Hamamelis D1 0,22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris D2 2,2 мкл; в упаковке 5, 100 шт.

100 г мази содержат Arnica D3 1,5 г, Calendula, Hamamelis по 0,45 г, Millefolium, Hypericum по 0,09 г, Belladonna D1, Aconitum D1 по 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 г, Hepar sulphuris D6 0,025 г, Symphytum D4, Bellis perennis по 0,1 г, Chamomilla, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpureae D2 по 0,15 г; в тубах по 50 г. Основа: гидрофильная мазь Salbe DAB

9, консервированная этанолом 12,5%; в упаковке 50 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антиэкссудативное, антитромботическое, гемостатическое, иммуностимулирующее, обезболивающее.

Показ.: Воспалительные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, стилоидит, эпикондилит, бурсит, плечелопаточный периартрит, синовиит, артрозы крупных и мелких суставов, гемартроз, подагра, болезнь Бехтерева); травмы (растяжения, ушибы, вывихи, гематомы, переломы); последствия острой травмы (сотрясение головного мозга и последствия родового травматизма); гемофтальм, кровоизлияние в сетчатку; пародонтит, пародонтоз, гингивит; варикозные расширения вен нижних конечностей, геморрой; профилактика и лечение инфекционных осложнений у хирургических больных в послеоперационном периоде; различные формы острой вирусной ринопатологии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к Arnica (мазь) или сложноцветным (раствор для инъекций).

Поб. действ.: Гиперсаливация и аллергические реакции, требующие отмены препарата, артралгия.

Взаим.: Эффект повышается при одновременном применении нескольких лекарственных форм препарата.

Примен. и доз.: Сублингвально, обычно по 1 таблетке 3 раза в сутки. Местно, втирают мазь в пораженные участки 2-5 раз в сутки; возможно наложение повязки, компресса. Раствор для инъекций - в/в, в/м, п/к, в/к (при рубцах), внутрисуставно или периартикулярно - по 1-2 ампулы 1-3 раза в неделю, в острых случаях - ежедневно. При заболеваниях суставов рекомендуется комбинировать с препаратом Цель Т.

Предост.: Не следует применять мазь на больших участках тела.

Произв.: Neel (Германия)

Трексан (Trexan®)

Метотрексат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метотрексата 2,5 или 10 мг; в упаковке 30 или 100 шт.

1 мл раствора для инъекций - 2,5 или 25 мг, во флаконах по 2 и 20 мл; в упаковке 10 и 1 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антагонизм с фолиевой кислотой, подавление синтеза ДНК, РНК, белка.

Показ.: Карциномы легких (крупно- и мелкоклеточные), молочной железы, головы и шеи, мочевого пузыря, шейки матки, яичников, яичек; остеосаркома; острый лимфолейкоз детей, острый лимфо- и миелолейкоз взрослых, неходжкинская лимфома, гистиоцитарная и лимфатическая лимфомы, лимфома Беркитта.

Противопоказ.: Поражение печени, почек и костного мозга, беременность (особенно I триместр).

Поб. действ.: Стоматит, лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, поражение почек и печени, кожные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, 30 мг/кв.м в течение 5 дней с последующим перерывом 2 нед; в/в, капельно в течение не более 5 дней. В полости вводят (разводят физраствором) в концентрации 1 мг/мл. Рекомендуются дозы - 12 мг/кв.м 1-2 раза в неделю. Разовая доза - не более 15 мг. При дозах, превышающих 70 мг/кв.м, необходимо одновременное применение фолиата кальция.

Предост.: Необходимо проводить контрольные исследования лейкоцитов и тромбоцитов до и после лечения. При назначении больших доз рН мочи должен поддерживаться на щелочном уровне. Лактирующим женщинам следует приостановить грудное вскармливание.

Произв.: Orion (Финляндия)

Трексил (Trexyl®)

Терфенадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит терфенадина 60 мг; в упаковке 10x10 шт.

5 мл суспензии для приема внутрь - 30 мг; во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное (блокада H₁-гистаминовых рецепторов).

Фармакокин.: Хорошо всасывается из ЖКТ; связывание с белками плазмы - 97%; большая часть превращается в активные метаболиты в печени. После приема внутрь (60 мг) максимальная концентрация в плазме терфенадина достигается через 1 ч, активных метаболитов - через 2-3 ч. Период полураспределения 3-4 ч, период полувыведения 16-23 ч (в среднем 17 ч). Действие начинается через 1-2 ч, достигает максимума через 3-4 ч и продолжается более 12 ч. Распределяется по всем тканям, накапливается в печени и легких. Выводится кишечником (60% введенной дозы) и почками (40%), в основном в виде метаболитов.

Фармакодин.: Частота седативных эффектов (сонливость, слабость, головок-

ружение, нарушение концентрации внимания) аналогична таковой при приеме плацебо и в 2 раза ниже, чем при приеме традиционных антигистаминных препаратов.

Показ.: Сезонный аллергический ринит, аллергические поражения кожи с зудом и эритемой (крапивница, дермографизм, атопическая экзема, контактный дерматит), атопическая астма и астма, вызванная физической нагрузкой, острые аллергические реакции на лекарства, пищу, укусы насекомых и т.д.; простудные заболевания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не следует принимать в период лактации; при беременности рекомендуется лишь в тех случаях, когда результаты терапевтического действия оправдывают риск для плода.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, сухость слизистых оболочек рта, носа, глотки, кашель, боли в горле, эпистаксис, повышение уровня трансаминаз, кожные реакции (алопеция, ангионевротический отек, фотосенсибилизация, сыпь), экстрасистолы (у больных с нарушением функции печени).

Взаим.: Не влияет на депрессивные эффекты алкоголя и бензодиазепинов, усиливает действие кортикостероидов и кромogliката натрия, совместим с бронходилататорами и антагонистами H₂-рецепторов.

Передоз.: Рекомендуется удаление невсосавшегося препарата, кардиомониторинг в течение не менее 24 ч (может возникнуть экстрасистолия), симптоматическая и поддерживающая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 таблетки 1 раз в день или по 10 мл суспензии и 1 таблетке 2 раза в день; детям в виде суспензии - 3-5 лет - 15 мг 2 раза в сутки, 6-12 лет - 30-60 мг.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Трентал (Trental®)

Пентоксифиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пентоксифиллина 100 или 400 мг.

1 драже или 1 ампула с 5 мл инъекционного раствора - 100 мг.

В упаковке 60 (драже, таблетки) и 5 (ампулы) шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, ангиопротекторное, улучшение микроциркуляции, антиагрегационное, антиадгезивное, снижение вязкости крови, анти-

тромботическое, увеличение пластичности эритроцитов.

Показ.: Нарушения периферического артериального и венозного кровообращения вследствие атеросклероза, диабета, воспалительных процессов, трофических изменений и ангионевропатии; ишемические и постинсультные состояния, сосудистая патология глазного дна и внутреннего уха, ишемическая болезнь сердца.

Противопоказ.: Острый инфаркт миокарда, массивные кровотечения, кровоизлияние в мозг, обширные кровоизлияния в сетчатку, беременность, гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические явления, тошнота, головокружение, боль в области сердца, ощущение жара, гиперемия, аллергические проявления.

Взаим.: Усиливает эффект гепарина, фибринолитиков, ряда гипотензивных и гипогликемических препаратов (инсулин, пероральные антидиабетические средства).

Примен. и доз.: Внутрь, в/в и в/а. Внутрь, во время или после еды. Начальная средняя доза - по 2 драже (таблетки) 3 раза в день, максимальная суточная доза - 1200-1600 мг. В/в - 5 мл препарата, растворив в 250 или 500 мл инфузионного раствора, вводят капельно в течение 1,5-3 ч. Затем дозу постепенно увеличивают до 15 мл препарата в день. Перед в/а введением 0,1-0,3 г препарата разводят в 20-50 мл физиологического раствора хлорида натрия и вводят в течение 10-30 мин.

Произв.: Hoechst Marion Roussel (Индия)

Трентал 400 (Trental® 400)

Пентоксифиллин*

Трентал (Trental®)

Пентоксифиллин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 драже содержат пентоксифиллина 400 мг.

1 ампула Трентала с 5 мл раствора для инъекций - 100 мг; в упаковке драже - 50 шт, ампулы 5 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, ангиопротекторное, антиагрегационное, снижение вязкости крови, улучшение микроциркуляции.

Показ.: Оклюзионное поражение периферических артерий, нарушения периферического артериального и венозного

кровообращения при атеросклерозе, диабете (перемежающаяся хромота, боли в покое) и трофических нарушениях (язвы голени, гангрена), атеросклеротические нарушения мозгового кровообращения (нарушение концентрации, внимания, головокружение, забывчивость), ишемические и постинсультные состояния, нарушения кровоснабжения глаз и органов слуха в сочетании с дегенеративными процессами в сосудах и снижением функции зрения и слуха.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, массивные кровотечения, обширные кровоизлияния в сетчатку, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности. Во время лактации применение возможно после оценки соотношения риска и ожидаемого положительного результата.

Поб. действ.: Диспептические явления (тошнота, рвота, понос), головокружение, кардиалгия, ощущение жара, гиперемия кожи лица, тахикардия, артериальная гипотония, головная боль, расстройства сна, повышение уровня печеночных трансаминаз, внутрипеченочный холестаз, тромбоцитопения, кровотечения из кожи и слизистых, тахикардия, зуд, уртикарная сыпь, анафилактические или анафилактоидные реакции (ангионевротический отек, бронхоспазм).

Взаим.: Усиливает действие гипотензивных, гипогликемических средств, теофиллина.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в и в/а. Внутрь во время или после еды. Начальная доза - 400 мг 3 раза в день, после улучшения состояния дозу уменьшают до 400 мг 2 раза в день. В/в, капельно в течение 1,5-3 ч - по 5 мл препарата в 250 или 500 мл инфузионного раствора. Затем дозу постепенно увеличивают до 15 мл в день. Перед в/а введением 0,1-0,3 г препарата разводят в 20-50 мл физиологического раствора хлорида натрия и вводят в течение 10-30 мин.

Предост.: В связи с угрозой кровотечения и, в меньшей мере, возможным снижением АД рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами с выраженными нарушениями ритма сердца, при инфаркте миокарда, при сниженном артериальном давлении, при выраженной почечной и печеночной недостаточности.

Произв.: Hoechst (Германия)

Три-регол (Tri-regol)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка охрово-желтого цвета содержит левоноргестрела 0,05 мг

и этинилэстрадиола 0,03 мг; 1 таблетка абрикосово-розового цвета - левоноргестрела 0,075 мг и этинилэстрадиола 0,04 мг и 1 таблетка белого цвета - левоноргестрела 0,125 мг и этинилэстрадиола 0,03 мг; в каждой конвалюте 6 таблеток охрово-желтого цвета, 5 таблеток абрикосово-розового цвета и 10 таблеток белого цвета, всего 21 шт.; в упаковке 3 конвалюты.

Фарм. действ.: Контрацептивное.

Показ.: Контрацепция, дисменорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания печени и желчного пузыря, хронический колит, тяжелый сахарный диабет, другие заболевания эндокринной системы, нарушения липидного обмена, тяжелые органические заболевания сердца, тяжелая артериальная гипертензия, цереброваскулярные заболевания, повышенная склонность к тромбозам, серповидно-клеточная анемия, хроническая гемолитическая анемия, злокачественные опухоли, тетания, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, масталгия, увеличение или уменьшение массы тела, снижение толерантности к глюкозе, изменения либидо, кровянистые выделения из влагалища, головные боли, лабильность настроения, утомляемость, судороги в икроножных мышцах, кожные высыпания.

Взаим.: Эффект снижают индукторы микросомального окисления (рифампицин, барбитураты, фенитоин), антибиотики широкого спектра, сульфониламиды, производные пиразолона.

Примен. и доз.: Внутрь, для контрацепции, в вечернее время, с 5-го дня менструации по 1 таблетке в день. Начинают с приема таблеток охрово-желтого цвета (6 дней), затем в течение 5 дней принимают таблетки абрикосово-розового цвета и после этого в течение 10 дней - таблетки белого цвета. Курс - 21 день. После 7-дневного перерыва (в это время наступает менструальноподобное кровотечение) приступают к следующему 21-дневному курсу.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Триакорт (Triacortum)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: Мазь, содержащая 0,1% триамцинолона ацетонида; в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Воспалительные и аллергические заболевания кожи (экзема, псориаз, нейродермит, дерматит).

Противопоказ.: Бактериальные, вирусные и грибковые инфекции кожи, раны и язвы, беременность.

Поб. действ.: Вторичные инфекции и атрофические изменения кожи, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Накожно, наносят на пораженные участки кожи 1-3 раза в день в течение 5-10 (до 25) дней. Для усиления эффекта накладывают окклюзионную повязку.

Произв.: Акрихин (Россия)

Триам-ко (Triam-co)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триамтерена 50 мг и гидрохлоротиазида 25 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, гипотензивное.

Фармакодин.: Гидрохлортиазид увеличивает выведение из организма ионов натрия, хлора, калия, магния, бикарбонатов и эквивалентных количеств воды. Задерживает выведение ионов кальция, мочевой кислоты. Триамтерен при слабом натрийуретическом действии уменьшает выведение из организма ионов калия и магния.

Показ.: Артериальная гипертензия; отечный синдром различного генеза (хроническая сердечная недостаточность, нефротический синдром, цирроз печени, предменструальные отеки и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и почек, гиперкалиемия, детский возраст.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, сухость во рту; гипокалиемия, судороги, гиперкалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, гипомагниемия, гиперкальциемия; тахикардия, головокружение, слабость, парестезии, головная боль; повышение концентрации в крови мочевой кислоты, мочевины, креатинина, глюкозы, аллергические реакции (кожная сыпь, фотосенсибилизация).

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при артериальной гипертензии - начальная доза 1 таблетка в сутки, затем дозу постепенно увеличивают - до 4 таблеток в сутки. При отечном синдроме - 1 таблетка 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 3 таблетки.

Предост.: С осторожностью применяют при сахарном диабете, подагре, нарушениях функции печени и/или почек. Пожилым пациентам препарат назначают в

уменьшенных дозах. При длительном применении необходим контроль за уровнем электролитов, мочевины, креатинина, глюкозы, мочевой кислоты в крови.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Триамцинолон (Triamcinolonum)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триамцинолона 0,004 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антиаллергические, иммунодепрессивное.

Показ.: Аллергические заболевания, надпочечниковая недостаточность, бронхиальная астма, ревматизм, ревматоидный артрит, аутоиммунная гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемобластозы, лейкомия, склеродермия, пузырчатка, лимфосаркома, контактные дерматиты.

Противопоказ.: Артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, атеросклеротический кардиосклероз со стенокардией, глаукома, недостаточность кровообращения, беременность.

Поб. действ.: Остеопороз, кровотечения ЖКТ, гирсутизм, миастения, угнетение функции надпочечников, обострение инфекций, гипертонической и язвенной болезни, головокружение, головная боль.

Примен. и доз.: Внутрь, по 4-8-16 мг/сутки в 2-4 приема, после наступления терапевтического эффекта дозу уменьшают постепенно до 1 мг в день.

Произв.: Акрихин (Россия)

Триамцинолон (Triamcinolon)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит триамцинолона 2 или 4 мг; в упаковке 50, 100, 500 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, антитоксическое.

Показ.: Артриты (ревматоидный, юношеский хронический), ревмокардит, системная красная волчанка и др. коллагенозы, нефротический синдром, бронхиальная астма, лекарственные и профессиональные поражения легких, сывороточная болезнь, гипоальбуминемия, аллергические и воспалительные дерма-

тозы, аутоиммунная гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Крона, язвенный колит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, системные грибковые заболевания, туберкулез, герпес, др. местные и системные инфекции, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острый гломерулонефрит, кишечный анастомоз, дивертикулит, миастения, остеопороз, тромбоз, тромбофлебит, расстройства психики, беременность.

Поб. действ.: Охриплость голоса, сухость в полости рта и глотке, отек лица, затрудненное дыхание, кашель, слабость, покраснение, зуд, гипертрихоз, атрофия кожи, гипер- или гипопигментация, угри, остеопороз, катаракта, пептическая язва, задержка роста у детей, включая младенцев и подростков; изменения показателей белкового, жирового и электролитного обменов, кандидоз полости рта.

Примен. и доз.: Внутрь, в зависимости от показаний - от 4 до 48 мг/сутки. Детям, при возможности, назначают в минимальной дозе и короткими курсами.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Трианол (Trianol®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит 25 мг липидостеролового комплекса из коры дерева *Rygeum africanum*; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное.

Показ.: Аденома предстательной железы, нарушения мочеиспускания без органических изменений, расстройства после простатэктомии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, боль в яичках, гинекомастия, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 капсулы 2 раза в сутки (утром и вечером) перед едой в течение 4-6 нед.

Произв.: Lek (Словения)

Триасепт (Triasept®)

Сост. и ф.в.: Бацитрацина 400 ЕД, неомицина сульфата 3,5 мг и полимиксина В сульфата 5000 ЕД на мазевой основе; мазь в тубах.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции кожи, порезы, ссадины и ожоги.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Назначать с осторожностью.

Поб. действ.: Суперинфекция (при длительном применении).

Примен. и доз.: Наружно. Наносят на область поражения 1-3 раза в день. На мазь может быть наложена стерильная повязка.

Предост.: Следует использовать только наружно, не наносить на большую поверхность, не допускать попадания в глаза. Не рекомендуется применять более 1 нед.

Произв.: American Drug Company (США)

Тридерм (Triderm®)

Сост. и ф.в.: 1 г мази или крема содержат бетаметазона дипропионата 0,64 мг (эквивалентно 0,5 мг бетаметазона), гентамицина (в форме сульфата) 1 мг и клотримазола 10 мг; в тубах по 15 и 30 г.

Фарм. действ.: Местное противовоспалительное, сосудосуживающее, противозудное, антибактериальное, противогрибковое.

Показ.: Дерматозы, течение которых осложнено вторичной инфекцией или имеется опасность инфицирования, дерматомикозы, кандидозы, инфекции кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Жжение, зуд, раздражение кожи, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, мацерация кожи, вторичная инфекция, атрофия кожи, потница, появление стрий; системные побочные эффекты (угнетение функции коры надпочечников). У детей: угнетение гипоталамо-гипофизарно надпочечниковой системы, синдром Кушинга, задержка роста, отставание в прибавке массы тела, повышение внутричерепного давления.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером). Курс - не более 3-4 нед.

Предост.: Необходимо избегать попадания препарата на открытые раны или поврежденную кожу. Не следует применять в офтальмологической практике.

Произв.: Schering-Plough (США).

Тридин (Tridin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для жевания содержит ионов фтора 5 мг (в форме L-глутаминмонофторфосфата) и ионов

кальция 150 мг (в форме кальция глюконата и цитрата); в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита кальция, стимуляция образования и активности остеобластов, фиксация кальция в костной ткани.

Показ.: Первичный остеопороз.

Противопоказ.: Остеомаляция, тяжелая почечная недостаточность, гиперкальциемия, гиперкальциурия, период роста.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Боли в суставах, расстройств ЖКТ, флюороз.

Взаим.: Уменьшает всасывание ионов железа и тетрациклинов. Хорошо совместим с кальцием пищи или назначаемым дополнительно.

Примен. и доз.: Внутрь по 1-2 жевательных таблетки 3 раза в день не менее 1 года.

Произв.: CSC (Италия)

Тризистон (Trisiston®)

Сост. и ф.в.: 1 драже красно-коричневого цвета содержит этинилэстрадиола - 30 мкг и левоноргестрела 50 мкг; 1 драже белого цвета - этинилэстрадиола 40 мкг и левоноргестрела 75 мкг; 1 драже бежевого цвета - этинилэстрадиола 30 мкг и левоноргестрела 125 мкг; в упаковке 21 шт. (6 красно-коричневых, 6 белого и 9 бежевого цвета).

Фарм. действ.: Гестаген-эстрогенная контрацепция.

Показ.: Контрацепция.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли молочных желез и матки, тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, тяжелый сахарный диабет, тромбоэмболические заболевания и тромбозы артерий и вен (в т.ч. в анамнезе), сердечно-сосудистые заболевания, серповидно-клеточная анемия; идиопатическая желтуха, зуд, герпес, обострение атеросклероза во время предшествующей беременности, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, депрессия, тошнота, диарея, болезненность молочных желез; при длительном использовании - появление коричневых пятен на коже, ухудшение переносимости контактных линз, повышается риск развития тромбоэмболий.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже в сутки, начиная с первого дня менструального цикла и в течение 21 дня: первые 6 дней принимают красно-коричневые драже, с 7 по 12 день - белые, с 13 дня - бежевые, затем - 7-дневный перерыв (после которого должно начаться типич-

ное менструальное кровотечение). Интервал между приемом очередных доз препарата не должен превышать 36 ч (22-26 ч).

Предост.: Прием препарата необходимо прекратить при наступлении беременности, появлении сильных головных болей, острых нарушениях зрения, слуха, тромбоэмболии, застое желчи или желтухе, повышении АД, генерализованном зуде, учащении эпилептических припадков, порфирии, длительном постельном режиме.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Трийодтиронин® (Triiodthyronin)

Лиотиронин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит лиотиронина 20 или 50 мкг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита гормонов щитовидной железы.

Показ.: Гипотиреоз (первичный, вторичный, после операций по поводу струмы, как результат терапии радиоактивным йодом), профилактика рецидива зоба после его резекции; тиреостатическое лечение гипертиреоза (после достижения эутиреоидного состояния); супрессивная и заместительная терапия при злокачественной опухоли щитовидной железы (преимущественно после тиреоидэктомии); супрессионный тест щитовидной железы.

Противопоказ.: Гипертиреоз (исключение - сопутствующая терапия при тиреостатическом лечении гипертиреоза после достижения эутиреоидного состояния), острый инфаркт миокарда, стенокардия, инфаркт миокарда у пожилых пациентов со струмой, миокардит, нарушения функции коры надпочечников.

Бер. и корм. гр.: Допустимо. Не разрешается применение во время беременности в качестве сопутствующей терапии при тиреостатическом лечении гипертиреоза у матери (может привести к развитию гипотиреоза у плода).

Поб. действ.: Возможны симптомы гипертиреотоксикоза (тахикардия, аритмии, тремор, беспокойство, бессонница, гипергидроз, потеря массы тела, диарея), временное повышение массы тела, алопеция.

Взаим.: Снижает эффект гипогликемических средств, усиливает - непрямым антикоагулянтов. Фенитоин, салицилаты, дикумарол, фуросемид (в высоких дозах), клофибрат повышают содержа-

ние в крови. Холестирамин подавляет всасывание.

Примен. и доз.: Дозу устанавливают индивидуально. Внутрь, суммарную суточную дозу утром, натощак за 30 мин до завтрака, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Начальная доза - 25 мкг/сутки. Эту дозу увеличивают через каждые 2-4 нед на 25-50 мкг/сутки до достижения оптимального эффекта. Средняя поддерживающая доза - от 50 до 75 мкг/сутки. Для лучшей переносимости суточную дозу можно разделить на 2-3 приема. Рекомендуются строго придерживаться установленного ритма приема; нельзя наверстывать пропущенную дозу, а также прерывать, изменять назначенный врачом курс лечения.

Предост.: С осторожностью назначать пациентам пожилого возраста при коронарной болезни сердца, сердечной недостаточности и тахикардии. При одновременном назначении с непрямыми коагулянтами и гипогликемическими препаратами необходим контроль свертываемости и содержания сахара в крови.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Триквилар (Triquilar®)

Сост. и ф.в.: 6 драже светло-коричневого цвета содержат левоноргестрел 0,05 мг и этинилэстрадиол 0,03 мг; 5 драже белого цвета - соответственно 0,075 и 0,04 мг; 10 драже цвета охры - 0,125 и 0,03 мг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт. или 3x28 шт. (с 7 драже коричневого цвета без действующего вещества).

Фарм. действ.: Эстроген-гестагенное, контрацептивное.

Показ.: Предупреждение нежелательной беременности.

Противопоказ.: Беременность, тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени или тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, серповидноклеточная анемия, рак молочной железы или эндометрия, нарушения жирового обмена, герпес в анамнезе, идиопатическая желтуха, зуд и отосклероз с ухудшением во время беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушение функции желудка, нагрубание молочных желез, депрессивные состояния, изменение массы тела и либидо, появление пятен коричневого цвета на

лице, плохая переносимость контактных линз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно с первого дня цикла, и далее по стрелке на упаковке приблизительно в одно и то же время.

Произв.: Schering (Германия)

Триксилем (Trixilem)

Метотрексат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 2,5 мг метотрексата; в упаковке 50 шт.

1 флакон с раствором для инъекций - 5, 50, 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антималярийное, иммунодепрессивное.

Показ.: Острый лимфоцитарный лейкоз у детей, хориокарцинома и другие тромбопластические опухоли, лимфосаркома, лимфома Беркета, остеогенная саркома, опухоли мозга, груди, шейки матки, головы и шеи, легких, яичников, яичек, мочевого пузыря, тяжелый псориаз, микозы.

Противопоказ.: Тяжелое нарушение функции почек и печени, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, беременность.

Поб. действ.: Изъязвление слизистой полости рта, желудочно-кишечные расстройства, лейкопения, тромбоцитопения, депрессия костного мозга, мегалобластическая анемия, повышение уровня ферментов печени, повреждение почек, легочные реакции (включая инфекционный пневмонит).

Взаим.: Вытесняется из связи с альбуминами плазмы сульфонидами, салицилатами, тетрациклинами, хлорамфениколом, фенитоином.

Передоз.: Назначают фолиевую кислоту (нейтрализует токсический эффект препарата на костный мозг). Обеспечивают адекватную гидратацию и подщелачивание мочи (эффективно в течение 42 ч с момента передозировки), что увеличивает экскрецию.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в, в/м, в/а, внутрикапсуально. При дозах выше 70 мг/кв.м поверхности тела совместно с фолиевой кислотой.

Предост.: В течение 6 мес после окончания терапии мужчинам и женщинам следует воздержаться от зачатия, т.к. возможен тератогенный эффект.

Произв.: CSC (Италия)

Тримепранол (Trimepranol®)

Метипранолол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метипранолола 10 или 40 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, антигипертензивное, антиаритмическое (бета-адреноблокирующее).

Показ.: Гипертоническая болезнь, стенокардия (стабильная и нестабильная), состояние после инфаркта миокарда, аритмии, гипертрофическая кардиомиопатия, тревога, гиперкинетический синдром (в том числе при гипертиреозе, феохромоцитоме), тремор на фоне приема препаратов лития).

Противопоказ.: Брадикардия, АВ-блокада II и III степени, гипотония, сердечная недостаточность, бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма и свежий инфаркт миокарда, прогрессирующий общий атеросклероз, гипогликемия, метаболический ацидоз.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при лактации.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, брадикардия, АВ-блокада, бронхоспазм, мышечная слабость, парестезии, нарушения сна, утомляемость, нарушения зрения, депрессия, галлюцинации, головокружение, головная боль, увеличение массы тела, гипотония, хроническая сердечная недостаточность, нарушение периферического кровообращения, отек легких, синдром отмены, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект д-тубокурарина, симпатолитиков, инсулина и сульфаниламидных противодиабетических средств, вазодилататоров, эрготамина, ослабляет - адреналина, препаратов наперстянки, ацетилсалициловой кислоты. Действие повышается фенитоином, фуросемидом, циметидином и гидралазином и снижается нестероидными противовоспалительными средствами. Несовместим с ингибиторами МАО, галогенсодержащими анестетиками, аймалином, хинидином, верапамилом, клонидином, мазиндолом, алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь (перед едой), в индивидуальной дозе (в зависимости от чувствительности больного и характера заболевания). Обычно назначают 10 мг, затем постепенно увеличивают на 10 мг, при этом ЧСС в положении лежа должна находиться в пределах 50-60 ударов в минуту (но не менее 45-50 ударов в минуту). При стенокардии средняя су-

точная доза составляет 80-120 мг, при гипертонии - 40-80 мг, при аритмии и гиперкинетическом синдроме - 10-40 мг; при нейроциркулярной астении - 10-30 мг; при лечении тремора суточная доза не должна превышать 30 мг.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Тримопан (Trimopan®)

Триметоприм*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триметоприма 100 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции мочевыводящих путей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушение функции печени и почек, синдром мальабсорбции, дефицит фолиевой кислоты, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, по 100 мг 1-2 раза в день. Детям - ежедневно - 2-6 мг/кг.

Предост.: Назначение лактирующим женщинам требует прекращения грудного вскармливания.

Произв.: Orion (Финляндия)

Тримосул (Trimosul)

Ко-тримоксазол

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит триметоприма 80 мг и сульфаметоксазола 400 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, почек, мочевыводящих путей, ЖКТ (включая тиф, паратиф и холеру), простатит; инфекции ран и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые заболевания печени, выраженные нарушения функции почек, болезни крови, беременность, лактация, ранний детский возраст (до 2 мес).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, глоссит, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, мегалобластная анемия, тромбоцитопеническая пурпура, псевдомембранозный колит, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, гемолиз эритроцитов у больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке).

Взаим.: Не рекомендуется одновременное применение тиазидных диуретиков, пероральных сахароснижающих препаратов, не прямых антикоагулянтов, са-

лицилатов, фенилбутазона, напроксена, фенитоина, производных парааминобензойной кислоты.

Примен. и доз.: Внутрь, дозу устанавливают индивидуально. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей, бактериальных энтеритах суточная доза составляет 800 мг сульфаметоксазола и 160 мг триметоприма (2 таблетки) в 2 приема. Курс лечения - в среднем 5 дней. При пневмонии - 100 мг/кг сульфаметоксазола и 20 мг/кг триметоприма в сутки, разделенная на 4 приема (каждые 6 ч) в течение 14 дней. При гонорее - по 2 г сульфаметоксазола и 400 мг триметоприма утром и вечером в течение 1 дня.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Триомбраст® (Triombrastum®)

Натрия амидотризоат*

Сост. и ф.в.: 60 и 76% раствор смеси натриевой и метилглюкаминовой солей тромбраста для инъекций в ампулах по 20 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Рентгеноконтрастное.

Показ.: Артериография, вазография, аортография, ангиокардиография, экскреторная урография, ретроградная пиелография, цистография.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гипертиреоз, тяжелые поражения почек, печени, миокарда, гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации, шок, коллапс, активные формы туберкулеза, миеломная болезнь, гиперпротромбинемия.

Поб. действ.: Ощущение жара, головокружение, тошнота, рвота, учащение пульса, цианоз, аритмии, фибрилляция желудочков, остановка сердца.

Примен. и доз.: Интраваскулярно, по 30-60 мл со скоростью 3-35 мл/с в зависимости от вида диагностической процедуры. Внутривенно.

Предост.: Необходимо определять чувствительность к йоду.

Произв.: Фармак (Украина)

Триптизол (Tryptizol®)

Амитриптилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит амитриптилина гидрохлорида 10 или 25 мг; в упаковке 100 шт. 1 ампула - 1 мл 1% раствора амитриптилина гидрохлорида; в упаковке 12 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессантное, седативное, холинолитическое.

Показ.: Депрессии, энурез (при отсутствии органической патологии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острая фаза инфаркта миокарда, возраст (до 12 лет).

Бер. и корм. гр.: При назначении беременным или женщинам, которые могут забеременеть, следует сопоставить потенциальный положительный эффект с возможной опасностью для матери и ребенка. Противопоказан при кормлении грудью.

Поб. действ.: Гипо- или гипертензия, обморок, неспецифические изменения ЭКГ, тахикардия, аритмии, блокада проводящей системы сердца, инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сознания и сна, возбуждение, бред, галлюцинации, тремор, атаксия, периферическая нейропатия, экстрапирамидные расстройства, мидриаз, нарушение аккомодации, повышение внутриглазного давления, диспептические расстройства, запор, угнетение кроветворения, импотенция, синдром отмены, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами МАО (возможны гиперпиретические кризы, судороги, смерть). Ослабляет гипотензивный эффект гуанетидина или соединений с подобным действием. В комбинации с антихолинергическими средствами может вызывать паралитическую непроходимость кишечника. Метаболизм может снижаться циметидином. Усиливает реакцию организма на алкоголь, барбитураты и другие средства, угнетающие ЦНС. Одновременный прием с тетраамином может провоцировать делирий. При совместном назначении с холинолитиками или нейролептиками возможна гиперпирексия (особенно при жаркой погоде).

Передоз.: Имеется сообщение о летальной аритмии через 56 ч после передозировки.

Примен. и доз.: Внутрь, в/м и в/в. Начинать лечение следует с малых доз, постепенно их увеличивая. При приеме внутрь взрослым амбулаторным больным в начале лечения обычно достаточно 75 мг в сутки в несколько приемов; при необходимости дозу увеличивают до 150 мг в сутки. Увеличивать дозировку желательно в конце дня и/или перед сном. Седативное действие проявляется быстро, антидепрессивное может проявиться через 3-4 дня, для адекватного развития эффекта может потребоваться до 30 суток. Для госпитализированных больных в начале лечения может потребоваться доза 100 мг в сутки; при необходимости дозу постепенно увеличивают

до 200-300 мг в сутки. Для подростков и пожилых людей рекомендуются меньшие дозы (50 мг в несколько приемов или однократно). С целью уменьшения вероятности рецидива поддерживающее лечение следует продолжать в течение 3 мес и более. При парентеральном введении пациентам с депрессивным синдромом начальная доза составляет 20-30 мг (2-3 мл) 4 раза в сутки. Курс - 1 нед. После выявления характера реакции на лечение и снятия более серьезных проявлений депрессии можно назначать внутрь. Парентеральное лечение используется для пациентов, не способных или не желающих принимать препарат внутрь. При энурезе детям младше 6 лет назначают 10 мг перед сном, детям 6-10 лет - 10-20 мг в сутки, детям 11-16 лет - 25-50 мг в сутки.

Предост.: Назначать осторожно пациентам с припадками в анамнезе, нарушенной функцией печени и задержкой мочи (в т.ч. в анамнезе), закрытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением (может возникнуть глаукоматозный криз). Следует прекратить прием препарата за несколько дней до хирургической операции. У некоторых пациентов снижается быстрота реакции (избегать управления автомобилем и других видов деятельности, которые становятся опасными при снижении реакции). Требуют тщательного наблюдения пациенты с сердечно-сосудистыми расстройствами (большие дозы вызывают аритмии, синусовую тахикардию, замедление проводимости; сообщалось об инфаркте миокарда и инсульте), гипертиреозом. Во время лечения больных с депрессией сохраняется опасность суицида.

Произв.: MSD (США)

Трисеквенс® (Trisequens®)

Сост. и ф.в.: Упаковка в виде календарного диска из 28 таблеток содержит 12 голубых таблеток по 2 мг эстрадиола (в виде полугидрата), 10 белых таблеток по 2 мг эстрадиола (в виде полугидрата) и 1 мг норэтистерона ацетата и 6 красных таблеток по 1 мг эстрадиола.

Фарм. действ.: Эстроген-прогестагенное (трехфазный препарат с преобладанием эстрогенов).

Показ.: Эстрогенная недостаточность в климактерическом периоде; облегчение менопаузальных симптомов, профилактика остеопороза в постменопаузе.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли (карцинома молочной железы или эндометрия); острые и хронические заболевания печени (в т.ч. в анамнезе) при нарушенных печеночных функциональных тестах; тромбозы глубоких вен, тромбоэмболии, расстройства мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе); маточные кровотечения неясной этиологии, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Нерегулярные менструальноподобные выделения и болезненность молочных желез в первые месяцы лечения. Редко: тошнота, головная боль, отечность, алопеция, нарушения зрения, тромбозы и тромбоэмболия, повышение АД, кожные аллергические реакции, менструальноподобное кровотечение (вследствие пропущенного приема).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в сутки, ежедневно без перерывов. У менструирующих женщин или у женщин, находящихся на заместительной гормональной терапии, прием начинают с 5 дня менструального цикла. При отсутствии менструаций или нерегулярном цикле, можно начинать прием в любой день.

Предост.: Препарат не является контрацептивом и не предохраняет от беременности. С осторожностью назначают при гипертонии, эпилепсии, мигрени, сахарном диабете, бронхиальной астме и сердечной недостаточности. Пациенты, принимающие антигипертензивные препараты, должны находиться под регулярным наблюдением врача. При длительном лечении необходимы не реже 1 раза в год профилактические осмотры. Лечение прекращают при тромбозе глубоких вен, тромбоэмболических нарушениях, при появлении желтухи, усилении мигренозных болей, внезапном нарушении зрения, значительном повышении АД, а также за 4-6 нед до плановой хирургической операции. Появление измененных или нерегулярных менструальных выделений на фоне лечения требует диагностического выскабливания для исключения злокачественных новообразований матки.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Тритаце (Tritace®)

Рамиприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит рамиприла 1,25, 2,50, 5 и 10 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Венодилатирующее, гипотензивное, ингибирование АТФ.

Показ.: Артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, постинфарктный период.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, гемодинамически значимый стеноз почечной артерии единственной почки, выраженный стеноз почечных артерий.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Гипотония, аритмия, обострение перфузионных нарушений при сосудистых стенозах, миокардиальная или церебральная ишемия, почечная недостаточность, приливы, конъюнктивит, облысение, отслоение ногтевых пластинок, феномен Рейно, увеличение анафилактикоидных реакций на другие препараты, сухой кашель, насморк, бронхит, бронхоспазм, сухость, раздражение или воспаление слизистой рта, диспепсия, панкреатит, увеличение активности печеночных трансаминаз, гепатит, анемии (в том числе гемолитическая), тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, панцитопения, гиперкалиемия, гипонатриемия, головная боль, ослабление либидо, снижение эрекции, импотенция, мышечные судороги, миалгия, артралгия, фотосенсибилизация, ангионевротический отек, зуд, крапивница, различные формы экзантемы и энантемы, лихорадка, эозинофилия, васкулит, повышенное содержание антинуклеарных антител.

Взаим.: Цитостатики, иммуносупрессоры и кортикостероиды повышают вероятность лейкопении.

Примен. и доз.: Гипертония: начальная дозировка - 2,5 мг 1 раз в сутки, увеличение (удвоение) дозировки необходимо проводить постепенно на протяжении 2-3 нед, максимальная суточная доза - 10 мг. Застойная сердечная недостаточность: начальная дозировка - 1,25 мг/сутки. После инфаркта миокарда: начальная дозировка - 2,5 мг 2 раза в сутки, если переносимость препарата снижена, рекомендуется на протяжении первых двух дней принимать по 1,25 мг.

Произв.: Hoechst (Германия)

Триттико (Trittico)

Тразодон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с контролируемым высвобождением содержит тразодона 75 или 150 мг, в упаковке 30 и 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Антидепрессивное.

Показ.: Депрессии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, возбуждение, нарушение сна, тошнота, рвота, снижение аппетита, гипотония, приапизм.

Взаим.: Усиливает действие алкоголя, барбитуратов, других средств, угнетающих ЦНС, миорелаксантов.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды по 300-600 мг/день при тяжелых формах и 150-300 мг/день при средне-тяжелых формах (в 2 приема после обеда и вечером); 75-150 мг/сутки при легких и латентных формах (однократно перед сном). Курс - не менее 1 мес.

Предост.: При эпилепсии, кардиопатии, беременности, лактации, заболеваниях печени, почек, после инфаркта миокарда назначать с осторожностью. Снижает концентрацию внимания, о чем следует предупредить пациентов, управляющих транспортными средствами.

Произв.: CSC (Италия)

Трифермент (Triferment)

Панкреатин

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит панкреатин (с минимальной активностью трипсина 18 ЕД W.W.L, липазы 6 ЕД W.W.L и амилаз 1:10); в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Нормализация пищеварения, восполнение дефицита ферментов поджелудочной железы.

Показ.: Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз); хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, состояние после резекции или облучения этих органов; для улучшения процесса пищеварения (при погрешностях в питании, нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни); подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.

Поб. действ.: Гиперурикозурия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды. Драже проглатывают целиком, запивая большим количеством нещелочной жидкости (вода, фруктовые соки). Взрослым - по 1-3 драже 3 раза в день, детям - по 1-2 драже в день. Продолжительность лечения - от нескольких дней до

нескольких месяцев и лет (в качестве заместительной терапии).

Произв.: Romferchim (Румыния)

Трозид (Trosyd)

Тиоконазол*

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит тиоконазола 10 мг; в тубах по 15, 20 и 30 г.

Фарм. действ.: Противогрибковое (фунгицидное), антибактериальное.

Показ.: Дерматомикозы, вызванные дерматофитами и дрожжами, в т.ч. осложненные бактериальной инфекцией; эпидермофития стоп и ногтей; дерматомикоз паховой области и гладкой кожи.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к другим производным имидазола).

Поб. действ.: Аллергические реакции; местное раздражение.

Примен. и доз.: Наружно, крем легко втирают в пораженный и прилежащий участок кожи 1-2 раза в день утром и/или вечером, в местах опрелостей наносят тонким слоем и равномерно втирают во избежание мацерации кожи. Лечение отрубевидного лишая проводят 7 дней; тяжелых дерматомикозов стоп - до 6 нед; дерматомицетных инфекций др. участков, кандидоза, эритразмы - 2-4 нед; инфекций ногтей - 6-12 мес.

Предост.: Не рекомендуется использовать в офтальмологической практике. При развитии аллергической реакции лечение прекращают.

Произв.: Pfizer (США)

Тромбо АСС (Thrombo ASS®)

Ацетилсалициловая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка в кишечнорастворимой оболочке содержит ацетилсалициловой кислоты 50 или 100 мг; в упаковке 30 или 100 шт.

Фарм. действ.: Антиагрегационное.

Показ.: Профилактика тромбозов, эмболий, инфаркта миокарда, мигрени, сужения сосудов после хирургических операций на сосудах (аортокоронарное шунтирование), нарушений мозгового кровообращения, артериальной гипертензии беременных, преэклампсии; лечение острого инфаркта миокарда.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в стадии обострения, склонность к кровотечениям, нарушение свертываемости крови, гемофилия, нефролитиаз.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, скрытые желудочно-кишечные кровотечения

(возможно развитие железо-дефицитной анемии), пролонгирование менструации, тромбоцитопения, приступы бронхиальной астмы, реакции гиперчувствительности (спастическое дыхание, кожные проявления); при длительной терапии высокими дозами - нарушения функции почек, головокружение, звон в ушах, кровотечение из язв ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50-100 мг 1 раз в день.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Тромбовар (Trombovar®)

Натрия тетрадецилсульфат*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит натрия тетрадецилсульфата 0,06 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Веносклерозирующее.

Фармакодин.: Препарат используется для облитерации варикозных вен путем повреждения просвета вены. Облитерация достигается под действием сурфактантного анионного детергента.

Показ.: Варикозное расширение вен нижних конечностей, пищевода; кожные бугорчатые ангиомы у детей, кисты сальных желез и слизистых оболочек, липомы.

Противопоказ.: Очень большие варикозные очаги, недоступные вены, острый тромбоз глубоких вен, лихорадочные состояния.

Поб. действ.: Восходящий флебит (возможно с перифлебитом), остаточная пигментация, интраварикозные гематомы, аллергические реакции; очень редко - тромбоз легочных вен.

Примен. и доз.: В/в. Перед применением проверяют реакцию венозного эндотелия пробным введением 1 мл 1% раствора. Лечение: инъекции повторяют каждую неделю или через неделю, с возрастающим количеством мест инъекций и постепенным увеличением общей дозы. Начинают от 0,5 до 2 мл (1% раствора) в точки укола, расположенные от 6 до 12 см друг от друга. Для больших варикозных очагов используют 3% раствор (не более 10 мл при одном сеансе). 1% раствор можно получить путем разбавления 3% раствора физиологическим раствором до нужной концентрации.

Произв.: Laboratoires Promedica (Франция)

Тромбофоб (Trombophob®)

Гепарин натрия*

Сост. и ф.в.: 100 г геля и мази содержат 30000 МЕ гепарина натрия; в тубах по 40 и 100 г.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное, противотечное.

Фармакодин.: Улучшает микроциркуляцию в области кожных швов и активирует тканевый обмен, благодаря этому ускоряет процессы рассасывания гематом и тромбов и уменьшения отеков тканей.

Клин. фарм.: Хорошая переносимость геля обусловлена содержанием в нем специального жирового компонента, который оказывает благоприятное воздействие на кожу.

Показ.: Локальный отек после ушиба.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (к гепарину и его гомологам).

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Аллергические реакции (в единичных случаях).

Примен. и доз.: Наносят на поврежденные участки 2-3 раза в день в течение не более 10 дней.

Предост.: Нельзя наносить на открытые раны (только на близлежащие участки кожи) и не применять после окончания срока годности препарата.

Произв.: Knoll (Германия)

Тропацин (Tropacium)

Дифенилтропин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит дифенилтропина гидрохлорида 10 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, спазмолитическое, блокада центральных и периферических м-холинорецепторов.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм, экстрапирамидные нарушения (спастический паралич, ригидность, гиперкинез, болезнь Литтля, спазм гладкой мускулатуры внутренних органов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, угроза преждевременных родов, интоксикация фосфорорганическими соединениями).

Противопоказ.: Глаукома, мерцательная тахикардия, артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, печеночно-почечная недостаточность.

Поб. действ.: Гипосаливация, диспепсия, головная боль, головокружение, возбуждение, тахикардия, парез аккомодации.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 10-12,5 мг 1-2 раза в день, при хорошей переносимости доза может быть увеличена до 15-20 мг. Высшая разовая доза - 30 мг, суточная - 100 мг. Детям - 1-5 мг 1-2 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Трусопт (Trusopt®)

Дорзоламид*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит дорзоламида гидрохлорида 20 мг; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Противоглаукомное, ингибирование карбоангидразы.

Фармакокин.: Выводится, в т.ч. в виде метаболитов, в основном почками.

Фармакодин.: Оказывает преимущественно местное действие, но после абсорбции может вызывать системные эффекты, характерные для сульфонамидов (например, диуретический).

Клин. фарм.: Эффективность и безопасность применения не зависят от возраста (в т.ч. у пациентов старше 65-75 лет). Однако следует учитывать возможность большей чувствительности к препарату некоторых пожилых пациентов.

Показ.: Повышенное внутриглазное давление, первичная и вторичная (в том числе псевдоэксфолиативная) открытоугольная глаукома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее или равен 30 мл/мин), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Возможно, если предполагаемый лечебный эффект для матери оправдывает потенциальный риск для плода. В период лактации рекомендуется или отменить препарат, или прекратить кормление грудью.

Поб. действ.: Жжение, покалывание и зуд в глазах, раздражение век, затуманивание зрения, слезотечение, конъюнктивит, блефарит, иридоциклит, горечь во рту, тошнота, головная боль, астения, утомляемость, сыпь, мочекаменная болезнь.

Взаим.: Совместим с офтальмологическими растворами тимолола и бетаксолола. Возможно комбинирование с ингибиторами АПФ, антагонистами кальция, диуретиками, НПВС (включая аспирин), эстрогенами, инсулином, тироксином, хотя и не исключается повышение токсичности (например, при приеме

больших доз аспирина) из-за системной ингибиции карбоангидразы.

Передоз.: Вызывает нарушения электролитного баланса, ацидоз, расстройства ЦНС. Лечение симптоматическое. Необходим контроль уровня электролитов в сыворотке (особенно калия) и рН крови.

Примен. и доз.: Конъюнктивально, по 1 капле 3 раза в день. В комбинации с бета-адреноблокаторами - по 1 капле 2 раза в день. При сочетании с несколькими местными офтальмологическими средствами введение препаратов проводят с интервалом в 10 мин.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с нарушением функции печени, при ношении контактных линз (из-за абсорбции бензалкония хлорида - консерванта, входящего в состав препарата), т.к. опыта применения у этих больных не имеется.

Произв.: MSD (США)

Тубокурарин (Tubocurarine®)

Тубокурарин хлорид*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит тубокурарина хлорида 10 мг, в ампулах по 1,5 мл; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Миорелаксантное.

Показ.: Операции, столбняк (для длительного - более 1 ч - расслабления мышц).

Противопоказ.: Миастения, преклонный возраст.

Взаим.: Несовместим с другими препаратами, расслабляющими скелетные мышцы. Усиливает эффект гипотензивных средств.

Примен. и доз.: Парентерально, 15-25 мг.

Произв.: Orion (Финляндия)

Туринойрин (Turineurin®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит сухого экстракта зверобоя 225-237,5 мг (соответствует 0,1375 мг гиперидина); в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антидепрессивное, седативное.

Фармакодин.: Угнетает МАО (в основном А-типа), связывается с бензодиазепиновыми рецепторами, оказывает седативное действие (бифлавоноид гиперфорин).

Показ.: Психовегетативные нарушения, страх и/или нервное беспокойство, депрессия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Только под контролем врача.

Поб. действ.: Фотосенсибилизация; световая гиперчувствительность (у белокожих пациентов).

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой (целую капсулу), запивая большим количеством жидкости - по 1 капсуле 3 раза в день, при необходимости - по 2 капсулы 3 раза в день. Возможно длительное применение.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Туриплекс (Turiplex®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит сухого экстракта тыквенных семечек 122,5 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антидизуритическое.

Показ.: Гиперестезия мочевого пузыря, дизурия I стадии (нарушения опорожнения мочевого пузыря при аденоме предстательной железы), доброкачественное увеличение предстательной железы.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой (целую капсулу), запивая большим количеством жидкости - по 1 капсуле 3 раза в день. Можно применять длительно.

Предост.: Препарат устраняет симптомы заболеваний, возникающих при увеличении предстательной железы, но не меняет ее размеров, поэтому во время лечения необходимо регулярно посещать лечащего врача.

Произв.: Jenapharm (Германия)

Тыквеол® (Tycveolum)

Сост. и ф.в.: Комплекс биологически активных веществ, получаемых из тыквы (каротиноиды, токоферолы, фосфолипиды, стерины, фосфатиды, флавоноиды, витамины В₁, В₂, С, Р, РР, F, насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты - пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидовая). В трех чайных ложках препарата содержится суточная доза витаминов А, Е, F, В. Во флаконах по 50 и 100 мл.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, желчегонное, противоязвенное, антисептическое; антисклеротическое, снижение пролиферации клеток простаты.

Показ.: Гепатит, жировая дистрофия печени, цирроз печени, холецистохолангит, дискинезия желчевыводящих путей, гастрит, язвенная болезнь желудка и

двенадцатиперстной кишки, изжога, колит, энтероколит, геморрой; атеросклероз; простатит, аденома предстательной железы, эрозия шейки матки. Наружно - герпес, дерматит, диатез, псориаз, экзема; ожоги и ожоговая болезнь; пародонтоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, диарея (необходимо снизить дозу).

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды, по 1 чайной ложке 3-4 раза в день в течение 1-3 мес. Накожно, смазывают пораженные участки 2-3 раза в день. Ректально, при геморрое и простатите (наряду с внутренним применением) - микроклизмы. В гинекологии - вагинальные тампоны 2 раза в сутки. При пародонтозе - аппликации.

Произв.: Европа (Россия)

Убихинон композитум (Ubichinon compositum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл (2,2 г) раствора для инъекций содержит Ubichinonum D10, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D8, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Vaccinium myrtillus D4, Colchicum autumnale D4, Podophyllum peltatum D4, Conium maculatum D4, Hydrastis canadensis D4, Acidum sarcolacticum D6, Hydrochinonum D8, Acidum alpha-liponicum D8, Sulfur D8, Manganum phosphoricum D8, Natrium diethyloxalaceticum D8, Trichinoylum D10, Anthrachinonum D10, Naphthochinonum D10, para-Benzochinonum D10, Adenosinum triphosphoricum D10, Coenzymum A D10, Galium aparine D6, Acidum acetylsalicylicum D10, Histaminum D10, Nadidum D10 и Magnesium gluconicum D10 по 22 мкл; в упаковке 5 или 100 шт.

Фарм. действ.: Биостимулирующее, антисептическое, антиоксидантное, иммуностимулирующее, метаболическое, противовоспалительное, детоксикационное, противоаллергическое.

Показ.: Хронические дегенеративные заболевания внутренних органов и систем организма (в т.ч. новообразования); интоксикационный синдром (кахексия, истощение, лихорадочные инфекции); нарушение обмена веществ (атеросклероз, почечно-желчнокаменная болезнь, подагра и др.), абсолютный или относительный дефицит ферментов, витаминов, минеральная недостаточность; гипоксические состояния вследствие забо-

леваний, физического и психического стресса; последствия химиорадиотерапии.

Противопоказ.: Беременность, лактация.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/к, по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Произв.: Heel (Германия)

Уголь активированный (Carbo activatus)

Активированный уголь

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит угля активированного 0,25 г (вспомогательное вещество - крахмал картофельный); в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Адсорбирующее.

Показ.: Диспепсия, метеоризм, интоксикация алкалоидами, солями тяжелых металлов, пищевые интоксикации.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2-3 таблетки 3-4 раза в день.

Произв.: Медисорб (Россия)

Уголь активированный ФАС-Э (Carbo activatus FAS-E)

Активированный уголь

Сост. и ф.в.: Гранулы в стеклянных флаконах по 15 г и пакетах по 5, 10 и 45 г.

Фарм. действ.: Абсорбирующее, противодиарейное, энтеросорбирующее.

Показ.: Диарея, диспепсия, метеоризм, пищевые интоксикации, отравление алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.

Примен. и доз.: Внутрь, между приемами пищи, размешать гранулы в 100 мл воды, взрослым - по 10 г 3 раза в день; детям до 7 лет - по 5 г; 7-14 лет - 7 г на прием. Длительность курса лечения - 3-15 дней (зависит от тяжести и течения интоксикации).

Произв.: Кристалл (Россия)

Укидан (Ukidan®)

Урокиназа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с сухим веществом для приготовления инъекционного раствора содержит урокиназы 5000, 25000, 100000, 500000 или 1000000 МЕ, в комплекте с растворителем в ампулах по 2 мл.

Фарм. действ.: Фибринолитическое, активация превращения плазминогена в плазмин.

Фармакокин.: После в/в введения период полувыведения препарата в плазме не превышает 20 мин.

Клин. фарм.: Повышенная фибринолитическая активность сохраняется в течение нескольких часов.

Показ.: Острые артериальные и венозные тромбозы и тромбоэмболии.

Противопоказ.: Продолжающееся или недавно остановленное кровотечение; язвенные заболевания ЖКТ; церебральные тромбозы или наличие предрасполагающих факторов для возникновения внутричерепного кровоизлияния; сниженная свертываемость крови; диабетическая геморрагическая ретинопатия; острый отек легких; наличие любой кровоточащей опухоли; тромбоз позвоночной или сонной артерии; подострый эндокардит, мерцание предсердий, митральный стеноз.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности лечение препаратом может оказаться неэффективным вследствие наличия в циркулирующей крови высокого уровня естественных ингибиторов урокиназы. Осторожно назначать в первые 18 нед беременности.

Поб. действ.: Кровоизлияния в области перфузии (особенно при инфузиях превышающих 48 ч), кровотечения из десен, кишечные, пурпура (редко), эмболия фрагментами лизированного первичного тромба (редко), лихорадка, снижение (умеренное) гематокрита.

Взаим.: Гепарин и препараты, нарушающие функцию тромбоцитов (нестероидные противовоспалительные средства) увеличивают риск развития кровотечения. Антифибринолитические средства снижают эффект. Не рекомендуется смешивать в одном шприце с другими препаратами.

Примен. и доз.: Порошок с активным веществом разводят непосредственно перед введением прилагаемым растворителем. При тромбоэмболии легочной артерии и периферическом артериальном тромбозе вводят 300000 МЕ путем медленной (15-30 мин) в/в инфузии с последующей непрерывной перфузией в дозе 250000 МЕ/ч в течение 12 ч, при инфаркте миокарда - в "ударной" дозе (2000000 МЕ) в/в, при тромбозе глубоких вен - 200000 МЕ путем медленной (15-30 мин) инфузии, затем 100000 МЕ/ч в течение 24-72 ч путем непрерывной перфузии, при гифеме и гемофтальме - 5000-25000 МЕ препарата, при тромбозе артериовенозного шунта - непосредственно в тромбированный шунт (и оставляют в нем в течение 1-2 ч) 5000-

25000 МЕ препарата, разведенного в физиологическом растворе.

Предост.: Следует с осторожностью назначать пациентам в возрасте старше 70 лет, в случае расслаивающейся аневризмы, после недавно проводившейся сердечно-легочной реанимации, при подозрении на повреждение внутренних органов.

Пронзв.: Serono (Швейцария)

Улкодин (Ulcodin®)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ранитидина гидрохлорида 150 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, подавление секреции желудочного сока, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона, рефлюкс-эзофагит, гиперацидность желудочного сока.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, усталость, кожная сыпь, тромбоцитопения, спутанность сознания, галлюцинации, гинекомастия, дисменорея, гиперпролактинемия, импотенция, выпадение волос, лейкопения.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи - по 150 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 6 нед. В случае рецидивов курс лечения может быть продолжен до 12 мес при приеме 1 таблетки в день.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушении выделительной функции почек.

Пронзв.: Alkaloid (Македония)

Улкосан (Ulcosan)

Ранитидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ранитидина гидрохлорида 150 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, антигистаминное (блокада H₂-гистаминовых рецепторов).

Фармакокин.: Хорошо абсорбируется, характеризуется выраженным эффектом "первого прохождения" через печень. Биодоступность - около 65%. C_{max} в плазме достигается через 1-3 ч и составляет 400-500 мг/мл после приема 150 мг, терапевтический уровень в плазме сохраняется около 12 ч. Связывание с белками плазмы низкое (15%), интен-

сивно метаболизируется в печени (около 70% введенной дозы). $T_{1/2}$ - 2-3 ч. Выводится преимущественно почками (до 30% - в неизмененном виде).

Фармакодин.: Уменьшает базальную и стимулированную (гистамином, гастрином и ацетилхолином) секрецию соляной кислоты, повышает значение рН желудочного сока, уменьшая активность пепсина.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение и профилактика), "стрессовая" язва, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера - Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказан во время лактации. В период беременности назначают по строгим показаниям на непродолжительное время.

Поб. действ.: Головные боли, головокружение, вялость, сонливость, тошнота, боли в животе, запор или диарея, повышение в плазме уровня АСТ, АЛТ, глутаматаминотрансферазы, креатинина, редко - лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции (кожная сыпь).

Взаим.: Антациды и сукральфат уменьшают абсорбцию, холиноблокаторы повышают биодоступность. Пирензепин усиливает эффект. Пролонгирует выведение метопролола (в 2 раза), снижает почечный клиренс триамтерена и прокаинамида. Увеличивает действие глипизида, нифедипина, фенитоина, циклоспорина, теофиллина, дисульфирама, изониазида, пероральных контрацептивов. Изменяет (усиливает или уменьшает) эффект диазепама.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке утром и вечером или 2 таблетки вечером до рубцевания язвы (без эндоскопического контроля - не менее 4 нед). Для профилактики рецидивов язвенной болезни - по 1 таблетке вечером в течение 12 мес. При синдроме Золлингера-Эллисона - 6 таблеток (в исключительных случаях и более) в сутки. Больным с клиренсом креатинина ниже 50 мл/мин назначают по 1 таблетке (150 мг) 1 раз в сутки.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с нарушениями функций почек и печени (в этих случаях дозу необходимо уменьшить). Препарат может снижать кожную реакцию на аллергены.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Ультравист-240, 300, 370 (Ultravist®-240, 300, 370)

Иопромид*

Сост. и ф.в.: 1 мл Ультрависта-240 содержит иопромид 499 мг (соответствует 240 мг йода), во флаконах объемом 50 мл; в упаковке 10 шт.

1 мл Ультрависта-300 - 623 мг (соответствует 300 мг йода), во флаконах объемом 10, 20, 50 и 100 мл; в упаковке 10 шт.

1 мл Ультрависта-370 - 769 мг (соответствует 370 мг йода), во флаконах объемом 30, 50 и 100 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Рентгеноконтрастное.

Показ.: Компьютерная томография (КТ), ангиография (в т.ч. цифровая субстракционная ангиография), урография, флебография, исследование полостей тела (артрография, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, гистеросальпингография, галактография), исследования ЖКТ при пероральном применении. При субарахноидальном введении - для миелографии, КТ-миелографии, КТ-цистерно/вентрикулографии, КТ-кистографии.

Противопоказ.: Абсолютные: гиперчувствительность к йодсодержащим рентгеноконтрастным средствам, гипертиреоз, острые воспалительные процессы в области таза (для гистеросальпингографии). Относительные: недостаточность кровообращения с явлениями декомпенсации, тяжелые поражения печени и почек, спастические заболевания церебральных сосудов.

Бер. и корм. гр.: При беременности используется только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гиперемия, чувство жара и болевые ощущения (во время внутрисосудистого введения); редко - шоковые реакции (по типу сосудистого коллапса).

Примен. и доз.: При коронарной ангиографии - от 5 до 8 мл, при ангиографии верхних конечностей - 8-12 мл, в остальных случаях от 30 до 80 мл (1-1,5-2 мл/кг).

Произв.: Schering (Германия)

**Ультракаин Д-С
(Ultracain D-S)****Ультракаин Д-С форте
(Ultracain D-S forte)**

Артикаин*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит артикаина гидрохлорида 40 мг, эпинефрина гидрохлорида 6 или 12 мг (ультракаин Д-С форте) и натрия дисульфата 0,5 мг, в карпулах по 1,7 мл; в упаковке 100 шт. или в ампулах по 2 мл; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Показ.: Местное обезболивание в стоматологии при пломбировании полости зуба, обтачивании зубов для коронок, при экстракции зубов; хирургические вмешательства на слизистой, костях и пульпе, остеотомия, чрезкожный остеосинтез, кистэктомия, резекция верхушки корня зуба, препарирование полостей и культей для коронок у зубов с повышенной чувствительностью и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к артикаину и эпинефрину; пароксизмальная тахикардия, мерцательная тахикардия, закрытоугольная глаукома, бронхиальная астма (у больных с повышенной чувствительностью к сульфиту).

Поб. действ.: Нарушение сознания (вплоть до потери), остановка дыхания, тремор, судороги, тошнота, рвота, падение или повышение АД, тахикардия или брадикардия, аритмия.

Взаим.: Гипертензивное действие эпинефрина усиливается ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

Примен. и доз.: При неосложненном удалении зубов верхней челюсти (отсутствие воспаления) используется инфильтрационная анестезия ультракаином в дозе 1,7 мл. В большинстве случаев нет необходимости проводить анестезию небным доступом. В случаях необходимости вмешательств на слизистой неба проводят инфильтрационную анестезию в дозе 0,1 мл. При хирургических и терапевтических вмешательствах на нижней челюсти в области премоляров (5-5) инфильтрационная анестезия ультракаином дает эффект проводникового обезболивания. При вмешательствах на твердых тканях зуба (лечение кариеса или препарирование зуба под коронку), за исключением нижних моляров, показана инфильтрационная анестезия ульт-

ракаином в дозе от 0,5 до 1,7 мл на каждый зуб. Максимально допустимая доза ультракаина для взрослого человека составляет 7 мг/кг массы.

Произв.: Hoechst (Германия)

Ультралан (Ultralan®)**Флуокортолон***

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит флуокортолона моногидрата 2,5 мг и флуокортолона гексаноата 2,5 мг; в тубах по 10 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Контактный дерматит, экзема: контактная, истинная, микробная, дисгидротическая, себорейная, анальная, сопровождающая варикозный синдром; экзема у детей, нейродермит (эндогенная экзема, атопический дерматит), псориаз, красный плоский и бородавчатый лишай, хроническая дискоидная красная волчанка, эритродермия, термические ожоги первой степени, солнечные ожоги, укусы насекомых, зуд вульвы и заднего прохода.

Противопоказ.: Туберкулезные и сифилитические поражения кожи, вирусная инфекция.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: При нанесении на большие поверхности кожи (свыше 10%) или при длительном использовании (более 4 нед) возможны: атрофия кожи, телеангиэктазия, акнеобразные явления, периоральный дерматит, гипертрихоз, кожные аллергические реакции, системные побочные эффекты.

Примен. и доз.: Местно. Наносить тонким слоем 2-3 раза (после наступления улучшения - 1 раз) в день. В отдельных случаях можно использовать окклюзионную повязку.

Предост.: Не следует наносить на большие поверхности, непосредственно на язвы голени при варикозном синдроме, применять длительно.

Произв.: Schering (Германия)

**Ультрапрокт
(Ultraproct®)**

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит флуокортолона пивалата 920 мкг, флуокортолона капроата 950 мкг и цинхокаина гидрохлорида 5 мг; в тубах по 10 г.

1 суппозиторий - флуокортолона пивалата 610 мкг, флуокортолона капроата

630 мкг и цинхокаина гидрохлорида 1 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, противоотечное.

Показ.: Геморрой, поверхностные трещины заднего прохода, проктит, ограниченный нейродермит анальной области и зуд в области заднего прохода.

Противопоказ.: Туберкулезные, сифилитические и вирусные поражения анальной области.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано в первом триместре беременности.

Поб. действ.: Атрофия кожи (при длительном применении - более 4 нед), кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно. Мазь наносят 2 раза в день (в первый день до 4 раз). Ректально - по 1 суппозиторию в день, в первый день при сильных болях - 2-3 суппозитория.

Произв.: Schering (Германия)

Ультратард® НМ (Ultratard® НМ)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для инъекций содержит биосинтетического человеческого цинк-инсулина кристаллического 40 ЕД; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 4 ч после п/к введения, достигает максимума к 8-24 ч и продолжается 28 ч. При инсулинзависимом сахарном диабете применяется в качестве базального инсулина в сочетании с инсулином короткого действия. При инсулиннезависимом сахарном диабете можно применять как для монотерапии, так и в сочетании с быстродействующими инсулинами.

Показ.: Сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа (при резистентности к производным сульфаниламочевина, интеркуррентных заболеваниях, операциях и в послеоперационном периоде, при беременности).

Противопоказ.: Гипогликемия, инсулинома.

Поб. действ.: Гипогликемия, редко - гиперемия и липодистрофия в местах инъекции.

Взаим.: Эффект усиливают ацетилсалициловая кислота, алкоголь, альфа- и бета-адреноблокаторы, амфетамин, анаболические стероиды, клофибрат, циклофосфамид, фенфлурамин, флуоксетин, ифосфамид, ингибиторы МАО, метилдопа, тетрациклины, тритоквалин,

трифосфамид; ослабляют - хлорпротиксен, diaзоксид, диуретики (в особенности тиазиды), глюкокортикоиды, гепарин, гормональные противозачаточные средства, изониазид, лития карбонат, никотиновая кислота, фенотиазины, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты.

Передоз.: Характеризуется гипогликемией (внезапный пот, сердцебиение, тремор, чувство голода, возбужденность, раздражительность, парестезии в полости рта, бледность, головная боль, сонливость, неуверенность движений, нарушение речи и зрения, депрессия) или комой (потеря сознания, холодный пот, напряжение тканей глазного яблока, судороги по типу Джексона, вплоть до конвульсий, рефлекс Бабинского). Лечение: прием сахара (если больной в сознании), п/к, в/м, в/в 1 мг глюкагона или в/в глюкозу (40-80 мл 40% раствора).

Примен. и доз.: П/к, доза определяется индивидуально. Перед употреблением содержимое флакона осторожно перемешивается. При переводе пациентов с высокоочищенного свиного инсулина на человеческий, доза остается прежней. При переводе с бычьего или смешанного (свиной/бычий) инсулинов доза может быть уменьшена на 10%, за исключением тех случаев, когда исходная доза менее 0,6 ЕД/кг массы тела. При дневной дозе, превышающей 0,6 ЕД/кг массы тела, препарат необходимо вводить в виде двух инъекций в разные места. Больных, получающих в сутки 100 ЕД и более, на время смены инсулина, целесообразно госпитализировать.

Предост.: Нельзя применять раствор, не обладающий присущей ему мутно-белой хлопьевидной консистенцией. Следует иметь в виду, что при переводе на человеческий инсулин, временно может ухудшиться способность к вождению автомобиля.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Ульфамид (Ulfamid®)

Фамотидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фамотидина 20 или 40 мг; в упаковке 20 и 10 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Снижение секреции хлористоводородной кислоты и пепсина; блокада гистаминовых H₂-рецепторов.

Фармакокин.: Хорошо всасывается. Максимальная концентрация в плазме определяется через 1-3,5 ч. Однократная доза (20-40 мг), назначенная вечером, ингибирует 86-94% ночной желудочной

секреции, утром - 76-84% секреции после завтрака. Выделяется почками (клубочковая фильтрация и канальцевая секреция) и кишечником.

Фармакодин.: Ингибирует базальную и стимулированную секрецию хлористоводородной кислоты и пепсина.

Показ.: Язва (в т.ч. профилактика) двенадцатиперстной кишки и желудка, синдром Золлингера-Эллисона, рефлюкс-эзофагит; состояния с выраженной гиперхлоргидрией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, сухость во рту, снижение аппетита, тошнота, рвота, понос, запор, метеоризм, сыпь; редко - судороги, тоска, возбуждение, спутанность сознания, повышение температуры, уровня печеночных ферментов, снижение либидо.

Взаим.: Не изменяет метаболизм препаратов, окисляющихся системой цитохрома P450 (оральные антикоагулянты, теофиллин, фенитоин, диазепам, пропранолол). Прием пищи и антацидов влияет на биодоступность незначительно.

Примен. и доз.: Внутрь. Язва двенадцатиперстной кишки и желудка - по 40 мг 1 раз в день (перед сном) в течение 8 нед (до полного рубцевания язвы); профилактика - по 20 мг 1 раз в день перед сном. Рефлюкс-эзофагит - по 20 мг 2 раза в день в течение 6-12 нед, при язве пищевода - по 20-40 мг 2 раза в день. Синдром Золлингера-Эллисона - по 20 мг каждые 6 ч. Лечение тяжелых случаев - по 160 мг каждые 6 ч. При клиренсе креатинина менее 10 мл/мин суточную дозу снижают до 20 мг или по 20-40 мг каждые 36-48 ч.

Предост.: Перед началом лечения необходимо исключить рак желудка. У больных с печеночной недостаточностью дозу уменьшают.

Произв.: KRKA (Словения)

Умкалор (Umckalor®)

Сост. и ф.в.: 10 г раствора для приема внутрь содержат 8,0 г спиртового экстракта (1:10) из корней *Pelargonium sidoides*, во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Клин. фарм.: Уменьшает температуру тела, снимает кашель, устраняет боли в горле, ощущение разбитости, слабости.

Показ.: Острые и хронические инфекции дыхательных путей и носоглотки

(бронхит, синусит, тонзиллярная ангина, ринофарингит).

Противопоказ.: Тяжелые заболевания почек и печени, склонность к кровотечениям.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Усиливает антикоагулянтный эффект производных кумарина.

Примен. и доз.: Внутрь до еды с небольшим количеством жидкости. При острых заболеваниях по 20-30 капель, при хронических, рецидивирующих - 10-20 капель 3 раза в день. Детям от 6 до 12 лет при острых заболеваниях по 10-20 капель, до 6 лет - 5-10 капель 3 раза в день. Для профилактики рецидивов рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение нескольких дней после исчезновения симптомов заболевания.

Произв.: DHU (Германия)

Уназин (Unasyn®)

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит сульбактама 0,25; 0,5 или 1 г и ампициллина 0,5; 1 или 2 г соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Синусит, средний отит, фарингит, ларингит, инфекции мочевых путей, внутрибрюшные, кожи и мягких тканей, костей и суставов; септицемия, пневмония, пиелонефрит, гонококковые инфекции.

Примен. и доз.: Парентерально - 1,5-12 г/сутки в несколько приемов каждые 6-12 ч. Новорожденным и детям - 150 мг/кг/сутки.

Произв.: Pfizer (США)

Уназин (Unasyn®)

Сультамициллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 0,375 г сультамициллина; в упаковке 12 шт.

1 флакон с порошком для приготовления оральной суспензии - 250 мг/5 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Синусит, средний отит, фарингит, ларингит, инфекции мочевых путей, внутрибрюшные, кожи и мягких тканей, костей и суставов; септицемия, пневмония, пиелонефрит, гонококковые инфекции.

Противопоказ.: Аллергические реакции на пенициллины.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея; анемия, тромбоцитопения, эозинофи-

лия, лейкопения; преходящее повышение активности аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз; боль в месте инъекции (при в/в введении - флебит); сыпь, зуд и другие кожные реакции, анафилактические реакции (иногда приводят к летальному исходу).

Примен. и доз.: Внутрь, в/в, в/м. Внутрь, взрослым - 375-750 мг 2 раза в сутки, детям (с массой тела менее 30 кг) - 25-50 мг/кг в сутки в два приема. Парентерально - 1,5-12 г/сутки в несколько приемов каждые 6-12 ч. Новорожденным и детям - 150 мг/кг/сутки.
Произв.: Pfizer (США)

Унгапивен (Ungariven)

Сост. и ф.в.: 30 г мази содержат яда пчелиного 0,018 г, полиэтиленоксида 1500 13,5 г и полиэтиленоксида 400 до 30 г; в алюминиевых тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Артриты, артрозы, остеохондроз, радикулиты с корешковым синдромом, миалгия, миозит, люмбаго.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания почек, печени и поджелудочной железы, новообразования, туберкулез, тяжелые инфекции, включая острые гнойные, сепсис, заболевания кроветворной системы, декомпенсированная недостаточность кровообращения, психические болезни, кахексия, сахарный диабет, поражения коры надпочечников, беременность.

Поб. действ.: Аллергические реакции: местные (гиперемия, повышение температуры и отек кожи в месте нанесения) и общие (недомогание, озноб, головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры).

Примен. и доз.: Наружно (перед использованием место аппликации промывают теплой водой). Наносят тонким слоем на влажную поверхность тела, втирание проводят в течение 3-5 мин 1-3 раза в сутки. Курс лечения - 1-4 нед.

Предост.: Необходимо избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. Следует иметь в виду, что женщины в период менструации и лица пожилого возраста обладают повышенной чувствительностью к препарату.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Уникер (Unicare)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для твердых контактных линз содержат кокамадопропил-РГ-димоний хлорид-фосфата

0,03 г, полоксамера-407 (POLAX ICN) 0,4 г и натрия эдетата 0,1 г; во флаконах по 120 мл.

100 мл раствора для мягких контактных линз - кокамадопропил-РГ-димоний хлорид-фосфата 0,03 г, полоксамера-407 (POLAX ICN) 0,4 г и натрия эдетата 0,15 г; во флаконах по 250 мл.

Фарм. действ.: Дезинфицирующее, бактерицидное, фунгицидное, консервирующее.

Фармакодин.: Обладает консервирующим действием (кокамадопропил-РГ-димоний хлорид-фосфат), очищает линзы и устраняет с них жировые (полоксамер-407), кальциевые наслоения, нарушающие качество зрения и вызывающие боль (натрия эдетат).

Показ.: Очистка, хранение, дезинфекция контактных линз.

Поб. действ.: Раздражение глаз.

Примен. и доз.: Раствор используется для контактных линз. Линзы следует держать в растворе не менее 6 ч.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Унитиол (Unithiolum)

Унитиол

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 0,05 г 2,3-димеркаптопропансульфоната натрия, в ампулах по 5 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Дезинтоксикационное, устранение дефицита сульфгидрильных групп.

Показ.: Интоксикация мышьяком, ртутью, висмутом, хромом, сердечными гликозидами, гепатоцеребральная дистрофия, диабетическая полиневропатия, хронический алкоголизм.

Поб. действ.: Тошнота, головокружение, тахикардия.

Примен. и доз.: В/м, п/к, при интоксикациях 5-10 мл (из расчета 0,05 мг/кг); в первые сутки вводят через 6-8 ч, во вторые - 12-18 ч по 1-2 инъекции/сутки. При гепатоцеребральной дистрофии - по 5-10 мл ежедневно или через день; курс - 25-30 инъекций с перерывом 3-4 мес. При диабетической полиневропатии - по 5 мл в течение 10 дней.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Уолш поливит для взрослых (Walsh polyvit® for adults)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина А (в том числе бета-каротина) 5000 МЕ, витамина D 400 МЕ, витамина Е

(D₁-альфа токоферол ацетата) 30 МЕ, витамина С 60 мг, витамина В₁ 1,5 мг, витамина В₂ 1,7 мг, витамина В₆ 2 мг, никотинамида 20 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, витамина В₁₂ 6 мкг, биотина 30 мкг, пантотената кальция 10 мг, железа (фумарата) 18 мг, кальция (фосфата) 130 мг, фосфора (фосфата кальция) 100 мг, йода (йодида калия) 150 мкг, магния (оксида) 100 мг, меди (сульфата) 2 мг, цинка (сульфата) 15 мг, хрома 10 мкг, селена 10 мкг, молибдена 10 мкг, марганца (сульфата) 2,5 мг, калия (хлорида) 37,5 мг и хлорида (калия) 34 мг; в упаковке 30 и 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов и минералов.

Показ.: Гиповитаминоз и минеральная недостаточность у взрослых, пожилых и подростков, реконвалесценция, пониженная сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям, повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка, неполноценное питание, неблагоприятные экологические условия, нарушение утилизации витаминов (рвота, диарея, курение, алкоголизм, обильные менструации), атеросклероз, заболевания нервной системы, кожи, глаз, лучевая болезнь, анемия, антибиотико- и сульфониламидная терапия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не развиваются при соблюдении режима дозирования.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды - по 1 таблетке в день.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Уолш поливит для детей (Walsh polyvit® for children)

Сост. и ф.в.: 1 пастилка с фруктовым вкусом содержит витамина А 2500 МЕ, витамина D 400 МЕ, витамина Е (D₁-альфа токоферол ацетата) 15 МЕ, витамина С 60 мг, фолиевой кислоты В_с 300 мкг, витамина В₁ 1,05 мг, витамина В₂ 1,2 мг, никотинамида 13,5 мг, витамина В₆ 1,05 мг и витамина В₁₂ 4,5 мкг; в упаковке 30 и 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита витаминов.

Показ.: Профилактические цели: гиповитаминоз у детей и подростков, пониженная сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям, повышенная физическая и нервно-психичес-

кая нагрузка, неполноценное питание, неблагоприятные экологические условия, нарушение утилизации витаминов (рвота, диарея). Лечебные цели: атеросклероз, заболевания нервной системы, кожи, глаз, лучевая болезнь, антибиотико- и сульфониламидная терапия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 4 лет).

Поб. действ.: Не развиваются (при соблюдении режима дозирования).

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды по 1 пастилке в день.

Произв.: Walsh Pharma (США)

УПСАВИТ витамин С (UPSAVIT vitamin C)

Сост. и ф.в.: 1 "шипучая" таблетка содержит аскорбиновой кислоты 1 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Регуляция окислительно-восстановительных реакций, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, образования стероидных гормонов, повышение сопротивляемости организма инфекциям.

Показ.: Профилактика и лечение гиповитаминоза, компенсация повышенной потребности организма в витамине С в период роста, беременности, лактации, при физических нагрузках, переутомлении, в период реконвалесценции после длительных тяжелых заболеваний.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Гипервитаминоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день, растворив в 1/2 стакана воды.

Произв.: UPSA (Франция)

УПСАВИТ мультивитамин (UPSAVIT multivitamin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для разжевывания со вкусом черной смородины или 1 "шипучая" таблетка со вкусом лимона содержит витамина А 3000 МЕ, витамина В₁ 1,6 мг, витамина В₂ 2 мг, витамина В₅ 6,87 мг, витамина В₆ 4,11 мг, витамина В₁₂ 0,004 мг, витамина С 150 мг, витамина Е 20 МЕ, витамина РР 30 мг, D-биотина 0,15 мг, фолиевой кислоты 0,4 мг, микроэлементы в виде солей: цинка 1,43 мг, меди 0,42 мг, селена 0,025 мг; в упаковке 10 шт. Мультивитамин без сахара, содержит аспартам.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов.

Показ.: Гиповитаминоз, минеральная недостаточность (и их профилактика), беременность, лактация.

Противопоказ.: Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Поб. действ.: Симптомы передозировки витамина А (при длительном применении препарата в высоких дозах).

Взаим.: Снижает эффект фенитоина, фенобарбитала, леводопы.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день в течение 15-30 дней. В период беременности и лактации - по 1 таблетке 2 раза в день в течение 15-30 дней.

Произв.: UPSA (Франция)

Урактон (Uractone)

Спиринолактон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит спинолактона 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое (калийсберегающее), гипотензивное.

Показ.: Первичный гиперальдостеронизм, отек как проявление вторичного гиперальдостеронизма (застойная сердечная недостаточность, цирроз печени с асцитом, нефротический синдром), гипертоническая болезнь.

Противопоказ.: Острая почечная недостаточность, анурия, гиперкалиемия.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Сонливость, головная боль, нарушение перистальтики ЖКТ, атаксия, гинекомастия, нарушение эрекции, андрогенные эффекты (гирсутизм), нарушение менструального цикла, метаболический ацидоз, нарушение водно-солевого обмена, гиперкалиемия, гипонатриемия, повышение температуры, кожная сыпь и другие аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных препаратов (раувольфия, ганглиоблокаторы и др.).

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 таблетки в день, для детей - 3 мг/кг; при гипертонической болезни - 100-200 мг в сутки.

Произв.: CSC (Италия)

Уралит-У (Uralyt-U®)

Сост. и ф.в.: 2,5 г гранулята (1 мерная ложка) для приготовления раствора для приема внутрь содержат калий-натрий-гидрогенцитрата (6:6:3:5) 2,4 г; в упаковке 280 г в комплекте с мерной ложкой, индикаторной бумагой, контрольным календарем.

Фарм. действ.: Повышение pH мочи, растворение мочекислых камней и профилактика почечнокаменной болезни.

Показ.: Мочекислые камни (профилактика - предупреждение образования и лечение - растворение), нефроуролитиаз и цистинурия (вспомогательное средство); для подщелачивания мочи при порфирии кожи, урикозурии, лечении цитостатиками.

Противопоказ.: Острая и хроническая почечная недостаточность, абсолютный запрет на употребление поваренной соли, тяжелые нарушения КЩР (метаболический алкалоз), хронические инфекции мочевыводящих путей.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, гранулят растворяют в стакане воды и выпивают. Перед каждым приемом препарата измеряют pH мочи, после чего определяют дозу. Если не назначено иначе, средняя суточная доза - 10 г (4 мерные ложки), принимается утром и днем - по 1 мерной ложке, вечером - по 2 мерных ложки с учетом показателей pH свежей мочи: при мочекаменной болезни и урикозурии 6,2-6,8; при цистиновых камнях - 7,5-8,5; при лечении цитостатиками - минимум 7, при порфирии - 7,2-7,5. При правильно подобранной дозе значения pH находятся в пределах указанного диапазона; если значения pH мочи выше, суточную дозу в вечерний прием следует снизить на 1/2 мерной ложки; если ниже - дозу увеличить на 1/2 мерной ложки.

Предост.: Рекомендуется постоянно контролировать значения pH мочи. При лечении цистиновых камней и порфирии для определения pH мочи следует использовать специальную индикаторную бумагу с диапазоном pH 7,2-9,7. При одновременном назначении с препаратами дигиталиса или с диетой, обедненной натрием, необходимо учитывать, что средняя суточная доза препарата содержит примерно 1,75 г (44 ммоль) калия и 1 г (44 ммоль) натрия.

Произв.: Madaus (Германия)

Урбазон (Urbason®)

Метилпреднизолон*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с сухим веществом для приготовления инъекционного раствора содержит метилпреднизолон-21-гидросукцинат натрия соли 331,48 или 1325,92 мг (соответствует 250 или 1000 мг метилпреднизолона), в комплекте с растворителем (вода для инъекций) в ампулах по 5 и 10 мл; в упаковке 1 и 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное.

Показ.: Шок (анафилактический, ожоговый, травматический, кардиогенный); отек мозга; шоковое легкое; астматический статус; аддисонов криз; синдром Уотерхаус-Фридрихсена; кризис иммунологической несовместимости при трансплантации органов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность. Для длительного использования не по жизненным показаниям: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелый остеопороз; психиатрические расстройства (в том числе в анамнезе), простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая форма), ветряная оспа, период от 8 нед и до 2 нед после предохранительных прививок, амебиаз, системные микозы, полиомиелит (кроме бульбарно-энцефалических форм), лимфомы, развивающиеся после прививки БЦЖ, глаукома.

Бер. и корм. гр.: По строгим показаниям (грудное кормление следует прекратить).

Поб. действ.: При длительном применении - лунообразное лицо, ожирение, мышечная слабость, гипертензия, остеопороз, снижение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, нарушение секреции половых гормонов (аменорея, гирсутизм, импотенция); красные полосы на коже, петехии, экхимозы, стероидные акне, отеки задержка натрия в тканях, отеки, повышенное выведение калия, снижение активности или атрофия коры надпочечников, васкулит, неприятные ощущения в эпигастрии, язвенные поражения желудка или двенадцатиперстной кишки, повышенный риск инфекционных заболеваний, нарушение иммунных процессов, замедление заживления ран, замедление роста у детей, асептические некрозы костей (головки бедренной и плечевой кости), глаукома, катаракта, психические расстройства, повышение риска тромбоза, панкреатит.

Взаим.: Усиливает действие сердечных гликозидов; снижает гипогликемическую активность противодиабетических средств, антикоагулянтную активность производных кумарина. Барбитураты, рифампицин и фенитоин уменьшают кортикостероидное действие. Усиливает выведение калия с салуретиками, увеличивает риск желудочно-кишечного кровотечения с противовоспалительными препаратами.

Примен. и доз.: В/в, медленно. Взрослым - 250-1000 мг один или несколько раз в день; детям - от 4 до 20 мг/кг массы тела. Интервал между введениями - от 30 мин до 24 ч. При шоковом легком,

кардиогенном шоке, отеке мозга, астматическом статусе, в начальной стадии гиповолемического шока - до 30 мг/кг массы тела. Содержимое ампулы растворяют в 5 (250 мг) или 10 (1000 мг) мл воды для инъекций.

Предост.: При тяжелой инфекции препарат использовать только в сочетании с антибактериальной терапией. Детям - по особо строгим показаниям.

Произв.: Hoechst (Германия)

Урегит (Uregyt®)

Этакриновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этакриновой кислоты 50 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отечный синдром.

Противопоказ.: Анурия, беременность, лактация, возраст (до 2 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз, гиповолемия, головокружение, диспепсия, тошнота, рвота, дисфагия, диарея, острый панкреатит, снижение слуха, аллергические реакции.

Взаим.: Снижает эффективность оральных гипогликемизирующих препаратов, усиливает потерю калия на фоне кортикостероидов, увеличивает ототоксичность аминогликозидов. Стимуляция диуреза снижается НПВС.

Примен. и доз.: Внутрь, утром после еды - по 50 мг, при необходимости увеличение до максимальной - 200 мг.

Произв.: Egis (Венгрия)

Урографин (Urogratin®)

Натрия амидотризоат*

Сост. и ф.в.: 1 мл 76% раствора для инъекций содержит амидотризоата натрия соли 100 мг и меглуминовой соли 660 мг (соответствует 370 мг йода).

1 мл 60% раствора - соответственно 80 и 520 мг (соответствует 292 мг йода), в ампулах по 20 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Рентгеноконтрастное.

Показ.: Урография (внутривенная и ретроградная), ангиокардиография (в т.ч. дигитальная субтракционная ангиография), компьютерная томография, гистеросальпингография.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к йодсодержащим веществам; гипертиреоз, почечная и печеночная недостаточность, активный туберкулез, эмфизема легких, поражения миокарда, тяжелая стадия гипертонической болезни, недо-

статочность кровообращения с явлениями декомпенсации, шоковые и коллаптоидные состояния, острые формы флебита - для флебографии.

Бер. и корм. гр.: При беременности использовать с осторожностью.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожи, цианоз; чувство жара и болевые ощущения (во время инъекции), крапивница, отек Квинке, астматический приступ или анафилактическая реакция (шок, коллапс).

Примен. и доз.: В/в. Урография - от 1 до 0,5 мл/кг, для ангиокардиографии средняя доза составляет 30-60 мл.

Предост.: Препарат относительно противопоказан при выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга, декомпенсированном сахарном диабете, повышенной свертываемости крови, узловатом зобе, плазмоцитоме, общем тяжелом состоянии. Для коронарографии предпочтительно применять урографин 76%.

Произв.: Schering (Германия)

Уротрактин (Urotractin)

Пипемидовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пипемидовой кислоты 400 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: Очень быстро всасывается в кишечнике. Эффективные концентрации в крови создаются через 30 мин, максимальные (в крови и моче) - через 2-3 ч (сохраняется 10-12 ч). Экскретируется в основном почками.

Показ.: Острые инфекции мочеполового тракта, сопровождающиеся болями (цистит, пиелит, цистопиелит, пиелонефрит, уретрит и др.); аденома предстательной железы, недержание мочи, постоянная катетеризация (вспомогательное средство), гонорея (при неэффективности другой терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Только по строгим показаниям и под контролем врача.

Поб. действ.: Тошнота, боли в желудке, нейросенсорные нарушения (головокружения), фотосенсибилизация, высыпания (крапивница, экзема).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1 капсуле 2 раза в день через каждые 12 ч после еды, курс лечения 10 дней.

Предост.: Во время лечения следует избегать воздействия солнечного света (фотосенсибилизация, развитие буллезного дерматита).

Произв.: CSC (Италия)

Урофлукс (Uroflux®)

Сост. и ф.в.: 25 г растворимого растительного чая содержат 8,4 г обезвоженного экстракта следующего состава: кора ивы 3 г, листья березы 9 г, листья толокнянки 6 г, трава хвоща 3 г, трава золотарника 6 г, корень рудбекии 1,5 г, корень лакричника 2 г, корень стальника 2,5 г и корневища злаков 9 г; порошок по 37,5 или 75 г; во флаконах вместимостью 150 и 300 мл соответственно.

Фарм. действ.: Диуретическое, противовоспалительное.

Показ.: Пиелит, цистит, уретрит.

Противопоказ.: Отеки на фоне сердечной и почечной недостаточности.

Взаим.: Совместим с сульфаниламидами и антибиотиками.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чашке чая 3-5 раз в день; одну чайную ложку чая кладут в чашку, заливают горячей водой и размешивают, чай можно подсластить. Флакон немедленно закрыть.

Предост.: При наличии диабета необходимо принимать во внимание, что чайная ложка урофлукса соответствует 0,08 ХЕ.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Урсофальк (Ursofalk®)

Урсодеоксихолевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит урсодеоксихолевой кислоты 250 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, желчегонное, иммуномодулирующее, подавление синтеза холестерина в печени и его абсорбции в кишечнике, снижение содержания холестерина в желчи, растворение холестериновых камней.

Показ.: Первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит, хронический активный гепатит, атрезия внутрипеченочных желчных путей, холестаз при парентеральном питании, билиарный рефлюкс-гастрит, билиарный рефлюкс-эзофагит, дискинезия желчевыводящих путей, алкогольный гепатоз, острый гепатит, профилактика поражений печени при использовании гормональных контрацептивов и цитостатиков, растворение холестериновых желчных камней в желчном пузыре (при невозможности их удаления хирургическим или эндоскопическим методами).

Противопоказ.: Острые инфекционные заболевания желчного пузыря и желчных протоков, беременность.

Поб. действ.: Диарея, кальцинирование желчных камней.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая. Для лечения хронических заболеваний печени Урсофальк применяется непрерывно в течение длительного времени (от нескольких месяцев до 2 лет) в суточной дозе - 10 мг/кг массы тела. Для растворения холестериновых желчных камней - по 2-5 капсул (10 мг/кг) 1 раз в день перед сном. Для успешного растворения необходимо, чтобы камни были чисто холестериновые, их размер не должен превышать 15-20 мм, желчный пузырь (заполненный камнями не более чем наполовину) и желчевыводящие пути должны полностью сохранять свою функцию. Для лечения билиарного рефлюкс-гастрита - по 1 капсуле перед сном. Курс - от 10-14 дней до 6 мес (при необходимости - до 2 лет).

Произв.: Dr. Falk (Германия)

Фазин (Fazin)

Оксиметазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит оксиметазолина гидрохлорида 0,5 мг; во флаконах-капельницах по 30 мл.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее, альфа-адреностимулирующее.

Фармакодин.: Суживает артериолы слизистой оболочки носа, что приводит к снижению отека, гиперемии и экссудации.

Показ.: Острый ринит, синусит, евстахиит, средний отит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, сухой ринит, хроническая сердечная недостаточность, гипертиреоз, сахарный диабет, беременность, детский возраст (до 1 года).

Поб. действ.: Жжение и сухость слизистой носовых ходов, чихание, сухость во рту и горле, тошнота, головокружение, повышенная возбудимость, нарушение сна, сердцебиение, гипертензия; атрофия слизистой оболочки (при длительном применении).

Примен. и доз.: Интраназально, взрослым и детям старше 6 лет - по 2-3 капли в каждую ноздрю каждые 10-12 ч.

Предост.: Рекомендуются использовать не более 3 дней. Если за этот период времени улучшения не наблюдается, необходимо обратиться к врачу. У детей от 1 года до 6 лет применяют только после консультации с врачом.

Произв.: Four Ventures (США)

Фалиминт (Falimint®)

Ацетиламинонитропропоксибензен

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит ацетиламинонитропропоксибензена 25 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Освежающее, охлаждающее.

Показ.: Заболевания (вспомогательная терапия) и инструментальные исследования полости рта и глотки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Не известны.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже несколько раз в день (но не более 10), держать в полости рта до полного рассасывания.

Предост.: Не следует применять длительно.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Фамопсин (Famopsin™)

Фамотидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит фамотидина 20 или 40 мг; в упаковке 30 или 20, 40 и 100 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение кислотопродукции, блокада H₂-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (лечение, профилактика рецидивов) и желудка (легкие формы), состояния, сопровождающиеся повышенной секрецией желудочного сока, включая синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, утомляемость, сухость во рту, анорексия, тошнота, рвота, запоры (или диарея), метеоризм, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. При язве двенадцатиперстной кишки - 1 раз в день, на ночь; для лечения начальная доза - 40 мг в течение 4-8 нед; для профилактики рецидивов - 20 мг. При язве желудка - по 40 мг 1 раз в день, на ночь; если эндоскопически не выявляют заживление язвы в более ранние сроки, лечение продолжают 4-8 нед. При синдроме Золлингера-Эллисона начальная доза - 20 мг каждые 6 ч; дозу и курс лечения подбирают индивидуально; при необходимости дозу повышают до 160 мг каждые 6 ч.

Предост.: Перед началом лечения следует исключить злокачественные опухоли желудка (во избежание маскировки симптомов и затруднений при диагностике во время применения препарата). Больным с нарушением функции почек рекомендуется редуцировать дозы. С осторожностью назначают при беременности (только при крайней необходимости), лактации (необходимо приостановить грудное вскармливание).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Фамосан (Famosan®)

Фамотидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фамотидина 20 или 40 мг; в упаковке 20 или 10 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H_2 -гистаминовых рецепторов.

Фармакокин.: C_{max} в крови достигается через 2-4 ч после приема внутрь. Продолжительность действия составляет около 24 ч.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона, рефлюкс-эзофагит, гиперацидные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Диарея, слабость, головная боль, анорексия, сухость во рту, гастралгия, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, на ночь - по 40 мг в течение 4-6 нед, затем поддерживающая терапия - по 20 мг 1 раз в день в течение 6-12 мес. При нарушении функции почек суточную дозу следует уменьшить до 20 мг/сутки.

Предост.: При одновременном назначении с антацидами интервал между их приемом должен составлять не менее 2 ч.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Фамосан (Famosan)

Фамотидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит фамотидина 20 и 40 мг; в упаковке 20 шт. или 10 и 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоязвенное, блокада H_2 -гистаминовых рецепторов.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (обострение, профилактика рецидивов), язвы (в т.ч. медикаментозные) ЖКТ и анастомоза, эрозивный бульбит, рефлюкс-эзофагит,

синдром Золлингера-Эллисона, функциональная гастропатия с гиперацидозом.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, нарушения аппетита, сухость во рту, тошнота, рвота, метеоризм, запор, понос, повышение активности печеночных ферментов, увеличение уровня мочевины, лейкопения, тромбоцитопения; редко: судороги, расстройство менструального цикла, выпадение волос.

Взаим.: Антацидные средства, содержащие магний и алюминий, снижают всасывание (следует назначать с интервалом не менее 2 ч).

Примен. и доз.: Внутрь, не раскусывая, запивая достаточным количеством жидкости. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - 20 мг 2 раза в день или 40 мг перед сном в течение 4-8 нед; для профилактики рецидивов - 20 мг на ночь; при синдроме Золлингера-Эллисона - по 20-40 мг через каждые 6 ч, в течение периода, необходимого для клинического улучшения (максимальная суточная доза - 480 мг). При других показаниях - обычно по 20 мг на ночь.

Произв.: Pro.Med.CS Praha (Чехия)

Фамотидин (Famotidine)

Фамотидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фамотидина 0,02 или 0,04 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, подавление продукции соляной кислоты, снижение активности пепсина, блокада H_2 -гистаминрецепторов.

Клин. фарм.: Продолжительность действия (при однократном приеме) - от 12 до 24 ч.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. профилактика обострений); симптоматические язвы, эрозивный и рефлюкс-эзофагит; синдром Золлингера-Эллисона.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, усталость, сухость во рту, отсутствие аппетита, диарея или запор, кожная сыпь.

Взаим.: Антациды нарушают абсорбцию, рекомендуется перерыв между приемом антацидов и фамотидина не менее 1-2 ч.

Примен. и доз.: Внутрь. При обострениях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 0,04 г одно-

кратно перед сном или по 0,02 г 2 раза в сутки, в течение 4-8 нед, для профилактики - 0,02 г однократно перед сном; при синдроме Золлингера-Эллисона - по 0,02-0,04 г 4 раза в сутки (до 0,24-0,48 г). Больным с клиренсом креатинина ниже 30 мл/мин или с концентрацией креатинина в сыворотке крови более 3 мг/100 мл - 20 мг в сутки.

Предост.: Необходимо исключить наличие злокачественного процесса в ЖКТ. С осторожностью используют у пациентов с нарушениями функции печени и почек.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Фарестон (Fareston®)

Торемифен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит торемифена (в форме цитрата) 20 или 60 мг; в упаковке 30, 60 или 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиэстрогенное.

Показ.: Рак молочной железы в постменопаузе.

Противопоказ.: Беременность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головокружение, чувство жара, потливость, гиперкальциемия.

Взаим.: Тиазидные диуретики повышают риск гиперкальциемии.

Примен. и доз.: Внутрь, по 60-240 мг ежедневно.

Предост.: Лактирующие женщины должны прекратить грудное вскармливание.

Произв.: Orion (Финляндия)

Фариал (Farial®)

Инданазолин*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит инданазолина гидрохлорида 1,18 мг; в аэрозольном флаконе 10 мл или во флаконах с капельницей по 10 мл.

Фарм. действ.: Вазоконстрикторное, уменьшение отечности слизистой оболочки носа, стимуляция альфа-адренорецепторов.

Показ.: Отечность слизистой оболочки носа при остром и хроническом рините.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, атрофический ринит, закрытоугольная глаукома, возраст (до 7 лет).

Бер. и корм. гр.: Только по строгим показаниям (особенно в первом триместре беременности).

Поб. действ.: Преходящая гиперсекреция (в течение нескольких часов), тошнота, головокружение, бронхоспазм, повышение АД, тахикардия, першение в

горле, аллергические реакции, атрофия слизистой носа (при хроническом рините).

Примен. и доз.: 3-4 раза в сутки по одному распылению или по 2-3 капли в нос. Если после 2-недельного применения, например, при хроническом воспалении слизистой оболочки носа, жалобы не прекращаются, продолжать лечение можно только по рекомендации врача.

Произв.: Knoll (Германия)

Фарингосепт (Faringosept®)

Амбазон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для рассасывания содержит амбазона 10 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антисептическое.

Показ.: Профилактика и лечение острых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и гортани (ангина, тонзиллит, стоматит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Таблетки держат во рту до полного рассасывания, принимают через 15-30 мин после еды. Взрослым - 30-50 мг в сутки; детям от 3 до 7 лет - по 10 мг 3 раза в сутки в течение 3-4 дней. После использования препарата необходимо воздерживаться от приема пищи и питья в течение 3 ч.

Произв.: Romferchim (Румыния)

Фарма-Мед® Леди'с формула Анти-стресс (Pharma-Med® Lady's formula for Anti-stress)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина В₁ 10 мг, витамина В₂ 10 мг, витамина В₆ 10 мг, витамина В₁₂ 50 мкг, фолиевой кислоты 400 мкг, биотина 40 мкг, никотиамида 100 мг, пантотеновой кислоты 20 мг, парааминобензойной кислоты 5 мг, холина 5 мг, инозита 5 мг, витамина С 300 мг, витамина Е 20 МЕ, кальция (карбонат) 50 мг и магния (окись) 25 мг на натуральной основе корня валерьяны, шлемника, страстоцвета, цветов ромашки, сибирского женьшеня, хмеля, листьев крапивы, клопогона кистевидного и красного стручкового перца; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ; седативное.

Фармакодин.: Предупреждает развитие расстройств нервной системы, повышает устойчивость организма к стрессовым нагрузкам, повышает общую сопротивляемость, обладает снотворным, седативным, противосудорожным, болеутоляющим, гипотензивным эффектами, улучшает пищеварение.

Показ.: Профилактика состояний, развивающихся в результате влияния стрессовых факторов.

Примен. и доз.: Внутрь, с приемом пищи, по 1 таблетке в день.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фарма-Мед® Леди'с формула для беременных и кормящих женщин (Pharma-Med® Lady's formula for Pregnant and Suckle's women)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит витамина А (ацетата) 4000 МЕ, витамина D (ацетата) 400 МЕ, витамина Е 11 мг, витамина С 100 мг, фолиевой кислоты 0,8 мг, витамина В₁ 1,5 мг, витамина В₂ 1,7 мг, никотинамида 18 мг, витамина В₆ (гидрохлорида) 2,6 мг, витамина В₁₂ 4 мкг, кальция (сульфата) 200 мг, железа (фумарат) 60 мг, цинка (окись) 25 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ.

Фармакодин.: Обеспечивает нормальный рост плода, нормализует состояние кожи, волос, ногтей беременной женщины; предупреждает развитие токсикоза, стимулирует кроветворение (профилактика анемии).

Показ.: Повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах при беременности и в период лактации.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1 таблетке в день.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фарма-Мед® Леди'с формула для волос, кожи и ногтей (Pharma-Med® Lady's formula for Hair, Skin and Nails)

Сост. и ф.в.: 3 таблетки, покрытые оболочкой, содержат витамина А 5000 МЕ,

витамина С 60 мг, витамина В₁ 5 мг, витамина В₂ 5 мг, никотинамида 25 мг, кальция 300 мг, железа 3 мг, витамина D 100 МЕ, витамина Е 15 МЕ, витамина В₆ 5 мг, фолиевой кислоты 200 мкг, витамина В₁₂ 8 мкг, фосфора 150 мг, йода 112,5 мкг, магния 100 мг, цинка 7,5 мг, биотина 200 мкг, пантотеновой кислоты 15 мг, холина 75 мг, инозита 30 мг, парааминобензойной кислоты 25 мг, селена 12,5 мкг, марганца 5 мг, РНК 30 мг, биофлавоноидов 25 мг, рутина 12,5 мг, бетаина гидрохлорида 25 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ, нормализация функций кожи, волос, ногтей.

Фармакодин.: Способствуют естественному очищению и регенерации кожи, стимулирует иммунитет, улучшает кровоснабжение и укрепляют структуру кожи, волос, ногтей.

Клин. фарм.: Эффект развивается в течение 3-6 мес.

Показ.: Восстановление и поддержание здоровой структуры волос, кожи, ногтей.

Примен. и доз.: Внутрь, с приемом пищи, 3 таблетки в день на протяжении не менее 3-6 мес.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фарма-Мед® Леди'с формула для укрепления костной ткани (Pharma-Med® Lady's formula for Bone Density)

Сост. и ф.в.: 2 таблетки, покрытые оболочкой, содержат кальция (карбоната) 1000 мг, магния (окиси) 500 мг, калия 10 мг, меди 1,3 мг, кремния 2 мг, бора 2 мг, марганца 5 мг, ванадия 200 мкг, молибдена 250 мкг, витамина D 50 МЕ и фолиевой кислоты 100 мкг на натуральной основе молочного чертополоха, люцерны, чеснока, молодых побегов ячменя и бурых морских водорослей; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита кальция и др. микроэлементов, витаминов, регуляция фосфорно-кальциевого обмена, нормализация минерального состава костной ткани.

Фармакодин.: Обеспечивает оптимальную минерализацию костной ткани, предотвращая риск развития рахита и остеопороза, улучшая сращивание пере-

ломов. Способствует восстановлению эпидермиса кожи, предотвращает ломкость ногтей, стимулирует кроветворение. Обладает общеукрепляющим, антитоксическим, антиоксидантным действиями.

Показ.: Остеопороз (профилактика и лечение), переломы костей.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, ежедневно по 2 таблетки.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фарма-Мед® Леди'с формула Железо плюс (Pharma-Med® Lady's formula for Iron support)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит железа (сульфат) 65 мг, витамина С 60 мг, никотиамида 20 мг, кальция (карбоната) 20 мг, цинка (глюконата) 5 мг, витамина В₁ 10 мг, витамина В₂ 10 мг, витамина В₆ 10 мг, меди 1 мг и фолиевой кислоты 400 мкг на натуральной основе люцерны, корня гортензии, корня юкки, аралии и красного стручкового перца; в упаковке 90 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов, железа и других минеральных веществ.

Фармакодин.: Нормализует работу сердечно-сосудистой и нервной систем, кроветворение, синтез гемоглобина, образование нормобластов, активирует окислительно-восстановительные процессы, устраняет общую слабость, вялость, повышает физическую и умственную активность, стимулирует аппетит и синтез гормонов стероидной структуры.

Показ.: Железодефицитные анемии различного генеза (недостаток железа в пище, кровопотеря во время менструаций и т.д.), повышенная потребность в железе (беременность, лактация, интенсивный рост).

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, по 1 таблетке в день, в течение 3 мес.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фарма-Мед® Леди'с формула Менопауза (Pharma-Med® Lady's formula for Menopause)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит магния (окись) 200 мг, витамина Е 30 МЕ, пантотеновой кисло-

ты 30 мг, никотиновой кислоты 15 мг; витамина В₆ 30 мг, витамина В₂ 15 мг, витамина В₁ 15 мг, бора 1 мг, марганца 2 мг, селена 20 мкг и хрома 20 мкг на натуральной основе дягиля, аралии, страстоцвета, морской водоросли спирулины; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ, общеукрепляющее, регулирующее гормональный баланс.

Фармакодин.: Магний, повышая синтез допамина, снимает нервное напряжение, беспокойство, раздражительность; является кофактором в биосинтезе простагландина Е, который вместе с витамином В₆ регулируют гормональный баланс в период менопаузы. Бор предотвращает остеопороз. Селен, обладая антиоксидантными свойствами, повышает иммунитет. Витамины группы В (В₁, В₂, В₆), регулируя жировой, белковый и углеводный обмен, нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Пантотеновая кислота улучшает энергетическое обеспечение сердечной мышцы, устраняет атонию кишечника. Никотиновая кислота обладает сосудорасширяющим действием. Витамин Е участвует в регулировании функции половых желез. Дягиль - уникальный природный стимулятор выработки женских гормонов, он обладает также мочегонным, слабительным, успокаивающим и обезболивающим действием. Аралия маньчжурская действует общеукрепляюще при снижении половой активности. Страстоцвет оказывает успокаивающее действие, устраняет неврастению и бессонницу климактерического периода. Спирулина дозирует йод, абсорбирует и выводит из организма радиоактивные элементы, соли тяжелых металлов.

Показ.: Климакс у женщин.

Примен. и доз.: Внутрь, с приемом пищи по 1 таблетке в день.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фарма-Мед® Леди'с формула Предменструальный синдром (Pharma-Med® Lady's formula predmenstrual syndrome)

Сост. и ф.в.: 2 капсулы содержат масла вечернего первоцвета 500 мг, кальция (карбонат) 40 мг, магния (окись) 20 мг, витамина В₆ 50 мг и бромелайна 20 мг на натуральной основе листьев красной

смородины, дикой клубники, дягиля, листьев толокнянки, мяты перечной и одуванчика.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита минеральных веществ и витамина В₆.

Фармакодин.: Масло первоцвета вечернего содержит гамма-линоленовую кислоту и обладает обезболивающим и противовоспалительным эффектами, успокаивает нервную систему и нормализует свертываемость крови. Бромелайн - фермент, улучшающий пищеварение, снижает содержание холестерина, обладает противовоспалительным эффектом, уменьшает головную боль и головокружение. Дягиль обладает успокаивающим и обезболивающим действием, нормализует гормональный фон. Толокнянка, мята перечная и одуванчик снимают спазмы желудка и кишечника, улучшают обмен веществ, устраняют метеоризм, обладают противосудорожным, успокаивающим и обезболивающим действием. Листья красной смородины и земляники уменьшают обильные менструации.

Показ.: Предменструальный синдром.

Примен. и доз.: Внутрь, с приемом пищи, по 2 капсулы в день.

Произв.: Pharma-Med (Канада)

Фастин-1 (Fastinum-1)

Сост. и ф.в.: Мазь, содержащая фурацилина 2%, синтомицина 1,6% и анестезина 3%; в банках по 50 и 350 г.

Фарм. действ.: Антимикробное, местно-анестезирующее.

Показ.: Ожоги, гнойные раны, пиодермия.

Примен. и доз.: Накожно, наносят на стерильные марлевые салфетки и накладывают на пораженную поверхность. Смену повязки производят через 7-10 суток, при необходимости - чаще.

Произв.: Акрихин (Россия)

Фастум (Fastum®)

Кетопрофен*

Сост. и ф.в.: 1 г геля содержит кетопрофена 25 мг; в тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противовоспалительное.

Фармакокин.: Кетопрофен медленно всасывается при местном применении. При аппликации на кожу в дозах 50-150 мг уровень в плазме крови повышается до 0,08-0,15 мкг только через 5-8 ч.

Клин. фарм.: Гель обеспечивает локализованное лечение поражений суставов, сухожилий, связок, мышц, кожи, вен, лимфатических сосудов и лимфоузлов.

Показ.: Болезненные, воспалительные или травматические поражения суставов, сухожилий, связок и мышц (артрит, периартрит, артросиновит, тендинит, тендосиновит, бурсит, ушибы, растяжения, вывихи, повреждения мениска колена, кривошея, люмбаго); флебит, перифлебит, лимфангит, поверхностный лимфаденит; воспалительные процессы кожи (эритема и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции (требуют отмены терапии).

Примен. и доз.: Накожно, наносят по 3-5 см геля или более (в зависимости от площади болезненного участка) и осторожно втирают до полного всасывания.

Предост.: Не рекомендуется использование препарата при открытых ранах или повреждении кожи.

Пр о и з в.: Berlin-Chemie / Menarini Group (Германия / Италия)

Фебихол (Febichol®)

Фенипентол*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит фенипентола 100 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Желчегонное.

Показ.: Диспепсия, хронические заболевания желчного пузыря, печени и поджелудочной железы.

Противопоказ.: Острый гепатит с обструкцией желчевыводящих путей, острый холецистит, холангит, острый панкреатит, эмпиема желчного пузыря.

Поб. действ.: Ощущение давления и переполнения в эпигастральной области, тошнота, изжога, метеоризм.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2 капсулы 3 раза в день или однократно по 2 капсулы непосредственно перед приемом пищи, запивая достаточным количеством воды (не менее 200 мл).

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Фебрицет (Febricet)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит парацетамола 500 мг; в упаковке 10 шт.

5 мл сиропа - 120 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, ингибирование синтеза простагландинов.

Показ.: Болевой синдром малой и средней интенсивности (головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, меналгия; боль при травмах, ожогах),

лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и/или почек, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови.

Поб. действ.: Тошнота, боли в эпигастрии, анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинемия, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке).

Взаим.: Взаимное повышение гепатотоксичности при совместном назначении барбитуратов, противоэпилептических препаратов, рифампицина, алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым и подросткам с массой тела более 60 кг назначают в разовой дозе 500 мг (максимальная разовая доза 1 г). Кратность назначения - до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза - 4 г. Таблетки запивают небольшим количеством жидкости. Максимальная продолжительность лечения - 5-7 дней. Детям (в форме сиропа) грудного возраста и до 2 лет - 1/2-2 чайные ложки 3 раза в сутки, 2-7 лет - 1-2 чайные ложки, 7-14 лет - 4 чайные ложки 3 раза в сутки.

Произв.: Hemofarm (Югославия)

Фейба ТИМ 4 Иммуно (Feiba® TIM 4 Immuno)

Сост. и ф.в.: 1 флакон содержит лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 500 или 1000 МЕ; в комплекте с водой для инъекций (флаконы по 20 мл) и набором принадлежностей для растворения и введения.

Фарм. действ.: Гемостатическое, ликвидация дефицита факторов свертывания крови II, VII, VIII, IX и X.

Показ.: Кровотечения при ингибиторных формах гемофилии А и В; тяжелые или угрожающие жизни кровотечения у пациентов с приобретенными ингибиторами к факторам VIII, XI и XII.

Противопоказ.: ДВС-синдром, инфаркт миокарда, острый тромбоз и/или эмболия при низких титрах ингибиторов факторов свертывания крови.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, аллергические реакции (лихорадка, крапивница).

Взаим.: Совместим с концентратом фактора VIII (возможно сочетанное назначение при иммунологической толерантности у больных с ингибиторной формой гемофилии).

Примен. и доз.: В/в (раствор готовится перед использованием) медленно, 50-100 МЕ ФЕЙБА/кг, максимальная разовая доза - 100 МЕ/кг, суточная - 200 МЕ/кг.

Предост.: Не рекомендуется комбинировать с антифибринолитическими средствами (эпсилон-аминокапроновая кислота).

Произв.: Immuno (Австрия)

Фелексин (Felexinn™)

Цефалексин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефалексина моногидрата 250 или 500 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей (острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь), ЛОР-органов (воспаление среднего уха, мастоидит, синусит, фолликулярный тонзиллит, фарингит), мочевыводящих путей (острый и хронический пиелонефрит, цистит, простатит), кожи и мягких тканей, суставов, гонорея. Инфекции в гинекологической, акушерской и стоматологической практике.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. беталактаминам).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в области ЖКТ, эозинофилия, нейтропения, повышение сыровоточных трансаминаз, суперинфекции (вызываемые резистентными микроорганизмами, особенно грибами *Candida*), псевдомембранозный колит, ложноположительная реакция на глюкозу в моче (в тесте с раствором Бенедикта или с таблетками сульфата магния), в тесте Кумбса, кожные сыпи.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - в обычной дозе по 1-2 г в сутки, разделяя на приемы, с интервалом 6, 8 или 12 ч; при тяжелых инфекциях - дозу увеличивают до 6 г/сутки; при гонорее - в однократной дозе по 2-3 г (в комбинации с 0,5-1 г пробенецида). Детям, включая новорожденных, - по 25-100 мг/кг массы тела в сутки, в несколько приемов, максимально до 4 г в день: до 1 года - по 125 мг 2 раза в день, 1-5 лет - по 125 мг 3 раза в день, 5-12 лет - по 250 мг 3 раза в день; при тяжелых инфекциях дозу удваивают. У пожилых и при острой почечной недостаточности дозу уменьшают.

Предост.: С осторожностью назначают при гиперчувствительности к др. препаратам, колите (в анамнезе), беремен-

ности, лактации (необходимо приостановить грудное вскармливание).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Фемоден (Femoden®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит гестодена 75 мкг и этинилэстрадиола 30 мкг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт.

Фарм. действ.: Гестоген-эстрогенное, контрацептивное.

Показ.: Предупреждение нежелательной беременности.

Противопоказ.: Беременность, тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени или тромбоэмболические процессы (в анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, серповидноклеточная анемия, рак молочной железы или эндометрия, нарушения жирового обмена; герпес (в анамнезе), идиопатическая желтуха и зуд, а также отосклероз с ухудшением в ходе имевшей место беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушения функции желудка, нагрубание молочных желез, изменение массы тела и либидо, депрессивные состояния, появление пятен коричневого цвета на лице, плохая переносимость контактных линз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно, с 1-го дня цикла, и далее по стрелке на упаковке приблизительно в одно и то же время.

Произв.: Schering (Германия)

Фенибут (Phenibutum)

Фенибут

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фенибута 0,25 г; в упаковке 20 и 50 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное, транквилизирующее.

Показ.: Астенические и тревожно-невротические состояния, бессонница, головокружение, вестибулярные нарушения, болезнь Меньера, заикание, тики.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сонливость, тошнота.

Взаим.: Удлиняет и усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противосудорожных препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды - по 0,25-0,5 г 3 раза в день. Детям до 8 лет - по 0,05-0,1 г, 8-14 лет - по 0,2-0,3 г 3 раза в день. Курс лечения - до 4-6 нед.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Фенил-фри (Phenyl-free)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 454 г; в коробке 6 шт.

1 л готовой смеси (842 ккал) содержит белка 41,6 г, незаменимых аминокислот: изолейцина 2,30 г, лейцина 3,60 г, лизина 3,90 г, метионина 1,30 г, цистина 0,71 г, тирозина 1,90 г, треонина 1,90 г, триптофана 0,59 г, валина 2,60 г, гистидина 0,97 г, карнитина 38,1 г; жиров 14,2 г (кукурузного масла 9,4 г, кокосового масла 4,1 г, лецитина 0,7 г), углеводов (сахарозы) 137,8 г, витамина А 761 мкг, витамина D 7,92 мкг, витамина Е 21,2 мг, витамина К 212 мкг, витамина В₁ 1,27 мг, витамина В₂ 2,12 мг, витамина В₆ 1,89 мг, витамина В₁₂ 5,28 мкг, никотиновой кислоты 16,9 мг, фолиевой кислоты 264 мкг, биотина 63,4 мкг, пантотеновой кислоты 6,34 мг, витамина С 110 мг, холина 108 мг, инозитола 63,4 мг, кальция 1057 мг, фосфора 1057 мг, магния 136 мг, железа 25400 мкг, цинка 14800 мкг, меди 1270 мкг, марганца 2120 мкг, натрия 844 мг, калия 2852 мг, йода 95,1 мкг, селена 12,7 мкг, хлоридов 1943 мг. Фенил-фри не содержит фенилаланина.

Фарм. действ.: Обеспечение организма больных с фенилкетонурией питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Показ.: Гиперфенилаланинемия, фенилкетонурия (в т.ч. у детей старше 1 года).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Для приготовления 450 мл жидкой смеси стандартного разведения (83 ккал/100 мл) добавляют 98,5 г сухого вещества к 400 мл кипяченной воды и тщательно перемешивают до получения однородной суспензии. Приготовленную смесь хранят в холодильнике в закрытом контейнере и используют в течение 24 ч после приготовления. Режим дозирования препарата устанавливается врачом индивидуально в зависимости от возраста, содержания фенилаланина в сыворотке крови и состава диеты, которая включает продукты с низким содержанием белка, фрукты и овощи. Мясо и молочные продукты рекомендуется исключить или применять в исключительно малых количествах.

Предост.: Применяют под контролем врача, проводя коррекцию диеты с учетом результатов регулярных анализов

крови и мочи. Не следует использовать для кормления здоровых детей первого года жизни и более старшего возраста (не обеспечивает полноценного питания).

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Фенилин® (Fenilin)

Фениндион*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фениндиона 0,03 г; в ламинированной бумаге по 20 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное не прямое.

Показ.: Профилактика и лечение тромбозов, тромбофлебитов, эмболий; предупреждение тромбообразования в послеоперационном периоде.

Противопоказ.: Геморрагические диатезы, гипокоагуляция (индекс протромбина ниже 70%), нарушения функции печени и почек, анемия, язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, перикардит, менструации, гинекологические заболевания, беременность, ранний послеродовый период, лактация.

Поб. действ.: Лихорадка, тошнота, понос, поражения печени, парестезии, угнетение кроветворения; окрашивание ладоней в оранжевый цвет и мочи - в розовый, дерматиты, аллергические реакции.

Взаим.: Анаболические стероиды, ненаркотические анальгетики, левомецитин, аминогликозиды, тетрациклины усиливают эффект. Барбитураты, дифенин, спиронолактон - ослабляют. Увеличивает риск гипогликемии на фоне бутамида.

Примен. и доз.: Внутрь, в 3-4 приема, в первый день - 0,12-0,18 г в сутки, во второй - 0,09-0,15 г в сутки; в последующие дни - 0,03-0,06 г в сутки, в зависимости от содержания протромбина в крови (индекс протромбина поддерживается на уровне 50-40%). Взрослым высшая разовая доза - 0,05 г, высшая суточная доза - 0,2 г. При хронической сердечно-сосудистой недостаточности для профилактики тромбоэмболических осложнений назначают в дозе 0,03-0,06 г в сутки.

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Фенилсалицилат, висмута нитрат основной, экстракт красавки (Phenyli salicylas, Bismuthi subnitrates, extractum Belladonnae)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фенилсалицилата 0,25 г, висмута нитрата основного 0,25 г и экстракта красавки 0,015 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, антисекреторное, антисептическое, противовоспалительное, вяжущее, антацидное.

Фармакодин.: Спазмолитический и антисекреторный эффекты (уменьшение секреции желудочных, поджелудочной, бронхиальных, слюнных, потовых желез и выделение желчи) обусловлены М-холиноблокаторами (экстракт красавки), антисептический - фенолом (освобождается в щелочной среде кишечника при гидролизе фенилсалицилата), противовоспалительный - салициловой кислотой, вяжущий и антацидный - висмутом нитрата основным (обладает также способностью угнетать рост хелико/кампило/бактеров).

Показ.: Гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кишечника (энтериты, колиты).

Противопоказ.: Глаукома, аденома предстательной железы.

Поб. действ.: Сухость во рту, жажда, мидриаз, нарушение аккомодации.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1-2 таблетки на прием 3-4 раза в сутки.

Произв.: Татхимфармпрепараты (Россия)

Фенистил® (Fenistil®)

Диметинден*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит диметиндена малеата 2,5 мг; в упаковке 20 шт.

1 мл каплей для приема внутрь - 1 мг; во флаконах по 20 мл.

10 г геля - 10 мг; в тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Антигистаминное, противоаллергическое, противозудное.

Показ.: Таблетки, капли: зуд (эндогенный, при экземе, аллергических и неаллергических зудящих дерматозах, укусах насекомых, заболеваниях с высыпаниями - ветряная оспа, крапивница), аллергический хронический ринит и сен-

ная лихорадка, лекарственная и пищевая аллергия, аллергические реакции при десенсибилизационной терапии (профилактика). Гель: зуд при дерматозе, крапивнице, укусах насекомых, солнечных и легких бытовых и производственных ожогах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, грудной возраст до 1 мес (особенно недоношенные дети).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Сонливость, вялость, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, не разжевывая, взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке-ретард 2 раза в сутки. Разовая доза для капель составляет 20-40 капель, кратность назначения - 3 раза в сутки. Детям старше 3 лет назначают по 15-20 капель 3 раза в сутки, детям в возрасте от 1 года до 3 лет - по 10-15 капель 3 раза в сутки, грудным детям и детям до 1 года - по 3-10 капель 3 раза в сутки. Гель наносить на пораженные участки кожи 2-4 раза в сутки.

Предост.: Назначать с осторожностью при глаукоме, обструкции шейки мочевого пузыря, хронических обструктивных заболеваниях легких, детям в возрасте от 1 мес до 1 года, особенно родившимся недоношенными. При применении геля следует избегать длительной инсоляции участков кожи, обработанных гелем.

Произв.: Novartis Consumer Health (Швейцария)

Фенкарол (Phencarolum)

Хифенадин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит хифенадина гидрохлорида 10 или 25 мг; в упаковке 50 и 20 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антигистаминное, блокада H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Аллергические реакции и заболевания, поллинозы, крапивница, отек Квинке, сенная лихорадка, ринит, аллергодерматозы.

Противопоказ.: Тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и почек, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Сухость во рту, диспепсия.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды; детям до 3 лет - по 5 мг 2-3 раза в день, от 3-7 лет - 10 мг 2 раза в день, от 7 до 12 лет - по 10-15 мг 2-3 раза в день; детям старше 12 лет и взрослым - по 25-50 мг 3-4 раза в день.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Фенобарбитал (Phenobarbitalum)

Фенобарбитал*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фенобарбитала 0,05 или 0,1 г.

1 таблетка для детей - 0,005 г.

Фарм. действ.: Седативное, снотворное, противосудорожное, спазмолитическое.

Показ.: Эпилепсия, хорея, спастический паралич, спазм периферических артерий, эклампсия, возбуждение, бессонница.

Противопоказ.: Печеночно-почечная недостаточность.

Поб. действ.: Астения, атаксия, ощущение разбитости, гипотония, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, в качестве снотворного - 0,1-0,2 г на ночь, в качестве седативного средства - 0,03-0,05 г 2-3 раза в день, при эпилепсии - 0,05-0,1 г 2 раза в день; в качестве спазмолитика - по 0,01-0,05 г 2-3 раза в день. Детям (за 30-40 мин до еды два раза в день) в возрасте до 6 мес - разовая доза 5 мг, 6 мес - 1 год соответственно 10 и 20 мг, 1-2 года - 20 мг, 3-4 года - 30 мг, 5-6 лет - 40 мг, 7-9 лет - 50 мг, 10-14 лет - 75 мг.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Акрихин (Россия)

Фентанил (Phentanyl)

Фентанил*

Сост. и ф.в.: 1 ампула или 1 флакон с 10 мл раствора для инъекций содержит фентанила 0,5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее (наркотическое).

Показ.: Премедикация перед хирургическими операциями, осуществление вводного наркоза, послеоперационная анестезия, нейролептанальгезия.

Противопоказ.: Угнетение дыхательного центра, черепно-мозговая гипертензия, кесарево сечение.

Поб. действ.: Угнетение дыхания, брадикардия, кратковременная ригидность мышц (в т.ч. грудных).

Взаим.: Закись азота усиливает влияние на мышечную ригидность, трициклические антидепрессанты и препараты, угнетающие ЦНС - на дыхательный центр.

Примен. и доз.: Для премедикации, а также в послеоперационном периоде в/м - 0,05-0,1 мг; детям - 0,002 мг/кг; для осуществления вводного наркоза -

в/в 0,1-0,2 мг; для нейролептанальгезии - в/в 0,2-0,6 мг (введение повторяют через каждые 20 мин). При операциях на открытом сердце используют 0,05-0,1 мг/кг.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Фентанил (Phentanylum)

Фентанил*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит фентанила 0,05 мг, в ампулах по 1 и 2 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, возбуждение опиатных рецепторов.

Показ.: Премедикация, нейролептанальгезия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, акушерские операции, бронхиальная астма, угнетение дыхательного центра, наркомания.

Поб. действ.: Угнетение дыхания (в больших дозах); брадикардия, ригидность мышц, бронхоспазм.

Примен. и доз.: В/в, в/м, взрослым - при подготовке к операции: в/в - по 0,05-0,1 мг (в комбинации с 2,5-5 мг дроперидола) за 10-15 мин до наркоза; для хирургического наркоза: в/в - по 0,05-0,2 мг через каждые 20-30 мин. Детям при подготовке к операции - 0,002 мг/кг массы тела; для хирургического наркоза: в/в - 0,01-0,15 мг/кг или в/м 0,15-0,25 мг/кг; для поддержания хирургического наркоза: в/м - по 0,001-0,002 мг/кг.

Предост.: Использование препарата рекомендуется под наблюдением врача-анестезиолога и с применением соответствующего анестезиологического оборудования.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Фервекс (Fervex)

Сост. и ф.в.: 1 пакетик (1 доза) с гранулированным порошком для приготовления орального раствора содержит фенирамина малеата 25 мг, парацетамола 500 мг и аскорбиновой кислоты 200 мг, в упаковке 8 шт. Выпускается с сахаром и без сахара.

1 пакетик (1 доза) с гранулированным порошком для приготовления орального раствора для детей содержит фенирамина малеата 10 мг, парацетамола 280 мг, аскорбиновой кислоты 100 мг; в упаковке 8 шт.

Фарм. действ.: Жаропонижающее, анальгезирующее, антигистаминное, компенсация дефицита витамина С.

Показ.: Простудные заболевания, сопровождающиеся болями и лихорадкой, гриппоподобные состояния (симптоматическое лечение), аллергический ринит, ринофарингит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции печени, закрытоугольная глаукома, аденома предстательной железы, возраст до 15 лет (для препарата, предназначенного взрослым), возраст до 6 лет (для препарата, предназначенного детям).

Поб. действ.: Возможны - сухость во рту, нарушение аккомодации, задержка мочи, повышенная возбудимость, редко - аллергические реакции (сыпь, крапивница), крайне редко - тромбоцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь. Содержимое пакетика разводят в достаточном количестве холодной или теплой воды. Взрослым - по 1 пакету 2-3 раза в сутки. Детям в возрасте 6-10 лет - по 1 пакету порошка для детского раствора 2 раза в сутки, 10-12 лет - по 1 пакету 3 раза в сутки, 12-15 лет - по 1 пакету 4 раза в сутки. Интервал между приемами препарата должен составлять не менее 4 ч.

Произв.: UPSA (Франция)

Ферлатум (Ferlatum)

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 15 мл раствора для приема внутрь содержит железа протеинсукцинилата 800 мг, что соответствует 40 мг трехвалентного железа; в упаковке по 10 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа, антианемическое.

Показ.: Железодефицитные состояния: скрытые и манифестированные формы железодефицитных анемий (при острой или хронической кровопотере, нерациональном питании, недостаточном всасывании железа в ЖКТ, инфекционных заболеваниях) в любом возрасте, при беременности и лактации.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гемосидероз, гемохроматоз, апластическая, гемолитическая и сидеробластная анемии, хронический панкреатит, цирроз печени.

Поб. действ.: Боли в эпигастральной области, тошнота, запоры, диарея.

Взаим.: Нарушают абсорбцию тетрациклинов в ЖКТ. Всасывание увеличивает аскорбиновая кислота (в дозе свыше 200 мг), снижают - антациды. Хлорамфеникол вызывает отсроченную ответную реакцию на терапию железом.

Передоз.: Симптомы: в первые 6-8 ч - эпигастральные боли, тошнота, рвота (в т.ч. кровью), диарея, сонливость, бледность, шок, кома. Лечение: рвотные препараты, промывание желудка, адекватная поддерживающая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь, перед едой; взрослым - по 1-2 флакона или пакетика (количество, эквивалентное 40-80 мг трехвалентного железа) в сутки в 2 приема; детям - по 1,5 мл раствора для приема внутрь на 1 кг массы тела в сутки (количество, эквивалентное 4 мг/кг/сутки трехвалентного железа) в 2 приема. Курс лечения - не более 6 мес (за исключением случаев продолжающегося кровотечения, меноррагии и беременности).

Произв.: CSC (Италия)

Ферретаб комп. (Ferretab® comp.)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит фумарата железа 154 мг, что соответствует 50 мг двухвалентного железа и фолиевой кислоты 0,5 мг; в упаковке по 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа в организме.

Показ.: Лечение и профилактика железодефицитных состояний (беременность, нарушение всасывания железа в ЖКТ, длительные кровотечения, неправильное питание).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, анемии, вызванные недостатком железа или фолиевой кислоты (апластическая, пернициозная, талассемия, гемолитическая, железорефрактерная, свинцовая), гемосидероз, гемохроматоз, нарушение усвоения железа.

Поб. действ.: Чувство наполнения и неприятные ощущения в желудке, рвота.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, обильно запивая жидкостью, по 1 капсуле в день. При необходимости дозу увеличивают до 2-3 капсул в день. Длительность поддерживающей терапии - не менее 4 нед.

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Ферро-градумет (Ferro-gradumet)

Железа сульфат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит элементарного железа (в форме сульфата) 105 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа в организме, антианемическое.

Фармакокин.: Препарат содержит высокий процент элементарного железа, которое в виде сульфата содержится в специальном наполнителе (градумете), из которого железо постепенно и контролированно высвобождается и всасывается в зависимости от потребностей организма.

Показ.: Лечение и профилактика железодефицитных анемий: кровотечения (меноррагии, метроррагии, кровотечения во время родов, геморроидальные, при язвенной болезни, частые носовые кровотечения и др.), повышенная потребность в железе (беременность, лактация), недостаточное поступление железа с пищей, заболевания ЖКТ с мальабсорпцией (поносы).

Противопоказ.: Гемохроматоз, анемии: апластическая, гемолитическая, сидероакрестическая, при лейкозе, пернициозная (в стадии декомпенсации).

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, за полчаса до завтрака, таблетку проглатывают целиком, запивая достаточным количеством жидкости. Взрослые - 1 таблетка (возможно 2 таблетки) в день, в течение нескольких месяцев, после нормализации картины крови лечение продолжают еще в течение 2 мес для пополнения запасов железа в организме.

Предост.: С осторожностью используют при пептической язве, энтерите, язвенном колите.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Ферронал (Ferronal®)

Железа глюконат

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит железа глюконата 300 мг; в упаковке 30, 100 и 1000 шт.

Фарм. действ.: Противоанемическое, восстановление уровня гемоглобина.

Фармакокин.: Всасывается и усваивается лучше, чем другие формы железа (низкая константа ионизации).

Показ.: Железодефицитные анемии (профилактика и лечение), повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, период роста и развития).

Противопоказ.: Идиосинкразия к препаратам железа, гемохроматоз, гемосидероз, гемолитическая анемия.

Бер. и корм. гр.: Рекомендовано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства (тошнота, рвота, запор, диарея).

Взаим.: Нарушает всасывание тетрациклинов (назначать с интервалом не

менее двух часов); яйца, молоко, чай прекращают; а антацидные средства ухудшают резорбцию железа.

Передоз.: Симптомы: боль в животе, рвота, диарея, запор, желудочно-кишечное раздражение (вплоть до некроза), слабый пульс, летаргия, падение кровяного давления. Признаки периферического циркуляторного коллапса проявляются в течение 30 мин после приема препарата или задерживаются на несколько часов; метаболический ацидоз, конвульсии, жар, лейкоцитоз, кома и даже смерть - в течение 12-24 ч; острые почечные и печеночные некрозы - через 2-4 дня. Лечение: вызывают рвоту (сироп ипекакуаны), затем парентерально назначают десфероксамин (в случае тяжелого отравления внутривенно).

Примен. и доз.: Внутрь, после еды по 4-6 таблеток (лечение железодефицитной анемии) или 2 таблетки (профилактика) в день; детям - по 1-3 таблетки в день.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с пептической язвой, энтеритом, язвенным колитом. Во избежание случайного отравления хранить препарат в недоступном для детей месте.

Произв.: CTS (Израиль)

Ферронат (Ferronat)

Железа фумарат

Сост. и ф.в.: 1 мл суспензии для приема внутрь содержит железа фумарата 30 мг (что соответствует 10 мг элементарного железа); во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Восполнение абсолютного или относительного дефицита железа в организме.

Клин. фарм.: Положительная динамика в картине крови наблюдается через 4-5 дней, однако лечение следует продолжать еще не менее 4-5 дней.

Показ.: Железодефицитная анемия (при нарушении всасывания железа, массивном кровотечении, повышенном расходе железа).

Противопоказ.: Сидеробластная анемия.

Поб. действ.: Рвота, диарея или запор; потемнение зубов, окрашивание кала в черный цвет.

Передоз.: Симптомы: тошнота, боли в эпигастрии, симптомы раздражения ЖКТ, в тяжелых случаях - рвота с кровью, диарея, головокружение, спутанность сознания, слабость, акроцианоз, понижение АД, слабый пульс. Лечение: удаление препарата из ЖКТ (стимуляция рвоты, промывание желудка), его

связывание в желудке (назначение внутрь молока с яичным белком). Специфическая терапия - дефероксамин (внутрь и парентерально), симптоматическая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь, в промежутках между приемами пищи, запивать водой (но не чаем); перед применением флакон рекомендуется встряхнуть. Средняя доза составляет 5-6 мг элементарного железа на 1 кг массы тела в сутки (т.е. 0,5 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки). Взрослым (в случае непереносимости других препаратов железа) - по 10 мл 3-4 раза в сутки; детям в возрасте до 2 лет - по 5 мл 1 раз в сутки; от 2 до 6 лет - по 5 мл 2 раза в сутки; старше 6 лет - по 5 мл 3-4 раза в сутки.

Предост.: Перед приемом препарата не рекомендуется есть жирную пищу. Лечение проводят под контролем врача. Дозы отмеривают прилагаемой мензуркой, которую после использования ополаскивают горячей водой.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Ферроплект (Ferroplectum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит железа сульфата 0,05 г и аскорбиновой кислоты 0,03 г; в контурной ячейковой упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита железа.

Фармакодин.: Регулирует метаболические процессы, устраняет дефицит железа в организме.

Показ.: Железодефицитные анемии разного генеза, период интенсивного роста, беременность.

Противопоказ.: Апластическая и гемолитическая анемии, гемохроматоз, хронические заболевания печени и почек с нарушением их функций, лейкозы.

Поб. действ.: Анорексия и тошнота (при длительном применении), запоры (из-за связывания в кишечнике сероводорода - естественного стимулятора перистальтики), потемнение кала (из-за образования сульфида железа).

Взаим.: Уменьшает всасывание (взаимно) тетрациклинов и D-пенициллина (вследствие образования комплексов). Резорбцию железа снижают также антациды, в состав которых входят магний, кальций, алюминий.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, не разжевывая. Взрослым назначают по 2 таблетки 3 раза в день, детям (в зависимости от возраста) - 1-2 таблетки 3 раза

в день. Длительность курса - 3-4 нед, но может быть больше (до нескольких месяцев), в зависимости от формы заболевания и эффективности препарата.

Предост.: С осторожностью назначают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенном колите, энтеритах.

Произв.: Борщаговский химфармзавод (Украина)

Феррум Лек (Ferrum Lek®)

Сост. и ф.в.: 1 ампула для в/м введения (2 мл) содержит железа в виде ферри-полиизомальтозата 100 мг.

1 ампула для в/в введения (5 мл) содержит железа в виде ферри-сахарата 100 мг; в упаковке 5 и 50 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция эритропоэза, восполнение дефицита железа.

Показ.: Железодефицитные анемии различного генеза, нарушения всасывания железа в ЖКТ, повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, донорство, интенсивный рост).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, гемохроматоз, анемии нежелезодефицитного генеза.

Поб. действ.: Повышение температуры тела, гиперемия кожных покровов, аллергические кожные реакции. Редко - тошнота, рвота.

Примен. и доз.: В/в медленно (1 мл/мин), при необходимости растворяют в 0,9% растворе хлорида натрия или крови пациента, в 1-й день - 2,5 мл, во 2-й день - 5 мл, в 3-й день - 10 мл, затем - по 10 мл 2 раза в неделю до достижения общей дозы. Необходимо периодически контролировать уровень гемоглобина в крови. В/м - 4 мл в сутки, детям до 5 кг - 0,5 мл, 5-10 кг - 1 мл в сутки.

Произв.: Lek (Словения)

Фибро-Вейн (Fibro-Vein)

Натрия тетрадецилсульфат*

Сост. и ф.в.: 1 мл водного раствора для инъекций содержит натрия тетрадецилсульфата 3, 1, 0,5 или 0,2 мг; в ампулах по 2 мл, в упаковке 5 шт. (все концентрации) или во флаконах по 5 мл, в упаковке 10 шт. (0,2 и 3% растворы).

Фарм. действ.: Склерозирующее (при компрессионной склеротерапии варикозного расширения вен нижних конечностей).

Показ.: Варикозное расширение вен.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый тромбофлебит, сахарный диабет.

Поб. действ.: Боль или чувство жжения в месте введения, покраснение, крапивница, локальный некроз (при п/к введении).

Примен. и доз.: В/в, дозировку определяют в зависимости от размера вены, подвергаемой склерозированию. Вводят в просвет изолированного сегмента пустой поверхностной вены с немедленным продолжительным ее сжатием. Обычная доза - 1 мл в одно место. Для Фибро-Вейна 3% - максимум 4 места введения (максимум 4 мл) в течение одной процедуры. Для Фибро-Вейна 0,5; 1 и 2% - максимум 10 мест введения (максимум 10 мл) в течение одной процедуры лечения.

Предост.: Препарат должны вводить только медработники, знакомые с техникой инъекции. Нельзя набирать гепарин тем же шприцом. Многодозовый флакон (5 мл) используют для единичной процедуры лечения только одного пациента (неиспользованное содержимое флакона выбрасывают).

Произв.: Vitas (США)

ФиБС (FiBS)

Сост. и ф.в.: Препарат из отгона лиманной грязи, содержит коричную кислоту и кумарин. Раствор для инъекций в ампулах по 1 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Повышение защитных сил организма, усиление процессов регенерации, общетонизирующее.

Показ.: Блефарит, конъюнктивит, кератит, помутнение стекловидного тела, миопический хориоретинит, артриты, радикулиты, миалгия и др.

Противопоказ.: Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, нарушение функции почек.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Повышение температуры, кожные высыпания.

Примен. и доз.: П/к, по 1 мл ежедневно в течение 30-35 дней.

Произв.: Фармак (Украина)

Финоптин (Finoptin)

Верапамил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит верапамила гидрохлорида 40, 80, 120 или 200 (депо) мг; в упаковке 30 или 100 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 25 мг; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Гипертония, стенокардия, постинфарктный период, тахикардия и экстрасистолия (предсердная), гипертонический криз.

Противопоказ.: Кардиогенный шок, АВ-блокада II-III степени, сердечная недостаточность.

Взаим.: Соблюдать осторожность при одновременном назначении с бета-адреноблокаторами.

Примен. и доз.: Внутрь, по 40-160 мг 2-3 раза в день или по 120-200 мг 1-2 раза в день. При гипертоническом кризе - в/в (медленно) - по 5-10 мг.

Произв.: Ogiop (Финляндия)

Флагил (Flagyl®)

Метронидазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит метронидазола 250 мг; в упаковке 20 шт.

1 суппозиторий вагинальный - 500 мг; в упаковке 10 шт.

100 мл 0,5% раствора для в/в введения - 500 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, антипротозойное.

Фармакокин.: Быстро и полностью всасывается. $T_{1/2}$ - 8-10 ч, связь с белками плазмы крови не превышает 10-20%. Легко проникает в ткани (легкие, почки, печень, кожу, желчь, спинномозговую жидкость, слюну, семенную жидкость, вагинальный секрет), в молоко матери, преодолевает плацентарный барьер. Выводится на 40-70% (около 20% в неизменной форме) через почки.

Клин. фарм.: Обладает широким спектром действия в отношении анаэробных микроорганизмов (*Peptostreptococcus*, *Clostridium* sp., *Bacteroides* sp., *Prevotella*, *Fusobacterium*, *Veillonella*), подавляет развитие простейших (*Trichomonas vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*, *Lamblia*).

Показ.: Амебиаз, урогенитальный трихомониаз, неспецифический вагинит, лямблиоз (кишечный и печеночный), хирургические инфекции, вызванные анаэробами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: При беременности назначают с осторожностью, при лактации - прекращают грудное вскармливание.

Поб. действ.: Тошнота, металлический вкус во рту, анорексия, боли в эпигастрии, рвота, диарея, головная боль, го-

ловокружение, аллергические реакции (крапивница, зуд), лейкопения, периферические нейропатии, при длительном лечении большими дозами, возможно коричнево-красноватое окрашивание мочи.

Взаим.: Нежелательно сочетание с дисульфирамом, антикоагулянтами непрямого действия и недеполяризующими миорелаксантами. Несовместим с алкогольными напитками. Повышает концентрацию лития в плазме.

Примен. и доз.: При амебиазе внутрь - по 1,5 г/сутки за 3 приема (взрослые) и по 30-40 мг/кг/сутки также за 3 приема (дети) в течение 7 дней. При лямблиозе - взрослым - по 750-1000 мг/сутки, детям 2-5 лет - 250 мг/сутки, детям 5-10 лет - 375 мг/сутки, 10-15 лет - 500 мг/сутки в течение 5 дней. При трихомониазе у женщин (уретрит и вагинит) - однократно в дозе 2 г или в виде курсового лечения в течение 10 дней - по 250 мг 2 раза в день и по 1 вагинальному суппозиторию в день. При трихомонадном уретрите у мужчин - однократно в дозе 2 г или в виде курсового лечения в течение 10 дней по 250 мг 2 раза в день. При неспецифических вагинитах - 500 мг 2 раза в день в течение недели. При анаэробных инфекциях взрослым - 1-1,5 г/сутки, детям - из расчета 20-30 мг/кг/сутки. В/в введение показано только при невозможности приема его иным способом или при тяжелых формах заболеваний. 100 мл (500 мг) препарата вводят в течение 30-60 мин.

Предост.: Длительное лечение желательно проводить под контролем формулы крови. Возможен ложноположительный тест Нельсона, поскольку иммобилизируются трепонемы. С осторожностью комбинируют с непрямыми антикоагулянтами, недеполяризующими миорелаксантами.

Произв.: Rhône-Poulenc Roger (Франция-США)

Флекоксин (Flecoxin)

Бромгексин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит бромгексина гидрохлорида 4 или 8 мг; в упаковке 20 и 100 шт.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое.

Показ.: Бронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, синусит, трахеобронхит и др. хронические воспалительные процессы в респираторной системе.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, транзиторное повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови.

Взаим.: Эффект ослабляют антихолинергические средства.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым и детям старше 10 лет - по 8 мг (2 таблетки по 4 мг или 1 таблетка по 8 мг) 3 раза в день. Детям с 2 до 10 лет - по 4 мг (1 таблетка - 4 мг), 2-5 лет - 2 раза в день, 5-10 лет - 3 раза в день.

Предост.: С осторожностью следует назначать при пептической язве желудка, лактации (необходимо приостановить грудное вскармливание).

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Флекситал (Flexital)

Пентоксифиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит пентоксифиллина 100 или 400 мг; в упаковке 10 шт.

1 мл раствора для инфузий содержит пентоксифиллина 20 мг, в ампулах по 15 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, ангиопротективное, антиагрегационное.

Показ.: Нарушения периферического артериального и артериовенозного кровообращения (облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, атеросклероз).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, массивные кровотечения.

Поб. действ.: Диспепсия, головокружение, головная боль, бессонница, сонливость, тахикардия, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь, после или во время еды, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости, - по 400 мг 3 раза в сутки; курс - 8 нед. В/в: содержимое 1 ампулы разводят в 250-500 мл инфузионного раствора (0,9% раствор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы (декстрозы), раствор Рингера, раствор низкомолекулярного декстрана). Продолжительность инфузии составляет 2-3 ч, кратность - 2 раза в сутки.

Произв.: Sun Pharma (Индия)

Флемоксин Солутаб® (Flemoxin Solutab®)

Амоксициллин*

Сост. и ф.в.: 1 растворимая таблетка содержит амоксициллина 125, 250, 500, 750 или 1000 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью (на 93%) всасывается. C_{max} достигается через 1-2 ч. Около 17% связывается с белками плазмы. Накапливается в терапевтических эффективных количествах в слизистых оболочках, костной ткани, внутриглазной жидкости, мокроте. Концентрация в желчи в 2-4 раза больше таковой в крови. Плохо проходит в спинномозговую жидкость (даже при менингитах его концентрация в ней около 20% от уровня в крови). $T_{1/2}$ - 1-1,5 ч. При нарушении функции почек $T_{1/2}$ удлиняется. Частично метаболизируется, большинство метаболитов неактивны. Экскретируется почками, около 80% - путем канальцевой экскреции, 20% - клубочковой фильтрации.

Фармакодин.: Не эффективен в отношении микроорганизмов, продуцирующих пенициллиназу, *Pseudomonas*, *Klebsiella*, индол-положительных *Proteus*, *Enterobacter*.

Показ.: Бактериальные инфекции органов дыхания, мочеполовой системы, органов ЖКТ, кожи и мягких тканей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфекционный мононуклеоз и лейкоидные реакции лимфатического типа.

Бер. и корм. гр.: Допустимо во время беременности. Следует иметь в виду, что в небольших количествах проникает в материнское молоко и может алергизировать ребенка.

Поб. действ.: Редко отмечаются диспепсия, диарея, боли в области ануса, псевдомембранозный и геморрагический колиты, интерстициальный нефрит, суперинфекция, агранулоцитоз, тромбоцитопения, аллергические реакции (макулопапулярная сыпь, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактический шок, ангионевротический отек).

Взаим.: Пробеницид, фенилбутазон, оксифенбутазон, ацетилсалициловая кислота, сульфинпиразон увеличивают концентрацию в плазме и $T_{1/2}$ (подавляя тубулярную секрецию). Бактерицидный эффект нейтрализуется бактериостатиками (антибиотики тетрациклинового ряда, макролиды, хлорамфеникол), при использовании с аминогликозидами - синергизм.

Передоз.: Симптомы: тошнота, рвота, диарея, нарушение водно-электролитного баланса. Лечение: промывание желудка, активированный уголь, солевые сла-

бительные, коррекция водно-электролитного баланса.

Примен. и доз.: Внутрь, до или после приема пищи, таблетку можно проглотить целиком, разделить на части или разжевать, запив стаканом воды, или развести в воде с образованием сиропа (в 20 мл) или суспензии (в 100 мл). Взрослым и детям старше 10 лет (при инфекциях легкой и средней тяжести) - по 500-750 мг 2 раза в сутки или по 375-500 мг 3 раза в сутки. Детям от 3 до 10 лет - по 375 мг 2 раза в сутки или по 250 мг 3 раза в сутки. Детям в возрасте до 1 года - по 125 мг 2 раза в сутки или по 100 мг 3 раза в сутки. Суточная доза для детей - 30 мг/кг массы тела; кратность назначения - 2-3 раза. При хронических заболеваниях, рецидивах, тяжелых инфекциях: взрослым - до 0,75-1 г 3 раза в сутки, детям - до 60 мг/кг в сутки. При острой гонорее - 3 г однократно в сочетании с 1 г пробеницида. При инфекциях легкой и средней тяжести течения лечение проводят в течение 5-7 дней, при инфекциях, вызванных стрептококком, - не менее 10 дней. Прием препарата продолжают в течение 48 ч после исчезновения симптомов заболевания. При лечении инфекций, локализующихся в трудных для проникновения местах, назначают 3 раза в сутки. Пациентам с клиренсом креатинина ниже 10 мл/мин дозу уменьшают на 15-50%.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Фликсоназе® (Flixonase®)

Флутиказон*

Сост. и ф.в.: 1 доза водного назального спрея содержит флутиказона (в виде водной суспензии микронизированного флутиказона пропионата) 50 мкг; в упаковке 200 доз.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоаллергическое.

Клин. фарм.: При регулярном использовании максимальный эффект развивается к 3-му дню лечения.

Показ.: Аллергические риниты (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Возможно, но требует сопоставления предполагаемой пользы и вероятного риска.

Поб. действ.: Сухость и раздражение слизистой носоглотки, нарушения вкуса и обоняния, крайне редко - перфорация носовой перегородки (у пациентов с хи-

рургическими операциями в полости носа в анамнезе).

Примен. и доз.: Интраназально. Следует хорошо встряхнуть перед использованием. Взрослым и детям старше 12 лет - по 2 дозы в каждый носовой ход, предпочтительно утром; при необходимости - по 2 дозы в каждый носовой ход 2 раза в день. Детям с 4 до 12 лет - по одной ингаляции в каждый носовой ход 1 раз в день, утром, при необходимости - можно по одной ингаляции 2 раза в день.

Предост.: Необходимо с осторожностью переводить больных, получающих системные стероиды, на интраназальный препарат, особенно если у них нарушена функция надпочечников.

Произв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Фликсотид® (Flixotide®)

Флутиказон*

Сост. и ф.в.: 1 доза аэрозоля для ингаляций содержит флутиказона 25; 50; 125 и 250 мкг; в упаковке 60 и 120 доз.

1 доза порошка для ингаляций - 50; 100; 250 и 500 мкг; в ротадиске по 4 дозы.

Фарм. действ.: Противовоспалительное (местное).

Показ.: Бронхиальная астма (профилактика приступов).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью. Следует оценить, насколько ожидаемый лечебный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

Поб. действ.: Кандидоз полости рта и горла, дисфония, охриплость, парадоксальный бронхоспазм с одышкой (требует отмены препарата).

Передоз.: Острая и хроническая - угнетение функции надпочечников. Следует продолжать прием ингаляций в дозах, достаточных для предупреждения бронхоспазма, и функция восстановится через несколько дней.

Примен. и доз.: Ингаляционно. Взрослым и детям старше 16 лет - по 100-1000 мкг 2 раза в день. Легкая форма астмы - 100-250 мкг 2 раза в день. Средняя форма - 250-500 мкг 2 раза в день. Тяжелая форма - 500-1000 мкг 2 раза в день. Детям старше 4 лет - по 50-100 мкг 2 раза в день.

Предост.: Обычно при ингаляциях гормональный резерв надпочечников сохраняется в норме, однако у пациентов, переведенных с приема других ингаляционных или пероральных стероидов возможно истощение надпочечников.

При отсутствии эффекта или резком обострении бронхиальной астмы следует увеличить дозу, назначить пероральные стероиды, а при инфекции - антибиотики. У пациентов, принимавших системные стероиды, переход на ингаляции должен проходить на фоне постепенной отмены системных стероидов (снижение дозы не должно превышать 1 мг в день). Терапевтический эффект наступает при регулярном приеме в течение 4-7 дней. Эффект снижается, если ингалятор охлажден. После ингаляций рекомендуется прополоскать рот водой. Не следует резко прекращать лечение. С осторожностью используют при туберкулезе легких.

Пронзв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Флонивин БС (Flonivin BS)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит чистую сухую бациллу штамма IP 5832 с вегетативными спорами не менее 1 млрд.; в упаковке 16 шт.

Фарм. действ.: Противодиарейное.

Фармакокин.: После прекращения приема бактерия не остается в кишечнике в виде сапрофита, а выделяется во внешнюю среду; процесс выделения продолжается около 48 ч.

Фармакодин.: Обладает специфическими биологическими характеристиками по отношению к *B.cereus* и *B.subtilis*, которые отсутствуют в кишечной флоре и вносятся искусственным путем. Не нарушает нормальной кишечной флоры, сохраняя естественный синтез витаминов.

Показ.: Диарея грудных детей и взрослых; колит; дисбактериоз после приема антибиотиков широкого спектра действия (профилактика и лечение); энтерит, сопровождающийся поносом; метеоризм.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослые и дети от 3 до 12 лет - 4-6 капсул в сутки между приемами пищи; при функциональном синдроме - 2-3 капсулы утром, натошак, в течение 2-3 нед. Грудные дети и дети до 3 лет: 3-4 капсулы в сутки, капсулы перед приемом открывают и содержимое смешивают с небольшим количеством жидкости (подслащенная вода, сок, молоко или вода).

Предост.: Не следует давать детям неоткрытые целые капсулы.

Пронзв.: ICN Galenika (Югославия)

Флоринеф (Florinef)

Флудрокортизон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит флудрокортизона ацетата 0,1 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита гормонов коры надпочечников. Обладает выраженным влиянием на минеральный и углеводный обмен. Уже в малых дозах вызывает отчетливую задержку ионов натрия и способствует выведению калия.

Показ.: Заместительная терапия при выраженной недостаточности коры надпочечников, в частности, при болезни Аддисона, адреногенитальный синдром с потерей солей.

Противопоказ.: Психические заболевания в анамнезе, герпетические вирусные инфекции, амебиаз, системные микозы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, полиомиелит, остеопороз, период до и после иммунизации.

Бер. и корм. гр.: Во время беременности (особенно в I триместре) назначение только по абсолютным показаниям.

Поб. действ.: При использовании высоких доз: угнетение функции гипофиза (гипофизарной секреции АКТГ), снижение активности тимуса и образования кортизола, активация глюконеогенеза, отрицательный азотистый баланс, угнетение роста у детей, субкапсулярные катаракты, повышение внутриглазного давления, петехии, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, нарушения менструального цикла, отеки, повышение АД, асептические некрозы костей.

Примен. и доз.: Внутрь, от 0,1 мг 3 раза в неделю - до 0,2 мг в день. Больным с артериальной гипертонией - по 0,05 мг в сутки. Рекомендуется назначать в сочетании с кортизоном (6,25-25 мг в день) или гидрокортизоном (5-20 мг в день), особенно при заместительной терапии.

Предост.: С осторожностью назначают при язвенной болезни в анамнезе, миастении, дивертикулитах, недавно выполненных анастомозах кишечника, склонности к тромбозам и эмболиям, метастазирующей карциноме, туберкулезе (возможна активация процесса), сахарном диабете (вероятна декомпенсация). Во избежание отеков и повышения АД больным рекомендуется соблюдать диету с ограничением потребления поваренной соли. При возникновении инфекций на фоне лечения препаратом необходимо немедленное назначение антибиотиков или химиопрепаратов. При длительном

лечении следует регулярно контролировать концентрации электролитов и глюкозы в сыворотке крови.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Флормидал (Flormidal)

Мидазолам*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 3 мл раствора для инъекций содержит мидазолама 15 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Седативное, снотворное, противосудорожное, миорелаксирующее.

Фармакокин.: $T_{1/2}$ - 1,5-2 ч; образует устойчивые в водных растворах соли; в организме метаболизируется до неактивного альфа-гидроксимидазолама.

Показ.: Премедикация (хирургические и диагностические вмешательства, введение в наркоз), поддержание наркоза; седация в интенсивной терапии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, миастения.

Бер. и корм. гр.: В первом триместре беременности применяется только в случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Сонливость, утомляемость, атаксия; при в/в введении или высоких дозах - респираторная депрессия, апноэ.

Взаим.: Усиливает эффект нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов, гипнотических, анальгезирующих и анестезирующих средств.

Примен. и доз.: В/м. Взрослым - для премедикации: за 20-30 мин до введения в анестезию 10-15 мг, дети - 0,15-0,2 мг/кг. При введении в анестезию у детей возможно сочетание с кетаминотом: 0,15-0,2 мг/кг (5-10 мг) мидазолама и 8 мг/кг (5-100 мг) кетамина. В/в. С целью седации вводится за 5-10 мин до вмешательства под местной анестезией в дозе 2,5-5 мг. Для введения в анестезию (ингаляционную или комбинированную) - 10-15 мг с обезболивающими средствами.

Предост.: С осторожностью назначают пожилым больным и при нестабильной гемодинамике. После парентерального введения пациент должен находиться в больнице в течение 3 ч. В течение 12 ч после приема не рекомендуется водить машину, работать за станком, употреблять алкоголь.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Флу (Flu)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Carbolicum Acidum 4X, 25%, Sticta pulmon-

aria 4X, 25%, Triosteum perfoliatum 4X, 25%, Aviare 7C, 12,5%, Influenzinum 7C, 12,5%; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, адаптогенное.

Показ.: Грипп и др. вирусные инфекции (особенно острый период).

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано. Рекомендуются консультация врача до начала приема препарата.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, держать до полного растворения. Взрослым в остром периоде - по 1 таблетке каждые 15 мин в течение 1 ч, затем - по 1 таблетке каждые 30 мин еще 4 дозы; в дальнейшем - по 1 таблетке 3-4 раза в день до выздоровления. Детям в возрасте 2-12 лет назначают половину дозы для взрослых.

Предост.: Для обеспечения полной эффективности препарата не рекомендуется есть, полоскать горло, чистить зубы в течение 15-30 мин после приема. В начале лечения возможно обострение симптоматики. Если улучшение не наступает после 5 дней, следует проконсультироваться с врачом.

Произв.: Walsh Pharma (США)

Флугалин (Flugalin®)

Флурбипрофен*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая сахарной оболочкой, содержит флурбипрофена 50 или 100 мг; в упаковке 30 шт.

1 суппозиторий - 100 мг; в упаковке 12 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, ингибция простагландинсинтетазы.

Показ.: Ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, мышечные и костно-суставные боли, дисальгоменорея.

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, изжога, диарея, желудочно-кишечные кровотечения, язвенный стоматит, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50-100 мг 3 раза в день, ректально - по 1 суппозиторию 2-3 раза в день. Поддерживающая доза - по 1 суппозиторию утром или вечером.

Произв.: Knoll (Германия)

Флудара (Fludara®)

Флударабин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит флударабина фосфата 50 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое (ингибирование синтеза ДНК).

Фармакодин.: Ингибирует рибонуклеотидную редуктазу, ДНК-полимеразу (альфа/дельта и эпсилон), ДНК-праймазу и ДНК-лигазу, полностью угнетая синтез ДНК. Частично ингибирует РНК-полимеразу II, тормозит синтез белков.

Показ.: Хронический В-клеточный лимфолейкоз (в случае недостаточности или отсутствия эффекта при лечении алкилирующими цитостатическими средствами), неходжкинская лимфома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Миелосупрессия (нейтропения, тромбоцитопения, анемия), лихорадка, озноб, развитие инфекционных осложнений, анорексия, тошнота, рвота, диарея, желудочно-кишечные кровотечения, тревожность, утомляемость, слабость, нарушение сознания, нейропатия, кома, расстройства зрения, одышка, кашель, пневмония, отеки, кожная сыпь; геморрагический цистит, токсический эпидермальный некролиз, синдром лизиса опухоли (боль в боку, гематурия, повышенное мочеиспускание, гиперфосфатемия, гиперкальциемия, метаболический ацидоз, гиперкалиемия, кристаллурия, почечная недостаточность). У пациентов с невыявленной ранее аутоиммунной гемолитической анемией или непроведенной реакцией Кумбса после одного или более циклов лечения зарегистрированы случаи клинических проявлений гемолитической анемии.

Взаим.: Несовместим с пентостатином; дипиридамом и другие ингибиторы обратного захвата аденозина снижают терапевтическую эффективность.

Передоз.: Симптомы: необратимые изменения ЦНС (потеря зрения, кома, возможен смертельный исход), миелосупрессия (тромбоцитопения и нейтропения). Специфических антидотов нет. Лечение: выведение препарата из организма и поддерживающая терапия.

Примен. и доз.: В/в, по 25 мг/кв.м поверхности тела ежедневно в течение 5 дней каждые 28 дней. Раствор для парентерального введения должен быть приготовлен в асептических условиях; перед использованием сухое вещество, содержащееся во флаконе, растворяют в 2 мл стерильной воды для инъекций (каждый мл полученного раствора содержит 25 мг флударабина фосфата). Для быстрого в/в введения больших объемов, требуемая доза разводится в 10 мл 0,9% хлорида натрия или набирается шприцем и разводится в 100 мл 0,9% хлорида натрия, длительность инфузии составляет приблизительно 30 мин. Лечение продолжают до достижения максимально выраженного эффекта (обычно 6 циклов), после чего оно должно быть прекращено.

Предост.: С осторожностью использовать у пациентов с подозрением на почечную недостаточность и в возрасте старше 70 лет (при контроле клиренса креатинина: если клиренс креатинина в пределах от 30 до 70 мл/мин - доза должна быть снижена на 50%). У пациентов с хроническим лимфолейкозом и большими опухолями может наблюдаться синдром лизиса опухоли на первой неделе лечения. Необходимо следить за проявлениями неврологической симптоматики. Во время и после лечения следует избегать вакцинации живыми вакцинами. Во время лечения препаратом, а также в течение 6 мес после его окончания следует использовать противозачаточные средства во избежание наступления беременности. Следует соблюдать осторожность при приготовлении инфузионных растворов препарата, использовать резиновые перчатки и защитные очки; избегать вдыхания препарата; при попадании раствора на кожу или слизистые оболочки необходимо эти участки вымыть водой с мылом; в случае попадания в глаза следует тщательно промыть глаза большим количеством воды; рассыпанный или оставшийся препарат должен быть уничтожен сжиганием; в период беременности медперсонал к работе с флударой не допускается.

Произв.: Schering (Германия)

Флуклоксациллин (Flucloxacillin)

Флуклоксациллин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит флуклоксациллина 250 мг; в упаковке 28 шт.

1 пакетик с порошком для приготовления оральной суспензии - 125 или 250

мг.

5 мл эликсира - 125 мг; во флаконах по 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции кожи и мягких тканей, верхних и нижних дыхательных путей, мочевыводящих путей, остеомиелит, энтерит, эндокардит, менингит, средний отит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические явления, дисбактериоз, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1/2-1 ч перед едой - по 250-500 мг 4 раза в сутки; при остеомиелите, эндокардите - 8 г в сутки в 6-8 приемов; детям 2-10 лет - 1/2 дозы, до 2 лет - 1/4 дозы.

Произв.: Norton Healthcare / Galena (Великобритания)

Флуksум (Fluxum)

Парнапарин натрий*

Сост. и ф.в.: 1 шприц (предварительного заполнения) с 0,3 мл раствора для инъекций содержит парнапарина (натрия) 3200 МЕ (аХа), с 0,4 мл - 4250 МЕ, с 0,6 мл - 6400 МЕ, с 1,2 мл - 12800 МЕ, в упаковке 2 или 6 шт.

Фарм. действ.: Антикоагулянтное прямое, антиагрегационное.

Показ.: Тромбоз глубоких вен (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, нарушения свертывания крови (геморрагические диатезы, тромбоцитопения, дефицит факторов свертывания); язва желудка, двенадцатиперстной и подвздошной кишки, язвенный колит, острый бактериальный эндокардит (за исключением вызванного механическими протеазами), геморрагический инсульт.

Поб. действ.: Кровотечения (из ран, ЖКТ, слизистых оболочек, с поверхности кожи); тромбоцитопения; местные: гиперемия, инфильтрация и болезненность, гематома, некроз кожи; повышение уровня печеночных трансаминаз в плазме крови.

Примен. и доз.: П/к (в верхний наружный квадрант ягодичной области, иглу вводят перпендикулярно в толщу кожной складки, складку необходимо удерживать до окончания инъекции). При оперативных вмешательствах - по 0,3 мл (3200 МЕ аХа) за 2 ч до операции и далее каждые 24 ч (в течение 7 дней). При высоком риске тромбоэмболических осложнений и в ортопедической хирургии - по 0,4-0,6 мл (4250-6400 МЕ аХа)

за 12 ч до и через 12 ч после операции, затем 1 раз в сутки (не менее 10 дней).

Предост.: Нельзя вводить в/м; перед началом и во время лечения (в начальном периоде 2 раза в неделю, затем - ежемесячно) необходимо контролировать число тромбоцитов в периферической крови. При передозировке применяют протамин сульфат (0,6 мл ингибируют 0,1 мл Флуksума).

Произв.: CSC (Италия)

Флулем (Flulem)

Флутамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит флутамида 250 мг; в упаковке 90 шт.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, блокада связывания дигидротестостерона клеточными рецепторами, противоопухолевое.

Фармакокин.: Всасывается быстро, выводится почками (в основном) в виде метаболитов.

Показ.: Прогрессирующий рак предстательной железы (в комбинации с др. противоопухолевыми средствами); гиперандрогенные состояния у женщин: гирсутизм, облысение и др.; диагностика гипогонадизма у мужчин.

Противопоказ.: Тяжелые заболевания печени, почек и щитовидной железы.

Поб. действ.: Гинекомастия, боли в молочных железах, метгемоглобинемия (слабовыраженная).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке (250 мг) 3 раза в день, курс лечения длительный (в зависимости от течения заболевания). Для диагностических целей - по 10 мг/кг в сутки в 3 приема в течение 3 суток (под контролем экскреции гонадотропинов).

Предост.: С осторожностью назначают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Во время лечения необходим периодический контроль функции печени.

Произв.: CSC (Италия)

Флурокс (Flurox)

Флуороурацил*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с раствором для инъекций содержит флуороурацила 250 или 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, антиметаболическое.

Показ.: Паллиативное лечение злокачественных опухолей различной локализации.

Противопоказ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-

моррагии, опасность кровотечения из ЖКТ, патологические изменения со стороны крови, беременность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диарея, стоматит, геморрагии, бронхоспазм, атаксия, неврит зрительного нерва, алоpecia, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, нейтропения, дерматит, крапивница.

Примен. и доз.: В/в капельно (разводят в 300-500 мл 5% раствора глюкозы) по 15 мг/кг в сутки в течение 6 дней или по 12 мг/кг в сутки в течение 3 дней, затем по 6 мг/кг на 5-й, 7-й, 9-й дни.

Предост.: Необходимо прекратить лечение при появлении диареи, стоматита.

Произв.: CSC (Италия)

Флутакан (Flutacan)

Флутамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит флутамида 250 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, блокада связывания андрогенов клетками тканей-мишеней.

Показ.: Рак предстательной железы (паллиативное лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Гинекомастия, галакторея, задержка жидкости; подкожные кровоизлияния, тромбоэмболия, нарушение функции ЖКТ, почек и печени, токсический гепатит, бессонница, головная боль.

Примен. и доз.: Внутрь, по 250 мг 3 раза в день.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Флуцином (Flucinom®)

Флутамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит флутамида 250 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антиандрогенное, блокада связывания андрогенов клетками тканей-мишеней.

Фармакодин.: Препятствует биологическому действию андрогенов, в том числе в клетках опухоли предстательной железы. Способствует уменьшению размеров и плотности предстательной железы, уменьшает количество и размеры метастазов в тканях при раке предстательной железы, способствует уменьшению боли в костях.

Показ.: Прогрессирующий рак предстательной железы с метастазами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Гинекомастия и/или галакторея, задержка жидкости в организме, нарушение функции ЖКТ, печени и почек, бессонница, головная боль, подкожные кровоизлияния, волчано-подобный синдром, тромбоэмболия.

Примен. и доз.: Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. Применяют в виде монотерапии (с или без орхиэктомии) или в комбинации с агонистом лютеинизирующего гормона.

Предост.: Во время лечения необходимо контролировать функции печени и почек.

Произв.: Schering-Plough (США)

Фолинат кальция (Folinate calcium)

Кальция фолинат*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит фолиниевой кислоты 2,5 мг (в виде фолината кальция); в ампулах по 1 и 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита в организме фолиниевой кислоты, гемопэтическое, стимуляция роста быстро обновляющихся тканей (слизистая оболочка желудка, кишечника, кроветворная ткань), снижение токсичности метотрексата.

Фармакокин.: После в/м введения C_{max} - 30 мин, $T_{1/2}$ - около 45 мин. В значительной степени связывается с тканями, выводится из организма в основном почками.

Показ.: Профилактика интоксикаций метотрексатом (лечение лейкозов и солидных опухолей). Мегалобластные анемии ятрогенного происхождения. Фолиниевый гипо- и авитаминоз.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции.

Взаим.: Ослабляет эффект метотрексата (в т.ч. терапевтический).

Примен. и доз.: В/м, в/в - по 5 мг/сутки в течение 10 дней. При использовании повышенных доз метотрексата фолинат кальция назначают из расчета 25 мг/кв.м через 8 ч после применения метотрексата, затем - каждые 6 ч в течение 4 дней.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Форлакс (Forlax®)

Макроголь 4000*

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с ароматизированным порошком для приготовления раствора для приема внутрь содержит 10 г макроголя 4000; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Слабительное (осмотическое).

Фармакокин.: Благодаря своей высокой молекулярной массе макрогол не абсорбируется в ЖКТ и не подвергается метаболизму.

Фармакодин.: Осмотическое слабительное средство. Макрогол является высокомолекулярным веществом, представляющим собой длинные линейные полимеры, которые с помощью водородных связей способны удерживать молекулы воды. При приеме внутрь он увеличивает объем содержащейся в кишечнике жидкости, что приводит к усилению его перистальтики.

Клин. фарм.: Эффект наступает через 24-48 ч.

Показ.: Запоры у взрослых.

Противопоказ.: Язвенные поражения слизистой оболочки толстого кишечника; в т.ч. язвенный ректоколит, болезнь Крона; кишечная непроходимость (частичная, полная); боли в животе неизвестной этиологии.

Поб. действ.: Боли в животе; при передозировке - диарея.

Взаим.: Возможно замедление абсорбции, назначаемых одновременно других средств. Поэтому рекомендуется принимать Форлакс не ранее 2 ч после других препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь, предварительно растворяют содержимое пакетика в стакане воды, по 2 пакетика в сутки.

Предост.: Не рекомендуется длительное использование.

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Формагель (Formagelum)

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат 3,7% формальдегида; в тубах по 35 г.

Фарм. действ.: Дезинфицирующее, подавление функции потовых желез.

Показ.: Потливость любого происхождения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кожи.

Поб. действ.: Сухость кожи.

Примен. и доз.: Гель наносится тонким слоем на чистую и сухую кожу (на сильно потеющие участки). Через 30-40 мин препарат следует смыть теплой водой и кожу тщательно вытереть. Одной обработки достаточно для снижения потливости кожи на 10-12 дней, затем обработку можно повторить. Расход геля - около 4 г на одну обработку.

Произв.: Ретиноиды (Россия)

Форталгин Ц (Fortalgin C®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для приготовления шипучего напитка содержит ацетилсалициловой кислоты 400 мг и аскорбиновой кислоты 240 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее, антиагрегационное, противовоспалительное.

Показ.: Лихорадочный синдром (простудные заболевания, грипп), болевой синдром (головная боль, невралгия, артралгия, миалгия и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, склонность к кровотечениям, острая пептическая язва, подагра, фавизм, беременность, лактация, возраст (до 1 года).

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, слабость, шум в ушах.

Примен. и доз.: Внутрь (желательно после еды), по 1-2 таблетки (растворив в стакане с водой) 1-3 раза в день; детям до 12 лет - по 1/4-1/2 таблетки не более 4 раз в день. Высшая доза в пересчете на ацетилсалициловую кислоту - 4 г/сутки.

Произв.: Lek (Словения)

Фортранс (Fortrans®)

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с порошком для приготовления раствора для приема внутрь со вкусом пассифлоры содержит макроголя 4000 - 64 г, натрия сульфата безводного 5,7 г, натрия бикарбоната 1,68 г, натрия хлорида 1,46 г и калия хлорида 750 мг; в упаковке 4 шт.

Фарм. действ.: Слабительное (осмотическое).

Фармакодин.: Макрогол 4000 (компонент препарата), являющийся высокомолекулярным линейным полимером, с помощью водородных связей удерживает молекулы воды и тем самым увеличивает объем, содержащейся в кишечнике жидкости, вызывая слабительный эффект. Соли, содержащиеся в препарате, препятствуют нарушению водно-электролитного баланса организма.

Показ.: Опорожнение толстого кишечника при подготовке к диагностическим исследованиям (эндоскопическое, рентгенологическое) и хирургическим вмешательствам на толстом кишечнике.

Противопоказ.: Дегидратация, тяжелая сердечная недостаточность, заболевания толстого кишечника, сопровождающиеся значительными нарушениями функции слизистой оболочки, кишечная не-

проходимость (спастическая, обтурационная), детский возраст.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, ощущение вздутия кишечника.

Примен. и доз.: Внутрь, предварительно содержимое пакетика растворяют в 1 л воды. Для полного опорожнения кишечника требуется около 3-4 л раствора.

Предост.: Пожилым людям с различными сопутствующими заболеваниями рекомендуется назначать препарат только под наблюдением медицинского персонала.

Пронзв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Фортум® (Fortum®)

Цефтазидим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефтазидима (в виде пентагидрата) 250; 500; 1000 или 2000 мг; в упаковке 1 или 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Фармакокин.: Создает высокие концентрации в сыворотке крови (на длительное время), терапевтически эффективный уровень сохраняется через 8-12 ч после в/м и в/в введения. $T_{1/2}$ в сыворотке крови - 1,8-2,2 ч. Связывается с белками на 10%. Хорошо проходит через плаценту, плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер. Не биотрансформируется и выделяется в неизмененном виде с мочой (клубочковая фильтрация): 86-90% дозы за 24 ч, с желчью - менее 1%.

Фармакодин.: Ингибирует синтез белка клеточной стенки, активен в отношении микроорганизмов, устойчивых к гентамицину (и др. аминогликозидам), ампициллину и цефалотину.

Показ.: Тяжелые системные инфекции: сепсис, бактериемия, перитонит, менингит (в т.ч. у пациентов с иммунодефицитом, заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, инфицированными ожогами; инфекции дыхательных путей: пневмония, инфекционный плеврит, эмпиема, легочный абсцесс, бронхоэктазии, бактериальные осложнения при муковисцидозе; инфекции ЛОР-органов: воспаление среднего уха, злокачественное воспаление наружного уха, мастоидит, синусит; инфекции мочевых путей: пиелонефрит, пиелит, простатит, цистит, уретрит (бактериологический), почечный абсцесс; инфекции, связанные с камнями мочевого пузыря и почек; инфекции кожи и мягких тканей:

абсцессы, рожистое воспаление, инфицированные ожоги и раны, мастит, язвы; инфекции ЖКТ, желчных путей и брюшной полости: холангит, холецистит, эмпиема желчного пузыря, забрюшинные абсцессы, дивертикулит, после родовые бактериальные осложнения; костей и суставов (остеомиелит, септический артрит, бактериальное воспаление суставной сумки); диализ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к цефалоспориновым антибиотикам).

Бер. и корм. гр.: Для использования во время беременности необходимо оценить предполагаемую пользу и возможный риск. С осторожностью назначать кормящим матерям (т.к. проникает в грудное молоко).

Поб. действ.: Сыпь, крапивница, лихорадка, зуд, анафилактические реакции (бронхоспазм, гипотония); диарея, тошнота, рвота, боли в животе, стоматит, колит, кандидоз, вагинит, головные боли, головокружение, парестезии, судороги, неприятный привкус во рту, эозинофилия, положительная реакция Кумбса (без гемолиза), тромбоцитоз, повышение печеночных ферментов, мочевины и креатинина в сыворотке крови, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, лимфоцитоз. Местно: флебит, тромбоз (при в/в введении), боли и воспаление после в/м использования.

Примен. и доз.: В/в, в/м (глубоко). Взрослым - от 1 до 6 г в день, при большинстве инфекций - по 1 г через 8 ч или 2 г через 12 ч, при сниженном иммунитете - 2 г через 8 или 12 ч, муковисцидоз - 100-150 мг/кг в сутки в 3 приема. Детям (старше 2-х мес) - 30-100 мг/кг в сутки в виде 2-3 разделенных доз, с пониженным иммунитетом - до 150 мг/кг в сутки (6 г/сутки максимально) в виде трех доз. Новорожденные и младенцы до 2 мес - от 25 до 60 мг/кг в сутки при двукратном введении.

Предост.: С осторожностью назначают пациентам с аллергизацией (в анамнезе) к пенициллинам, в сочетании с нефротоксическими препаратами (аминогликозиды, сильно действующие диуретики). Больным с нарушенной функцией почек дозу уменьшают (рекомендуется рассчитывать с учетом клиренса креатинина).

Пронзв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Фосамакс (Fosamax®)

Алендронат натрия

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит алендроната натрия 10 мг.

Фарм. действ.: Антиостеопорозное, специфическая ингибция остеокласт-опосредованной костной резорбции.

Клин. фарм.: Восстанавливает положительный баланс между резорбцией и формированием костной ткани, повышает костную массу и увеличивает ее плотность, снижает риск переломов позвоночника, бедренных и др. костей. Нормализация скорости резорбции костной ткани (сравнивается с таковой в доменопаузном периоде) достигается к 3-6 мес.

Показ.: Постменопаузный остеопороз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания пищевода, сопровождающиеся задержкой прохождения пищи (стриктуры, ахалазия и др.), гипокальциемия, неспособность стоять или сидеть прямо не менее 30 мин, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Боли при глотании, боль за грудиной, дисфагия, эрозии и язвы пищевода, эзофагит, боли в животе, диспепсия, изжога, метеоризм, запор (или понос), головная боль, боли в мышцах и костях; сыпь, эритема, снижение уровня кальция и фосфора в сыворотке крови.

Взаим.: Совместим с препаратами, используемыми для сопутствующей терапии постменопаузного остеопороза. Препараты кальция и антациды, применяемые внутрь, изменяют скорость всасывания фосамакса.

Передоз.: Симптомы: гипокальциемия, гипофосфатемия, расстройства ЖКТ (изжога, эзофагит, гастрит, язвенные поражения). Рекомендуется назначение молока или антацида (для связывания алендроната). Пациентка должна оставаться в вертикальном положении; рвоту вызывать не следует (опасность раздражения пищевода).

Примен. и доз.: Внутрь, по 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день, запивают полным стаканом чистой воды (др. жидкости не рекомендуются). Таблетку не разжевывать и не сосать. Препарат следует принимать натощак, минимум за 30 мин до первого приема пищи, жидкости или др. лекарств. После приема препарата не следует ложиться ранее, чем через 30 мин и до первого приема пищи. Особо не рекомендуется принимать препарат

перед сном или перед утренним подъемом с постели.

Предост.: Невыполнение условий приема препарата может увеличивать риск отрицательного воздействия на пищевод; при появлении симптомов поражения пищевода необходимо прекратить прием. Рекомендуется с осторожностью назначать пациенткам с острыми заболеваниями верхнего отдела ЖКТ (дисфагия, заболевания пищевода, гастриты, дуодениты, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка. Во время лечения необходима диета, обеспечивающая достаточное поступление кальция (обычно - 500 мг кальция в день).

Пронизв.: MSD (США)

Фосфалюгель® (Phosphalugel®)

Алюминия фосфат

Сост. и ф.в.: 1 пакетик с 16 г геля для приема внутрь содержит алюминия фосфата (коллоидного) 8,8 г; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антацидное, обволакивающее, адсорбирующее.

Фармакодин.: Большая часть фосфата алюминия нерастворима, незначительная часть осаждается в кишечнике в виде оксидов и нерастворимых карбонатов. Фосфалюгель находится в виде гидрофильных коллоидных мицелл, что усиливает его протективное, антацидное влияние. Увеличивает pH желудочного сока до 3,5-5 менее, чем за 10 мин, и удерживает на этом уровне в течение длительного времени за счет буферных свойств; снижает протеолитическую активность пепсина, связывает и удаляет различные микроорганизмы и вредные вещества (экзогенные токсины, газы). За счет пектина и агар-агара участвует в образовании мукоидного антипептического защитного слоя в ЖКТ, нормализует прохождение по кишечнику; ослабляет болевые ощущения. Не вызывает защелачивания желудочного сока, не приводит к вторичной гиперсекреции соляной кислоты, не влияет (при длительном приеме) на обмен фосфора.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией, желудочно-пищеводный рефлюкс-эзофагит (в т.ч. у детей), диафрагмальная грыжа, синдром неязвенной диспепсии, функциональные заболевания толстого кишечника, желудочно-кишечные расстройства при приеме ле-

карственных препаратов или интоксикации.

Противопоказ.: Выраженные нарушения функции почек.

Бер. и корм. гр.: Возможно (недлительно, периодически).

Поб. действ.: Запоры (редко).

Взаим.: Снижает абсорбцию фуросемида, тетрациклинов, дигоксина, изониазида, индометацина, ранитидина (при приеме рекомендуется интервал не менее 1-2 ч).

Передоз.: Симптомы: подавление моторики ЖКТ. Лечение: использование слабительных средств.

Примен. и доз.: Внутрь, можно в чистом виде или перед приемом развести в половине стакана воды. Взрослым и детям старше 6 лет - по 1-2 пакетика 2-3 раза в день; при желудочно-пищеводном рефлюксе, диафрагмальной грыже - сразу после еды и на ночь; при язвенных заболеваниях - через 1-2 ч после еды и при возникновении болей; при гастрите и диспепсии - до еды; при функциональных расстройствах толстого кишечника - утром натощак и на ночь. Прием препарата повторяют, если боли возникают в промежутках между приемами. Детям: до 6 мес - по 1/4 пакетика или 1 чайной ложке (4 г) после каждого из 6 кормлений; после 6 мес - по 1/2 пакетика или по 2 чайные ложки после каждого из 4 кормлений.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушениях функции почек, пожилom возрасте (возможно увеличение концентрации алюминия в сыворотке), в случаях неуточненного диагноза.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

Фосфобион (Fosfobion)

Трифосаденин

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит натрия аденозинтрифосфата 10 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Улучшение метаболизма и энергообеспечения тканей, усиление мозгового, коронарного и периферического кровообращения.

Показ.: Мышечная дистрофия, атония, полиомиелит, рассеянный склероз, заболевания периферических сосудов (перебегающая хромота, болезнь Рейно, облитерирующий тромбангиит); купирование пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, ИБС, пигментная дегенерация сетчатки, слабость родовой деятельности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, арте-

риальная гипотония, воспалительные заболевания легких.

Поб. действ.: Головная боль, общая слабость, увеличение диуреза; при в/в введении - тошнота, гиперемия; редко - аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, по 10 мг (1 мл 1% раствора) 1 раз в сутки, затем - по 10 мг 2 раза в сутки или по 20 мг 1 раз в сутки. Курс лечения - 30-40 инъекций; повторные курсы - через 1-2 мес.

Предост.: Не рекомендуется одновременное применение с высокими дозами сердечных гликозидов.

Произв.: Romferchim (Румыния)

Фотил (Fotil®)

Фотил форте (Fotil® forte)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 мл глазных капель содержит тимолола (в виде малеата) 5 мг и пилокарпина гидрохлорида 20 (Фотил) или 40 (Фотил форте) мг; во флаконах по 5 мл.

Фарм. действ.: Снижение внутриглазного давления, м-холиномиметическое (пилокарпин), бета-адреноблокирующее (тимолол).

Показ.: Открытоугольная и закрытоугольная глаукома, вторичная глаукома (uveальная, афакическая, посттравматическая), повышение внутриглазного давления (послеоперационный период).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый ирит, поражения роговицы, сердечная недостаточность, АВ-блокада II-III степени, синусовая брадикардия, кардиогенный шок, бронхиальная астма (даже в анамнезе), бронхоспастический синдром.

Поб. действ.: Блефароконъюнктивит, дерматит век, корнеальная анестезия, точечная кератопатия, уменьшение слезоотделения, ощущение жжения в глазах (после закапывания), спазм цилиарной мышцы, миопия, обратимое помутнение хрусталика (при длительном применении). Очень редко системные эффекты: диспептические расстройства, гипотония, головная боль, астения, гиперемия слизистой оболочки носа, бронхоспазм, аритмия, галлюцинации, спутанность сознания.

Примен. и доз.: По 1 капле в пораженный глаз 2 раза в сутки. Фотил форте: по 1 капле в пораженный глаз 2 раза в сутки в течение 4 нед, затем в поддерживающей дозе - по 1 капле 1 раз в сутки.

Произв.: Santen (Финляндия)

Фраксипарин (Fraxiparine®)

Надропарин кальция*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит низкомолекулярного гепарина с активностью 25 000 ЕД. антиХа IC; шприцы предварительного заполнения по 0,3 мл; в упаковке 2 и 10 шт. и по 0,6 и 1 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антитромботическое.

Фармакодин.: Увеличивает степень ингибиции циркулирующего фактора Ха, не изменяя свертываемость крови.

Показ.: Глубокий венозный тромбоз, тромбоэмболическая болезнь, прежде всего в ортопедической и общехирургической практике (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кровотечения или предрасположенность к ним, кровоизлияние в головной мозг, обострение гастродуоденальной язвы, острый бактериальный эндокардит, тромбоцитопения, беременность.

Поб. действ.: Кровотечения, гематомы и некроз кожи в месте введения, тромбопения, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект антивитаминов К, НПВС, антиагрегантов, декстрана.

Примен. и доз.: П/к; при терапии - по 225 ЕД/кг (100 МЕ/кг) 2 раза в день в течение 10 суток. Профилактика тромбоэмболической болезни: общая хирургия - 0,3 мл (7500 ЕД или 3075 МЕ) за 2-4 ч до операции (длительность 7 дней); ортопедическая хирургия - 100 ЕД/кг (41 МЕ/кг) за 12 ч до операции, через 12 ч после и затем ежедневно в течение 3 дней, далее - 150 ЕД/кг (61 МЕ/кг) не менее 10 дней.

Предост.: Следует назначать с осторожностью в сочетании с антивитаминами К, НПВС, антиагрегантами, декстраном.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Фридерм деготь (Frederm Tar®)

Сост. и ф.в.: Содержит очищенный деготь; во флаконах по 150 мл.

Фарм. действ.: Противосеборейное.

Показ.: Себорея и псориаз волосистой части головы.

Примен. и доз.: Нанести на тщательно смоченные волосы необходимое количество дегтярного шампуня и втирать в кожу до образования пены. Тщательно

промыть волосы и нанести вновь. Оставить пену на голове примерно на 5 мин, затем тщательно промыть волосы. Применять 1-2 раза в неделю или по рекомендации врача.

Произв.: Schering-Plough (США)

Фридерм pH-баланс (Frederm pH-balance®)

Сост. и ф.в.: Содержит триэтаноламин-лаурил сульфат, полиэтиленгликоль-8-дистеарат, моноэтаноламид кокамид, диэтаноламид кокамид, натрия хлорид, дистиллированную воду; во флаконах по 150 мл.

Фарм. действ.: Защита кожи головы и волос, поддержание необходимого баланса pH.

Показ.: Очищение кожи головы и волос.

Примен. и доз.: Нанести шампунь на тщательно смоченные волосы, вспенить и промыть голову. Повторять процедуру столько раз, сколько необходимо или сколько указано лечащим врачом. Можно применять ежедневно.

Произв.: Schering-Plough (США)

Фридерм цинк (Friderm zinc®)

Сост. и ф.в.: Содержит пиридинетин цинка; во флаконах по 150 мл.

Фарм. действ.: Противосеборейное.

Показ.: Себорейный дерматит кожи головы, сопровождающийся образованием перхоти.

Примен. и доз.: Тщательно взболтать перед использованием. Нанести на смоченные волосы необходимое количество шампуня и втирать в кожу до образования пены. Тщательно промыть волосы и нанести вновь. Оставить пену на голове примерно на 5 мин, затем промыть волосы. Применять не реже 2 раз в неделю в течение первых 2 нед, в дальнейшем применять регулярно или по рекомендации врача.

Произв.: Schering-Plough (США)

ФСМЕ-Булин (FSME-Bulin®)

Сост. и ф.в.: 1 флакон содержит 1, 2, 5 или 10 мл концентрированного раствора очищенной фракции иммуноглобулинов человека против вируса клещевого энцефалита с минимальным титром антител 1:640. Плазма, применяемая для производства препарата, проходит обязательную проверку на АЛТ, а также на отсутствие HBsAg, анти-HCV, HIV-1 и HIV-2

антител. Содержит 100-170 мг/мл белка (не менее 90% гамма-глобулина), 22,5 мг/мл глицина, 3,0 мг/мл натрия хлорида, не содержит консервантов.

Фарм. действ.: Иммунизирующее (пассивное).

Показ.: Профилактика клещевого энцефалита перед посещением природных очагов инфекции или в течение 96 ч после укуса клеща (при отсутствии прививки вакциной, а также в случае неэффективной вакцинации).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Допустимо.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с живыми вакцинами (они не должны использоваться в течение 3 мес).

Примен. и доз.: В/м глубоко, медленно (согрев до температуры тела); введение до укуса клеща - 0,05 мл/кг (защитное действие проявляется через 24 ч и продолжается около 4 нед), затем повторно - через 4 нед; введение после укуса клеща - 0,2 мл/кг. Если к моменту укуса клеща пациент должен был получить вторую прививку вакцины против клещевого энцефалита (ФСМЕ-ИММУН Инжект), т.е. через 2-4 нед после 1 дозы, а с момента укуса прошло не более 48 ч, то вводят вакцину.

Произв.: Immuno (Австрия)

ФСМЕ-Иммун Инжект (FSME-Immun® Inject)

Сост. и ф.в.: Шприц, готовый к употреблению с одноразовой дозой, содержит 0,5 мл суспензии для инъекций (очищенный и инактивированный формалином вирус клещевого энцефалита, полученный путем репродукции на клетках куриного эмбриона, сорбированный на гидроксиде алюминия); в упаковке 10 и 100 шт.

Фарм. действ.: Активная иммунизация (против клещевого энцефалита).

Показ.: Вакцинация против клещевого энцефалита, вакцинация доноров с целью получения специфического иммуноглобулина (для профилактики и лечения клещевого энцефалита).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, инфекционные заболевания с высокой температурой.

Бер. и корм. гр.: Допустимо.

Поб. действ.: Вялость, миалгия, тошнота, головная боль, обострение аутоиммунных заболеваний, покраснение и отек мягких тканей в области укола,

воспаление близлежащих лимфатических узлов.

Взаим.: Пассивная иммунизация против клещевого энцефалита в первые 4 нед снижает эффективность активной. Возможно проведение других прививок.

Примен. и доз.: В/м, по 0,5 мл, 2 прививка через 1-3 мес, 3 - через 9-12 мес после второй, ревакцинация - через 3 года после последней. Если укус клеща имел место перед первой прививкой или же в течение 14 дней после нее, необходимо проведение пассивной иммунизации (иммуноглобулином против клещевого энцефалита).

Произв.: Immuno (Австрия)

Фталазол (Phthalazolum)

Фталилсульфатиазол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фталилсульфатиазола 0,5 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Дизентерия, колиты, гастроэнтериты, операции на кишечнике (для предупреждения гнойных осложнений).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 г 4-6 раз в сутки в течение 5-7 дней. Детям дозу уменьшают соответственно возрасту. Высшая доза для взрослых: разовая - 2 г, суточная - 7 г.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Фторафур (Phthorafurum)

Тегафур*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит тегафура 400 мг; в упаковке 10 шт.

1 капсула содержит тегафура 400 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Фармакокин.: Хорошо всасывается из ЖКТ при приеме внутрь, в печени и в опухолевой ткани превращается в активный метаболит - 5-фторурацил. $T_{1/2}$ после в/в введения - 6-16 ч.

Фармакодин.: Нарушает синтез ДНК и РНК: ингибирует фермент тимидилатсинтетазу, внедряется в РНК в виде 5-фторурацила. Нарушение синтеза РНК обуславливает эффективность препарата при солидных медленно растущих опухолях с малым пролиферативным пулом.

Показ.: Рак молочной железы, рак желудка, рак прямой и толстой кишки, лимфома кожи, диффузный нейродермит.

Противопоказ.: Терминальные состояния, кровотечение, печеночно-почечная недостаточность, лейкопения, тромбоцитопения, анемия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, головокружение (выраженность снижается при фракционировании суточной дозы и переходе на энтеральное введение), стоматит, лейкопения, тромбоцитопения, анемия.

Взаим.: Совместим с циклофосфаном, метотрексатом, гексаметилмеламином, митомицином и другими противоопухолевыми средствами при отсутствии перекрестной резистентности.

Передоз.: В больших дозах угнетает кроветворение (симптомы лейкопении, тромбоцитопении, анемии).

Примен. и доз.: В/в, по 30 мг/кг в сутки за 1-2 приема (не более 2 г), курсовая доза - 30-40 г. При кожных заболеваниях - в/в 400 мг в сутки, курсовая доза - 4-6 г. Внутрь, суточная доза 20-30 мг/кг (1,2-1,6 г) за два приема, курсовая доза - 30-40 г.

Предост.: В/в введение следует производить в положении лежа во избежание головокружения. Во время лечения необходимо регулярно контролировать клеточный состав крови. Назначение препарата допустимо через 1 мес после лучевой терапии и применения других химиотерапевтических средств.

Произв.: Гриндекс (Латвия)

Фторокорт (Ftorocort)

Триамцинолон*

Сост. и ф.в.: 1 тубик (15 г) содержит 15 мг триамцинолона ацетонида в смываемой мази.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, антиэкссудативное, противовосудное, противовоспалительное.

Показ.: Экзема, зуд заднего прохода и половых органов, контактный дерматит, нейродермит, пемфигус, герпетический дерматит, экссудативная эритема, дискоидная красная волчанка, псориаз, розовый питириаз, угри, розацеа, солнечный ожог, фоточувствительность, световая крапивница, укусы насекомых.

Противопоказ.: Офтальмологическая патология.

Поб. действ.: Системные глюкокортикоидные эффекты (при длительном ле-

чении и нанесении на обширные поверхности).

Примен. и доз.: Накожно, наносят тонкий слой на пораженную кожную поверхность 2-3 раза в день (не более 15 г/сутки), возможно наложение окклюзионной повязки (доза не более 10 г/сутки).

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Фторотан (Phthorothanum)

Галотан*

Сост. и ф.в.: Жидкость для ингаляционного наркоза во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Наркозное.

Показ.: Ингаляционный наркоз.

Противопоказ.: Феохромоцитома, гипертиреоз, гиперкатехоламинемия, печеночная недостаточность, гипотония, аритмия.

Поб. действ.: Гипотермия, гипотония, брадикардия, фибриляция желудочков, тошнота, рвота, головная боль.

Примен. и доз.: Ингаляционно, (в смеси с кислородом или закисью азота с кислородом) с помощью наркозных аппаратов, для вводного наркоза - 3-4%, для поддержания хирургической стадии - 0,5-1,5%.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Фунгизон (Fungizone®)

Амфотерицин В*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления раствора для инъекций содержит амфотерицина В 50 мг (50000 ЕД).

Фарм. действ.: Противогрибковое, широкого спектра, фунгицидное (образование комплексов со стеролами мембран гриба, нарушение проницаемости мембран).

Показ.: Системные микозы: криптококкоз, бластомикоз, диссеминированные формы кандидоза, кокцидиомикоз, гистоплазмоз, фикомироз, споротрихоз, аспергиллез, кожно-слизистый лейшманиоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность (только по жизненным показаниям).

Поб. действ.: Лихорадка (с ознобом), анорексия, потеря веса, тошнота и рвота, диспепсия и недомогание, боль в мышцах и суставах, спазмообразные боли в желудке; флебиты и боль в месте инъекции, миелосупрессия, нефротоксичность, гипотония или гипертония, нарушение свертываемости крови, анемия,

потеря слуха, нарушение зрения, периферическая нейропатия, головная боль, головокружения, судороги, гипокалиемия, анафилактоидные реакции, аритмии, остановка сердца, геморрагический гастроэнтерит, острая печеночная недостаточность.

Взаим.: Несовместим с нефротоксичными антибиотиками и противоопухолевыми препаратами.

Примен. и доз.: В/в, медленная инфузия в течение 6 ч: начальная суточная доза - 0,25 мг/кг массы тела, затем постепенное повышение до 1 мг/кг (максимально - до 1,5 мг/кг в сутки), курс - несколько месяцев; в диапазоне 0,25-1 мг/кг суточная доза должна поддерживаться на максимально возможном уровне, не сопровождающемся тяжелыми токсическими проявлениями; при прекращении лечения более, чем на 7 дней, терапия возобновляется с 0,25 мг/кг. Раствор для инфузии с конечной концентрацией 10 мг/100 мл готовят путем последовательных разведений содержимого флакона сначала водой для инъекций, затем декстрозой для инъекций с pH 4,2 (не следует использовать другие растворители).

Предост.: Необходимо постоянное медицинское наблюдение, еженедельный контроль картины крови, уровня калия, показателей функционального состояния печени и почек.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Фурагин (Furaginum)

Фуразидин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуразидина 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Инфекционно-воспалительные заболевания: гнойные раны, ожоги, острый и хронический цистит, уретрит, пиелонефрит; инфекции женских половых органов, конъюнктивит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 100-200 мг 2-3 раза в день в течение 7-10 дней. Местно (интравагинально, конъюнктивально), разведя (1:13 000) в изотоническом растворе NaCl.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Фурадонин (Furadoninum)

Нитрофурантоин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитрофурантоина 50 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка с кишечнорастворимой оболочкой - 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекционные заболевания мочевыводящих путей: пиелит, пиелонефрит, цистит, уретрит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, цирроз печени, хронический гепатит.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, аллергические реакции (экзантема, энантема).

Примен. и доз.: Внутрь, по 100-150 мг 3-4 раза в сутки в течение 5-8 дней.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Фуразолидон (Furazolidonum)

Фуразолидон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуразолидона 50 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, антипротозойное.

Показ.: Дизентерия, паратифы, лямблиоз, пищевые токсикоинфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 100-150 мг (детям до 14 лет - 30-50 мг) 4 раза в сутки, (но не более 800 мг) в течение 5-10 дней.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Фурацилин (Furacilinum)

Нитрофурал*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитрофурала 100 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Бактериальная дизентерия.

Противопоказ.: Почечная недостаточность.

Поб. действ.: Анорексия, рвота, головокружение, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 100 мг 4-5 раз в сутки в течение 5-6 дней. Высшие дозы: разовая - 100 мг, суточная - 500 мг.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Фурацилин (Furacilinum)**Нитрофурал***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для наружного употребления содержит нитрофурала 20 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное.

Показ.: Хронический гнойный отит, инфицированные раны, язвы, ожоги, пролежни; стоматит; ангина; конъюнктивит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Дерматиты.

Примен. и доз.: Наружно, в виде водного раствора 1:5000 (0,02%) - орошают раны и накладывают влажные повязки. Внутриполостно - промывают гайморовую полость, полость рта.

Произв.: Олайнфарм (Латвия); Тюменский химфармзавод (Россия)

Фурезис композитум (Furesis compositum®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг и триамтерена 50 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отеки.

Противопоказ.: Выраженная почечная или печеночная недостаточность, гиперкалиемия.

Поб. действ.: Сухость во рту, тошнота, диарея, головная боль, утомляемость, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозировка индивидуальная. Обычно для взрослых - 1 таблетка 1-2 раза в день.

Произв.: Ogiön (Финляндия)

Фуросемид (Furosemid)**Фуросемид***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отеки (хроническая сердечная недостаточность, цирроз печени, нефротический синдром), отек легких и мозга, хроническая почечная недостаточность, гипертензия, эклампсия, отравления (форсированный диурез).

Противопоказ.: Тяжелая почечная или печеночная недостаточность, гипокалиемия, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Гипокалиемия.

Взаим.: Совместим с АКТИГ и кортикостероидами. Усиливает нефротоксичность цефалоспоринов и гентамицина.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым по 1-2 таблетке (в начале - по 1/3 таблетки) в день или через день.

Предост.: Назначать следует на фоне диеты, богатой калием, или в сочетании с солями калия.

Произв.: Ogiön (Финляндия)

Фуросемид (Furosemid)**Фуросемид***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг; в упаковке 100 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 20 мг; в упаковке 25 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отечный синдром различного генеза, отек легких, сердечная астма, отек мозга, хроническая почечная недостаточность, некоторые формы гипертонического криза, эклампсия.

Противопоказ.: Острый гломерулонефрит, острая почечная недостаточность с анурией, гипокалиемия, алкалоз, прекоматозные состояния, печеночная и диабетическая кома, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Гиповолемия, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, гиперурикемия, гипергликемия, артериальная гипотония, головокружение, сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, диарея, мышечная слабость, судороги, дерматиты.

Взаим.: Усиливает эффект курарепоподобных средств; нестероидные противовоспалительные средства уменьшают диуретический эффект. Несовместим с солями лития, аминогликозидами, цефалоспоринами.

Примен. и доз.: Внутрь, в/в или в/м. При нетяжелом отеком синдроме - внутрь в разовой дозе 40-80 мг (обычно утром натощак). При выраженном отеком синдроме - внутрь в разовой дозе 120-160 мг. При необходимости дозу увеличивают до 1-1,5 г. Максимальная разовая доза - 2 г. В/в и в/м - по 40-80-120 мг 1 раз в сутки (в отдельных случаях - 2 раза в сутки).

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Фуросемид (Furosemidum)**Фуросемид***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отечный синдром при застойной сердечной недостаточности, циррозе печени с портальной гипертензией, по-

чечной недостаточности, отек легких и мозга; интоксикация барбитуратами, эклампсия; артериальная гипертензия, гипертонический криз.

Противопоказ.: Гипокалиемия, почечная кома, механическая непроходимость мочевых путей, сахарный диабет, подагра, беременность (первая половина).

Поб. действ.: Тошнота, понос, гипотония, обратимое ухудшение слуха, головокружение, депрессия, мышечная слабость, судороги, дегидратация, жажда, гипокалиемия, гипергликемия, урикозурия, гиперемия кожи, зуд.

Примен. и доз.: Внутрь, натощак - по 40 мг 1 раз в день (утром), при необходимости - 80-160 мг, принимая 1-2 раза в день. При тяжелой почечной недостаточности - 240-500 мг/сутки. При артериальной гипертензии - 20-40 мг/сутки.

Произв.: Акрихин (Россия); Олайн-фарм (Латвия)

Фуросемид (Furosemid)

Фуросемид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 0,04 г; в пластмассовой банке по 50 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, салуретическое.

Показ.: Артериальная гипертензия, отеки, острая и хроническая почечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к сульфонидам, анурия, вызванная нефротоксическими веществами, почечная недостаточность, предкоматозные состояния и печеночная кома, тяжелая гипокалиемия, гипонатриемия и/или гиповолемия, сопровождающие гипотонию, беременность, лактация.

Поб. действ.: Нарушение водно-электролитного баланса: гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз; гипергликемия, глюкозурия, нарушение функции ЖКТ, панкреатит, ослабление зрения, глухота, головная боль, ортостатическая гипотония, фотосенсибилизация, кожные аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффект гипотензивных средств, нефротоксичность цефалоспоринов и аминогликозидов, ототоксичность др. препаратов. Антikonвульсанты, НПВС, пробенецид, курение уменьшают диуретическое действие.

Примен. и доз.: Внутрь, дозу подбирают индивидуально. Взрослым при отеках - обычно 0,04 г 1 раз в сутки; в легких случаях - 0,02 г в сутки или 0,04 г через день; при необходимости - до 0,08

г и более в сутки, разделив на один или несколько приемов. В тяжелых случаях дозу увеличивают постепенно (максимально до 0,6 г в сутки). При артериальной гипертензии - 0,04-0,08 г в сутки. Детям - 1-3 мг/кг (максимально - 0,04 г в сутки).

Произв.: Таллинский фармацевтический завод (Эстония)

Фуросемид Ланнахер (Furosemid Lannacher)

Фуросемид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг; в упаковке 20 и 50 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 20 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое.

Показ.: Отечный синдром (при хронической сердечной недостаточности, портальной гипертензии, нефротическом синдроме), острая сердечная левожелудочковая недостаточность (отек легких), сердечная астма, отек мозга, хроническая почечная недостаточность, артериальная гипертензия, гипертонический криз, эклампсия, форсированный диурез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый гломерулонефрит, тяжелая почечная недостаточность, анурия, гипокалиемия, гипонатриемия, гиповолемия, алкалоз, прекоматозные состояния, кома (печеночная, диабетическая).

Поб. действ.: Головокружение, шум в ушах, сухость во рту, жажда, анорексия, тошнота, рвота, диарея, аритмии, артериальная гипотония, панкреатит, мышечная слабость, судороги, гиповолемия, дегидратация, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, при высоких дозах у больных с нарушением функции почек - нарушения слуха, зрения, парестезии, дерматит, преходящая гиперурикемия с обострением подагры, повышение уровня мочевины и креатинина, гипергликемия, изменения картины периферической крови.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 20-80 мг в день (максимально - до 500-600 мг в день), при артериальной гипертензии - по 20-40 мг 2 раза в день. В/м или в/в, по 20-40 мг. Детям - начинают с 1-2 мг/кг массы тела (при парентеральном введении 1 мг/кг), доза может быть увеличена через 6-8 ч на 1-2 мг/кг (максимальная суточная доза - 6 мг/кг массы тела).

Произв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Фуросемид (Fursemid)

Фуросемид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фуросемида 40 мг; в упаковке 12 и 100 шт.

1 ампула с 2 мл раствора для инъекций - 20 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Диуретическое, гипотензивное.

Показ.: Отечный синдром (сердечного, почечного, печеночного генеза), сердечная недостаточность; отеки при беременности, асцит, эклампсия, отек легких и мозга, отравление барбитуратами, тяжелые формы гипертензии, цирроз печени, гиперкальциемия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, анурия при острой почечной недостаточности, печеночная кома, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, ранняя стадия беременности.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, гиперемия, зуд, парестезия, ухудшение зрения, гипотония, обморок, слабость, жажда, учащение мочеиспускания, гипокалиемия.

Взаим.: Усиливает гипотензивный эффект антигипертензивных средств, повышает риск дигиталисной интоксикации (увеличенная потеря калия).

Примен. и доз.: Внутрь. Дозирование индивидуальное. Средняя доза - 1 таблетка в день утром (при необходимости - 2-3 таблетки в сутки в несколько приемов), поддерживающая доза - 1 таблетка через день; для детей доза подбирается в зависимости от возраста и массы тела. При отеках начальная доза - 40 мг в день, затем ее снижают до 20 мг в день. Для форсирования диуреза (например, гипертонический криз) - в/в капельно или в/м 1-2 раза в день. При гипертензии - по 40-80 мг в день.

Произв.: Belupo (Хорватия)

Хай-Кром (Hay-Crom)

Кромоглициевая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора содержит динатрия кромогликата 20 мг; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Противоаллергическое.

Фармакодин.: Стабилизирует мембраны сенсibilизированных тучных клеток, предотвращает их дегрануляцию и высвобождение медиаторов аллергии и других биологически активных веществ.

Показ.: Аллергические конъюнктивиты (включая сезонный), поллиноз; раздражение слизистой глаз, связанное с аллергическими реакциями на средства бы-

товой химии, косметику, глазные лекарственные формы, профессиональные вредности (дым, запыленность, пары растворителей и других химических веществ), растения и домашних животных; синдром "сухих глаз", перенапряжение и усталость глаз (в качестве профилактического средства и в комплексной терапии).

Противопоказ.: Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Бер. и корм. гр.: В период беременности (особенно в первом триместре) применяют только в случае крайней необходимости.

Поб. действ.: Временная расплывчатость зрения сразу после закапывания, кратковременное чувство жжения в глазах.

Примен. и доз.: Взрослым и детям - по 1-2 капли в каждый глаз до 4-х раз в сутки.

Предост.: В процессе ношения мягких контактных линз лечение препаратом не рекомендуется. При появлении временной расплывчатости зрения после закапывания капель необходимо воздержаться от управления машиной и другими механизмами до полного восстановления зрения.

Произв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Хеликоцин (Helicocin)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка овальной формы содержит амоксициллина 750 мг и 1 таблетка круглой формы - метронидазола 500 мг; в упаковке 36 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакодин.: Активен в отношении *Helicobacter pylori*, предотвращает рецидивирование язвенной болезни; амоксициллин ингибирует развитие резистентности *Helicobacter pylori* к метронидазолу.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), хронический гастрит (в фазе обострения).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания нервной системы, нарушения кроветворения, лимфолейкоз, инфекционный мононуклеоз, детский и подростковый возраст (до 18 лет), беременность, лактация, употребление алкоголя в процессе лечения.

Поб. действ.: Глоссит, стоматит, анорексия, тошнота, рвота, диарея, запор, боли в эпигастрии, гепатит, интерстициальный нефрит, нарушение гемопоэза, псевдомембранозный колит, аллергичес-

кие реакции (крапивница, ангионевротический отек). При длительном применении высоких доз - головокружение, атаксия, спутанность сознания, депрессия, периферические нейропатии, судороги.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке обоих видов 3 раза в сутки в течение 12 дней, при выраженных нарушениях функции почек (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин) и печени - по 1 таблетке обоих видов 2 раза в сутки (утром и вечером).

Предост.: Не рекомендуется использовать при заболеваниях ЖКТ с длительной диареей и рвотой. С осторожностью назначать пациентам с гиперчувствительностью к бета-лактамам антибиотикам, с аллергическими заболеваниями (диатезом, бронхиальной астмой, сенной лихорадкой), заболеваниями печени.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Хенофалк (Chenofalk®)

Хенодеоксихолеваая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит хенодеоксихолеваой кислоты 250 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Растворение холестериновых желчных камней, подавление синтеза холестерина в печени, снижение содержания холестерина в желчи, желчегонное.

Показ.: Холестериновые желчные камни в желчном пузыре (при невозможности их удаления хирургическим или эндоскопическим методами).

Противопоказ.: Острые инфекционные заболевания желчного пузыря и желчных протоков, энтерит, колит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, почечная недостаточность, беременность.

Поб. действ.: Диарея, транзиторное повышение активности трансаминаз.

Примен. и доз.: Внутрь, по 15 мг/кг в сутки, капсулы следует принимать перед сном, не разжевывая. Курс - от 3 мес до 2-3 лет. Для успешного растворения необходимо, чтобы камни были чисто холестериновые, их размер не должен превышать 15-20 мм, желчный пузырь (заполненный камнями не более чем наполовину) и желчевыводящие пути должны полностью сохранять свою функцию. После успешного растворения камней препарат должен приниматься еще в течение 3 мес.

Произв.: Dr. Falk (Германия)

Хенохол (Henohol)

Хенодеоксихолеваая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит хенодеоксихолеваой кислоты 250 мг; в упаковке 56 шт.

Фарм. действ.: Торможение синтеза холестерина, растворение желчных камней.

Фармакокин.: Препарат почти полностью резорбируется из ЖКТ путем пассивной диффузии из тонкого кишечника и активной резорбции - из терминальной подвздошной кишки. Хенодеоксихолеваая кислота в печени конъюгируется с глицином и таурином, образуя хенодеоксихолилглицин и хенодеоксихолилтаурин, а затем в этом виде и в виде солей натрия или калия выделяется в желчный тракт и далее в просвет кишечника. Небольшая часть выделяется с испражнениями, часть через воротную вену возвращается в печень, где деконъюгируется. Под действием бактериальных энзимов в кишечнике третья часть конъюгированной хенодеоксихолеваой кислоты дигидроксилируется в литохолевуую кислоту. В такой форме она резорбируется и трансформируется в печени, так же, как и хенодеоксихолеваая кислота.

Показ.: Холестериновые ("рентгенопрозрачные") желчные камни диаметром менее 20 мм (при сохраненной функции желчного пузыря).

Противопоказ.: Нехолестериновые желчные камни, холецистит при желчнокаменной болезни, острый и хронический гепатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки; воспалительные заболевания пищеварительного тракта; синдром мальабсорбции, тяжелая почечная или печеночная недостаточность, беременность.

Поб. действ.: Диарея; печеночные колики (при миграции камней); увеличение трансаминаз в крови.

Примен. и доз.: Внутрь, 15-18 мг/кг в сутки в три приема: утром и во второй половине дня по 1 капсуле, вечером - по 2 капсулы, в течение не менее 6 мес (до 1-2 лет). Если после 6 мес не отмечается уменьшения размеров камней - прием прекращают. После успешного лечения для профилактики - по 1 капсуле в день в течение 1 мес или каждый третий месяц - по 1 капсуле в день.

Предост.: При увеличении трансаминаз в крови суточную дозу уменьшают на 1 капсулу (если в течение 4 нед показатели не нормализуются, лечение прекращают). Необходим постоянный контроль

функции печени (печеночные пробы). Во время лечения рекомендуется женщинам контрацепция.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Хепель (Hepel®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Lycopodium D3, Chelidonium D4, China D3, Nux moschata D4 по 30 мг, Carduus marianus D2, Phosphorus D6 по 15 мг, Veratrum D6 60 мг, Colocynthis D6 90 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротективное, спазмолитическое, желчегонное, противовоспалительное.

Показ.: Заболевания печени и желчевыводящих путей, печеночная недостаточность; функциональные расстройства пищеварения, спастические заболевания органов ЖКТ (колит, желчнокаменная болезнь); дисбактериоз кишечника; угри и экзема.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к препаратам хинина.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Произв.: Heel (Германия)

Хеферол (Heferol®)

Железа фумарат

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит железа фумарата 350 мг (100 мг элементарного железа); в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Стимуляция гемопоэза, восполнение дефицита железа в организме.

Показ.: Лечение и профилактика железодефицитных анемий: при кровотечениях, повышенной потребности организма в железе (беременность, лактация, период интенсивного роста и полового созревания), недостаточном поступлении железа с пищей (глистные инвазии), нарушении всасывания железа из ЖКТ (хроническая диарея).

Противопоказ.: Все виды анемий, не связанные с дефицитом железа, гемохроматоз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, диарея, запор.

Взаим.: Не следует назначать одновременно с антибиотиками тетрациклинового ряда (взаимное нарушение всасывания).

Примен. и доз.: Внутрь, натощак за 0,5 ч до завтрака, взрослым и детям старше

12 лет - по 1-2 капсулы. Курс - 6-12 нед. Лечение продолжают и после нормализации картины крови (для восполнения запасов железа в организме).

Произв.: Alkaloid (Македония)

Хивид (Hivid®)

Зальцитабин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит зальцитабина 0,375 или 0,750 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное (в отношении ВИЧ-1 и ВИЧ-2).

Показ.: Поздняя стадия ВИЧ-инфекции (монотерапия при непереносимости или неэффективности зидовудина или в комбинации с зидовудином) у взрослых.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Периферическая нейропатия (онемение и ощущение жжения в конечностях, сильные острые или постоянные боли и др.); язвы в полости рта и пищеводе, тошнота, рвота, дисфагия, боли в животе, диарея (или запоры) и др. нарушения ЖКТ; сыпь, зуд, потливость; головная боль, головокружение и др. расстройства ЦНС; нарушения поджелудочной железы, печени, почек, сердечно-сосудистой и респираторной системы, крови.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 0,75 мг каждые 8 ч (монотерапия или в комбинации с 200 мг зидовудина), суточная доза - 2,25 мг (зидовудина - 600 мг).

Предост.: При появлении побочных эффектов назначение следует отменить или провести коррекцию схемы лечения: снижают дозу, увеличивают интервал между приемами. С крайней осторожностью применяют при периферической нейропатии, панкреатите и застойной сердечной недостаточности в анамнезе, при наличии кардиомиопатии. Во время лечения рекомендуется периодический контроль клинических и биохимических показателей крови.

Произв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Хилак форте (Hylak® forte)

Сост. и ф.в.: Стерильный концентрат продуктов биосинтеза грамположительных и грамотрицательных симбионтов кишечной флоры тонкой и толстой кишок. 1 мл капле соответствует биосинтетическим активным веществам, продуцируемым 100 миллиардами микроорганизмов. Содержит также биосин-

тетическую молочную кислоту, молочно-солевой буфер, лактозу, аминокислоты, короткоцепочечные летучие жирные кислоты; во флаконах по 30 и 100 мл.

Фарм. действ.: Восстановление микрофлоры кишечника, стимуляция синтеза эпителиальных клеток кишечной стенки, нормализация pH и водно-электролитного баланса в просвете кишечника.

Показ.: Нарушения физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами, лучевой терапии); синдром недостаточности пищеварения, диспепсия, диарея, метеоризм, запоры, гастроэнтерит, колит, гипо- и анацидные состояния (в т.ч. при беременности); энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени; аллергические кожные болезни (крапивница, экзема), долечивание реконвалесцентов сальмонеллеза (в т.ч. детей грудного возраста).

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Под влиянием антацидных препаратов возможна нейтрализация молочной кислоты, входящей в состав препарата.

Примен. и доз.: Внутрь, до или во время приема пищи с небольшим количеством жидкости (исключая молоко). В первые дни лечения взрослым назначают по 40-60 капель 3 раза в сутки; детям - по 20-40 капель 3 раза в сутки; детям грудного возраста - по 15-30 капель 3 раза в сутки. После улучшения состояния суточная доза может быть уменьшена наполовину.

Предост.: Не рекомендуется применять с молоком или молочными продуктами.

Произв.: Merckle (Германия)

Хлоракон (Chloraconum)

Бекламид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бекламид 0,25 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное.

Показ.: Эпилепсия, психомоторное возбуждение эпилептического характера.

Поб. действ.: Гастрит, головокружение, слабость.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, начиная с 0,5 г 4 раза в день, при необходимости - до 4-6 г/сутки. Детям - по 0,25-0,5 г 2-4 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Хлорэтил (Aethylchloridum)

Хлорэтил

Сост. и ф.в.: Жидкость для наружного применения; в баллонах по 20 и 30 мл.

Фарм. действ.: Наркозное, местное обезболивающее.

Показ.: Кратковременное поверхностное обезболивание при небольших поверхностных операциях, рожистое воспаление, нейромииозиты, невралгии, бородавчатые формы красного лишая. Для наркоза применяется редко, при очень коротких хирургических вмешательствах.

Противопоказ.: Нарушения целостности кожных покровов, заболевания сосудов.

Поб. действ.: Гиперемия и повреждение кожи с экссудацией.

Примен. и доз.: Наружно, согревают ампулу в руках и направляют струю препарата на поверхность кожи.

Предост.: Не следует вдыхать хлорэтил, испаряющийся с поверхности кожи.

Произв.: Фармак (Украина)

Холагогум (Cholagogum®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит экстракта чистотела спиртового сухого 40 мг, экстракта куркумы спиртового сухого 20 мг, масла мяты перечной 5 мг и масла куркумы 5 мг; в упаковке 30 или 50 шт.

Фарм. действ.: Желчегонное, холеретическое, холекинетическое, гепатопротекторное, активация внешнесекреторной функции поджелудочной железы, растворение холестериновых желчных камней.

Показ.: Хронические заболевания и воспаления желчного пузыря и желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, состояние после оперативного удаления желчного пузыря, недостаточность пищеварительной функции поджелудочной железы, функциональные расстройства желчного пузыря и желчных протоков.

Противопоказ.: Печеночная недостаточность, полная обтурация желчных путей, гнойное воспаление желчного пузыря, печеночная кома.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, запивая небольшим количеством жидкости, 3 раза в день по 2 капсулы в течение 1 нед, в дальнейшем - 3 раза в день по 1 капсуле; в тяжелых случаях -

3 раза в день по 2 капсулы в течение 2 и более недель.

Пронзв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Холагол (Cholagol®)

Сост. и ф.в.: 1 мл (= 35 капель) содержит пигментов корня куркумы 2,25 мг, эмолина крушины 900 мкг, магния салицилата 18 мг и смеси эфирных масел 553,5 мг, а также этанол, масло оливковое; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Желчегонное, спазмолитическое, слабительное.

Фармакодин.: Оказывает холеретическое (увеличивает образование желчи) и холекинетическое (повышает скорость ее выделения) действие. Способствует отхождению мелких конкрементов.

Показ.: Желчнокаменная болезнь, хронический холецистит и холангит (в фазе ремиссии), диспептический синдром при хронических заболеваниях печени и после операции на желчевыводящих путях.

Противопоказ.: Острые воспалительные заболевания гепатобилиарной системы.

Поб. действ.: Тошнота, изжога, рвота.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30 мин до еды на кусочке сахара - по 5-10 капель 3 раза в сутки. При начинающейся желчной колике - до 20 капель однократно. При диспептических явлениях препарат можно применять во время или после еды.

Пронзв.: Norton Healthcare/Galena (Великобритания)

Холафлукс (Cholaflux®)

Сост. и ф.в.: 100 г растворимого чая содержат 37,5 г обезвоженного экстракта следующего состава: листьев шпината 10,5 г, плодов чертополоха 4,5 г, травы лапчатки гусиной 12,5, травы чистотела 40,5 г, травы тысячелистника 12,0 г, корня лакричника 43,5 г, корневища ревеня 15 г, корня и травы одуванчика 12 г, сухого спиртового экстракта корневища куркумы 0,4 г, экстракта алоэ 1,2 г, масла куркумы 0,076 г; порошок по 37,5 или 75 г во флаконах вместимостью 150 и 300 мл соответственно.

Фарм. действ.: Желчегонное, холеретическое, холекинетическое.

Показ.: Хронический холецистит, холангит, нарушения желчеотделения после холецистэктомии, дискинезия желчных путей и желчного пузыря (компонент комплексной терапии).

Противопоказ.: Печеночная недостаточность, закупорка желчных путей, гнойное воспаление желчного пузыря, печеночная кома, кишечная непроходимость.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 чашке чая 3 раза в день утром натощак и перед едой; 1 чайную ложку чая кладут в чашку, заливают горячей водой и размешивают, после чего чай готов к употреблению; чай можно подсластить. Флакон следует немедленно закрыть.

Предост.: При наличии диабета необходимо помнить, что 1 чайная ложка чая соответствует 0,08 ХЕ.

Пронзв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Холензим (Cholenzymum)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 0,6 г препарата из желчи и ферментов поджелудочной железы и кишечника, полученных от здоровых животных; во флаконе 50 шт.

Фарм. действ.: Желчегонное, холеретическое.

Показ.: Хронические болезни печени и желчевыводящих путей, недостаточная пищеварительная функция кишечника при хронических панкреатитах, энтероколитах и гепатитах.

Противопоказ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1-3 раза в день после еды в течение 2-3 нед.

Пронзв.: Микомс (Россия)

Хондроксид (Chondroxidum)

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит хондроитина сульфата 50 мг и диметилсульфоксида 100 мг; в алюминиевых тубах по 30 г.

Фарм. действ.: Ускорение регенерации хрящевой ткани.

Фармакодин.: Ускоряет синтез гликозаминогликанов, ускоряет восстановление хрящевой ткани и пораженных межпозвонковых дисков.

Показ.: Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника (преимущественно узелковые формы), остеохондроз, гематомы, ушибы, растяжения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции (редко).

Примен. и доз.: Наносят на кожу (в очаге поражения) и легко втирают 2-3 мин (до полного впитывания) 2-3 раза в

день в течение 2-3 нед. При необходимости курс повторяют.

Произв.: Нижфарм (Россия); Синтез (Россия)

Хорагон (Choragon®)

Хорионический гонадотропин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит человеческого хорионического гонадотропина из мочи беременных женщин 1500 или 5000 МЕ; в комплекте с растворителем в ампулах по 1 мл в упаковке 3 комплекта.

Фарм. действ.: Лютеинизирующее, стероидогенное, стимуляция сперматогенеза.

Показ.: У женщин - бесплодие, вызванное ановуляцией, в программе "экстракорпорального оплодотворения" (в комплексе с препаратами человеческих менопаузальных гонадотропинов, например, с Меногоном или с фолликулостимулирующим гормоном). У мальчиков и мужчин - гипогонадотропный гипогонадизм, олигоастеноспермия, азооспермия, для оценки функции клеток Лейдинга (как дифференциально-диагностический тест для крипторхизма и анорхизма).

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли половой сферы, угрожающий синдром гиперстимуляции (у женщин) при лечении бесплодия в программе ЭКО.

Поб. действ.: У женщин при комбинированном лечении бесплодия (например, в сочетании с Меногоном или Кломифеном) - синдром гиперстимуляции яичников (развитие кист яичников с опасностью их разрыва, появление жидкости в брюшной и грудной полостях). У мальчиков и мужчин - временное увеличение размеров яичек и простаты, акне.

Примен. и доз.: В/м. Для женщин в качестве овуляторной дозы - одномоментно 5000-10 000 МЕ, для стимуляции функции желтого тела - 1500-5000 МЕ на 3-6-9-й дни после овуляции. У мальчиков при задержке полового развития - по 3000-5000 МЕ 1 раз в неделю в течение не менее 3 мес. При гипогонадотропном гипогонадизме - 1500-6000 МЕ (в комбинации с препаратами человеческих менопаузальных гонадотропинов) 1 раз в неделю. С целью дифференциальной диагностики крипторхизма и гипогонадотропного гипогонадизма - однократно 5000 МЕ.

Произв.: Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды)

Хормоплекс (Hormoplex)

Эстрогены конъюгированные

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит конъюгированных эстрогенов (в основном, эстрона и эквилина сульфата) в виде натриевых солей 1,25 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Климактерический синдром, остеопороз (в климактерическом периоде), эстрогендефицитные состояния (заместительная терапия), злокачественные новообразования простаты и молочной железы.

Противопоказ.: Эстрогензависимые злокачественные новообразования половых органов и молочных желез, тромбоэмболии, печеночная недостаточность, эндометриоз, миома.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, увеличение массы тела, нагрубание молочных желез, маточные кровотечения, нарушения функции печени, желтуха, кожные высыпания, депрессия, головная боль, рак эндометрия и молочных желез.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозу устанавливают индивидуально. При климаксе и остеопорозе - в среднесуточной дозе 1,25 мг прерывистыми курсами в течение 20 или 29 дней соответственно, с перерывом 7 дней; при необходимости (при климаксе) по 2,5-3,75 мг в сутки (не более 7 дней). При дисфункциональных маточных кровотечениях - по 2,5-7,5 мг в сутки в 2-3 приема, 2-5 дней; при необходимости дозу увеличивают на 50% и выше (после прекращения кровотечения терапию продолжают до 20 дней). При аменорее - по 1,25-3,75 мг в сутки, 20 дней. При климаксе с регулярным менструальным циклом, маточных кровотечениях или аменорее рекомендуется комбинация с гестагенным препаратом с 15 по 21 день. При злокачественных новообразованиях - по 3,75-7,5 мг в сутки.

Произв.: ICN Galenika (Югославия)

Хотемин (Hotemin®)

Пироксикам*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит пироксикама 10 или 20 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 1 мл раствора для инъекций - 20 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее.

Показ.: Воспалительные или дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, сопровождающиеся болью, болью Бехтерева, обострение подагры.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагический диатез, беременность, лактация, возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспепсия, ulcerация ЖКТ, нарушения функции печени, отеки, нарушение зрения, синдром Стивенса-Джонсона, шок, анемия, тромбоцитопения, снижение агрегации тромбоцитов, фотосенсибилизация, повышение активности печеночных трансаминаз, аллергические реакции (кожные высыпания).

Взаим.: Вытесняет из связи с белком другие лекарственные препараты. Снижает эффективность гипотензивных средств. Увеличивает риск гиперкалиемии при сочетании с калийсберегающими диуретиками и донорами калия и вероятность ulcerации ЖКТ на фоне кортикостероидов и нестероидных (прочих) противовоспалительных препаратов. Плазменная концентрация снижается ацетилсалициловой кислотой.

Примен. и доз.: В/м. При болевом синдроме - 20-40 мг в сутки в течение 1-3 дней, затем переходят на капсулы; внутрь, при артритах начальная доза - 20-30 мг 1 раз в день с постепенным снижением до минимальной эффективной - 10-20 мг в сутки, при подагре - 40 мг в сутки в течение 4-6 дней.

Произв.: Egis (Венгрия)

Хумалог (Humalog®)

Лизпроинсулин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит 40 или 100 МЕ активности инсулина, во флаконах по 10 мл и картриджах по 1,5 и 3 мл (только 100 МЕ/мл); в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Действует быстро: начало - через 15 мин после введения, максимум - через 0,5-2 ч. Эффект держится 3-4 ч.

Показ.: Сахарный диабет I и II типа.

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Гипогликемия, аллергические реакции, липодистрофия.

Взаим.: Потребность в инсулине повышают пероральные контрацептивы, кортикостероиды, тиреоидные гормоны и снижают пероральные гипогликемические средства, салицилаты, сульфаниламиды и антидепрессанты.

Примен. и доз.: П/к, в/м и в/в, перед едой.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Хуматроп (Humatrop)

Соматропин*

Сост. и ф.в.: Лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах по 4 МЕ, в комплекте с растворителем во флаконах по 2 мл или в картриджах для шприц-ручек для приготовления раствора для инъекций 18; 36 или 72 МЕ/мл.

Фарм. действ.: Стимуляция роста скелета, увеличение числа и размера мышечных клеток, анаболическое, мобилизация жиров, гипергликемическое, задержка натрия, калия, фосфора.

Показ.: Нарушение роста при недостаточности гормона роста, синдром Тернера.

Противопоказ.: Закрытые эпифизы, активный опухолевый процесс, проведение противоопухолевой терапии, признаки роста опухоли, гиперчувствительность к м-крезолу или глицерину, острый период внутричерепной травмы.

Поб. действ.: Незначительное повышение уровня сахара в крови, снижение толерантности к глюкозе, транзиторный отечный синдром, симптомы гипотиреоза.

Взаим.: Глюкокортикоиды ослабляют эффект.

Примен. и доз.: В/м, п/к. Доза и интервалы введения подбираются индивидуально (до 0,48 МЕ/кг в неделю). При дефиците гормона роста - до 0,48 МЕ/кг в неделю, при синдроме Тернера - 0,8-0,9 МЕ/кг, что эквивалентно 24-28 МЕ/м² поверхности тела в неделю. Недельная доза делится на 6-7 инъекций (на ночь). При проведении длительной терапии необходимо контролировать концентрацию в крови глюкозы и тиреоидных гормонов.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Хумулин Л (Humulin L)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: 1 мл инсулин-цинк суспензии для инъекций содержит инсулина человеческого 40 или 100 ЕД; во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 30 мин, достигает максимума через 4-16 ч после введения и продолжается 24 ч.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет, инсулиннезависимый сахарный диабет (в качестве вспомогательной терапии).

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия, инсулинрезистентность.

Взаим.: Гипогликемический эффект усиливают ингибиторы МАО, алкоголь, неселективные бета-адреноблокаторы, сульфаниламиды, снижают - пероральные контрацептивы, глюкокортикостероиды, тиреоидные гормоны, тиазидные диуретики.

Примен. и доз.: Доза определяется индивидуально. Вводится п/к или в/м. П/к введение проводится в предплечье, бедро, ягодицу или в область передней брюшной стенки. Место инъекции следует менять. При монотерапии вводится 1-2 раза в день. При необходимости возможна комбинация с Хумулином Р.

Предост.: При переводе пациентов с инсулинов животного происхождения на человеческие может потребоваться уменьшение дозировки и/или изменение коэффициента соотношения препаратов различной продолжительности действия. Уменьшение дозы может быть проведено сразу или постепенно в течение нескольких недель. Риск развития гипогликемии при переходе с одного вида инсулина на другой незначителен, если суточная доза препарата менее 40 ЕД.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Хумулин М2 20/80 (Humulin M2 /20/80/®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций содержит рекомбинантного инсулина человека 40 и 100 МЕ/мл; во флаконах по 10 мл; или 100 МЕ/мл в картриджах по 1,5 или 3,0 мл для шприц-ручек типа BD-Пен.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 30 мин, достигает максимума через 1,5-9 ч и продолжается 14-16 ч.

Показ.: Сахарный диабет I и II типов.

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Липодистрофия, инсулинрезистентность, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м, п/к; доза определяется индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Хумулин М3 30/70 (Humulin M3 /30/70/®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций содержит рекомбинантного инсулина человека 40 и 100 МЕ/мл; во флаконах по 10 мл; или 100 МЕ/мл в картриджах по 1,5 и 3,0 мл для шприц-ручек типа BD-Пен.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 30 мин, достигает максимума через 1-8,5 ч и продолжается 14-15 ч.

Показ.: Сахарный диабет I и II типов.

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия, инсулинрезистентность.

Примен. и доз.: В/м, п/к; доза определяется индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Хумулин НПХ (Humulin NPH®)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций содержит рекомбинантного инсулина человека 40 или 100 МЕ/мл; во флаконах по 10 мл или в картриджах по 1,5 и 3,0 мл для шприц-ручек типа BD-Пен.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Начало действия - через 30 мин после введения, максимум - между 3 и 10 ч, длительность - 18-20 ч.

Показ.: Сахарный диабет I и II типов.

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия, инсулинрезистентность.

Примен. и доз.: П/к, дозы подбираются индивидуально.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Хумулин Регуляр (Humulin Regular)

Инсулин человеческий*

Сост. и ф.в.: Суспензия для инъекций содержит рекомбинантного инсулина человека 40 или 100 МЕ/мл; во флаконах по 10 мл или в картриджах по 1,5 и 3 мл для шприц-ручки BD-Пен.

Фарм. действ.: Гипогликемическое.

Клин. фарм.: Начало действия - через 30 мин после введения, максимум - между 1 и 3 ч, длительность - 5-7 ч.

Показ.: Инсулинзависимый сахарный диабет, инсулиннезависимый сахарный диабет (в качестве вспомогательной терапии), при оперативных вмешательствах, кетоацидозе или острой инфекции у пациентов с сахарным диабетом.

Противопоказ.: Гипогликемия.

Поб. действ.: Аллергические реакции, липодистрофия, инсулинрезистентность.

Взаим.: Потребность в инсулине повышают пероральные контрацептивы, кортикостероиды, тиреоидные гормоны и снижают пероральные гипогликемические средства, салицилаты, сульфаниламиды и антидепрессанты.

Примен. и доз.: Доза определяется индивидуально. Вводится п/к, в/м или в/в. Хумулин Регуляр можно вводить без других видов инсулина, используя многократные ежедневные инъекции.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Цедекс (Cedex®)

Цефтибутен*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефтибутена 400 мг, в упаковке 5 шт.

Порошок для приготовления оральной суспензии (в 5 мл приготовленной суспензии - 180 мг); во флаконах по 7,5 г, в комплекте с дозирующей ложкой или шприцем.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное; устойчив к действию бета-лактамаз.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей (фарингит, тонзиллит, острый синусит у взрослых), бронхит, пневмония, отит у детей, инфекции мочевого тракта, энтериты и гастроэнтериты, вызванные *Salmonella*, *Shigella* или *E. Coli*, скарлатина.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 6 мес).

Бер. и корм. гр.: В период беременности необходимо учитывать соотношение между предполагаемым эффектом и возможным риском для матери и плода. При кормлении грудью - возможно (в грудное молоко не проникает).

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боли в животе, головная боль, звон в ушах, псевдомембранозный колит.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи, взрослым - в дозе 400 мг ежедневно, при лечении больных пневмонией - по 200 мг 2 раза в сутки. У пациентов, находящихся на гемодиализе (частота сеансов 2-3 раза в неделю), назначают по 400 мг в конце каждого

сеанса гемодиализа. Детям (не старше 10 лет и массой тела менее 45 кг) - по 9 мг/кг в день (максимально - 400 мг в день), внутрь в виде суспензии. Длительность курса - 5-10 дней, при инфекциях, вызванных *S. pyogenes*, препарат применяют не менее 10 дней.

Предост.: Осторожно назначать при известной или предполагаемой аллергии к пенициллинам, наличии в анамнезе сведений об осложненных желудочно-кишечных заболеваниях.

Произв.: Schering-Plough (США)

Цеклор (Ceclo®)

Цефаклор*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефаклора 250 или 500 мг (в форме моногидрата).

5 мл приготовленной суспензии - 125 или 250 мг.

1 пакетик с гранулами для приготовления суспензии для приема внутрь - 125; 250 или 375 мг.

Фарм. действ.: Антимикробное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных (фарингит, тонзиллит, пневмония) и мочевыводящих (пиелонефрит, цистит, гонококковый уретрит) путей, кожи, синуситы, отит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, ранний грудной возраст (до 1 мес).

Поб. действ.: Диспептические явления (понос, тошнота, рвота), гепатит, холестатическая желтуха, возбуждение, нервозность, бессонница, головокружение, увеличение АД, зуд в области половых органов, транзитное повышение активности печеночных трансаминаз, уровня мочевины и креатинина в крови, лейкопения, гемолитическая или гипопластическая анемия, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, псевдомембранозный колит, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, эозинофилия, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, анафилаксия).

Взаим.: Усиливает эффект пероральных антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь - 250 мг каждые 8 ч (при необходимости - 4 г в сутки); при гонорее - 3 г (в сочетании с 1 г пробенецида) однократно. Детям - 20 мг/кг/сутки (в 3 приема), при более тяжелых инфекциях, отите - 40 мг/кг/сутки (максимальная суточная доза 1 г). Средняя продолжительность курса - 10 дней.

Пронзв.: Lilly (Швейцария)

Целаскон Эффервесценс (Celaskon Effervescens®)

Аскорбиновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 шипучая водорастворимая таблетка содержит витамина С (аскорбиновой кислоты) 500 мг; в упаковке 15 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витамина С, регуляция метаболических (окислительно-восстановительных) процессов.

Показ.: Абсолютная и относительная недостаточность витамина С (гипо- и авитаминоз, искусственное вскармливание, период интенсивного роста, беременность, лактация, напряженная работа и др.); ослабленная иммунорезистентность, инфекции верхних дыхательных путей (профилактика), кровотечения из десен, утомляемость и анорексия, связанные с гиповитаминозом С, заболевания печени, анемии, для стимуляции регенерации и др.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, слабость, бессонница, головная боль, астматические приступы, нефролитиаз, экзантема, гипероксалиемия, глюкозурия.

Взаим.: Всасывание и усвоение снижают ацетилсалициловая кислота, оральные контрацептивы, свежие соки. Уменьшает активность гепарина и содержание витамина В12.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым - по 1 таблетке (таблетку растворить в 150 мл воды и выпить) несколько раз в день; детям с 1 года - по 1/2-1 таблетке в сутки.

Пронзв.: Slovakofarma (Словакия)

Целестодерм В (Celestoderm V®)

Бетаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержат бетаметазона валерата в количестве эквивалентном 1 мг бетаметазона; в тубах по 15 и 30 мг.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, сосудосуживающее, противозудное.

Показ.: Экземы (атопическая, детская, монетовидная), дерматиты (контактный, себорейный, солнечный, эксфолиативный, стаза дерматит, радиационный, интертригинозный), нейродермит, псориаз, аногенитальный и старческий зуд.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Применение возможно в случаях, если польза для матери явно превышает потенциальную угрозу для плода или младенца.

Поб. действ.: Угнетение функции коры надпочечников, жжение, зуд, раздражение кожи, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит; при применении окклюзионных повязок - мацерация, атрофия кожи, стрии, потница, вторичная инфекция; у детей - угнетение системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники, синдром Кушинга, линейная задержка роста, отставание в прибавке массы тела, повышение внутричерепного давления.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день в зависимости от тяжести заболевания. При выраженной инфильтрации целесообразно применение окклюзионных повязок на ограниченные участки кожи.

Предост.: При наличии вторичной микробной инфекции кожи необходимо провести соответствующую антимикробную или противогрибковую терапию. Не следует применять препарат в больших дозах и в течение длительного времени.

Пронзв.: Schering-Plough (США)

Целестодерм В с гарицином (Celestoderm-V with garamycin®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержат бетаметазона валерата в количестве, эквивалентном 1 мг бетаметазона и гентамицина сульфата в количестве, эквивалентном 1 мг гентамицина основания; в тубах по 15 и 30 г.

Фарм. действ.: Местное противовоспалительное, сосудосуживающее, противозудное, антибактериальное.

Показ.: Инфицированные воспалительные и аллергические дерматозы: экземы (атопическая, детская, монетовидная), псориаз, дерматиты (контактный, себорейный, интертригинозный, солнечный, эксфолиативный, стаза дерматит), нейродермит, аногенитальный и старческий зуд.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Применение возможно только в случае, если польза для матери

явно превышает потенциальную угрозу для плода или младенца.

Поб. действ.: Жжение, зуд, раздражение и сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит; при использовании окклюзионных повязок - мацерация, атрофия кожи, стрии, потница, вторичная инфекция. У детей: угнетение системы гипофиз-гипоталамус надпочечники, синдром Кушинга, линейная задержка роста, отставание в прибавке массы тела, повышение внутричерепного давления.

Примен. и доз.: Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером); в легких случаях - 1 раз в сутки. В случаях, трудно поддающихся лечению, возможно более частое применение препарата.

Предост.: Не рекомендуется применять в больших дозах и в течение длительного времени. При раздражении или повышенной чувствительности кожи лечение следует прекратить. Не применять в офтальмологической практике.

Произв.: Schering-Plough (США)

Целестон (Celestone®)

Бетаметазон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит бетаметазона 0,5 мг; в упаковке 30 шт.

1 мл раствора для инъекций - 5,3 мг натриевой соли бетаметазона фосфата (эквивалентно 4 мг бетаметазона); в ампулах по 1 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противоревматическое, противоаллергическое.

Показ.: Внутрь и парентерально: диссеминированная красная волчанка, острый ревмокардит, склеродермия, дерматомиозит, пузырьчатка, герпетический буллезный дерматит, полиморфная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), крапивница, эксфолиативный дерматит, псориаз, грибковый микоз, аллергические экземы, бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергические реакции на лекарства, сывороточная болезнь, адреналовая недостаточность, врожденная гиперплазия надпочечников, тиреоидит, опухоль надпочечников, гиперкальциемия, псориатический, подагрический и ревматоидный артриты, анкилозирующий спондилит, бурсит, синовит, тендосиновит, острая ревматическая лихорадка, аллергический конъюнктивит, кератит, аллергические язвы роговицы, Herpes Zoster, ирит, иридоциклит, хореорити-

нит, неврит зрительного нерва и ретробульбарные невриты, эмфизема и фиброз легких, симптоматический саркоидоз, бериллиоз, синдром Леффлера, тромбоцитопения, аутоиммунная гемолитическая анемия, эритробластопения, эритроидная гипопластическая анемия, трансфузионные реакции, паллиативное лечение лейкемии и лимфом у взрослых и острой лейкемии у детей; туберкулезный менингит, неспецифический язвенный колит, паралич Белла. В/в или в/м: шок, отек мозга, столбняк, профилактика отторжения почечного аллотрансплантата, дородовая профилактика респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, системные грибковые инфекции, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (для в/м введения).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при приэклампсии и эклампсии, при повреждении плаценты.

Поб. действ.: Нарушение водно-электролитного баланса, мышечно-скелетные, желудочно-кишечные, дерматологические, неврологические, эндокринные, офтальмологические, метаболические и психические нарушения; слепота (при инъекциях в очаги поражения на лице и голове), гипо- или гиперпигментация, атрофия кожи и подкожной клетчатки, стерильные абсцессы, постинъекционные обострения (после внутрисуставного введения), артропатия (типа сустава Шарко).

Взаим.: Эффект усиливается эстрогенами, ослабляется - фенобарбиталом, рифампицином, фенитоином, эфедрином. Углубляет гипокалиемию, вызываемую диуретиками, сердечными гликозидами, амфотерицином.

Примен. и доз.: Дозировка зависит от заболевания, его тяжести и ответа больного на проводимое лечение. Таблетки: начальная доза у взрослых - от 0,25 до 8 мг ежедневно; у детей - 0,017 - 0,25 мг/кг. При отеке мозга - 0,5-1 мл (коматозным больным - 2-4 мг 4 раза в день); реакция отторжения почечного аллотрансплантата - в/в капельно 60 мг в первые 24 ч. При мышечно-скелетных нарушениях доза зависит от размера сустава или места введения (от 0,4 до 6,0 мг). Субконъюнктивально - 0,5 мл/2 мг.

Предост.: При быстрой отмене возможна вторичная адреналовая недостаточность. Во время лечения нельзя проводить вакцинацию от оспы и другие процедуры иммунизации. Следует избе-

гать введения препарата в сухожилия и ранее инфицированный сустав.

Произв.: Schering-Plough (США)

Цель Т (Zeel® Т)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит Cartilago suis D6, Funiculus umbilicalis suis D6, Embryo suis D6, Placenta suis (свободный от гормонов) по 2 мг, Rhus toxicodendron D2 10 мг, Arnica D4 200 мг, Dulcamara D3, Symphytum D6 по 10 мг, Sanguinaria D4 3 мг, Sulfur D6 3,6 мг, Nadid D8, Coenzym A D8, A-Liponsaure D8, Natrium oxalaceticum D8 по 2 мг; в упаковке 5, 100 шт.

1 таблетка содержит экстракт Cartilago suis, экстракт Funiculus umbilicalis suis, экстракт Embryo suis, экстракт Placenta suis (свободной от гормонов) по 0,3 мкг, Rhus toxicodendron 0,108 мг, экстракт жидкий из цветов Arnica 0,06 мг, Dulcamara 0,003 мг, Symphytum 0,03 мг, Sanguinaria 0,0045 мг, Sulfur 0,0054 мг, Acidum silicicum colloidalе 0,003 мкг, Nadid, Coenzym A, A-Liponsaure, Natrium oxalaceticum по 0,00003 мкг; в упаковке 50 шт.

100 г мази содержат экстракт Cartilago suis, экстракт Funiculus umbilicalis suis, экстракт Embryo suis (свободной от гормонов), экстракт Placenta suis по 0,001 г, Toxicodendron quercifolium e summitatibus 0,27 г, Arnica montana D2 0,3 г, Solanum dulcamara D2 0,075 г, Symphytum D8 0,75 г, Sanguinaria canadensis 0,225 г, Sulfur D6 0,27 г, Nadid D6 0,01 г, Coenzym A D6 0,01 г, A-Liponsaure D6 0,01 г, Natrium oxalaceticum D6 0,01 г, Acidum silicicum D6 1,0 г; в тубах по 50 г.

Фарм. действ.: Хондропротекторное, хондростимулирующее, ускорение регенерации.

Фармакодин.: Оказывает анальгезирующее (Rhus toxicodendron) и противовоспалительное (Dulcamara) действие, нормализует обмен веществ в хряще, синовиальной мембране и жидкости (Nadid, Coenzym A, A-Liponsaure, Natrium oxalaceticum), способствует восстановлению пораженных костей и надкостницы (Symphytum), укрепляет связки и соединительную ткань (Acidum silicicum colloidalе).

Показ.: Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, связочных структур (гонартрозы, полиартрозы, спондилоартрозы, остеохондрозы, плечелопаточные периартриты, хондропатии, тендопатии и др.); метаболические остеопатии; последствия травм и перело-

мов позвоночника, "синдром поясничного и шейного отдела позвоночника" (люмбо-сакральные расстройства, шейная мигрень и др.); ревматические заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный полиартрит, синдром Рейтера и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Артралгия, кожные аллергические реакции.

Взаим.: Терапевтический эффект усиливается Траумель С, а также одновременным использованием всех трех лекарственных форм препарата.

Примен. и доз.: Раствор для инъекций - п/к, в/м, в/к, в/в, внутрисуставно или периартикулярно, (при необходимости) паравертебрально (методом "волдыря") - по 1 ампуле 2 раза в неделю, в случае заболевания больших суставов - по 2 ампулы за одну инъекцию. Внутрь (предварительно рассосав) - по 1 таблетке 3-5 раз в сутки. Местно, осторожно втирают мазь в болезненное место 2-5 раз в сутки, при необходимости накладывают мазевую марлевую повязку.

Произв.: Heel (Германия)

Церебролизин (Cerebrolysin®)

Сост. и ф.в.: 1 мл водного раствора для инъекций содержит 215,2 мг концентрата церебролизина (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи), в ампулах по 1 мл; в упаковке 10 шт. и в ампулах по 5 и 10 мл; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное, улучшение настроения, памяти, способности к приобретению и сохранению навыков, стимуляция дифференциации нейронов, активация аэробного метаболизма и синтеза белка в мозге.

Показ.: Хроническая цереброваскулярная недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия), ишемический инсульт, травматические повреждения мозга (сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, состояние после хирургического вмешательства на мозге), задержка умственного развития у детей, расстройства, связанные с дефицитом внимания у детей, синдромы деменции различного генеза (пресенильная - болезнь Альцгеймера, сенильная альцгеймеровского типа, сосудистая - мультиинфарктная форма, смешанные формы), эндогенная депрессия, резистентная к антидепрессантам.

Противопоказ.: Острая почечная недостаточность, эпилептический статус.

Бер. и корм. гр.: С осторожностью (особенно в первом триместре беременности).

Поб. действ.: Гиперчувствительность, гипертермия (на фоне быстрой в/в инфузии).

Взаим.: Усиливает эффект антидепрессантов.

Примен. и доз.: Ежедневно в/м или в/в капельно. При острых состояниях (ишемический инсульт, черепно-мозговая травма, осложнения после нейрохирургических операций) - в/в в течение 60-90 мин 10-60 мл в 100-250 мл физиологического раствора; продолжительность курса - 10-25 дней. В резидуальном периоде инсульта и травматического повреждения мозга в/в - по 5-10 мл в течение 20-30 дней. При психоорганическом синдроме - в/в по 5-10 мл в течение 20-25 дней (деменция) или 10-15 дней (депрессия). В нейрорепедиатрической практике - по 1-2 мл (до 1 мл на 10 кг) в/м в течение месяца с повторением курса 2-3 раза в год.

Предост.: С осторожностью назначают при аллергических диатезах, эпилепсии.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Церебрум композитум (Cerebrum compositum)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл раствора для инъекций содержит Cerebrum suis D8, Embryo suis D10, Hepar suis D10, Placenta suis D10, Kalium phosphoricum D6, Selenium D10, Thuja D6, Ignatia D8, Bothrops lanceolatus D10, Acidum phosphoricum D10, China D4, Manganum phosphoricum D8, Magnesium phosphoricum D10, Anacardium D6, Conium D4, Luesinum D13, Medorrhinum D13, Hyoscyamus D6, Aconitum D6, Coccus D4, Ambra D10, Sulfur D10, Kalium bichromicum D8, Gelsemium D4, Ruta D4, Arnica D28, Aesculus D4 по 22 мкл; в упаковке 5, 100 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, сосудорасширяющее, антиспазматическое, противовоспалительное, гемостатическое, нормализация метаболизма.

Показ.: Нарушение функций головного мозга функционального и органического характера (отставание умственного и физического развития у детей, депрессии, неврозы, церебральный атеросклероз, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона); возрастные расстройства памяти; состояния после сотрясений головного мозга, энцефалита.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/к (при необходимости в/в) - по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Произв.: Heel (Германия)

Церубидин (Cerubidine®)

Даунорубицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит даунорубицина гидрохлорида 20 мг; в комплекте 1 флакон и 1 ампула (4 мл) с водой для инъекций.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое (ингибирование синтеза ДНК - взаимодействие с молекулой ДНК с встраиванием между соседними основаниями, что вызывает изменение молекулярной структуры и функции ДНК).

Фармакокин.: $T_{1/2}$ после в/в введения - 46-54 ч. Метаболизируется в печени, с мочой выводится за 24 ч около 10% введенного препарата, за 5 дней - около 25%. Выведение препарата с желчью составляет около 40%.

Показ.: Острый лейкоз, хронический миелолейкоз, лимфогранулематоз, лимфосаркома, солидные опухоли.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендовано.

Поб. действ.: Угнетение костномозгового кроветворения, панцитопения, аритмия, сердечная недостаточность, тошнота, рвота, диарея, язвенный стоматит (редко), алоpecia, аменорея, азооспермия, гиперурикемия (следствие цитолиза). Возможно окрашивание мочи в красный цвет (в первые несколько дней). Некроз окружающих тканей (при экстравазации).

Взаим.: Совместим с винкристином, преднизолоном, L-аспарагиной.

Примен. и доз.: Строго в/в. В зависимости от показаний доза может варьировать от 40 до 60 мг/кв.м поверхности тела в сутки. Введение проводят в течение 3-5 дней каждые 3-4 нед. Курсовая доза не должна превышать 600 мг/кв.м.

Предост.: Необходимо тщательно контролировать состояние периферической крови в процессе лечения. Для своевременного выявления побочных действий со стороны сердечно-сосудистой системы целесообразен ЭКГ и ЭхоКГ-контроль. При наличии у больного почечно-печеночной недостаточности требуется снижение дозы. Использовать только свежеприготовленный раствор.

Произв.: Rhône-Poulenc Roger (Франция-США)

Церутил (Cerutil®)

Меклофеноксат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит меклофеноксата гидрохлорида 250 мг; в упаковке 60 шт.

Фарм. действ.: Ноотропное.

Фармакодин.: Оказывает стимулирующее действие на ЦНС и активирует обменные процессы.

Показ.: Психоорганический синдром, цереброваскулярная недостаточность, состояния повышенной утомляемости вследствие прогрессирования деструктивных изменений в мозге.

Противопоказ.: Выраженные состояния беспокойства и возбуждения.

Поб. действ.: Нарушения сна, боли в области желудка, изжога, повышение аппетита, усиление беспокойства, аллергические кожные реакции.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозы подбираются индивидуально, в среднем - по 0,25 г 2-3 раза в день. Последнюю дозу рекомендуется применять не позднее 16 ч.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Цетрин (Cetrine)

Цетиризин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит цетиризина дигидрохлорида 10 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противоаллергическое, блокада H₁-рецепторов.

Показ.: Аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, ангионевротический отек.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сонливость, головная боль, головокружение, расстройства ЖКТ.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день.

Предост.: Не следует назначать детям до 2-х лет и беременным женщинам (безопасность применения не изучена).

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Цефазолин (Cefazolin)

Цефазолин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефазолина натрия 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных (бронхит, пневмония) и желчных путей, мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит), кожи и мягких тканей, костей и суставов, септицемия, эндокардит, периоперационные инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, судороги и другие проявления нейротоксичности, гипопротромбинемия, суперинфекции (кандидоз, псевдомембранозный колит), аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/м и в/в, по 500-1000 мг (детям - по 20-50 мг/кг) каждые 4-12 ч.

Произв.: Biochemie (Австрия)

Цефаклен (Cefaclen®)

Цефалексин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, или 1 таблетка, покрытая оболочкой, для детей (цефаклен про инфантибус) содержит цефалексина моногидрата в дозе, соответствующей 500 или 250 мг безводного цефалексина; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное бактерицидное.

Фармакокин.: При приеме натощак всасывается до 90%. Максимальная сывороточная концентрация достигается через 1,5 ч и к концу 4 ч снижается. Период полуэлиминации в плазме составляет около 45 мин. Связывается с белками плазмы (5-15%), объем распределения составляет 16 л/1,73 куб.м. Распределяется относительно равномерно, не проникает через гематоэнцефалический барьер. Выводится в неизменном виде (2/3 путем гломерулярной фильтрации, 1/3 путем тубулярной секреции). За 6 ч выделяется 80-90%, за 24 ч - 85-95%.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, отиты и др.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, утомляемость, суперинфекция, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим с фуросемидом и алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1/2-1 ч до еды; при заболеваниях желудка - во время еды, запивая водой. Взрослым - 2-4 г в сутки в 4 приема (каждые 6 ч). Детям - по 25-50 мг/кг в сутки; при тяжелых инфекциях дозу можно увели-

чить до 100 мг/кг в сутки (в 4-5 приемов). Курс лечения - 7-10 дней.

Предост.: Относительно противопоказан при аллергии к пенициллинам. Во время лечения может возникнуть ложноположительная реакция на сахар в моче или ложноположительная реакция Кумбса. С осторожностью комбинировать с аминогликозидами.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Цефалексин (Cefalexin)

Цефалексин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит цефалексина 250 или 500 мг; в упаковке 16 и 100 шт.

5 мл сиропа для детей - 250 мг; во флаконах по 60 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра.

Показ.: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей; средний отит; остеомиелит; эндо-метрит; гонорея, цистит, дерматит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Показано лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает возможное негативное влияние на плод. При назначении в период лактации кормление грудью следует приостановить.

Поб. действ.: Сухость во рту, потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, холестатическая желтуха, гепатит, кандидоз, головная боль, головокружение, сонливость, изменение картины периферической крови (лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения); транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, галлюцинации, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, дерматит, эозинофилия, отек Квинке, артралгии).

Взаим.: Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, за 30-60 мин до еды, запивая водой; средняя доза - 250-500 мг каждые 6 ч. При необходимости суточная доза может составлять 4-6 г. Курс лечения - 7-14 дней. Детям желательно назначать в форме суспензии. При массе тела менее 40 кг средняя суточная доза составляет 25-50 мг/кг, кратность введения - 4 раза в сутки. При тяжелых инфекциях суточная доза может быть увеличена до 100 мг/кг, кратность введения - до 6 раз в сутки. При инфекциях, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, минимальная продолжительность лечения - 10 дней.

Произв.: Nemoform (Югославия)

Цефобид (Cefobid®)

Цефоперазон*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефоперазона 0,5, 1 и 2 г; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Клин. фарм.: Лечение может привести к снижению свертываемости крови (следует назначать витамин К).

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, костей, суставов, половых путей (эндометрит, гонорея); интра-абдоминальные инфекции (перитонит, холецистит, холангит), воспалительные заболевания тазовых органов, септицемия, менингит; профилактика инфекционных послеоперационных осложнений.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к цефалоспорином.

Бер. и корм. гр.: По жизненным показаниям, с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Поб. действ.: Нейтропения, повышение уровня АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы; диарея; болевые ощущения в месте введения (при в/м введении); флебит (при в/в введении).

Взаим.: Не влияет на фармакодинамику других антибиотиков (может применяться в сочетании с ними).

Примен. и доз.: В/м, в/в. Взрослым - от 2 до 4 г/сутки; младенцам и детям - от 50 до 200 мг на 1 кг массы тела, доза вводится в 2 приема (каждые 12 ч).

Предост.: Во время лечения необходимо воздерживаться от приема алкогольных напитков. При длительном применении возможен усиленный рост устойчивых микроорганизмов.

Произв.: Pfizer (США)

Цефотаксим (Cefotaxime®)

Цефотаксим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефотаксима в виде натриевой соли 1 или 2 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции верхних дыхательных путей и легких, урогенитальные, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, костей и суставов, септицемия, эндокардит, менингит, внутрибрюшинные абсцессы, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, желудочно-кишечные расстройства, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, в/м, по 1-2 г 2 раза в день (максимальная суточная доза - 12 г); новорожденным и детям - по 0,05-0,1 г/кг в сутки.

Произв.: Lek (Словения)

Цефотаксим (Cefotaxim)

Цефотаксим*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цефотаксима (в форме натриевой соли) 0,5; 1 или 2 г.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных, мочеполовых путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей, костей и суставов, септицемия, эндокардит, внутрибрюшинные абсцессы, менингит, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Головная боль, желудочно-кишечные расстройства, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в, в/м, по 1 г 2 и более раз в день (максимальная суточная доза - 12 г); новорожденным и детям - по 0,05-0,1 г/кг/сутки за несколько введений.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Цианокобаламин (Cyanocobalaminum)

Цианокобаламин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл инъекционного раствора содержит цианокобаламина (витамина В₁₂) 0,03; 0,1; 0,2 или 0,5 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Нормализация кроветворения (участие в переносе метильных фрагментов, образовании холина, метионина, креатина, нуклеиновых кислот и др.).

Показ.: Анемии (Аддисона-Бирмера, алиментарная макроцитарная, железodefицитная, постгеморрагическая, апластическая, вызванная токсическими веществами и лекарственными препаратами), заболевания печени, миелоз, полиневриты, радикулиты, невралгии тройничного нерва, боковой амиотрофический склероз, детский церебральный паралич, болезнь Дауна, кожные заболевания, травмы периферических нервов.

Противопоказ.: Тромбоэмболия, стенокардия.

Поб. действ.: Возбуждение, боли в области сердца, тахикардия, аллергические реакции.

Взаим.: Несовместим (в одном шприце) с тиамином бромидом, рибофлавином.

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/в и интралюмбально; при анемии Аддисона-Бирмера - по 100-200 мкг через день; при анемии Аддисона-Бирмера с явлениями фуникулярного миелоза и при макроцитарных анемиях с нарушениями нервной системы - по 400-500 мкг и более на инъекцию (в первую неделю ежедневно, а затем с интервалами между введениями до 5-7 дней). Одновременно назначают фолиевую кислоту. В период ремиссии при отсутствии явлений фуникулярного миелоза вводят для поддерживающей терапии по 100 мкг 2 раза в месяц, а при наличии неврологических явлений - по 200-400 мкг 2-4 раза в месяц. При железодефицитных и постгеморрагических анемиях - по 30-100 мкг 2-3 раза в неделю; при апластических анемиях (особенно у детей) - по 100 мкг до наступления клинико-гематологического улучшения; при алиментарной анемии у детей в раннем возрасте и у недоношенных - по 30 мкг в день в течение 15 дней; при болезнях ЦНС и неврологических заболеваниях с болевым синдромом вводят в возрастающих дозах - от 200 до 500 мкг на инъекцию, а при улучшении состояния - по 100 мкг в день; курс - до 2 нед; при травматических поражениях периферических нервов - по 200-400 мкг через день в течение 40-45 дней; при гепатитах и циррозах печени - по 30-60 мкг в день или по 100 мкг через день в течение 25-40 дней; при дистрофиях у детей раннего возраста, болезни Дауна и детском церебральном параличе - по 15-30 мкг через день; при фуникулярном миелозе, боковом амиотрофическом склерозе, рассеянном склерозе вводят иногда в спинномозговой канал - по 15-30 мкг (увеличивая постепенно дозу до 200-250 мкг).

Предост.: При стенокардии применять с осторожностью и в меньших дозах.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); ICN Полифарм (Россия)

Цигнодерм (Cignoderm)

Дитранол*

Сост. и ф.в.: 1 г мази содержит дитранола 0,1%, а также салициловой кислоты 0,5%; в тубах по 40 г.

Фарм. действ.: Антипсориатическое, кератолитическое.

Фармакодин.: Снижая скорость синтеза протеинов, замедляет процессы митоза и пролиферации эпидермальных клеток.

Показ.: Псориаз.

Противопоказ.: Обострения псориаза с эритродермией, экссудативный псориаз, почечно-каменная болезнь, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Покраснение кожи по контуру псориатически измененных ее участков вследствие легкого раздражения.

Примен. и доз.: Наружно. Наносят на ночь на пораженные участки кожи. Утром кожу в месте аппликации промывают теплой водой с большим количеством мыла.

Предост.: При нанесении мази целесообразно использовать одноразовые перчатки. Следует беречь лицо и слизистые оболочки, не втирать мазь в морщины и углубления кожи. При смывании мази с области головы нельзя допускать попадания в глаза. Значимое покраснение кожи по контуру псориатических участков является поводом для отмены препарата.

Произв.: Акрихин (Россия)

Цикло 3 крем (Cyclo 3 creme)

Сост. и ф.в.: 100 г крема содержат экстракта иглицы 1,6 г и экстракта донника 2 г; в тубах по 40 и 100 г.

Фарм. действ.: Альфа-адреностимулирующее (вено- и лимфовазотонизирующее), снижение проницаемости и увеличение резистентности капилляров, вазопротективное.

Фармакокин.: Эффект проявляется в течение первых 30 мин и сохраняется более 4 ч.

Показ.: Симптоматическое лечение нарушений, связанных с венозной и лимфатической недостаточностью: тяжесть в ногах, парестезии, судороги, отеки.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Местные высыпания типа крапивницы (редко).

Примен. и доз.: Наружно, наносят крем путем легкого восходящего массажа в течение 2-3 мин 2 раза в сутки.

Предост.: Крем не следует наносить на поврежденную кожу.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Цикло 3 форт (Cyclo 3 Fort®)

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит экстракта иглицы (с титрованным 22% содержанием стероловых гликозидов) 150 мг, гесперидина 150 мг и аскорбиновой кислоты 100 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Повышение тонуса вен и лимфатических сосудов (альфа-адреностимулирующее), снижение проницаемости и увеличение резистентности капилляров, вазопротективное.

Показ.: Хроническая венозная недостаточность: варикозное расширение вен, геморрой, маточные кровотечения при контрацепции (оральной или внутриматочной), лимфостазы, функциональные симптомы при беременности, менструации и менопаузе (тяжесть в ногах, отеки, боль в тазу, болезненность и напряжение молочных желез).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспептические расстройства.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2-3 капсулы (при геморрое - 4-5 капсул) в день с небольшим количеством воды.

Предост.: В случае тошноты или боли в желудке рекомендуется принимать препарат в начале еды.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Цикло-Прогинова (Cyclo-Progynova®)

Сост. и ф.в.: 11 драже белого цвета, содержащих эстрадиола валерата 2 мг, и 10 драже светло-коричневого цвета, содержащих эстрадиола валерата 2 мг и норгестрела 500 мкг; в упаковке с календарной шкалой 21 шт.

Фарм. действ.: Эстроген-гестагенное.

Показ.: Профилактика и лечение эстрогенной недостаточности (постменопаузный период, овариоэктомия по поводу незлокачественных образований, лучевая кастрация); аменорея (первичная и вторичная), нерегулярные месячные кровотечения, профилактика остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы в постменопаузе.

Противопоказ.: Тяжелые нарушения функции печени, синдромы Дубина-Джонсона и Ротора, опухоли печени и тромбоэмболические процессы (в т.ч. в анамнезе), тяжелый диабет с сосудистыми осложнениями, серповидноклеточная анемия, рак молочной железы или эндо-

метрия, нарушения жирового обмена, герпес (в анамнезе), идиопатическая желтуха, зуд или ухудшение отосклероза во время имевшей место беременности.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: Головные боли, тошнота, нарушения функции желудка, нагрубание молочных желез, изменение массы тела, маточные кровотечения, появление коричневых пятен на лице.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже ежедневно в течение 21 дня, затем - перерыв 7 дней.

Произв.: Schering (Германия)

Цикловакс (Cyclovax)

Ацикловир*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацикловира 200 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Противовирусное, противогерпетическое.

Показ.: Острые герпетические заболевания кожи и слизистых оболочек (вызванные простым герпесом), включая первичный и рецидивирующий герпес половых органов; лечение (предупреждение обострений) и профилактика герпетических инфекций любой локализации у больных с иммунодефицитом; лечение заболеваний, вызванных вирусом герпес Зостер.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства, головная боль, неврологические нарушения, одышка, повышение билирубина, активности печеночных ферментов, мочевины, креатинина, снижение гематологических показателей, кожная сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь. При герпетических заболеваниях (вызванных простым герпесом) взрослым и детям старше 2 лет - по 200 мг 5 раз в день в течение 5 дней (400 мг - при иммунодефиците); детям младше 2 лет - половину дозы взрослых. Для вторичной профилактики обострений герпетических инфекций при иммунодефиците - по 200 мг 4 раза в день или 400 мг 2 раза в день с возможным уменьшением до 200 мг 2-3 раза в день; длительность курса - 6-12 мес. Для профилактики герпетических инфекций при иммунодефиците взрослым и детям старше 2 лет - по 200 мг 4 раза в день; детям младше 2 лет - в половинной дозе взрослых. При заболеваниях, вызванных герпесом Зостер, взрослым - по 800 мг 5 раз в день в

течение 7 дней. Больным с хронической почечной недостаточностью (при Cl креатинина свыше 10 мл/мин) - до 200 мг 2 раза в день; у престарелых дозу снижают.

Предост.: С осторожностью следует назначать при почечной недостаточности, лактации (необходимо приостановить грудное вскармливание), не рекомендуется при беременности. На фоне лечения необходимо обеспечивать достаточную гидратацию.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Циклодол (Cyclodolum)

Тригексифенидил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тригексифенидила гидрохлорида 2 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, блокада центральных и периферических м-холинорецепторов.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм, экстрапирамидные нарушения (спастический паралич, ригидность мышц, гиперкинез, болезнь Литтля).

Противопоказ.: Глаукома, мерцательная тахикардия, артериальная гипертензия, печеночно-почечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность.

Поб. действ.: Гипосаливация, головокружение, возбуждение, тахикардия, парез аккомодации.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, начиная с 0,5-1 мг/сутки; в последующие дни прибавляют по 1-2 мг в день до суточной дозы 5-10 мг (в 1-3 приема).

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Циклодол® (Cyclodol)

Тригексифенидил*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит тригексифенидила 0,002 г; в блистерной упаковке по 50 шт.

Фарм. действ.: Противопаркинсоническое, н-холинолитическое (центральное), м-холинолитическое (периферическое).

Показ.: Паркинсонизм, медикаментозные экстрапирамидные нарушения.

Противопоказ.: Задержка мочеиспускания, глаукома (особенно закрытоугольная), обструкция ЖКТ, фибрилляция предсердий, беременность.

Поб. действ.: Сухость во рту, сонливость, головокружение, нервозность, нарушение зрения, задержка мочеиспускания, тахикардия.

Взаим.: Трициклические антидепрессанты, производные фенотиазина, др. холинолитики увеличивает вероятность развития побочных эффектов. Ослабляет эффект сублингвально применяемых нитратов (вследствие сухости во рту).

Примен. и доз.: Внутрь, дозировка индивидуальная. Начальная доза - 0,001-0,002 г/сутки; в дальнейшем дозу увеличивают по 0,002 г/сутки. Обычная поддерживающая суточная доза - 0,006-0,01 г (для пожилых - меньше), в тяжелых случаях - 0,012-0,015 г/сутки, в 3-4 приема. Высшие дозы для взрослых: разовая - 0,01 г, суточная - 0,02 г.

Предост.: С осторожностью применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Отменять лечение необходимо постепенно. Возможно развитие пристрастия (особенно у пациентов с психическими заболеваниями). Опасно применять при работе на транспортных средствах и с движущимися механизмами.

Произв.: Таллинский фармацевтический завод (Эстония)

Циклотал (Cyclotal)

Медроксипрогестерон*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит медроксипрогестерона ацетата 100 мг, в упаковке 100 шт. или 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, прогестагенное.

Фармакодин.: Обладает антиэстрогенной, антиандрогенной и антигонадотропной активностью.

Показ.: Рак эндометрия, почек, гормонозависимый рак молочной железы, эндометрическая карцинома (дополнительная и паллиативная терапия рецидивов и метастазов).

Противопоказ.: Беременность, лактация.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, повышение АД, отеки.

Передоз.: Симптоматичное лечение.

Примен. и доз.: Внутрь. При раке эндометрия или почек - 200-600 мг в день, при раке молочной железы - 400-1200 мг в день. Эффект наблюдается через 8-10 нед.

Произв.: CSC (Италия)

Циклоферон® (Cycloferonum)

Циклоферон

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит циклоферона 250 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, противовирусное, противовоспалительное.

Фармакокин.: Быстро проникает в кровь и клетки. Незначительно связывается с белками и широко распространяется по органам, тканям и биологическим жидкостям организма (в т.ч. ликвор проходит через гематоэнцефалический барьер, вызывая образование интерферонов в тканях мозга). Легко выводится из организма и не кумулируется при длительном применении. 99% введенного препарата экскретируется почками (в неизмененном виде) в течение 24 ч.

Фармакодин.: Нормализует иммунный статус организма, стимулируя выработку интерферона как в случаях иммунодефицита, так и при др. аутоиммунных заболеваниях. Отличается низкой токсичностью и отсутствием мутагенных, тератогенных, эмбриотоксических и канцерогенных эффектов.

Показ.: ВИЧ-инфекции, онкологические заболевания, нейровирусные инфекции (серозный менингит клещевой природы, рассеянный склероз, арахноидит и пр.), острый и хронический вирусный гепатит (А, В, С, D), цитомегаловирусные инфекции, герпес любой локализации, иммунодефицитные состояния различной этиологии (послеоперационный период, ожоги, хронические бактериальные и грибковые инфекции, бронхит, пневмония), урогенитальные инфекции и хламидиозы; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; ревматоидный артрит; дегенеративно-дистрофические заболевания суставов (деформирующий остеоартроз и др.); кожные болезни (нейродерматит, экзема, дерматозы).

Противопоказ.: Беременность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взаим.: Совместим со всеми лекарственными средствами (антибиотики, витамины, химиопрепараты, иммуномодуляторы, интерфероны и др.).

Примен. и доз.: В/м или в/в, в разовой дозе 0,25 г один раз в сутки в течение 2-х дней, затем - через день. Базовые курсы составляют: ВИЧ-инфекции (СПИД, стадия IIА-IIIВ) - в/в 7 инъекций по 4 мл, повторные курсы через

каждые 3 и 6 мес; гепатиты - 4 курса по 5 инъекций, средняя продолжительность курса - 40 дней; простой герпес и герпес Зостер - курс из 10 инъекций проводят по схеме: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-й день, повторный курс для закрепления эффекта через 10-12 дней - 5-7 инъекций, при хронических формах рекомендуется сочетание с другими противовирусными препаратами и лечебной вакциной; нейровирусные инфекции: острые формы - курс 5 инъекций, хронические формы - 10-15 инъекций, повторный курс - через 2 мес; хламидиозы урогенитальные - базовый курс 10 инъекций в сочетании с антибиотиками, обязательное применение 2-3 базовых курсов со сменой антибиотика; ревматические заболевания: ревматоидный артрит - базовый курс 90 дней (4 курса по 5 инъекций) в сочетании с цитостатиками и кортикостероидами, повторные курсы - через 3 и 6 мес, реактивный артрит - курс 21 день (2 курса по 4 инъекции) в сочетании с антибиотиками, деформирующий остеоартроз - базовый курс 30 дней (2 курса по 5 инъекций).

Пронзв.: Полисан (Россия)

Циклофосфан (Cyclophosphanum)

Циклофосфамид*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит циклофосфамида 0,2 г.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Мелкоклеточный рак легкого, рак яичников, рак молочной железы, ретикулосаркома, хронический лимфолейкоз, острый лимфобластный лейкоз, множественная миелома, опухоли Вильмса, костная ретикулосаркома, саркома Юинга, ангиосаркома.

Противопоказ.: Кахексия, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, сердечная и печеночно-почечная недостаточность.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, токсический гепатит, цистит, головная боль, миалгия, оссалгия, алоpecia, лейкопения, тромбоцитопения.

Примен. и доз.: В/в, в/м, внутривенально или внутривенно - по 0,2 г ежедневно или по 0,4 г через день, или по 0,6 г через 2 дня; поддерживающая доза - 0,1-0,2 г 2 раза в неделю. На курс - 8-14 г.

Пронзв.: Олайнфарм (Латвия)

Цимевен (Cymevene®)

Ганцикловир*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит ганцикловира (в форме натриевой соли) 500 мг.

1 капсула - 250 мг.

Фарм. действ.: Противовирусное, конкурентное ингибирование включения дезоксигуанозина трифосфата в ДНК-полимеразу, подавление синтеза ДНК.

Показ.: Цитомегаловирусные (ЦМВ) инфекции (ретинит, колит, эзофагит, пневмония, др. поражения внутренних органов или тяжелые системные инфекции без выявленных поражений внутренних органов), в т.ч. у лиц с ослабленной иммунной системой (при СПИДе, после операций трансплантации органов, при химиотерапии злокачественных новообразований). Капсулы: поддерживающая терапия ЦМВ-ретинита у больных с ослабленным иммунитетом, в т.ч. у больных СПИДом, при условии стабилизации ретинита под действием индукционной терапии; профилактика ЦМВ-инфекции у ВИЧ-положительных лиц группы риска по ЦМВ-инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, врожденная или неонатальная ЦМВ-инфекция, нейтропения (менее 500 нейтрофилов в 1 мкл), беременность, лактация.

Поб. действ.: Нейтропения, тромбоцитопения, озноб, отеки, инфекции, недомогание, аритмии, артериальная гипертензия, гипотензия, пародоксальные мысли или сновидения, атаксия, кома, спутанность сознания, головокружение, головные боли, нервозность, парестезии, психоз, сомнолентность, тремор, судороги, тошнота, рвота, анорексия, диарея, кровотечения, боли, эозинофилия, снижение уровня глюкозы в крови, диспноэ, алоpecia, зуд, крапивница, отслойка сетчатки у больных СПИДом с ЦМВ-ретинитом, гематурия, повышение уровня креатинина и азота мочевины в крови; боль, воспаление, флебит в месте инъекции, канцерогенность.

Взаим.: Дапсон, пентамидин, флуоцитозин, винкристин, винбластин, адриамицин, амфотерицин В, триметоприм и другие нуклеозидные аналоги усиливают токсичность. Не рекомендуется комбинировать с зидовудином (увеличивается риск нейтропении). При одновременном применении с имипенемом, циластатином возможны генерализованные судороги.



Примен. и доз.: Дозу подбирают индивидуально. Обычно начинают с в/в введения - 5 мг/кг с постоянной скоростью в течение 1 ч каждые 12 ч (10 мг/кг/сутки) в течение 14-21 дней. Для поддерживающей терапии вводят 6 мг/кг 5 раз в неделю или 5 мг/кг ежедневно. У больных с почечной недостаточностью снижают дозу препарата и увеличивают интервал между введениями. Внутрь, во время еды. Больным с ЦМВ-ретинитом, стабилизировавшимся на фоне индукционной терапии, поддерживающая доза - 3 г в сутки (по 1 г 3 раза в сутки или по 500 мг 6 раз в сутки). Для профилактики ЦМВ-инфекции - по 1 г 3 раза в сутки. Больным с почечной недостаточностью дозу снижают в зависимости от клиренса креатинина.

Предост.: Следует избегать быстрой или струйной в/в инъекции, поскольку избыточные концентрации ганцикловира в плазме могут усилить его токсичность. В/м или п/к инъекция может вызвать сильное раздражение тканей вследствие высокого рН раствора. Детям младше 12 лет назначают в тех случаях, когда возможная польза от терапии превышает риск развития побочных эффектов.

Пронзв.: Hoffman-La Roche (Швейцария)

Циметидин Ланнахер (Cimetidin Lannacher)

Циметидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит циметидина 800 мг; в упаковке 10 или 30 шт.

Фарм. действ.: Противоязвенное, снижение продукции соляной кислоты, блокада H₂-рецепторов гистамина.

Показ.: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (лечение и профилактика обострений); эрозивный и рефлюкс-эзофагит; синдром Золлингера-Эллисона; профилактика стрессовых поражений верхних отделов ЖКТ.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 14 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, слабость, подавленность, сонливость, боли в мышцах или суставах, парестезии, запоры или понос, выпадение волос, гиперпролактинемия, гинекомастия, галакторея, изменение либидо и потенции, подавление сперматогенеза, транзиторное повышение уровня креатинина в плазме и активности трансаминаз

в сыворотке крови, лейкопения, тромбоцитопения, кожные высыпания.

Примен. и доз.: Внутрь, перед или во время еды. При язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки - по 800 мг 1 раз в день, на ночь, возможно повышение дозы (при недостаточном эффекте) до 1600 мг в 2 приема (утром и вечером). Поддерживающее лечение - 400 мг на ночь (несколько недель). При синдроме Золлингера-Эллисона - по 800 мг 2 раза в день.

Пронзв.: Lannacher Heilmittel (Австрия)

Циндол суспензия (Cindolum suspensio)

Сост. и ф.в.: 100 г суспензии содержат глицерина 20 г, окиси цинка 12,5 г, талька медицинского 12,5 г, крахмала 12,5 г, спирта этилового 70% 20 г, воды дистиллированной до 100 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, вяжущее, подсушивающее.

Показ.: Дерматиты, язвы, опрелости.

Примен. и доз.: Наружно.

Пронзв.: Московская фармфабрика (Россия)

Цинедил (Cinedil®)

Циннаризин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циннаризина 75 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, улучшение периферического (мозгового и коронарного) кровообращения, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Церебро-васкулярная недостаточность (головокружение, шум в ушах, снижение способности к концентрации внимания, мигрень, снижение памяти, сенильные психозы), постинсультные состояния, реконвалесценция после черепно-мозговых травм, болезнь Рейно, облитерирующий атеросклероз и тромбангит, диабетическая ангиопатия, акроцианоз; нарушения равновесия (синдром Меньера, морская болезнь).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Диспепсия, сонливость.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, по 1-2 таблетки 1 раз в день; при нарушениях периферического и мозгового кровообращения и центральных расстройствах вестибулярного аппарата - 75 мг 2-3 раза в день в течение нескольких месяцев.

Предост.: После длительного применения рекомендуется контрольное обследо-

вание печени и почек, контроль картины крови.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Циннабсин (Cinnabsin®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка для рассасывания содержит Cinnabaris D3 25 мг, Hydrastis D3 25 мг, Kalium bichromicum D3 25 мг, Echinacea angustifolia D1 25 мг и Barium chloratum D3 25 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, уменьшение отека слизистых оболочек полости носа и придаточных пазух, облегчение носового дыхания (Cinnabaris, Hydrastis, Kalium bichromicum, Barium chloratum), повышение сопротивляемости организма (Echinacea).

Клин. фарм.: Препарат дает быстрое и стойкое ослабление типичных для синуситов симптомов: заложенность носа, насморк, тупые боли и тяжесть в голове, слезотечение.

Показ.: Острые и хронические синуситы (гайморит, фронтит).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к хрому.

Поб. действ.: Усиленное слюноотделение (требует снижение дозы или отмены препарата), кожные реакции (требуют отмены препарата).

Примен. и доз.: Внутрь, медленно рассасывая, за полчаса до или после еды. При острых заболеваниях - по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз в день) в течение 1-2 дней до наступления улучшения, затем - по 1-2 таблетки 3 раза в день (до выздоровления). Детям до 12 лет при острых заболеваниях - по 1 таблетке каждые 2 ч (не более 8 раз в день) в течение 1-2 дней до наступления улучшения, затем по 1 таблетке 3 раза в день.

Предост.: В случае временного первичного ухудшения состояния необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

Произв.: DHU (Германия)

Циннаризин (Cinnarizinum)

Циннаризин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циннаризина 0,025 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее, не селективная блокада "медленных" кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды головного мозга.

Фармакодин.: Снижает тонус гладкой мускулатуры артериол, уменьшает выра-

женность их реакции на биогенные сосудосуживающие вещества, повышает устойчивость мышц к гипоксии.

Показ.: Нарушения мозгового кровообращения (в т.ч. при остаточных явлениях после инсульта), расстройства вестибулярного аппарата, профилактика приступов мигрени, болезнь Меньера, профилактика и лечение нарушений периферического кровообращения - облитерирующий атеросклероз, диабетическая ангиопатия, акроцианоз.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Поб. действ.: Сонливость, сухость во рту, диспепсия, аллергические реакции (кожная сыпь).

Примен. и доз.: Внутрь, до еды. При нарушениях мозгового кровообращения - по 25 мг 3 раза в сутки. При нарушениях периферического кровообращения - по 50-75 мг 3 раза в сутки. Для профилактики укачивания - 25 мг перед поездкой.

Произв.: Акрихин (Россия)

Циннарон (Cinnaron™)

Циннаризин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит циннаризина 75 мг; в упаковке 20, 50, 100 и 500 шт.

Фарм. действ.: Сосудорасширяющее, улучшение мозгового и периферического кровообращения, селективная блокада "медленных" кальциевых каналов, H₁-гистаминовых рецепторов.

Показ.: Болезнь Меньера и др. вестибулярные расстройства, двигательная слабость, заболевания, связанные с нарушением периферического и церебрального кровообращения (перемежающаяся хромота, мышечная боль во время покоя, вазоспастические расстройства, включая синдром Рейно).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, паркинсонизм, беременность, детский возраст.

Поб. действ.: Утомляемость, сонливость, головная боль, сухость в полости рта, расстройства ЖКТ, увеличение массы тела, потливость, красный плоский лишай, симптомы волчанки, аллергические кожные реакции; в течение 4 дней после приема возможен ложный результат при проведении кожных аллергических проб.

Примен. и доз.: Внутрь. При тошноте, рвоте и др. вестибулярных расстройствах, нарушениях периферического и церебрального кровообращения (в т.ч. у пожилых) - по 1 таблетке (75 мг) 1 раз

в день (или по 0,25 мг 3 раза в день). При двигательной слабости взрослым за 1 ч до поездки - по 25 мг, дозу можно повторять каждые 6 ч; детям - по 12,5 мг.

Предост.: Не рекомендуется во время лечения управлять машинами и др. механизмами. С осторожностью следует назначать при гипотензии.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Циннасан (Cinnasan®)

Циннаризин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит циннаризина 75 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Вазодилатирующее (включая церебральные сосуды), улучшение периферического кровообращения, блокада "медленных" кальциевых каналов.

Показ.: Церебральная ишемия: головная боль с вазомоторными нарушениями; состояния после черепно-мозговых травм (сотрясения головного мозга); нарушения периферического кровообращения: ощущение холода в конечностях, перемежающаяся хромота, нарушение чувствительности (онемение, острая боль, ощущение покалывания в руках и ногах); диабетическая ангиопатия, синдром Рейно, варикозный симптомокомплекс (варикозные вены, язвы на ногах, отеки); трофические расстройства (нарушение питания кожи); вестибулярные симптомы (укачивание, синдром Меньера).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью.

Поб. действ.: Утомляемость, головокружение, головная боль, сухость во рту, гастроинтестинальные симптомы, повышенное потоотделение, красная волчанка, красный плоский лишай, аллергические реакции. У пожилых пациентов или при дозе более 150 мг/день - тремор, ригидность мышц, гипокинезия (требуется отмена препарата).

Взаим.: Усиливает эффект (взаимно) антигипертензивных и сосудорасширяющих средств. Препараты, угнетающие ЦНС (в т.ч. алкоголь), могут повысить утомляемость.

Примен. и доз.: Внутрь, при нарушении мозгового кровообращения - по 1 капсуле 1-3 раза в день; при нарушениях периферического кровообращения - по 1 капсуле 3 раза в день. При вестибулярных симптомах - по 1 капсуле 1-2 раза в день; поддерживающая терапия - 1 капсула в день.

Предост.: У пациентов с болезнью Паркинсона необходима оценка целесооб-

разности и риска. С осторожностью сочетать с антигипертензивными и сосудорасширяющими препаратами.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Цинобак (Cinobac)

Циноксацин*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит циноксацина 500 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции мочевых путей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, анурия, детский и юношеский возраст (до 18 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, изменение вкуса, головная боль, головокружение, бессонница или сонливость, ощущение жжения в области промежности, звон в ушах, светобоязнь, тромбоцитопения, повышение концентрации мочевины, креатинина в крови, повышение активности печеночных ферментов, снижение уровня гемоглобина, кристаллурия, фотосенсибилизация, аллергические реакции.

Взаим.: Повышает уровень теофиллина, кофеина и циклоспорина в крови. Может усиливать действие пероральных антикоагулянтов. Всасывание уменьшают антациды и сукральфат. Железо- и цинксодержащие препараты и продукты уменьшают концентрацию в моче. При сочетании с НПВС возможны судорожные припадки.

Примен. и доз.: Внутрь, 1 г в сутки в 2 или 4 приема в течение 1-2 нед. Для профилактики инфекций мочевых путей у женщин с рецидивами - по 250 мг перед сном в течение 5 мес.

Произв.: Lilly (Швейцария)

Цинт (Cynt)

Моксонидин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит моксонидина 0,2; 0,3 или 0,4 мг.

Фарм. действ.: Антигипертензивное.

Показ.: Гипертоническая болезнь.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, синдром слабости синусового узла, нарушения синоатриальной и АВ-проводимости II и III степени, брадикардия (менее 50 уд./мин), аритмии, тяжелая сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, тяжелые заболевания печени и почек, перемежающаяся хромота, болезнь Рейно, болезнь Пар-

кинсона, эпилепсия, глаукома, депрессия, возраст (до 16 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Сухость во рту, утомляемость, головные боли, головокружение, нарушение сна, слабость в ногах.

Взаим.: Эффект повышают другие гипотензивные препараты. Может усиливать действие алкоголя, транквилизаторов, барбитуратов.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, запивая жидкостью, - 0,2-0,4 мг в сутки (не более 0,6 мг); у больных с пониженной почечной функцией (клиренс креатинина 30-60 мл/мин) разовая доза не должна превышать 0,2 мг, суточная доза - 0,4 мг.

Предост.: Во время лечения требуется постоянный врачебный контроль. С осторожностью назначают работающим с механизмами (снижает быстроту реакции).

Произв.: Lilly (Швейцария)

Ципринол (Ciprinol®)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ципрофлоксацина (в виде хлорида моногидрата) 250 или 500 мг; в упаковке 10 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для инфузий - 100 мг (в виде лактата); в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное (блокада ДНК-гиразы).

Показ.: Инфекции мочевыводящих путей и мочевыделительной системы; дыхательных путей (пневмонии, кроме пневмококковой, острый и хронический бронхит, бронхоэктазы, обострения у больных с кистозным фиброзом); ЛОР-органов (средний отит, синусит, мастоидит); органов малого таза (сальпингит, эндометрит, оофорит, тубулярный абсцесс, тазовый перитонит); абдоминальные и гепатобиллиарные инфекции (перитонит, внутрибрюшинные абсцессы, холецистит, холангит); инфекции костей и суставов (остеомиелит, септический артрит); кожи и мягких тканей (инфицированные язвы, раны, ожоги, абсцессы, целлюлит, инфекция наружного слухового прохода); тяжелые системные инфекции (сепсис, инфекции у больных нейтропенией); сальмонеллоносительство; инфекционная диарея (когда возбудителями являются штаммы *E.coli* и *Campylobacter jejuni*); профилактика инфекций при хирургических вмешательствах (в урологии, гастроэнтерологии, ортопедии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, период роста.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Неприятный вкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, потеря аппетита, диарея, головокружение, головная боль, утомляемость, нарушения зрения, диплопия, шум в ушах, ощущение беспокойства, тоска, судороги, повышение внутричерепного давления, токсический психоз, галлюцинации, фотосенсибилизация, аллергические реакции (эритема, зуд, отек (лица), эозинофилия), гипо- или гипертензия, тахикардия, боли в суставах и мышцах, кристаллурия, местное воспаление (в области венопункции).

Взаим.: Антациды, содержащие алюминий, магний или кальций, снижают всасывание (интервал между их приемом и ципринола должен быть не менее 4 ч). Повышает концентрацию теофиллина и кофенна в плазме. Увеличивает нефротоксичность циклоспорина и эффект антикоагулянтов.

Примен. и доз.: Внутрь (не разжевывая и запивая жидкостью) и в/в (инфузия не более 60 мин). При неосложненных инфекциях нижних и верхних отделов мочевыводящих путей - по 250 мг внутрь или по 200 мг в/в 2 раза в день в течение 3 дней. При осложненных инфекциях верхних отделов мочевыводящих путей - внутрь по 500 мг или в/в по 400 мг 2 раза в день, при осложненных инфекциях нижних отделов мочевыводящих путей - внутрь по 500 мг 2 раза в день в течение 14 дней. При тяжелых инфекциях (пневмония, остеомиелит) - внутрь по 750 мг или в/в по 400 мг 2 раза в день. При хроническом сальмонеллоносительстве - внутрь по 750 мг 2 раза в день в течение 4 нед. При острой гонорее - однократно внутрь 250 или 500 мг, или в/в 100 мг. При очень тяжелых инфекциях дозу можно увеличить до 750 мг внутрь или 400 мг в/в 3 раза в день. При диарее во время путешествия - по 500 мг 2 раза в день. Курс лечения (в зависимости от заболевания) - от 3-14 дней до 4-6 нед. Для профилактики инфекций при хирургических вмешательствах - 500-750 мг внутрь или 200-400 мг в/в за 30-60 мин до операции. При продолжительности операций свыше 4 ч дозу повторяют.

Предост.: Следует соблюдать осторожность при лечении больных преклонного возраста, при нарушениях ЦНС (эпилепсия, сниженный судорожный порог, судороги в анамнезе, сниженное кровоснабжение мозга, апоплексия, психичес-

кие заболевания), почечной недостаточности, дефиците глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы. Необходимо контролировать рН мочи, обеспечить адекватную гидратацию, избегать чрезмерной инсоляции. При возникновении болей в сухожилиях (или при первых признаках их воспаления), при тяжелой и продолжительной диарее или псевдомембранозном колите рекомендуется прекратить лечение. Пациент должен знать, что снижается способность к быстрой реакции, особенно на фоне алкоголя.

Произв.: KRKA (Словения)

Ципробай® (Ciprobay®)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципрофлоксацина гидрохлорида 100, 250, 500 или 750 мг; в упаковке 10 шт.

1 флакон с 50 или 100 мл раствора для инфузий - 100 или 200 мг соответственно.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции дыхательных, желчных и мочевыводящих путей, уха, горла, носа, глаз, брюшной полости, почек, костей и суставов, ЖКТ, кожи и мягких тканей, органов малого таза, перитонит, сепсис (в т.ч. у больных со сниженным иммунитетом), гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский и подростковый возраст. Осторожно назначать больным эпилепсией и с повреждением ЦНС.

Поб. действ.: Диспептические явления, головная боль, головокружение, слабость, нарушение сна, возбуждение, тремор, повышение внутричерепного давления, депрессия, галлюцинации, судороги, аллергические реакции, лейкопения/лейкоцитоз, тромбоцитопения, анемия, псевдомембранозный колит, анафилактические реакции (в т.ч. шок), синдром Стивенса-Джонсона, интерстициальный нефрит, гепатит, желтуха, печеночная недостаточность; светочувствительность; снижение функции почек, почечная недостаточность, расстройства зрения, обоняния, вкуса и слуха.

Примен. и доз.: Внутрь и в/в; внутрь - по 125-500 мг 2 раза в день, в/в - по 100-200 мг (до 400 мг) 2 раза в день; инфузии - 200 мг в течение 30 мин или 400 мг в течение 60 мин.

Произв.: Bayer (Германия)

Ципролет (Ciprolet)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципрофлоксацина 250 или 500 мг; в упаковке 10 шт.

1 флакон со 100 мл инфузионного раствора - 200 мг.

1 мл глазных капель - 3 мг; во флаконах с капельницей по 5 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции органов дыхания, ЛОР-органов, мочеполовой системы, ЖКТ, костей и суставов, кожи и мягких тканей, хламидиоз, гонорея, сепсис, инфекции на фоне иммунодефицита, глазные капли: конъюнктивиты, блефароконъюнктивиты, блефариты, кератиты, кератоконъюнктивиты, бактериальные язвы роговицы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (таблетки); беременность, лактация, детский возраст (до окончания интенсивного роста) (раствор для инфузий).

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, метеоризм, головокружение, головная боль, утомляемость, бессонница, возбуждение, тремор, фотосенсибилизация, васкулиты, аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, сыпь); легкая болезненность и гиперемия конъюнктивы (капли).

Примен. и доз.: Внутрь и в/в. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей: в/в, капельно - по 100 мг 2 раза в день или внутрь - по 250 мг 2 раза в день; при тяжелых и осложненных инфекциях мочевыводящих путей: в/в капельно - по 200 мг 2 раза в день или внутрь - по 250-500 мг 2 раза в день; при инфекциях органов дыхания: в/в капельно - по 200-400 мг 2 раза в день или внутрь - по 250-500 мг 2 раза в день; при тяжелых инфекциях (сепсис, перитонит, остеомиелит и др.): в/в - по 400 мг 2-3 раза в день или перорально - по 750 мг 2 раза в день; при хламидийных поражениях мочеполовой системы: внутрь - по 750 мг 2 раза в день. После окончания в/в введения можно принимать препарат перорально. Глазные капли: при легкой и умеренно тяжелой инфекции - по 1-2 капли в пораженный глаз (или оба глаза) каждые 4 ч; при тяжелой инфекции - по 2 капли каждый час.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Ципросол (Ciprosol)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципрофлоксацина 250 мг; в упаковке 10 шт., и 500 мг; в упаковке 4 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции органов дыхания, кожи и мягких тканей, костей, суставов, мочеполового тракта, инфекционная диарея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, возраст (до 14 лет).

Поб. действ.: Анорексия, боли в животе, тошнота, рвота, диарея; чувство страха и тревоги, нервозность, бессонница, эйфория.

Примен. и доз.: Инфекции мочевых путей: внутрь по 250 мг каждые 12 ч. Инфекции дыхательного тракта, кожи и мягких тканей, костей и суставов, инфекционная диарея: внутрь по 500 мг каждые 12 ч. Осложненные инфекции: по 750 мг каждые 12 ч. Обычный период лечения составляет 7-14 дней, однако в особых случаях может быть продлен до 4-6 нед и более.

Произв.: Sol Pharmaceuticals (Индия)

Ципрофлоксацина гидрохлорид (Ciprofloxacin hydrochloridum)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ципрофлоксацина гидрохлорида 0,25 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра, бактерицидное.

Показ.: Инфекции мочевого тракта, нижних дыхательных путей, кожи, костей и суставов, ЖКТ, острые системные инфекции, гинекологические, глазные инфекции, инфекции у онкологических больных.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, эпилепсия, беременность, лактация, детский возраст (до 15 лет).

Поб. действ.: Отек лица и голосовых связок, анорексия, боль в животе, тошнота, рвота, понос, нарушения вкуса и запаха, нарушения сна, головная боль, беспокойство, общая угнетенность, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, аллергические реакции (зуд, сыпь).

Взаим.: Антациды, в т.ч. щелочные воды снижают эффект. Усиливает депримирующее действие алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым при неосложненных инфекциях - по 0,125-0,5 г 2 раза в сутки, в более тяжелых случаях - по 0,75 г 2 раза в сутки. Курс лечения - 5-15 дней.

Предост.: С осторожностью назначают пожилым, больным с нарушениями ЦНС (судороги в анамнезе, нарушение мозгового кровообращения, инсульт).

Произв.: Мосхимфармпрепараты (Россия)

Циркулин драже валерианы (Cirkulin® baldrian dragees)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит сухого экстракта (4:1) корней валерианы 140 мг; в упаковке 40 шт.

Фарм. действ.: Седативное.

Показ.: Нервное перенапряжение, стресс, повышенная возбудимость, нарушение сна (в т.ч. при нарушении его структуры, для облегчения засыпания).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется принимать в первые 3 мес беременности.

Поб. действ.: Возможны боли в области живота, кожные аллергические реакции (редко).

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже 1-2 раза в день; при бессоннице - по 2 драже за 30 мин до сна.

Предост.: Водителям транспорта необходимо учитывать возможное снижение концентрации внимания (при приеме очень значительных доз).

Произв.: Roha (Германия)

Цисанплат (Cisanplat)

Цисплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для парентерального введения с окончательной концентрацией 1 мг/мл содержит цисплатина 10; 25 или 50 мг; в упаковке 10 (10 и 25 мг) и 5 (50 мг) шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Клин. фарм.: Малотоксичен для костного мозга. Может применяться в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами (в течение курса химиотерапии).

Показ.: Опухоли яичек, шейки матки, яичников, мочевого пузыря.

Примен. и доз.: В/в, предварительно развести в 0,9% физиологическом растворе до окончательной концентрации -

1 мг/мл. Дозировка варьируется в зависимости от схемы лечения и показаний.

Предост.: Следует контролировать режим восполнения жидкости.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Цисплатил (Cisplatyl®)

Цисплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит цисплатина 10, 25 или 50 мг, в комплекте с растворителем; в упаковке 1, 5 и 10 шт.

Фарм. действ.: Цитостатическое, бифункциональное алкилирование ДНК, ингибция синтеза ДНК.

Показ.: Злокачественные опухоли яичка, рак яичников, шейки матки, эндометрия, мочевого пузыря, пищевода, кожи и другие злокачественные опухоли.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, почечная недостаточность, полиневрит, угнетение гемопоэза.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, нарушения слуха, функции почек, миелосупрессия, тахикардия, гипокальциемия, гипомagneмия, алоpecia, аллергические реакции. Редко - потеря вкуса и чувствительности, анорексия, повышение активности трансаминаз.

Взаим.: Несовместим с аминогликозидами по причине синергического невро- и ототоксического действия.

Примен. и доз.: В/в. Разовая доза - 50-100 мг/кв.м поверхности тела каждые 3-4 нед. Препарат чаще всего вводят единовременно или разбивая дозу на 5 дней. Применение препарата требует предварительной гидратации, для чего вводят 1-2 л 5% раствора глюкозы или 0,9% раствора натрия хлорида.

Предост.: Перед началом лечения целесообразно снять аудиограмму и провести неврологическое обследование, а также оценить функцию почек. В ходе лечения необходим контроль за общим анализом крови и электролитным балансом (особенно за ионами магния, кальция, калия).

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Цисплатин-Эбеве (Cisplatin-Ebewe)

Цисплатин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 20, 50 и 100 мл концентрата для приготовления инфу-

зии содержит цисплатина 10, 25 и 50 мг соответственно.

Фарм. действ.: Цитостатическое.

Показ.: Злокачественные опухоли яичка, рак яичников, опухоли головы и шеи, рак шейки матки, остеогенная саркома и саркома мягких тканей, рак легкого, карцинома простаты, лимфосаркома, меланома.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, поражения костного мозга, миелосупрессия, почечная недостаточность, нарушения слуха.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано (обладает эмбриотоксичностью, тератогенностью).

Поб. действ.: Нарушения слуха, поражение почек, печени и ЦНС, тошнота, рвота, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, анафилактические реакции.

Взаим.: Несовместим с аминогликозидными антибиотиками и цефалоспоридами.

Примен. и доз.: В/в и в/а - 50-120 мг/кв.м поверхности тела в одной дозе или 50 мг/кв.м в первый и на восьмой день лечения, или по 15-20 мг/кв.м ежедневно в течение 5 дней. Курс может повторяться каждые 3-4 нед. В/а вводят через артериальный катетер; при опухоли головы и шеи - 30 мг; при остеосаркоме - 120-150 мг.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Цистрин (Cystrin)

Оксибутинин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит оксибутинина гидрохлорида 3 или 5 мг; в упаковке 100 или 500 шт.

Фарм. действ.: Холинолитическое, расслабление гладких мышц мочевого пузыря.

Фармакокин.: C_{max} достигается через 1 ч, $T_{1/2}$ - 2-3 ч.

Фармакодин.: Препятствует сокращению и уменьшает спазм гладких мышц мочевого пузыря, увеличивает его объем, уменьшает частоту сокращений, снижает напряжение детрузора, сдерживает позывы мочеиспускания.

Показ.: Частое мочеиспускание, недержание мочи (в т.ч. ночное) у пациентов с ослабленным детрузором, гиперфункция мочевого пузыря (после операций на мочевом пузыре, простатэктомии, острым и хроническом цистите).

Противопоказ.: Глаукома, непроходимость ЖКТ (полная или частичная), заболевания, вызывающие задержку мочи (в т.ч. гипертрофия простаты), ме-

гоколон, тахикардия, миастения, беременность, лактация.

Поб. действ.: Сухость во рту, запоры, нарушения зрения, сонливость, уменьшение потоотделения, тахикардия, задержка мочи, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 5 мг 2-3 раза в день (до 20 мг в день); детям старше 5 лет - по 5 мг 2 раза в день (до 15 мг в день).

Предост.: С осторожностью применяют при заболеваниях почек, печени и сердца. Следует иметь в виду, что использование препарата при высокой температуре окружающей среды увеличивает риск теплового удара или лихорадки (уменьшается потоотделение). Во время лечения не рекомендуется управление машиной или техникой.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Цистум Солидаго раствор (Cystium Solidago losung)

Сост. и ф.в.: 100 г раствора для приема внутрь содержат сухого экстракта из травы золотарника (соотношение - высушенное лекарственное растение : нативный экстракт = 5,5 - 6,5 : 1) 10 г, во флаконах по 100 и 250 мл.

Фарм. действ.: Диуретическое, противовоспалительное, спазмолитическое.

Показ.: Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, нефроуролитиаз (профилактика и лечение).

Противопоказ.: Отеки сердечного и почечного происхождения.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды, по 5 мл (мензурка) 2-4 раза в день. Рекомендуется обильное питье.

Произв.: Pharma Wernigerode (Германия)

Цитарабин (Cytarabinum)

Цитарабин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон или 1 ампула с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержат цитарабина 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Фармакокин.: В организме дезаминируется, выводится с мочой.

Фармакодин.: Как синтетический нуклеозид является антиметаболитом пириимидинового обмена, тормозит синтез

ДНК. Антилейкемическое действие обусловлено фосфорилированием в миелобластах, лимфобластах, лимфоцитах.

Показ.: Острый миелоидный и лимфобластный лейкоз, хронический миелолейкоз (бластный криз), неходжкинские лимфомы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночно-почечная недостаточность, острые инфекционные заболевания, аплазия костного мозга.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Лейкопения, тромбоцитопения, анемия, мегалобластоз, аритмии, бронхоспазм, отек легких, нарушение функций ЦНС, невриты, гиперурикемия, тошнота, рвота, анорексия, боли в животе, диарея, стоматиты, кожные высыпания, тромбофлебиты, нарушение функций печени и почек.

Взаим.: Совместим с циклофосфаном, винкристином, тиогуанином, L-аспарагиназой, рубомицином, карминомицином и другими противоопухолевыми средствами, преднизолоном. Тормозит всасывание дигоксина из ЖКТ.

Передоз.: 12-кратная в/в инфузия 4,5 г/кв.м. в течение 1 ч каждые 12 ч вызывает необратимые изменения ЦНС и смерть. Антидот не известен.

Примен. и доз.: В/в, п/к, интратекально. В/в - по 100 мг/кв.м в сутки: две капельные инфузии по 3 ч каждая с интервалом 10 ч или непрерывно в течение 24 ч, курсовая доза - 500-1000 мг. П/к по 20 мг/кв.м 2-3 раза в сутки. Курс - 4-7 дней (максимально до 10 дней). Интратекально - по 20 мг/кв.м 1 раз в 3 дня в течение 15 дней. Всего проводят 4-7 лечебных курсов. Интервалы между курсами - 10-14 дней и более. Максимальная разовая доза - 3 г/кв.м в виде быстрой в/в инфузии. Непосредственно перед употреблением содержимое флакона растворяют в изотоническом растворе натрия хлорида или воде для инъекций: для в/в введения - 400 мл, для п/к и интратекального - 1 мл.

Предост.: Необходим постоянный контроль за числом лейкоцитов и тромбоцитов в крови и костном мозге, функциональным состоянием печени и почек. При выраженном побочном действии следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Произв.: Гриндекс (Латвия)

Цитеал (Cyteal®)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для наружного применения содержат хлоргексидина диглюконата (20% раствор) 0,5

мл, гексамидина диизетионата 100 мг и хлоркрезола 300 мг; во флаконах по 250 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, противогрибковое, противопаразитарное.

Фармакокин.: При нанесении на неповрежденную кожу не всасывается.

Показ.: Антисептическая обработка ран, рук хирурга, кожи и слизистых (при микозах, экземе, акне, язве, опрелости, бактериальных дерматозах, вульвите, вагините, цервиците и др.); профилактика инфекций, передаваемых половым путем.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Контактная экзема, контактный дерматит.

Взаим.: Несовместим с другими антисептиками (взаимная инактивация).

Примен. и доз.: Местно (избегать попадания на слизистые глаза, среднего уха), используется неразведенным и разведенным (1:10); обрабатывают наружный участок и слизистые оболочки с последующим ополаскиванием.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Цитерал (Citeral®)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципрофлоксацина гидрохлорида 250 или 500 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное, бактерицидное, ингибция микробной ДНК-гиразы.

Показ.: Инфекции мочевых, дыхательных, желчевыводящих путей, брюшной полости, органов малого таза, ЛОР-органов, костей и суставов, кожи, сепсис, гонорея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, период роста.

Поб. действ.: Диспепсия, головокружение, головная боль, слабость, сенсорные нарушения, беспокойство, нарушения зрения, судороги, гипотония, тахикардия, артралгия, повышение активности печеночных трансаминаз и щелочной фосфатазы, гипербилирубинемия, кристаллурия, фотосенсибилизация, аллергические реакции (экземы, эритема, зуд, лихорадка, отек лица).

Примен. и доз.: Внутрь, натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, по 500-750 мг 2 раза в день, при инфекциях мочевыводящих путей - по 125-250 мг 2 раза в день; курс - 7-10 дней, при острой гонорее - 250 мг

однократно. При остеомиелите - 750 мг 2 раза в сутки; курс лечения - до 2 мес. У пожилых больных (или с почечной недостаточностью) или назначают 1/3 дозы или снижают кратность приема.

Произв.: Alkaloid (Македония)

Цитоксан (Cytoxan®)

Циклофосфамид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит циклофосфамида 25 или 50 мг; во флаконах или коробках 100 шт. или в упаковке 28 шт.

1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора - 100, 200 или 500 мг; в коробках 12 шт. (в упаковке 1 коробка) и 1 или 2 г, в коробках 6 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитотоксическое, иммунодепрессивное.

Показ.: Злокачественные лимфомы (лимфоцитарная и гистиоцитарная лимфома, лимфогранулематоз, лимфома Беркитта, лимфома смешанного типа), множественная миелома, лейкозы (лимфолейкоз, гранулоцитарный лейкоз, миелолейкоз, острый лимфобластный лейкоз у детей), микоз грибовидный, нейробластома, аденокарцинома яичника, ретинобластома, карцинома молочной железы. Нефротический синдром "минимальных изменений" у детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелая миелосупрессия.

Бер. и корм. гр.: При беременности и лактации можно использовать только по жизненным показаниям.

Поб. действ.: Нарушения репродуктивной функции, тошнота, рвота и другие диспептические расстройства, язвенный стоматит, алоpecia, кожные высыпания, пигментация кожи, изменения ногтей, миелосупрессия, цистит, уретрит, нарушения функции почек, сердца, индукция вторичных инфекций и злокачественных опухолей, фиброзы (легких, мочевого пузыря), анафилактикоидные реакции.

Примен. и доз.: При злокачественных новообразованиях - внутрь, по 1-5 мг/кг в день. В/в, по 40-50 мг/кг в несколько приемов в течение 2-5 дней или по 10-15 мг/кг с интервалом в 7-10 дней, или 3-5 мг/кг 2 раза в неделю. (Перед употреблением содержимое флакона растворяют в 5-100 мл в воде для инъекций или ином растворителе до концентрации 20 мг/мл). При нефротоксическом синдроме - внутрь, по 2,5-3 мг/кг в течение 60-90 дней.

Предост.: С осторожностью назначают больным с миелосупрессией, наруше-

ниями функции печени и почек, при предшествующей лучевой и химиотерапии. Во время лечения необходим регулярный контроль клеточного состава крови и мочи (на наличие эритроцитов). Женщинам детородного возраста рекомендуется надежная контрацепция.

Произв.: Bristol-Myers Squibb (США)

Цитомид (Citomid)

Винкристин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит винкристина 1 мг; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Фармакодин.: Обладает метафазозависимостью, блокирует митоз клеток в метафазе за счет связывания тубулина и подавления сборки микротрубочек.

Клин. фарм.: Миелосупрессивное действие не является дозолимитирующим.

Показ.: Лейкозы, лимфомы, саркомы, карциномы, лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы, саркома Юинга, эмбриональная рабдомиосаркома, опухоль Вильямса, нейробластома, рак молочной железы, мозга и легких.

Противопоказ.: Демиелинизирующие формы синдрома Шарко-Мари-Тута, беременность, лактация.

Поб. действ.: Угнетение функции костного мозга; неврологические и нейромышечные токсические эффекты (дозолимитирующие): парестезия, отсутствие глубоких сухожильных рефлексов, атаксия, онемение стоп, шлепающая походка и гипертрофия мышц; запоры, острая мочекишечная нефропатия, алоpecia.

Передоз.: Назначают по 15 мг фолиевой кислоты каждые 3 ч в течение 24 ч, затем каждые 6 ч в течение не менее 48 ч.

Примен. и доз.: В/в в виде инфузии в 0,9% растворе натрия хлорида. В дозе 1,4 мг/кв.м, максимальная доза - 2 мг/кв.м или 25-75 мкг/кг 1 раз в неделю. Детям 1,5-2 мг/кв.м или 50 мкг/кг 1 раз в неделю.

Предост.: Для профилактики запора рекомендуются клизмы и слабительные средства. Больным с нарушениями функции печени назначают меньшие дозы. Необходимо соблюдать осторожность при назначении в пожилом возрасте. Нельзя вводить подоболочечно (не избежен летальный исход).

Произв.: CSC (Италия)

Цитонал (Cytonal®)

Цитарабин*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2 мл раствора для инъекций содержит цитарабина 40 мг; в упаковке 5 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 100 мг; в упаковке 5 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для инъекций - 500 мг; в упаковке 5 шт.

1 флакон с 20 мл раствора для инъекций - 1000 мг; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, ингибция ДНК-полимеразы.

Показ.: Острые миелоидный (включая обострения хронического), лимфобластный и нелимфобластный лейкозы, диффузные гистиоцитарные лимфомы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, угнетение функции костного мозга.

Бер. и корм. гр.: При беременности применять только в случае крайней необходимости. Во время лактации - не рекомендуется.

Поб. действ.: Анемия, лейкопения, тромбоцитопения, мегалобластоз, ретикулоцитопения, диспептические расстройства (снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея) стоматит, фарингит, эзофагит, изъязвление пищевода, конъюнктивит, лихорадка, сыпь, нарушение функции печени (желтуха), тромбофлебит, кровотечение; пневмония, кожные язвы, сепсис, задержка мочи, нарушение функции почек, алоpecia, головокружение, головная боль, целлюлиты в месте инъекции, аллергические реакции (анафилактический шок, зуд, крапивница).

Взаим.: Не следует сочетать с метотрексатом или 5-фторурацилом.

Передоз.: Дозы 4,5 г/кв.м. внутривенной инфузией по 1 ч каждые 12 ч в течение 12 дней могут вызвать необратимое поражение ЦНС и привести к смерти. Антидота для передозировки цитарабина не существует.

Примен. и доз.: Внутривенно, струйно или капельно (в течение 1-3 ч), подкожно или внутримышечно (для поддерживающей терапии), интратюмбально, интравентрикулярно в дозах 100-200 мг/кв.м каждые 12 ч в течение 2-6 дней. Повторный курс - только после нормализации клеточного состава крови.

Предост.: С осторожностью назначают больным с нарушением функции печени. Следует периодически исследовать функцию костного мозга, печени и почек, уровень мочевой кислоты в крови. При количестве тромбоцитов ниже 50000

куб.мм или полиморфонуклеарных гранулоцитов ниже 1000 куб.мм. лечение следует прекратить.

Произв.: CTS (Израиль)

Цитотект (Cytotect®)

Иммуноглобулин

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит протеина плазмы человека 100 мг (при этом антител против цитомегаловируса 50 единиц института Пауля Эрлиха, определенных в тесте ЭЛИЗА). Другие компоненты: хлорид натрия, вода для инъекций. В ампулах по 10 и 20 мл или во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, повышение содержания в организме антител против цитомегаловируса человека.

Показ.: Профилактика и терапия цитомегалии у пациентов с иммунодефицитом, иммуносупрессией (особенно у реципиентов после трансплантаций); острые цитомегаловирусные инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом (у недоношенных младенцев, новорожденных или грудных детей, при медикаментозном подавлении иммунитета, при иммунодефиците, вызванном другими причинами, например, при СПИДе).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к препаратам человеческого иммуноглобулина.

Поб. действ.: Тошнота, боль в спине, повышение температуры, кожные реакции, аллергические реакции (редко - анафилактический шок).

Взаим.: Живые вирусные вакцины против паротита, кори и краснухи не должны вводиться в течение 3 мес после приема иммуноглобулинов, так как их эффективность может быть снижена под влиянием антител, содержащихся в препарате цитотект. Возможно совместное введение с консервированной кровью, плазмой, сывороткой, раствором глюкозы или изотоническим раствором. Никакие другие препараты нельзя добавлять к раствору цитотект, так как это может привести к изменению концентрации электролита или величины pH и денатурации или осаждению белков.

Примен. и доз.: Для профилактики цитомегаловирусных инфекций доза на 1 введение - 1 мл/кг. При трансплантации органов - 1 мл/кг в день трансплантации, при пересадке костного мозга - 1 мл/кг в день, предшествующий трансплантации. Курс - 6 введений с интервалами в 3 нед. В других случаях иммунодефицита - поддерживающая доза 1

мл/кг каждые 3 нед, общее число доз определяется состоянием иммунной системы и в случае применения длительностью и интенсивностью химиотерапии. При терапии цитомегаловирусных инфекций разовая доза 2 мл/кг вводится каждые 2 дня до исчезновения клинических симптомов. Раствор перед употреблением следует подогреть до температуры тела. При инфузии скорость введения не должна превышать 20 капель/мин (1 мл/мин).

Произв.: Biotest (Германия)

Цитрамон П (Citramonum P)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 0,24 г, парацетамола 0,18 г, кофеина 0,03 г, какао 0,0225 г и лимонной кислоты 0,005 г; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее.

Показ.: Болевой синдром слабой и умеренной выраженности (головная боль, невралгия, артралгия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Цитрат бетаина Бофур (Citate betaine Beaufour®)

Бетаин

Сост. и ф.в.: 1 чайная ложка гранул для приготовления орального раствора содержит цитрата бетаина моногидрата 0,33 г, лактозы 1,38 г, сахарозы 2,75 г, а также ароматизирующие добавки; в упаковке 250 г (25 г активного вещества).

Фарм. действ.: Гепатопротективное, гипополипидемическое.

Показ.: Диспепсия, замедленное пищеварение, сонливость и дискомфорт после приема пищи, умеренно выраженная гипертриглицеридемия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды 1-2 чайные ложки гранул, разведенных в половине стакана воды, 3 раза в день.

Предост.: С осторожностью назначают больным с сахарным диабетом (препарат содержит сахарозы 2,75 г, лактозы 1,38 г).

Произв.: Beaufour Ipsen International (Франция)

Цифлоксинал (Cifloxinal)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит ципрофлоксацина 250 мг; в упаковке 10 и 20 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра.

Показ.: Инфекции дыхательных путей, среднего уха и придаточных пазух носа, глаз, почек и мочевыводящих путей, органов малого таза (в т.ч. аднексит, простатит), ЖКТ, желчного пузыря и желчевыводящих путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов, гонорея, перитонит, сепсис.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 15 лет).

Бер. и корм. гр.: Не рекомендовано.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, обморок, боли в животе, тошнота, рвота, диарея, тахикардия, расстройства зрения, шум в ушах, кожные высыпания, зуд.

Взаим.: Антациды и препараты железа снижают всасывание. Повышает концентрацию теофиллина в плазме крови.

Примен. и доз.: Внутрь. При инфекциях мочевыводящих путей - по 0,25-0,5 г 2 раза в сутки; при пневмонии, остеомиелите - по 0,75 г 2 раза в сутки; при неосложненной гонорее - 0,25-0,5 г однократно.

Предост.: Следует назначать только по жизненным показаниям больным с эпилепсией, приступами судорог, сосудистыми заболеваниями и органическими поражениями мозга.

Произв.: Pro.Med.CS Praha (Чехия)

Цифран® (Cifran®)

Ципрофлоксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит ципрофлоксацина USP 250 или 500 мг (в форме гидрохлорида моногидрата), в упаковке 10 или 100 шт.

100 мл раствора для инфузий - 200 мг (в форме лактата); во флаконах по 50 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра, бактерицидное, блокада бактериальной ДНК-гиразы и нарушение синтеза бактериальной ДНК.

Фармакокин.: Быстро всасывается из ЖКТ, биодоступность при пероральном приеме около 70%. После однократного приема 250 и 500 мг средние пиковые концентрации в сыворотке составляют

соответственно 1,5 и 2,5 мкг/л и многократно превышают МПК₉₀ для большинства микроорганизмов. После в/в введения 200 мг концентрация в сыворотке составляет 3,8 мкг/мл. Равномерно распределяется и достигает терапевтических концентраций в большинстве тканей и жидкостей. Уровень связывания с белками низкий (19-40%). Выводится в неизмененном виде с мочой, а также с желчью и калом.

Показ.: Инфекции дыхательных и мочевых путей, ЛОР-органов; кожи и мягких тканей; костей и суставов, ЖКТ, брюшной полости и органов малого таза; тяжелые системные инфекции (септицемия, бактеремия и инфекции у больных с ослабленным иммунитетом), гонорея, профилактика хирургических инфекций.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст (до 12 лет).

Поб. действ.: Диспепсия, головная боль, беспокойство, повышение сывороточных трансаминаз, сыпь, раздражение в месте введения.

Взаим.: Повышает концентрацию теофиллина в сыворотке крови и период его полувыведения. Пробеницид замедляет выведение, антациды - всасывание.

Примен. и доз.: Внутрь и в/в. Дозы зависят от тяжести инфекции, типа возбудителя, возраста, массы тела и функции почек больного. При тяжелых инфекциях (или невозможности перорального назначения) лечение начинают с инфузий с последующим переводом на пероральный прием. Рекомендуются дозы: инфекции мочеполового тракта - 250-500 мг внутрь или 200 мг в/в каждые 12 ч; острая неосложненная гонорея - однократно 500 мг внутрь; другие инфекции - 500-750 мг внутрь или 200-400 мг в/в каждые 12 ч. Курс лечения 5-10 дней.

Предост.: Для профилактики кристаллурии следует рекомендовать обильное питье. При тяжелых нарушениях функции почек проводят коррекцию дозы. Возможно возбуждение ЦНС, поэтому с осторожностью назначают больным с нарушениями ЦНС.

Произв.: Ranbaxy (Индия)

Цюкли® (Zuckli®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит цикламата натрия 40 мг и сахарина натрия 4 мг; в упаковке с дозатором по 100 и 650 шт.

10 капель раствора - цикламата натрия

60 мг и сахараина натрия 6 мг; во флаконах по 125 мл.

Фарм. действ.: Подслащающее (бескалорийная замена сахара).

Показ.: Сахарный диабет, разгрузочная диета (в качестве подслащающего средства).

Противопоказ.: Беременность, лактация, ранний детский возраст.

Поб. действ.: Фотоаллергические реакции, диарея (после приема 10-15 г в сутки).

Взаим.: Устраняет горький вкус и улучшает растворение большинства лекарств (антигистаминных, анальгетиков, сульфаниламидов, барбитуратов).

Примен. и доз.: Добавляют в еду или питье.

Произв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Шайни® (Shiny®)

Фарм. действ.: Очищающее, противовоспалительное, отбеливающее, освежающее, предотвращающее развитие кариеса.

Фармакодин.: Монофторофосфат способствует укреплению эмали зубов и предохраняет от кариеса; натрия бикарбонат поддерживает кислотно-щелочной баланс полости рта в нормальном диапазоне.

Показ.: Ежедневная гигиена полости рта.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Два (или более) раза в день чистить зубы.

Произв.: American Drug Company (США)

Эвкабал бальзам С (Eucabal balsam S)

Сост. и ф.в.: 100 г эмульсии содержат эвкалиптового масла 10 г и хвойного масла 3 г в тубах по 40 и 100 мл или в тубах по 40 мл в комплекте с ингалятором.

Фарм. действ.: Отхаркивающее (разжижение и растворение бронхиального секрета, усиление транспортировки секрета мерцательным эпителием).

Показ.: Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (ларингит, фарингит, ринит), бронхит; состояния раздражения верхних дыхательных путей различной этиологии.

Противопоказ.: Тяжелые заболевания, сопровождающиеся высокой температу-

рой, инфекции, сердечная недостаточность, гипертония, значительные повреждения кожи, острые кожные заболевания.

Примен. и доз.: Наружно - втирают полоску препарата длиной 3-5 см, нанесенную на грудь и спину (межлопаточная область), несколько раз в день. Ингаляционно - для приготовления паровой ингаляции полоску препарата длиной 5 см размешивают в 2-3 л горячей воды. Ванны - для приготовления ванны в воду с температурой 36-37 град.С добавляют полоску препарата длиной 5-10 см и равномерно распределяют в воде, продолжительность принятия ванны - 15-20 мин. Принимать ванну можно дополнительно к растиранию и ингаляции.

Предост.: Водяные ванны (независимо от добавления в ванну препарата) рекомендуется принимать только после консультации с врачом. Не допускать попадания в глаза. После принятия ванны с эвкабалом не следует принимать душ или растираться полотенцем.

Произв.: Esparga (Германия)

Эвкабал-капли от кашля (Eucabal-cough drops)

Сост. и ф.в.: 100 г капель содержат жидкого экстракта роснянки 14 г и жидкого экстракта тимьяна 21 г; во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Противокашлевое, отхаркивающее, муколитическое, спазмолитическое.

Показ.: Катаральные заболевания верхних дыхательных путей, бронхит.

Противопоказ.: Возраст (до 3 лет).

Поб. действ.: Неизвестны.

Примен. и доз.: Внутрь, детям младшего возраста (с 3 лет) - по 3-5 капель 3 раза в день, детям дошкольного возраста - по 5-10 капель 3 раза в день, детям школьного возраста - по 15-20 капель 3 раза в день, взрослым - по 15-20 капель 3 раза в день.

Произв.: Esparga (Германия)

Эвкабал-сироп от кашля (Eucabal-cough syrup)

Сост. и ф.в.: 100 г сиропа содержат жидкого экстракта подорожника 3 г и жидкого экстракта тимьяна 15 г; во флаконах по 100 и 250 мл.

Фарм. действ.: Отхаркивающее, муколитическое, противовоспалительное,

уменьшение раздражения верхних дыхательных путей.

Показ.: Катаральные заболевания верхних дыхательных путей.

Противопоказ.: Непереносимость фруктозы, возраст до 6 мес.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 столовой ложке 3 раза в день; детям грудным (с 6 мес) и младшего возраста - по 1 чайной ложке 3-5 в день; детям школьного возраста - по 1 столовой ложке 3-5 раз в день (перед употреблением взболтать). В чайной ложке сиропа (5 мл) содержится 3 г сахарозы или 0,25 хлебных единиц; в 1 столовой ложке (10 мл) - 6 г сахарозы или 0,5 хлебных единиц. Препарат содержит 6,5 объемных % этанола.

Произв.: Esparma (Германия)

Эгестренол® (Egoestrenolum)

Сост. и ф.в.: Таблетка содержит ацетомепрегенола 0,8 мг и этинилэстрадиола 0,04 мг; в упаковке 21 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенно-прогестагенное.

Показ.: Контрацепция, функциональное бесплодие, дисфункциональные маточные кровотечения, гипоталамический синдром в период полового созревания.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания печени, артериальная гипертензия, гиперкоагуляция, тромбоэмболическая болезнь.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, нагрубание молочных желез, межменструальные кровотечения.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от приема пищи. Контрацепция - ежедневно 1 таблетку на ночь, начиная с 5-го дня менструального цикла, в течение 21 дня (при пропуске одного приема на следующий день принимают 2 таблетки (утром и на ночь). При функциональном бесплодии - 1 таблетку с 5-го по 25-й день на протяжении 2-3 циклов с последующим 2-месячным перерывом. При дисфункциональном маточном кровотечении - первые два дня по 1 таблетке 4 раза в сутки, на 3-4-е дни по 1 таблетке 3 раза в сутки, в последующие 2 дня по 1 таблетке утром и вечером, после прекращения кровотечения дозу уменьшают до 1 таблетки в сутки в течение 21 дня.

Произв.: Биореактор (Россия)

Эглонил® (Eglonil®)

Сульпирид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит сульпирида 50 мг; в упаковке 30 шт.

1 таблетка - 200 мг; в упаковке 12 шт.

1 ампула с 2 мл инъекционного раствора - 100 мг; в упаковке 6 шт.

100 мл 0,5% раствора для приема внутрь (предпочтительно для детей) - 500 мг (1 чайная ложка 5 мл - 25 мг и 20 капель - 5 мг); во флаконах по 200 мл.

Фарм. действ.: Нейролептическое (биполярное): растормаживающее (активирующее), уменьшение продуктивной симптоматики (в дозах более 600 мг/сутки).

Показ.: Острые и хронические психозы (заторможенность, бред, спутанность сознания, аграмматизм, абулия), шизофрения, невротические состояния, сопровождающиеся заторможенностью, психосоматическая симптоматика (особенно при язвенной болезни ЖКТ и геморрагическом ректоколите).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, подозрение на феохромоцитому, беременность, лактация.

Поб. действ.: Заторможенность, сонливость, гиперпролактинемия, аменорея, галакторея, гинекомастия, импотенция, фригидность, увеличение массы тела, дискинезии, экстрапирамидные расстройства, ортостатическая гипотензия, злокачественный нейролептический синдром (гипертермия).

Взаим.: Несовместим с леводопой, гипотензивными средствами, алкоголем и др. препаратами, угнетающими ЦНС.

Примен. и доз.: Психозы: в/м - по 200-800 мг/сутки (2-8 ампул) в течение 2 нед; внутрь - при негативной симптоматике - по 200-600 мг/сутки (1-3 таблетки), при продуктивной симптоматике - по 800-1600 мг/сутки (4-8 таблеток), при двигательной заторможенности и психосоматических расстройствах - 2-4 капсулы в день (100-200 мг/сутки), при язвенной болезни ЖКТ - по 3 капсулы в день в течение 4-6 нед. Детям (предпочтительно в виде раствора для приема внутрь) - по 5-10 мг/кг массы тела в сутки (1 кофейная ложка - 25 мг; 4 капли - 1 мг).

Предост.: С осторожностью назначают больным с почечной недостаточностью, эпилепсией, паркинсонизмом, пожилым и новорожденным, работающим с техникой и транспортными средствами.

Произв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Эдекс® (Edex®)

Алпростадил*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с сухим веществом для приготовления инъекционного раствора содержит алпростадил 20 мкг.



1 флакон - 5; 10 или 20 мкг. Вспомогательные вещества - лактоза и альфадекс.

Фарм. действ.: Улучшение микроциркуляции в половом члене.

Показ.: Эректильная дисфункция (диагностическая оценка и лечение).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, заболевания крови.

Поб. действ.: Боль в месте инъекции, гематома, кавернит, фиброзные узлы, бляшки, девиации полового члена. Редко - гипотензия, головокружение.

Взаим.: Миотропные спазмолитики, альфа-адреноблокаторы увеличивают длительность эффекта. Сочетание с МАО может вызвать развитие гипертонического криза.

Передоз.: При развитии ригидной затнувшейся более 3 ч эрекции - контроль врача, местное введение альфа-адреномиметиков (эфедрина, адреналина и др.) или аспирация крови из кавернозных тел.

Примен. и доз.: Инъекции: начальная доза - 2,5 мкг, увеличение индивидуально, средняя разовая доза - 10-20 мкг, максимальная разовая - 40 мкг.

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Эдицин® (Edicin®)

Ванкомицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит ванкомицина (в форме гидрохлорида) 500 или 1000 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Фармакокин.: В/в введение 1 г обеспечивает концентрацию в плазме 25 мкг/мл на 2,5 ч, период полужизни составляет 6 ч. В течение первых 24 ч около 75% дозы выводится почками (клубочковая фильтрация). Минимальная ингибирующая концентрация менее 5 мкг/мл, для *Staphylococcus aureus* - 10-20 мкг/мл.

Фармакодин.: Ингибирующий синтез пептидогликана клеточной стенки бактерий на стадии появления мономеров дополнительно действует на цитоплазматическую мембрану бактериальной клетки в период роста и покоя, изменяя ее проницаемость, тормозит образование РНК. Эффективен в отношении многих грамположительных микроорганизмов: стафилококков (*Staphylococcus aureus* и *epidermis*, включая метициллин - резистентные штаммы), стрептококков (*Streptococcus pyogenes*, *pneumonia*, *agalactiae*), энтерококков (*E. faecalis*),

Listeria spp., *Corynebacterium*, *Clostridium spp.*

Клин. фарм.: Развитие устойчивости стафилококков в течение курса лечения встречается редко. В связи с уникальным механизмом действия не возникает перекрестной резистентности с другими антибиотиками.

Показ.: Инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами, резистентными к другим антибактериальным препаратам, или при наличии аллергии к пенициллинам и цефалоспорином: эндокардит, сепсис, остеомиелит, инфекции ЦНС, нижних дыхательных путей (пневмонии), кожи и мягких тканей (в/в); стафилококковый энтероколит, псевдомембранозный колит (внутрь).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: В период беременности используют при крайней необходимости (под контролем концентрации в плазме). С осторожностью назначают в период лактации (экскретируется с молоком).

Поб. действ.: Ототоксичность, нефротоксичность (при первых признаках их развития лечение прекращается); почечная недостаточность, интерстициальный нефрит; при быстрой в/в инфузии: анафилактикоидные реакции, кожная сыпь, покраснение верхней части тела, мышечный спазм в области шеи и спины (Red man syndrome); обратимые: нейтропения, лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, агранулоцитоз (редко); головокружение, тромбофлебит (в месте инъекции).

Взаим.: Анестетики увеличивают риск возникновения гипотензии, эритемы, крапивницы, анафилактических реакций. Соблюдать осторожность при использовании с этакриновой кислотой, аминогликозидами, полимиксином В, нейромышечными блокаторами, цисплатином и другими нейро- и нефротоксичными препаратами. При смешивании с кислотонеустойчивыми препаратами возможен физический или химический дисбаланс (из-за кислого pH раствора).

Передоз.: Развивается интоксикационная симптоматика. Лечение: симптоматическое, избыток препарата удаляется гемофильтрацией.

Примен. и доз.: В/в, медленно в течение 60 мин, назначается в разведенном виде по 500 мг каждые 6 ч или 1 г каждые 12 ч (не более 10 мг/кг). Детям: новорожденным до 7 дней жизни - 15 мг/кг, затем из расчета 10 мг/кг каждые 12 ч. Грудным детям до 1 мес:

начинают с 15 мг/кг, затем из расчета 10 мг/кг каждые 8 ч. Детям от 1 мес и старше - 40 мг/кг в день, разделенная на введения каждые 6-12 ч. Пациентам с почечной недостаточностью начальная доза - 15 мг/кг, далее в соответствии с клиренсом креатинина (мл/мин) - 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, - доза (мг/24 ч), соответственно, 1,545; 1,390; 1,235; 1,080; 925, 770, 620, 465, 310, 155. Внутрь, доза разводится 30 мл воды, вводится через назогастральную трубку. Взрослым - 500 мг - 2 г в день в 3-4 приема, курс - 7-10 дней (не более 2 г в сутки). Детям суточная доза - 40 мг/кг в 3-4 приема (не более 2 г в сутки), курс - 7-10 дней. Сиропа и отдушки могут быть использованы для улучшения вкуса раствора. Разведение раствора: развести 500 мг содержимого флакона в 10 мл или 1 г содержимого до 20 мл стерильной водой для инъекций для получения концентрации 50 мг/мл. Дальнейшее разведение необходимо: приготовленные растворы, содержащие 500 мг ванкомицина, должны быть разведены, как минимум, 100 мл растворителя, содержащие 1000 мг - как минимум, 200 мл растворителя. Для разведения обычно используется 0,9% раствор хлорида натрия для инъекций или 5% раствор декстрозы для инъекций. Стабильность растворов: растворы, приготовленные на основе 0,9% хлорида натрия или 5% декстрозы, могут храниться в холодильнике в течение 14 дней без значительной потери активности.

Предост.: Вводить медленно, при быстром (в течение нескольких минут) введении возможно падение АД и остановка сердца. Осторожно назначать пациентам с недостаточностью слуха и почечной недостаточностью в связи с возможной ото- и нефротоксичностью. У грудных детей и пожилых пациентов из-за пониженной функции почек необходимо уменьшение дозы или увеличение интервала между введениями под контролем концентрации в плазме для предупреждения кумуляции в организме. При назначении пациентам с дисфункцией почек и пациентам старше 60 лет требуется контроль плазменных концентраций и функции слуха.

Произв.: Lek (Словения)

Эднит (Ednit)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 2,5; 5; 10 или 20 мг; в упаковке 28 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, ингибирование ангиотензинпревращающего фермента.

Показ.: Артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек во время приема других ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (в анамнезе), беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Артериальная гипотензия, обморок, головная боль, головокружение, слабость, нарушения зрения, тошнота, диарея, кашель, бронхоспазм, гиперкалиемия, обратимое повышение уровня креатинина в крови, ангионевротический отек и другие аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает эффекты других гипотензивных средств, диуретиков тиазидного ряда (не следует комбинировать с калийсберегающими), алкоголя, наркотических анальгетиков.

Примен. и доз.: При артериальной гипертензии начальная доза - 5 мг в день (монотерапия), при необходимости ее постепенно увеличивают до 10-40 мг в день (в 1-2 приема); при сочетании с диуретиками начальная доза - 2,5 мг в день. При хронической сердечной недостаточности начальная доза - 2,5 мг в день, при необходимости ее постепенно увеличивают до 5-10 мг в день.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Экалин (Ecalin®)

Эконазол*

Сост. и ф.в.: 1 г крема содержит эконазола нитрата 0,01 г; в тубах по 30 г.

100 г аэрозоля - 1 г; в аэрозольных упаковках по 50 г.

1 суппозиторий вагинальный - 150 мг; в коробке 3 шт.

Фарм. действ.: Противогрибковое широкого спектра, антибактериальное.

Фармакодин.: Обладает фунгицидным эффектом, проявляющимся в отношении *Trichophyton* (*rubrum*, *mentagrophytes*, *tonsurans*), *Microsporum* (*canis*, *andonini*, *gypseum*), *Candida albicans*, а также вызывает гибель ряда грамположительных бактерий. Действие развивается в течение 3 дней.

Показ.: Дерматомикозы гладкой кожи (любой локализации), онихии и паронихии, вызванные кандидой, сапрофитами, педикулезом, верруциформной, эритроизомой; вульвовагинальные микозы, бели и кольпит, вызванные грибками; микозы

со вторичной инфекцией (суперинфекция грамположительными бактериями).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: В I триместре беременности возможно только по жизненным показаниям, во II и III триместрах - в случае необходимости. При лактации назначают с осторожностью.

Поб. действ.: Эритема, зуд (при использовании суппозиториев).

Примен. и доз.: Местно. Наносят крем на пораженное место тонким слоем или распыляют аэрозоль с расстояния не менее 10 см и втирают до полного всасывания 2 раза в день. Суппозитории вагинальные - вводят по одному суппозиторию глубоко во влагалище перед сном в течение 3 дней подряд.

Произв.: ЈАКА-80 (Македония); Акрихин (Россия)

Экзацил (Exacyl)

Транексамовая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит транексамовой кислоты 250 или 500 мг; в упаковке 20 шт.

1 ампула с 5 мл раствора для инъекций - 500 мг; в упаковке 5 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для приема внутрь - 1 г; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гемостатическое, ингибирование фибринолиза.

Показ.: Кровотечения, связанные с активацией фибринолиза (в т.ч. при лечении фибринолитиками), меноррагии и метроррагии, желудочно-кишечные кровотечения, гематурия из нижней части мочевыводящей системы (аденома предстательной железы, злокачественные опухоли мочевого пузыря и предстательной железы, почечные камни); кровотечения в результате хирургического вмешательства на предстательной железе и мочевыводящих путях, послеоперационные оториноларингологические геморрагии.

Противопоказ.: Тромбозы, тяжелая почечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, головокружение, поражения кожи.

Взаим.: Несовместим с урокиназой, некоторыми гипертензивными средствами (норадреналином битартратом, дезоксипинефрином гидрохлоридом, метармином битартратом), с бензилпенициллином, тетрациклинами, дипиридамолом, диазепамом.

Примен. и доз.: Внутрь и в/в - по 2-4 г в сутки в 2-3 приема; детям - из расчета 20 мг/кг в сутки.

Предост.: В случае почечной недостаточности учитывают клиренс креатинина и дозу редуцируют. При почечной гематурии возникает риск механической анурии в результате образования сгустка в уретре.

Произв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Экзодерил (Exoderil®)

Нафтифин*

Сост. и ф.в.: 1 г крема или 1 мл раствора содержат нафтифина гидрохлорида 10 мг; крем в тубах по 15 и 30 г, раствор во флаконах по 10 мл.

Фарм. действ.: Противогрибковое, антибактериальное, противовоспалительное.

Клин. фарм.: Эффективен при лечении микозов волосистых участков тела и кожи с гиперкератозом.

Показ.: Дерматомикозы и онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и другими грибами.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, открытая раневая поверхность.

Поб. действ.: Местное воспаление, жжение, сухость и покраснение кожи.

Примен. и доз.: На пораженную поверхность и соседние участки, очищенные и сухие - 1 раз в день в течение 2-8 нед; при онихомикозе - 1-2 раза в день до 6 мес.

Предост.: Следует избегать попадания в глаза. Раствор нельзя наносить на открытые раны (используется крем).

Произв.: Biochemie (Австрия)

Экзосурф® педиатрический (Exosurf® neonatal)

Колфосцерил пальмитат*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит колфосцерил пальмитата 108 мг; в комплекте с растворителем (вода для инъекций).

Фарм. действ.: Суфрактакт-подобное, улучшение растяжимости легких и экскурсий грудной клетки.

Фармакодин.: Обладая поверхностно-активными свойствами, улучшает механику легких и приводит к быстрому увеличению концентрации кислорода в артериальной крови.

Клин. фарм.: Снижается тяжесть респираторного дистресс-синдрома и уменьшается частота осложнений его интенсивной терапии (особенно искусственной вентиляции легких).

Показ.: Респираторный дистресс-синдром у новорожденных.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Легочное кровотечение (чаще у недоношенных детей); редко - обструкция эндотрахеальной трубки, апноэ.

Передоз.: При передозировке необходимо отсосать суспензию из трубки и трахеи и перевести ребенка на поддерживающее лечение.

Примен. и доз.: Эндотрахеально (интубированным детям, находящимся на искусственной вентиляции легких), содержимое флакона разводят в 8 мл стерильной воды для инъекций и в дозе 5 мл/кг вводят шприцем в эндотрахеальную трубку через боковое отверстие в специальном эндотрахеальном адаптере без прерывания механической вентиляции легких, дозу вводят медленно (не менее 4 мин). Повторно вводят ту же дозу тем же способом через 12 ч, если ребенок остается интубированным.

Предост.: Если асептический режим не может быть обеспечен, суспензию готовят перед применением и неиспользованную часть выбрасывают. Лечебная процедура требует от медперсонала владения методами интубации и искусственной вентиляции легких у новорожденных, применяется только в реанимационных отделениях. Не следует интубировать детей лишь для введения препарата. Аппликацию следует замедлить или прекратить, если у ребенка ухудшается цвет кожи, замедляется ритм сердечных сокращений, резко снижается концентрация кислорода в крови, накапливается суспензия в эндотрахеальной трубке.

Пронзв.: Glaxo Wellcome (Великобритания)

Экстенциллин (Extencilline®)

Бензатина бензилпенициллин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит бензатин бензилпенициллина 600000, 1200000 или 2400000 ЕД; в комплекте с растворителем соответственно по 2, 4 и 8 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: После в/м введения медленно гидролизуются с высвобождением бензилпенициллина. C_{max} в крови достигается через 12-24 ч после инъекции. На 14-й день после введения 2,4 млн. ЕД концентрация в сыворотке составляет 0,12 мкг/мл; на 21-й день после введения 1,2 млн. ЕД у 89-97,4% больных наблюдается концентрация 0,06 мкг/мл (1 ЕД = 0,6 мкг). Проникновение в жидкости полное, в ткани - очень слабое. Связь с белками плазмы 40-60%. Выводится преимущественно почками в неизмененном виде. Преодолевает плацентарный барьер, проникает в молоко матери.

Показ.: Сифилис, ревматизм (профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Анемия, тромбоцитопения, лейкопения, гипокоагуляция, аллергические реакции (повышение температуры, крапивница, эозинофилия, отек Квинке, анафилактический шок).

Примен. и доз.: В/м, глубоко, предварительно растворив порошок в воде для инъекций. Для профилактики ревматизма взрослым вводят каждые 15 дней по 2400000 ЕД, детям (в зависимости от возраста) - по 600000-1200000 ЕД. Для лечения сифилиса - 8 дней по 2400000 ЕД.

Предост.: При появлении любой аллергической реакции требуется немедленное прекращение лечения. Недопустимо в/в введение.

Пронзв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Элдеприл (Eldepryl®)

Селегилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит селегилина 5 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антипаркинсоническое, ингибирование МАО типа В.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Сухость во рту, расстройства сна, повышение АЛТ в сыворотке.

Взаим.: Усиливает эффект леводопы.

Примен. и доз.: Внутрь, по 5-10 мг утром.

Пронзв.: Orion (Финляндия)



Элдицин (Eldisine®)

Виндезин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит виндезина сульфата 1 или 5 мг и маннита 5 или 25 мг, в комплекте с растворителем.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, блокада митоза в метафазе.

Клин. фарм.: Проявляет онколитическую активность у больных с рецидивом, возникшем на фоне комбинированного применения нескольких препаратов (включая винкристин).

Показ.: Острый лимфолейкоз у детей (при резистентности к винкристину), лимфомы (кроме болезни Ходжкина), хронический гранулоцитарный лейкоз (бластный криз), рак легкого (кроме мелкоклеточного), рак молочной железы (при неэффективности гормональной терапии), злокачественная меланома.

Противопоказ.: Тяжелая гранулоцитопения (в т.ч. лекарственная) и тромбоцитопения, тяжелые бактериальные инфекции, демиелинизирующая форма синдрома Шарко-Мари.

Поб. действ.: Анорексия, боли в животе, тошнота, рвота, запоры, понос, стоматит, кишечная непроходимость, поражения нервной системы: парестезии, периферический неврит, боли в челюсти, головная боль, утрата глубоких сухожильных рефлексов, общее недомогание, слабость, депрессия, судороги, слепота; лейкопения (дозозависимая), гранулоцитопения, тромбоцитопения, острая одышка, бронхоспазм; генерализованные миалгии, боль в области опухоли; облысение, кожные высыпания, озноб, лихорадка; реакция в месте введения (раздражение, целлюлит, флебит).

Взаим.: При комбинировании с митомицином С (особенно при наличии расстройств легочной функции) возрастает вероятность возникновения острой одышки и тяжелого бронхоспазма. Снижает уровень фенитоина в крови (повышает судорожную готовность).

Передоз.: Симптомы - усиление выраженности побочных эффектов. Лечение - симптоматическое: при тошноте и рвоте - противорвотные средства, для профилактики кишечной непроходимости - слабительные. Обязателен контроль функций сердечно-сосудистой системы, ежедневный анализ крови и при необходимости - гемотрансфузия и антибиотикотерапия.

Примен. и доз.: Только в/в, в виде болюсной инъекции (прямо в вену или через систему для инфузий) с предварительным разведением до 1 мг/мл (водой для инъекций, раствором глюкозы или физиологическим раствором). Взрослым - обычно по 3 мг/кв.м поверхности тела, детям - по 4 мг/кв.м с интервалами 7-10 дней в течение 1-3 мес (или по альтернативной схеме - по 2 мг/кв.м в течение 2 дней подряд с перерывом 5-7 дней и повторением цикла). Оптимальной считают дозу, вызывающую легкую или умеренную лейкопению (следует избегать стойкой лейкопении ниже 2500/куб.мм). Максимальное снижение числа лейкоцитов наступает обычно через 3-5 дней после инъекции, восстановление - через 7 и более дней. Взрослым при снижении функции костного мозга (вследствие предшествующей терапии) рекомендуется уменьшение дозы. Максимальная суммарная доза - 4 мг/кв.м.

Предост.: Требуется осторожность при одновременном применении других средств, обладающих нейротоксичностью. Внутривенное введение препарата смертельно. Вводить следует в самую крупную из доступных вен и перед введением убедиться, что игла расположена правильно. Инъекции рекомендуется поручать только персоналу, имеющему опыт введения элдицина. Больного необходимо предупредить о риске, связанном с лечением. Требуется постоянное врачебное наблюдение за деятельностью сердечно-сосудистой системы, за количеством форменных элементов крови. Необходимо строго придерживаться рекомендуемых дозировок. При экстравазации инъекционное введение немедленно прекращают (оставшуюся часть вводят в другую вену), место поражения умеренно прогревают и вводят гиалуронидазу. Нельзя допускать попадания препарата в глаза (раздражение и изъязвление роговицы) - если это случилось, глаза сразу промывают водой (физиологическим раствором). Не следует смешивать с другими средствами в одной емкости. При отпуске не в исходной упаковке, а в шприце последний должен иметь этикетку с надписью: "Не снимать до момента инъекции. При внутривенном введении смертельно. Только для в/в введения".

Произв.: Lilly (Швейцария)

Элоком (Elocom®)**Мометазон***

Сост. и ф.в.: 1 г крема или мази содержат мометазона фуората 1 мг; в тубах по 15 и 30 г.

1 мл лосьона для наружного применения - 1 мг в водно-спиртовом растворе; во флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, противозудное, сосудосуживающее.

Показ.: Мазь и крем: псориаз, атопический дерматит; лосьон: поражения кожи волосистой части головы.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Применение возможно только, если польза для матери превышает потенциальную угрозу для плода или младенца.

Поб. действ.: Крем: парестезии, зуд и атрофия кожи; мазь: жжение, зуд, чувство покалывания или пощипывания, атрофия кожи; лосьон: жжение, фолликулит, угревидные высыпания, зуд, атрофия кожи. Другие побочные реакции (редкие): раздражение кожи, гипертрихоз, гипопигментация, периоральный дерматит, мацерация кожи, вторичная инфекция; у детей: угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, нарушения роста и развития.

Примен. и доз.: Мазь и крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в сутки. Несколько капель лосьона наносят на пораженные участки кожи волосистой части головы 1 раз в сутки и втирают мягкими движениями до полного впитывания.

Произв.: Schering-Plough (США)

Эльгидиум (Elgydium®)

Сост. и ф.в.: 100 г зубной пасты содержат хлоргексидина диглюконата 0,004 г и кальция карбоната 25 г; в тубах по 100 и 150 г.

Фарм. действ.: Антисептическое, восстановление коллагена десны, повышение pH слюны.

Показ.: Гингивиты, кровотечения из десен, пародонтопатии; профилактика кариеса и заболеваний десен.

Примен. и доз.: Чистить зубы (2-3 мин) не менее 2 раз в день, тщательно массируя участок десны, прилегающий к зубу.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Эльгифлуор (Elgyfluor®)

Сост. и ф.в.: 100 г желеобразной зубной пасты содержат никометанола фторгидрата (флуоринола) 850 мг и хлоргексидина диглюконата 4 мг; в тубах по 100 г.

Фарм. действ.: Повышение резистентности эмали к воздействию кислот.

Показ.: Лечение и профилактика кариеса, зубного камня и заболеваний десен.

Примен. и доз.: Чистить зубы (2-3 мин) 3 раза в день, можно полоскать рот (небольшое количество пасты выдавить в стакан, добавить воды и перемешать) после чистки зубов.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Эльдерин (Elderin®)**Этодолак***

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этодолака 200 или 300 (форте) мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее.

Клин. фарм.: По воздействию на ЖКТ в 2-3 раза безопаснее фенилбутазона, индометацина, напроксена, в 10 раз - сулиндака и толметина.

Показ.: Ревматизм, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартроз, болевой синдром.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, кровотечение в ЖКТ, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диспепсия. Редко - головная боль, головокружение, сыпь.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды - по 200-300 мг утром и вечером; максимальная суточная доза - 1-2 г.

Произв.: Lek (Словения)

Элюгель (Elugel®)**Хлоргексидин***

Сост. и ф.в.: 100 г геля для зубов содержат хлоргексидина диглюконата 200 мг; в тубах по 40 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое.

Показ.: Лечение и профилактика гингивитов, налета на зубах, зубного камня.

Примен. и доз.: Чистить зубы (3 мин) очень мягкой щеткой, затем прополоскать рот.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Элюдрил (Eludril®)

Сост. и ф.в.: 100 мл раствора для полосканий содержат хлоргексидина диглюконата 0,1 г, хлорбутанола 0,1 г, натрия докузата 0,1 г и хлороформа 0,5 мл; во флаконах по 90 мл.

Фарм. действ.: Антисептическое, противовоспалительное, анальгезирующее.

Показ.: Ангина, гингивиты, стоматит, афты, пародонтит, альвеолит, пред- и послеоперационная обработка полости рта, дезинфекция съемных протезов.

Противопоказ.: Не используется у новорожденных.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Полоскать (не глотая) рот (2-4 чайных ложки на полстакана воды).

Пронзв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Эмла (Emla®)

Сост. и ф.в.: 1 г крема или 1 пластырь содержат лидокаина 25 мг и прилокаина 25 мг; крем в тубах по 5 г.

Фарм. действ.: Местноанестезирующее.

Клин. фарм.: Максимальный эффект достигается через 60 мин. Длительность анестезии - 30 мин.

Показ.: Местная анестезия при проведении инъекций и поверхностных хирургических вмешательств.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, атопический дерматит в анамнезе, детский возраст (недоношенные, младше 6 мес).

Поб. действ.: Бледность, эритема, отечность, аллергические реакции (возможен анафилактический шок); местно - ощущение жжения и зуда.

Примен. и доз.: Наружно. Наносить не менее, чем за 1 ч до начала процедуры, крем наносят на поверхность кожи под повязку, убрав повязку, очищают поверхность спиртом. Для анестезии кожи взрослым и детям старше 1 года наносят 1,5 г/10 кв.см. Малые процедуры - 2 г в течение 1-5 ч, на большие поверхности - 1,5-2 г/10 кв.см в течение 2-5 ч. Детям от 6 до 12 мес - 2 г крема на площадь не более 16 кв.см (в течение 1 ч). Анестезия половых органов - 5-10 г крема на 5-10 мин (без плотной повязки) и сразу проводят процедуру.

Предост.: Нельзя наносить на слизистую оболочку и открытые раны, грудным детям (6-12 мес) - более чем на две кожные поверхности одновременно и на срок, превышающий 2 ч.

Пронзв.: Astra (Швеция)

Эмоксипин® (Emoxipin)**Эмоксипин**

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл инъекционного раствора содержит эмоксипина 0,01 г; в коробке из картона по 10 шт.

Фарм. действ.: Снижение сосудистой проницаемости и вязкости крови, антиагрегационное, антигипоксантающее.

Показ.: Внутриглазные кровоизлияния, диабетическая ретинопатия, центральные хориоретинальные дистрофии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, посттравматические кровоизлияния, осложненная миопия; для защиты сетчатой оболочки глаза при воздействии света высокой интенсивности (лазерные и солнечные ожоги, лазеркоагуляция), в послеоперационном периоде у больных глаукомой с отслойкой хориоидеи, нарушения мозгового кровообращения ишемического и геморрагического характера (у взрослых).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Возбуждение (кратковременное), сонливость, повышение АД, сыпь, местные реакции: боль, ощущение жжения, зуд, покраснение, уплотнение параорбитальных тканей.

Примен. и доз.: В офтальмологии - ретробульбарно в дозе 0,5 мл 1% раствора 1 раз в сутки ежедневно в течение 10-15 дней; субконъюнктивально и парабульбарно - по 0,2-0,5 мл 1% раствора 1 раз в сутки ежедневно в течение 10-30 дней (при необходимости лечение можно повторять 2-3 раза в год). Для защиты сетчатой оболочки глаза при лазеркоагуляции, перед ограничивающей и разрушительной коагуляциями опухолей вводят ретробульбарно по 0,5 мл 1% раствора за 24 ч и за 1 ч до коагуляции. Далее применяют в течение 2-10 дней 1 раз в сутки ретробульбарно в тех же дозах (0,5 мл 1% раствора). В неврологии - в/м в дозе 0,03-0,05 г (3-5 мл 1% раствора) ежедневно 2-3 раза в сутки в течение 10-30 дней; при в/в введении перед применением препарат разводят в 100-200 мл изотонического раствора натрия хлорида и вводят капельно (20-30 капель в минуту) в дозе 0,05-0,15 г (5-15 мл 1% раствора) 1 раз в сутки ежедневно в течение 7-10 дней (при необходимости до 2 нед).

Предост.: Необходимо постоянно контролировать АД и свертываемость крови. Нельзя смешивать с др. препаратами (в одном шприце).

Произв.: Таллиннский фармацевтический завод (Эстония)

Эналаприл (Enalapril)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 5, 10 или 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, сосудорасширяющее, снижение пост- и преднагрузки, блокада АПФ, торможение синтеза альдостерона в надпочечниках.

Показ.: Артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная); хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. ингибиторам АПФ), нарушения функции почек, стеноз почечных артерий (двусторонний или единственной почки), азотемия, состояние после трансплантации почки, стеноз устья аорты, первичный гиперальдостеронизм, наследственный отек Квинке, гиперкалиемия, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Головная боль, головокружение, усталость, повышенная утомляемость, тошнота, сухой кашель, ортостатическая гипотония, сердцебиение, боли в области сердца, боли в животе, диарея, отек Квинке, нарушение функции почек и печени, протеинурия, гиперкалиемия, повышение печеночных трансаминаз и концентрации билирубина в крови, нейтропения, судороги; бессонница, нервозность, шум в ушах, выпадение волос, глоссит, импотенция, кожная аллергическая сыпь.

Взаим.: Пища с большим содержанием хлорида натрия и НПВС снижают эффект, на фоне калийсберегающих диуретиков возможна гиперкалиемия; замедляет выведение лития, усиливает действие алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь, до, во время или после еды. При артериальной гипертензии начинают с 5 мг однократно, затем возможно увеличение дозы до 10-20 мг в сутки в 2 приема (максимально - до 40 мг, редко - 80 мг в сутки); при реноваскулярной гипертензии - по 5 мг однократно, при хронической сердечной недостаточности - 2,5 мг однократно.

Произв.: Nemofarm (Югославия)

Энам (Enam)

Эналаприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 2,5; 5 или 10 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Антигипертензивное, блокада АПФ.

Показ.: Артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, диабетическая нефропатия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, отек Квинке, двусторонний стеноз почечных артерий, беременность, лактация, детский возраст.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головная боль, кашель, беспокойство, гипотензия, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, 10-20 мг (до 40 мг при гипертензии) в сутки в 1-2 приема. При диабетической нефропатии с нормальным АД - 2,5-5 мг/сутки.

Произв.: Dr. Reddy's Laboratories (Индия)

Энап (Enap®)

Эналаприл*

Энап-5 (Enap®-5)

Эналаприл*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эналаприла малеата 5, 10 или 20 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибирование АПФ.

Фармакокин.: После перорального приема абсорбируется 60% в процессе метаболизма превращается в эналаприлат. Максимальная концентрация эналаприлата в крови достигается через 3-4 ч, равновесная - через 4 дня ($T_{1/2}$ к этому времени стабилизируется на уровне 11 ч).

Фармакодин.: Постепенно снижает АД. Не вызывает изменений в частоте сердечных сокращений и минутном объеме, уменьшает гипертрофию левого желудочка, улучшает коронарную гемодинамику, снижает чувствительность сердца к ишемическому повреждению и частоту желудочковых аритмий, уменьшает зону некроза миокарда (после инфаркта), улучшает метаболизм сердечной мышцы; поддерживает и улучшает функцию почек; не влияет на метаболизм глюкозы, липопротеидов и половую функцию.

Показ.: Артериальная гипертензия, вторичная гипертензия, вызванная паренхиматозным заболеванием почек, сердечная недостаточность, диабетическая нефропатия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Головокружение, головная боль, чувство усталости, тошнота; редко - гипотензия (в т.ч. ортостатическая), диарея, мышечные спазмы, кашель, кожная сыпь, ангионевротический отек, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, изменение вкусовых ощущений и голоса, повышение уровней мочевины, креатинина и трансаминаз в сыворотке, протеинурия, холестатическая желтуха.

Взаим.: Эффект усиливают диуретики, бета-блокаторы, метилдопа, нитраты, антагонисты кальция, гидралазин, празозин, ослабляют (и повышают риск развития нарушений функции почек) НПВС. Спиронолактон, амилорид, триамтерен и калий увеличивают риск развития гиперкалиемии. Снижает $T_{1/2}$ теофиллина и клиренс лития. Циметидин удлиняет $T_{1/2}$. Выраженность артериальной гипотензии возрастает во время наркоза и на фоне приема алкоголя.

Примен. и доз.: Внутрь. Лечение гипертензии - однократно 5 мг/сутки, поддерживающая терапия - 10-20 мг (иногда до 40 мг) за один или два приема. На фоне диуретической терапии - 2,5 мг/сутки. Застойная сердечная недостаточность - 2,5 мг/сутки за один или два приема, поддерживающая - от 5 до 20 мг в сутки (максимально 40 мг/сутки) за один или два приема в течение 2-4 нед. При почечной недостаточности - 5 мг/сутки (при клиренсе креатинина более 30 мл/мин) или 2,5 мг/сутки (при клиренсе ниже 30 мл/мин). Детям - начальная доза 2,5 мг/сутки.

Предост.: С осторожностью назначают при билатеральном стенозе почечных артерий или стенозе почечной артерии единственной почки, тяжелой форме стеноза аорты или субаортальном мышечном стенозе, генерализованном атеросклерозе. Не рекомендуется больным на гемодиализе с полиакрилонитрильными мембранами. За 2-3 дня до начала терапии рекомендуется прервать прием диуретиков (или снизить дозу) и отказаться от бессолевой диеты. После первого приема при подозрении на развитие гипергипотензии пациент должен находиться под наблюдением врача в течение 2 ч (желательно в положении лежа).

Произв.: KRKA (Словения)

Энап (Енап®)

Эналаприлат*

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит эналаприлата 1,25 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибирование АПФ.

Фармакокин.: Начало действия - через 15 мин после введения, продолжительность - около 6 ч, максимальный эффект - через 1-4 ч. Выводится в неизменном виде через почки.

Фармакодин.: Уменьшает концентрацию ангиотензина II и альдостерона в крови, повышает высвобождение ренина, улучшает функционирование калий-креин-кининовой вазодепрессивной системы, увеличивает высвобождение простагландинов и эндотелиального релаксирующего фактора вен, тормозит симпатическую нервную систему. Снижает систолическое и диастолическое АД.

Показ.: Артериальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: У больных с гипертензией (в состоянии гиповолемии и гипонатриемии), на гемодиализе, с сердечной и почечной недостаточностью в начале лечения может развиваться чрезмерная гипотензия; гипотензия у больных с цереброваскулярной или коронарной недостаточностью иногда вызывает кровоизлияние в мозг или инфаркт миокарда; головная боль, слабость, утомляемость, головокружение, повышение температуры, кожные высыпания, запор, транзиторное повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке; редко - ангионевротический отек лица и шеи, отек языка, глотки и гортани.

Взаим.: Диуретики повышают риск возникновения чрезмерной гипотензии; спиронолактон, амилорид или триамтерен - гиперкалиемии. Увеличивает токсичность лития. Совместим с препаратами наперстянки, бета-блокаторами, метилдолой, нитратами, антагонистами кальция, гидралазином, празозином.

Передоз.: Симптомы: чрезмерная гипотензия. Лечение: введение вазопрессоров, ангиотензина II, гемодиализ.

Примен. и доз.: В/в, медленно (в течение не менее 5 мин) - по 1,25 мг (1 мл) каждые 6 ч; на фоне диуретиков доза уменьшается до 0,625 мг (0,5 мл) и может быть введена повторно, если эффект неудовлетворительный; после 6 ч

лечение продолжают полной дозой (1,25 мг) каждые 6 ч. При почечной недостаточности: при клиренсе креатинина более 0,5 мл/с - 1,25 мг (1 мл) каждые 6 ч, при клиренсе креатинина, не превышающем 0,5 мл/с, начинают с 0,625 мг (0,5 мл), при неудовлетворительном эффекте (через 1 ч) дозу вводят повторно, а по истечении 6 ч продолжают лечение полной дозой. Для больных на гемодиализе - 0,625 мг (0,5 мл) каждые 6 ч. Лечение длится 48 ч. При переводе на пероральную форму (таблетки Энап) назначают 5 мг/сутки (при использовании ранее полной инъекционной дозы) или 2,5 мг/сутки (при лечении половинной дозой).

Предост.: Лечение с цереброваскулярной или коронарной недостаточностью следует начинать с половины обычной дозы. В случае развития артериальной гипотензии больному придают горизонтальное положение.

Произв.: KRKA (Словения)

Энап-Н (Енап®-Н)

Энап НL (Енап® НL)

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка Энап-Н содержит эналаприла малеата 10 мг и гидрохлортиазида 25 мг; в упаковке 20 шт.

1 таблетка Энап-НL - 10 и 12,5 мг действующих веществ соответственно; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, ингибция АПФ, диуретическое.

Фармакокин.: При пероральном приеме всасывается около 60%, максимальная концентрация в крови достигается через 3-4 ч; действие сохраняется 24 ч.

Фармакодин.: Гидролизуется в организме до эналаприлата, который, ингибируя АПФ, снижает концентрацию ангиотензина II и уменьшает выделение альдостерона, потерю калия на фоне гипотензии. Сочетание гидрохлортиазид + эналаприл-малеат оказывает более интенсивное гипотензивное действие, чем каждый из них в отдельности.

Показ.: Эссенциальная гипертензия.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин или уровень в плазме превышает 3 мг/100 мл), тяжелая печеночная недостаточность, выраженный стеноз митрального (аортального) клапана, первичный гиперальдостеронизм.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Диспептические расстройства, головокружение, головная боль, мышечные спазмы, кашель, кожные высыпания; идиосинкразия (ангионевротический отек - отек языка и горла); увеличение мочевины в крови или сыворотке.

Взаим.: Эффект усиливают гипотензивные препараты, барбитураты, трициклические антидепрессанты, препараты лития, фенотиазины, алкоголь, ослабляют - анальгетики, НПВС, избыточное потребление поваренной соли. Риск гиперкалиемии увеличивает амилорид. Цитостатики, иммунодепрессанты, системные кортикостероиды снижают количество лейкоцитов.

Примен. и доз.: Внутрь, независимо от времени приема пищи, от 1 до 2 таблеток (Энап-Н или Энап-НL) 1 раз в день.

Предост.: За три дня до начала лечения больным, принимающим диуретики, рекомендуется их отмена или снижение дозировки. Следует с осторожностью использовать в комбинации с препаратами дигиталиса, назначать больным со сниженной функцией почек (клиренс креатинина от 30 до 80 мл/мин), имеющим стеноз почечной артерии, получающим аллопуринол или его комбинации, принимающим пероральные противодиабетические препараты. При развитии гипотензии пациента рекомендуется положить в горизонтальное положение и скорректировать объем плазмы.

Произв.: KRKA (Словения)

Энгистол (Engystol®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит Vincetoxicum hirundinaria D6 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 мг, Sulfur D4 37,5 мг, Sulfur D10 37,5 мг, магния стеарата 1,5 мг, лактозу; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антивирусное, иммуномодулирующее, симпатолитическое.

Клин. фарм.: При тяжелых инфекционных состояниях (выраженная лихорадка, сепсис) первый прием препарата может ухудшить состояние (на 3-5 ч).

Показ.: Вялотекущие хронические заболевания внутренних органов, вирусные инфекции, сепсис, интоксикации, аллергия, агранулоцитоз, невриты, заболевания почек, печени, костного мозга, сердечной мышцы.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Сублингвально, по 1 таблетке 3 раза в день.

Произв.: Heel (Германия)

Эндобулин (Endobulin®)

Иммуноглобулин

Сост. и ф.в.: 1 флакон содержит лиофилизированного концентрата IgG человеческого 500, 1000, 2500, 5000, 7500 или 10000 мг - в комплекте с водой для растворения (флаконы вместимостью, соответственно, 10, 20, 50, 100, 150 и 200 мл) и набором принадлежностей для растворения и введения. Общее содержание белка 55 мг/мл, IgG - 50 мг/мл, хлорида натрия 3 мг/мл, глюкозы 50 мг/мл. Не содержит консервантов.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее.

Показ.: Иммунодефицит, аутоиммунные заболевания, вирусные инфекции, адъювантная терапия острых и хронических бактериальных инфекций.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Допускается.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в (раствор готовят перед использованием). Дозы и интервалы зависят от клинической картины.

Предост.: Активную иммунизацию (вакцины против кори, свинки, краснухи и др.) можно использовать не ранее, чем через шесть месяцев.

Произв.: Immuno (Австрия)

Эндотелон (Endotelon®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка с гастрорезистентной оболочкой содержит очищенного экстракта виноградных косточек со стандартным содержанием процианидоловых олигомеров 50 или 150 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Ангиопротективное, вено-tonизирующее, уменьшение ломкости и проницаемости капилляров, защита коллагена и эластина от энзиматической деградации.

Показ.: Симптоматические нарушения при вено-лимфатической недостаточности (тяжесть и боль в ногах, раздражение в виде "мурашек", неприятные ощущения при переходе в горизонтальное положение и др.), лимфатические отеки после терапии рака груди (устранение субъективного ощущения натянутости кожи), осложнения, связанные с нарушениями ретикулярной и/или хорoidalной циркуляции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Во время лечения не рекомендуется кормление грудью.

Поб. действ.: Головная боль, боли в животе, тошнота, кожные аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во флебологической и лимфологической практике - по 150 мг 2 раза в день (утром и вечером) в течение 20 дней, в офтальмологической - по 100-150 мг в день.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Эндур-ВМ (Endur-VM®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка ретард содержит витамина А (бета-каротин пальмитат) 7000 МЕ, витамина D (кальциферол) 400 МЕ, витамина Е (альфа-токоферолацетат) 30 МЕ, витамина С (аскорбиновая кислота) 100 мг, фолиевой кислоты 400 мкг, витамина В₁ (тиамина мононитрат) 5 мг, витамина В₂ (рибофлавин) 6 мг, витамина В₃ (никотиновая кислота и никотинамид) 30 мг, витамина В₆ (пиридоксина гидрохлорид) 7 мг, витамина В₁₂ (цианокобаламин) 15 мкг, пантотеновой кислоты (кальция пантотенат) 15 мг, биотина 100 мкг, йода (йодид калия) 150 мкг, цинка (оксид) 15 мг, меди (сульфат) 2 мг, хрома (квасцы) 5 мкг, молибдена (квасцы) 15 мкг, марганца (сульфат) 5 мг, магния (оксид) 50 мг, кальция (фосфат) 100 мг, фосфора (фосфат калия) 56 мг; во флаконе 60 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов.

Фармакокин.: Всасывается в течение 6-8 ч, поскольку витамины и микроэлементы постепенно и равномерно высвобождаются из таблетки: в течение первого часа - около 50%, к шестому часу - около 96%.

Фармакодин.: Действие определяется эффектами входящих в его состав витаминов и минеральных веществ, в форме коферментов, участвующих в основных окислительно-восстановительных процессах в организме. Активирует неспецифическую резистентность организма.

Показ.: Взрослым и детям старше 4-х лет при гиповитаминозе, минеральной недостаточности, пониженной сопротивляемости к инфекционным и простудным заболеваниям, повышенной физической и психо-эмоциональной нагрузке, неполноценном питании, неблагоприятной экологической обстановке, атеросклерозе, заболеваниях нервной системы, ЖКТ, кожи, лучевой болезни, анемии, сахарном диабете.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день (желательно во время утреннего приема пищи). Не запивать горячими жидкостями.

Произв.: Endurance Products (США)

Эндур-Е 200 (Endur-E 200®)

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит витамина Е (альфа-токоферолаацетат) 200 МЕ и кальция (фосфат) 100 мг; во флаконе 60 шт.

Фарм. действ.: Антиоксидантное, восполнение дефицита витамина Е и кальция в организме.

Фармакодин.: Участвуя в энергетическом обмене, оказывает не прямое влияние на поглощение кислорода митохондриями; регулирует биосинтез белков, нуклеиновых кислот и стероидов; предупреждает гемолиз эритроцитов, препятствует повышенной проницаемости капилляров.

Показ.: Бесплодие, угрожающий аборт, климакс, атрофия слизистой дыхательных путей, переутомление, ревматические заболевания, мышечная дистрофия, парезы, постинфекционная вторичная миопатия, фиброзы, нарушение функции половых желез у мужчин, недостаточное питание, анемии, хронический гепатит, поражение кожи и слизистых половых органов, амитрофический боковой склероз. В комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний: ночные мышечные судороги у больных с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (значительно улучшает артериальный кровоток в нижних конечностях и увеличивает дистанцию, которую могут пройти пациенты без боли), в составе комбинированной терапии ИБС. Глазные болезни (для уменьшения побочных реакций при лечении химиотерапевтическими препаратами); остеопороз. Эпилепсия (повышение эффективности противосудорожной терапии); повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов; повышение иммунитета; гиповитаминоз Е; реконвалесценция после заболеваний, протекавших с лихорадочным синдромом; высокие физические нагрузки; пожилой возраст; дегенеративные и пролиферативные изменения суставов и связочного аппарата позвоночника и крупных суставов. Повышенная потребность в витамине Е при увеличении потребления с пищей полиненасыщенных жирных кислот.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции, при приеме больших доз - диарея, боли в эпигастрии.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке в день, желательно во время утреннего приема пищи.

Предост.: Следует соблюдать режим дозирования. С осторожностью применяют при тяжелом кардиосклерозе, инфаркте миокарда, при повышенном риске развития тромбоза.

Произв.: Endurance Products (США)

Эндурацин (Endur-acin®)

Никотиновая кислота*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка-ретард содержит никотиновой кислоты 500 мг; во флаконе 100 или 200 шт.

Фарм. действ.: Метаболическое, сосудорасширяющее.

Фармакокин.: Всасывается в течение 6-8 ч, поскольку никотиновая кислота постепенно и равномерно высвобождается из таблетки. В течение первого часа всасывается около 50%, к восьмому часу - около 96%. Продукты деградации выводятся почками.

Фармакодин.: Никотиновая кислота нормализует содержание липопротеинов крови, снижает уровень общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов и повышает уровень ЛПВП, обладающих антиатерогенным эффектом. Обладает вазодилатирующим действием (особенно в отношении мелких сосудов), улучшает микроциркуляцию, оказывает слабый антикоагулянтный эффект.

Показ.: ИБС (хронические формы); церебральный атеросклероз и энцефалопатия; атеросклероз артерий нижних конечностей с явлениями хронической артериальной недостаточности I-III степени; микроангиопатии (воспалительные, при склеродермии, синдром Рейно); гиперлипидемия (особенно у лиц с другими факторами риска ИБС (гиперлипидемии IIa, IIb и IV типов по ВОЗ, но при уровне общего холестерина крови до 7,8 ммоль/л (300 мг/дл), и/или триглицеридов до 4,6 ммоль/л (400 мг/дл), а также при изолированной или сочетанной гипоальфахолестеринемии менее 1 ммоль/л (40 мг/дл)).

Противопоказ.: Хронический гепатит и цирроз печени любого генеза; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. в фазе ремиссии); сахарный диабет I и II типа; подагра; гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Редко - покраснение кожи лица, сухость кожи, зуд, чувство жжения, головная боль. Возможно обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, транзиторное повышение активности трансаминаз, концентрации глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови.

Взаим.: Другие гиполипидемические средства повышают риск развития токсических эффектов.

Примен. и доз.: Внутрь. Начальная доза - 500 мг 1 раз в сутки (1 таблетка) в течение первой недели и 500 мг 2 раза (по 1 таблетке утром и вечером) - во вторую неделю лечения. Начиная с третьей недели - по 500 мг 3 раза в сутки. По истечении 3 мес лечения необходимо провести биохимическое исследование крови. При недостаточном гиполипидемическом эффекте лечение продолжается в дозе 2-3 г/сутки в течение 1-2 мес. При достаточном гиполипидемическом эффекте можно сделать месячный перерыв в лечении, после чего возобновить прием препарата по вышеописанной схеме на 2,5-3 мес. Оптимальная доза препарата - 1,5-2 г/сутки. Для повышения уровня альфахолестерина при изолированной гипоальфахолестеринемии - 1 г/сутки. При умеренной дислипидемии у лиц с факторами риска, но без выраженной клиники ИБС - 0,5-1 г/сутки. При лечении атеросклероза артерий ног с явлениями хронической недостаточности II-III стадии - 3 г (по 2 таблетки 3 раза в сутки).

Предост.: Дозу следует увеличивать постепенно (подбирать наименьшую эффективную) и принимать таблетки после еды; при сильном зуде, головной боли рекомендуется предварительный прием 0,125 г ацетилсалициловой кислоты. Необходимо соблюдать осторожность при комбинировании с гипотензивными средствами, ацетилсалициловой кислотой, антикоагулянтами.

Произв.: Endurance Products (США)

Эноксор (Enoxor)

Эноксацин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит эноксацин в форме гидрата 200 мг; в блистерной упаковке по 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное широкого спектра действия, бактерицидное.

Фармакокин.: C_{max} в плазме крови достигается через 1-2 ч после приема

внутрь. $T_{1/2}$ - 4-6 ч. Выводится преимущественно почками (за 24 ч в неизмененном виде около 40% дозы).

Показ.: Инфекции мочевыводящих путей у взрослых; простатиты, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами; неосложненные острые гонококковые уретриты у мужчин.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, эпилепсия, детский и подростковый возраст (до 15 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, диарея, боли в животе, мышечные и суставные боли, расстройство внимания, судорожные припадки, кожные аллергические реакции и фотосенсибилизация; редко - эозинофилия, повышение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы в плазме.

Взаим.: Усиливает эффекты непрямых антикоагулянтов, теофиллина (повышает концентрацию в плазме). Препараты алюминия и магния снижают всасывание.

Примен. и доз.: Внутрь, обычно 2 раза в сутки во время еды. При инфекции мочевыводящих путей - по 0,2 г 2 раза в сутки в течение 5 дней (при осложненных формах - 7-15 дней), при простатитах - по 0,4 г 2 раза в сутки, длительность определяется индивидуально, при острых гонококковых уретритах - однократно 0,2 или 0,4 г в зависимости от массы тела.

Предост.: При появлении болезненных ощущений или припухания ахиллова сухожилия следует прекратить прием препарата. Избегать воздействия солнечных и УФ лучей. У пациентов с хронической почечной недостаточностью суточная доза должна быть не более 0,4 г. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с пероральными непрямыми антикоагулянтами. Не рекомендуется назначать с препаратами теофиллина.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Энтерол (Enterol)

Сост. и ф.в.: 1 саше или 1 капсула содержат лиофилизированных сахаромидов боулардии 282,5 мг (соответствует 250 мг дрожжей) и до 285,35 мг магния стеарата; в упаковке 10-20 шт.

Фарм. действ.: Антидиарейное.

Показ.: Инфекционные и неспецифические поносы, синдром "болезненно чувствительной кишки", лечение и про-

филактика осложнений антибиотикотерапии (поносов, колитов, кандидозов), профилактика диарей.

Поб. действ.: Не выявлены.

Взамн.: Несовместим с противогрибковыми антибиотиками, производными хинолиновой кислоты.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 1-2 саше или капсулы в день. Детям - по 1 саше или капсуле в день. Капсулы проглотить, запивая небольшим количеством жидкости. Саше развести в воде, перемешать, выпить. Смесь может храниться несколько дней при температуре 4 град.С.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Энфалак (Enfalac)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 400 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (81 ккал/100 мл) содержит белка 24 г, жиров 40,8 г, линолевой кислоты 8400 мг, углеводов 89,6 г, минеральных веществ (зола) 5,1 г, воды 879 г, витамина А 3100 МЕ, витамина D 510 МЕ, витамина Е 20 МЕ, витамина С 160 мг, фолиевой кислоты 290 мкг, витамина В₁ 640 мкг, витамина В₂ 1300 мкг, витамина РР 10000 мкг, витамина В₆ 600 мкг, витамина В₁₂ 4 мкг, биотина 25 мкг, пантотеновой кислоты 3700 мкг, витамина К 72 мкг, холина 96 мг, инозитола 48 мг, кальция 950 мг, фосфора 530 мг, йода 120 мкг, железа 1,8 мг, магния 96 мг, цинка 8,1 мг, меди 970 мкг, марганца 300 мкг, натрия 330 мг, калия 1000 мг, хлоридов 690 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма недоношенного ребенка необходимыми питательными веществами, витаминами, минеральными элементами и энергией.

Фармакодин.: Белковый компонент смеси представлен сывороточными белками и казеином в соотношении 60/40 и обогащен таурином - условно незаменимой аминокислотой, фактором роста и дифференцировки ЦНС для недоношенного ребенка. Жировой компонент на 39% представлен среднецепочечными триглицеридами (вследствие сниженной активности панкреатической липазы у недоношенного ребенка) и смесью растительных масел - источником ненасыщенных жирных кислот. Углеводный компонент представлен смесью полимеров глюкозы и лактозой (вследствие транзиторной лактазной недостаточности недоношенного). Осмоляльность смеси - 230 мОсм/л - существенно ниже таковой женского молока, что обеспечивает аде-

кватно низкую почечную нагрузку. Смесь обогащена витамином К, фолиевой кислотой, железом, кальцием. Энфалак адекватно обеспечивает высокие темпы роста недоношенных детей с низкой массой тела в условиях ограниченных возможностей переваривания и усвоения пищи.

Показ.: Вскармливание недоношенных детей в течение первых месяцев жизни, а также маловесных детей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Для получения 1 л смеси стандартного разведения (67 ккал/100 мл) добавляют 137 г порошка к 902 мл воды. Возможно приготовление смеси и в других разведениях (81 ккал/100 мл и 40 ккал/100 мл). Прием начинают с разбавленной смеси (40 ккал/100 мл), после чего постепенно увеличивают концентрацию (67 или 81 ккал/100 мл). Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом клинической ситуации.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

ЭнфаМама (EnfaMama)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г.

1 л готового напитка со вкусом шоколада или персика (830 ккал) содержит белка 51 г, жиров 7,8 г, углеводов 140 г, минеральных веществ (зола) 11,5 г, воды 870 г, витамина А 1760 мкг, витамина D 10,8 мкг, витамина Е 17,4 мкг, витамина С 87 мг, фолиевой кислоты 868 мкг, тиамина 1500 мкг, витамина В₂ 1700 мкг, витамина РР 17400 мкг, витамина В₆ 2100 мкг, витамина В₁₂ 6,9 мкг, биотина 260 мкг, пантотеновой кислоты 8680 мкг, инозитола 119 мг, кальция 1840 мг, фосфора 1410 мг, йода 130 мкг, железа 43 мг, магния 163 мг, натрия 780 мг, калия 2170 мг, хлоридов 1610 мг, цинка 32,6 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение беременных и кормящих женщин питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Фармакодин.: Содержит повышенное количество легкоусваиваемого белка (25% энергетической ценности продукта), необходимого для роста плода и обеспечения белкового компонента материнского молока. Углеводный компонент обогащен фруктозой и глюкозой, обеспечивающих дополнительные энер-

гетические потребности беременной и кормящей женщины. Пятикратное, в сравнении с коровьим молоком, снижение уровня жира позволяет контролировать прибавку массы тела в период беременности. Ассоциированный с беременностью и кормлением грудью дефицит фолиевой кислоты, с которым связано формирование пороков развития нервной трубки, полностью компенсируется одной-двумя порциями ЭнфаМамы в день (200-400 мкг в сутки). Продукт обогащен железом, кальцием, цинком, другими минеральными веществами и микроэлементами, витаминами, в т.ч. - бета-каротином. Применение продукта оптимизирует питание беременной и кормящей женщины, адекватно обеспечивая дополнительные пищевые потребности.

Показ.: Беременность, кормление грудью (дополнение к обычному питанию).

Примен. и доз.: К 100 мл воды комнатной температуры добавляют 50 г порошка (2 мерных стаканчика по 25 г). Перемешивают до полного растворения, добавляют еще 100 мл холодной воды, встряхивают. Принимают внутрь - по 1 порции препарата каждое утро (вечер) вместе с едой; дневная норма - 230 мл. Приготовленный к употреблению напиток употребляют немедленно или хранят в холодильнике не более 24 ч.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Энфамил (Enfamil)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г; в упаковке 24 шт.

1 л готовой смеси (670 ккал) содержит белка 15 г, жиров 37 г, углеводов 70 г, витамина А 2000 ЕД, витамина D 400 ЕД, витамина Е 12 ЕД, витамина С 75 мг, фолиевой кислоты 50 мкг, тиамина 500 мкг, рибофлавина 1200 мкг, ниацина 8000 мкг, витамина В₆ 450 мкг, витамина В₁₂ 2,6 мкг, биотина 19 мкг, пантотеновой кислоты 3800 мкг, витамина К 60 мкг, холина 80 мг, кальция 550 мг, фосфора 420 мг, йода 45 мкг, железа 1,5 мг, магния 50 мг, цинка 4,5 мг, меди 420 мкг, марганца 60 мкг, натрия 190 мг, калия 830 мг, хлоридов 450 мг, линолевой кислоты 6,0 г.

Фарм. действ.: Обеспечение организма ребенка первого года жизни необходимыми питательными веществами, витаминами, минеральными элементами и энергией.

Показ.: Кормление новорожденных и грудных детей при недостатке или отсут-

ствии материнского молока, различных препятствиях для кормления грудью.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом возраста ребенка и клинической ситуации. При приготовлении необходимо четко придерживаться указанного на упаковке соотношения количества мерных ложек и объема воды. Смесь готовят непосредственно перед каждым кормлением ребенка. Оставшуюся часть разведенной смеси хранят в холодильнике и используют в течение 24 ч после приготовления.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Энфамил 1 (Enfamil 1)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г; в упаковке 24 шт.

1 л готовой смеси (676 ккал) содержит белка 14,9 г, таурина 41 мг, жиров 37 г, линолевой кислоты 6,1 г, альфа-линоленовой кислоты 640 мг, углеводов 70 г, минеральных веществ (зола) 2,9 г, витамина А 600 мкг, витамина D 10 мкг, витамина Е 14 МЕ, витамина С 81 мг, фолиевой кислоты 108 мкг, витамина В₁ 540 мкг, витамина В₂ 950 мкг, витамина РР 6800 мкг, витамина В₆ 410 мкг, витамина В₁₂ 2 мкг, биотина 20 мкг, пантотеновой кислоты 3400 мкг, витамина К 54 мкг, холина 81 мг, кальция 450 мг, фосфора 300 мг, соотношение Са:Р (1,5:1), йода 101 мкг, железа 8 мг, магния 54 мг, цинка 6,8 мг, меди 440 мкг, марганца 68 мкг, натрия 176 мг, калия 740 мг, хлоридов 470 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма детей с рождения до 6 мес питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Показ.: Кормление новорожденных и грудных детей (до 6 мес) при недостатке или отсутствии материнского молока, различных препятствиях для кормления грудью.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом возраста ребенка и клинической ситуации. При приготовлении необходимо четко придерживаться указанного на упаковке соотношения количества мерных ложек и объема воды. Смесь готовят непосред-

ственно перед каждым кормлением ребенка. Оставшуюся часть разведенной смеси хранят в холодильнике и используют в течение 24 ч после приготовления.

Предост.: Используется только по рекомендации врача.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Энфамил 2 (Enfamil 2)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (676 ккал) содержит белка 22 г, таурина 40 мг, жиров 30 г (линолевой кислоты 5 г, альфа-линоленовой кислоты 500 мг), углеводов 80 г, минеральных веществ (зола) 5 г, витамина А 600 мкг, витамина D 400 МЕ, витамина Е 14 МЕ, витамина С 80 мг, фолиевой кислоты 100 мкг, тиамина 540 мкг, витамина В₂ 1000 мкг, ниацина 6800 мкг, витамина В₆ 600 мкг, витамина В₁₂ 2 мкг, биотина 20 мкг, пантотеновой кислоты 3400 мкг, витамина К 54 мкг, холина 80 мг, инозитола 34 мг, кальция 784 мг, фосфора 620 мг, йода 54 мкг, железа 12 мг, магния 74 мг, цинка 6,8 мг, меди 500 мкг, марганца 100 мкг, натрия 330 мг, калия 1000 мг, хлоридов 680 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма ребенка необходимыми питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и энергией.

Показ.: Кормление грудных детей в возрасте от 6 мес до 1 года при недостатке или отсутствии материнского молока, различных препятствиях для кормления грудью.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом возраста ребенка и клинической ситуации. При приготовлении смеси необходимо четко придерживаться указанного на упаковке препарата соотношения количества мерных ложек и объема воды. Смесь готовят непосредственно перед каждым кормлением ребенка. Оставшуюся разведенную смесь хранят в холодильнике и используют в течение 24 ч после приготовления.

Предост.: Используют только по рекомендации врача. Не рекомендуется применять для вскармливания детей до 6 мес жизни. Следует иметь в виду, что, если смесь сильно разбавлена или концентри-

рованная, ребенок не будет получать полноценного питания.

Произв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Энфамил с железом (Enfamil with iron)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 450 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (670 ккал) содержит белка 15 г, жиров 37 г, углеводов 70 г, витамина А 2000 ЕД, витамина D 400 ЕД, витамина Е 12 ЕД, витамина С 75 мг, фолиевой кислоты 50 мкг, тиамина 500 мкг, рибофлавина 1200 мкг, ниацина 8000 мкг, витамина В₆ 450 мкг, витамина В₁₂ 2,6 мкг, биотина 19 мкг, кальция 550 мг, пантотеновой кислоты 3800 мкг, витамина К 60 мкг, холина 80 мг, фосфора 420 мг, йода 45 мкг, железа 12 мг, магния 50 мг, цинка 4,5 мг, меди 420 мкг, марганца 60 мкг, натрия 190 мг, калия 830 мг, хлоридов 450 мг, линолевой кислоты 6,0 г.

Фарм. действ.: Обеспечение организма ребенка первого года жизни необходимыми питательными веществами, витаминами, минеральными элементами, энергией.

Фармакодин.: Увеличенное до 12 мг/л содержание железа в комплексе с другими гемопоэтическими факторами профилактически компенсирует железодефицитные состояния и связанные с ними анемии.

Показ.: Кормление новорожденных и грудных детей при недостатке или отсутствии материнского молока, различных препятствиях для кормления грудью.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом возраста ребенка и клинической ситуации. При приготовлении смеси необходимо четко придерживаться указанного на упаковке соотношения количества мерных ложек и объема воды. Смесь готовят непосредственно перед каждым кормлением ребенка. Оставшуюся разведенную смесь хранят в холодильнике и используют в течение 24 ч после приготовления.

Предост.: Применяют только по рекомендации врача. Следует иметь в виду, что если смесь слишком жидкая или слишком концентрированная, ребенок не будет получать адекватное питание. Начатую банку необходимо хранить (не

более 1 мес) плотно закрытой в сухом, прохладном месте.

Прозв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Энфамил соя (Enfamil soya)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии в банках по 400 г; в упаковке 24 шт.

1 л готовой смеси (676 ккал) содержит белка 20 г, таурина 40,6 мг, жиров 36 г, линолевой кислоты 5,81 г, линоленовой кислоты 608,4 мг, L-карнитина 13,5 мг, L-метионина 378 мг, углеводов 66 г, минеральных веществ (зола) 3,3 г, воды 905 г, витамина А 2028 МЕ, витамина D 405,6 МЕ, витамина Е 13,5 МЕ, витамина С 81 мг, фолиевой кислоты 108,2 мкг, витамина В₁ 541 мкг, витамина В₂ 608,4 мкг, витамина РР 6760 мкг, витамина В₆ 406 мкг, витамина В₁₂ 2 мкг, биотина 20,3 мкг, пантотеновой кислоты 3380 мкг, витамина К 54 мкг, холина 81 мг, инозитола 115 мг, кальция 642,2 мг, фосфора 507 мг, йода 101,4 мкг, железа 12 мг, магния 74,4 мг, цинка 8,1 мг, меди 507 мкг, марганца 169 мкг, натрия 243,4 мг, калия 811,2 мг, хлоридов 541 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение быстрорастущего организма ребенка первого года жизни гипоаллергенными питательными веществами, витаминами, минеральными элементами и энергией.

Фармакодин.: Белковый компонент представлен изолятом соевого белка, обогащенного таурином, L-метионином и L-карнитином и гарантирует полноценное аминокислотное обеспечение при длительном вскармливании детей с аллергией на белок молока или его непереносимостью. В сочетании с безлактозным углеводным компонентом смесь обеспечивает диетическое лечение острых кишечных расстройств и адекватное питание в период ранней реконвалесценции.

Показ.: Кормление грудных детей при непереносимости белка коровьего молока (в т.ч. аллергии), сахарозы, лактозной недостаточности, галактоземии и дефиците галактокиназы; острые кишечные расстройства, профилактика пищевой аллергии.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом возраста ребенка и клинической ситуации. Смесь готовят непосредственно перед

каждым кормлением ребенка (1 мерная ложка сухой смеси на каждые 30 мл воды). Оставшуюся разведенную смесь хранят в холодильнике и используют в течение 24 ч после приготовления.

Прозв.: Mead Johnson Nutritionals (США)

Энфамил Юниор (Enfamil Junior)

Сост. и ф.в.: Порошок для приготовления оральной суспензии; в банках по 400 г; в коробке 24 шт.

1 л готовой смеси (676 ккал) содержит белка 33,8 г, жиров 17,3 г, линолевой кислоты 3 г, альфа-линоленовой кислоты 224 мг, углеводов 96,8 г, минеральных веществ (зола) 7,5 г, витамина А 2500 МЕ, витамина D 486 МЕ, витамина Е 12 МЕ, витамина С 80 мг, фолиевой кислоты 91 мкг, витамина В₁ 600 мкг, витамина В₂ 1500 мкг, витамина РР 8000 мкг, витамина В₆ 500 мкг, витамина В₁₂ 4 мкг, биотина 25 мкг, пантотеновой кислоты 5000 мкг, витамина К 88 мкг, холина 51 мг, инозитола 67 мг, кальция 1080 мг, фосфора 880 мг, йода 96 мкг, железа 12 мг, магния 108 мг, цинка 6 мг, меди 400 мкг, марганца 80 мкг, натрия 420 мг, калия 1620 мг, хлоридов 1000 мг.

Фарм. действ.: Обеспечение организма детей старше 1 года питательными веществами, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.

Фармакодин.: Обогащенный таурином, растительными маслами - источниками ненасыщенных жирных кислот, полимерами глюкозы, железом (12 мг/л), витаминами D, А, С, мультикомпонентно сбалансированный, с низкой осмотической нагрузкой (343 мОсм/л) Энфамил Юниор оптимизирует рацион питания ребенка старше 1 года.

Показ.: Для питания детей в возрасте старше 1 года, ослабленных и часто болеющих, а также детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Режим кормления устанавливают индивидуально с учетом возраста ребенка и клинической ситуации. При приготовлении необходимо четко придерживаться указанного на упаковке соотношения количества мерных ложек и объема воды. Смесь готовят непосредственно перед каждым кормлением ребенка. Оставшуюся часть разведенной смеси хранят в холодильнике и исполь-

зуют в течение 24 ч после приготовления.

Произв.: Mead Johnson Nutritional (США)

Эпиал (Epi^{al}®)

Карбамазепин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит карбамазепина 200 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противосудорожное, седативное, антидепрессивное.

Показ.: Эпилепсия (большие и малые припадки, фокальные приступы и др.), невралгия тройничного нерва, глоссофарингеальная невралгия, синдром алкогольной абстиненции, смешанные формы рассеянного склероза.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, АВ-блокада, беременность.

Поб. действ.: Анорексия, сухость во рту, тошнота, диарея, нарушения функции печени, головокружение, головные боли, слабость, сонливость, атаксия, эксфолиативный дерматит, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, аллергические реакции.

Взаим.: Может снижать действие оральных антикоагулянтов и надежность оральной контрацепции. Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды, запивая небольшим количеством воды. Доза подбирается индивидуально, в зависимости от симптоматики, в начале по 200 мг 2 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 800-1200 мг (в 2-4 приема) в сутки. Детям - по 10-20 мг/кг в день.

Предост.: До начала и во время лечения необходимо контролировать клеточный состав крови (в первый месяц лечения - еженедельно, затем - ежемесячно) и функцию печени. Следует иметь в виду, что снижает реакционную способность (для водителей транспорта и др.).

Произв.: Alkaloid (Македония)

Эпилем (Epilem)

Эпирубицин*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с лиофилизированным порошком для приготовления инъекционного раствора содержит эпирубицина гидрохлорида 10 или 50 мг.

Фарм. действ.: Противоопухолевое.

Показ.: Острый лейкоз, лимфома, миеломная болезнь, рак яичников, молочной железы, ЖКТ, мочевого пузыря, бронхогенный рак легкого, саркома мягких тканей, остеогенная саркома.

Противопоказ.: Миелосупрессия, кардиомиопатия, беременность, лактация.

Поб. действ.: Кардиотоксичность, левосторонняя желудочковая блокада, аритмия, гипоплазия костного мозга, потеря аппетита, рвота, тошнота, астенция, стоматит, алопеция, жар, конъюнктивит, некроз тканей (при экстравазации), аллергические реакции.

Примен. и доз.: В/в; предпочтительна медленная инфузия (в течение 3-5 мин) в дозе 60-90 мг на 1 кв.м поверхности тела в течение 21-дневного курса. Рекомендуются сниженные дозы - 60-70 мг/кв.м при угнетении функции костного мозга (из-за предшествующей лучевой или химиотерапии), метастазировании в костный мозг, печеночной недостаточности. Дозу можно принимать дробно, в течение 2-3 последовательных дней. Содержимое флакона растворяют в воде для инъекций или 0,9% растворе хлорида натрия, рекомендуемая концентрация 2 мг/мл.

Произв.: CSC (Италия)

Эпомакс (Eromax®)

Эпоэтин омега

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 1 мл раствора для инъекций содержит эпоэтина омега 2000 или 4000 МЕ. Другие ингредиенты: хлорид натрия 8,18 мг, одноосновный фосфат натрия 1,56 мг, гидроксид натрия для поддержания рН при значении 7,2, человеческий сывороточный альбумин 1,0 мг, вода для инъекций.

Фарм. действ.: Стимуляция эритропоэза.

Клин. фарм.: В случае развития в течение лечения гиперволемической гипертонии антигипертензивную терапию необходимо проводить осторожно, т.к. возможен аддитивный эффект на увеличение вязкости крови. При отсутствии влияния на уровень АД препарат следует отменить. При лечении пациентов с тромбозами (в т.ч. в анамнезе) проводятся тесты на свертываемость крови (не менее одного раза в месяц) и при необходимости назначают терапию антикоагулянтами.

Показ.: Анемия на фоне хронической почечной недостаточности.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к человеческому сывороточному альбумину или производным продуктов из млекопитающих), артериальная гипертензия, детский возраст.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется. По строгим показаниям и в наименьших

дозах только во втором и третьем триместре и в период лактации.

Поб. действ.: Гипертензия, тромбозы, гиперкалиемия, гриппоподобная симптоматика, эдема, утомляемость, судороги икроножных мышц, тахикардия, гипотензия, стенокардия, бронхит, диарея, прурит, анафилактический шок.

Передоз.: Проявляется увеличением гематокрита, уровня гемоглобина, вязкости крови, гипертензией, тромбозом. Лечение: отмена препарата, антигипертензивная и/или антикоагулянтная терапия.

Примен. и доз.: П/к, в/в, начальная доза - 20-50 МЕ/кг массы 3 раза в неделю с постепенным увеличением дозы или частоты введения до достижения эффекта. При превышении уровней гемоглобина (12 г/дл) и гематокрита (35 объемных %) прекращают лечение или уменьшают дозу. При неудовлетворительном терапевтическом ответе в начальной фазе назначают в течение 2 нед 3 раза в неделю до достижения значений 40-55 МЕ/кг (не более 120-165 МЕ/кг в неделю). При необходимости дозировка может быть увеличена до 60-75 МЕ/кг (не более 180-225 МЕ/кг в неделю). Курс продолжают до достижения нормальных уровней гемоглобина 10-12 г/дл и гематокрита 30-35 объемных %. Суммарная недельная доза не должна превышать 225 МЕ/кг. Уровень гемоглобина и гематокрит нормализуются в течение 3-6 нед. Поддерживающая доза (для сохранения достигнутых показателей +10%) - 60-100 МЕ/кг в неделю в 2-3 приема. Максимальная поддерживающая доза - 200 МЕ/кг 3 раза в неделю (600 МЕ/кг в неделю). При снижении значений гематокрита и гемоглобина на 10% ниже достигнутых необходимо увеличить дозу. Дозировка подбирается индивидуально: в начале каждого двухнедельного периода доза может быть увеличена на 15-20 МЕ/кг (общая недельная доза увеличивается на 30-60 МЕ/кг). Дозировка препарата, при которой значения уровня гемоглобина и гематокрит возвращаются в пределы указанного диапазона, используется для продолжения лечения до появления следующего увеличения показателей, превышающего 10%, или проявления побочных эффектов. При замене рекомбинантных эритропоэтинов Эпомаксом доза не должна быть выше дозы рекомбинантного эритропоэтина (50-75 МЕ/кг еженедельно, разделенная на 2-3 приема). Ожидаемое уменьшение уров-

ня гемоглобина после прекращения лечения - 0,5 г/дл в неделю.

Предост.: В начале лечения тест на гемоглобин и гематокрит проводят 2 раза в неделю до достижения значений 10-12 г/дл для гемоглобина и 30-35 объемных % для гематокрита. Затем определения проводят 1 раз в неделю. При лечении анемии отмечается улучшение аппетита, увеличение поглощения калия и протеинов. В данном случае показана диета и диализ до достижения нормальных сывороточных значений калия, креатинина и др. При терапии пациентов с тромбозами (в анамнезе или в течение лечения) 1 раз в месяц проводятся тесты на свертываемость (при необходимости назначается антикоагулянтная терапия). С осторожностью назначают пациентам с артериальной гипертензией, ишемической болезнью, конвульсиями и амнезией (параллельно проводят антигипертензивную или антикоагулянтную терапию). Необходим контроль резервного железа до и еженедельно во время лечения (уровень ферритина должен быть выше 100 нг/мл). Перед началом лечения необходимо исключить факторы, снижающие эффект: недостаточность витамина В₁₂, фолиевой кислоты, интоксикацию алюминием, инфекции, терапию кортикостероидами или иммунодепрессантами.

Произв.: Lek (Словения)

Эпрекс® (Eprex®)

Эпоэтин альфа*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 0,5 мл раствора для инъекций содержит эпоэтина альфа 1000 ЕД, с 1 мл - 2000, 4000 или 10000 ЕД; в упаковке 6 шт.

1 шприц с 0,5 мл раствора для инъекций - 1000 или 2000 ЕД, с 0,3 мл - 3000 ЕД, с 0,4 мл - 4000 ЕД и с 1 мл - 10000 ЕД; в упаковке 6 шт.

Фарм. действ.: Антианемическое, стимуляция эритропоэза.

Показ.: Анемии на фоне хронической почечной недостаточности (у больных на гемодиализе), ВИЧ-инфекции (лечение зидовудином), немиелоидных опухолей (наряду с химиотерапией).

Противопоказ.: Неконтролируемая артериальная гипертензия.

Бер. и корм. гр.: Допустимо в случаях, когда предполагаемый эффект выше потенциального риска для плода.

Поб. действ.: Повышение АД (с усугублением гипертензии), головная боль, спутанность сознания, тонико-клонические судороги, повышение количества тромбоцитов и риск тромботических ос-

ложнений, сыпь, экзема, крапивница, зуд, ангионевротический отек, краснота, чувство жжения, болезненность в месте инъекции, гриппоподобный синдром.

Взаим.: Изменяет эффект циклоспорина А - может возникнуть необходимость корректировки дозы последнего.

Передоз.: Симптомы: повышение АД, головная боль, дезориентация, судороги, повышение тромбоцитов и гемоглобина. Лечение: симптоматическое, при очень высоком уровне гемоглобина - флеботомия.

Примен. и доз.: П/к или в/в (в течение 1-2 мин), в начальной дозе - 50 ЕД/кг массы тела 3 раза в неделю; через месяц дозу можно увеличить - до 75 ЕД/кг; при необходимости возможно увеличение дозы на 25 ЕД/кг каждый месяц. Максимальная доза - не более 200 ЕД/кг массы тела 3 раза в неделю. Поддерживающую дозу подбирают индивидуально, с учетом гематокрита (не должен превышать 35 об.%), после диализа - 30-100 ЕД/кг 3 раза в неделю.

Предост.: Следует учитывать возможность резистентности, возникающей вследствие дефицита железа, фолиевой кислоты, витамина В₁₂, интоксикации алюминием, интеркуррентных заболеваний, воспаления или травм (скрытое кровотечение, гемолиз, фиброз костного мозга). Нельзя использовать в виде инфузий, а также в сочетании с растворами других лекарств.

Прозв.: Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария)

Эпситрон (Epsitron™)

Каптоприл*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка (делимая) содержит каптоприла 25 или 50 мг; в упаковке 50 и 100 шт.

Фарм. действ.: Гипотензивное, сосудорасширяющее, ингибирование АПФ.

Показ.: Артериальная гипертензия легкой и средней тяжести, тяжелая гипертензия при неэффективности др. терапии; застойная сердечная недостаточность (в составе комплексного лечения).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Нефротический синдром, гломерулонефрит, ишемические нарушения почек и сердца, ортостатическая гипотензия, тахикардия, пемфигус, потеря вкуса, протенинурия, повышение уровня азота в крови и моче, креатинина в крови (при снижении ОЦК и заболеваниях почек), ложноположительная реакция

на ацетон в моче, агранулоцитоз, лейкопения, панцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь. Дозу подбирают индивидуально. При гипертензии начальная доза - по 12,5 мг 2 раза в день с постепенным увеличением дозы при необходимости; при легкой и средней тяжести - по 25 мг 2 раза в день, но не более 100 мг в 2 приема; при тяжелой форме - не более 150 мг/сутки: 50 мг 3 раза в день. При сердечной недостаточности - по 6,25-12,5 мг 3 раза в день, при условии тщательного контроля возможно увеличение дозы до 25 мг 3 раза в день. При тяжелой форме гипертензии на фоне нарушенной функции почек следует использовать минимальные дозы в комбинацию с "петлевыми" диуретиками.

Предост.: Не рекомендуется назначать детям; лактирующие женщины на период лечения должны приостановить грудное вскармливание. С осторожностью назначают при нарушении функции почек сосудистого генеза и на фоне коллагенозов. Перед началом и регулярно в ходе приема следует контролировать функцию почек (в т.ч. на белок в моче), уровень лейкоцитов в крови. Для снижения вероятности развития симптоматической гипотензии терапию начинают с малых доз и назначают препарат на ночь.

Прозв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Эреспал (Erespal)

Фенспирид*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит фенспирида гидрохлорида 80 мг; в упаковке 30 шт.

1 мл сиропа - 2 мг.

Фарм. действ.: Противоастматическое, бронхорасширяющее, противовоспалительное (антагонизм с серотонином, гистамином, брадикинином).

Фармакокин.: Хорошо всасывается. С_{max} - через 6 ч. Выводится в основном через почки (90%).

Показ.: Бронхиальная астма, бронхоспазм, хронический бронхит (в т.ч. с дыхательной недостаточностью), аллергический ринит.

Противопоказ.: Детский возраст (таблетки).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью в первые месяцы беременности.

Поб. действ.: Диспепсия, сонливость, возбуждение, синусовая брадикардия.

Передоз.: Проявляется сонливостью или возбуждением, тошнотой, рвотой, синусовой брадикардией. Рекомендуются

промывание желудка, электрокардиографический контроль и симптоматическое лечение.

Примен. и доз.: Внутрь, до еды - по 1 таблетке (детям сироп) 2-3 раза в день.

Произв.: Servier (Франция)

Эринит® (Erynitum)

Пентаэритритила тетранитрат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит эринита 0,01 г; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Коронародилатирующее.

Показ.: Хроническая коронарная недостаточность, предупреждение приступов стенокардии.

Противопоказ.: Кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное давление, выраженная гипотензия, закрытоугольная форма глаукомы.

Поб. действ.: Диарея; крайне редко - головная боль, шум в ушах, головокружение.

Примен. и доз.: Внутрь, за 1 ч до еды в дозе 0,01-0,02 г через 4-6 ч.

Произв.: Акрихин (Россия)

Эритромицин (Erythromycinum)

Эритромицин*

Сост. и ф.в.: 1 суппозиторий содержит эритромицина 50 или 100 мг.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции дыхательных путей и легких (пневмонии, бронхиты), кожи и мягких тканей, ангина, дифтерия, дифтерийное носительство, микоплазмоз, легионеллез; профилактика стафилококковой инфекции.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, тяжелые нарушения функции печени.

Поб. действ.: Раздражение слизистой прямой кишки.

Примен. и доз.: Ректально, детям от 1 до 3 лет - по 0,4 г в сутки, от 3 до 6 лет - 0,5-0,75 г в сутки, от 6 до 8 лет - до 1 г в сутки; суточная доза делится на 4-6 частей и вводится через 4-6 ч.

Произв.: Нижфарм (Россия)

Эрмицед (Ermyced™)

Эритромицин*

Сост. и ф.в.: 5 мл сиропа с фруктовым вкусом содержат эритромицина этилсукцината 125 и 250 мг; во флаконах по 60 и 100 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Показ.: Инфекции верхних дыхательных путей (тонзиллит, ларингит, фарингит, синусит, вторичные инфекции при простудах и гриппе), нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмония, трахеит, бронхоэктатическая болезнь), уха (отит, инфекции наружного уха), глаз (блефарит), полости рта (гингивит, ангина Венсана), кожи и мягких тканей, ЖКТ; остеомиелит, уретриты, гонорея, сифилис, венерическая лимфогранулема, дифтерия, простатит, скарлатина (лечение, профилактика).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. макролидам).

Поб. действ.: Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота и др.), снижение гематокрита, гемоглобина и лейкоцитов в крови, изменение функциональных печеночных тестов.

Взаим.: Усиливает эффект дигоксина, варфарина, карбамазепина, теофиллина (в больших, токсических дозах).

Примен. и доз.: Внутрь, несколько раз в день. Взрослым (в т.ч. пожилым) и детям старше 8 лет при инфекциях легкой и средней тяжести - по 2 г в день, при острых и тяжелых формах - до 4 г в день. Детям 2-8 лет при инфекциях легкой и средней тяжести - по 1 г в день; новорожденным и детям до 2 лет при инфекциях легкой и средней тяжести - по 0,5 г в день; при тяжелых - дозу удваивают.

Предост.: С осторожностью назначают при нарушении функции печени. После вскрытия упаковки сироп рекомендуется хранить при температуре ниже 25 град.С и использовать не более 2 нед.

Произв.: Remedica - Minnex (Кипр)

Эрсефурил® (Ercefuril®)

Нифуроксазид*

Сост. и ф.в.: 1 капсула содержит нифуроксазида 200 мг; в блистерной упаковке 28 шт.

5 мл (1 мерная ложка) 4% суспензии (с банановым ароматизатором) для приема внутрь - 220 мг; во флаконах по 90 мл.

Фарм. действ.: Антибактериальное.

Фармакокин.: Действует преимущественно в просвете кишечника (практически не всасывается).

Показ.: Острая бактериальная диарея.

Противопоказ.: Гиперчувствительность к нитрофуранам, детский возраст (до 1 мес, недоношенные).

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым - по 1 капсуле (200 мг) 4 раза в день; детям от 1 до 30 мес - по 1-3 мерных ложки

(220-660 мг) суспензии за 2-3 приема, старше 30 мес - по 1 мерной ложке 3 раза в день (перед употреблением суспензию взболтать). Курс лечения - не более 7 дней.

Предост.: При необходимости следует проводить регидратацию. Объем вводимой жидкости и способ ее введения (per os, в/в) должен соответствовать степени выраженности диареи, возрасту и клиническому состоянию больного. В случае инфекционной диареи необходима систематическая антибактериальная терапия. Не следует назначать препарат при врожденном дефиците фермента, расщепляющего сахарозу (у новорожденных).

Пронзв.: Synthelabo Groupe (Франция)

Эскузан (Aescusan®)

Сост. и ф.в.: 100 г капель для приема внутрь содержат сухого экстракта из семян конского каштана в пересчете на эсцин 5,0 - 6,25 г и тиамина хлорида гидрохлорида 0,5 г; во флаконах-капельницах по 20 мл.

Фарм. действ.: Венотонизирующее, антиэкссудативное.

Фармакодин.: Снижает концентрацию лизосомальных ферментов и предотвращает распад мукополисахаридов в стенке капилляров, уменьшает трансапиллярную фильтрацию, устраняет симптомы хронической венозной недостаточности (чувство усталости, тяжести, напряжения; зуд, боли и отечность ног).

Показ.: Хроническая венозная недостаточность (варикозная, посттромботическая), функциональные нарушения кровоснабжения (флебит, застой, варикозное расширение вен, отеки, геморроидальные узлы).

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Воспаление слизистой оболочки ЖКТ, аллергические реакции.

Взаим.: Эффект снижают сульфитсодержащие растворы для в/в введения.

Примен. и доз.: Внутрь, перед употреблением встряхнуть, по 12-15 капель 3 раза в день перед едой.

Предост.: Следует иметь в виду, что препарат содержит 31% алкоголя.

Пронзв.: Pharma Wernigerode (Германия)

Эскузан (Aescusan®)

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит экстракта из плодов конского каштана, соответствующего содержанию эсцина 4 мг и тиамина хлорида гидрохлорида 2,25 мг; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Венотонизирующее.

Показ.: Хроническая венозная недостаточность различного происхождения (отеки, судороги икроножных мышц, зуд, боли и ощущение тяжести в ногах); варикозное расширение вен и посттромбофлебитический синдром; язва голени, воспалительные или послеоперационные отеки мягких тканей.

Противопоказ.: Нет.

Бер. и корм. гр.: Возможно, особенно при отеках нижних конечностей в III триместре беременности, при условии отсутствия нефропатии.

Поб. действ.: Диспепсия.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 драже 3 раза в сутки, при необходимости - по 3 драже 3 раза в сутки.

Пронзв.: JenaPharm (Германия)

Эскулюс композитум (Aesculus compositum®)

Сост. и ф.в.: 100 мл орального 35% спиртового раствора содержат Aesculus D1 10 мл, Secale cornutum D3, Viscum album D2, Tabacum D10, Solanum nigrum D6, Arnica D3, Echinacea angustifolia D2, Baptisia D4, Rhus toxicodendron D4, Cuprum D13, Ruta D4, Dulcamara D4, Colchicum D4, Barium jodatum D6, Hamamelis D4, Apis mellifica D4, Acidum benzoicum D4, Eupatorium cannabinum D3, Arteria suis D10, Natrium pyruvicum D8 по 1 мл; во флаконах по 30 мл.

Фарм. действ.: Флебодинамическое, венотонизирующее, спазмолитическое, анальгезирующее.

Клин. фарм.: Часто сочетается с приемом препарата Кралонин.

Показ.: Нарушения периферического кровообращения ("нога курильщика", перемежающаяся хромота, облитерирующий эндартериит, артериосклероз, слоновость, варикозное расширение вен, постинсультные и постинфарктные состояния).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, беременность.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, по 10 капель 3 раза в день; в острых случаях - по 10 капель каждые 15 мин.

Предост.: С осторожностью применять пациентам при заболеваниях щитовидной железы (только после консультации с врачом).

Пронзв.: Neel (Германия)

Эспа-липон (Espa-lipon)

Тиоктовая кислота

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит альфа-липоевой кислоты 200 или 600 мг; в упаковке 30 и 100 шт.

1 мл раствора для инъекций - 25 мг, в ампулах по 12 или 24 мл; в упаковке 5 и 10 шт.

Фарм. действ.: Гепатопротекторное, дезинтоксикационное, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, нормализация липидного и углеводного обмена, стимуляция окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты и альфа-кетокислот.

Показ.: Диабетическая полинейропатия, атеросклероз (лечение и профилактика), заболевания печени (хронический гепатит, цирроз печени), хроническая интоксикация.

Противопоказ.: Гиперчувствительность; инъекционная форма противопоказана новорожденным (содержит бензиловый спирт), выраженная желтуха.

Поб. действ.: В/в введение - ощущение тяжести в голове и затруднение дыхания, судороги, диплопия; точечные кровоизлияния в слизистую и кожу, нарушения функции тромбоцитов, нарушения усвоения глюкозы (снижение уровня сахара в крови), аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока).

Взаим.: Инъекционная форма снижает эффективность цисплатина. В отдельных случаях необходимо снижение доз гипогликемизирующих препаратов.

Примен. и доз.: Внутрь или парентерально. При невозможности парентерального введения в начале лечения назначают 600 мг в день (по 200 мг 3 раза в день или за один прием независимо от приема пищи, запивая водой), поддерживающая доза - 200-400 мг в день. В случае тяжелой диабетической полинейропатии назначают 300-600 мг (12-24 мл раствора для инъекций). Ежедневно в начале лечения - в/в капельно в течение 2-4 нед. Для дальнейшего лечения назначают 1-2 таблетки. При в/м введении доза препарата в одно место инъекции не должна превышать 50 мг (2 мл). У больных сахарным диабетом особенно в начале лечения необходим частый контроль глюкозы крови. Во время лечения необходимо воздержание от приема алкоголя.

Произв.: Esparma (Германия)

Эспераль (Esperal)

Дисульфирам*

Сост. и ф.в.: 1 стерильная таблетка для имплантации содержит дисульфирама 100 мг; в упаковке 10 шт.

1 таблетка для перорального приема - 500 мг; в упаковке 20 шт.

Фарм. действ.: Ингибирование ацетальдегид-дегидрогеназы.

Фармакодин.: Увеличивает концентрацию ацетальдегида, вызывающего недомогание, тошноту, рвоту, прилив крови к лицу, тахикардию, гипотонию.

Показ.: Хронический алкоголизм.

Противопоказ.: Ишемическая болезнь сердца, печеночная недостаточность, сахарный диабет, эпилепсия, нервно-психические заболевания, беременность.

Поб. действ.: Полиневрит нижних конечностей, неврит зрительного нерва, металлический вкус во рту, гепатит, нервно-психические нарушения, астения, снижение памяти, головная боль, аллергический дерматит; обусловленные ассоциацией дисульфирам-этанол: коллапс, аритмия, инфаркт миокарда, отек мозга, кровоизлияния в оболочку головного мозга, летальный исход.

Взаим.: Ингибирует печеночный метаболизм (поэтому может увеличивать концентрации в плазме фенитоина, изониазида, метронидазола).

Примен. и доз.: Внутрь, по 500 мг (1 таблетка) в день, затем дозу снижают до 250-125 мг (1/2-1/4 таблетки). П/к и в/м имплантация - по 8-10 таблеток.

Предост.: Недопустим прием алкоголя (в т.ч. лекарств на спиртовой основе) в течение 24 ч после приема препарата. С осторожностью следует назначать в сочетании с фенитоином, метронидазолом, изониазидом, оральными антикоагулянтами.

Произв.: Sanofi-Chinoin (Франция)

Эспумизан (Espumizan®)

Симетикон

Сост. и ф.в.: 5 мл эмульсии или 1 капсула содержат симетикона 40 мг; во флаконах по 100 мл или в упаковке 50 или 100 шт. соответственно.

Фарм. действ.: Ветрогонное (снижение поверхностного напряжения).

Фармакокин.: Вследствие физиологической и химической инертности не усваивается организмом и после прохождения через ЖКТ выводится в неизмененном виде.

Фармакодин.: Снижает поверхностное напряжение распадающихся газовых пузырьков в питательной взвеси и слизи ЖКТ. Высвобождаемые при этом газы могут поглощаться стенками кишечника или выводиться из организма благодаря перистальтике.

Клин. фарм.: При соно- и рентгенографии предупреждает помехи и перекрытия изображений; способствует лучшему орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным средством, препятствуя разрыву контрастной пленки.

Показ.: Чрезмерное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, аэрофагия, диспепсия, синдром Ремгельда), в т.ч. в послеоперационном периоде, при подготовке к диагностическим исследованиям брюшной полости со снимками для получения двойного контрастного изображения (добавка к суспензии контрастных средств); интоксикация моющими средствами (Эспумизан в виде эмульсии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, во время или после еды (при необходимости и на ночь). При метеоризме и чувстве переполненности взрослым и детям школьного возраста - по 1-2 чайные ложки эмульсии или 1-2 капсулы 3-5 раз в день, детям грудного и раннего возраста - по 1 чайной ложке эмульсии 3-5 раз в день. Длительность курса зависит от развития болевых ощущений. Для подготовки к рентгено- и сонографии за день до исследования - по 2 чайные ложки эмульсии или по 2 капсулы 3 раза в день и в день исследования, утром - 2 чайные ложки эмульсии или 2 капсулы. Для диагностики - 20-40 мл на 1 л контрастной взвеси. При отравлениях моющими средствами - не менее 4-5 чайных ложек эмульсии. Грудные дети и дети раннего возраста принимают эмульсию с пищей из бутылочки или с жидкостью после еды.

Прозв.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

Эссавен (Essaven®)

Сост. и ф.в.: 100 г геля содержат эсцина 1 г, гепарина натриевой соли 10000 МЕ и "эссенциальных" фосфолипидов 1 г; в тубах по 40 и 100 г.

Фарм. действ.: Венотонизирующее, снижение проницаемости капилляров, противоотечное, анальгетическое, улучшение микроциркуляции, антиагрегаци-

онное, противовоспалительное, тромболитическое.

Показ.: Нарушения венозного кровообращения (варикозное расширение вен, воспаления поверхностных вен, болезненная усталость ног, ночные судороги икроножных мышц, кровоподтеки и отеки вследствие растяжений и ушибов, спортивные травмы).

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Поб. действ.: Чувство жжения при мокнущей экземе ног и при открытых ранах (содержит спирт), аллергические реакции.

Примен. и доз.: Наружно, наносят тонким слоем на отечные и болезненные участки 2-3 раза в день. Втирание не является необходимым, в случае воспалительных процессов - даже нежелательно.

Прозв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Эссенциале (Essentiale®)

Сост. и ф.в.: 1 ампула (5 мл) содержит "эссенциальных" фосфолипидов 250 мг, пиридоксина гидрохлорида 2,5 мг, цианокобаламина 6 мкг, натрия-D-пантотената 1,5 мг, никотинамида 25 мг; в упаковке по 5 шт.

1 капсула форте - "эссенциальных" фосфолипидов 300 мг, тиамин мононитрата 6 мг, рибофлавина 6 мг, пиридоксина гидрохлорида 6 мг, цианокобаламина 6 мкг, никотинамида 30 мг, токоферола ацетата 6 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Нормализация метаболизма липидов и белков, защита фосфолипидзависимых ферментных систем, улучшение детоксикационных функций печени, восстановление ее клеточной структуры и торможение формирования соединительной ткани в ней.

Показ.: Острый и хронический гепатит, цирроз печени, жировая дегенерация печени различной этиологии, печеночная кома, радиационный синдром, токсикоз беременности, отравления, лекарственные и алкогольные поражения печени, псориаз, нарушение функции печени в результате осложнений при других заболеваниях.

Противопоказ.: Не выявлены.

Поб. действ.: Неприятные ощущения в эпигастриальной области.

Примен. и доз.: Лечение начинают с комбинированного парентерального и орального назначения. По мере улучшения состояния больного лечение продолжают капсулами. Курс лечения состав-

ляет, как минимум, 3 мес и при необходимости может быть продолжен или повторен. Эссенциале форте принимают по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды с небольшим количеством воды. В/в вводят по 2-4 ампулы в день, предварительно разведенных, желательно, кровью пациента, в соотношении 1:1. Лечение псориаза начинают с двухнедельного приема капсул (по 2 капсулы 3 раза в день), затем проводится 10 в/в вливаний по 1 ампуле ежедневно и одновременно начинается ПУВА-терапия. После завершения вливаний возобновляют прием капсул на протяжении 2 мес. При наличии противопоказаний к ПУВА-терапии ограничиваются применением эссенциале по приведенной методике, в т.ч. в сочетании с общепринятыми методами лечения псориаза.

Произв.: Rhône-Poulenc Rorer (Франция-США)

Эстифан (Estifan)

Сост. и ф.в.: Таблетки по 0,2 г; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее, повышение фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофагов, увеличение продукции интерлейкина-1 макрофагами, ускорение трансформации бета-лимфоцитов в плазматические клетки, усиление антителообразования и Т-хелперной активности.

Показ.: Инфекционные заболевания (рецидивирующие) на фоне иммунодефицита: бронхит, пневмония, инфекции ЛОР-органов.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, 1-2 таблетки 3 раза в день в течение 10-20 дней; повторный курс - через 2-3 нед.

Произв.: Борисовский ЗМП (Беларусь)

Эстрогель (Estrogel)

Эстрадиол*

Сост. и ф.в.: 2,5 мг водно-спиртового геля содержат эстрадиол 1,5 мг; в тубах по 80 г с мерным шпателем.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита эстрогенов.

Фармакодин.: Ослабляет или устраняет симптоматику климактерического синдрома (включая остеопороз), улучшает липидный профиль (нормализует уровень триацилглицеридов), снижает агрегацию тромбоцитов, вязкость крови.

Клин. фарм.: Эффект развивается через 7-10 дней после применения.

Показ.: Эстроген-дефицитные состояния (чувство жара, потливость, нарушения сна, головокружение, раздражительность, атрофические изменения органов урогенитальной системы), постменопаузный остеопороз (профилактика).

Противопоказ.: Злокачественные опухоли молочной железы и эндометрия, тяжелые нарушения функции печени, маточные кровотечения неясной этиологии, тромбоэмболические заболевания, беременность.

Поб. действ.: Головная боль, тошнота, напряжение молочных желез, мажущие кровянистые выделения, железистая гиперплазия эндометрия, раздражение кожи.

Примен. и доз.: Наружно, постоянно или циклично, одна стандартная доза геля (2,5 - 1,5 мг эстрадиола) наносится ежедневно однократно на участок кожи как можно большей площади (руки, ноги или живот). Лечение дополняется гестагенными препаратами (10 дней в 1-3 мес).

Предост.: Рекомендуется избегать попадания геля на кожу молочных желез и половых органов.

Произв.: Leiras (Финляндия)

Эстрофем® (Estrofem®)

Эстрадиол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой голубого цвета, содержит эстрадиол (в виде полугидрата) 2 мг; в упаковке в виде календарного диска по 28 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Эстрогенная недостаточность в климактерическом периоде или после гинекологических операций, облегчение менопаузальных симптомов.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли (карцинома молочной железы или эндометрия); острые или хронические заболевания печени (в т.ч. в анамнезе) при нарушенных функциональных тестах; тромбозы глубоких вен, тромбоэмболии, нарушения мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе), маточные кровотечения неясной этиологии, порфирия.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано при беременности.

Поб. действ.: В первые месяцы лечения: болезненность молочных желез, выделения и/или маточные кровотечения (если имеется здоровая матка). Редко - тошнота, отечность, головная боль. При продолжении лечения эти явления проходят самостоятельно.

Примен. и доз.: Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в сутки, ежедневно без перерывов. Лечение женщин с удаленной маткой или женщин в постменопаузе можно начинать в любой день. При сохраненном менструальном цикле прием первой таблетки начинают с 5 дня менструального цикла.

Предост.: Препарат не является контрацептивом и не предохраняет от беременности. Пациенты, принимающие антигипертензивные препараты, должны находиться под регулярным наблюдением врача. При появлении измененных или нерегулярных менструальных выделений, необходимо проведение диагностического выскабливания для исключения злокачественных новообразований матки. При длительном лечении рекомендуется не реже 1 раза в год проводить профилактические осмотры. Длительная монотерапия повышает риск развития рака эндометрия при сохраненной матке (риск зависит как от продолжительности, так и от дозы препарата). Дополнительная 10-дневный прием прогестагенов в течение каждого цикла оказывает защитное действие на эндометрий. При использовании низких доз эстрогенов в течение короткого периода увеличения частоты рака молочной железы не отмечалось. Перед началом лечения необходимо провести тщательное медицинское обследование, особенно у женщин, которые ранее принимали или в настоящее время принимают эстрогены. Больные эпилепсией, мигренью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой или сердечной недостаточностью должны находиться под регулярным наблюдением врача. Лечение следует немедленно прекратить при тромбозе глубоких вен, тромбоэмболических нарушениях, появлении желтухи, усилении мигренозных болей, внезапном нарушении зрения, значительном повышении АД, а также за 4-6 нед до плановой хирургической операции.

Произв.: Novo Nordisk (Дания)

Этамбутол (Ethambutolum)

Этамбутол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этамбутола гидрохлорида 0,4 г; в упаковке 100 шт.

Фарм. действ.: Антимикробное, противотуберкулезное.

Показ.: Туберкулез всех форм и локализаций (в составе комбинированной терапии).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, неврит зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, беременность, лактация, детский возраст (до 13 лет).

Поб. действ.: Ухудшение зрения, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, нарушение функции печени, головокружение, аллергические реакции.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды в дозе 20-25 мг на 1 кг массы тела, но не более 1 г.

Произв.: Акрихин (Россия)

Этамзилат (Etamsylatum)

Этамзилат*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этамзилата 0,25 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Гемостатическое, ангиопротекторное.

Показ.: Кровотечения (кишечные, маточные и при оперативных вмешательствах), травмы, геморрагический диатез, диабетическая ангиопатия, полименорея.

Противопоказ.: Геморрагии на фоне антикоагулянтов, тромбозы, тромбоэмболии (в т.ч. в анамнезе).

Бер. и корм. гр.: С осторожностью применяют в первом триместре беременности.

Примен. и доз.: Внутрь, по 2-3 таблетки (до 6-8 таблеток в сутки); при диабетических микроангиопатиях - по 1 таблетке 3 раза в день; курс - 2-3 мес.; при обильных меноррагиях - по 3-4 таблетки в сутки в течение 10 дней, начиная с 5-го дня до ожидаемой менструации.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Этализин (Aethacizinum)

Этализин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит этализина 50 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое.

Показ.: Желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, пароксизмы мерцательной тахикардии.

Противопоказ.: AV- и внутрижелудочковая блокада, застойная сердечная недостаточность, гипотония, печеночно-почечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Головокружение, гипотония, замедление AV- и внутрижелудочковой проводимости, нарушение аккомодации.

Взаим.: Несовместим с антиаритмиками хинидинового ряда.

Примен. и доз.: Внутрь, по 50 мг 3-4 раза в день, при недостаточном эффекте - 100 мг 3 раза в день, при достижении эффекта - терапия в индивидуально подобранных дозах.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Этимизол (Aethimizolum)

Сост. и ф.в.: 1 мл раствора для инъекций содержит этимизола 15 мг, в ампулах по 3 мл; в упаковке 10 шт.

1 таблетка - 0,1 г; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Аналептическое, стимуляция дыхательного центра, бронхолитическое, противовоспалительное, противоаллергическое, повышение уровня глюкокортикоидов в крови.

Показ.: Угнетение дыхания, гиповентиляция легких, астенодепрессивные состояния, полиартрит, бронхиальная астма, бронхоспазм, асфиксия новорожденных.

Противопоказ.: Возбуждение центральной нервной системы.

Поб. действ.: Тошнота, рвота, головокружение, нарушение сна, двигательное возбуждение.

Примен. и доз.: В/в (медленно), в/м, п/к, для стимуляции дыхания - 0,6-1 мг/кг массы больного 1-2 раза в день; при асфиксии новорожденных - 0,5 мл 0,6% раствора, при бронхоспазме - 2 мл 1,5% раствора 2 раза в день. Внутрь, после еды - по 50-100 мг 3-4 раза в день, курс - 20-30 дней.

Произв.: ICN Октябрь (Россия)

Этинилэстрадиол (Aethinyloestradiolum)

Этинилэстрадиол*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит этинилэстрадиола 0,05 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Эстрогенное.

Показ.: Гипогенитализм, гипофункция яичников, первичная и вторичная аменорея, альгоменорея, климакс.

Противопоказ.: Гормонозависимые опухоли (у женщин), мастопатия.

Поб. действ.: Тошнота, головокружение, маточные кровотечения.

Примен. и доз.: Внутрь 0,05-0,1 мг 1-2 раза ежедневно или через день.

Произв.: Биореактор (Россия)

Этионамид (Ethionamide)

Этионамид*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит этионамида 250 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Противотуберкулезное.

Показ.: Туберкулез.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени, беременность.

Поб. действ.: Анорексия, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, диарея, стоматит, нарушения функции печени, периферический неврит, психические нарушения, ортостатическая гипотония, тромбоцитопения, гинекомастия, дисменорея, импотенция, явления гиповитаминоза В6, кожная сыпь.

Взаим.: Усиливает нейротоксический эффект циклосерина.

Примен. и доз.: Внутрь, средняя суточная доза - 0,5-1 г (в 2-3 приема); детям - 20-40 мг/кг.

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Этиотраст® (Aethyotrastum®)

Йофендилат*

Сост. и ф.в.: Раствор для инъекций в ампулах по 3 мл; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Рентгеноконтрастное.

Показ.: Миелография, лимфография.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острые воспалительные процессы в головном и спинном мозге, наличие крови или билирубина в спинномозговой жидкости, повреждения паренхимы печени, почек, миокарда, сердечно-сосудистая декомпенсация, шок, коллапс, активный туберкулез, гипертиреоз, кахексия.

Поб. действ.: Гипертремия, головокружения, головная боль, тошнота, рвота, гипотония, аллергические реакции.

Примен. и доз.: ЭндOLUMбально в поясничную область или в затылочную цистерну вводят 1,5-9 мл в течение 10-15 с. В периферический лимфатический сосуд верхней или нижней конечности - 0,015 мл/кг со скоростью 1 мл/10 мин. Общее количество не должно превышать 7 мл в сосуды верхней конечности и 15 мл - нижней.

Произв.: Фармак (Украина)

Этмозин (Aetmozinum)

Морацизин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит морацизина гидрохлорида 25 или 100 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антиаритмическое, коронародилатирующее.

Показ.: Аритмии: предсердная и желудочковая экстрасистолия, пароксизм

мерцательной аритмии, пароксизмальная желудочковая тахикардия.

Противопоказ.: AV- и внутрижелудочковая блокада, застойная сердечная недостаточность, гипотония, печеночно-почечная недостаточность.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Головокружение, гипотония, замедление AV- и внутрижелудочковой проводимости.

Взаим.: Несовместим с ингибиторами MAO.

Примен. и доз.: Внутрь, начиная с 25-50 мг 3-4 раза в день, увеличивая до 100 мг 3-4 раза в сутки. Высшая суточная доза - 0,6 г. Курс - 7-45 дней.

Произв.: Олайнфарм (Латвия)

Этопозид (Etoposide®)

Этопозид*

Сост. и ф.в.: 1 флакон с 5 мл инъекционного раствора содержит этопозид 100 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое, блокада моноизомеразы II.

Фармакокин.: Связывается с белками плазмы на 94%, легко проходит в печень, почки, селезенку, позвоночник, головной мозг, сердце и кишечник, но плохо проникает в спинномозговую жидкость. После в/в введения $T_{1/2}$ в плазме составляет 6,8 ч (от 3 до 12 ч); выводится преимущественно с мочой (30-60%, из которых до половины - в неизмененном виде).

Показ.: Мелкоклеточный рак легких, острые лейкозы, болезнь Ходжкина, неходжкинские лимфомы, плацентарная хорионкарцинома, герминогенная карцинома яичка, рак молочной железы с предшествующей химиотерапией.

Противопоказ.: Гиперчувствительность.

Бер. и корм. гр.: Противопоказано.

Поб. действ.: Лейкопения, тромбоцитопения, алоpecia, тошнота, рвота, гипотензия (при быстром в/в введении), парестезии, аллергические реакции.

Передоз.: Лечение симптоматическое. Этопозид и его метаболиты не диализируются.

Примен. и доз.: В/в капельно (в течение 2 ч), по 50-150 мг/кв.м на протяжении 1-3 сут. Повторные курсы - с интервалами 3 нед.

Произв.: Pierre Fabre Medicament (Франция)

Этопозид-Эбеве (Etoposid-Ebewe)

Этопозид*

Сост. и ф.в.: 1 мл концентрата для приготовления раствора для приема внутрь или инфузий содержит этопозид 20 мг, во флаконах по 2,5; 5; 10 или 20 мл; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитотоксическое.

Показ.: Герминогенные опухоли (яичка и хорионкарцинома); рак яичников, легкого (мелкоклеточный и немелкоклеточный), желудка; болезнь Ходжкина, неходжкинская лимфома (моно- и комбинированная терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность, выраженная миелосупрессия, тяжелые нарушения функции печени и почек, беременность, лактация, алкоголизм, детский возраст (до 2 лет).

Поб. действ.: Лейкопения, анемия, тромбоцитопения; повышение уровня мочевой кислоты; тошнота, рвота, анорексия, диарея, инфекции ЖКТ, гипотония, сонливость, утомляемость, аллергические реакции (озноб, лихорадка, бронхоспазм); алоpecia.

Примен. и доз.: Внутрь, добавив к концентрату 250 мл воды, по 50 мг/кв.м поверхности тела в течение 21 дня, потом на 28-й день; 4-6 повторных курса. В/в, инфузионно (в разведении 1:50 - 1:100 в физиологическом растворе хлорида натрия или растворе глюкозы) - по 50-100 мг/кв.м ежедневно или по 120-150 мг/кв.м через день в течение 5 дней с повторением курса через 2-3 нед; возможны другие схемы (с другими дозами и интервалами) в зависимости от чувствительности и переносимости препарата.

Предост.: До и в течение лечения необходим постоянный контроль за картиной периферической крови, общим состоянием больного (включая осмотр слизистой полости рта). Не рекомендуется назначать при вождении транспорта и работе с механизмами.

Произв.: Ebewe (Австрия)

Эуноктин (Eunoclin)

Нитразепам*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит 10 мг нитразепама; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Снотворное, седативное, миорелаксирующее, противосудорожное.

Показ.: Нарушения сна, энцефалопатии, сопровождающиеся эпилептическими припадками.

Противопоказ.: Миастения (тяжелые формы), височная эпилепсия, первый триместр беременности.

Поб. действ.: Сонливость, утомляемость, мышечная слабость, беспокойство, атаксия, уменьшение либидо, дисменорея, парез кишечника, зависимость.

Взаим.: Усиливает эффект транквилизаторов, антидепрессантов, наркотических и ненаркотических анальгетиков, миорелаксантов, гипотензивных средств. Несовместим с алкоголем.

Примен. и доз.: При нарушениях сна: взрослым - 5-10 мг на ночь, ослабленным больным - 5 мг, детям - 2,5-10 мг (в зависимости от возраста). При эпилептических припадках: взрослым - по 5-25 мг/сутки (в 2-3 приема); детям: в грудном возрасте - 2,5-7,5 мг/сутки, в раннем детском возрасте - 5-10 мг/сутки, в школьном возрасте - 7,5-15 мг/сутки (в 2-3 приема).

Произв.: Gedeon Richter (Венгрия)

Эуфиллин (Euphyllin®)

Теофиллин

Сост. и ф.в.: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит теофиллина безводного 125 мг (ретард мите Н) или 250 мг (ретард Н); в упаковке 50 или 100 шт.

1 ампула с 10 мл раствора для инъекций - теофиллина моногидрата 193,2 мг и этилендиамина 46,8 мг; в упаковке 5 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое.

Показ.: Обструктивные заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема), нарушения со стороны дыхательного центра, недостаточность правых отделов сердца вследствие хронических обструктивных заболеваний легких, отеки сердечного и почечного происхождения.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, острый период инфаркта миокарда, артериальная гипертензия, гипертиреоз, эпилепсия, тахиаритмии, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелые нарушения функции печени, детский возраст (до 6 лет) - таблетки.

Поб. действ.: Беспокойство, возбуждение, тремор, расстройство сна, головная боль, сердцебиение, желудочно-кишечные расстройства, снижение АД (при быстром в/в введении), кожные аллергические реакции (из-за присутствия этилендиамина).

Взаим.: Усиливает (взаимно) эффекты диуретиков, бета-2-адреномиметиков, других метилксантинов, эфедрина, уменьшает - солей лития и бета-блокаторов. Клиренс (теофиллина) увеличивают никотин (курильщики), фенобарбитал, рифампицин, фенитоин, диуретики, снижают - антибиотики из группы макролидов, бета-блокаторы, циметидин, оральные контрацептивы.

Примен. и доз.: Внутрь. Взрослым с массой тела более 50 кг - по 250 мг 2-3 раза в сутки с 8-ми часовыми интервалами. Взрослым и подросткам с массой тела до 50 кг - по 125 мг 2-3 раза в сутки. Детям от 6 лет - 125 мг 2 раза в сутки. Суточные дозы для в/в введения: взрослым с массой тела от 60 до 80 кг - 600-800 мг, взрослым и подросткам от 40 до 60 кг - 400-600 мг, детям школьного возраста от 20 до 40 кг - 260-520 мг, более младшего возраста от 10 до 20 кг - 160-320 мг. Суточную дозу делят на 1-3 введения. В/в введение осуществляют осторожно и медленно (в течение 5 мин), пациент должен находиться в положении лежа.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Эуфиллин (Euphyllinum)

Аминофиллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит аминофиллина 150 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Спазмолитическое, вазодилатирующее, бронхорасширяющее, диуретическое.

Показ.: Бронхиальная астма, бронхоспастический синдром, легочная гипертензия, сердечная астма; хроническая недостаточность мозгового кровообращения, отек мозга, нарушение почечного кровотока.

Противопоказ.: Инфаркт миокарда, выраженный коронароспазм, пароксизмальная тахикардия, коронароатеросклероз.

Бер. и корм. гр.: Не противопоказано.

Поб. действ.: Диспепсия, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, гипотония, сердцебиение, судороги.

Взаим.: Совместим с другими спазмолитическими препаратами.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды - по 0,1-0,2 г 2-3 раза в день; детям - 7-10 мг/кг в сутки в 4 приема. Длительность лечения - до нескольких месяцев.

Произв.: ICN Октябрь (Россия); Олайнфарм (Латвия)

Эуфилонг (Euphylong®)**Теофиллин**

Сост. и ф.в.: 1 капсула с замедленным высвобождением содержит теофиллина безводного 375 мг или 250 мг (мите); в упаковке 20, 50 или 100 шт.

Фарм. действ.: Бронхолитическое.

Показ.: Обструктивные заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема), нарушения со стороны дыхательного центра, недостаточность правых отделов сердца (вследствие хронических обструктивных заболеваний легких), отеки сердечного и почечного происхождения.

Противопоказ.: Острый период инфаркта миокарда, гиперчувствительность, артериальная гипертония, гипертиреоз, эпилепсия, нарушение функции печени, беременность, возраст (до 6 лет), тахикардия, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поб. действ.: Беспокойство, возбуждение, тремор, расстройство сна, головная боль, сердцебиение, аритмии, желудочно-кишечные нарушения.

Взаим.: Усиливает (взаимно) эффекты диуретиков, бета-2-адреномиметиков, других метилксантинов, эфедрина, уменьшает - солей лития и бета-блокаторов. Клиренс (теофиллина) увеличивают никотин (курильщики), фенобарбитал, рифампицин, фенитоин, диуретики, уменьшают - антибиотики из группы макролидов, бета-блокаторы, циметидин, оральные контрацептивы.

Примен. и доз.: Внутрь, взрослым с массой тела 60-70 кг и нормальным метаболизмом теофиллина - 12 мг/кг (720-840 мг), с повышенным (например, курящим) - 18 мг/кг (1080-1260 мг); детям с массой тела 40-60 - 18 мг/кг (720-1080 мг). Следует запивать достаточным количеством жидкости. Эуфилонг предназначен для длительного применения.

Произв.: Byk Gulden (Германия)

Эуфорбиум композитум**Назентропфен С****(Euphorbium compositum****Nasentropfen S®)**

Сост. и ф.в.: 100 мл физиологического раствора с 0,01% бензалкония хлорида содержат Euphorbium D4, Pulsatilla D2, Luffa operculata D2, Mercurius bijodatus

D8, Mucosa nasalis D8, Hepar sulfuris D10, Argentum nitricum D10, Sinusitis-Nosode D13 по 1 мл; в аэрозольных флаконах по 20 мл.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, репаративное, противоаллергическое.

Клин. фарм.: При воспалительных проявлениях одновременно применять с Траумель С, Энгистол Н.

Показ.: Риниты различного генеза (вирусные, бактериальные, аллергические, гиперпластические, атрофические), озена, сенная лихорадка, аденоиды, острые и хронические синуситы, отиты, евстахеиты.

Противопоказ.: Нет.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Впрыскивают в каждую ноздрю по 1-2 дозы 3-5 раз в сутки, детям до 6 лет - по 1 дозе 3-4 раза в день. Можно использовать для детей до 1 года.

Произв.: Heel (Германия)

Эфедрина гидрохлорид (Ephedrine hydrochloridum)**Эфедрин**

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит эфедрина гидрохлорида 50 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Сосудосуживающее, гипертензивное, бронхолитическое, гипергликемическое, возбуждение ЦНС, альфа- и бета-адреномиметическое.

Показ.: Бронхиальная астма, сенная лихорадка, крапивница, сывороточная болезнь и др. аллергические заболевания, риниты, гипотония (операции, спинномозговая анестезия, травмы, кровопотери, инфекционные заболевания, гипотоническая болезнь и др.), нарколепсия, отравление снотворными и наркотическими средствами; энурез; местно: в качестве сосудосуживающего средства, для расширения зрачка (с диагностической целью).

Противопоказ.: Гипертония, атеросклероз, тяжелые органические заболевания сердца, гипертиреоз, бессонница.

Поб. действ.: Легкая дрожь, сердцебиение (через 15-30 мин после приема внутрь); нарушения сна.

Примен. и доз.: П/к, в/м, взрослым - по 0,02-0,05 г; 2-3 раза в день; в/в, струйно (медленно) - по 0,4-1 мл 5% раствора или капельно в общей дозе до 0,08 г (в 100-500 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора

глюкозы). Высшие дозы для взрослых (п/к): разовая - 0,05 г, суточная - 0,15 г.

Предост.: Не следует назначать препарат в конце дня или перед сном.

Произв.: Московский эндокринный завод (Россия)

Эфокс (Effox®)

Изосорбида мононитрат*

Эфокс лонг (Effox® long)

Изосорбида мононитрат*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит изосорбида мононитрата 10 и 20 мг; в упаковке 50 шт.

1 таблетка ретард - 50 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антиангинальное, венодилатирующее, артериодилатирующее, уменьшение пред- и постнагрузки на сердце, уменьшение давления в легочной артерии.

Показ.: Ишемическая болезнь сердца, стенокардия (профилактика приступов), включая стенокардию в постинфарктном периоде, тяжелая сердечная недостаточность.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, низкое давление наполнения левого желудочка, шок, сосудистый коллапс, выраженная гипотония, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тампонада перикарда, кардиогенный шок, первичная легочная гипертензия.

Поб. действ.: Головная боль, гипотензия (при приеме первой дозы), тахикардия, слабость, тошнота, рвота.

Взаим.: Антигипертензивные средства (антагонисты кальция, бета-блокаторы), циклические антидепрессанты, нейролептики, дигидроэрготамин усиливают гипотензивный эффект, нестероидные противовоспалительные препараты - ослабляют эффект ЭФОКСА.

Примен. и доз.: Внутрь, после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, ЭФОКС - по 1 таблетке 2 раза в день, ЭФОКС ЛОНГ - по 1 таблетке 1 раз в день.

Предост.: Рекомендуются постепенно снижать дозу, т.к. возможен "синдром отмены".

Произв.: Schwarz Pharma (Германия)

Эффералган (Effergal®)

Парацетамол*

Сост. и ф.в.: 1 быстрорастворимая "шипучая" таблетка содержит парацетамола 500 мг; в упаковке 16 шт.

1 капсула - 500 мг; в упаковке 16 шт.

1 мл педиатрического раствора - 30 мг; во флаконе 90 мл.

1 пакетик порошка для приготовления педиатрического раствора, - 80 или 150 мг; в упаковке 12 шт.

1 свеча ректальная - 80, 150, 300 или 600 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее.

Фармакокин.: После приема внутрь быстро и почти полностью всасывается (при введении свечей всасывается медленнее). Максимальная концентрация в плазме достигается через 20-30 мин (после использования ректальных свечей - через 2-3 ч). Связывание с белками плазмы слабое. Период полувыведения из плазмы составляет 2-2,5 ч. Метаболизируется в печени в основном с образованием конъюгатов с сульфатами и глюкуронатами и в небольшой степени (менее 4%) - путем окисления (при участии цитохрома P-450) с образованием меркаптопуровой кислоты и цистеина.

Показ.: Боли, лихорадочные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Возможны аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница. Крайне редко - тромбоцитопения.

Передоз.: Симптомы - анорексия, тошнота, рвота, боли в животе, бледность кожных покровов, некроз печени, выражающийся в печеночно-клеточной недостаточности, метаболическом ацидозе, энцефалопатии, вплоть до комы. Лечение: промывание желудка, применение N-ацетилцистеина, симптоматическая терапия.

Примен. и доз.: Внутрь. Таблетки 500 мг: растворяют в стакане воды, взрослым - по 1-2 таблетки 1-3 раза в день, детям 7-13 лет - 1/2 таблетки 1-3 раза в день, 13-15 лет - по 1 таблетке 1-3 раза в день; средняя доза - 20-30 мг/кг в сутки. Капсулы: по 1-2 капсулы 1-3 раза в сутки (не более 6 капсул в сутки). Педиатрический раствор: либо в чистом виде, либо разбавляя водой или молоком; детям до 1 года - по 1/2 мерной ложечки 3 раза в день, 1-3 лет - по 1 мерной ложечке 3 раза в день, старше 3 лет - по 1 мерной ложечке 4 раза в день

с интервалом не менее 4 ч. Порошок для приготовления педиатрического раствора: растворяют в стакане воды, молока или сока; рекомендуемая дозировка - 20-30 мг/кг в сутки. Эффералган 80 мг: детям в возрасте 3-6 мес - 1 пакетик 2 раза в сутки, 6 мес - 1 год - 1 пакетик 2-3 раза в сутки; 1-2 года - 1 пакетик 3-4 раза в сутки. Эффералган 150 мг: детям 2-4 лет - 1 пакетик 2-3 раза в сутки, 4-6 лет - 1 пакетик 3-4 раза в сутки, 6-8 лет - по 2 пакетика 2-3 раза в сутки, 8-12 лет - по 2 пакетика 3 раза в сутки. Свечи ректальные: взрослым - 1 свеча (600 мг) 1-3 раза в день; детям в возрасте 3-6 мес - по 1 свече (80 мг) 2 раза в сутки, 6-12 мес - по 1 свече (80 мг) 2-3 раза в сутки; 1-2 лет - по 1 свече (80 мг) 3-4 раза в сутки, 2-4 лет - по 1 свече (150 мг) 2-3 раза в сутки, 4-6 лет - по 1 свече (150 мг) 3-4 раза в сутки, 6-8 лет - по 1 свече (300 мг) 2-3 раза в сутки, 8-12 лет - по 1 свече (300 мг) до 3-х раз в сутки, 12-15 лет - по 1 свече (300 мг) 3-4 раза в сутки.

Произв.: UPSA (Франция)

Эффералган с витамином С (Efferalgan with Vitamin C®)

Сост. и ф.в.: 1 делимая "шипучая" таблетка содержит парацетамола 330 мг и аскорбиновой кислоты 200 мг; в упаковке 10 или 20 шт.

Фарм. действ.: Анальгезирующее, жаропонижающее, компенсация недостатка витамина С.

Фармакокин.: Быстро и почти полностью всасывается в ЖКТ, равномерно распределяется в жидкостных средах, слабо взаимодействует с протеинами плазмы. Период полувыведения из плазмы составляет 2-2,5 ч, плазматический пик достигается за 20-30 мин, метаболизм в печени идет по двум основным путям - образование глюкуро- и сульфэфиров или (менее 4%) окисление при участии цитохрома Р-450 и конденсация с глутатионом. Выделяется с мочой.

Показ.: Боли, лихорадочные состояния.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность.

Поб. действ.: Возможны аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница; крайне редко - тромбоцитопения.

Примен. и доз.: Внутрь, таблетку растворяют в стакане воды. Взрослым - по 1-2 таблетки (детям 7-13 лет - по 1/2-1 таблетке, 13-15 лет - по 1-1,5 таблетки) 1-3 раза в день; интервал между приема-

ми не менее 4 ч. Средняя доза - 20-30 мг/кг в сутки.

Произв.: UPSA (Франция)

Эхинацея композитум С (Echinacea compositum S)

Сост. и ф.в.: 1 ампула с 2,2 мл (2,2 г) раствора для инъекций содержит Echinacea angustifolia D3, Aconitum napellus D3, Sanguinaria canadensis D4, Sulfur D8, Baptisia tinctoria D4, Lachesis mutus D10, Bryonia cretica D6, Eupatorium perfoliatum D6, Pulsatilla pratensis D8, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Thuja occidentalis D8, Influenzinum-Nosode D13, Phosphorus D8, Cortisonum aceticum D13, Streptococcus haemolyticus-Nosode D18, Staphylococcus-Nosode D18, Phytolacca americana D6, Pyrogenium-Nosode D18, Zincum metallicum D10, Gelsemium sempervirens D6, Hepar sulfuris D10, Rhus toxicodendron D4, Arnica montana D4, Arsenicum album D8, Argentum nitricum D8 и Euphorbium D6 по 22 мкл; в упаковке 5 или 100 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное, антибактериальное, асептическое, иммуностимулирующее, дезинтоксикационное, гемостатическое, адаптогенное, седативное, обезболивающее.

Показ.: Воспалительные процессы и гнойные инфекции кожных покровов, мягких тканей, слизистых оболочек (фурункул, абсцесс, флегмона, карбункул, свищ, гингивит, стоматит, синусит, гастроэнтерит, энтероколит, кольпит, аднексит, мастит, цистит, гломерулонефрит и др.); септические состояния и токсические синдромы (остеомиелит, сепсис, септицемия, вторичные бактериальные и вирусные инфекции, затяжные лихорадочные состояния).

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к др. препаратам, содержащим растения рода хвощ - семейство Anacardiaceae).

Поб. действ.: В отдельных случаях - обильное слюноотечение (рекомендуется отмена препарата).

Примен. и доз.: П/к, в/м, в/к, при необходимости в/в, по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Произв.: Heel (Германия)

Эхинацин ликвидум (Echinacin® liquidum)

Сост. и ф.в.: 100 г раствора для приема внутрь содержат 80 г свежего сока рас-

тения *Echinacea purpurea herba*, полученного прессованием, и 22 об.% этилового спирта; во флаконах по 50 или 100 мл.

Фарм. действ.: Иммуностимулирующее.

Фармакодин.: Повышает количество гранулоцитов и Т-лимфоцитов, активирует фагоцитарную активность гранулоцитов и макрофагов.

Показ.: Рецидивирующие инфекции дыхательных и мочевыводящих путей.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к сложноцветным), туберкулез, лейкоз, коллагеноз, рассеянный склероз.

Поб. действ.: Не выявлены.

Примен. и доз.: Внутрь, с небольшим количеством жидкости; в начальной (ударной) дозе - 40 капель, затем - по 20 капель каждые 1-2 ч, в дальнейшем - по 40 капель 3 раза в день; не более 8 нед без перерыва. При использовании флакон с каплями следует держать вертикально капельницей вниз. Если эвакуация капель затруднена, надо слегка постучать по дну флакона.

Пронзв.: Madaus (Германия)

Эховист-200 (Echovist®-200)

Галактоза

Сост. и ф.в.: 1 флакон вместимостью 20 мл содержит 3 г гранулята для приготовления микроионизированной суспензии D-галактозы, в комплекте с растворителем - 13,5 мл 20% раствора D-галактозы; во флаконе вместимостью 20 мл. В комплект входит также пластиковая канюля для приготовления суспензии.

Фарм. действ.: Диагностическое.

Показ.: Ультразвуковые исследования женских половых органов, в частности, для выявления или исключения врожденных или приобретенных изменений полости матки; а также при визуализации фаллопиевых труб и проверки их проходимости (контрастная гистеросальпингоэхография); эхокардиографические исследования у новорожденных и детей младшего возраста (до 6 лет), в т.ч. с целью выявления гемодинамических дефектов правой половины сердца, венозных сосудов и др.

Противопоказ.: Воспалительные заболевания женских половых органов.

Примен. и доз.: Раствор D-галактозы (13,5 мл) набирают в шприц и с помощью прилагаемой канюли переносят во флакон, содержащий 3 г гранул D-галак-

тозы, в течение 5 мин встряхивают для получения суспензии. При проведении гистеросальпингографии суспензию вводят трансцервикально в дозе 2-5 мл (с помощью внутриматочного балонного катетера), при исследовании фаллопиевых труб дополнительно вводят 1-2 мл. Максимальная доза - 15 мл.

Предост.: Полученная гомогенная суспензия должна быть использована в течение последующих 5 мин, необходимо избегать нагревания суспензии (например, при длительном держании флаконов в руках) и создания чрезмерного разрежения (при заборе суспензии из флакона), т.к. возможно снижение концентрации микропузырьков и образование крупных пузырьков воздуха.

Пронзв.: Schering (Германия)

Юмекс (Jumex)

Селегилин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит селегилина гидрохлорида 5 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Блокада МАО, повышение уровня дофамина.

Показ.: Болезнь Паркинсона, паркинсонизм.

Противопоказ.: Заболевания с экстрапирамидной симптоматикой, не сопровождающиеся недостатком дофамина (эссенциальный или наследственный тремор, хорей Гентингтона и др.).

Поб. действ.: Диспептические расстройства, беспокойство, тревога, бессонница, психические расстройства.

Взаим.: Усиливает эффект леводопы.

Примен. и доз.: Внутрь, по 5-10 мг в сутки (1-2 таблетки утром или по 1 таблетке утром и вечером), через несколько недель начальную дозу можно уменьшить в 2 раза.

Пронзв.: Sanofi-Chinoïn (Франция)

Юнидокс Солютаб® (Unidox Solutab®)

Доксициклин*

Сост. и ф.в.: 1 растворимая таблетка содержит доксициллина моногидрата 100 мг; в упаковке 10 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактериостатическое.

Фармакокин.: Полностью всасывается. Через 2 ч после приема 200 мг в первый день и 100 мг в последующие дни уровень в сыворотке составляет от 1,5 до 3 мг/мл, через 24 ч - 1,5 мг/мл. На 80-90% связывается с белками плазмы, хорошо проникает в ткани, плохо (10-

20% от уровня в сыворотке) - в цереброспинальную жидкость; накапливается в ретикуло-эндотелиальной системе и костной ткани; проникает через плацентарный барьер и в небольшом количестве определяется в материнском молоке. Уровень в слюне - 5-27% от сывороточного. $T_{1/2}$ - 16-18 ч, после приема повторных доз 22-23 ч. Метаболизму подвергается незначительная часть. 40% секретируется почечными канальцами в виде активных форм, 20-40% экскретируется с фекалиями в виде неактивных форм (хелатов).

Показ.: Инфекции органов дыхания, ЖКТ, урогенитальные (в т.ч. гонорея, первичный и вторичный сифилис), гнойные инфекции кожи и мягких тканей, сыпной тиф.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, детский возраст (до 8 лет).

Бер. и корм. гр.: Противопоказано во II и III триместрах беременности.

Поб. действ.: Редко - анорексия, дисфагия, глоссит, тошнота, рвота, диарея, энтероколит, кандидоз (проктит, вагинит), макулопапулезная и эритематозная сыпь, эксфолиативный дерматит, фотосенсибилизация, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нейтропения, эозинофилия, аллергические реакции (сыпь, ангионевротический отек, анафилактические реакции, перикардит, обострение системной красной волчанки); при длительном приеме возможно черно-коричневое окрашивание щитовидной железы.

Примен. и доз.: Внутрь, во время еды, таблетку можно глотать целиком, разделив на части или разжевав, запив стаканом воды, или развести в воде с образованием сиропа (в 20 мл) или суспензии (в 100 мл). Взрослым и детям с массой тела более 50 кг - начинают с 200 мг в первый день в один или два приема, затем - по 100 мг однократно, ежедневно; при тяжелых инфекциях - по 200 мг ежедневно. Детям старше 8 лет с массой тела менее 50 кг - в первый день из расчета 4 мг/кг в один прием, затем - по 2 мг/кг однократно, ежедневно; при тяжелых инфекциях - 4 мг/кг в сутки в течение всего курса лечения. При гонорее: женщинам - по 200 мг ежедневно (в среднем в течение 5 дней); мужчинам - по 200-300 мг однократно, ежедневно в течение 2-4 дней, либо в течение одного дня по 300 мг 2 раза в сутки (второй прием через час после первого). При сифилисе - по 300 мг ежедневно, в течение, как минимум, 10 дней. При сыпном тифе - однократно - 100-200 мг.

Предост.: Не следует комбинировать с пенициллинами и цефалоспоридами, имеющими бактерицидное действие, а также с препаратами, содержащими металлы (антациды, железосодержащие препараты), в связи с их способностью связывать тетрациклины с образованием неактивных хелатов. При одновременной терапии антикоагулянтами требуется тщательный контроль свертывания крови (синтез витамина К снижается на фоне тетрациклинов). Пациентам с нарушенной функцией почек дозу уменьшают.

Произв.: Yamanouchi (Нидерланды)

5-АСА (5-ASA)

Месалазин*

Сост. и ф.в.: 1 драже содержит месалазина 250 и 500 мг; в упаковке 50 или 100 шт.;

1 ректальный суппозиторий - 250 мг; в упаковке 5 или 10 шт.

Фарм. действ.: Противовоспалительное.

Фармакокин.: После приема большая часть дозы достигает подвздошной и толстой кишки (абсорбция незначительна), где происходит высвобождение активного вещества (драже покрыто специальной оболочкой, препятствующей всасыванию в желудке и проксимальном отделе тонкой кишки).

Показ.: Неспецифический язвенный колит; болезнь Крона (профилактика и лечение обострений), колит хронический; проктит.

Противопоказ.: Гиперчувствительность (в т.ч. к производным салициловой кислоты), тяжелые нарушения функции печени, геморрагический диатез.

Бер. и корм. гр.: Не рекомендуется.

Поб. действ.: Головная боль, слабость, бронхоспазм, псевдоэритематоз, метгемоглобинемия, аллергические реакции.

Взаим.: Усиливает токсичность метотрексата, сульфаниламидов, фуросемида, рифампицина, гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины и ulcerогенное действие глюкокортикостероидов.

Примен. и доз.: В период обострений внутрь - по 0,5-1 г 3-4 раза в сутки в течение 8-12 нед; или ректально - по 2 свечи 3-4 раза в день (т.е. 1,5-2 г в сутки), в особо тяжелых случаях суточную дозу можно удвоить. Для профилактики обострений - по 0,25-0,5 г 3-4 раза в сутки или по 1 свече 3-4 раза в день.

Предост.: При длительной терапии необходимо регулярное проведение общего анализа крови и мочи.

Произв.: Slaviamed (Югославия)

5-НОК® (5-NOK®)

Нитроксолин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит нитроксолина 50 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, широкого спектра.

Показ.: Острые и хронические инфекции урогенитального тракта.

Противопоказ.: Гиперчувствительность, олигурия, анурия, катаракта, беременность, лактация.

Поб. действ.: Диспепсия, аллергические реакции (редко).

Примен. и доз.: Внутрь, по 100 мг (максимально - 200 мг) 4 раза в сутки в течение 2-3 нед, после перерыва можно провести повторный курс. Для детей школьного возраста средняя суточная доза - 200-400 мг, до 5 лет - 200 мг, разделенные на 4 приема. Без перерыва можно применять 1 мес, в хронических случаях после короткого перерыва возможна курсовая терапия (2 нед в месяц).

Предост.: Окрашивает мочу в шафрано-желтый цвет. С осторожностью следует назначать при почечной недостаточности - возможна кумуляция.

Произв.: Lek (Словения)

5-Фторурацил-Эбеве (5-Fluorouracil-Ebewe)

Фторурацил*

Сост. и ф.в.: 1 мл концентрата для приготовления инфузий содержит фторурацила 50 мг, во флаконах и ампулах по 5, 10, 20 и 100 мл; в упаковке 1 шт.

Фарм. действ.: Противоопухолевое, цитостатическое.

Показ.: Рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени (гепатоцеллюлярный), яичника, шейки матки, молочной железы, мочевого пузыря и предстательной железы; карцинома анальная, колоректальная; раковые метастазы в печень; злокачественные опухоли головы и шеи (моно- и комбинированная терапия).

Противопоказ.: Гиперчувствительность; выраженные изменения в составе крови, угнетение костномозгового кроветворения, геморрагии; существенные нарушения функции печени и почек; тяжелые инфекции, в т.ч. вирусные (опоясывающий лишай, ветряная оспа); стома-

тит, изъязвления ротовой полости и ЖКТ, псевдомембранозный энтерит.

Поб. действ.: Миелосупрессия; анорексия, стоматит, боль в горле, фарингит, эзофагит, энтерит, изъязвления слизистой ЖКТ (включая ротовую полость), кровотечения, диспепсии; боли в сердце, ишемия, инфаркт миокарда; спутанность сознания, сонливость, атаксия; эйфория, нарушение зрения и др. нарушения ЦНС; почечная и печеночная недостаточность; дерматиты, сухость кожи, фурункулез и др. нарушение регенерации кожи, ногтей, волос; аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока).

Примен. и доз.: В/в: инъекционно, внутриаптериально; внутривполостно (в виде концентрата или после разведения в 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы). При ежедневном введении (1 раз в день) путем в/в инфузии по 600 мг/кв.м поверхности тела (до появления побочных эффектов) или путем в/в инъекций - сначала по 480 мг/кв.м, затем по 240 мг/кв.м; при еженедельном введении (1 раз в нед) - в начальной дозе 200 мг/кв.м (инфузионно) или 600 мг/кв.м (инъекция), в поддерживающей дозе - по 200-400 мг/кв.м. Максимальная суточная доза - не выше 1 г. Курс терапии определяется специалистом (в зависимости от типа заболевания и течения). Дозу корректируют у больных с миелосупрессией, кахексией, после операции, при комбинации с лучевой терапией и с др. цитостатиками.

Предост.: Лечение немедленно прекращают при возникновении побочных явлений со стороны ЖКТ, крови, нервной системы и сердца. Назначают с осторожностью при метастазировании в печень, беременности и лактации.

Произв.: Ebewe (Австрия)

L-Тирок (L-Thyrok®)

Левотироксин натрия*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левотироксина натрия 0,05; 0,1 или 0,15 мг; в упаковке 50 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита гормонов щитовидной железы.

Фармакокин.: Принимаемый натощак всасывается на 70-80%, всасываемость снижается при приеме с пищей. Время полужизни составляет 8 дней (примерно). Один прием в день обеспечивает стабильные уровни трийодтиронина (в организме трансформируется в трийодтиронин).

Клин. фарм.: В случае появления сердечной декомпенсации (как результат гипотиреоза) L-Тирок улучшает сердечную функцию.

Показ.: Заместительная терапия при всех формах врожденного и при ятрогенном гипотиреозе, после облучения щитовидной железы, тиреоидэктомии, лечения тиреостатиками; угнетение функции щитовидной железы при зобе, карциноме, активной аденоме (если функция щитовидной железы остается под контролем гипопфиза).

Противопоказ.: Не существуют. При использовании L-Тирок в качестве заместительной терапии необходимо подтвердить, что функция щитовидной железы контролируется гипопфизом.

Бер. и корм. гр.: Во время второго и третьего триместров беременности, для обеспечения адекватных доз, необходимо повысить дозу на 25% под контролем L-T4. В случае гипертиреоза не назначают комбинацию L-Тирок и антитиреоидина, т.к. возможно развитие врожденного гипотиреоза. Во время лактации прием препарата можно не прерывать.

Поб. действ.: Проявления гипертиреоза: тахикардия, стенокардия, аритмия, нервозность, тремор, потливость, диарея, потеря массы тела.

Взаим.: Можно сочетать с антитиреоидным лечением при заместительной терапии для подавления секреции тиреотропного гормона. Эстрогены уменьшают, а фенитоин увеличивает эффект (за счет увеличения или снижения связи L-Тирок с тиреоглобулином). Холестирамин снижает всасывание в ЖКТ, барбитураты ускоряют катаболизм препарата. Усиливает действие антикоагулянтов, снижает активность гипергликемических средств и дигиталиса. При приеме с трициклическими антидепрессантами эффект взаимно усиливается.

Передоз.: Симптомы острой интоксикации (тиреотоксический криз): тахикардия, стенокардия, аритмия, беспокойство, тремор, потливость, диарея, потеря массы. Лечение: уменьшить дозу или прекратить прием препарата на несколько дней, затем возобновить прием, но в меньших дозах. В тяжелых случаях используют бета-блокаторы. При гипертермии снижают температуру больного, используют в/в кортикостероиды для предупреждения надпочечниковой недостаточности и плазмозорез - при выраженной интоксикации.

Примен. и доз.: Внутрь, утром натощак за полчаса до приема пищи 1 раз в день. Перед началом лечения уровень тирео-

тропного гормона должен быть приведен к норме. Взрослым - начинают с 25-50 мкг в сутки, постепенно увеличивая дозу в течение 2-4 нед (от 25 до 50 мкг в сутки). Поддерживающую дозу увеличивают до 100-200 мкг в сутки. При тяжелом гипотиреозе, стенокардии, сердечной декомпенсации, аритмии начинают с 25 мкг в сутки или в течение двух суток, повышая дозу постепенно. Детям - начинают с 2,5-5 мкг/кг в день, увеличивая дозу до достижения эутиреоза.

Предост.: Перед началом лечения пациентам, страдающим вторичным гипотиреозом из-за недостаточности гипопфиза, необходимо провести курс кортикотерапии для предупреждения острой надпочечниковой недостаточности. Пациентам с микседемой и сердечно-сосудистыми заболеваниями (риск развития повышения АД, стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной декомпенсации) начинают лечение с низших доз с последующим очень постепенным их повышением.

Произв.: Knoll (Германия)

L-Тироксин 25

Берлин-Хеми
(L-Thyroxin 25
Berlin-Chemie)

Левотироксин натрия*

L-Тироксин 50, 100

Берлин-Хеми
(L-Thyroxin 50, 100
Berlin-Chemie)

Левотироксин натрия*

Общее описание

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит левотироксина натрия 25, 50 или 100 мкг, в упаковке 50 и 100 шт.; в календарной упаковке 84 шт.

Фарм. действ.: Восполнение дефицита гормонов щитовидной железы.

Фармакокин.: Всасывается в тонком кишечнике на 80% (при приеме натощак). Максимальная концентрация в плазме достигается примерно через 6 ч после приема. Связывание с белками плазмы более 99%. Метаболический клиренс составляет около 1,2 л плазмы в сутки, расщепление происходит главным образом в печени, головном мозге и мышцах.

Клин. фарм.: Действие наступает через 3-5 суток после начала пероральной терапии.

Показ.: Гипотиреоз (первичный, вторичный, после операции по поводу стру-



мы как результат терапии радиоактивным йодом); профилактика рецидива зоба после его резекции; тиреостатическое лечение гипертиреоза (после достижения эутиреоидного состояния); супрессивная и заместительная терапия при злокачественной опухоли щитовидной железы (преимущественно после тиреоидэктомии); супрессионный тест щитовидной железы.

Противопоказ.: Гипертиреоз (исключение - сопутствующая терапия при тиреостатическом лечении гипертиреоза после достижения эутиреоидного состояния); острый инфаркт миокарда, стенокардия; инфаркт миокарда у пожилых пациентов со струмой; миокардит; нарушения функции коры надпочечников.

Бер. и корм. гр.: Возможно.

Поб. действ.: Явления гипертиреоза (тахикардия, аритмии, стенокардия, тремор, беспокойство, бессонница, гипергидроз, потеря массы тела, понос), временное повышение массы тела, алопеция, расстройство функции почек у детей (при высоких начальных дозах).

Взаим.: Снижает эффект инсулина и пероральных антидиабетических средств, усиливает - непрямым антикоагулянтов. Фенитоин, салицилаты, дикумарол, фуросемид (в высоких дозах), клофибрат повышают содержание в крови. Холестирамин подавляет всасывание.

Передоз.: Рекомендуются прием блокаторов бета-рецепторов, плазмаферез.

Примен. и доз.: Внутрь, утром, натощак с небольшим количеством жидкости. При гипотиреозе начальная доза - 25-100 мкг в сутки; поддерживающая - 125-250 мкг в сутки; детям начальная доза - 12,5-50 мкг в сутки, поддерживающая - 100-150 мкг на 1 кв.м поверхности тела. Дополнительная терапия при лечении тиреостатическими препаратами - 50-100 мкг в сутки. Супрессионная сцинтиграмма щитовидной железы: в течение 14 дней по 200 мкг в сутки или 3 мг 1 раз за 7 дней до повторной сцинтиграммы. Злокачественная опухоль щитовидной железы (после операции) - 150-300 мкг в сутки. При эутиреоидной струме и для профилактики рецидивов после ее резекции взрослым - 75-200 мкг в сутки, детям (в зависимости от возраста) - 12,5-150 мкг в сутки.

Предост.: С осторожностью назначать пожилым пациентам при коронарной бо-

лезни сердца, сердечной недостаточности и тахикардии. Особая осторожность необходима в начале лечения у больных с гипертонией, страдающих припадками, с недостаточной функцией коры надпочечников, у пациентов с тяжелой формой гипофункции щитовидной железы или в том случае, если пониженная функция наблюдается продолжительное время.

Пронз.: Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия/Италия)

V-Пенициллин Словакофарма (V-Penicillin Slovakofarma®)

Феноксиметилпенициллин*

Сост. и ф.в.: 1 таблетка содержит феноксиметилпенициллина (в форме калиевой соли) 250 или 500 мг; в упаковке 30 шт.

Фарм. действ.: Антибактериальное, бактерицидное.

Показ.: Инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами (кокки, палочки столбняка и сибирской язвы, актиномицеты, клостридии и др.).

Противопоказ.: Гиперчувствительность к бета-лактамам антибиотикам.

Бер. и корм. гр.: Не обладает тератогенным эффектом.

Поб. действ.: Аллергические реакции (кожные высыпания, крапивница, лихорадка, эозинофилия, артралгия, ангионевротический отек, анафилактический шок). При назначении больших доз - кровоточивость, гиперкалиемия. Очень высокие дозы препарата вызывают нарушения со стороны ЦНС, особенно у детей, пожилых пациентов и на фоне почечной недостаточности.

Взаим.: Сульфаниламиды и бактериостатические антибиотики (тетрациклины, хлорамфеникол и др.) снижают, аминогликозиды увеличивают эффективность. Выведение почками замедляют пробенецид, фенилбутазон, салицилаты, индометацин. Снижает действие гормональных контрацептивов.

Примен. и доз.: Взрослым назначают в среднем по 500 мг 4-6 раз в сутки. Детям в возрасте 5-12 лет - по 250 мг 4-6 раз в сутки. Курс лечения - не менее 5-7 суток. Таблетки не следует рассасывать.

Произв.: Slovakofarma (Словакия)

Адреса предприятий и фирм и их представительств в России

А

Акрихин (Россия) -
ОАО "Химфармкомбинат
"Акрихин"
Россия, 142450, Московская обл.,
пос. Старая Купавна, ул. Кирова, 29
тел.: (095) 702-95-04, 702-93-87
(отдел сбыта)
факс: (095) 702-93-38, 702-95-03
телетайп: 346620 ГОРМОН
эл.почта: akrihin @ mastak.sitek.ru

Алтайвитамины (Россия) -
ЗАО "Алтайвитамины"
Россия, 659325, г. Бийск Алтайского
края, ул. Заводская, 69
тел.: (3854) 22-24-67, 22-82-84
факс: (3854) 24-50-58, 22-60-48
телетайп: 233415 "Рутин"

**Архангельский опытный
водорослевый комбинат
(Россия) -**
Архангельский опытный
водорослевый комбинат
Россия, 163030, г. Архангельск, пр.
Ленинградский, 328
тел.: (8182) 41-46-46
факс: (8182) 41-46-65
телетайп: 742445 Белоус

Б

Белкозин (Россия) -
Лужский завод белковой
колбасной оболочки "Бел-
козин"
Россия, 188260, Ленинградская обл.,
г. Луга
тел.: (81272) 2-19-50, 2-19-60
факс: (81272) 2-42-39
телетайп: 322577 Брынза

**Биомед им. И.И. Мечни-
кова (Россия) -**
АООТ "Биомед"
им. И.И. Мечникова
143422, Московская обл., Красногор-
ский р-н, с. Петрово-Дальнее
тел.: (095) 561-11-31, 561-19-67,
418-45-45
факс: (095) 418-40-68

Биореактор (Россия) -
ООО "Биореактор"
Россия 111250, Москва, ул. Авиамо-
торная, 53, корп. 2
тел.: (095) 273-94-54, 273-94-70
факс: (095) 273-31-69

Биотики (Россия) -
ООО "Медицинский на-
учно-производственный
комплекс "Биотики"
Россия, 127540 Москва, ул. Дубнин-
ская, 6, корп. 1, комната Правления.
Торговое представительство:
Россия, 115304, Москва, ул. Луган-
ская, 9
тел.: (095) 322-00-74, 110-07-90
факс: (095) 322-00-74

Биофа (Литва) -
АО "Биофа"
ул. В. Грайчюно, 8, 2028, г. Вильнюс,
Литовская Республика
тел.: (0122) 64-25-09
факс: (0122) 64-12-84
Дистрибьютеры:
в Москве: ТОО "Интермедспорт" -
тел./факс: (095) 277-53-13
ТОО "ГРИТВАК" - тел./факс:
(095) 117-79-06
в Омске: ГП Аптека N 200 -
тел./факс: (3812) 334-334

Борисовский ЗМП (Беларусь) -

Борисовский завод медицинских препаратов
Республика Беларусь, 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27
тел.: (01777) 3-22-61
факс: (01777) 3-24-25
телетайп: 301621 Борисов Хром

Борщаговский химфарм-завод (Украина) -

НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в форме ЗАО
Украина, 252134, Киев, ул. Мира, 17
тел.: (044) 483-71-20
факс: (044) 483-71-40

В**ВИЛАР НПО ПЭЗ (Россия) -**

Производственно-экспериментальный завод НПО "ВИЛАР"
Россия, 113628, Москва, ул. Грина, 7
тел.: (095) 338-33-09
факс: (095) 338-55-11

Восток (Россия) -

АООТ "Восток"
Россия, 612711, п. Восточный Кировской обл. Омутнинского р-на
тел.: (83352) 2-20-06, 2-20-05, 2-22-86, 2-16-77
факс: (83352) 2-22-06
телетайп: 672212 "Восток"

Г**Гриндекс (Латвия)**

Приватизируемое государственное акционерное общество "Гриндекс"
ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия
тел.: (013) 713-94-58, торговый департамент - 713-91-58, 710-43-57
факс: (013) 713-94-92, 713-86-83
телекс: 161243 GRIND LV

Д**Дарница (Украина) -**

АО "Фармацевтическая фирма "Дарница"
Украина, 253093, Киев, ул. Бориспольская, 13
тел.: (044) 556-00-72
факс: (044) 556-76-46

Е**Европа (Россия) -**

Фирма "Европа"
Россия, 400048 Волгоград, ул. Землячки, 12, корп. 22
тел.: (8442) 39-32-83, 39-32-87, 71-62-63
тел./факс: (8442) 39-32-87

И**Институт молекулярной генетики (Россия) -**

Институт молекулярной генетики Российской академии наук
Россия, 123182, Москва, пл. акад. Курчатова, 46
Институт молекулярной генетики РАН
тел.: (095) 196-02-16
факс: (095) 196-02-21
E-mail: img @ glas.apc.org

Ирбитский химфармзавод (Россия) -

ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
Россия, 623800, г. Ирбит, Свердловская обл., ул. Кирова, 172
тел.: (34355) 2-20-81, 2-30-41 (сбыт), 2-36-90 (снабжение)
факс: (34355) 2-23-20, 2-28-40
телетайп: Уран 721119

К**Кальцекс (Латвия) -**

Кальцекс
Э. Мелигайля, 3, Рига, LV-1144, Латвия
тел.: (0317) 33-12-28
факс: (0317) 33-41-48

Красногорсклексредства (Россия) -

АО "Красногорсклексредства"

Россия, 143414, Московская обл., пос. Опалиха, ул. Ленина, 25

тел.: (095) 562-52-03, 705-93-80, 705-93-81, 563-95-76

факс: (095) 705-93-82, 562-52-03

телетайп: 206143 "Травы"

Кристалл (Россия) -

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл"

Россия, 606007 г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Зеленая, 6

тел.: (8313) 59-81-21, 59-81-09 (отдел маркетинга)

факс: (8313) 54-65-01, 59-81-84

М**Марбиофарм (Россия) -**

Марийское биофармацевтическое акционерное общество "Марбиофарм"

Россия 424000, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 121

тел.: (8362) 12-03-12

факс: (8362) 55-77-00

телетайп: 220 214 SORBT RU

Медисорб (Россия) -

ЗАО "Медисорб"

Россия, 614113, Пермь, ул. Гальперина, 6

тел.: (3422) 54-71-28, 54-72-56

факс: (3422) 55-10-31

Микомс (Россия) -

ОАО "Московский мясокомбинат "Микомс"

109316, Москва, ул. Талалихина, 41

тел.: (095) 271-94-77

факс: (095) 276-08-60

телетайп: 113288 МЯСО

Московская фармфабрика (Россия) -

АО "Московская фармацевтическая фабрика"

Россия, 125239, Москва, Фармацевтический пр., 1

тел.: (095) 459-34-01 (отдел продаж), 450-42-80, 450-93-26

факс: (095) 459-41-12 (отдел продаж)

Московский эндокринный завод (Россия) -

Федеральное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"

Россия, 109052, Москва, ул. Ново-Хохловская, 25

тел.: (095) 278-00-50

факс: (095) 911-42-10

для телеграмм: Москва, 52, Инсулин

Мосхимфармпрепараты (Россия) -

Объединение "Мосхимфармпрепараты" им.

Н.А.Семашко"

Россия, 109172, Москва, ул. Б.Каменщики, 9

тел.: (095) 912-46-24, 912-54-26, 912-75-84

факс: (095) 912-01-80, 912-71-61

телетайп: 611067 Интал

Н**Нижфарм (Россия) -**

ОАО "Нижфарм" (Нижегородский химико-фармацевтический завод)

Россия, 603600, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел.: (8312) 37-08-97, 37-08-80,

30-72-40, 37-05-58, 37-09-27,

37-05-25, 37-02-57, 37-07-38,

37-09-27, 35-15-51

факс: (8312) 37-08-13, 37-07-38



О

Олайнфарм (Латвия) -
АО "Олайнский химико-фармацевтический завод"
Латвийская Республика, Олайне LV-2114, ул. Рупницу, 5
тел.: (0132) 96-44-95, 96-21-25
факс: (0132) 96-30-89
телетайп: 661874 Santa LV

Органика (Россия) -
ОАО "Органика"
Россия 654024 г. Новокузнецк Кемеровской обл.
тел.: (3843) 37-05-75, 37-24-94, 37-35-13
факс: (3843) 37-24-96, 37-16-07, 37-05-40
телекс: 215112 ISKRA SU

П

Пептек (Россия) -
ЗАО "Пептек"
117871, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
ИБХ РАН, ЗАО "Пептек"
тел.: (095) 330-74-56, 429-80-10
тел./факс: (095) 429-77-40

Перфторан (Россия) -
ОАО "Научно-производственная фирма "Перфторан"
Россия, 142292, Московская обл., г.Пушино
ИТЭБ РАН, корпус "искусственной крови"
тел.: (095) 923-74-67, доб. 332
тел./факс: (0967) 79-05-46

Полисан (Россия) -
Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан"
Россия, 198207, Санкт-Петербург, а/я 508
тел./факс: (812) 234-47-19
телетайп: 821599 ГРИПП (для НТФФ "Полисан")

Полисорб (Россия) -
ЗАО "Полисорб"
Россия, 454126, г. Челябинск, просп. Победы, 160, офис 336
тел./факс: (3512) 35-25-45

Р

Ретиноиды (Россия) -
АОЗТ "Фармацевтическое научно-производственное предприятие "Ретиноиды"
Россия, 111123 Москва, ул.Плеханова, 2
тел.: (095) 306-97-00, 176-72-17
тел./факс: (095) 176-19-28

Российский инсулин (Россия) -
ОАО "Российский инсулин"
Россия 352700, Республика Адыгея, Майкоп, ул. Юннатов, 9
тел.: (87722) 3-38-45, 3-60-27
факс: (87722) 3-73-58
Представительство в Москве:
121019, Москва К-9, ул.Воздвиженка, 4/7, офис 422
тел.: (095) 202-77-90, 202-10-12
факс: (095) 291-00-69

С

Санитас (Литва) -
АО "Санитас"
Проспект Витауто, 3, Каунас 3000, Литва
тел.: (370 7) 22-67-25, 22-40-09
факс: (370 7) 22-36-96

Синтез (Россия) -
Акционерное Курганское Общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (АКОС)
Россия, 640614, г.Курган, просп. Конституции СССР, 7
тел.: (352-22) 4-91-25, 4-41-38, 4-91-84, 4-86-90, 4-93-37, 4-43-25, 4-92-53
факс: (352-22) 4-89-77, 4-86-12, 4-82-85, 4-86-90, 4-86-85
телетайп: 120234 РИТМ

Т

Таллиннский фармацевтический завод (Эстония) -

АО "Таллиннский фармацевтический завод"
ул. Тонди, 33, EE0013 Таллинн, Эстония

тел.: (014) 655-27-87

факс: (014) 655-27-18

телекс: 173293 TAFA EE

Татхимфармпрепараты (Россия) -

Казанское производственное химико-фармацевтическое объединение

"Татхимфармпрепараты"
Россия 420091, Казань, ул. Беломорская

тел.: (8432) 54-20-32, 42-66-53, 42-69-11

факс: (8432) 54-33-54, 54-20-62

телетайп: 224729 ARGON RU

Томский химфармзавод (Россия) -

ОАО "Томский химико-фармацевтический завод"
Россия, 634009, Томск, просп. Ленина, 211

Тел.: (3822) 76-10-00, 77-24-64

(отдел сбыта)

тел./факс: (3822) 77-95-38

телетайп: 128185 ПАСК

ТОС (Россия) -

ЗАО "Производственное объединение "ТОС"
Россия, 141700 Моск.обл., г.Долгопрудный, Лихачевский пр., 5

тел: (095) 408-58-63

факс: (095) 408-53-77

телетайп: 364507 "Фотон"

Тюменский химфармзавод (Россия) -

Федеральное государственное унитарное предприятие "Тюменский химико-фармацевтический завод"

Россия, 625005, г. Тюмень, ул. Береговая, 24

тел.: (3452) 36-19-74, 36-11-15

факс: (3452) 39-40-07

телетайп: "Берег" 235119

У

УфаВита (Россия) -

ОАО "Уфимский витаминный завод "УфаВита"

Россия 450077, Уфа-77, ул.Худайбердина, 28

тел.: (3472) 29-00-19

факс: (3472) 22-86-68

телетайп: 162234 УЗОР

Ф

ФармаДон (Россия) -

ООО "Химико-фармацевтический завод "ФармаДон"

Россия, 344019, Ростов-на-Дону, ул. Виталия Закруткина, 66/3

тел.: (8632) 53-58-18, 53-87-44

факс: (8632) 53-69-77, 53-57-11

телетайп: "Фарма" 123488

Фармак (Украина) -

ОАО "Фармак"

Открытое акционерное общество "Фармак"

Украина, 254080, Киев, ул. Фрунзе, 74

тел.: (044) 417-10-55, 417-95-60, 417-98-67

факс: (044) 417-60-49, 417-44-87, 417-10-55

телетайп: 131092 ЗИЛ.

Представительство в России:

"Фармак-плюс"

107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11

тел.: (095) 962-64-19, 962-63-83, 962-63-87

"Интерфармсоюз"



198020, Санкт-Петербург, Рижский
просп., 41/В
тел.: (812) 251-78-92, 251-59-94

Фармэк+ (Россия) -**Фармэк+**

Россия, Москва, ул. Авиамоторная,
53

тел.: (095) 956-18-82, 273-45-42, 273-
93-39, 273-98-15

факс: (095) 273-45-42

Э**Эндокринный препара-
тай (Литва) -**

АО "Эндокринный пре-
паратай"

Литва, 3018 Каунас, ул. Вейверю, 134

тел.: (370 7) 22-74-32, 29-57-42

факс: (370 7) 29-15-85

А**Alcon Pharmaceuticals
(Швейцария) -**

Alcon Pharmaceuticals
Ltd.

P.O. Box 80

CH-6330 Cham, Switzerland

tel.: (41) 41-785-88-88

fax: (41) 41-785-88-87

Представительство в России:

197068, Санкт-Петербург,

Канал Грибоедова, 129-11

тел.: (812) 219-42-18

факс: (812) 113-67-43

Alkaloid (Македония)

Республика Македония, 91000, г. Ско-
пье,

бульвар Александар Македонски, 12

тел.: (38991) 611-533, 115-682

факс: (38991) 612-531

телекс: 51-104, 51-440 АЛКАИД МК

Представительство в России:

123242, Москва, ул. Конюшковская,
28/4, офис 7

тел.: (095) 253-93-95, 253-93-97, 253-
93-98

факс: (095) 253-93-94

**American Drug Company
(США)**

1730 Rhode Island Ave., NW Washing-
ton, D.C. 20036, USA

tel.: (202) 833-9223

fax: (202) 833-9294

Представительство в России:

117981, Москва, ГСП-1, просп.

Вернадского, 41, офис 615

тел.: (095) 430-84-12, 430-83-58

Ankerpharm (Германия) -

Ankerpharm GmbH

Groupe Chauvin

Theodor-Neubauer Straße, 33-36

07407 Rudolstadt, Germany

tel.: (03672) 47-82-19

Представительство в России:

107082, Москва, ул. Бакунинская, 84

тел./факс: (095) 261-38-03

Apotex (Канада) -

Apotex Inc.

150 Signet Drive, Weston, Ontario

Представительство в России:

АО "Спектра Лтд."

121433 Москва, ул. Звенигородская
14-2

тел.: (095) 146-96-12, 146-96-13

факс: (095) 142-59-17

Отдел по работе с клиентами: 121182

Москва, ул. Авиационная 13

тел.: (095) 490-41-52, 190-67-00

факс: (095) 490-49-22

Astra (Швеция) -

Astra

Astra Export & Trading AB

S-15185 Sodertalje, Sweden

tel.: + 46 8 553 260 00

fax: + 46 8 553 260 00

Представительство в России:

123610, Москва, Краснопресненская

наб., 12, офис 903

тел.: (095) 258-14-00

факс: (095) 258-14-42

В**Baxter (США)**

Baxter Export Corporation

8350 N.W. 52nd Terrace

Suite 300, Miami, Florida, 33166, USA

Представительство в России:

103473, Москва, Суворовская пло-
щадь, 1

тел.: (095) 956-38-39, 284-58-57, 284-
44-31

факс: (095) 956-38-40

Bayer (Германия) -

Bayer AG

D-5090 Leverkusen, Bayerwerk, Germany

tel.: (02 14) 30-39-23

fax: (02 14) 30-6-63-28

telex: 85 103-251 by d

ЗАО "БАЙЕР" (Россия):

123022, Москва, Б. Трехгорный пер. 1, стр. 20

тел.: (095) 234-20-68, 234-20-85, 234-20-86

факс: (095) 234-20-70, 234-20-77

Beaufour Ipsen International (Франция)

37, rue Spontini

75116 Paris-France

Представительства в России:

109004, Москва, ул. Николоямская, 54

тел.: (095) 258-54-00

факс: (095) 258-54-01

630000, Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 1

тел.: (3832) 25-96-43

факс: (3832) 25-97-30

Представительство на Украине:

252024, Киев, ул. Шовковична, 36/7, кв. 8

тел./факс: (044) 293-41-55

Представительство в Беларуси:

220004, Минск, просп. Машерова, 5

тел.: (0172) 76-90-17

тел./факс: (0172) 23-98-67

Представительство в Казахстане:

480091, Алматы, ул. Толе Би, 69

тел.: (3272) 69-40-72

факс: (3272) 69-17-29

Представительство в Узбекистане:

700017, Ташкент, С-4, 26, кв. 2

тел.: (3712) 35-89-46

факс: (3712) 40-68-21

Behringwerke (Германия) -

Behringwerke AG

D-35001

Marburg, Germany

tel: (06421) 39-0

fax: (06421) 39-39-86

Представительство в России:

Хехст АГ

Хехст Мэрион Руссель

125015, Москва, ул. Вятская 70, 5 этаж

тел.: (095) 232-19-25, 232-18-26

факс: (095) 232-19-28

спутниковый факс: (503) 232-19-28

Belupo (Хорватия) -

Belupo d.o.o.

Belupo d.o.o. Lijekovi i kozmetika - Koprivnica - Hrvatska

"Belupo" - 10000 Zagreb - Berislaviceva 11/1 - Hrvatska (Croatia)

tel.: +385/1/428-899, 277-754

fax: +385/1/423-380

Представительство в России:

"Астра-Белупо"

121248, Москва, Кутузовский просп., 13, кв. 10-13

тел.: (095) 243-65-37, 243-04-53, 243-04-74

факс: (095) 243-65-37, 243-11-15

Béres Co. (Венгрия) -

Béres Co. Ltd.

Hungary, Budapest, Szepvolgyi ut

135, H-1037

tel.: 36-1-250-74-44

fax: 36-1-250-72-51

Berlin-Chemie / Menarini Group (Германия / Италия)

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125-127,

D-12489, Berlin, Germany

tel.: (004930) 6707-2521

fax: (004930) 6707-2777

telex: 302967 bche dd

Menarini Pharmaceutical

Industries Group Ltd

VIA SANT 3,

50131 Florence, Italy

P.O. Box 4063

fax: (055) 568-04-84

telex: 572404 MENARINI

Представительство в России:

125047, Москва, ул. Гашека, 7, Дука-2

тел.: (095) 785-01-00

факс: (095) 785-01-01

Biochemie (Австрия) -

Biochemie Ges.m.b.H.

A-6250 Kundl / Austria

tel: (43-5338) 200-662

fax: (43-5338) 200-665

telex 51442 bcimd a.

Представительство в России:

119021 Москва, ул. Россолимо, 4, 5 этаж

тел.: (095) 245-07-50, 245-07-75, 245-00-87, 245-00-89

факс: (095) 245-00-98



Biogal (Венгрия)

АО "Фармацевтический завод"Био-гал"Венгрия-4042, г.Дебрецен, ул.Паллагн, 13

тел.: (36-52) 311-633, 347-000

факс: (36-52) 340-650, 418-752

Представительство в России:

123376, Москва, ул.Красная Пресня, 1-7, комн. 540

тел.: (095) 255-17-92, 238-65-68

факс: (095) 956-22-24"

Bionorica (Германия) -

Bionorica Arzneimittel

GmbH

Kerschensteinerstr. 11-15 D-92318

Neumarkt, Germany

tel.: 0049 9181 231-90

fax: 0049 9181 231265

Представительство в России:

117415, Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 2

тел.: (095) 938-93-55

тел./факс: (095) 938-26-00

Biotest (Германия) -

Biotest Pharma GmbH

63303, Dreieich, Landsteinerstr. 5, Germany

tel.: (49-6103) 801-753

fax: (49-6103) 801-717

Представительство в России:

117846, Москва, ул. Вавилова, 69, офис 428

тел.: (095) 938-23-41

факс: (095) 938-23-43

Bittner (Австрия) -

Richard Bittner GmbH

"Herbs Trading GmbH" - партнер австрийской фирмы "Richard Bittner GmbH"

Naturpark Gurktal A-9344, Weitensfeld, Osterreich

tel.: +43-4265-2380

fax: +43-4265-7423

Представительство в России:

"Хербс Трейдинг ГмбХ"

109240, Москва, ул. Николоямская, 11

тел.: (095) 915-05-76, 915-77-50

факс: (095) 915-32-43

Boehringer Mannheim

(Германия) -

Boehringer Mannheim

GmbH

Sandhofer Strasse 116, D-68298

Mannheim, Germany

tel.: (0621) 759-0

fax: (0621) 759-28-90

telex: 463193 bm d

Представительство в России:

119881, Москва, ул. Малая Трубецкая 8, корп.В, 12 этаж

тел.: (095) 913-71-03

Bristol-Myers Squibb

(США)

в США:

General Offices, P.O. Box 4000, Princeton, NJ 08543-4000, USA

В Великобритании:

Central & Eastern Europe, Harrington House, Millton Road Ickenham, Middlesex UB10 8Pu, UK

tel.: (044) 1895628988

Представительство в России:

103001, Москва, Трехпрудный пер. 7-9, строение Н

тел.: (095) 755-92-67

факс: (095) 755-92-62

Byk Gulden (Германия)

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2, Postfach 10 03

10, D-7750, Konstanz, Germany

tel./fax: (49)(07531) 84-24-74

Представительство в России:

121356, Москва, ул. Маршала Тимошенко, 15

тел.: (095) 414-09-83

факс: (095) 415-29-78

Представляет также препараты, зарегистрированные дочерней фирмой Oranienburger Pharmawerk GmbH (Германия)

С

Ciba Vision Ophthalmics

(Франция)

8, rue de Colomies, B.P. 1129

31036 Toulouse, Cedex, France.

Представительство в России:

Москва, 101000, а/я 886, ПРЕФАРМ

Москва, ул. Александра Лукьянова, 4

тел.: (095) 261-57-40

факс: (095) 261-06-95

E-MAIL: Rp.Prespharma @G23.Rel-com.RU

Covex (Испания) -

Covex, S.A.

28770 C/Acero 25, Poligono Industrial Sur, Colmenar Viejo
Madrid, Spain

tel.: (34-1) 845-02-00, 804-45-45

fax: (34 1) 845-02-08, 804-30-30

telex: 47918 COVX

E-Cables: COVEX

Представительство в России:

ЗАО "Трейд Фармацевтика"

117526, Москва, просп. Вернадского, 91, корп. 3

тел.: (095) 938-92-18

факс: (095) 938-92-20

CSC (Италия) -

CSC Ltd.

В Вене:

tel.: +43-1-369-04-44

fax: +43-1-369-04-44-20

Представительства в России:

115478, Москва, Каширское шоссе, 24, Дом Ученых ОНЦ РАМН, к. 354

тел.: (095) 324-92-30, 343-43-84

факс: (095) 324-91-40

телекс: 411015 knife

115551, Москва, Шиниловский пр., 47/1, гостиница "Царицино", 10 этаж

тел.: (095) 343-43-84

факс: (095) 343-43-88

CTS (Израиль) -

CTS Chemical Industries Ltd.

P.O. Box 10, Tel Aviv 61000, Israel,
Head Office: 100 Jabotinsky Rd.

Petach Tikva

tel: 972-3-9373333

fax: 972-3-9225964

Дистрибьютеры в России:

АО "Фармимэкс",

101423, ГСП, Москва, К-9, ул.

Б.Дмитровка 7/5

тел.: (095) 292-70-16

факс: (095) 292-98-89

АОЗТ "Оргат"

157092, Костромская обл., Сусанинский р-н,

п.Панфилово

тел.: (09434) 9-12-32

факс: (0942) 55-04-52

"Спектра Лтд"

111402, Москва, ул. Вешняковская, 12-3

тел.: (095) 490-41-52

факс: (095) 490-49-22

ООО "Квалитет"

450098, Уфа, пр-т Октября, 122-46

тел.: (3472) 33-77-95

факс: (3472) 24-19-10

D

DHU (Германия) -

Deutsche Homöopathie-Union

Ottostrasse, 24, 76202 Karlsruhe, Deutschland

tel.: (8-1049-721) 409-32-36, 409-32-37

fax: (8-1049-721) 409-32-66

Представительство в России:

117071, Москва, Ленинский просп., 20-А

тел.: (095) 237-16-91, 954-40-27,

954-61-11

факс: (095) 958-14-58

Diet Pharma (Германия) -

Diet Pharma GmbH

Schmied-Kochel-Str. 17

D-8000-Munchen 70, Deutschland

tel.: (089) 76-18-34

Fax: (089) 725-07-36

Представительство в России:

АОЗТ "Красная Гора"

101430, Москва, ул. Неглинная, 29/14

тел.: (095) 200-39-33, 200-36-35

факс: (095) 200-20-28, 200-10-27

Dr. Falk (Германия) -

Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5, D-79041, Freiburg, Germany

tel.: 0049/761/130 34 0

fax: 0049/761/130/ 34 21

telex: 772 458 falk d

Представительство в России:

117415, Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 2, офис 463-а

тел./факс: (095) 938-91-91

Dr. Kade (Германия) -

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistr. 2, 12277, Berlin, Germany

tel./fax: 30-72082200

Представительство в России:

117415, Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 2, офис 463-а

тел./факс: (095) 938-91-91



Dr. Reddy's Laboratories (Индия) -

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

7-1-27, Ameerpet, Hyderabad 500016, India

tel.: 91-40-291946, 91-40-291947

fax: 91-40-290500, 91-40-291955

telex: 0-425-8103 VOGL IN

Представительство в России:

117296, Москва, Ломоносовский просп., 2/62

тел.: (095) 134-45-47, 132-30-01

факс: (095) 132-72-74

телекс: 413081 DRL SU

Dr. Willmar Schwabe (Германия) -

Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel

Willmar-Schwabe-Strasse, 4 Deutschland

tel.: (0721) 40-05-0

fax: (0721) 40-05-202

Представительство в России:

117071, Москва, Ленинский просп., 20-А

тел.: (095) 237-16-91

тел./факс: (095) 958-14-58

Е**Ebewe (Австрия)**

Ebewe Arzneimittel Ges.m.b.H.

A-4866 Unterach, Austria

tel.: 43-76 65-81 23

fax: 43-76 65-81 32

Представительство в России:

123060, Москва, ул. Народного Ополчения, 35

тел./факс: (095) 194-19-87, 943-04-48

Egis (Венгрия) -

Egis Rt

H-1106 Budapest, X. Kereszturi ut 30-38

Tel: (361) 252-72-22

Fax: (361) 183-45-54

Telex: 22-41-01 egis h

Представительство в России:**Торговое представительство Венгерской Республики**

123376 Москва, ул. Красная Пресня, 1-7, офис 560

Тел.: (095) 252-64-02, 250-71-80

Факс: (095) 252-65-02

Endurance Products (США) -

Endurance Products Co. (Innovite Inc.)

9914 SW Tigard Street, Tigard, OR 97223-5244, USA

tel.: +1 (503) 639-95-62

fax: +1 (503) 639-95-64

Представительство в России:

101953, Москва, Петроверигский пер., 10, офис 260

тел.: +7 (095) 921-03-89

факс: +7 (095) 921-09-69

Esparma (Германия) -

Esparma GmbH

Lutherstrasse 1-2, 39112 Magdeburg, Germany

tel.: (+49-391) 62847-0

fax: (+49-391) 6284720

Представительство в России:

125167, Москва, Ленинградский просп., 47, офис 340

тел.: (095) 967-69-63

факс: (095) 967-69-60

F**Ferring Pharmaceuticals (Нидерланды) -**

Ferring Pharmaceuticals B.V.

Представительство в России:

121002, Москва, Карманицкий пер., 9

тел.: (095) 234-08-28

факс: (095) 956-09-61

Ferrosan (Дания) -

Ferrosan A/S

Sydmarken 5, 2860 Soeborg, Denmark

tel.: (45) 39 69 21 11

Представительство в России:

113447, Москва, ул. Дмитрия Ульянова 35, строение 1

тел.: (095) 126-94-30

тел./факс: (095) 126-94-16

Four Ventures (США) -

Four Ventures Enterprises, Inc.

18226 Ventura Blvd., Suite 200, Tarzana, Ca 91356 USA

tel.: (818) 345-88-80

fax: (818) 774-2225

Представительство в России:

"Москови Компани" ЗАО
119121, Москва, Ружейный пер., 4,
под. 4
тел.: (095) 247-45-49
факс: (095) 247-40-27

G**Gedeon Richter (Венгрия)**

Венгрия, Будапешт, ул. Дьемрен 19-21, Н-1475

Тел.: (361) 261-21-99

Факс: (361) 260-46-91

Представительство в Москве.

Торговое представительство

Венгерской Республики

000940, Москва, ул. Красная Пресня, 1-7, офис 459

Тел.: (095) 255-18-39

Факс: (095) 255-17-54

Glaxo Wellcome (Великобритания)

Представительства в России:

117418, Москва, ул. Новочеремушkinsкая, 61

тел.: (095) 258-67-22

факс: (095) 258-67-23

GlaxoWellcome North:

191101, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 1

тел.: (812) 327-30-95

GlaxoWellcome Far East:

690000, г. Владивосток, Океанский просп., 103-а

тел.: (4232) 42-20-16

GlaxoWellcome East Siberia:

664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 18, офис 223

тел.: (3952) 33-59-90

GlaxoWellcome South:

350000, г. Краснодар, ул. Постовая, 18, офис 401

тел.: (8612) 59-98-54

GlaxoWellcome East Russia:

625000, г. Тюмень, ул. Сакко, 13, офис 7

тел.: (3452) 24-69-76

GlaxoWellcome Md. Povolzhie:

440101, г. Пенза, ул. Лядова, 28-119

тел.: (8412) 55-13-97

Grünenthal (Германия) -

Grünenthal GmbH

Steinfeldstrasse 2, D-52222 Stolberg, Germany

tel.: (02402) 103-1

fax: (02402) 103442

telex: 8 32 230 agrtd

Представительство в России:

129010, Москва, Грохольский пер.,

13, строение 2, офис 205

тел./факс: (095) 280-47-80, 280-19-81

H**Heel (Германия) -**

Biologische Heilmittel

Heel GmbH

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden, Deutschland

tel.: +49-7221-501137

fax: +49-7221-501230

telex: 781 260

Представительство в России:

ЗАО "Арнебия"

127276, Москва, ул. Ботаническая, 35

тел.: (095) 903-93-42, 482-38-31

факс: (095) 482-50-18

Hemofarm (Югославия) -

Hemofarm DD

26300, Vrsac-Yugoslavia, Beogradski put bb

tel.: (381-13) 812-345

fax: (381-13) 818-362, 818-383

telex: 13 136 yu inhem

Представительство в России:

129110, Москва, ул. Трифоновская, 45Б

тел.: (095) 284-05-52, 284-05-88, 284-06-23, 281-52-85

факс: (095) 281-82-95, 284-06-37

Hoechst (Германия) -

Hoechst AG

D-65926

Frankfurt am Main, Germany

tel.: (49) (069) 305-0

fax: (49) (069) 30-36-65/66

telex: 41 234 260 ho d.

Представительство в России:

Хехст АГ

Хехст Мэрион Руссель

125015, Москва, ул. Вятская 70, 5 этаж

тел.: (095) 232-19-25, 232-18-26

факс: (095) 232-19-28

спутниковый факс: (503) 232-19-28

Hoechst Marion Roussel

(Индия) -

Hoechst Marion Roussel

Представительство в Москве:

Хехст АГ



Хехст Мэрнон Руссель
125015, Москва, ул. Вятская 70, 5
этаж
тел.: (095) 232-19-25, 232-18-26
факс: (095) 232-19-28
спутниковый факс: (503) 232-19-28

Hoffman-La Roche
(Швейцария) -
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.

CH-4002 Basel, Switzerland
tel.: (41-61) 272-349, 271-122
Представительство в России:
103051, Москва, Рахмановский пер.,
4, стр. 1
тел.: (095) 258-27-77
факс: (095) 258-27-71

I

ICN Pharmaceuticals
(США) -

ICN Pharmaceuticals, Inc.
International Headquarters
ICN Plaza
3300 Hyland Avenue
Costa Mesa, California 92626
tel.: 1-714-545-0100
fax: 1-714-556-0131
Московский филиал Корпорации ICN
Pharmaceuticals, Inc.:
103001, Москва, Трехпрудный пер.,
7-9
тел.: (095) 232-66-00
факс: (095) 234-31-88

ICN Alkaloida (Венгрия)

Венгрия
4440 г.Тисавашвари, п/я 1
тел.: 36-42-372511
факс: 36-42-372512
Представительство в России:
см. представительство ICN Pharma-
ceuticals, Inc.

**ICN Galenika (Югосла-
вия)**

Югославия
11080, Beograd-Zenum Batajnicki
drum b.b. D.O.B. 129
tel.: (38111) 105-391, 199-417
Представительство в России:
см. Представительство ICN
Pharmaceuticals, Inc.

**ICN Лексредства (Рос-
сия)**

Россия, 305909, г. Курск, ул. 2-я Аг-
регатная, 1-а/18
тел./факс: (07122) 6-12-81, 6-02-11,

6-00-05

телетайп: 137105 Химия
телекс: 137203 CURE RU
Представительство в Москве:
см. представительство ICN Pharma-
ceuticals Inc.

ICN Октябрь (Россия)

Россия, 197376, Санкт-Петербург, Ап-
текарский проспект, 5
тел.: (812) 234-22-65, 234-44-31
факс: (812) 234-02-61
телетайп 821516 ADONIS RU
Представительство в Москве:
см. Представительство ICN Pharma-
ceuticals, Inc.

ICN Полифарм (Россия)

Россия, 454899, Челябинск, ул. Ель-
кина, 32
тел.: (3512) 33-10-25, 66-68-98
факс: (3512) 66-70-84
Представительство в Москве:
См.представительство ICN Pharma-
ceuticals, Inc.

Immuno (Австрия) -

Immuno AG
A-1221 Vienna, Austria, Industries-
trasse, 67
tel.: (43-1) 20-100-2170
fax: (43-1) 20-100-517
Представительство в России:
117312 Москва, ул. Губкина, 14,
офис 79-80
тел.: (095) 938-28-46
факс: (095) 938-28-05

Iskra (Япония) -

Iskra Industry Co., Ltd.
1-14-2, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo,
Japan
tel.: 03-3281-3362
fax: 03-3281-4497
telex: Proiskra J24818
Представительство в России:
103009, Москва, ул.Б.Дмитровка, 9,
офис 19
тел.: (095) 292-78-19, 564-87-33
факс: (095) 292-60-72
телекс: Moscow 413239 ISKRA RU
Поставка со склада - через Генераль-
ного дистрибьютера
фирмы "Искра" в России - "Рос Ток
Корпорейшн"
101000, Москва, Бобров пер., 6 (зда-
ние "Профбанка")
тел./факс: (095) 925-47-86

J

ЈАКА-80 (Македония)

ул. Сава Ковачевич 15-А, 91000, Скопје, Македония

тел.: (389 91) 114 188

факс: (389 91) 115727

Представительство в России:

117312, Москва, просп. 60-летия Октября, 9, 13 этаж

тел.: (095) 135-23-46, 137-29-54, 926-59-98, 926-59-97

факс: (095) 926-59-91

Janssen-Cilag (Бельгия/Швейцария) -

Janssen-Cilag (фирма корпорации Johnson & Johnson)

Janssen Pharmaceutica

Turnhoutseweg 30

B-2340, Beerse, Belgium

Cilag

Chollerstrasse 38

CH-6300 Zug, Switzerland

Представительство в России:

113191, Москва, ул. Б. Тульская, 43

тел.: (095) 755-83-57

факс: (095) 755-83-58

Jenapharm (Германия) -

Jenapharm GmbH & Co. KG

Otto-Schott-Strasse, 15

D-07745 Jena, Deutschland

tel.: (03641) 64-61-74

fax: (03641) 64-66-90

Представительство в России:

Группа компаний Schering

129090, Москва, ул. Дурова, 26, корп. 1

тел.: (095) 926-50-67, 284-76-59

факс: (095) 284-79-58

K

Knoll (Германия) -

Knoll AG BASF Pharma

Postfach 210805, D-67008 Ludwigshafen Knollstrasse, Germany

tel.: (0621) 5 89-0

fax: (0621) 5 89-28 96

telex: 464 823 Kn d

Представительство в России:

119881, Москва, ул. Малая Трубецкая, 8, 12 этаж

тел.: (095) 234-96-66

факс: (095) 234-96-67

Krewel Meuselbach (Германия) -

Krewel Meuselbach GmbH

Xavier-Vorbruggen-Str. 6

98708 Gehren, Germany

tel.: +49 36783/85-0

fax: +49 36783/85-333

Представительство в России:

125468, Москва, Ленинградский просп., 51, офис 502

тел.: (095) 943-95-91

факс: (095) 943-94-15

KRKA (Словения) -

KRKA, d.d

Smarjeska cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenija

tel.: (068) 312-111

fax: (068) 321-537

Представительство в России:

103009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5, 3 подъезд, 5 этаж, кв. 25-26

тел.: (095) 564-83-07, 956-95-14

факс: (095) 564-83-05, 956-95-12

L

Laboratoires Biocodex (Франция)

19, rue Berbes, 92120 Montroville, France

tel.: (33-1) 46-56-67-89

Представительство в России:

Москва, 101000, а/я 886, ПРЕФАРМ

Москва, ул. Александра Лукьянова, 4

тел.: (095) 261-57-40

факс: (095) 261-06-95

E-MAIL: Rp.Prespharma

@G23.Relcom.RU

Laboratoires Doms Adrian (Франция)

4, rue Ficatier, 92400 Courbevoie, France

tel.: (33-1) 41-16-33-14.

Представительство в России:

Москва, 101000, а/я 886, ПРЕФАРМ

Москва, ул. Александра Лукьянова, 4

тел.: (095) 261-57-40

факс: (095) 261-06-95

E-MAIL: Rp.Prespharma

@G23.Relcom.RU



Laboratoires du Docteur E.Bouchara (Франция)

68, rue Marjolin, F-92300 Levallois-Perret, France

Tel.: (1) 45-19-10-45

Fax: (1) 42-70-16-96

Telex: LABEX 614124F

Представительство в России:

ФИК МЕДИКАЛЬ ВОСТОК

123610 Москва, Краснопресненская

наб. 12, Совинцентр,

гостиница "Международная-2", офис 606

тел.: (095) 258-20-06

факс: (095) 258-20-07

Laboratoires Laphal (Франция)

BP.7, 13718 - Allauch, France

Представительство в России:

Москва, 101000, а/я 886, ПРЕФАРМ

Москва, ул. Александра Лукьянова, 4

тел.: (095) 261-57-40

факс: (095) 261-06-95

E-MAIL: Rp.Prespharma @

G23.Relcom.RU

Laboratoires Promedica (Франция)

41, rue de Carnille-Pelletan - 92305

Levallois-Perret, France

Представительство в России:

Москва, 101000, а/я 886, ПРЕФАРМ

Москва, ул.Александра Лукьянова, 4

тел.: (095) 261-57-40

факс: (095) 261-06-95

E-MAIL: Rp.Prespharma

@G23.Relcom.RU

Lannacher Heilmittel (Австрия) -

Lannacher Heilmittel GmbH

Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria

tel.: 03136/82577-0

fax: 03136/81563

Представительство в России:

109088, Москва, 1-я ул. Машиностроения, 5, офис 503

тел.: (095) 177-88-10, 177-88-42

факс: (095) 177-85-80

Leiras (Финляндия) -

Leiras Oy

Pansiontie 47, P.O. Box 415

FIN-20101 Turku, Finland

tel.: +358216-332-416

fax: +358216-332-570

Представительство в России:

Группа компаний "Schering"

129090, Москва, ул. Дурова, 26, корп.1

тел.: (095) 926-50-67, 284-76-59

факс: (095) 284-79-58

Lek (Словения)

Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.

Verovskova 57, P.O. Box 81.

Ljubljana, Slovenia 61107

tel.: (386-61) 188-21-11

fax: (386-61) 168-35-17

Представительство в России:

123837, Москва, просп. Маршала Жукова, 4, 3 этаж

тел.: (095) 195-66-78, 195-64-14, 195-66-76

факс: (095) 234-17-13

Lilly (Швейцария) -

Eli Lilly Export S.A.

Air Centre 16, Ch. Des Conquelicots,

P.O. Box 580, CH-1214 Vernier / Geneva, Switzerland

tel.: (41-22)-306-03-33

fax: (41-22)-306-04-70

Представительство в России:

103051, Москва, ул.Садовая-Самотечная, 24/27

тел.: (095) 258-50-01

факс: (095) 258-50-05

Lisapharma (Италия)

Via Licinio 11/13/15,

I-22036 Erba Como, Italy

tel.: (39) 31-641-257

Представительство в России:

121248, Москва, Кутузовский просп., 9, корп. 2, бюро 98

Фирма "Линум" (Словения) - официальный дистрибьютер

завода "Lisapharma" (Италия)

тел./факс: (095) 974-80-01, 974-80-02, 974-80-03

М**Madaus (Германия) -****Madaus AG**

Ostmerheimer Str. 198, 51109 Koln

tel.: (49) 221 8998-471

fax: (49) 221 8998-720

telex: 8873441 drmad

**Marion Merrell Dow
(США)****Представительство в России:**

Хехст АГ

Хехст Мэррион Руссель

125015, Москва, ул. Вятская, 70, 5

этаж

тел.: (095) 232-19-25, 232-18-26

факс: (095) 232-19-28

спутниковый факс: (503) 232-19-28

Mead Johnson Nutritionals (США)

Mead Johnson Nutritionals

A division of Bristol Myers Squibb Co.

2400 West Lloyd Expressway, Evans-

ville, Indiana, 47721, USA

tel.: 1 812 429 5000

fax: 1 812 429 8992

Представительство в России:

103001, Москва, Трехпрудный пер.,

7-9, строение Н

тел.: (095) 755-92-67

факс: (095) 755-92-85, 755-92-62

Merckle (Германия) -**Merckle GmbH**

Graf-Argo-Strasse 3, 89079 Ulm

(Donau), Germany

tel./fax: (49-731) 402-62-40, 402-71-

74, 402-73-44

Представительство в России:

121069, Москва, Новинский бульв.,

20-а

тел.: (095) 232-12-47, 232-13-95

факс: (095) 232-13-69

MSD (США) -**Merck Sharp & Dohme****Idea, Inc.**

Affiliate of Merck & Co., Inc., White-

house Station, N.J., USA

Представительство в России:

121059, Москва, Бережковская наб.

2, гостиница "Славянская/Радиссон",

Южное крыло

тел.: (095) 941-82-75

факс: (095) 941-82-76

Mundipharma (Австрия) -**Mundipharma GmbH**

A-1072 Wien, Apollogasse 16-18

Эксклюзивный дистрибьютер препара-

та "Мундизал гель" в России:

Корпорация "Технотрейд Интер-

нэшнл"

109004, Москва, ул. Марксистская

20, строение 8

тел.: (095) 270-59-02, 911-66-70

факс: (095) 270-60-04

N**Norgine Pharma (Фран-
ция)**23, avenue de Neuilly, 75116 Paris,
France

tel: (1) 44 17 48 88

fax: (1) 44 17 48 96

telex: NORPAR 641 454 F

Представительство в России:

ФИК МЕДИКАЛЬ ВОСТОК

123610 Москва, Краснопресненская

наб. 12, Совинцентр, Международная-

2, офис 606

тел.: (095) 258-20-06

факс: (095) 258-20-07

**Norton Healthcare / Ga-
lena (Великобритания)**

H.N.Norton & Co. Ltd.

United Kingdom, Flex Meadow - Har-

low, Essex CM19 5TJ

tel.: (1279) 42-66-66

fax: (1279) 42-68-17

Galena a.s.

Ostravska 29, 747770 Opava 9, Czech

Republic

tel.: (653) 21-08-20

fax: (653) 21-08-01

Представительство в России:

Norton Healthcare / Galena a.s.

103031, Москва, Дмитровский пер., 9,

Бизнес-центр "Столешники", 5 этаж

тел.: (095) 234-97-13

факс: (095) 234-97-11

**Novartis Consumer
Health (Швейцария) -****Novartis Consumer Health
SA****Представительство в России:**

103104, Москва, Б.Палашевский

пер., 15



тел.: (095) 969-21-65
факс: (095) 969-21-66

Novartis Pharma Services (Швейцария) -
Novartis Pharma Services Inc.

Представительство в России:
103104, Москва, Б.Палашевский пер., 15
тел.: (095) 969-21-60, 967-12-70
факс: (095) 967-12-68

Novo Nordisk (Дания) -

Novo Nordisk A/S
Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Denmark
tel.: +45 4444 8888
fax: +45 4449 0555
telex: 37173

Представительство в России:
117330 Москва, Ломоносовский просп., 38-11
тел.: (095) 956-11-32, 956-11-33
факс: (095) 956-50-13

О

Orion (Финляндия) -

Orion Corporation Orion Pharma International
P.O. Box 65, 02101 Espoo, Finland
tel: +358-9-4291
fax: +358-9-42938-15

Представительства в СНГ:
Россия, 117049, Москва, ул. Мытная 1, пом. 21
тел.: (095) 230-04-65, 230-04-76, 230-04-78
факс: (095) 230-65-11
Россия, 190068, Санкт-Петербург, пер. Бойцова 7, офис 209
тел.: (812) 315-73-72
тел./факс: (812) 310-02-20
Украина, 252110, Киев, ул. Соломенская 17, Клиническая больница N 7
тел.: (044) 271-75-30
тел./факс: (044) 276-00-32

Orthomol (Германия) -

Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
D-40739 Langenfeld, Postfach 1431, Germany
tel.: (2173) 90-59-0
fax: (2173) 90-5911

Р

Parke-Davis / Gödecke (Германия)

Mooswaldallee 1, Freiburg, D-79090, Germany
tel.: 49-761-518-23-03
fax: 49-761-518-33-13
telex: 77-21-575 san d.
Представительство в России:
123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, офис 508
тел.: (095) 258-24-52
факс: (095) 258-24-51

Pasteur Mérieux Connaught (Франция)

58, avenue Leclerc, BP-7046
69342 LYON CEDEX 07
tel.: (33) 4 72 73 77 07
fax: (33) 4 72 73 77 37
Представительство в СНГ:
101000, Москва, Уланский пер., 5, 3 эт.
тел.: (095) 935-86-90/91/92/93/94/95
факс: (095) 935-86-96

Pfizer (США) -

Pfizer International Inc.
Hoge Wei 10, B-1930, Zaventem, Belgium
tel.: (32 2) 722-02-11
fax: (32 2) 725-35-86
telex: 21952 pfizsg b
Представительство в России:
109004, Москва, ул. Таганская, 21
тел.: (095) 258-55-35, 258-55-45
факс: (095) 258-55-38

Pharma Wernigerode (Германия) -

Pharma Wernigerode Arzneimittelwerk GmbH
Muhlental 42
D-38855 Wernigerode, Germany
tel.: (0 39 43) 530-0
fax: (0 39 43) 530-479
Представительство в России:
Московская фармацевтическая фабрика
125239, Москва, Фармацевтический пр., 1
тел.: (095) 459-43-17
факс: (095) 459-34-07

Pharma-Med (Канада) -

Pharma-Med Inc.

5001 Yonge Street Suite 1403, North
Jork, Ontario, Canada

tel: (416) 221-2401

fax: (416) 221-2719 MRN GPE

Представительство в России:

ЗАО "Фармамед"

117815 Москва, ул. Академика
Опарина, 4

тел.: (095) 438-12-10, 438-12-11

факс: (095) 438-12-07

**Pierre Fabre Medicament
(Франция)**45, place Abel Gance, 92100 Bou-
logne, France

tel.: (1) 49-10-80-00

fax: (1) 49-10-96-93

Представительство в России:119899, Москва, Воробьевы горы, На-
учный парк МГУ, корп. 3

тел.: (095) 247-62-02

факс: (095) 247-62-03

Pliva (Хорватия) -

Pliva d.d.

Groatia 41000 Zagreb

Vukovarska avenija 49

tel.: (38-5-41)-612-09-99

fax: (38-5-41)-811-18-35

telex: 22635

Представительство в России:117330, Москва, Ломоносовский
просп., 38, N 3

тел./факс: (095) 143-03-90, 232-15-49

факс: (095) 940-67-29

телекс: 414420

**Pohl-Boskamp (Герма-
ния) -**

G.Pohl-Boskamp GmbH

& Co. Chemisch-pharazeu-
tische FabrikKieler Strasse 11, D-25551 Hohen-
lockstedt, Germany

tel.: (49) 48-26-59-0

fax: (49) 48-26-59-10

Представительство в России:125252, Москва, ул. Куусинена 21-Б,
МЦНТИ

тел./факс: (095) 198-73-41

Pro.Med.CS Praha**(Чехия) -**

Pro.Med.CS Praha a.s.

Telcska 1, 141 00 Praha 4, Czech Re-
public

tel./fax: (422) 692-07-58

Представительство в России:115478, Москва, Каширское шоссе,
24, Экспериментальный корпус,
комн. 548

тел./факс: (095) 324-22-34

Q**Quimica (Перу) -**

Quimica Interamericana

Peru S.A.

Республика Перу, г.Лима, ул.7 Галеа-
но, 672, Лос Росалес, Сурко

тел./факс: 48-06-72

Представительство в России:ТОО Центр Народной Медицины
"Юнона"115477, Москва, ул.Кантемировская,
12/14

тел./факс: (095) 322-61-41, 320-69-10

R**Ranbaxy (Индия) -**

Ranbaxy Laboratories Ltd.

10th floor, Devica Tower 6 Nehru
Place, New Dehli 110019, India**Представительство в Лондоне:**Suite No 28, 140, Parklane, London,
W1Y 3AA, UK**Представительства в России:**129223, Москва, Просп. Мира, ВВЦ
Деловой центр Технопарк, строение
6, офис 65-66

тел.: (095) 974-72-56

факс: (095) 974-72-74

Санкт-Петербург:

тел.: (812) 185-49-51

факс: (812) 185-49-52

Екатеринбург:

тел.: (3432) 60-52-93

факс: (3432) 55-60-17

Новосибирск:

тел./факс: (3832) 22-50-16

Ростов-на-Дону:

тел./факс: (8632) 54-37-36

Представительство на Украине:

Украина, Киев:

тел./факс: (044) 294-71-54, 294-43-68



Remedica - Minnex**(Кипр) -**

Remedica Ltd. - Minnex
Aharnon str. Industrial Estate, P.O.
Box 1706

Limassol, Cyprus
tel.: (357 5) 393-444

fax: (357 5) 390-192

Remedica Ltd. - Minnex
London, England

tel.: (441 71) 408-0279

fax: (441 71) 493-7724

Remedica Ltd. - Minnex
1820 Minnesota World Trade Center
Saint Paul, Minnesota 55101, USA

tel.: (1 612) 290-9048

fax: (1 612) 290-0204

Remedica Ltd. - Minnex
Aleja Ujazdowskie 22/1

00-476 Warsaw, Poland

tel.: (48 22) 621-3592

fax: (48 22) 629-1962

Представительство в России:

Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 16,
корп. 2,

подъезд 8, 8 этаж, кв. 538

тел./факс: (095) 124-24-45

Москва, ул. Верхняя, 6, 8 этаж, кв. 45

тел./факс: (7 095) 257-60-23

Rhône-Poulenc Rorer**(Франция-США)****Представительство в России:**

101000, Москва, Уланский пер., 5

тел.: (095) 926-57-

11/12/13/14/15/16

факс: (095) 926-57-25, 956-57-10

телекс: 413555 RHON RU

Roha (Германия) -

Roha Arzneimittel GmbH

Rockwinkeler Heerstrasse 100

P.O. BOX 330 340

D-2800 Bremen 33, Deutschland

tel. 1049-421-257 91 21

Дистрибьютер в России:

ГП "Интерсэн" МЗ РФ

101479, Москва, Вадковский пер.,
18/20

тел.: (095) 973-15-60, 973-18-44

Roland (Германия) -

Roland Arzneimittel

GmbH

Bargkoppelweg 66, 22145 Hamburg,
Germany

tel.: (49) 40-679-05-0

fax: (49) 40-679-05-122

Romferchim (Румыния) -

Romferchim SA

202 A.Splaiul Independentei St. Bucha-
rest, Romania

tel.: (40-1) 6385095

fax: (40-1) 6384715, 3121141

Представительство в России:

Москва, ул. Мосфильмовская, 64

тел./факс: (095) 143-04-71

Roussel Uclaf (Франция)**Представительство в России:**

Хехст АГ

Хехст Мэрион Руссель

125015, Москва, ул. Вятская, 70, 5
этаж

тел.: (095) 232-19-25, 232-18-26

факс: (095) 232-19-28

спутниковый факс: (503) 232-19-28

S**Sanofi-Chinoin (Фран-
ция)**

Sanofi Pharma

32/34, Rue Marbeuf,

75008, Paris, France

Chinoin Pharmaceutical & Chemical
Works Co. Ltd.

H-1045 Budapest, To u. 1-5, Hungary

Представительство в России:

Sanofi-Chinoin

103045, Москва, Последний пер.,
23/3

тел.: (095) 721-14-00

факс: (095) 721-14-11

Santen (Финляндия) -

Santen Oy

Niittyhaankatu 20, P.O. Box 33, FIN-
33721,

Tampere, Finland

tel.: +358-3-2488111

fax: +358-3-3181900

Представительство в России:

117049 Москва, ул. Мытная, 1, поме-
щение 14

тел.: (095) 230-02-88

тел./факс: (095) 230-03-87

Schering (Германия) -

Schering AG

SCHERING Aktiengesellschaft

Postfach 65 0311

D-1000 Berlin 65
 tél.: (030) 4 68-13-45
 fax: (030) 4 68-59-98
 Fur Besucher: Berlin-Wedding
 Mullerstrasse 170-178
Представительство в России:
 129090 Москва, ул. Дурова, 26,
 корп. 1
 тел.: (095) 926-50-67
 факс: (095) 284-79-58

Schering-Plough (США) -

Schering-Plough Central
 East AG
 Topferstrasse 5
 6004 Lucerne, Switzerland
 tél.: (41) (41) 418-17-17
 fax: (41) (41) 418-17-27, 418-16-26
 telex: 868160

Представительство в России:
 121069, Москва, Хлебный пер., 19,
 этаж 4
 тел.: (095) 291-52-70, 291-74-30
 факс: (095) 291-50-60

Schwarz Pharma (Герма- ния) -

Schwarz Pharma AG
 40789 Monheim, Alfred-Nobel-Str. 10,
 Germany
 tel: (49 2173) 48-0
 fax: (49 2173) 48-16-08
 telex: 8515642

Представительство в России:
 109432, Москва, ул. Трофимова, 16
 тел.: (095) 234-98-95
 тел./факс: (095) 277-78-51, 277-68-
 80, 234-17-72

Searle (США)

Представительство в России:
 ООО "Серл Фарма"
 123242, Москва, Волков пер., 19
 тел.: (095) 255-00-01, 244-91-90
 факс: (095) 255-50-01
 телекс: 413314

Serono (Швейцария)

В составе Ares-Serono Group
 Ares-Services S.A.
 15-bis, Chemin des Mines, 1202 Ge-
 neva, Switzerland
 tél.: (41 22) 738-80-00
 fax: (41 22) 739-33-20

Представительство в России:
 119881, Москва, ул. Еланского, 2,
 офис 359-364

тел.: (095) 248-65-41
 факс: (095) 956-29-23

Servier (Франция)

Les Laboratoires Servier
 6, Place des Pleiades, 92415 Cour-
 bevoie Cedex, France
 tél.: (33)(1) 46-41-60-00
 fax: (33)(1) 47-89-11-91

Представительство в России:
 103009, Москва, Газетный пер., 17/9
 тел.: (095) 234-38-66
 факс: (095) 234-32-99

Slaviamed (Югославия)

J. Grujica, 25
 11000 Beograd
 tel./fax: (381) (11) 664 466
 Контактный телефон в Москве: (095)
 324-19-29

Slovakofarma (Слова- кия) -

Slovakofarma, a.s.
 Zeleznicna ul. 12, 92027 Hlohovec,
 Slovakia
 tel.: +42-804-523464
 fax: +42-804-523605

Представительство в России:
 119881, Москва, ул. Погодинская 10,
 корп. 1
 тел./факс: (095) 246-31-84, 232-18-
 63, 250-15-34

Sol Pharmaceuticals (Индия) -

Sol Pharmaceuticals Ltd.
 Regd. Office: 5-9-88/2
 "SAPHIRE BUILDING"
 Fateh Maidan, Hyderabad 500001,
 India
 tél.: (1091)-40 331-66-12
 tel./fax: (1091)-40 331-15-39, 331-07-
 87
 fax: (1091)-40 331-66-08, 331-66-06
Представительство в России:
 117321, Москва, Литовский бульв.,
 3-А
 тел./факс: (095) 427-53-22

Solco Basel (Швейца- рия) -

Solco Basel AG
 Ruehrbergstrasse 21 CH-4127 Birs-
 felden, Switzerland
 tél.: (061) 316-1616
 fax: (061) 313-0068, 313-0073
Представительства в России:



103473, Москва, Суворовская площадь, 1
 тел.: (095) 971-70-12, 971-70-71
 факс: (095) 755-68-61
 199026, Санкт-Петербург,
 В.О., 21-я Линия, 8-а
 тел./факс: (812) 327-74-93

Sun Pharma (Индия)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
 F.P. 145, Ram Mandir Road, Vile-
 Parle (E), Bombay 400057, India
 tel.: (022) 612-04-21, 615-38-51, 611-
 54-56, 611-54-62
 fax: (022) 611-36-77
 telex: 78349 SUN IN

Представительство в России:

113447, Москва, Севастопольский
 просп., 10, стр. 2
 тел.: (095) 126-64-82, 126-75-67, 126-
 49-57

факс: (095) 126-66-59

Дистрибьютеры в Москве:

Медэкспорт-Сервис

117342, Москва, ул. Бутлерова, 17

тел.: (095) 330-98-97

факс: (095) 330-98-65

Экохелл Фарм

117571, Москва, Ленинский просп.,
 156

тел.: (095) 438-73-21

факс: (095) 438-73-15

Инвакорп-Фарма

113105, Москва, Нагорный пр., 6

тел.: (095) 123-12-12

тел./факс: (095) 127-39-49

Synthelabo Groupe (Франция)

22 avenue Galilee, 92352 Le Plessis-Ro-
 binson, France

tel.: 33 (1) 45-37-55-55

fax: 33 (1) 45-37-59-42

Представительство в России:

АОЗТ "Синтеллабо"

109004, Москва, Воронцовская ул., 17

тел.: (095) 258-31-70

факс: (095) 258-31-71

T

Teva (Израиль) -

Teva Pharmaceutical In-
 dustries Ltd.

P.O. Box 3190, Petach Tiqva 49131,
 Israel

tel.: 03-926-72-70

fax: 03-926-74-23

telex: 381111 TEVPTA IL

Представительство в России:

117246, Москва, Научный пр., 8,
 офис 226

тел.: (095) 332-33-66, 721-17-39

факс: (095) 956-28-03

U

U.S. Quality Drug (США) -

U.S. Quality Drug Co.

P.O. Box 241, Bellerose, New York
 11426, USA

Представительство в России:

Корпорация "Технотрейд Интер-
 нэшнл"

109004, Москва, ул. Марксистская,
 20, строение 8

тел.: (095) 270-59-02, 911-66-70

факс: (095) 270-60-04

UCB (Бельгия) -

UCB S.A.

326, Avenue Louise

B-1050 Brussels, Belgium

tel.: (322) 641-14-11, 641-15-08

fax: (322) 641-16-90

telex: 21280 and 25669 ucbl b

Представительство в России:

117312, Москва, ул. Губкина, 14, кв.
 44

тел.: (095) 938-28-30, 938-20-88

факс: (095) 564-80-67

Unipharm (США) -

Unipharm, Inc.

350 Fifth Avenue, Suite 6701,
 New York, NY 10118, USA

tel.: (212) 594-32-60

fax: (212) 594-32-61

Представительство в России:

101953, Москва,

Петроверигский пер., 10, комн. 210

тел./факс: (095) 921-01-22

UPSA (Франция)

Laboratoires UPSA

128, rue Danton - 92500 Rueil-Mal-
 maison, Cedex, France

tel: (33 1) 47-16-87-72

fax: (33 1) 47-16-80-15

telex: UPSA 634 269 F

Представительство в России:

103001 Москва Трехпрудный пер., 7-
 9, строение 1 Н

тел.: (095) 755-92-67

факс: (095) 755-92-62

V

Vitas (США) -**Vitas Corporation**

70 East 55th Street, New York, NY
10022

tel.: (212) 355-30-30

fax: (212) 355-30-85

Представительство в России:

119021, Москва, ул. Россолимо, 4

тел.: (095) 246-93-66, 246-92-58, 246-43-36, 246-72-67

факс: (095) 246-95-43

Представляет интересы фирм As-
trapin (Германия),

Watson Laboratories (США), E.Denk
OHG (Германия),

STD Pharmaceutical Products Ltd.
(Великобритания)

Ganzoni & CIE AG (Швейцария),

Enzon Inc. (США).

W

Walsh Pharma (США)

Walsh Pharma, Division of Bob Walsh
Enterprises, Inc.

2025 First Avenue, Suite 320, Seattle,
Washington 98121 USA

tel.: (206) 441-7460

fax: (206) 441-1452

Представительство в России:

121019, Москва, ул. Новый Арбат, 21

тел.: (095) 291-93-74

факс: (095) 291-48-10

Wyeth-Lederle (США)

150 Randor Sbesta Road, St. Davids,
USA

Philadelphia, PA 19087

tel. 1 610 902 4902

fax: 1 610 902 4862

Представительство в России:

143013, Московская обл., Одинцов-
ский р-н,

Немчиновка-1, ул. Агрохимиков, 9

тел.: (095) 591-00-65, 591-83-92,,
591-83-86

факс: (095) 591-86-72

Y

**Yamanouchi (Нидерлан-
ды) -**

Yamanouchi Europe B.V.

Представительство в России:

109044, Москва, Саринский пр., 13

тел.: (095) 912-99-95, 926-55-89

факс: (095) 926-55-78

Z

**Zeneca (Великобрита-
ния) -**

Zeneca Ltd.

Представительство в России:

Зенека Москва

113054 Москва, Б. Строченовский
пер., 22/25, офис 201

Тел.: (095) 230-61-11

Факс: (095) 230-61-19

Zorka (Югославия) -

Zorka Pharma d.d.

Sabac-Jugoslavlja, Narodnih heroja b.b.

tel.: (015) 24-814

fax: (015) 22-355

telex: 10 812

Представительство в России:

121151 Москва, ул. Раевского 4

тел.: (095) 249-13-44, 244-74-33

факс: (095) 241-78-20

телекс: 414 334 GENEX SU



РЛС-ДОКТОР 97/98. Гл.ред. Ю.Ф.Крылов. Ред.кол. В.Л.Багирова, Г.Л.Вышковский, Е.Г.Лобанова, В.П.Падалкин, А.С.Румянцев, Г.С.Чернов. / М.: "Ремако", 1997. — 864 с.

РЛС-ДОКТОР 97/98 - одно из трех изданий системы справочников РЛС - содержит необходимую для врача информацию о 2000 лекарственных средств 226 отечественных и зарубежных производителей. Все препараты разрешены к медицинскому применению в России и реально присутствуют в ее аптечной сети.

РЛС-ДОКТОР 97/98 предназначен для врачей всех областей медицины, учащихся медицинских учебных заведений, включая систему постдипломного образования, и просто для людей, заботящихся о своем здоровье.

РЛС-ДОКТОР 97/98 - первый карманный справочник, применяющий в качестве поискового указателя динамическую нозологическую классификацию (по показаниям к применению), построенную на существующем в книге массиве описаний препаратов.

Подписано в печать 08.08.97. Формат 80x119/32. 27 усл.-печ.л. Тираж 50000 экз.

Свободная цена. Учредитель "Регистра лекарственных средств России" - ТОО "Ремако".

Редакция "Регистра лекарственных средств России". 123317, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 13.

Издательство "Ремако". 123317, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 13.

Лицензия на издательскую деятельность ЛР N 064459.

Типография "Graphischer Grossbetrieb Possneck GmbH". Karl-Marx-Strasse 24, D 07381 Possneck, Germany.



РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ (РЛС) — НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛЕКАРСТВ



Пятое издание "**Регистра лекарственных средств России**" (РЛС) 97/98 предназначено для врачей, фармацевтов и пациентов. Оно содержит информацию о всех **12000** препаратов, разрешённых к применению в России и адреса их производителей.

Преимущества РЛС 97/98:

достоверность и **актуальность** информации. Все сведения получены только из официальных источников и согласованы с фирмами-производителями;

полнота информации. Даны подробные описания и цены абсолютного большинства лекарств, имеющих в российских аптеках;

точность поиска данных, которую обеспечивают пять уникальных указателей, в том числе и нозологический - специально для врачей. В нём препараты сгруппированы по показаниям к применению. С помощью указателей по МНН и фармгруппам легко находить синонимы и аналоги препаратов.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРОВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ РЕГИСТРА — РЛС-ПК

РЛС-ПК содержит информацию из **РЛС 97/98** и **РЛС 96**.

Преимущества РЛС-ПК:

- быстрота поиска и выборки информации по запросам;
- ежеквартальное обновление информационной базы;
- возможность вывода нужной информации на печать или в текстовый файл.



Простота использования, подробное руководство пользователя и бесплатные телефонные консультации по вопросам работы программы позволят пользоваться **РЛС-ПК** даже начинающему.



РЛС-ДОКТОР

Это **карманное издание** разработано специально для практикующих врачей. В нем размещены подробные описания более **2000** новейших и наиболее употребляемых препаратов, а также даны адреса их производителей. При этом он такой компактный, что легко поместится в кармане или сумочке. А это значит, что нужная вам информация будет всегда под рукой!

РЛС - ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ВРАЧУ !

Заполните и вышлите нам этот бланк для оформления заказа на
"РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ".

Мы вышлем Ваш заказ в течение недели после поступления оплаты на наш
расчетный счет. ТОО "РЕМАКО", Россия, 123317, Москва, а/я 37.

Тел. (095) 256-51-70, 259-80-39; факс (095) 259-47-53.

БЛАНК-ЗАКАЗ

- ☐ Просим оформить заказ на книгу **"РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ" (РЛС) 97/98.**
- ☐ Просим оформить заказ на книгу **"РЛС-ДОКТОР" 97/98.**
- ☐ Просим оформить заказ на **РЛС-ПК** (компьютерную версию **"РЕГИСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ"**).
- ☐ Просим оформить подписку на книгу **"РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ" (РЛС) 98/99.***
- ☐ Просим оформить подписку на книгу **"РЛС-ДОКТОР" 98/99.***

Наименование справочника	Кол-во	Стоимость 1 экз.+ доставка 1 экз.	Общая стоимость
РЛС 97/98		59 000 руб.+25 000 руб.	
РЛС-ДОКТОР 97/98		9 000 руб.+10 000 руб.	
РЛС-ПК		550 000 руб.+20 000 руб.	
РЛС 98/99*		59 000 руб.+25 000 руб.	
РЛС-ДОКТОР 98/99*		9 000 руб.+10 000 руб.	
		НДС не облагается	+0%
		ИТОГО:	

* выйдет в сентябре 1998 г.

Деньги в сумме _____ рублей,
одновременно перечисляем на ваш расчетный счет, платежным поручением

№ _____ от " _____ " _____ 199__ г.

Копия заверенного банком платежного поручения прилагается.

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ТОО "РЕМАКО", ИНН 7703006721,
р/счет №41467445 в АБ "ТОРИБАНК", МОСКВА, кор. счет 715161800,
БИК 044583715. Код по ОКОНХ: 71212, 51510; код по ОКПО: 35265404.**

Заполните реквизиты Вашего учреждения для выписки счета-фактуры

Ф.И.О. руководителя _____

Организация _____

Адрес _____

Тел., факс _____

Банк. реквиз. _____

ИНН _____

Код по ОКОНХ _____ Код по ОКПО _____

**Укажите информацию о себе для включения в программу бесплатного
распространения РЛС среди практикующих врачей**

Ваши Ф.И.О. _____

Должность _____

Подразделение _____

Специальность _____

**Теперь Вы также можете оформить подписку на РЛС в ближайшем
отделении связи по каталогу Роспечати "ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ".**

РЛС 97/98
ИНДЕКС 45 942

РЛС-ДОКТОР 97/98
ИНДЕКС 45 944

РЛС-ПК
ИНДЕКС 45 943



Основные разделы нозологической классификации

1. Болезнь ЛУЧЕВАЯ	19
2. Заболевания ГЛАЗ	19
3. Заболевания ИНФЕКЦИОННЫЕ	22
4. Заболевания КОЖИ	26
5. Заболевания МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ	35
6. Заболевания НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ	36
7. Заболевания ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ	41
8. Заболевания ОРГАНОВ ЖКТ И ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ	47
9. Заболевания ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ	56
10. Заболевания ОРГАНОВ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ	58
11. Заболевания ОРГАНОВ СЛУХА	66
12. Заболевания ПОЛОСТИ РТА	67
13. Заболевания СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ	68
14. Заболевания УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ	77
15. Заболевания ЭНДОКРИННЫЕ	84
16. Нарушения ИММУННОЙ СИСТЕМЫ	87
17. Нарушения ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ	87
18. Нарушения ПСИХИКИ	91
19. Нарушения СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ	96
20. Синдром БОЛЕВОЙ	97
21. Синдром ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ	101
22. Синдром ГИПОКСИЧЕСКИЙ	101
23. Синдром ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ	101
24. Синдром ЛИХОРАДОЧНЫЙ	102
25. Синдром СНИЖЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	102
26. Состояния АКУШЕРСКИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ	102
27. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА	103
28. Хронические и острые АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	104

РЕГИСТР
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
РОССИИ



ДОСТОВЕРНОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
ПОЛНОТА



РЛС
ДОКТОР

97/98



ВИНПОЦЕТИН

Тел. 095 938 92 18 / 956 82 97
Факс: 095 938 92 20